

渴

白汗

黃疸

發熱

往來寒熱

瘧

葶勞

虛羸

痞悶

腹脹

水腫

積聚

霍亂

嘔吐

吃逆

咳嗽

喘

鼻衄

血崩

月水不調

月水不通

瀉利

赤白痢

大便秘澀

大便不通

遺尿

淋瀝

小便數

小便不禁

小便出血

大便下血

陰脫玉門不閉

陰蝕

乳少

乳汁自出

吹妳

妬乳



渴

熊產後心煩發渴宜清心蓮子飲

雜病白濁

薛前證若

出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門

丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱

用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血

湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余

以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加

發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門

五味氣血漸復



熟地黄湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黄 酒洗淨蒸 壹錢半 人參 去蘆

麥門冬 去心各 貳錢 瓜蒌根 貳錢 甘州 炙半


右作一服水貳鍾糯米壹撮生薑叁片紅棗叁枚同煎至壹鍾不拘時服

產寶療產後大渴不止

蘆根 切壹升 瓜蒌 人參

甘州 各叁 大棗 貳拾枚

麥門冬 生肆兩



右以水玖升煮取叁升分三服頓服四劑即瘥忌菘菜

黃芩散 楊氏 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬 各等分

咬咀每服叁錢水盞半煎至捌分去滓溫服無時

括萋根湯 集驗 療產後血渴

括萋根 肆兩 麥門冬 去心 人參 各叁兩

生乾地黄 甘州 各貳兩 土瓜根 伍兩

大棗 貳拾枚 產寶無地黃麥門冬有牡蠣粉等分

咬咀以水捌升煮取貳升半分三服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉 叁升

甘艸

人參

茯苓 各壹兩

小麥 伍合

生薑

半夏 各叁兩

麥門冬 伍兩

大棗 拾伍枚

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取柒升去

滓內藥再煎取貳升去滓一服五合日三夜一

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或

因吐瀉所致者

人參

白朮 炒

木香

白茯苓

甘草 炒

藿香

乾葛 各壹錢

右水煎服

竹葉歸芪湯

治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉 壹錢半

黃芪 貳錢

白朮

人參

當歸 各壹錢

麥門冬 去心 柒分

甘艸 炒 伍分

右水煎服

玄胡索散 治產後失血渴不止

鬱金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

玄胡索

右各等分以好醋浸一宿焙乾末之每服貳錢陳

皮湯調下日三夜一

桃花散 治產後不煩而渴

新石灰 壹兩 黃丹 伍錢

右為細末渴時井水調下壹錢

本治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末貳錢白湯調下如渴燥甚井花水下

治產後中風煩渴用紅花子伍合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

療血渴及產後渴疾用蓮子心生取為細末米飲調下貳錢効

自汗

大夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成瘧縱不成瘧亦虛乏短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也薛按前證屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附芪附等湯若汗多亡陽發瘧尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至額而還額上偏多蓋額為六陽

之所會也。由虛熱熏蒸而出竊謂前證當以部位分之。額左屬肝，額右屬肺，鼻屬脾，頤屬腎，額屬心。治者審之。一產婦略聞音響，其汗如水，而昏憤。諸藥到口，即嘔。余以為脾氣虛敗，用參附末為細丸，時含三五粒，隨液嚥下，乃漸加之。至錢許，却服參附湯，而痊。一產婦盜汗不止，遂致廢寐，神思疲甚，口乾引飲。余謂血虛有熱，用當歸補血湯，以代茶。又以當歸六黃湯，內黃芩、連檉、炒黑倍，加人參、五味子、二劑而愈。大凡產後忽冒悶，汗出不識人，治用雞子及竹瀝。薛前證屬太虛宜固，元氣為主，其汗不止必變柔瘥。

東垣先生云：婦人分娩及半產漏下，昏冒目瞋，蓋因血暴亡而火上熾，但補其血則神自昌。若常時血下當補而升舉，其氣陽得血而神安，則目明矣。今立一方以補手足厥陰之血，兼益陽氣，名曰全生活血湯。全生活血湯 治發熱自汗盜汗目瞋四肢無力口乾頭暈行步欹側

- 升麻 芍藥炒各 參錢 柴胡
- 當歸 防風 羌活
- 獨活 葛根 甘草炒各 貳錢
- 川芎 藁本各壹錢 伍分 生地黄

熟地黄 各壹錢 細辛

蔓荆子 各伍分

紅花 叁分

右每服伍錢水煎熱服

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸

黃芪

麻黃根

牡蠣 服為粉

人參

粉草 各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

又方

當歸

黃芪 各壹兩

麻黃根 貳兩

右咬咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服

千金療產後風虛汗出不止小便難四肢拘急難以

屈伸

甘草 炙壹兩

附子 半箇炮去皮尖

桂心

芍藥 各壹兩半

右咬咀每服叁錢水壹盞生薑肆

片棗壹枚煎柒分去滓空心溫服 忌豬肉冷水生葱等物

經効療產後汗出不止

黃芪 拾貳分

白朮

牡蠣 煨

茯苓

防風

麥門冬 去心

生地黄 各捌分

大棗 柒枚

右咬咀水貳升煮取柒合去滓空心分溫兩服

療產後血氣暴虛汗出 淡竹葉煎湯參合微溫服之須臾再服

又方 馬齒莧研取汁參太合煮一沸投蜜匙許冷停頓服無新者用乾者煮汁入蜜服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煨研粉

小麥麩炒令黃色碾為粉

右等分和勻煮生豬肉汁調下貳錢無時

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

當歸 各等分

右為末以豬腰子壹隻去脂膜切小片子以水參

升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁壹盞入藥貳錢煎至捌分溫服不拘時

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止不應加入參

白朮 心血不足加酸棗仁炒

當歸

熟地黄自製

黃芪炒各貳錢

生地黄

黃檗炒哩

黃芩炒黑

黃連炒黑各壹錢

右水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便

自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等證

人參

壹兩

附子

炮伍錢

右作二服薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪

附湯 芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰涌四肢

逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃芪 壹兩 附子 炮伍錢

右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全

濟 當歸補血湯 見前 十全大補湯 見下

黃疸

丹治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不

來時發熱脉弦 白朮 壹兩 人參

牡丹皮 生地黃

柴胡 芍藥 各半兩 川芎

黃芩 乾葛 各壹錢 甘草 伍分

右分十二貼水煎食前熱服

此方一服入四月內... 婦人血氣虧損... 宜用當歸補血湯... 若誤認爲火證投以... 涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不... 熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而... 熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無... 水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助... 其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中... 心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱

發熱

薛產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認爲火證投以涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱

產後 婦科五 卷十
是無水也治法前證無水者六味丸無火者八味丸
氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯 大尹俞君之
內產後發熱晡熱吐血便血兼盜汗小便頻數胸脇
脹痛肚腹痞悶余曰此諸臟虛損也治當固本為善
自持知醫用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹
痛足冷始信余言診其脉或浮洪或沉細或如無其
面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨
時從證先用六君子湯加炮薑肉桂數劑胃氣漸復
諸證漸退更佐以十全大補湯半載全愈 儒者揚
敬之內人所患同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑

不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛
不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸
補土之母而痊 一婦產後三日起早况氣血未定
遂感身熱目暗如風狀卽以清魂散二服得微汗而
愈 滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱
衆皆以為感寒溫以薑附益太熱手足搐搦語謔目
攛診其脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑
如焙燥無津潤胸腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內
熱而風生血蓄而為痛也曰此產後熱入血室因而
生風卽先為清熱降火治風涼血兩服頗爽繼以琥

產後 女科 五
百十一
珀牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀
三四服惡露大下如初時產已十日矣于是諸證悉
平一婦盛暑月中產三日發熱其脈虛疾而大惡
露不行敗血攻心狂言叫呼奔走掣捉不住以乾荷
葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服即
定惡露旋下而安一婦產後時發昏瞢身熱汗多
眩暈口渴或時頭痛惡心醫用四物涼血之劑病不
減又用小柴胡病益甚石山至診得浮洪搏指汪曰
產後而得是脈又且汗多而脈不為汗衰法在不治
所幸者不喘不泄耳其脈如是蓋涼藥所激也用人

參參錢黃芪貳錢甘草當歸各柒分白朮門冬各壹
錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服五劑脈歛而病漸安
王愈憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲引冷水
瓜果謔語若狂飲食不進體素豐厚不受補醫用清
涼熱增劇診得六脈浮大洪數江曰產後暴損氣血
孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補氣血與八珍湯
加炮薑八分熱減大半病人自以素不宜參芪不肯
再服過一日復大熱如火復與前劑潛加參芪炮薑
連進二三服熱退身涼而愈

行血
當歸養血丸 產後 腹痛

當歸黃芪湯 腰痛

虛 當歸補血湯

當歸散 並見胎自墮半產條

虛 大全人參湯 見上

羅氏犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角 麥門冬 白朮 各半 柴胡 壹兩

枳殼 欬炒 地骨皮 生地黃 甘艸 炒

當歸 人參 茯苓 黃芩

黃芪 各柒錢

右咬咀每服肆錢薑參片浮麥柒拾粒水煎服
三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

柴胡 黃芩 人參 半夏

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

甘草 各壹錢半

作一服水貳鍾薑參片紅棗壹枚煎一鍾無時服
三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

白朮 白茯苓 黃芪 各壹錢 柴胡

人參 各壹錢半 黃芩 半夏 甘草 半錢

右作一服水貳鍾生薑參片紅棗壹枚煎至壹鍾
食前服

加味逍遙散

治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸

白芍藥

乾葛

生地黃

川芎

黃芩

人參

麥門冬

柴胡

烏梅

甘草

右剉散分作二服用水壹鍾煎至柒分空心服

虞

產後發熱多屬虛寒惟乾薑加入補藥中神效此

丹溪法也

人參當歸湯

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

則生內熱心胸煩滿呼吸短氣頭痛悶亂晡時轉

甚與大病後虛煩相類

方見前產後虛煩

往來寒熱

郭產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能

令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒

陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟

腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於

脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜

增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別

之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和

也增損四物湯不一皆隨病加減薛產後寒熱因

氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之證經云陰虛則發

熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用發表降火若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黄丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八瓊湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認爲寒則誤矣 一產婦惡寒發熱用十

全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難候其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾上飲食停滯而作用六君加木香一劑而安 一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛也不信仍服一劑汗出不止譫語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補湯二劑益甚脉洪大重按如無仍以前湯加附子四劑稍緩數劑而安 吳茱山治一婦人產後去血過多食後著惱頭疼身

痛寒熱如瘧左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食
飲痰火也二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補
心湯去地黃加羌活青皮葱棗三服汗出身涼其患
漸差然後以八物湯調理半月後全愈 一婦產後
惡露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料
五積散五貼惡露自下而寒熱除 又一婦產後惡
露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脈緊而
弦以葱白散二貼安 一少婦初產四日冷物傷脾
胃但覺身分不快嘔逆飲食少 心腹滿悶時或腹
脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽搐頗

類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實
熱用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不効汪
至見醫滿座亦踞縮診其脈弦而緊遂令按之小腹
急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還
有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客于經
絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡
血成冰其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗
許臭不可近患人覺倦病勢漸減然後以人參養榮
湯數十貼月餘如初

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

保治日久虛勞微有寒熱脈沉而數宜柴胡四物湯

川芎

當歸

芍藥

熟地黄各壹錢半

柴胡捌錢

人參

黃芩

甘草

半夏各叁錢

右為末水煎服

雲產後往來寒熱脈弦者少陽也小柴胡加生地黄湯

柴胡貳兩

黃芩伍錢

人參叁錢

半夏壹兩半湯洗

大棗叁枚

生地黄

梔子

枳殼剉炒名伍錢

右如前煎服

增損柴胡湯 治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥各等分為改咀

右每服叁錢薑伍片棗貳枚水同煎食後日二服

增損四物湯方見本卷腹痛 評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二臟邪大抵

一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可

云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣

與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散
入醋煎佳

雲岐熟地黃散 治產後蓐勞皆由體虛氣力未壯
勞復所起四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃

人參

白芍藥

白茯苓

白朮

續斷各壹兩

黃芪

桂心

五味子

當歸

川芎各柒錢半

大全方有麥門冬柒錢半

右咬咀每服肆錢薑三片棗壹枚水煎服一方
無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各柒錢半作散

黃芪丸 治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠
疼氣力羸乏

黃芪

鼈甲

當歸炒各壹兩

桂心

白芍藥

續斷

川芎

牛膝

菴蓉

沉香

栝子仁

枳殼各柒錢半

五味子

熟地黃各半兩共為細末

右煉蜜和丸梧子大每服肆伍拾丸食後粥飲下
大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯
榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆

汚血

產後 往來寒熱

百七

氣血未平之所為也

大豆

壹兩半 炒去皮

茯神

壹兩

真琥珀

壹錢

右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

加減烏金散

治產後寒熱似瘧

錯雜之邪

厚朴

各貳錢

柴胡

黃芩

麻黃

各貳錢

陳皮

當歸

川芎

桔梗

茯苓

各壹錢 伍分

桂枝

蒼朮

白芷

枳殼

各壹錢

羌活

草果

半夏

各貳錢

甘艸

玖分

白芍藥

熟地黄

各壹錢 五分

右剉為散分作兩服每服用水壹鍾半薑叁片葱

叁莖煎至壹鍾不拘時服 有汗多當歸川芎白

芍藥熟地黄 有脹多厚朴陳皮 有熱多柴胡

黃芩 有寒多蒼朮草果桂枝 有痰多半夏桔

梗茯苓 有頭痛多川芎白芷羌活 有瀉去積

殼甘草不用 如方用有餘血塊在腹作潮熱疼

懷香遍身痛加羌活獨活 寒熱往來加黃芩柴胡

產寶療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生

瘡時時乾嘔困乏悶絕

產後往來與熱

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹茹

遠志

扶神

白欬

玄參

竹瀝

右取銀壹斤水壹斗伍升煮取柒升下諸藥重煮取參升分温叁服忌魚酒濕麵等

知母湯

治產後乍寒乍熱通身温壯胸心煩悶

知母

叁兩

芍藥

黃芩

各貳兩

桂心

甘草

各壹兩以
上為呷咀

右水五升煮取貳升半分三服

一方不用桂心

用生地黄

瘧

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用入參養胃湯飲食勞役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子夫凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱

交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷
寒戰如慄雖見百證當峻溫補其病自退若誤用清
脾截瘧之類多致不起 一產婦患瘧發熱作渴胸
膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸噯氣此是飲食所
傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作
酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至
三十五日計進飲食七十餘椀腹始悶令用豬膽汁
導而通之其糞且不甚燥 一產婦患瘧久不愈百
病蜂起其脉或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名
狀用六君加炮薑二十餘劑脉證稍得又用參朮煎

膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥 一產婦朝寒暮熱或
不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑
而尋愈

草果飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱
者宜此

- 半夏湯泡 赤茯苓 甘草炙 草果炮去
- 川芎 陳皮 白芷各貳錢 青皮去白
- 良薑 紫蘇各貳錢半 乾葛肆錢

右以咀每服參錢水壹大盞薑叁片棗貳个同煎
至柒分去滓當發日侵早連進三服無有不安

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴生去粗皮 半夏

陳皮 甘草 大棗去核 生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿紙裹煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤伍錢重水貳錢煎至柒分食前一服食後一服

補遺產後瘧疾熱多寒少者清脾湯 寒多熱少者養胃湯 久而不已者七寶飲方並見雜病瘧

尋勞

夫產後尋勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏于氣血則不能温于肌膚使入虛乏勞倦乍卧乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣而感于肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受干風邪流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此則尋勞之候也 又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺各

曰蓐勞薛按前證當扶養正氣為主用六君子湯
加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥
門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓
荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝
腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味
子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍
加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢用加味道遙散不
抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而
作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其
病自愈矣仍參虛煩發熱方論上治汪一婦產未

虛熱

滿月因怒氣血流如水二百方止隨又勞苦四肢無
力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴
芩薄荷之類其熱愈熾診其脈弦大無力此蓐勞也
以四物湯壹兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熱
退身涼後以黃連八珍丸一料而安

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼
痛面色痿黃名曰蓐勞

豬石子壹雙去脂 香豉一方無此 葱白切

粳米 當歸 芍藥各貳

右咬咀分兩劑每劑用水參升煮取壹小碗去滓

產後 蓐勞

又并五

百三三

分三服 廣濟無芍藥有人參

增損柴胡湯 見前往來寒熱

豬腰子粥 治蓐勞發熱 用豬腰子壹枚去白膜

切作柳葉片以鹽酒拌先用粳米壹合入葱椒煮

粥鹽醋和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作蠶生

狀空心服

虛寒人參鼈甲散 治蓐勞皆由在產內未滿百日體中

虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成蓐勞

其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏

痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困

在床服此大效

人參 桂心 當歸 桑寄生

白茯苓 白芍藥 桃仁 麥門冬 去心

熟地黄 甘草 各半 續斷 貳錢 牛膝 柒錢

鼈甲 黃芪 各壹兩

右為細末每服先以豬腎壹對去筋膜以水兩大盞生薑半分棗叁枚煎至壹盞去豬腎薑棗然後入藥末貳錢蔥白叁寸烏梅壹箇荆芥伍穗煎至柒分去滓空心晚食前温服此藥神妙

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力

遂覺項膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此為毒勞

豬腎壹雙去脂 當歸 芍藥

生薑各貳兩 葱白切 桂心各壹兩

右水捌升煮腎取陸升下藥煮取貳升分溫二服

熟地黄散見前

白茯苓散治毒勞緣生產日淺久坐多語運動用力致頭自四肢疼痛寒熱如瘧狀宜此

白茯苓壹兩 當歸 川芎 桂心

白芍藥 黃芪 人參各半兩 熟乾地黄壹兩

吹咀先以水貳盞入豬腎壹雙去脂 薑片參枚 煎壹

盞去三物入藥半兩煎柒分去滓食前分溫三服

黃芪丸往來寒熱

胡氏牡丹散

白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮

人參各半兩 沒藥 桂心各貳錢 牡丹皮叁錢

右為細末每服貳錢水酒各半盞如不飲酒只用

水壹盞開先錢壹枚麻油蘸之同煎柒分去滓通

口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煮散

鼈甲醋炙 黃芪各壹兩 桂心 當歸炒

桑寄生 白茯苓 白芍藥 人參

治產後毒勞

或憎寒壯熱四肢痠疼心煩頭痛

面無顏色

熟地黄 麥門冬去心 甘草炙各半兩 牛膝朱錢半
右為細末每服用豬石子壹對去脂膜切破先以水壹盞入薑半分棗叁枚煎至米分去石子薑棗却下藥伍錢更煎至肆分去滓空心晚食前溫服
二滓併煎

黃芪建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒

肉桂各壹兩

白芍藥炒貳兩

甘草炒朱錢

每服伍錢薑棗水煎服日二三服虛甚者加附子紫河車丸治勞勞及產後虛弱大効猶犬產兒即食其胞衣故無產疾方見虛勞

虛羸

產實云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可涉喧否則氣血復傷虛羸之證作矣 薛前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若嘔氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣
丹產後補虛

人參

白朮 各壹錢

黃芩

歸身尾 各伍分

川芎 半兩

陳皮 叁分

右水煎服如有寒加乾薑叁分茯苓壹錢

保命三元湯治產日久虛勞而脉浮大者即小柴胡

合四物也

治產後日久虛勞鍼灸不效者三合散此四君子四物小柴胡三

方合和是也

白朮

川當歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地黄 各壹兩

柴胡

人參 各壹兩半

黃芩

半夏

甘草 各陸錢

川芎 壹兩

右為粗末每服壹兩水壹鍾半煎服日三

當歸羊肉湯 治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹

痛

肥羊肉 壹斤去脂水壹斗煮取捌斤去肉

當歸 伍兩

黃芪 肆兩

生薑 陸兩

右以肉汁煮三味取貳升伍合分為四服若覺惡

露不盡加桂叁兩惡露下多加芎叁兩有寒加茱

萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黃汁貳合

保命治產婦虛勞不能食十全散即十全大補湯

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參 白木 白茯苓

黃芪 當歸 熟地黄酒洗蒸焙

白芍藥炒 川芎各壹錢 肉桂

甘草炙各伍分 右薑棗水煎服

當歸建中湯 見前腹痛

雲岐治產後虛損飲食不下四物加建中 人參 白木 茯苓 主之

療產後太虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黃芪 白木 當歸 人參

甘草各貳兩 生薑肆兩 先以白羊肉叁斤去膜水

壹斗玖升煮肉取汁伍升下諸藥煮叁升分三服

天_勞夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷

搏於血氣血氣不能溫於肌膚使入虛乏疲頓致羸

損不平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷使

入無子 薛前證若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒

用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱

用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味

產後 女科 五
百五
逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯
產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃耆 當歸 芍藥 人參各參 桂心

甘草 川芎 生薑各肆分 大棗拾貳枚

右九味水柴升者參升分温參服

療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸 人參 生薑各貳兩 黃芪參兩

淡豉參合 豬腎貳枚 粳米參合 薤白參合

右水壹斗伍升先煮豬腎取陸升下諸藥煮取貳升分爲參服

又方 豬腎壹雙煮入葱豉作臠如常食之

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見睨丸則愈 陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四物湯去地黃加入參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見睨丸却能作效 薛前證若宿食停滯用六君枳

實神麩若因肉食所致更加山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受傷用六君子湯或燕酸變腐加炮薑作瀉更加升麻如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯 一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積為患用大酒麩炒為末溫酒調服貳錢俄而腹鳴良久仍下粽而愈 一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數劑而愈 見現丸

薑黃炒

三稜醋炒

萹澄茄

陳皮去白

良薑

人參

蓬莪茂酒炒各等

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麩糊丸如梧子大每服叁拾丸蘿蔔湯下白湯亦可

腹脹

郭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何益日敗血散於脾
胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不
能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止
吐藥治之病與藥不相于轉更傷動正氣疾愈難治
但服抵聖湯則愈薛前証若敗血傷於脾胃宜用
前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於
胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為
善一產婦患前証或用抵當湯敗血已下前証益
甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用

產後發長

文子五

百三十一

此方治產後腹脹滿悶嘔吐不定者何益日敗血散於脾
胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不
能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止
吐藥治之病與藥不相于轉更傷動正氣疾愈難治
但服抵聖湯則愈薛前証若敗血傷於脾胃宜用
前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於
胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為
善一產婦患前証或用抵當湯敗血已下前証益
甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用

補中益氣湯加炮姜溫補脾胃重墜如失又用八君
子湯而安

抵聖湯入生姜半兩焙乾水煎方見胎前腹脹○薛氏云此方最宜用之
局方平胃散加人參亦可

此方不速而止... 且報受之... 局方平胃散加人參亦可

水腫

郭產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢
留淫日深却還不得腐壞如米故令面黃四肢浮腫
醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥極虛
入夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致天
枉但服小調經散血行腫消則愈 陳無擇曰產後
浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失
於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留
滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脈證治之
宜得其情小調經散治血分固効但力淺難憑不若

吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也 又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也 繫古如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度 如浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也 如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也 如只浮腫止七聖丸本方服 東垣中滿分消丸雜病用四物脹滿丹產後腫必用大補氣血為主少佐以蒼湯吞之

木茯苓使水自利 薛前證若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參雜證本門主治 一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈 一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈用補中益氣而脾胃健 杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜治之杜

產後水腫

女科五

百三

至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛寵小便不澀不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八經半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血藏風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名損金湯者是也牡丹散見血暈一婦產後四肢浮腫寒熱往來益因敗血流入經絡滲入四肢氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解頻服小調經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

行血

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見產後

寒熱小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

細辛

麝香

各半錢

右為細末每服半錢薑汁温酒各少許調停服

治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆

大麥蘖

等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾

產後水腫

大調經散

百三十五

漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散

但是產後諸疾熱酒調下貳錢

行氣

經云產後肌浮柑皮酒服橘皮為末每服貳錢酒調

白朮湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

枳實 壹兩半

白朮 叁兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服腹中爽即當散也

行氣利水

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行

氣可也

白朮 貳兩半

陳皮 壹兩

川芎 半兩

木通 陸錢

茯苓 叁錢

右用米前下與點九貳拾伍九黃芩為末粥九名與點九亦名清金九奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 叁兩

白麩 叁兩

大半夏 七枚

右以生薑汁搜麩裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調壹盞小便利為効

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已 等分

利便治寒

右為采每服貳錢温酒調下不飲者醋湯調亦可
漢防已散 此藥虛人戒服

漢防已

緒苓

枳殼

桑白皮 各壹兩

商陸

甘州 各米錢半

右為粗末每服肆錢水壹盞半薑叁片煎至柒分
去滓空心温服

七聖丸 雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臍氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虚浮惡
寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

虚邪冷内勝宿疾轉增

吳茱萸 壹兩半

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防風

半夏

細辛

當歸

赤茯苓

牡丹皮

桂心 各半兩

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓食
前熱服

補脾腎利

金匱加減腎氣丸 方見雜病水腫

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參

白茯苓

熟地黄

產後

女科五

百三

小懷香 各參錢 白朮

川芎 各肆錢

當歸 白芍藥

香附子 各伍錢

甘草 黃芩

柴胡 各壹錢

右劉散分作六七服每服水壹鍾半薑參片煎至
柴分空心熱服盡此藥方服調經丸 若肚痛加
延胡索乾漆枳殼 各參錢 若嘔吐惡心加良薑砂
仁 各貳錢 若手足麻痺加肉桂 壹錢半 若咳嗽加
五味子欬冬花杏仁

積聚 血瘕即兒枕宜參看

大夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成
皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣
聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者
積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣陽性
浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱為
風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也
薛前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當
固真氣為主若求旦夕之効而攻其邪則速其危矣
當參前雜證積聚諸方論治之 一產婦腹中似有

產後積聚

女科五

百三

一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皎白脉浮而瀦余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破血行氣痛益甚轉動無常又認以為血鼈專用破血驅逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信為鼈確服下蟲等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉裏以為鼈子畏藥而走於外余曰肝藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節胸項皆屬肝膽部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈一婦月經不調兩脇腫脹小便澁滯腹中一塊作痛或上攻脇

腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無味殊類瘵證久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨證互服而愈

血瘕

天新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也謂其痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也薛前證乃寒邪乘客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養為善難經云任脉之病男子為疝疝女子為瘕聚當參前後各論治之

丹南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比
前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴
血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨
則痛稍定大小便抽痛小便澀大便略下少赤積垢
食不進口略渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷
之血妄行而不得洩所以為病也

砂仁
黃芩 各叁分
滑石 壹錢半
桃仁 柒粒
右水酒煎服
芍藥湯 命保治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自

川芎
牛膝 貳錢

安

芍藥

黃芩

茯苓 各陸兩

右劉散每以半兩水煎溫服日三

丹產後消血塊

滑石 叁錢

沒藥

血竭 各貳錢

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末
麵糊丸白朮湯陳皮湯任下

又方消血塊

香附 童便浸

桃仁 去皮留

為末醋糊丸

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

產後積聚

女科五

當歸 貳兩

桂心

芍藥 炒

血竭

蒲黃 炒各壹兩半

延胡索 炒壹兩

右為末每服貳錢空心熱酒調下

葛氏方治證同前 桂心為末每服壹錢空心酒調下

產寶療血痕痛無定處

童便 叁升

生地黄汁

生藕汁 各壹升

生薑汁 叁升

右先煎前三味約三分減一次下薑汁慢火煎如

稀餲每服取壹合暖酒調下

千金療血痕

生乾地黄 壹兩

烏賊魚骨 貳兩

右為細末空心溫酒調服貳錢匕

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

川芎

當歸 去蘆

乾薑 炮

赤芍藥 各等分

右為細末每服貳錢食遠用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或

成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心

當歸

赤芍藥

牡丹皮

沒藥

檳榔 各半兩

產後積聚

六十五

青皮

乾漆

炒烟盡各
柴錢半

大黃

桃仁

去皮尖

三稜

煨

玄胡索

鼈甲

酥炙

厚朴

製各壹兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服參肆拾丸食前用溫酒送下

霍亂

大產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸太段虛冷者加附子來復丹亦妙薛一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈後胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作瀉余謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼恚怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無

補法而用辛散或用平補之劑必致不起一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

白朮散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘紅

麥門冬去心

乾薑

人參各壹兩

甘草半兩

為粗末每服肆錢水壹盞生薑伍片煎去滓溫服溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參

白朮

當歸

草豆蔻仁

乾薑

厚朴壹兩半製

右為粗末每服叁錢水煎服

附子散 治產後霍亂不止手足逆冷

附子炮

白朮

當歸

吳茱萸洗

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草各半兩

右為細末每服貳錢粥飲調下不拘時

高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疔痛

良薑

當歸

草豆蔻仁

右等分為細末每服貳錢用粥飲調下

產後霍亂 女科五

右二方非真寒不可用

局方參苓白朮散療產後霍亂吐利身熱帶渴者良

方見雜
病泄瀉

若吐逆不受湯藥以伏龍肝細末參錢米湯調下即受

餘詳雜病霍亂門

嘔吐

大夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也薛前證若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土用六君升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有

生者 一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰
降火肥體日瘦飲食日少前證愈甚余曰早間吐痰
脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也
遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調理
而痊

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜
服此

訶子肉 壹兩 人參 壹兩 甘草 半兩

右三味為細末別以半夏半分生薑壹分薤白貳
柒莖水壹大盞煎至陸分去滓分為兩服

瘕產後嘔逆不止 鄧知縣傳

橘紅 壹兩 半夏麴 甘草 各半兩

霍香 參兩

右為細末每服貳錢水壹錢半薑叁片煎至陸分
溫服無時

治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮 壹兩貳錢半 生薑 壹兩半

右細切酒水各貳升煎取壹升分叁服

產後嘔逆不已四君子湯加陳皮半夏藿香砂仁
石蓮散 治產後咳逆嘔吐心怔目暈

石蓮子去殼壹兩 白茯苓壹兩 丁香伍錢

右為細末米飲調服參錢無時

內熱嘔吐服前藥不効者以枇杷葉去毛 茅根各伍錢煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

吃逆

大夫肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不順則吃逆也脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噎者胃寒所生服藥無効者灸期門參壯必愈期門穴乃胃之本絡薛前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦有復生者參附湯見前自汗

產後吃逆

女科五

五十五

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香

白豆蔻仁各半兩

伏龍肝壹兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下壹錢如人行五里再服

石蓮散 見嘔吐

產寶療產後吃逆三日不正欲死方

桂心半兩

薑汁叁合

右同煎取貳合以火炙手摩背熱時塗藥汁盡

妙

治產後吃逆方 用乾柿壹枚切碎以水壹盞煎至

陸分熱呷之

又方 古壁鏡窠叁肆個水壹小盞煎至半小盞熟

服

羌活散 靈苑

治吃逆

羌活

附子炮

懷香炒各半兩

木香

白薑炮各貳錢半

右五味為末每服貳錢水壹盞鹽壹捻煎拾數沸熱服一服止

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆効

右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂

熱者宜乾柿竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子佐之誤施則有謬濟之悔慎之

夫古聖製藥參戰固水宜不益頭至平小益燥

咳嗽

大夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫鹽太早而咳嗽者難治產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麵壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方黑神散五積散加棗煎服 薛產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用芎歸熟地參朮肺氣傷者用四君芎歸桔梗陰

產後咳嗽

六十五

百五

火上炎者六味地黄加參朮風寒所感者補中益氣
加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘急用二味參蘇飲多
有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前飲亦有
得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根
本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患
者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於巳土
亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感其陰火
上炎亦壯土金生腎水以制火為善若逕治其病則
誤矣 一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感用
參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓

半夏一劑而痊又與六君加黃芪以實其腠理而安
一產婦咳嗽痰盛面赤口乾肉熱晡熱徹作無時
此陰火上炎當補脾腎遂用補中益氣湯六味地黃
丸而愈 一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此
病在胃關於肺用異功散而愈

表

表

旋復湯

即旋復花湯見喘
有汗者去麻黃

知母飲

治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服

此藥若傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治

知母

貝母

白茯苓

人參 各貳錢

桃仁

杏仁

並生去皮
尖各壹錢

產後惡露 六味 百病

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服
集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘

甘草

苦梗 各壹兩半

款冬花 壹兩

生麥門冬

生地黄 各叁兩

葱白 壹握

豉 貳合 舊方無葱白與豉

右吹咀水貳升煮取捌合去滓食後分兩服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母 各壹兩半

桑白皮

茯苓 各貳兩

淡竹葉 貳拾片

右吹咀水貳升煎取捌合去滓食後分兩服
療產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗 各陸分

桑白皮 貳拾分

乾百合

赤茯苓 各捌分

右吹咀水貳升煮取柒合去滓食後分兩服

自製噲化丸 見前雜病咳嗽

產後喘極危多死也 郭產後喉中氣急喘促者
何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相
隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無
主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡
露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹
胞衣血去喘自定 陳無擇評曰產後喘急固可畏
若是敗血上熏於肺猶可責効奪命丹若感風寒或
因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰
乎若榮血暴絕宜大料煮芩藹湯亦可救傷風寒宜

喘

產後喘極危多死也 郭產後喉中氣急喘促者
何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相
隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無
主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡
露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹
胞衣血去喘自定 陳無擇評曰產後喘急固可畏
若是敗血上熏於肺猶可責効奪命丹若感風寒或
因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰
乎若榮血暴絕宜大料煮芩藹湯亦可救傷風寒宜

旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見現丸五積散芎藭湯薛前證若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附湯四劑而愈浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二月洗浴即氣喘但坐不得卧者五個月惡風得暖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不効用牡丹皮菴仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜

蔓仁煎湯服之即寬二三服得卧其痰如失蓋作活血感寒治之也

血氣

血竭散治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾宜服

真血竭如無紫山沒藥

右等分研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

雲岐參蘇飲治產後血入於肺面黑發喘欲死者

治後喘 女科五 百五十二

人參壹兩 蘇木貳兩

右以水兩碗煮取蘇木壹碗以下去查調參末隨時加減服神效

表

旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐卧不安

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗

半夏麴 前胡 甘草炙

茯苓 五味子 杏仁去皮尖炒

麻黃各等分 一方芍藥茯苓多一倍

右以咀每服四錢水壹盞半生薑參片棗壹枚煎

裏

至米分去滓食前温服有新者不忌服

若傷鹹冷飲食而喘者宜見現丸見前

五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子杵炒 人參 杏仁各貳錢

麥門冬去心 陳皮各壹錢

右薑參片棗貳枚水煎服

大補湯 治產後百白外面青浮腫唇白氣急有汗

乃太虛之證急宜服此

當歸頭 大川芎 大白朮

白芍藥 白茯苓多 人參多

黃芪多

五味子

熟地黄

乾薑上下

甘草少

右剉散水煎服此二貼不退即加川烏木香穿磨入服有瀉加訶子肉豆蔻粟殼

鼻衄

鼻衄

郭產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證胃絕肺敗不可治經驗方云急取緋線壹條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可治亦禳厭之一端也薛按胃脈俠口繞承漿蓋鼻隼屬脾土鼻孔屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之證急用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者汪一婦

產後鼻衄

女科

百三

產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升
遂用益母丸貳丸童便化下鼻衄漸止下血漸通

血崩

陳產後血崩者何答曰產卧傷耗經脉未得平復勞
役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷壽榮
衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急
服固經丸以止之 陳無擇評曰血崩不是輕病况
產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多
因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血
不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若大
料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得
薛前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛

症芎藭湯肝火血妄行加味道遙散脾鬱不統血加
味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷
血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼
一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如
湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君加炮黑
乾薑四劑稍愈又以十全大補三十餘劑而痊一
產婦血崩因怒其血如湧仆地口噤目斜手足抽搐
此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸證悉退但
食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈
固經丸

艾葉

木賊各半兩

赤石脂煨

附子壹枚炮

補骨脂炒

右為末陳米飯和丸如梧子大每服貳拾丸食前
溫酒下米飲亦可

芎藭湯加芍藥方

芎藭

當歸

芍藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓熱服
無時

熟乾地黄散治產後崩中頭自旋運神思昏迷四肢
煩亂不知人事

產後 女科 五

熟乾地黄 伏龍肝 黃芪

赤石脂各壹兩 阿膠 甘草

白朮 艾葉炒 川芎

人參各半兩 當歸半錢

右吹咀每服肆錢水壹盞半薑叁片煎至柒分去

滓温服

白芍藥散 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

白芍藥 牡蠣 乾薑

熟乾地黄 桂心 黃耆

烏賊魚骨 鹿角膠 龍骨各壹兩

右為末每服貳錢食前温酒下

又方 赤石脂 熟地黄各壹兩

鹿茸 牡蠣 當歸各半兩

右為細末食前以粥飲調下貳錢

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各壹兩 續斷

川芎 當歸 甘草

丹參各壹兩 龍骨 鹿茸酥炙

烏賊魚骨 鼈甲炙各貳兩

右煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下貳叁拾丸

產後 血崩 大科 六

芎藭酒 治產後崩中下血不止 芎藭壹兩半以

酒貳盞煮取壹盞去滓分溫三服食前

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮百枚燒存性 棕櫚燒存性 當歸

桂心各壹兩 鯉魚鱗燒 川芎各柒錢半 檳榔貳枚

右為細末每服叁錢煨薑酒調下如未止更進一

服或非時血崩無藥可治但進三服即止

補遺治產後血崩 香附子炒赤貳兩 蓮蓬殼伍枚燒存性

右為末米飲調下貳錢

產後血崩素有熱者奇効四物湯良方見血崩

月水不調

大產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風

邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血

消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調

也 產前證若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加

柴胡丹皮不及期而來血熱也四物山梔柴胡將來

而作痛者血實也四物加桃仁紅花過期而來者血

虛也四物加參朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔

炒連丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陳治當

臨證制宜 一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之

劑血更如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遙散調理而安

琥珀散 治產後經脈不調四肢痲疼飲食全少且

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生乾地黄

當歸 各壹兩

桃仁

赤芍藥 各半兩

右為粗末每服叁錢水壹盞薑壹片煎至陸分去滓服

薑黃丸 治產後虛之不足胸心短氣腹內緊急腰背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃

當歸

熟地黄

牡丹皮

厚朴 製

桂心

川芎

續斷

菴仁

白朮 各壹兩

赤芍藥

木香 各柒錢半

羚羊角屑 貳錢半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食前溫酒下

白朮
 川芎
 益母草
 當歸
 赤芍
 蘇木
 桂枝
 茯苓
 澤瀉
 黃芩

月水不通

大夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷
 血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡
 之間故令月水不通也凡血結月水不通則成血瘕
 水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也
 婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽
 小腸之經手少陰心之經此一經上為乳汁下為月
 水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去
 血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或二歲之
 內而月經不行此是常候即非病也何必通之諺云

產後月水不通

女科五

百五十八

妳假是也若半歲而行者或四五箇月便經行者皆
是少壯血盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必
四肢尪羸肚大青筋頭大髮焦好啖泥土病名無辜
若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經
不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脉虛氣
血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥自然
通行若用牛膝紅花蘇木乾漆蜜蟲水蛭等藥以通
之則爲害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎初
虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而
不可得也後之學者更宜詳審而療之

薛前證脾

胃虛弱用六君子湯若兼蓄時火傷脾用歸脾湯加丹
皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛
用八珍牡丹皮仍參前論主之 一產婦月經年餘
不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少
倦怠胸滿氣壅朝用加味道遙散夕用四君子湯月
許諸證稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈
以上三證宜於調經門中參看通用

西... 卷... 三

... 山... 用... 六... 子... 用... 六... 子... 用... 六... 子...

瀉利

郭產後腹痛及瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入太腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白眩脇填脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從內性况勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有

產後瀉利

正方 薛產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛
 不能消食當審而治之若米食所傷用六君加穀蘖
 若麵食所傷用六君加麥蘖若肉食所傷用六君加
 山查神麩凡兼嘔吐皆加藿香若兼燕酸或嘔吐用
 前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮
 薑若寒水及來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣
 下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾
 土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加
 木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬
 命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便

滯滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎
 利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若
 久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞
 胎主於任而繫於腎况九月十月乃腎與膀胱所養
 必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之
 劑是虛其虛也 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多
 肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹隆年餘
 矣余以為脾胃瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘
 而痊 一婦產後泄瀉兼嘔吐燕酸面目浮腫此脾
 氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而燕酸

愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康。一產婦瀉利年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱吐痰者乃脾虛不能統攝歸源也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而脾胃健。一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不進與死為鄰此脾腎俱虛用四神丸十全大補湯而愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯而康。一婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六君子湯送香連丸一服漸愈仍以前湯送四神丸四

服全愈至七月終怠惰嗜卧四肢不收體重節痛口舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒悽慘不樂此肺之脾胃俱虛而陽氣寒不伸也用升陽益胃湯而痊。汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時即泄下如此半月餘衆皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰此產中勞力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯調服旬餘而安。

丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞

泄不禁下青白黑色用荆芥大者肆伍穗於盞內燒
灰不得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能
治大病方名的奇散
產後泄方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

乾薑

滑石

陳皮

芍藥

炒各

右水煎服之

調中湯

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子

川芎

甘草 半兩

右為粗末每服參錢匕水盞盞煎至壹盞去滓熱服

右方惟寒中洞泄者宜之其腸胃有熱者當服黃連而愈如金丸香連丸之類若戊巳丸固腸丸四神丸五味子丸之類皆產後大便不實必用之藥已詳載雜病及前泄瀉門中茲不贅引

本草綱目卷之四十一
木香
木香味甘辛平
主心腹痛
治一切氣痛
治一切風濕
治一切瘧疾
治一切痢疾
治一切嘔吐
治一切泄瀉
治一切霍亂
治一切傷寒
治一切瘟疫
治一切瘡毒
治一切疥癩
治一切濕疹
治一切皮膚病
治一切眼疾
治一切耳疾
治一切鼻疾
治一切口疾
治一切舌疾
治一切喉疾
治一切咽疾
治一切膈疾
治一切胃疾
治一切脾疾
治一切肺疾
治一切肝疾
治一切腎疾
治一切膀胱疾
治一切小腸疾
治一切大腸疾
治一切婦人經閉
治一切婦人血虛
治一切婦人產後
治一切婦人胎前

甘草

芍藥

附子

川芎

赤白痢

大產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛之未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無方瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下痢又有產後氣宇不順而下

產後赤白痢

百六十五

痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澁之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣未有不妥者也薛前證白屬氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱漸愈又用八珍大補兼服調理尋愈一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脉大無力口

乾用黃芩芍藥湯三服而安

熊治產後赤白痢證用四君子湯加黃耆粟殼神效雲救急散治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地黄各壹兩

甘草

當歸各叁兩

右咬咀水煎分二服空心飲

大當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後血暈崩中久痢方見血崩

療妊娠血痢用阿膠貳兩以酒壹升半煮壹升頓服產後諸痢煮薤白食之又方羊腎脂炒薤白空心

食之甚佳

經治產後胎前痢疾敗龜甲壹枚米醋炙研為末醋

湯調下

丹溪云龜甲大補陰治勞倦

丹婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石

白芍藥炒

蒼木各伍錢

白朮貳錢伍分

訶子貳錢煨

乾薑肆錢

茯苓壹錢

右為細末調下保和丸肆伍拾粒

雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼

等藥

黃連丸治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連肆兩

阿膠

蒲黃

梔子仁各壹兩

當歸貳兩半

黃芩

黃蘗各貳兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服陸柒拾丸米飲吞

下日三夜

仲產後下痢虛極白頭翁加甘艸阿膠湯主之脉經作熱

痢重下新產虛極者

白頭翁

阿膠各貳兩

黃連

黃蘗

秦皮各叁兩

甘草貳兩

產後赤白痢

女科五

百病

右以水米升者取貳升半納膠令消盡温分三服
婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心温
熟水調下壹錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二
大合煎壹沸下蜜壹合調頓服

滑梅治產後血泄不禁餘血作痛兼瑰桂心乾薑等分
為末空心酒調服方寸匕

天療產後痢日五十行者取木裏蛙蟲糞屑炒黃急
以水沃之令稠稀得所服之即瘥

聖治產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四温服

渴產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養
臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣
脾胃既虛不能尅水水自流溢浸漬皮膚則令人腫
但止其渴痢則自瘥 產前證若渴而不喜冷飲屬
胃氣虛不能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口
渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以益氣湯
以滋化源 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌體消瘦
飲食少思或胸膈痞悶或小腹脹墜年餘矣余以為
脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而瘥
一產婦患前證形體倦怠飲食不進與死為隣此脾

胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

必効療產後痢而渴飲無度數 麥門冬陸分 烏梅

貳拾 細到水壹升者取拾 柴合拾 細呷

經効療產後久痢津液涸渴不止

龍骨拾貳分 厚朴 茯苓 黃芪

麥門冬 人參各捌分 生薑陸分 大棗拾肆個

右以水壹大升者取柴合空心分兩服

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥古今錄驗

冬瓜壹枚 黃泥糊厚伍寸煨爛熟去皮絞汁服之瘥

補遺人參白朮散治產後痢津液竭渴不止方見胎前霍亂

大便秘澀

郭產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛

竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹

中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜

服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則陽

消陰長變證百出性命危矣 薛產後大便不通因

去血過多大腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日

期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿覺脹自欲去

而不能者乃結在直腸宜用豬膽汁潤之若服苦參

藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能

正必成敗證若屬血虛火燥用加味道遙散氣血俱
虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類 一產婦
大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所
入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十
一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先去乾糞五七塊後
皆常糞而安 一產婦大便八日不通用通利之藥
中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用
蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六
君加吳茱肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然
多致不起 一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等

藥致吐瀉不食腹痛胸痞余用六君子加木香炮薑
治之而愈 一婦人大便秘澁諸藥不應苦不可言
令飲人乳而愈

麻仁丸

麻仁 研如泥

枳殼

人參 各壹兩

大黃 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下貳拾丸
未通漸加丸數不可太過
評曰產後不得利利者百無一生去血過多臟燥
大便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯蔥涎調

臘茶為丸復以臘茶下之必通子常用局方四物湯以生地黃易熟

地黃加青皮去白煎服甚効

本事婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當用紫蘇子大麻子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁壹盞分二次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人諸虛風秘皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶余辨說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚於

胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

丹產後秘結不通膨滿者氣急坐卧俱難用大麥蘖炒黃為末酒下壹合神效出兵部手集

大小便不通

大產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱下津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不通也薛嘗治一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

桃花散

治膀胱氣滯血澁大小便秘

桃仁

葵子

滑石

檳榔各等分

右為細末每服貳錢空心蔥白湯調下

療產後大小便不利下血

產後大小便不通

聖惠

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黃

芍藥

各壹兩
伍錢

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

通氣散治產後未小便不通亦可用封臍法見前雜證大便

不通

心治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三

里關元三陰交陰谷主之

大小便不通

遺尿

薛產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主虛寒加肉豆蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方

按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子丸主之雜病泄瀉

一產婦大便不實飲食少思或侵晨遺尿此中氣虛

寒脾腎不足用補中益氣送四神丸而痊 一產婦

小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用

六君子湯二劑又用五苓散二劑而痊尋常腸交亦

可用

廣濟療產後遺糞方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半盞亦治男子

集驗方

療產後遺糞亦治男子

礬石枯 牡蠣煨各等分

右為末酒服方寸匕日三服

補遺療產後遺糞不知出時方

白飲

芍藥

各等分

酒服方寸匕

補遺治產後遺糞不知覺可服固腸丸方見前雜症泄瀉條
華佗云病人卧遺尿不覺者死

淋悶

大產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澁痛故謂之淋 又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血即流滲於胞中故血隨小便出而為血淋淋者淋瀝之謂也 三因論曰治諸產前後淋秘其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最是產後要藥唯當尋究其所因則不失機要矣 薛按前證若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源也 一

產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈余以為肺腎之氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根 捌兩 瞿麥穗 白茯苓 各肆

葵子 人參 各貳 蒲黃

桃膠 滑石 甘草 各壹兩

紫貝 拾枚煨 石首魚頭中石 貳拾枚燒

右剉散每服肆大錢水壹盞半薑參片燈心貳拾莖煎至柒分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下

貳錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散金千 療產後淋

滑石 壹兩貳錢半研 通草 車前子

葵子 各壹兩

右為末以漿水調服方寸匕至貳匕為妙

張不愚療產後小便不通淋閉方

陳皮 壹兩去白為末 空心溫酒調下貳錢一服便通

療卒不得小便方

杏仁 拾肆枚 去皮尖 右炒為末和飲頓服通

療產後淋小便痛及血淋

白茅根

伍兩

瞿麥

車前子

各貳兩

鯉魚齒

壹百枚為末

通草

叁兩

冬葵子

貳合

右水貳升者取壹升入魚齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中填可與臍平却用葱白剥去麤皮拾餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子太小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述出產集

小便數

夫產後小便數者乃氣虛不能制故也 薛前證若因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎 一產婦小便頻數時復寒戰乃屬脾肺虛弱用補中益氣湯加山茱山藥為主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙散而安 一產婦患前證吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛用補中益氣湯以六味丸而愈又患痢後小便頻數手足俱冷屬陽

氣虛寒用前湯及八味丸而瘳

桑螵蛸散千金治產後小便數及遺尿

桑螵蛸參拾枚煨 鹿茸酥炙 黃芪各參兩

牡蠣煨 人參 厚朴 赤石脂各貳兩

右為末空心粥飲調下貳錢外臺無厚朴石脂有甘草生薑

括蔞湯集驗 療產後小便數兼渴 桑螵蛸 甘草

並黃連各貳兩 生薑各貳兩 括蔞根參兩 人參參兩 大棗伍拾枚

右細切用水柒升煮貳升半分三服忌豬肉冷水

補遺瘳產後小便數或遺尿 益智仁為末米飲調服

小便不禁

陳婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時 丹嘗

見收生者不謹損破產婦尿管致病淋瀝遂成廢疾

一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者

宜可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚示曰

難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以

參芪為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以

豬羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用壹兩至二月

而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮略發熱于午後此膀胱

產後小便不禁

女科五

道正七

脫為坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各壹錢半

白朮

壹錢

人參

陳皮

各伍分

甘草

炙少許

右水煎熱服之

薛前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血熱用加味道遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頓緊面色頓赤仍用前散佐以六君子湯以清肝火生肝血

培脾土而痊

廣濟療產後小便不禁

鷄尾毛燒存性酒調下壹

匕日三服

千金治產後遺尿不知出

白薇

芍藥

各等分

為末酒服方寸匕日叁

又方

桑螵蛸

半兩炒

龍骨

壹兩

右為末食前粥飲調下貳錢

固脬散治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

產後小便不禁

卷二十一

五

產後 女科 五 百五十八

黃絲絹自然黃者染黃者不用參尺以炭灰汁
兩蜜壹兩白茅根貳錢馬屁勃末貳錢

右用冰貳升再煎至壹盞空心頓服服時飲氣服
之不得作聲如作聲無効

補遺補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋
濕不乾

生絲絹黃色者壹尺 白牡丹根皮木 白芨各壹錢
用冰壹碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無効

雞內金散 治產後溺床失禁
以雞脬脰壹具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

小便出血

大產後小便出血者因血氣虛而熱乘之血得熱則
流散滲於胞內故血隨小便出 產婦尿血面
黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味道遙補中益
氣煎服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血
仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於衆論服犀
角地黄湯諸證復作仍服前湯而愈

治小便利血方

亂髮湯洗垢膩淨
右燒研為末米飲調服方寸匕

產後 小便出血 女科 五

又方 用滑石研髮灰分等每服壹錢地黄汁調下

崔氏方 療產後血滲入大小腸

蜜壹大合 車前草搗汁壹升

右相和煎沸分兩服

補遺方治產後小便出血

川牛膝去蘆水煎服

又方

生地黄汁半升生薑自然汁半合

右相和服之

大便下血

薛產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損陽絡外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若因淳酒濕毒葛花解醒湯若因怒動肝火六君加芍藥柴胡芎歸若因鬱結傷脾加味歸脾湯若因思慮傷心妙香散若因大腸風熱四物加側柏荆防枳殼槐花若因大腸血熱四物加芩連若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡若因腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中益氣加茯苓半夏若因氣虛用六君升麻若因血虛用四物氣血俱虛用八珍俱加柴

胡升麻大凡病久或元氣虛弱見病百端皆因脾胃
虧損內真寒而外假熱但用六君子或補中益氣加
炮薑溫補脾氣諸證悉退若四肢畏冷屬陽氣虛寒
急加附子病因多端當臨證制宜庶無誤矣 一產
婦糞後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣
虛弱用補中益氣加吳茱炒黃連五分四劑頓止但
怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而痊 一婦人
但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痞悶此木
乘土用六君加山梔柴胡而愈又用補中益氣加味
逍遙一藥而不復作 一婦人久下血在囊前屬脾

胃虛寒元氣下陷用補中益氣湯加連炒吳茱一錢
數劑稍緩乃加生吳茱五分數劑而愈 一婦人產
後便血口乾飲湯胸脇膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲
食不甘體倦面黃日晡則赤酒浙惡寒此脾肺氣虛
先用六君加炮薑木香諸證漸愈用補中益氣將愈
用歸脾湯全愈後飲食失節勞役兼怒氣發熱血崩
夜間熱甚謔語不絕此熱入血室用加味小柴胡二
劑而熱退用補中益氣而血止用逍遙散歸脾湯調
理而康

陰脫產門不閉
三因婦人趣產勞力努嘔太過致陰下脫若脫肛狀
及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續
續小便淋露
硫黃散 治產後勞傷陰脫
硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 貳錢
右為末 摻患處
桃仁膏 治產後陰腫妨悶
桃仁 去皮 枯礬 五倍子 各等分
右以下二味為末 研桃仁為膏 拌勻 傅之

陰脫產門不閉

三因婦人趣產勞力努嘔太過致陰下脫若脫肛狀
及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續
續小便淋露

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 貳錢

右為末 摻患處

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁 去皮 枯礬 五倍子 各等分

右以下二味為末 研桃仁為膏 拌勻 傅之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃 肆兩

吳茱萸

兔絲子 各壹兩半

蛇床子 兩

右每服肆錢水壹椀煎數沸濾滓洗玉門日再洗

熨法

單炒蛇床子乘熱布裏熨患處亦治產後陰痛

當歸散 治陰下脫

當歸

黃芩 各貳兩

芍藥 壹兩半

蛭皮 燒存性半兩

牡蠣 煨貳兩半

右為末每服貳錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重

丹溪 一婦人三十餘歲生女二百後產戶一物如手

帕下有帕尖約重壹斤予思之此因胎前勞之傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞急與炙黃芪半錢人參壹錢白朮伍分當歸壹錢半升麻五分二貼連服之即收止得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脉皆瀼左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮壹錢生薑壹片煎二三貼以養之一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有一歧其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂

用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來
曰服二次後覺響一聲視之已收陰戶訖但因經宿
乾着席上破一片如掌心大在席其妻在家哭泣恐
傷破不可復生予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破
尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加人
參與一百貼三年後復有子 治子宮下用黃芪壹
錢半人參壹錢當歸柒分升麻參分甘草貳分作一
貼水壹鍾煎至伍分去滓食前服却用五倍子末泡
湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下
玉門不閉氣血虛弱也用十全大補湯腫脹炊痛

肝經虛熱也加味道遙散若因憂怒肝脾氣血傷也
加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯
一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補加五味子
數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門
閉 一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒
熱作渴嘔吐不食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫
及於脣諸證蜂起此真氣虛而邪氣盛也先用六君
子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數劑而全
愈 一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少
思朝寒暮熱自汗盜汗半年矣用補中益氣湯加茯

女科五
百四
苓半夏膿水漸少飲食漸進又用歸脾湯共五十餘劑而愈一產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一塊攻走脇下或脹或痛用加味道遙散加車前子而愈一婦人子宮腫大二白方入損落一片殊類豬肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍復生育

外治

治產後陰腫下脫肉出玉門不閉石灰壹升炒湯極熱貳升投灰中適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須平復如故又方以鐵精粉一推內之又灸臍下橫紋伍柴壯

一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裏炙熱熨推肉之

鐵精是鍛鐵爐中飛出如塵紫色而輕虛可以坐磨器血者

子母療產後陰下脫燒兔頭末傳之

補遺治產後生腸不收用枳殼煎湯浸良久即入

又方五倍子白礬煎湯浸亦良又方酸篤草俗

名老鴟酸煎湯用草坐不開孔纔薰收一半稍溫

下手洗並收入而安

又方子宮脫出以溫水洗軟却用雄鼠糞燒烟熏入

又法革麻子拾肆粒去殼搗爛塗頂心如入即洗去

針灸

東婦人胞胎門落頰不收常濕神關 玉泉伍拾

身交臍下指縫中灸 又法 玉泉傍開三寸隨

年壯參報 女人陰門冷腫 取來參拾

甲婦人陰挺出四肢淫樂身悶少海主之照海

陰中肉線 一婦產後水道中出肉線壹條長三四尺

動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑叁斤研

爛入清油貳斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于

水道邊以前薑熏之冷則熨之一日夜縮其大半

日即盡入再服失笑散等歸湯調理之如肉線斷則

不可治矣

陰蝕

大凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠹瘡

或痛或痒如蟲行狀淋漓膿汁陰蝕幾盡者此皆由

心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡

皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當

補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可 薛前證乃

肝脾鬱結之證木旺生蟲耳宜解鬱清肝備見前雜

證陰中生瘡類 一產婦素有肝火患此內潰痒痛

食少熱渴小水淋瀝用加味道遙散加味歸脾湯兼

服間以蘆薈丸外以鶴虱草煎洗而愈

陰蝕 婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠹瘡

千金方 蒲黃 參升 水銀 壹兩 二味研勻以粉上
又方 肥豬肉拾斤水壹碩煮水浸冷即易不過三
兩度

洗搨湯方

甘草

乾漆 各壹兩

黃芩

乾地黄

當歸

芍藥 各貳兩

龜甲 伍兩

右細切以水柴升煮耗一半以綿帛內湯中以搨
瘡處良久即易日二度每搨湯可人行十里許即
衰乾拾取甘濕散薄傅瘡上使遍可經半日又以

湯搨訖如前傳藥 余家婢遇此疾醫療不差
蝕處作兩瘡深半寸余因檢得此方仍以自處蟬
蛇膽散不經七日瘡乃平復甚効凡治數十人應
手而瘥請廣布之

甘濕散

又名蟬蛇膽散

療疔蟲陰蝕

蟬蛇膽

真者

青木香

石硫黃

鐵精

麝香

各肆分臨時分之多少入綠麝香碎蛇毒若先以相

利蛇膽即無力也舊用五月五日蟻蟄

右陸味各等分為末更細研有患取如三基子和
井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏

下部訖然後取藥如碁子安竹管裏吹入下部中亦用再度老少量減其熏法每日壹度不用再為之良

療疔蟲蝕下部及五臟方 取桃東南枝參朮枝輕

搥頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏

桃枝燃轉之令未少厚又截壹短竹筒先內下部

中以所燃藥桃枝熟燃熏之

文仲療陰蝕欲盡者方 以蝦蟇兔屎等分為末傳

之良

狼牙湯 古今錄驗 療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭

穢

狼牙 卷兩

右吹咀以水肆升煮取半升去滓內苦酒如雞子

中黃大沸湯壹盃消盡夜滴寒温以綿纏筋頭大

如繭濡湯以瀝瘡中日四五度即瘥

補遺治產後陰戶生瘡

青黛

黃丹

水粉

五倍子 等分為末

用賣肉鋪上拭肉巾燒為末和前藥先以荆芥薄

荷栢葉煎湯洗淨後摻藥如瘡乾可用油調末塗

又方 平胃散加貫衆末每貳錢熟煮豬肝拌藥內
陰戶中

乳少

大凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡
不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁
若乳盈溢可潑東壁上佳或有產後必有乳若乳雖
脹而產後畧作者此年少之人初經產乳有風熱耳
須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液
故也須服滋溢之藥以動之若雖有乳却又不甚多
者須服通經之藥以動之仍以羹臠引之蓋婦人之
乳資於衝脉與胃經通故也有屢經產而乳汁常多
者亦婦人血氣不衰使然也太抵婦人素有疾在衝

盛者服之

任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱而多疾
三因產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不
行者有血少氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之
盛者當用通草漏蘆土瓜根葦虛者當用煉成鐘乳
粉豬蹄鯽魚之屬槩可覓矣 薛前證若氣血虛弱
而不能化生宜壯脾胃怒動肝膽而乳腫汁出宜清
肝火夫乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經若屢
產無乳或大便澁滯當滋化源
漏蘆散 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯
妳乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內

消乳汁通行

漏蘆 貳兩半

蛇蛻 拾條

瓜萋 拾枚急火燒焦存性

右為末温酒調下貳錢無時候服藥後即以豬蹄
羹投之經驗方有牡蠣燒存性 一方只用牡蠣
煨末酒調

又方

葵菜子 炒香

縮砂仁 各等分

右為細末每服貳錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行
津液止蔡張不愚方常用極有驗

產寶療產後乳無汗方

產後乳少

女科五

百九

土瓜根

通草 肆兩

涌蘆 各叁兩

甘州貳兩

右水捌升煎取貳升分温叁服忌如常法 一方加桂心並為末酒服方寸匕

產書下乳汁

土瓜根為末酒調服壹錢日三四服

下乳汁以京三稜叁個水貳碗煎取壹碗洗取汁下為度極妙

湧泉散 成都教授單驤方療產乳無汁亦治乳結

癰腫

穿山甲

洗淨壹兩 灰炒燥

為細末酒調服方寸匕

必用方云涌蘆括萋皆要藥或云多食豬蹄羹括萋取子淨洗炒令香熟槌破取仁在上攤泔令白色研為細末温酒調下壹錢服了合面卧少時末効再作一方瓜萋壹枚熟搗以白酒壹斗煮取肆升去滓温飲壹升日叁

成煉鍾乳散

療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕

少

成煉鍾乳粉

研細 濃煎涌蘆湯調下貳錢

靈死下乳汁立効方

虛者補之

產後乳少

女科十五

百九

粳米

糯米各半

萵苣子壹合並淘淨

生甘草半兩

用水貳升煎汁壹升去滓分叁服立下

又方 豬蹄壹隻通草肆兩水壹斗煮作羹食之妙

薛一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴

余謂血氣虛以玉露散補之而愈

玉露散 治乳脉不行身體壯熱疼痛頭自昏痛大

便澁滯等證

川芎

桔梗

白芷各貳錢

芍藥

當歸各壹錢半

人參

白茯苓

甘州各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服如頭熱甚大

便秘者加大黃叁錢

羅氏湧泉散

治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去心

龍骨

穿山甲

炮黃

王不留行

各等分

右為細末每服壹錢熱酒調下後吃豬蹄羹少許

又用木梳於左右乳上各梳叁貳拾梳日三服依

前法

又方治妳汁少

瓜蒌根

薄荷幹身 等分

右為粗末先喫羊蹄汁壹碗次服藥後再喫葱絲羊羹湯少許出効

有入乳汁不行已十七日諸藥無効遇有入送赤豆一斗遂時常煮粥食之當夜乳脉通行

又方 麥門冬不拘多少去心焙為末以酒磨犀角約壹錢許煖犀角酒調門冬末貳錢服之不過兩服乳汁便下

乳汁自出

大產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之

若乳多温滿急痛者温帛熨之產寶有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可 有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及薛前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散肝經怒火用四物參朮柴梔肝脾鬱怒用加味歸脾湯 一產婦勞役忽乳汁如涌昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

漏蘆散 見前

吹妳

大產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰速至死者速服皂角散括萋散傳以天南星散以手揉之則散矣
薛前證用藥切不可損其氣血餘詳外科乳癰條
括樓散方

乳香 壹錢 研

括樓實 壹个 研勻 溫酒煎服

天南星散

南星

為末

溫湯調以鷲翎蘸塗患處

皂角散

歌曰

婦人吹妳治如何皂角燒灰蛤粉和熱酒壹杯調
捌字須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛

百藥煎為細末每服叁錢酒壹盞煎數沸熱服

乳硬作痛

嫩桑葉生研以米飲調攤紙花貼腫處

補遺治產後吹妳結實腫痛

用陳皮

壹兩

甘艸

壹錢

水貳碗煎至壹碗分兩服

產後吹妳

卷十五

百七

次用荆芥羌活獨活煎湯熏洗即散

妬乳

夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺便知以手將捏去汁更令傷人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰也輕則為吹乳妬乳重則為癰雖有專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝

玄參

芍藥

白斂

防風

射干

大黃

杏仁

甘草 各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服

療產後婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜蒌 壹箇半 生半炒 大粉草 壹寸半 生薑 壹塊半

右同剉用酒壹椀煮取壹盞去滓服之其痛一會

不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側

卧於床上令其藥行故也

療產後吹乳作癰

葵莖及子

右擣篩為散酒服方寸匕即愈

又方 雞屎乾為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方 皂角拾條以酒壹升揉取汁消石半兩煎成

膏傳之

療乳腫將次結成癰方 右以馬溺塗之立愈

補遺療產後吹妳妬妳但未結成癰或成癰未作有

膿者

蔓荊子搗爛酒服仍以滓敷患處

又方用赤小豆酒研爛温酒服滓封患處

乳頭小瘡 搔之 米出

又方仙人掌草壹握小酒糟壹塊生薑壹大塊同研

爛入桂末少許炒酒服留滓罨患處

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁

出浸淫為長百種療不差者動經年月名為妬乳病

婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍

皮湯及天麻湯洗之傳一物飛鳥膏及飛鳥散佳始

作者可傳以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯

槲皮叁升切

温之分以洗乳

右以水壹斗煮伍升夏冷用秋冬

天麻湯

天麻草伍升切

右以水壹斗半煎取壹斗隨寒

温分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏着花赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散

飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑烟名維粉者參參兩兩熬令焦燥礬石燒粉

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三作者不須和有汁自着可用散亦傅諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡

疔蝕口浸淫瘡蝸瘡等並以此傳之

又黃連胡粉膏散方

黃連貳兩

胡粉貳兩半

水銀壹兩同研令消散

右參味搗黃連為末參物相和皮裏熟按之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中以傅乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡若着甲煎為膏千金同補遺婦人乳頭小淺瘡爛痒以芙蓉花或葉乾為末摻之又有婦人乳頭裂痛取秋後冷落茄子花裂開者陰乾燒存性水調塗之

寬文十三年癸丑仲秋吉辰

銅駝坊書肆

村上平樂寺刊行

