



門牌  
82  
卷42

西  
曆  
大  
正  
十  
年  
十  
月  
十  
日

西  
曆  
大  
正  
十  
年  
十  
月  
十  
日  
本  
州  
古  
蹟  
之  
一  
也  
其  
地  
在  
本  
州  
之  
東  
南  
角  
其  
地  
之  
廣  
闊  
約  
有  
十  
餘  
町  
其  
地  
之  
高  
低  
約  
有  
十  
餘  
町  
其  
地  
之  
廣  
闊  
約  
有  
十  
餘  
町  
其  
地  
之  
高  
低  
約  
有  
十  
餘  
町

周氏

杏林

幼科證治準繩自序

醫家以幼科為最難謂之啞科謂其疾痛不能自陳說也稱黃帝之言曰吾不能察其幼小為別是一家調理耳吾獨謂不然夫幼小者精神未受七情六欲之攻臟腑未經八珍五味之漬投之以藥易為自功猶膏粱之變難窮而藜藿之腹易効也何謂難乎然古今輯是科書未有能善者如心鑑之蕪穢類萃之粗略新書則有古無今百問則挂一漏萬皆行於世未足為幼科準繩也故吾輯為是編而麻疹一門尤加詳焉平生聚麻疹書百數十家率人所寶秘千金

杏林

周氏

不傳者然多猥陋不足采擇益可以見世之無具眼  
矣或曰夫人之病無論男女長幼未有能越五臟者  
也子於它科不分五臟而獨幼科分之何居曰正以  
精神未受七情六慾之攻臟腑未經八珍五味之漬  
獨有藏氣虛實勝乘之病耳粗工不能精究而臆指  
之曰此為內傷此為外感此為痰此為驚此為熱妄  
投湯丸以去病為功使輕者重重者死亦有不重不  
死幸而得愈者然已傷其真元天其天年矣吾之獨  
分五臟以此也大中丞沈太素公從大梁寄余俸金  
百以助刻費而是書稿適成遂鳩工刻之又踰年始

竣因序而識之使後之人有效焉時

萬曆三十五年歲在丁未夏五十又三自念西居士  
王肯堂宇泰甫書

幼科證治準繩目錄

目錄專備分證檢方之用今止

不互用故不復列覽者詳之

集之一

初生門

證治通論

錢氏論五臟所主

五臟病

五臟相勝

潔古論五臟五邪相乘補瀉大法

五臟補瀉法

察色

聽聲

脉法

死證

襁褓

乳哺

雜將護法

初生

拭口法

浴兒法

斷臍法

灸臍法 裹臍法

服藥下胎毒法 甘草法 朱蜜法 黃連法 牛黃法 韭汁法 禾粉法

豬乳法 臍帶法 藏衣法 剃頭法

百壽散 兒初生日與平和飲子

生下胎疾 月內不測諸病

初生輒死 不能啼 洗眼方 眼不開 生地黃湯 四聖散

朱砂丸 吐不 木瓜丸 聖惠人參丸

不小 葱乳湯 豆豉膏 大便不通 聖惠藿香散

便 一字散 重舌 地黃膏

癰垂 如聖散

金朱飲 重 聖惠牛黃散 口中有蟲

禁 定命散 辰砂全蠍散 張渙立聖散

鷺 張渙保命散 撮 千金龍膽湯 急風散

辰砂僵蠶散 撮風散 辰砂膏

臍 控痰散 益脾散 宣風散

防風散 劫風膏 一字金

黑白飲 張渙封臍散 臍濕 封臍散 三方

錢乙礞黑散 張渙胡粉散 臍瘡 異功散

龍骨散 張渙金黃散 臍突 外消散

一二豆散 驚胎 獨活湯 驅風散

青金丸

太乙散

參蠟散

豬乳膏

朱銀丸

張煥聖星丹

白金散

烏金膏

天南星煎

祛風散

鐵粉散

羌活膏

麝香膏

胎癩 胎風

熱生地黃湯

木通散

釀乳法

甘豆湯

四聖散

地黃膏

胎寒

胎肥 浴體法

大連翹飲

胎黃生地黃湯

地黃湯

地黃飲子

犀角散

赤胎 二金散

真金散

洗心散

集之二

肝臟部

肝

瀉青丸

抑肝散

驚搐

大青膏

黃連安神丸

鎮心丸

急驚 參蘇飲

人參羌活散

惺惺散

獨活湯

木通散

已風丹

加味導赤散

仁齋犀角湯

通關散

嚏驚散

茅先生奪命散

錢氏涼驚丸

局方天麻防風丸

全嬰方睡紅散

定搐散



順搖散

瀉青丸

羅氏鎮肝丸

防風湯

宣風散

定命丹

疎風散

演山截風丹

定搖散

牛黃清心丸

鄭氏比金丸

利驚丸

太白散

防風丸

全蠍散

火府散

湯氏金星丸

茅先生朱砂膏

大黑龍丸

小黑龍丸

謝氏奪命丹

比金丸

利驚丸

演山青金丸

真珠天麻丸

鄭氏驅風膏

睡安散

蛇頭丸

直指天麻丸

直指銀白散

定志丸

溫膽湯

加味地黃丸

五福化毒丹

安神丸

曾氏五苓散

百解散

木通散

三解散

牛蒡湯

防風湯

半夏丸

寬氣飲

五和湯

茯神湯

鎮驚丸

截驚丸

朱砂膏

不驚丹

薛氏參朮柴苓湯

安神鎮驚丸

慢驚瓜蒌湯

青州白丸子

溫白丸

釣藤飲子

羌活膏

海藏返魂丹

湯氏八仙散

醒脾散

釀乳方

擦痰方

陳氏方芩蠟散

油珠膏

補脾益真湯

前朴散

曾氏中和飲

七寶散

六柱散

日生湯

固真湯

醒脾散

沉香飲

天麻飲

薛氏木附湯

太乙保生丹

聚寶丹

金箔鎮心丸

天南星散

烏沉湯

沉香散

蘇青丸

銀白散

釣藤散

黑附子湯

生附四君湯

辰砂膏

七寶辰砂丹

觀音全蠟散

吉州醒脾散

本事醒脾丸

蝎稍丸

錢氏回生散

梓材散

豆卷散

東垣黃芪益黃散

生氣散

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

湯氏醒脾散

演山觀音全蠟散

直指星香全蠟散

烏蠟四君湯

調氣散

慢脾風黑附湯

金液丹

生附四君子湯

異功散

大醒脾散

實脾散

通治急慢驚湯氏奪命散

湯氏奪命散

鎮驚丸

保命丹

溫驚丸

一名粉紅丸抱龍丸

琥珀抱龍丸

初氏奪命散

天麻散

雄黃散

天麻防風丸

七味羌活膏

福銀丸

劫風膏

霹靂散

目睛瞶動  
唇口開動

目直視  
睡中驚動

目動咬牙  
泄瀉

腹蟬蛻釣藤飲

煩渴清心丸

神芩丸

潮熱似瘧

雜證類驚消暑清心飲

驚悸

溫膽湯

寧志丸

扶神散

治要茯苓補心湯

扶神湯

酸棗仁丸

定志丸

治要茯苓散

朱雀丸

世傳蜜陀僧散

丹溪朱砂丸

本事辰砂遠志丸

加味歸脾湯

辰砂膽星膏 木通散

癩

錢氏五色丸

三因六珍丸

風散風丹

保安丸

獨活湯

細辛大黃湯

牛黃丸

化風丹

驚癩比金丹

蛇黃丸

鎮驚丸

虎睛丸

七寶鎮心丸

清神散

食癩妙聖丹

天麻丸

蛇黃丸

地龍散

龍腦安神丸

奪魂散

雌黃丸

拔萃妙香丸 鎮心丸 蜜陀僧散

代赭石散 神應丹 牛黃清心丸

清神湯 養心湯 妙香散

星蘇散 礬丹 元戎二白丸

朱砂滾涎散 琥珀壽星丸 南星五生丸

斷癩丸 定癩丸 碧穹丹

控涎丸 當歸人黃湯 元戎小靈寶丹

沉香天麻湯 牛黃丸 斷癩丹

紫河車丸

中風

角弓反張

搖頭

清肝益胃丸

偏風口噤

錢氏全蝎散 胃風湯

口喎失音

朱砂丸 全蠍散 寬氣飲

木通湯

天釣

九龍控涎散 釣藤飲 一字散

雙金散

牛黃散

白銀丹

抵聖丹

釣藤飲

四方

乳香丸

木香丸

牛黃丸

塗頂膏

天漿子散

青黛丸

再生散

三白散

拘攣

續命湯

追風散

手拳不展 薏苡丹

薏苡仁散

羚羊角散

脚拳不展 海桐皮散

當歸散

乾地黄丸

驚癱鶴膝

大防風湯

獨活寄生湯

防已湯

祛風散

獨活湯

黑虎丹

排風湯

眼目

目赤腫痛 導赤散

小防風湯

小流氣飲

小菊花膏

通頂散

九仙散

三解散

草龍膽散

明目飲

金波散

黃連膏

清涼膏

辟塵膏

速効飲

生熟地黄散

犀角飲

廣大重明湯

助陽和血補氣湯

柴胡復生湯 黃連羊肝丸 障外保命羚羊角散

東垣補陽湯 羌活退翳湯 五秀重明丸

鎮肝散 井泉石散 羅氏煮肝散

龍膽飲子 內人參補胃湯 冲和養胃湯

滋陰腎氣丸 瀉熱黃連湯 千金補肝散

局方菊睛丸 眞珠膏 雀復明散

眼白 山茱萸丸 通睛湯氏牛黃丸 眼劄

小便不通

錢氏捻頭散 湯氏木通散 冬葵子散

張氏葵石散 車前散 芫黃散

朱砂丹 朱砂散 清肺散

八正散 梔子仁散

淋

五淋散 局方五淋散 導赤散

葵子散 香芩丸 清心蓮子飲

金沙散 立効散 張渙石燕丹

石韋散 葵子散 滑石散

蒲黃散

遺尿

鷄腸散 二方 益智丸 破故紙散

尿白便濁

君朴丸

茯苓散

三稜散

香砂丸

疝

茱萸內消丸

當歸散

川棟丸

曾氏白芍湯

烏梅散

金鈴散

金菜丸

散氣丸

勻氣散

木香飲

龍膽瀉肝湯

陰腫

桃仁丹

胡連散

海蛤散

桃仁丸

三白散

蚯蚓散

牡蠣散

牡蠣大黃湯

青木香湯

立消散

天花散

偏墜

黑散

陰瘡

臘茶散

不寐

仲景酸棗湯

本事鼈甲丸

真珠母丸

人參竹葉湯

咽喉

甘桔湯

立効散

吹喉散

牛蒡湯

化毒湯

備急散

牛蒡子湯

拔萃桔梗湯

消毒飲

集之三

心臟部一

心

安神丸

八物定志丸

瀉心湯

導赤散

生犀散

秘旨安神丸

發熱

五臟 梔子清肝散

柴胡清肝散

柴胡飲子

龍腦飲子

滋腎丸

實熱 茅先生三解牛黃散

牛黃涼膈丸

虛熱 當歸補血湯

補中益氣湯

加味逍遙散

表熱 敗毒散

清解散

集驗荆朮散

人參羌活散

羌活散

人參辛梗湯

紅懸散

裏熱 四順清涼飲

大黃朴硝湯

柴胡飲子

五和湯

寬熱飲

三黃丸

表裏俱熱 七寶散

白虎湯

半表半裏熱

餘熱 實脾散

參苓白朮散

安神散

簡易凝神散



目錄  
卷之十一

壯熱地黃煎  
火府丹  
金蓮飲子

黃龍湯  
牛黃膏  
梔子仁湯

六物黃芩湯  
五物人參散  
温壯柴苓湯

二黃犀角散  
牛黃散  
驚熱天竺黃散

甘露散  
辰砂金箔散  
骨蒸熱人參生犀散

地骨皮散  
柴胡飲  
鄭氏犀角飲

靈犀飲  
煩熱一粒金丹  
絳雪丹

地黃煎丸  
竹葉石膏湯  
潮熱地骨皮散

田氏犀角散  
秦艽散  
人參尋歸散

十味人參散  
曾氏百解散  
當歸散

三解散  
大柴胡湯  
晝熱龍膽丸

六合湯  
豬膽丸  
夜熱金星丸

四物二連湯  
積熱紅絲散  
六神散

銀白散  
桃枝丸  
梔豉飲子

梔子湯  
玉露飲  
益元散

萬安飲  
調胃散  
寒熱

變蒸熱紫陽黑散  
柴胡湯  
調氣散

當歸散  
平和飲子  
參杏膏

心痛  
錢氏靈礬散  
聖惠芍藥散  
茅先生金鈴散

煩躁

清熱解毒丸

橘皮湯

黃連解毒湯

至寶丹

神芎丸

酸棗仁湯

注夏

清暑益氣湯

清燥湯

舌

重舌烏魚散

青液散

當歸連翹湯

一捻金散

綠袍散

木舌消黃散

川硝散

舌白胎  
舌上瘡

舌上血出

諸失血證

人參芩歸湯

黃芩丸

茅花湯

吐血四物湯

犀角地黄湯

黃芪芍藥湯

人參黃芪散

栝枝飲

辰膠散

紫參散

衄血湯氏地黄湯

麥門冬飲子

龍膽丸

槩皮湯

槐花散

膠黃散

大小便血五倍丸

訶灰散

桃膠丸

火府散

車前散

語遲

錢氏菖蒲丸

張氏菖蒲丹

聖惠芍藥散

雞頭丸

汗

白香瓜丸

止汗散

薛氏十全大補湯

團參湯

牡蠣散

撲汗方

血餘散

盜汗錢氏黃芪散

白朮散

當歸六黃湯

沉香鼈甲丹

菴蓉丹

升麻湯

牡蠣散

虎杖散

噫氣

本事枳殼散

四味黃連丸

下氣

尋衣撮空

生地黄連湯

喜笑不休

瘡瘍

四黃散

一抹金

解表消毒飲

攻裏消毒飲

連翹散

寄生散

玄參劑

涼膈散

托裏榮衛湯

秘方托裏散

仙方活命飲

神效解毒散

玄參丸

犀角消毒丸

托裏消毒散

托裏散

八味茯苓補心湯

天烏散貼方

青露散

驚毒掩

驚毒腫痛掩子

鐵箍散

神功散

丹葛根白朮散

犀角解毒散

防風升麻湯

荆芥散

防已散

化丹湯

漏蘆湯一名蘆散

藍葉散

升麻散

大黃散二方

升麻膏

生料四物湯

藍青散

解毒散

赤葛散

紅散子

硝石散

綠袍散

白玉散

碧雪

冰黃散

丹驚黃芩四物湯

五色丹

丹白張煥香豉散

五香連翹湯

丹赤升麻膏

張煥升麻膏

丹黑張煥祛毒丹

大火丹

丹鬼火張煥戎鹽散

家火丹

丹張煥拔毒散

神火丹

朱田火丹

尿竈火丹

流升麻湯

乳香散

晏元獻牛黃散

張煥大黃散

玄胡散

消腫散

身有赤處丹參散

麥門冬散

鉛霜散

二十種丹所起形候并治法

游腫犀角散

升麻膏

鬱金散

丹入腹

丹辨小兒欲發丹毒候

禁忌法

丹飛龍奪命丹

毒時通氣散

犀角升麻湯

施子仁湯

葛根牛蒡子湯

流注健脾滲濕飲

和血定痛丸

蔥熨法

隔蒜灸法

如聖餅

天蛇毒

天柴芍參苓散

加味解毒散

金黃散

楊梅瘡換肌消毒飲

王爛瘡  
沒淫瘡

紅絲瘡

惡核瘡大聖散

玄參飲

升麻湯

柴芍參苓飲

清肝益榮湯

加味小柴胡湯

益氣養榮湯

必効散

驚風  
結核皂角子丸

九味柴胡湯

琥珀膏

瘡加味羌活散

當歸飲子

牛黃解毒丸

立効散

敷藥解毒散

苦瓠散

青金散

癰葛根橘皮湯

玄參升麻湯

化癰湯

荆防敗毒散

人參敗毒散

人參安胃散

犀角消毒飲

地龍散

黃水  
粘瘡九味解毒散

加味清涼飲

人參消風散

連翹防風湯

和肝補脾湯

益脾清肝湯

三黃散

立効散

頭面  
瘡養心湯

牛黃解毒散

拔毒散

眉煉  
瘡青金散

耳水銀膏

胡粉散

蔓荊子湯

清上散

當歸龍薈丸

清黃散

清心丹 清白散

交感丹

禹餘糧丸

龍骨散

羊角散

滋陰地黃丸

白欬散

口瘡板毒散

立効飲

黃金散

天竺黃散

地黃膏

清胃散

清熱消毒散

柳葉散

如聖散

牡蠣散

照升麻防風湯

清咽利膈湯

臂白芷升麻湯

大連翹飲

腋癰

脇加味歸脾湯

腹癰

臀內托羌活湯

腿癰

肺小青龍湯

桔梗湯

升麻湯

排膿散

射干湯

人參平肺散

參芪補肺湯

人參補肺湯

腸大黃湯

薏苡仁湯

桃仁湯

牡丹皮散

使內補黃芪湯

囊托裏清肝散

山藥膏

脚凍瘡白欬散

湯神効當歸膏

乳香定痛散

豬蹄湯

翻花藜蘆膏

多骨疽痛瘡

痘疹上

集之四 心臟部二

滌源

預防

運氣

疫癘

辨疑似

五臟見證

部位

脉候

氣血

虛實

陰陽

形氣

輕重

順逆

動靜

形色

目錄

力斗

上

疎密

老嫩

乾溼

榮枯

標本

始終

日數

禁忌

汗下

證治大法

初熱證治

見形證治

預防

三豆湯

代天宣化丸

溯源解毒湯

養脾丸

消瘟丹

秘傳保嬰丹

滋陰三寶散

四製白朮散

八珍膏

衛元湯

內托至奇湯

滴滴金

犀角地黃湯

茯神湯

野仙獨聖散

參苓白朮散

固真湯

龍金湯

紫霞黃露飲

龍旋散

貞元散

龍蟠散

穀精龍膽散

消導飲

磨積散

浚牛膏

大法

解毒防風湯

消毒救苦湯

又名東垣消毒散

參芪飲

即保元湯萬氏各調元湯

十神解毒湯

羌活散鬱湯

太乙保和湯

益元透肌散

保嬰百補湯

八味二花散

保生散

初熱

升麻葛根湯

惺惺散

荆芥散

羌活散

薄荷散

羌活散

人參敗毒散

李氏敗毒散

正氣散

調解散

蘇解散

和解湯

王朝奉四物解肌湯

防風蒼朮湯

雙解散

葛根橘皮湯

五積散

桂枝葛根湯

柴葛桂枝湯

七物升麻丸

備急丸

加味四君子湯

和中散

六一散

大靈丹

無比散

小無比散

大無比散

玳瑁湯

犀角飲子

犀角湯

奪命散

牛蒡散

獨勝散

解毒踈痘湯

安癩散

西來甘露飲

渾元汁

蟬蛻膏

辰砂散

見形

快癩湯

消毒飲

奪命丹

發熱一二口便出實表解毒湯

消毒快癩湯

清地退火湯

熱五六日始出托裏快癩湯

十宣散

增損八物湯

勻氣散

應出加減參蘇飲不出

加減調中湯

山太密連翹升麻湯

東垣鼠黏子湯

犀角消毒飲

麻黃甘草湯

田氏調肝散

目錄

力斗



麗氏地黃膏

快 出 消毒散

鼠黏子湯

化毒湯

透肌湯

九味羌活湯

辰砂五苓散

人參竹葉湯

白虎湯

紫草散

四聖散

紫草迴瘰散

紫草木通散

人參蟬蛻散

透肌散

紫草透肌湯

紫草快癩湯

烏金膏

紫金散

蘿蔔湯

野通散

祕傳大透肌散

活血散

通天散

人參透肌散

升均湯

二花散

異功散

十補散

藍根散

絲瓜散

甘桔加梔子湯

水解散

胡荽酒

紫草飲

加味四聖湯

臘脂塗法

阮氏萬全散

化毒湯

解毒散

露桃花散

黃連解毒湯

加減犀角地黃湯

五龍湯

化癩湯

四仙散

大玉泉散

出多熱不退 涼血解毒湯

加味犀角飲

謹目 神應膏

黃檗膏

集之五

心臟部三

痘疹中

起發證治

灌漿證治

收靨證治

落痂證治

發熱

渴

煩躁

譫妄

驚搐

中風

自汗

失血

不能食

咳嗽

喘

涕唾稠粘

失音

噎水

吐利

吐逆

瀉利

大小便閉

起發

活血散

歸芎湯

參耆四聖散

胎元散

獨參湯

水楊湯

祛邪湯

玉樞正氣丹

九味順氣散

紫草飲子

內托散

迴陽丹

茵陳薰法

不二散

快癍越婢湯

消毒化癍湯

羌活救苦湯

起發不透雞鳴散

震蟄丹

天元接髓丹

內托散

灌漿

辟穢香

六一湯

助漿丸

升天散

補漿湯

澄泉散

轉環丹

收靨

回漿散

象牙散

敗草散

蕎麥散

滅癍救苦散

百花膏

排毒散

升陽解毒湯

雄黃散

綿爾散

落茄

四白滅癩散

韶粉散

調元固表湯

人參固肌湯

人參清神湯

馬齒莧散

羊髓骨髓

發熱

羌活湯

加味葛根湯

如聖湯

柴胡麥門湯

連翹散

梔子金花丸

三黃丸

宣風散

通膈丸

渴

葛根解毒湯

人參麥門冬散

六味人參麥門冬散

退火回生散

人參白虎湯

竹葉石膏湯

麥門冬湯

人參白朮散

生脈散

神功散

紅花湯

煩躁

活人酸棗仁湯

梔子豆豉湯

黃連解毒湯

牛黃清心丸

人參蟬蛻散

人參竹葉湯

譫妄

安神丸

梔子仁湯

驚搐

紅綿散

麻痘風搐方

解毒丸

柴胡二連丸

括萋散

保命丹

中風

消風散

白汗

浮麥散

敗蒲散

溫粉撲法

失血

犀角地黃湯

二寶散

犀角地黃湯

斬關散

不能食

四君子湯

六脾散

七珠散

人參養胃湯

麥冬參朮散

二和湯

白朮苦參湯

陳皮枳實湯

咳嗽

白朮湯

五味子湯

人參清膈散

生地黃散

赤茯苓湯

桔梗湯

喘

杏甘湯

麻黃湯

前胡枳殼湯

葶蘆丸

葶蘆木香散

紫草甘草枳殼湯

目錄

力手

三

葛根黃芩湯

五味子湯

六味涼血消毒散

涕唾稠粘

失音

補肺散

八風散

天花散

清肺散

梔子萹蒲湯

紫河車散

噙化丸

澹水

吐利

理中湯

香蘇飲

紫草木香湯

人參胃愛散

黃芩加半夏湯

中和散

竹茹湯

和中湯

藿香止氣散

吐逆

茱萸散

橘皮湯 一方

橘皮半夏湯

丁香煮散

加味鼠粘子散

燈心竹葉湯

瀉利

黃芩湯

九味理中湯

陳氏豆蔻丸

理中湯丸

參朮丸

香連丸

十味木香散

治中散

大小便閉

八正散

滋腎丸

黃芩清肺飲

紫草木通湯 通關散 連翹湯

紫草冬葵湯 當歸丸 棗變百祥丸

洗心散 三乙承氣湯 膽導法

加味四君子湯 潤腸湯 紫苴麻仁湯

集之六 心臟部四

痘疹下

寒戰咬牙 厥逆 眼目 咽喉

腰痛 腹痛 腹脹 痛癢

身痛 瘡塌 陷伏倒靨

黑陷 灰白 夾疹 夾癍

痘疔 痘癩 瘰癧 潰爛

臭痘 蛆痘 驗頭面 驗耳目鼻

驗唇口齒 驗喉舌 驗頸項 驗胸腹

驗手足 驗寢卧 驗飲食 痘後餘毒

水痘 麻疹

寒戰咬牙

柴葛桂枝湯 養衛化毒湯 袁氏獨附湯

清神化毒湯 無憂散 透骨解毒湯

催蠶丹 滴滴金

厥逆

目錄

方詳

三五

參附散

二神散

眼目

蟬蛻膏

治瘡疹入眼方二

海藏地黃散

决明散

撥雲散

蜜蒙花散

通聖散

蛤粉散

洗肝明目散

蟬蛻明目散

蟬蛻散

蜜蒙花散

兔糞散

兔糞丸

吹耳丹 二方

洗肝散

防風散

加味四物湯

羌活防風散

秦皮散

仙靈脾散

蒺藜散

蟬菊散

菊花散

浮萍散

羚羊角丸

羚羊角散

羚羊角飲子

撥雲散

兔糞積榔方

咽喉

活人如聖餅子

甘草桔梗升麻湯

甘露飲子

地黃丸

甘桔防風湯

玄參升麻湯

射干鼠粘子湯

玉鎖匙

加減射干鼠粘子湯

利咽解毒湯

三黃熟艾湯

腰痛

加味地黃丸

羌活當歸湯

如神湯

腹痛

定痛散

桂枝芍藥湯

黃連湯

一味異功散

蟬蛻一物湯

桂枝大黃湯

桂枝芍藥湯

黃芪建中湯

化毒湯

牛黃散

和解湯

腹脹

紫草承氣湯

桔梗枳殼湯

二陳加枳殼湯

加味透肌散

紫草厚朴湯

紫草枳實湯

木通芍藥湯

痛癢

痛

五物木香散

青黛散

身痛

消毒飲

勻氣散

癢塌

參芪內托散

紫草木香散

消風化毒湯

蠅花散

二物湯

盒脾散

震澤湯

天元二仙丹

七星散

白龍散

浴法

陷伏倒靨

龐氏鬱金散

四聖散

無價散



南金散

橄欖飲

白花蛇散

黑陷

寇氏麻黃湯

豬尾膏

龍腦膏子

四糞散

百祥丸

牛李膏

活人無比散

癩疹黑陷方

紫草散

奪命五毒丹

談笑博金丹

大造保童丸

一字金丹

至寶丹

一粒金丹

天真膏

大成散

無價散

灰白

加減大紫草散

補元湯

活血散

保生散

混元散

內助丹

助陽丹

回生起死丹

夾疹

荆防敗毒散

人參羌活散

清和散

夾癩

山梔子湯

陽毒升麻湯

陰毒升麻湯

痘疔

四聖散

二聖散

拔毒膏

飛龍奪命丹

痘癩

苦參丸

瘰癧

潰爛

牛黃丹

生肌散

金華散

白螺散

乳香韶粉散

祕傳茶葉方

蟬花散

臭痘

定金湯

寒水丹

蛆痘

痘後餘毒

活血解毒湯

龍仙方活命飲

人參敗毒散

樺皮散

十三味敗毒散

保命集木香散

流氣飲

小柴胡加生地湯

六味活血散

五福化毒丹

犀角消毒丸

托裏散

托裏消毒散

東垣聖愈湯

濟生歸脾湯

拔毒膏

隔蒜灸法

替鍼丸

神効太乙膏

神効當歸膏

豆豉餅

如聖餅

神功散 三豆散

鐵箍散

瘡連翹散

瘡三黃散

癩篋衣湯

蜆子水

丹玄參化毒湯

犀角消毒散

加味解毒散

螞蟻法

眼凉肝明目散

望月沙散

羌菊散

嘔吐木香太女丸

養脾丸

熟柴胡梔子散

小柴胡湯

槐花散

黃芪散

中風釣藤湯

拘攣當歸桂枝湯

嗽燈心湯

赤茯苓湯

寒熱太和散

腫脹五皮湯

塌氣丸

胃苓湯

失血桃仁承氣湯

吐瀉蓮肉湯

狐惑化蠶丸

黃連陰蠶丸

疝洗心散

甘露飲

雄黃散

馬鳴退散

人中白散

吹口散

赴筵散

水痘

麥湯散

麥煎散

麻疹

瀉白消毒散

加味金沸草散

防風解毒湯

黃連解毒湯

桂枝解毒湯

升麻解毒湯

麻黃湯

檉葉散

黃連湯

茅花湯

加味黃芩湯

銅壁山黃芩湯

十全散

葛根麥門冬散

白虎合解毒湯

養血化癍湯

大青湯

加味地骨皮散

柴胡橘皮湯

柴胡麥門冬散

柴胡四物湯

文蛤散

雄黃散

門冬清肺湯

清熱除疳丸

當歸養血湯

黃連安神丸

集之七

脾臟部上

脾

益黃散

人參安胃散

瀉黃散

不乳食

平胃散

調中丸

八味地黄丸

參苓白朮散

健脾飲

藿香飲

茅先生勻氣散

調理衆病醒脾散

健脾散

調中飲子

神木散

前胡散

張渙集香煎

調中散

益胃丹

丁香黃芪散

千金地黄丸

脾弱多困

人參散

痰涎

半夏丸

白附丸

膽星天竺丸

牛蒡子散

萬全鬱金散

小朱砂丸

金朱丹

譚氏金珠丸

半夏丸

劉氏消乳痰丸

吐瀉

夏秋 治裏 玉露散 香薷飲 車前子散

不換金正氣散 二順散 六和湯

冬春 治表 大青膏 守胃散 釣藤飲

瀉黃多渴 為熱宜涼 瀉青不和 渴為寒 和胃丸 理中湯

理中丸 金液丹 豆蔻散

張渙勻胃散 助胃膏 瀉黃白似渴為 寒熱雜合病

補四君子湯 六君子湯 錢氏異功散

和劑觀音散 溫中丸 和中散 曾氏和中散

銀白散 除濕胃苓湯 治痰 半粟散

宿食 消積丸 津液 張渙三和散 香豆散

吐 丁時發人參散 心腹 人參散 肉豆蔻散

吐 寒 萬安膏 朱沉丹 定吐紫金核

香銀丸 本事白朮散 薑橘湯

定吐飲 參香飲 吐 熱 香薷飲

竹茹湯 錢氏藿香散 本事麥門冬散

湯氏清膈飲子 聖惠麥門冬散 蘆根粥

大順飲 綠豆飲 益元散

濟生竹茹湯 積 烏犀丸 傷風 痰 茯苓厚朴湯

吐 傷乳 消乳丸 消食丸 吐 風 痰 青州白丸子

半夏散

錢氏鐵粉丸

茯苓半夏湯

二陳湯

白附飲

毒氣千金藿香湯

挾驚張澹三香丹

殊聖歸命丹

定吐丸

田季散

王氏睡驚丸

萬安膏

全蠍觀音散

安胃六神湯

人參散

掌中金

釀乳法

瀉

茅先生香連丸

乳香散

守中湯

沒石子丸

張渙川椒丸

栗煎湯

熟瀉黃芩湯

張渙清胃散

香連丸

傷食瀉香橘餅

加減觀音散

調中散

生薑瀉心湯

保安丸

杏霜丸

醫局開胃丸

水瀉聖惠厚朴散

張渙厚朴散

萬全龍骨丸

瀉積香橘餅

驚瀉至聖保命丹

定命飲子

朱君散

睡驚太乙丹

四神丸

二神丸

疳積瀉沒石子丸

暴瀉聖惠胡連散

龍骨散

張渙阿膠丹

玉粉丹

瀉千金七味散

聖惠丁香散

黃連丸

譚氏斗門散

嬰孺龍骨湯

龍骨湯

黃連煎

雞骨丸

温白丸

惺惺散

香礬丹

瀉瀉聖惠厚朴散

地榆散

醫局胃風湯

赤白痢

羌活散

水浸丹 寬腸丸

熱痢黃連解毒湯

潑火散

芍藥礬皮丸

寬腸枳殼散

三黃熟艾湯

地榆散

地榆飲

川草散

錢氏黃礬丸

梔子丸

外臺子芩湯

聖惠梔子仁散

烏梅散

形謔治開胃散

冷痢大順飲

養臟湯

雄朱散

玉脂散

治白痢艾湯

曾氏養臟湯

寒熱雜合香連丸

金粟丸

白附香連丸

荳蔻香連丸

木香丸

小香連丸

吉氏香連丸

白葛氏雞子餅

王氏脂附丸

丁時發附子散

純血聖惠黃連散

馬齒菜汁粥

張渙水蓼丹

張渙黃連丹

齒根湯

厚腸丹

聖効散

必效丹

吉氏地榆散

膿血相雜白頭翁丸

肘後乳母方

肘後近効方

千金黃礬湯

聖惠吳藍散

樗根皮散

人參散

雞屎礬丸

養生黃連阿膠丸

燔髮散

張煥建胃丹

青橘丹

王允通神丸

五色痢

漢東王先生鮮湯丸

三霜丸

至聖丸

定粉散

禁口痢石蓮散

香脯散

休息痢松焙餅子

玉命丹

蠱痢聖惠蕤荷散

聖惠黃連散

聖惠犀角散

嬰孺蕤荷根湯

嬰孺犀角煎

張煥白頭翁散

地榆丹

宣連丸

收澀雙金散

萬金散

神效散

補養升陽益胃湯

瀉痢兼證

渴龍骨湯

麥門冬湯

外臺檉皮飲子

聖惠黃芪散

黃芩散

當歸散

龍骨散

藍葉散

地榆散

黃連散

檉皮散

甘草散

黃芩丸

太醫局人參散

嬰孺子芩湯

菰蘆湯

冬瓜湯

張煥建胃散

碧香丹

寶鑑竹茹丸

人參白扁豆散

吉氏六神丸

腸痛聖惠黃連散

黃檗丸

木香散

肉豆蔻散

龍骨丸

張煥順胃丹

建中丹

九笱衛生固氣丸

張氏聖餅子

吉氏紫霜丸

羸瘦聖惠桔梗丸



目錄  
外科  
三五

雄黃散  
雞子粥  
張渙龍骨湯

腫浮惠濟論塌氣散  
止渴聖効散

腹痛  
寒調中丸  
當歸散  
七氣湯

指迷七氣湯  
張洩實中湯  
蓬莪朮丹

溫胃丹  
橘香散  
胃氏懷香湯

熱積茯苓丸  
痛積湯氏三稜散  
痛蟲錢氏安蟲散

安蟲丸  
蕪荂散  
使君子丸

化蟲飲  
二聖丸  
鎖肚烏梅散

盤腸內釣痛  
錢氏釣藤膏  
魏香散

蒜乳丸  
異香散  
補虛芍藥甘草湯

聖惠人參散  
錢乙和中散

腹脹

塌氣丸  
本事調中丸  
訶梨勒丸

張氏溫脾散  
沉香煎  
三因肥兒丸

六神丸  
褐丸子  
五疳保童丸

楊氏塌氣散  
塌氣丸  
塌氣散

分氣飲  
三稜煎丸  
三稜丸

阿魏丸二方  
小阿魏丸  
真珠天麻丸

大棗連丸  
下蟲丸  
遇仙丹

目錄  
力手  
三五

中滿分消丸 消痞丸 升陽滋血湯  
麻黃升麻湯

水腫

南星腹皮散 香陸胃苓丸 赤蒼飲

三白散 商陸丸 溲川丸

榮衛飲子 分氣飲子 大効神功救生丹

金匱加減腎氣丸

集之八 脾臟部下

疝

肝天麻丸 生熟地黃湯 耆歸湯

張漢熊膽天麻丹 烏蟾丹

蘆薈丸 皂角膏 神妙觀音散

人參散 通神丸 金箔茯苓散

朱砂安神丸 茯苓丸 茯神湯

張漢參黃丹 天竺黃丹 朱砂丸

萬全真珠散 麝香丸 睡驚丸

桃花丸 脾四味肥兒丸 靈脂丸

神効換肌丸 張漢木香煎 檳榔丹

肉豆蔻丹 聖惠木香丸 訶梨勒丸

桃花散 大胡黃連丸 大蕪荑湯

黃耆散

蘆薈丸

虎睛丸

肺地黃清肺飲

化蠱丸

補肺散

張漢麝香丹

靈砂丹

五靈脂丹

胡黃連丸

張國林肺疳散

腎疳調元散

九味地黃丸

張漢熊膽散

熊膽膏

立聖膏

三金散

通治五疳保童丸

大蘆薈丸

蘆薈丸

萬應丸

博濟青金丹

靈苑紅丸子

譚氏蝦蟆丸

張漢夜明丹

劉氏金蟾丸

張氏香蟾丸

莊氏五疳丸

王氏保童丸

吳氏黃芪飲子

脂連丸

冷熱木香丸

熱疳胡黃連丸

無辜疳肥兒丸

聖惠鼈甲散

張漢蠍虎丹

香甲湯

張漢玉粉散

二肝丹

梅肉散

藍葉湯

天靈丹

溫臍湯

枌附丹

人中白散

朱砂丸

決明子丸

漏蘆散

漏蘆丸

五疳出蟲朱砂丸

聖惠乾蟾丸

麝香丸 蘆薈丸

出蟲丸

乾蟾丸

熊膽丸

定命散

青黛丸

錢乙胡連麝香丸

錢乙榆仁丸

史君子散

蘆薈丸

張煥三根散

除毒丹

豬肚丹

穀精丹

桃柳湯

苦楝丸

下蟲丸

聖惠金蟾散

地骨皮丸

殺疳丸

蘆薈丸

青黛丸

朱砂丸

聖惠生黃丸

龍腦丸

吹鼻龍腦散

安息丸

龍膽丸

聖惠天竺黃散

青黛丸

牛黃丸

胡黃連丸

青黛散

牛黃丸

史君子丸

東垣厚腸丸

張煥金粟丹

本事芍朮丸

聖惠木香丸

蘆薈丸

麝香散

胡粉丸

譚氏寶命丹

外紫金散

秋霜散

惠眼秋霜散

乳香丸

錢乙龍骨散

茅先生崩砂方

定命散

蟾灰散

聖散子

生金散

李璇麝香散

黑神散

孔氏無比散

曾氏燒鹽散

內金散

蜜陀僧散

紅鉛散

演山蘭香散

傳齒立効散

獨活飲子

三黃散

人參散

檳榔散

黃耆散

地骨皮散

茅先生朱砂膏

牛黃膏

天竺黃散

三解牛黃散

檳榔散

黃礬散

吳氏青霞散

鼻痔湯氏五福化毒丹

澤瀉散

枇杷葉散

青金散

錢乙蘭香散

張渙石膽散

吹鼻蟬殼散

錢氏白粉散

眼疳龍木殺疳散

退翳丸

玉訣瀉肝散

蕤仁膏

靈苑羚羊角丸

譚氏退雲散

張渙井泉石散

豬膽黃連丸

濕疳千金除熱結腸丸

薑蜜湯

杏仁湯

張渙桃白散

如聖丹

錢乙金華散

化蠱丸

疳積散

熊膽膏

通治集聖丸

集驗神効丹

元和麝香丸

靈苑千金丸

太醫局蘆薈丸

錢氏膽礬丸

丁氏蝦蟇丸

張氏神麩散

張道人定命丹

演山史君檳榔丸

胡黃連丸

肥肌丸

熱疳湯氏鼈甲散

化蟲丸

豬肚丸

龍膽丸

烏犀丸二丁丸

譚氏金瓜丸

蘆薈丸

茅先生柴胡散

六物黃芩湯

莊氏青黛丸

王氏史君子散

地骨皮散

豬肚黃連丸

柴胡飲

勞疝乾地黃煎

雞肉煎丸

張氏三和飲子

犀角散

鼈血煎

黃連丸

渴疝聖惠天竺黃散

五膽丸

胡黃連散

黃連丸

錢乙龍粉丸

張煥青香丸

嗽疝防已丸

溫肺散

杏仁散

積疝錢乙牛黃丸

張煥褐丸子

換骨丹

莊氏參苓散

香甲丸

趙氏青蒿丸

青金膏

豆蔻散

知母飲

經驗檳榔丸

瀉疝仙人水鑑粉霜丸

錢乙二聖丸

胡黃連飲子

莊氏黃連丸

錢乙如聖丸

博濟胡連丸

香蔻丸

錢氏木香丸

沒石子丸

聚寶方黃龍丸

吉氏蘆薈丸

良方吳婆散

痢疝聖惠青黛散

殺疝丸

白龍骨丸

肉豆蔻丸

聖惠黃連散

蕪荑丸

八香丸

張道人沉香丸

木香丸

白朮散

胡黃連丸

疝腫勻氣散

疝氣入陰烏金膏

虛羸

補中益氣湯

聖惠黃芪丸

秦芫丸

麥門冬丸

燒黃瓜丸

大黃丸

豬肚丸

香甲丸

聖惠訶梨勒散

溫脾散

五香煎

蘆薈丸

露星膏

錢氏橘連丸

二聖丸

香蟾丹

萬全雷丸丹

孔氏神聖丸

豬肚丸

趙氏斧槌丸

玉挂杖散

蘆薈丸

吉氏益兒丸

朱氏肥兒丸

六味肥兒丸

秘方肥兒丸

鶴節

地黃丸

丁癸

十全丹

醍醐散

快活丸

聖惠赤芍藥丸

嬰孺芍藥丸

張渙大麝香丹

哺露

聖惠人參丸

宿食

保和丸

木香大安丸

消食丸

七聖丸

三稜散

莪朮丸

丁香脾積丸

三黃枳朮丸

聖惠訶梨勒散

朱氏木香丸

朱氏洗心散

養脾丸

痞結

聖惠前胡散

聖惠甘遂破結散

進食丸

枳木丸

枳實理中丸

快膈湯

參朮陷胸湯

積

千金紫雙丸

茅先生青金丹

萬靈丸

錢乙消積丸

紫霜丸

真珠丸

消堅丸

白餅子

張渙萬靈丹

剪紅丸

真方五色丸子

下積丸

五珍丸

局方進食丸

六聖丸

烏犀丸

水晶丹

聚寶聖餅子

吉氏追魂散

沉香檳榔丸

集驗蓬朮丸

聖惠三稜散

張渙三稜散

聖惠化癖丸

丁香化癖散

青礞石丸

玉訣銀白散

快膈消食丸

莊氏紫金丸

莊氏軟金丸

劉氏桃紅散

王先生靈砂丹

小沉香丸

良方妙香丸

瘵茅先生蓬朮散

聖惠鼈甲散

化癖丸

木香丸

取癖丸

挨癖丸

聖惠前胡丸

朱氏知母丸

渴

目錄

力斗

聖



三黃湯

聖惠黃連飲 麥門冬散

聖惠銀飲子

蘇蘆根散 茅先生胡黃連散

聖惠蘆根散

嬰孺麥門冬湯 蘆根飲子

蘇蘆湯

錢氏白朮散

黃疸

茵陳湯

梔子檉皮湯

犀角散

連翹赤小豆湯

加減瀉黃散

張渙蘆根湯

子芩散

茵陳湯

三黃散

雙連丹

當歸丸

小半夏湯

茯苓滲濕湯

消食丸

瓜蒂散

秦王九疔散

滯頤

張渙溫脾丹

溫胃散

金朱丹

牛蒡丹

大小便不通

神芩丸

錢氏郁李仁丸

犀角丸

惠眼芍藥散

握官丸

大便不通

聖惠芩黃散

集之九

肺臟部

腎臟部

目錄

力斗

聖

肺

阿膠散

瀉白散

咳嗽

麻黃湯

三拗湯

加減三拗湯

五拗湯

百部丸

九寶飲

華蓋散

金沸草散

麥煎散

小青龍湯

清肺飲

解表散

和解湯

錢氏葶藶丸

人參荊芥散

扁銀丸

瀉肺湯

聖惠天門冬散

百部散

黃芩散

柴胡石膏湯

張煥養肺湯

菖蒲煎

木香半夏丹

順肺湯

聖惠陳橘皮散

麥門冬煎

茅先生妳豆膏

注脣膏

蜜瓜膏

生犀散

保肺湯

大麻防風丸

紫蘇子散

馬兜鈴丹

人參半夏丹

貝母湯

潔古黃芪湯

加味四君子湯

張煥蟬殼湯

白朮五味湯

人參平肺散

細辛五味子湯

黃芩半夏生薑湯

甘桔湯

芍藥甘草湯

烏梅丸

赤石脂禹餘糧湯

麻黃附子細辛湯

茯苓甘草湯

天麻散

天麻圓

琥珀散

貝母湯

惺惺散

外臺四物湯

張渙雄黃膏

甘桔散

王氏解肌丸

團參丸

雞清散

聖惠射于散

陳橘皮散

蘿蔔子散

蟬蛻散

張渙桔梗湯

知母湯

雄黃散

如意膏

雄黃丹

玉訣貝母丸

油衮丸

惠眼內金丸

腦子散

聖惠杏仁煎

金杏丸

勻氣散

聖惠蘇煎

不灰木散

桑白皮煎

知母散

貝母散

喘

碧玉丸

補肺散

坎離湯

聖惠杏仁煎

八味理中丸

張渙蟬殼湯

聚寶平氣飲

生白丸

枳實湯

半夏丸

大効雄朱化痰定喘丸

天麻定喘飲

紫蘇飲子

麻黃杏仁甘草湯

青龍加石膏湯

真珠散

千金射干湯

梅花飲子

二聖散

定喘飲

馬脾風 牛黃奪命散

無價散

悲哭

錢氏蟬花散

本事龍齒散

乳香丸

木香丸

牛黃膏

青雲散

聖惠犀角散

羚羊角散

龍齒散

柏子仁散

軀養臟湯

嬰孺黃芪散

魏香散

開胃丸

白水當歸煎丸

六神散

夜啼花火膏

錢氏當歸丸

張渙萬金散

田氏五味子散

釣藤膏

釣藤飲

聖惠乳頭散

吉氏朱砂膏

安神散

三因燈花散

茅先生抹唇膏

三因蒲黃散

黃土散

瘡

王先生通關散

千金大補心湯

張渙竹瀝膏

救生菖陽湯

醒脾散

鼻

消風散

薄荷湯

張渙辛夷膏

吉氏葱涎膏

聖惠龍腦散

張渙清肺膏

張渙菊花散

聖惠菊花散

萬全芎藭散

聖惠木通散

張渙犀角升麻散

萬全麥門冬丸

楊氏地黃散

目錄

力斗

三

龜胸

聖惠大黃丸

張氏百合丹

龜背

張氏松葉丹

脫肛

張漢蕪荊丹

妙應散

曾氏薄荷散

聚寶象豆丸

黎古五倍子散

錢氏赤石脂散

曾氏蟠龍散

伏龍肝散

遊腸散

勝雪膏

蓖麻膏

苦參湯

肛痒

化蠶丸

雄黃散

香薷散

腎

地黃丸

解顛頤陷頤填總論

張漢封頤散

解顛

天南星散

曾氏調元散

張漢玉乳丹

嬰孺狗腦丸

小兒錮頤藥

參苓散

王八封頤散

三辛散

頤陷

力十

史

烏附膏

聖惠生乾地黄散

頤填

行遲

張氏麝茸丹

錢氏羚羊角丸

生乾地黄丸

虎骨散

三因五加皮散

柴胡飲

良方左經丸

丁時發續命丹

齒遲

張煥香附丹

湯氏芎黃散

髮遲

張煥苕勝丹

聖惠黑豆膏

香薷煎

髮黃

齒

清胃散

張煥藁本散

雄黃丸

莊氏麝香散

聖惠蝦蟇散

聚寶黃龍散

耳

張煥通鳴散

聖惠細辛膏

麝香散

芎烏散

張煥紅藍花散

田氏紅玉散

湯氏龍黃散

五輭

金靈散

生筋散

竹茹散

貼頭起項膏 狼毒丸

五鞭

小續命湯

寒熱往來

太醫局小柴胡湯

人參前胡散 芍藥湯

全生荆芥散 全生備急丸

嬰孺六味湯 大黃丸 聖惠柴胡散

五味子散 人參散 黃芪丸

張煥香甲散

張煥秦艽湯

王氏柴胡人參湯

玉訣真珠丸

聖惠柴胡散

黃芪丸

瘧

全生指迷蘇蘇湯

清脾飲子

全生薑桂湯 草果飲 清脾湯

二薑丸

胡黃連散 張煥桃仁湯

全生鼈甲湯

張煥烏梅丹 全生旋覆花丸

半硫丸

張煥知母丹 桂枝麻黃各半湯

知母麻黃湯

柴胡桂枝湯 白虎加桂湯

十味香薷散

養胃湯 四獸飲

鬼哭散

千金大五補湯 聖惠犀角散

三聖丸

二仙散 祛瘧丹

鼈甲飲子

經効瘡丹

瘡母丸

消癍丸

大腹皮湯

青皮湯

疔病

龍膽湯

聖惠甘草散

大黃丸

張渙虎骨丹

客忤

真珠散

安神丸

真珠散

張渙辟邪膏

中惡

蘇合香丸

沉香降氣湯

聖惠桃奴散

聖惠鬼羽箭散

聖惠雄黃丸

鬼箭羽湯

卒死

鬼持

外臺深師五邪丸

疔病

太乙備急散

尸疔仲景走馬湯

聖惠木香散

犀角散

張渙雌黃丹

立効湯

雄黃散

聖惠殺羊角散

升麻散

嬰孺雄黃丸

張渙雄麝散



麝犀湯

聖惠神效... 聖惠眼... 聖惠... 聖惠...

幼科證治準繩集之一

金壇王肯堂字泰甫輯

# 證治通論

錢氏論五藏所主

心主驚

實則叫哭發熱飲水

而搐 虛則卧而悸動不安

肝主風 實則目直

大叫呵欠項急頓悶

虛則前作咬牙多欠氣熱則

外生氣溫則内生

脾主困 實則

困睡身熱飲水

肺主喘 實則

悶亂喘促有飲水者有不飲水者

虛則哽氣長出

通論

幼科

氣ヲ腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷更當  
別虛實證假如肺病又見肝證前牙多呵欠者易治  
肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難  
治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新  
久虛實虛則補母實則瀉子

**五藏病**

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急心病多  
叫哭驚悸手足動搖發熱飲水脾病困睡泄瀉不  
思飲食肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急腎病  
無精光畏明體骨重潔熱則從心寒則從腎嗽而  
氣止從肺風從肝瀉從脾假令瀉兼嗽又氣止乃脾

肺病也宜瀉白益黃散合而服之脾苦濕肺苦燥氣  
上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴啾啾者宜服理  
中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴熱多者  
宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴湯  
其他五藏若有兼症皆如此類推之更詳後論四時  
推移用藥

**五藏相勝**

肝病秋見日補肝勝肺也肺怯不能勝  
肝當補脾治肝益脾者母能令子實也補脾益黃散  
治肝瀉青丸主之肺病春見早辰肺勝肝也肝怯  
故受病當補肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散

主之 肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝輕者  
肝病退重者唇白而死 肺病見春金旺肺勝肝也  
當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者  
當搖海藏云為肝怯故目淡青色也 心病見冬火旺心勝腎也當  
補腎治心輕者心病退重者下竄不語腎怯虛也  
腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重  
者悸動當搖 脾病見四旁皆倣此治之順者易治  
逆者難治脾怯當向目赤黃五藏相反隨證治之  
婁右五藏相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法  
特論之旨實發前人所未發者也假如肝病見於春

及早晨乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺  
之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣  
此 潔肝勝肺則肝病身熱發搖又見肺虛喘而氣  
短病見於申酉戌時是肝真強也內經云受所制而  
不能制謂之真強法當補脾肺而瀉肝導赤散瀉黃  
散主之 劉宗厚云此皆五藏相勝病機不離五行  
生剋制化之理者蓋小兒初生襁褓未有七情六慾  
只是形體脆弱血氣未定藏府精神未完所以有藏  
氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往遇是率指  
為外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢氏論時

有脫略幸而潔古補之今特參附誠無窮之惠也

潔古論五藏五邪相乘補瀉大法 五藏子母虛實

鬼賊微正若不違肯意不易得而入焉 在前者為實邪子能令母實拒賊傷於母其子又引母所尅者妻來相助故曰實邪也在後者為虛邪母引子之鬼賊至由母能使子虛也內經云子能令母實母能令子虛此之謂也 妻來乘夫為微邪夫來乘妻為賊邪法當瀉鬼補本藏本藏自病為正邪當虛則補之實則瀉之內經云滋苗者必固其根伐下者必枯其上逆其根伐其本則敗其真矣 心主熱自病或太

熱瀉心湯主之實則煩熱黃連瀉心湯主之虛則驚悸生犀散主之

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之

肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之

脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之 腎乘心賊

邪恐怖惡寒安神丸主之 肺主燥自病則喘嗽燥

則潤之實則喘而氣盛瀉白散主之虛則喘而少氣

先益黃散後阿膠散主之 心乘肺賊邪熱而喘嗽

先地黃丸中導赤散後阿膠散主之 肝乘肺微邪

惡風眩目昏憤嗽羌活膏主之 腎乘肺實邪憎寒

嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉

嗽人參白朮散主之 肝主風自病則風搐拘急肝  
苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之實則風搐  
力大瀉青丸主之虛則風搐力小地黄丸主之 心  
乘肝實邪壯熱而搐利驚丸涼驚丸主之 肺乘肝  
賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本藏補  
肝地黄丸主之瀉肺瀉白散主之 脾乘肝微邪多  
睡體重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證  
則別立法治之 腎乘肝虛邪憎寒呵欠而搐羌活  
膏主之 脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾苦  
濕急食苦以燥之實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散

主之虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之 肝乘脾  
賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪壯  
熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾  
實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶  
丸 腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之 腎  
主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無實小兒  
瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火 心乘腎微邪  
內熱不惡寒桂枝湯主之 肺乘腎虛邪喘嗽皮澁  
寒百部丸主之 肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中  
丸主之 脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

通論

刀斗一

五

凡五藏虛弱是自已正令不行乃鬼賊之所尅害  
當補本藏之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法  
當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本  
藏又名寒嗽大抵五藏各至本位即氣盛不可更補  
到所克位不可更瀉

**五藏補瀉法** 錢凡病先虛或已經下有合下者必先  
實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之證  
先當益脾後方瀉肺也 瀉青丸又名瀉肝丸 錢  
氏謂肝無補法故無補肝藥王海藏以四物湯內加  
防風羌活等分爲細末煉蜜丸名補肝丸 又以瀉

青丸去梔子大黃名鎮肝丸治肝虛 導赤散瀉丙  
小腸 瀉心湯瀉丁心 安神丸治心虛疴熱神思  
恍惚 海藏八物定志丸補心正藥 益黃散又名  
補脾散海藏云此劑補脾以燥濕東垣云治胃中寒  
濕嘔吐腹痛瀉利清白之聖藥也 瀉黃散又名瀉  
脾散海藏云瀉脾熱 阿膠散又名補肺散海藏云  
杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之類也 瀉  
白散又名瀉肺散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直  
瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分乏 地黃丸即  
金匱八味丸去桂附海藏云治腎虛解顛即魃病也

治脉毛而虛 錢氏謂腎無瀉法故無瀉腎藥海藏  
瀉腎丸治脉洪而實即前地黄丸熟地改生地去山  
茱萸是也此治左手本部脉若右尺洪實以鳳髓丹  
瀉之詳見五藏各門總論

**察色** 古稱望而知之謂之神而小兒醫號為啞科脉  
來駛疾難於指下分明尤以察色為要故首叙之  
夫嬰兒惟察其面部必有五色以知病源本身五體  
以頭為首首中有面面中有睛睛中有神神者目中  
光彩是也隱顯橫衝應位而見以應五藏五色者青  
黃赤白黑五藏之色心赤肝青脾黃肺白腎黑五藏

所主病證蘊於內必形色見於外故小兒有病先觀  
其本部形色以論其五行生尅吉凶形色若不相應  
然後聽聲切脉

**錢** 面上證 左頤為肝合左手關位肝膽之分 右

頤為肺合右手寸脉肺與大腸之分 額上為心合左手寸

於君火為一之氣 鼻為脾合右手關脉脾胃之分

氣 頰為腎合左手尺下腎與膀胱之分 赤者熱也

黃者積也白者寒也青黑者痛也隨證治之 赤類

鈴方云青色者為驚積不散欲發風候 紅赤色者

為熱為痰積壅盛驚悸煩躁增進 黃色者亦為熱

通論  
為食積癥傷欲作疴候或作痞癰若神思昏沉其候  
潮熱氣麤困倦或嘔噦或瀉痢 白色為寒為肺氣  
不利大腸滑泄欲作吐利 黑色者為痛所傳不煩  
變證即為逆候榮衛失序為疾危惡 全嬰方云左  
頰屬肝東方之位春見微青者平深青者病白色者  
絕赤色主身熱拘急肝熱生風青黑色主驚悸腹痛  
淺赤色主潮熱夜間發日中歇唇紅焦燥脉必緊數  
右頰屬肺西方之位居右秋見微白者平深白者  
病赤色者絕淺色主潮熱或大便堅而氣麤壅嗽青  
白色主咳嗽惡心青色主風入肺時時咳嗽青黑色

主驚風欲發或肚疼盤腸內吊 額上屬心南方之  
位火性炎上故居上夏見微赤者平深赤者病黑色  
者絕赤色主心經有風熱心躁驚悸睡卧不安青黑  
色主心中有邪驚風腹疼手足癱瘓而啼叫青黑甚  
至心腹疼黃色主驚疳骨熱渴皮毛乾燥夜多盜汗  
頭髮焦黃 鼻上屬脾中央之位故居中而四季見  
微黃者平深黃者病青色者絕赤色主身熱不思乳  
食深黃色主小便不通鼻孔乾燥氣麤鼻衄夜間多  
哭淡白色主泄瀉食不化青色主吐乳口鼻乾燥大  
小便不利 下頰屬腎北方之位水性潤下故居下



冬見微黑者平深黑者病黃色者絕赤色主膀胱與腎為表裏有熱則水道不利故小便癃閉永類金方肝部所主睛中瞳人內藏其神外究五輪眵眊屬脾熱即生眵兩眦總心熱痛如鍼白屬肺家熱赤生砂黃屬肝藏昏瞽障中心瞳人腎熱不明眼忽眩竄發風發驚心部所主顴面臉頰皆屬心位黑即沉困青即驚悸赤心發風白即疳氣虛黃衛積浮腫氣逆心絕何因太叫數聲過關不叫必作鴉聲加熱驚譊散熱清心脾部所主唇口見病人中承漿四圍上下合口脾鄉開口屬心心脾有熱唇裂舌瘡三

焦積熱唇紅如血深紅重渴鵝口慕口木舌重舌脾肺熱就口內噴臭脾腎氣寒色如死肝太驚一嚇口乾唇白常時積驚漸必傳心心氣不足令兒煩哭何知脾絕指甲皆黑目無神光定難用藥五種撮口驚風更惡不治証肺部所主鼻準兩孔并連山根大小二眦肺部所存鼻孔黑煤即肺經焦黑煤如墨肺經即絕鼻中赤癢疳盛蛔長或瀉白滯腦寒困寐或流清涕傷風喜睡肺熱鼻塞因息吹得或感風寒亦閉關隔鼻爛即疳鼻臭積熱腎部所主耳穴之前名曰耳花耳孩名輪輪裏名廓輪廓焦黑腎家虛熱

其黑如炭腎絕死且耳門生瘡衛積非常耳中膿出  
腎熱疳極臭名聾耳膿汁不止瘡癢如刺其候虛熱  
忽聽不聰心腎氣壅常作閃閃熱氣上攻或如蟲刮  
榮虛衛熱耳輪如水更有紅絲麻痘相侵耳輪紅熱  
傷寒是則熱極肉痛腫氣相攻清心涼膈關竅通塞  
兒孩兩腎常虛無病切莫攻擊補更無益 潔肝病  
面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃 心病  
面黑 若肝病驚搐而又加面白痰涎喘急之類此  
皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃  
羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風

熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立  
夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用  
導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋  
分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂腎不受瀉  
也 瀉青主驚積不散欲發風候紅主痰積驚悸黃  
者食積癥傷欲作疳癰白主泄瀉水穀更欲作吐黑  
主臟腑欲絕 印堂青主初患驚瀉紅主大驚夜啼  
黑主客忤 山根青主一次驚瀉後發躁黑黃甚者  
死 年壽平陷主夭青主發熱生驚黑主利死紅主  
躁死微黃曰平黃甚曰霍亂 承漿青主食時被驚

通論

刀科

黃主吐逆亦主血利黑主驚風○面眼黑睛黃主有  
熱白睛黃主食積疳疔白睛青主驚風黑睛黃主傷  
寒○眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅  
者死○風氣一池青主風候紫主吐逆或發熱黃主  
吐逆赤主煩躁夜啼○兩顴赤主肺有客熱○兩太  
陽青主一次受驚青自太陽入耳者死紅主血淋○  
兩臉青主客忤黃主痰溢赤主風熱○兩頰赤主傷  
寒兩顴青主吐蟲○兩金匱青主第二次驚風黑透  
口十日死青連目入耳七日死○兩風門紅主風熱  
黑主疝青主水驚黑從眉入耳即日死昏黑不食者

死○面青眼青肝病面赤心病面白肺病面黃脾病  
面黑腎病○額間赤色主心經有熱煩躁驚悸若飲  
水或叫哭屬本經實熱用瀉心散以清心火微赤困  
卧驚悸熱渴飲湯屬虛熱用秘旨安神丸以生心血  
青黑主驚風腹痛或瘵瘵啼叫用五味異功散加木  
香柴胡釣藤鈎補脾肝青黑主心腹作痛此寒水乘  
心用益黃散微黃主驚疳用安神丸○左臉青或兼  
赤主肝經風熱項強頓悶目劓瘵瘵用柴胡清肝散  
色微赤條熱咬牙屬虛熱用地黃丸青黑主肝尅脾  
而驚搐腹痛用六君子加薑桂微赤主潮熱血虛心

躁先用秘旨安神丸次用地黃圓。右臉赤主風邪氣麤咳嗽發熱飲水爲實熱用瀉白散若哽氣出氣唇白氣短屬虛熱用五味異功散若脾熱所傳用清胃散心火所刑用人參平肺散淡赤主潮熱心躁或大便堅秘用宣明柴胡飲子以疎導如潮熱未止更用釣藤飲以清肝色青白主咳嗽惡心先用惺惺散解表邪健脾土更以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內釣用六君釣藤鈎平肝補脾。鼻微黃爲平赤主脾胃實熱身熱飲水乳食如常用瀉黃散清熱理脾微赤主脾經虛熱身涼飲湯乳食少

思用五味異功散補中健脾色深黃主小便不通鼻中乾燥氣麤衄血乃脾熱傳於肺腎先用濟生犀角地黃湯後用地黃丸色淡白乃脾虛泄瀉乳食不化用六君子湯調補中氣青色主脾土虛寒肝木所勝用五味異功散加木香炮薑溫中平肝黑爲死候。顏間色赤主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通用五苓散以分利鼻準微黃兼右腮微赤乃脾肺燥熱不能化生腎水用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若顏間微赤乃膀胱陽虛陰無所化用六味地黃丸若小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯

用六味丸加車前牛膝脾肺氣虛不能通調水道者亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有熱用六味地黃丸如不應則用補中益氣湯益脾肺生肝腎若小便後出白津或莖中作痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸○印堂青黑主腹痛夜啼此脾氣虛寒也脾為至陰故夜間腹痛而啼用釣藤飲色淡白主泄瀉乳食不化屬脾氣虛弱用五味異功散加木香○人中黃主傷乳胃逆青主下利乳食不化噎氣酸腐此脾虛停滯先用大安丸消食後用異功散健脾黑主蛔蟲咬痛○唇色白主

吐涎嘔逆或吐血便血乃脾氣虛弱不能攝涎統血歸源急用六君子湯色赤乾燥而皺者主脾經熱渴大便不通煩熱不寐先以清胃散治其熱次以四君子湯健脾胃色赤兼白主衄血乃脾肺虛熱不能攝血歸源用聖濟犀角地黃湯清熱補血用四君子湯以補脾氣如久不應則用麥門冬散或人參安胃散○口畔色黃主脾經積熱用清胃散久病用四味肥兒丸以治疳熱唇口抽動主驚熱不安用異功散加山梔釣藤鈎補脾平肝若口流涎唇色紫乃脾氣虛寒用

通論

切十一

七三

異功散加炮薑木香若腹中痛口吐涎乃蟲作痛先用蕪荑散後用調中丸不吐涎是積痛也用異功散手足厥冷用理中湯加烏梅溫補中氣而痛自止或吐後或大便去後而痛止者先用下積丸後用異功散白主失血死青主驚風死黑色繞口者不治耳後微赤此少陽經風熱用柴胡飲子清肝生血微黃主睡中驚悸咬牙用四君子加芎歸升麻以調理脾氣耳乾燥主腎疝蒸熱作渴盜汗用地黃丸若小便後出白津或玉莖癢痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯後用地黃丸若稟賦腎氣不足或早近女色致

小便澀滯或作痛如淋者急用地黃丸補中益氣湯滋其化源或大小便去後穀道牽痛者其虛尤甚用前丸加牛膝車前肉桂如手足逆冷或畏寒少食陽氣虛寒也急加附子多可得生太抵多因稟賦臟氣不平或乳食寒暑失節或妊娠乳母飲食起居六淫七情所致若初病元氣無虧乳食如常發熱壯熱二便秘結作渴飲水睡不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢體畏寒而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣更宜審胎氣之虛實臟腑之相勝而治之庶無悞矣

錢目內證 赤者心熱導赤散主之 淡紅者心虛  
熱生犀散主之 青者肝熱瀉青丸主之 淺淡者補  
之 黃者脾熱瀉黃散主之 無精光者腎虛地黃  
丸主之 如見面目浮腫主久咳嗽乃脾受疴積也  
凡小兒唇白主吐涎嘔逆吐血便血唇紅渴飲煩躁  
如久渴瀉唇紅者是虛證也不可用涼藥唇黃主脾  
受積後發腫唇口紫及吐涎者主蟲痛不吐涎者是  
積痛唇口四畔黃如橘主口臭乃脾之積熱也唇青  
主血虛脾寒為冷所乘蓋唇主脾土木來尅土知脾  
弱不能食也

凡小兒舌乾舌白舌燥舌胎舌黃舌赤腫皆主大便  
不通或通利必色焦黃如舌裂舌上芒刺舌上出血  
皆熱極陽毒也舌上生瘡心脾有熱舌捲主驚久患  
瀉利舌黑必潤不可認為熱蓋久病上焦虛熱故也  
久瀉痢舌黑者必死

**聽聲**

重實聲重實雄聲體熱為三焦氣壅在心脾傷風咳  
嗽喉咽痛結澀腸中糞出遲  
悲焦聲悲焦有燥恐怖欲生風重濁聲沉靜疴攻  
必耳聾

啼哭聲但哭無啼只是驚多啼不哭痛分明聲輕顫  
嘔風痲病速緩聲頻吐瀉成

噤煎聲噤煎煩躁病難安燥促聲音為感寒語短氣  
微尿主澀長遲聲細痢多般

遲緩聲語短聲遲緩腸鳴泄瀉頻嘔聲多不響風熱  
肺家因

**脉法** 候兒脉當以太指按三部一息六七至為平和  
八九至為發熱五至為內寒脉弦為風痲沉緩為傷  
食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風太  
小不勻為惡候為鬼祟浮大數為風為熱伏結為物

聚單細為疳勞凡腹痛多喘嘔而脉洪者為有蟲沉  
而遲潮熱者胃寒也溫之則愈訣曰小兒脉緊風痲  
候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促急驚神  
不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘久腹痛之候  
緊而弦脉亂不治安可救變蒸之時脉必亂不治自  
然無過繆單細疳勞洪有蟲大小不勻為惡候脉沉  
而遲有潮熱此必胃寒來內寇瀉利脉大不可醫仔  
細酌量宜審究雲岐子云未及五歲不可視藥者未  
遲數按錢氏論又  
不拘五歲上下也

**脉應雜病**

通論脉應雜病

刀斗一

十一



諸數脈	為熱屬腑
諸遲脈	為冷屬臟
陽數脈	主吐逆不吐必發熱
陰微脈	主泄瀉不瀉必盜汗
沉數脈	寒熱寒多熱少亦主骨蒸熱
緊數脈	寒熱熱多寒少又主骨熱急則驚癇
沉緊脈	心腹痛短數同亦主咳嗽
沉細脈	乳食不化亦主腹痛下痢
沉伏脈	為積聚亦主霍亂
微緩脈	乳不化泄瀉沉緩亦同

微澀脈	瘕瘕筋攣
微急脈	寒熱唾血
浮滑脈	宿食不消亦主咳嗽
浮緊脈	疝氣耳聾
浮弦脈	頭疼身熱
緊滑脈	吐血惡
心脈急數	驚癇不驚者疝淋
肝脈急甚	顛癇風癇痰涎流液
肺脈浮實	鼻塞并大小便不通
關脈緊滑	主蛔蟲尺脈沉亦主蛔

通合... 脈... 病...  
寸...  
尺...

尺脉微細 溘泄冷痢乳食不化  
尺脉微澀 便血無血者必盜汗  
脉過寸口入魚際 主遺尿

**審脉逆順**

驚搐脉 浮數順沉細逆身温順肢冷逆  
夜啼脉 微小順洪大逆身冷逆  
心腹痛 沉細順浮大逆身温順肢冷逆  
傷寒脉 洪弦順沉細逆浮大順微伏逆  
汗後脉 沉細順洪緊逆困睡順狂躁逆  
溫病脉 洪大順沉細逆身熱順腹痛逆

咳嗽脉 滑浮順沉細逆身温順肢冷逆  
霍亂脉 浮洪順遲微逆身温順肢冷逆  
吐衄脉 浮大順沉細逆身温順肢冷逆  
泄瀉脉 緩小順浮大逆身温順肢冷逆  
諸痢脉 沉細順浮大逆身温順肢冷逆  
諸渴脉 洪數順微細逆身温順肢冷逆  
諸腫脉 浮大順沉細逆臟實順腸泄逆  
腹脹脉 浮大順虛小逆臟實順泄瀉逆  
痰喘脉 滑大順沉細逆身温順肢冷逆  
寒熱脉 緊數順沉細逆倦怠順強直逆

通命脉應雜病

寸口

十七

疳勞脉 緊數順沉細逆臟實順脾泄逆  
蟲痛脉 緊滑順浮大逆身温順唇青逆  
諸失血 沉細順浮數逆身温順發熱逆  
中惡腹脹 緊細順浮大逆身熱順身冷逆  
黃疸脉 浮大順沉細逆腹寬順泄瀉逆  
火瘴脉 浮洪順沉細逆身熱順身冷逆  
錢仲陽云小兒之脉氣不和則弦急傷食則沉緩虛  
驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治。水鏡訣  
云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六  
腑部分既別逆順難明若憑寸口之浮沉必乃橫亡

於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥始無差誤未  
至三歲看虎口食指第一節名風關脉初見易治第  
二節名氣關脉見病深難治第三節名命關脉見死  
不治三關青是四足驚赤是水驚黑是人驚紫色瀉  
利黃色雷驚三關通度是極驚之症必死或青或紅  
有紋如線一直者是乳食傷脾必發驚熱左右一樣  
者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰或似駒  
駘聲有赤是傷寒及嗽如紅火是瀉紅黑相兼主下  
痢青多白痢紅多赤痢紫色相兼加渴虎口脉紋亂  
主胃氣不和青是驚與積青黑發慢驚脉入掌乃內

通論

方寸

七

鈞指紋曲裏風盛鬱外食積此論三歲以上之法○  
若三歲以下更用一指按高骨乃分三關定其息數  
呼吸八至爲平脉九至不安十至危困浮主風沉遲  
主虛冷實主有熱緊主癩癩洪主熱盛沉緩主虛瀉  
微遲有積有蟲遲澀主胃脘不和沉主乳食難化沉  
細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛牢實主大便秘沉  
而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數乃驚風爲  
患四肢掣顫浮洪乃胃中有熱沉緊主腹痛有寒虛  
濡者有氣又主慢驚乳主大便利血○四歲以下用  
一指袞轉尋三部以關爲準七八歲移指少許九歲

次第依三關部位尋取十一十二歲亦同十四十五  
歲依大方脉部位診視○凡看脉先定浮沉遲數陰  
陽冷熱沉遲爲陰浮數爲陽更兼看部位青主驚風  
白主虛瀉赤主痰熱黑色病甚黃主脾疳以此相參  
察病治療庶無誤矣○全幼心鑑云小兒半歲之際  
有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指曲按  
之兒頭在左舉右手在右舉左手食指爲上中指爲  
中名指爲下三指俱熱主感風邪鼻塞氣麤發熱咳  
嗽若三指俱冷主外感風寒內傷飲食發熱吐瀉若  
食中二指熱主上熱下冷名中二指熱主夾驚之疾


食指熱主胸滿食滯又當察辨脉形主之。流珠形主飲食所傷內熱欲吐或腸鳴自利煩躁啼哭用助胃膏消飲食分陰陽若食消而病仍作用香砂助胃膏以補脾胃。環珠形主脾虛停食胸膈脹滿煩渴發熱用五味異功散加山查枳實健脾消食後用六君子湯調養中氣。長珠形主脾傷飲食積滯肚腹作痛寒熱不食先用大安丸消其積滯次以異功散健其脾氣。來蛇形主脾胃濕熱中脘不利乾嘔不食此疳邪內作先用四味肥兒丸治疳後用四君子湯補脾。去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急

不食困睡先用六君子湯加枳實健脾消積次以七味白朮散調補胃氣。弓反裏形主感冒寒邪噎氣出氣驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐涎先用惺惺散助胃氣祛外邪後以五味異功散加茯苓當歸養心血助胃氣若外邪既解而驚悸指冷脾氣受傷也宜用七味白朮散補之若悶亂氣麤喘促噎氣者難治脾虛甚故也。弓反外形主痰熱心神恍惚來驚來食風癇痰盛先以天麻防風丸祛外邪又用五味異功散調中氣。鎗形主風熱生痰發搐先用抱龍丸如未應用牛黃清心丸若傳於脾肺或過用

風痰之藥而見一切諸症者專調補脾胃。魚骨形主驚痰發熱先用抱龍丸治之如未應屬肝火實熱少用抑青丸以清肝隨用六味丸以補肝或發熱少食或痰盛發搐乃肝木尅脾土用六君子湯加柴胡補脾土以制肝木。水字形主驚風食積胸膈煩躁頓悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虛弱飲食積滯而木尅土也先用大安丸消導飲食次以六君子用四君升麻柴胡釣藤鈎升補脾氣平制肝木。鉞形主心肝熱極生風驚悸頓悶困倦不食痰盛搐

搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子加釣藤鈎平肝實脾。透關射指形主驚風痰熱聚於胸膈乃脾肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾肺化痰涎次用六君子湯加桔梗山藥補脾土益肺金。透關射甲形主驚風肝木尅制脾土之敗症急用六君子香釣藤鈎官桂溫補脾土未應即加附子以回陽氣多得生者嘗聞古人云小兒為芽兒如草之芽水之漚蓋因臟腑脆嫩口不能言最難投劑當首察面色而知其所屬次驗虎口以辨其所因實為治法之簡要也

通言  
虎口三關脉紋



流珠形

十三指形



長珠形



環珠形



來蛇形



去蛇形



弓反外形



通論  
弓反裏形



魚骨形



鎗形



鍼形



水字形



透關射指形



透關射甲形



通論  
切斗  
三



流珠只一點紅色環珠舍大長珠圓長已上非謂圈  
子總皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大  
一頭尖去蛇亦如此分上下朝故曰來去角弓反張  
向裏爲順向外爲逆鎗形直上魚骨分開水字卽三  
脉竝行鍼形卽過關一上粒米許射甲命脉向外透  
指命脉曲裏雖然余常治之亦有不專執其形脉而  
投劑者蓋但有是症卽服是藥而亦多驗

**死證**凡小兒頰腫頰陷汗出不流如珠如油舒舌出  
口舌腫發驚瀉黑黯血髮直如麻皮膚無血色此心  
絕也竝壬癸日死 病重啼哭無淚及病不哭下淚

爪甲青黑眼深如陷舌捲囊縮發搐目斜連唇口動  
手如抱頭之狀或脚面直素問云其華在爪其充在  
筋肝絕也竝庚辛日死 人中滿人中黑唇縮反張  
唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血腫尿血舌縮或捲  
鼻孔開張齒禁冷涎如油噁口如囊面如土色四肢  
逆冷如濕石之狀吃乳不收瀉糞赤黑脾絕也竝甲  
乙日死 有熱嘔湯水并藥食喉中鳴是胃脆直不  
能蔭肺此證醫書少有蓋累曾試之有驗竝死不治  
目直青鮮氣喘不回吃食噎嗽痰涎塞口喉中鳴響  
鼻塞不通鼻乾黑燥肺脹胃膈頭汗四肢冷此肺絕

也。並丙丁日死。面黑神昏眼黑眼腫目無光彩耳  
輪青黃焦枯疳疔牙齒落髮疎黃燥皮膚黑燥驚風咬  
乳憂齒洩屁黑色透口此腎絕也。並戊巳日死。  
小兒死證十五候。眼上赤脉下貫瞳人。頤門腫起  
兼及作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視覩不轉睛  
指甲黑色忽作鷓聲虛舌出口齧齒咬入魚口氣急  
啼不作聲虺蟲既出必是死形用藥速救十無一生  
小兒病困汗出如珠著身不流者死。小兒病其  
頭髮皆上逆者必死。小兒病而頤陷其口唇乾目  
皮及口中氣出冷手足四垂其卧如縛掌中冷皆不

治。小兒中風熱喘鳴有息脉緩則生急則死。小  
兒痢疾脉浮大而腹痛者必死。乳子病熱脉懸小  
手足溫則生寒則死。

**襦褌**千金論云小兒用父故絮著衣女用母故衣勿  
使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發瀉皆自此  
始。巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣則令筋骨  
緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便  
易傷損。嬰兒若常藏在幃幙之內重衣溫煖譬如  
陰地草木不見風日軟脆不在風寒。嬰兒皆當以  
故絮著衣莫用新綿也天氣和煖無風之時令母將

抱日中嬉戲數見風白則令血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病。嬰兒又當習薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣則令兒中風寒。○嬰兒冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒即漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲害也。嬰兒又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當戒之。初生兒出月必須入襁褓襁褓之道必須得宜如春夏之月乃萬物生長之時宜教令地臥使之不逆生長之氣如秋冬之月乃萬物收藏之時宜就溫暖之處使之不逆收藏之氣然後血凝

氣和則百病無自而入矣。○丹溪曰人生十六歲已前血氣俱盛如日方升如月將圓惟陰常不足養之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫暖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫暖則陰暗消是以下體不與綿絹夾厚溫暖之服恐妨陰氣實爲確論

**乳哺**湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者妳也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以化周歲以上必成乳癖食癖於

腹中作疼作熱疳病從此起也。丹溪曰血氣俱盛  
食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬  
酸鹹甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱  
難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非惟無病且不  
縱口可以養德此外生菓味鹹乾柿性涼可為長陰  
之助然栗太補柿太澀俱為難化亦宜少與婦人無  
知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何  
及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有  
食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小  
節不謹太義亦虧可不慎歟至於乳母尤宜謹節飲

食下咽乳汁便通情欲中動乳脉便應病氣到乳汁  
必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或  
為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其  
溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未  
形也 乳兒法凡乳母血氣為乳汁也五情善惡悉  
血氣所生宜戒喜怒一切禁忌不用狐臭瘦瘰氣嗽  
病者及身體疥癬頭瘡髮少緊唇耳聾音啞鼷鼻癩  
病等方可乳兒 夏中盛熱時乳母浴後或兒啼不  
可與妳能使兒成胃毒秋成赤白痢浴後可令定息  
良久熱燥乳之故無患也 聶氏曰盛啼不可食乳

通論乳病  
及中

恐氣逆不順聚而為逆亦能成驚風也。千金論曰：凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多猛取出授後再乳切須乳時合先令捏去宿熱乳然後乳之如乳母欲卧寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒卧於側或驚起不可乳兒蓋氣亂未定必能殺兒也。巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲蓋恐乳不得下停滯胸膈則為嘔吐也。顛顛經曰夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒泄瀉復痢尤不可不謹。夜間乳兒母起身坐抱兒餵

之。每侵早欲飲乳皆須捏去宿乳。乳汁勿投於地。蟲蟻食之令乳無汁可沃。東壁上佳。乳令兒病。證喜乳涎喘生驚。孫兆云令兒上氣顛在亦怒乳疝。氣腹脹。千金翼云怒乳令兒疝腹脹寒乳疝片不化。史記論云乳氣寒虛冷故令便青熱乳面黃不食。千金翼而啼千金翼云令兒咳嗽熱乳吐瀉腹脹。寶鑑云令兒面損肺氣令兒熱乳傷氣乳吐瀉腹脹。寶鑑云令兒面夜啼病乳能生諸疾。孫氏云黃瘦骨蒸盜汗嗽煎夜哭痙乳吐逆生痰。靈秘云痙乳成痰涎延壅生驚寶多驚。千金翼云醉注隨乳兒恍惚多驚淫乳必發驚痛。

寶鑑云乳母淫佚情亂乳兒  
生諸病不可不忌也凡喜怒哀亂未定乳兒則成吐  
瀉腹痛疳黃不食寒熱壅積不散乳兒則成痰癖涎

嗽肺脹龜背醉淫喘乳多發驚癇聖惠方云醉淫喘  
乳能殺小兒聖濟經論乳者夏不欲熱熱則致吐逆  
冬不欲寒寒則致下痢母不欲怒怒則令上氣顛狂  
母不欲醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛  
羸母有積熱而乳則變黃不能食新房而乳則瘦悴  
交脛不能行大抵乳食不便則生疾病 哺兒法肘  
後云兒初生三日應開腹助穀神碎米濃作飲如乳

酪與兒大豆許數令噉之頻與大豆許二七日可哺

千金云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡愈而復  
發又尪弱難養二十日後雖哺勿多不嗜食強與之  
不消復生病哺乳不進腹有痰癖四物紫丸微下之  
節哺數日自愈 寶鑑云兒五十日可哺如棗核百  
日彈丸早晚二哺莫抱檐下澡浴當風解衣哭未斷  
而乳冒冷而哺又不可在神佛驢馬畔各房舉尸之  
親諸色物器竝不可觸犯之害子性為驚癇經云三  
歲未滿勿食雞肉子腹生蟲 錢乙云兒多因愛惜  
過當三兩歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年

後宜煎陳米稀粥，粥尚時時與之。十月後漸與稠粥，爛飲以助中氣，自然易養。少病惟忌生冷油膩甜物等。外臺崔氏初哺兒法，以平定成日丑寅辰巳酉日大吉，男忌戊巳日，女忌丙丁日。斷乳法：小兒年至四五歲當斷乳，而不肯斷者，宜用畫眉膏斷乳之道，方可漸與肉食，則無疳癖之患。

畫眉膏

山梔存性 雄黃少

朱砂少

右為極細末，入生麻油、輕粉各少許，調勻候兒睡著，濃抹於兩肩上，醒來便不食乳，未效再用，加黃

丹壹錢

雜將護法萬全論：田婦護兒絕無他疾，譬之草木生於深山大澤，容易合抱。至於異果奇材，縱加培養，間有不秀實者，豈貴賤異哉！兒數見風日，即血凝氣剛，肌肉硬密，堪耐風寒。以田舍兒較之，相似。田氏曰：大凡小兒過煖，生熱熱極，生風提抱，生瘡餵飼，生癩最宜慎之。張渙曰：乳母須每日三時摸兒項後風池，若壯熱者，即須熨之，使微汗，即瘡。諺云：戒養小兒，謹護風池。風池在頸項筋兩轅之邊，有病乃治之，疾微切不可妄鍼灸，亦不用輒吐下，所以然者，鍼灸

傷兒經絡吐下傷動臟腑故也 嬰兒暑中常令在  
稍涼處乳母勿禁新水即不宜多 嬰兒春夏間有  
疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病矣  
嬰兒須看稟受南北之殊蓋地土寒溫不同故也  
嬰兒生後兩滿月即目瞳子成能笑識入乳母不得  
令生人抱之及不令見非常之物 嬰兒百晬任脉  
生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫 嬰兒半晬  
尻骨已成乳母當教兒學坐 嬰兒二百日外掌骨  
成乳母教兒地上匍匐 嬰兒三百日臙骨成乳母  
教兒獨立 嬰兒周晬膝骨已成乳母教兒行步

上件竝是定法蓋世之人不能如法存節往往抱兒  
過時損傷筋骨切宜戒之為吉 羅謙甫曰一小兒  
五月間因食傷冷粉腹中作痛遂於市藥舖中贖得  
神芎丸服之臍腹漸加冷疼時發時止踰七八年不  
已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其  
繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒  
也重寒傷胃其為冷痛可知矣凡人之脾胃喜溫而  
惡冷况小兒血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒  
留連久而不除也治病必先其本當用和中養氣之  
藥以救前失服之月餘方愈嗚呼康子饋藥孔子拜



而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人拱默而令切脉以謂能知病否且脉者人之血氣附行經絡之間熱勝則脉疾寒勝則脉遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源而主家亦不可不說其病源且此子之父不以病源告醫而求藥於市鋪中發藥者亦不審病源而以藥付之以致七八年之病皆昧此理也孫真人云未診先問最為有準東坡云只圖愈疾不欲困醫一公之語其有功於世大矣

# 初生門

## 初生

薛小兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸藉胎液以滋養受氣既足自然生育分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發為瘡疹須急於未啼時用軟帛裹指挖去其血用黃連豆豉硃蜜甘草解之後雖出痘亦輕矣有嚥入即時腹

脹嘔吐短氣不乳者用茯苓丸治之但黃連性寒若  
稟母氣膏梁積熱者宜服若滋味淡薄胎氣元弱者  
又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以  
牛黃分許蜜調與吮為佳世多用犀角解毒丸其胎  
氣虛寒虛弱者反傷脾胃生氣甚致不育又有嬰兒  
因其難產或冒風寒而垂危者切不可便斷臍帶急  
烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙  
捻於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦  
尤戒洗浴恐滕理不密元氣發泄而外邪乘之也

**拭口法** 嬰兒新產出胎急以綿裹指揩拭兒口中舌

上惡血穢露謂之玉銜若啼聲一發即入腹成百病  
又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不  
轉速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即  
活若舌下血出多者以燒亂髮灰同豬脂少許和  
塗之聖惠云看齒根有黃筋兩條以葦刀割 兒上  
下唇與齒齦連處皆有一筋牽引若上唇筋緊即生  
上煉下唇筋緊即生下煉上煉生瘡滿頭或眉間如  
癩狀瘙癢不已復流黃汁至處生瘡下煉起腰背漸  
至四肢患亦如上若疾甚不治或頭面上下相通累  
年不輕又天折或成大病是唯每日早晨拭口佳

刀生法  
刀生法  
刀生法

浴兒法 兒生三日以桑槐榆桃柳各取嫩枝三寸長者二三十節煎湯看冷熱入豬膽汁二三枚浴之浴湯用豬膽益母草不生瘡疥用金銀虎頭骨麝丹砂辟惡氣各忤驚瀰用桃梅李楮根葉解體熱溫壯之病須浴時煮湯須不冷不熱於無風密室浴之勿令久浴訖以粉摩之或以光粉蚌粉撲身辟邪吉 紀用經浴法寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不能上三日勿犯下三日三日五日七日浴小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證用清油調髮灰傅臍洗兒不可用水打濕臍

帶

斷臍法 千金云臍不得以刀割隔單衣咬斷以煖氣呵七遍卽纏結所留帶致兒足趺上斷訖連臍帶中多有蟲急剔撥去不爾入臍成疾臍當長六寸長則傷肌短則傷臟不以時斷及接汗不盡煖氣漸微卽生寒令兒臍風 寶鑑論斷臍若用剪刀先於懷中令煖又水入臍多天鈞痛苦啼叫面青黑臍傷動令久不乾傷外風卽口噤不可救 灸臍法 聖惠云兒生一宿抱近明無風處看臍上有赤脉直上者卽於脉盡頭灸三壯赤散無患矣

刀三斷臍法

三五

暴臍法千金論治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸  
與帛等合之暴臍調其緩急急則吐覘二十日乃解  
若十許白怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更暴臍  
冬時須閉戶下帳然火令溫暖換衣亦然仍以溫粉  
粉之

**服藥下胎毒法**心鑑曰古方書言兒始生落草服汞  
粉朱砂白蜜黃連欲下胎毒今人率承用之不知今  
人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之藥若  
與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五  
口其毒自下又能助養脾氣消化乳食然古人之法

終不可湮沒今人用之而効者多或不至如心鑑所  
云者今次第列於左方

張煥云嬰兒初生第一白纔斷臍襖袍訖看兒形色  
若面紅潤色赤啼聲響快者宜用汞粉法良久有臍  
糞便下為佳次用甘草法次用朱蜜法臨時更看形  
色若面色多青白啼聲不響即不須服次用牛黃法  
古方又有黃連法韭汁法豬乳法等在人看兒寒  
熱怯壯擇所宜而用之爾

甘草法用好原州甘草中指一節許拍碎以水二蜺  
殼煎一蜺殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁為佳

若服一蜆殼不吐即不須更服不問嬰兒虛實寒熱皆須服之服時後方吐後更與兩服吐止須盡壹合薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連法朱蜜法黃連法集驗方初生兒惡汁留胸膈壅塞易生蘊熱驚癩瘡瘡用好肥黃連數塊槌碎綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈搽一二點兒口中惡汁自下乳食便美未盡用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之○海藏方淨黃連壹錢水壹盞預先煎下待兒生未出聲時便用灌下以去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊積熱毒

終身不生瘡又去臍風等病

韭汁法本草云兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水聖惠方甘草後煖水浸韭子汁塗兒唇上乾又塗數次止不令入口

朱蜜法好朱砂一太豆許細研水飛煉赤蜜一蜆殼看稀稠和成膏每用一豆大乳汁化下時時滴口中三日內止三粒臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即不須服

牛黃法千金方朱蜜竟與牛黃不獨益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣又除百病張煥法真牛黃一塊

初生下胎毒法 切料一 三七

好蜜煉熟和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口中  
形色不實者不宜多服若嬰兒胎熱或身體黃色宜  
多服之

**汞粉法**張煥方兒紅潤色赤啼聲響快者用汞粉半  
錢旋旋令兒吮之良久有臍糞便下為佳 寶鑑銀  
粉抹口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜

**豬乳法**嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口  
中佳 豬兒飲母次便提後脚離乳急捋之即得

**臍帶法**用本兒落下臍帶瓦上焙燥為末入辰砂黃  
連甘草各末五分和勻蜜拌做三五次塗乳母乳上

俟兒吞之必使一日夜吞盡次日惡毒皆從大便而  
出日後不但痘疹稀疏竟有不出痘者俟臍帶落下  
即便製服在六七日之間為妙其辰砂必須研極細  
末以甘草湯飛過任服無害此方一以解毒一以補  
養蓋臍帶乃有生初之河車也繫於母之命門兩腎  
之所主乃以腎補腎腎既充足即不受邪故無他日  
變黑歸腎之證亦無顛門不合之疾生一兒即得一  
兒真保生第一良法

**藏衣法**即胎 崔氏云兒衣清水洗勿令沙土草污又  
清酒洗之仍內錢一文在衣中盛新瓶內青綿裏瓶

口密蓋置便宜處三日後依月吉地向陽高燥處入  
地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸須牢築令兒長壽  
智慧若不謹為豬狗食令顛狂蟲蟻食令病惡瘡木  
鳥食令兵死近社廟令見鬼近深水汗池令溺死近  
故竈令驚傷近井傍令聾盲棄道路街巷令絕嗣當  
門戶令聲不出耳聾著水流下令青盲棄火裏令生  
爛瘡著林木頭令自絞死此忌須慎每於天德月  
空處理之正月天德在二月空在三月若遇反支宜挂宅  
外福德上向陽高燥處待過月然後依法埋藏吉  
甲乙日生丙丁日藏丙丁日生戊巳日藏戊巳日生

庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏吉

剃頭法集驗方云小兒初剃頭俱不擇日皆於滿月  
日剃之蓋風俗所尚前產婦未得出房於滿月即與  
兒俱出謂胎髮穢惡有觸神竈令小兒不安故於此  
日必剃頭而出凡剃頭就溫煖避風處仍剃後須以  
杏仁參枚去皮尖研碎入薄荷參葉再口研却入生  
麻油參肆滴膩粉拌和頭上擦以避風邪免生瘡疥  
熱毒其後小兒亦宜此法

附方

海百壽散小兒初生未滿月已裏用之者老無瘡疥

初生下胎毒法

黃連 壹兩

硃砂 壹錢

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍身擦妙

顛頤兒初生日與平和飲子指迷兒生三下後與母服

人參

茯苓

甘草

升麻各貳錢伍分

水一盞煎一合半時時與之乳母忌油膩滿月及百晬加時冷加白朮熟加硝各半錢

# 生下胎疾

月內不測諸病

總論千金論曰芽兒出腹骨肉未斂肌肉未成猶尚是血凝則堅而成肌肉也又云如水上之泡草頭之露夫初生一臍之內天地八風之邪豈能速害良由在胎之時母失愛護或勞動氣血相干或坐卧饑飽相役飲酒食肉冷熱相制恐怖驚撲血脉相亂蘊毒於內損傷胎氣故降生之後有胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸證生焉外因浴洗拭口斷臍灸顛頤之不得法或綳絕驚恐乳哺寒溫之乖其宜致令瘵白



臍風鎖肚不乳等證病患致此亦難救療坐視其斃  
良可哀憫故黃帝云吾不能察其幼小謂別是一家  
調理耳用藥者必明消息形候審定生死察病患之  
淺深知藥性之寒溫而後度乎少失也

初生輒死千金兒初生輒死視兒口中懸瘡前上齶  
有胞者翼云赤胞以指甲摘取頭決令潰去血勿令血入  
咽入咽殺兒慎之

不能啼三因云小兒初生氣絕不能啼者必是難產  
或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且  
將胞衣置爐炭中燒之仍燃大紙條蘸油點火於臍

帶下薰之蓋臍帶連兒火薰時有火氣由臍入腹更  
以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴  
了即斷臍帶嬰兒哭遲者以葱白細鞭背上即啼  
水鑑方云胎風生下不能啼須使園中小葉葵搗  
取汁調熊膽末纔交入口免傾危看舌下法見前  
兒生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看  
喉間懸瘡前腭上有一泡用指摘破以帛拭去惡血  
勿令嚥下即能通聲吞乳

眼不開兒生眼閉口開常呻吟因受胎熱用涼五藏  
藥天竹黃散方見重舌及與母喫復以竹筒煎湯洗眼

小兒初生眼閉者由產母食熱物毒物致成斯疾治法當以熊膽少許蒸水洗眼上一日七次如三日不開用生地黄湯服仍須乳母服山茵陳湯凡初生小兒須洗令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼眥中使眼赤爛至長不瘥

生地黄湯 治初生小兒眼不開

乾地黄 赤芍藥 川芎

當歸去蘆 瓜蒌根 甘草

右為細末少許用燈心煎湯調抹入口中速服

四聖散 治嬰孩胎受熱毒生下兩目不開

燈心 黃連 秦皮

木賊 棗子各半兩

右以咀每服一錢水一盞煎七分澄清去查無時

頻洗兩目自開

洗眼方

黃連 秦皮 燈心

大棗各等分

右用竹筒煎湯

不乳謂初出胞胎而不吮乳也嬰兒初出胎時其聲未發急以手拭其口令惡血淨盡不得下咽即無他

病若拭口不全惡穢入腹則令腹滿氣短不能吮乳  
或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹痛也宜用茯  
苓丸及木香檳榔散治之

茯苓丸

赤茯苓

川黃連

枳殼炒

右等分爲末煉蜜丸桐子大每服一九乳汁調下

治穢惡入腹令兒嘔吐不乳方

木香

乾薑生

茯苓

甘草

酸木瓜

丁香各等分

右爲麤末一捻水煎綿蘸滴與之

外臺方

乳兩合葱白一寸煎一兩沸去葱喫卽乳

聖惠人參丸

人參

龍膽

黃連

馬牙硝

甘草炙微赤

枳實炙炒微黃各貢兩

右擣羅爲細末煉蜜丸如桐子乳汁研一九灌口

中日四五服差

朱砂丸 治三歲以下胃口閉不喫乳

朱砂

牛黃

麝香

丁香

甘草炙微赤

人參各壹分

犀角

黃耆

石膏

細研水飛

五靈脂各半

右搗羅研勻蜜丸如棗豆熟水下三九日四五服  
灸法兒生二十七日內不吮乳多啼者客風中臍循流  
心脾灸承漿在下唇稜下宛宛中次灸頰車在耳下  
頰骨後炷如雀屎各七壯此非灸不療兒喉中鳴  
咽乳不利灸旋璣三壯在天突下一寸陷者中  
**吐不止**錢初生下吐因穢惡下咽故也用木瓜丸主  
之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嚥下  
致生諸病田月裏生嘔先用朱砂丸下之如利後

用朱沉煎墜其邪氣使穢物自下而不嘔也

錢木瓜丸

木瓜

麝香

臍粉

木香

檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一二九甘  
草水下無時

薛芽兒初生之患多因乳母不慎七情不節厚味  
傳兒為病當審其因以調治其母前所用之藥恐  
臍腑脆嫩不能勝受用者審之

聖惠藿香散

治兒生至半月嘔逆不止

合天不小便

刀升

四

藿香

紫苑

洗去苗土 各壹分

甘草

炙赤 半兩

麥門冬

叁分 去心焙

桂心

半分

右為散每服一錢水一盞煎五分去滓溫綿點滴口中

**不小便**小兒初生不尿者多因在胎時母恣食噉熱毒之氣流入胎中兒飲其血是以生而臍腹腫脹如覺臍四旁有青黑氣色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者宜服葱乳湯

葱乳湯 葱白三四寸四破之以乳汁半盞煎灌一方葱

豆豉膏

生用搗爛入乳拌入兒口內再與乳吮嚥下即通

黑豆 壹勺

田螺 拾玖箇

葱 壹大把

右搗爛芭蕉汁調貼臍下

按觀丹溪治鄭廉使之子患淋病乃因父服下部熱藥遺毒在胎留於子之命門而然以紫雪和黃藥末為丸投之下如黍如粟者枕許而安則初生不尿症其當審因而處治不言可知也

**不大便**俗名鎖肚由胎中受熱熱毒壅盛結於肛門閉而不通無復滋潤所以如此至若第三日不通急

胎氣不大便

刀斗一

四聖

令婦人以溫水漱口，吸咂兒前後心并臍下手足心，共七處，凡四五次，仍以輕粉半錢，蜜少許，溫水化開，時時將少許服之，以通為度。如更不通，卽是肛門內合當以物透而通之。金簪為上，玉簪次之，須刺入二寸許，以蘇合香丸納入孔中，糞出為快。若肚腹膨脹，不能乳食，作呻吟聲，至於一七，難可望其生也。田氏治法，先用硬葱鍼紅肛門，如大便不下，後用牛黃散方見送朱砂丸，一時自見。

度須臾自通

**垂囊**千金云：小兒出腹六七日後，其血氣收斂成肉，則口舌喉頰裏清淨也。若喉裏舌上有物如蘆穰，盛水狀者，若懸囊有脹起者，可以綿纏長鍼留以處，如粟米許大，以刺決之，令氣泄去，青黃赤血汁也。一刺之止，消息一日未消者，來日又刺之，不過三刺自消。盡餘小小未消，三刺亦止，自然得消也。有著舌下如此者，名重舌，有著頰裏及上腭如此者，名重腭，有著齒斷上者，名重斷，皆刺去血汁也。刺後用鹽湯洗拭，急用如聖散或壹字散搽刷。

治法 垂囊

如聖散

鉛霜

朱砂水飛

真牛黃

太陰玄精石

右四味各研極細秤准各二錢五分拌勻入白龍腦五分再研勻每用藥抄壹字至半錢止搽兒口中時時用

壹字散

朱砂

朴硝各壹字

鵬砂各半錢

龍腦

右為極細末用蜜調少許搗翎蘸刷口內嚥下

妨

**重舌**巢氏云心候於舌而主血脾絡脉又出舌下心

火脾土二藏子母也有熱即血氣俱盛其狀附舌下

近舌根形如舌而短名重舌指爪摘斷及葦刀子

割法見前拭口法條惠眼搗口重舌重舌口瘡皆

上焦熱因受胎時大受極熱急以雞內金為末乾搽

口內及朱砂膏地黃膏輪流搽之仍服天竺黃散

地黃膏

鬱金皂莢水煮豆粉各半兩

甘草壹分

馬牙硝研壹錢

治天重舌

刀針

眼

用功  
生地黃汁蜂蜜對合熬成膏和藥每服兩皂子大  
香熟木含化或鵝翎掃口內

金朱飲 治驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻

生瘡致赤眼方 本名天竺黃散

川鬱金 剉皂莢水煎乾 天竺黃

甘草 炙 馬牙硝 各半 朱砂 壹分

蟬殼 拾肆筒水 麝香 少許

右為末每服半錢至一錢蜜湯調下

重蠟重膠 千金治法總前垂癰門 刺去血汗後鹽

湯洗拭壹字散塗刷法同前條 茅先生云心熱壅

滯先用朱砂膏 見驚積門 塗舌上後用牛黃膏 見癰熱門

聖惠牛黃散 一方無前三味有玄明粉

牛黃 白龍腦 朱砂 各壹分

鉛霜 半兩 太陰玄精石 壹兩

右細研為散先於腫處以鍼鉸破出血鹽湯洗拭

口後摻藥神效

口中有蟲外臺療兒喫妹不穩七日以來壯熱顏色

赤鼻孔黃恐作撮口及牙關蟲似蝸牛亦似黃頭白

蚌螺用竹瀝半合和少許牛黃服差 又豬肉拭口

即蟲出



胎疾 卷一  
禁風 巢氏云兒口內忽結聚生舌上如黍不能取乳  
名禁由在胎熱入藏心偏受熱 聖惠初生兒須防  
三病一撮口二著噤三臍風皆急病著噤尤甚過一  
臘方免牙關緊急喫乳不穩啼聲漸小口吐涎沫  
眼人見大小便通以為冷熱所得不知病在喉舌狀  
亦極重善救療者十不得三四依將護法防於事先  
必無此患 但有此證急看兒上腭有點子先以指  
甲輕輕刮破次服定命散辰砂全蝎散之類如口噤  
不開服諸藥不效者生南星去皮臍研為極細末龍  
腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上擦之立開

凡臍風撮口噤風二者雖異其受病之源則一也大  
抵裏氣鬱結壅閉不通宜服煎豆豉汁與喫取下  
胎毒千金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下  
之若不時下則成大疾難為療矣紫霜丸量而與之  
定命散 治初生兒口噤不乳

蟬蛻貳柒枚  
去嘴脚 全蝎貳柒箇  
去毒

服 右為極細末入輕粉少許和研用乳汁乳遠調化

辰砂全蝎散 治初生兒口噤

辰砂水飛  
半錢 全蝎頭尾全去毒  
貳拾枚炙

胎疾 卷一 五

鵬砂

龍腦

麝香

各壹字

右為極細末用乳母唾調塗口唇裏及牙齒上或用豬乳少許調入口內

紫霜丸

方見變蒸

張渙立聖散

治妊娠之時母服熱藥過多或食炙

煖熱物等致令嬰兒初生下口噤不乳口舌上瘡如黍粟大噉唯多啼名曰口噤

乾蜘蛛

壹箇去口足以新竹火上炙取油

乾蝎梢

朱筒為末

臍粉

未壹錢

右件並同研極細每服壹字乳准調時時滴口中

千金治口噤赤者心噤白者肺噤

救水

雞糞白棗大綿裹水一合煮一沸分再服

又雀糞四枚末之著乳頭飲兒大十枚

外臺著噤病在咽如麻豆許令兒吐沫不乳

水銀如黍與服下咽便愈以意量之不過小麻子

許事急用

食療茶菴研汁灌口中死亦生

生下濕莖端三葉花黃子赤似覆盆子

聖惠川椒一兩搜麩裏三角肉樣燒黃熟以綿蓋兒口指去尖如筋頭使椒氣入口効未覺再作

蜈蚣方 治小兒口噤不開不能吮乳

赤脚蜈蚣 牛條去足炙 麝香 少許

右以豬乳和之蓋豬乳能獨主小兒口噤不開

蜘蛛方 治小兒口噤不開不能吮乳

蜘蛛 壹枚去足及口

用豬乳一合和為三服徐徐灌之神妙入麝香治

牙疳極好

牛涎方

取東行牛口沫塗小兒口及額上即效

治噤搐鼻法用鬱金藜蘆瓜蒂為末水調搐之

茅先生云兒生一百廿日內犯風噤病同因母受胎

有疾故受毒氣生來血氣未調又被風邪所擊致之

治法先與奪命散吐風涎見急慢後下醒脾散胃氣

不和門一見夾勻氣散與服見胃氣又下雄朱散見

白夾朱砂膏見急常服即愈如手捉拳噤口不開死

鵝口巢氏云兒初生口裏白屑滿舌上如鵝之口故

名由在胎受穀氣盛心脾熱氣薰發於口 治用髮

纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣摻於

舌上 如用前法其舌上白屑不脫可煮栗荻汁令

濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗荻可煮栗木皮如

治法

初生

五

用井花水法 簡要用牙硝細研於舌上搽之日三五度 祕錄用桑白皮汁和胡粉傳之 雞脰脰黃皮燒末水和服

張渙保命散 治嬰兒初生七日內胎毒者其舌上

有白屑如米連舌下有膜如石榴子大令兒語不

發名曰鵝口病

白礬燒 朱砂水飛各 馬牙硝半兩

右各研極細再同研每服壹字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上頰內未用藥時先以手指纏亂髮揩拭舌上垢然後使藥傳之

茅先生論兒喉中壅一塊肉瘤閉却為喉痺身大熱

舌硬不轉為木舌口開滿口黃如膏名鵝口三候皆

熱甚生風風壅熱毒至此為實熱先用三解牛黃散

見實微與通吐惡涎後用勻氣散見胃氣及用天竺

黃散見重夾牛黃膏見發與服愈如喉響似鋸及眼

視面青黑不效食死候

**撮口**外證舌強唇青聚口撮口面目黃赤氣息喘急

啼聲不出飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可

救療其或肚脹青筋吊腸疝內氣引痛皆腸胃鬱

結不通致之治法貴乎疎利辰砂膏初生一臘乃

治天撮口 刀針

胎毒  
免也  
七日

千金云小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮口口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脈不斂也多不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

龍膽湯方 治嬰孩小兒胎驚月內氣盛發熱臍風

撮口壯熱

龍膽草

黃芩 炒

釣藤

桔梗 去蘆 炒

柴胡 去蘆 炒

赤芍藥 炒

茯苓 去皮

大黃 壹分 紙裹煨

甘草 炙各伍錢

蟬蛻 貳枚 土去翅足炙

右合研為極細末用棗去核煎或加防風去蘆麥門冬去心以導心熱食前調服

張渙云嬰兒胎氣挾熱亦因母有邪熱傳染或生下洗浴當風襁褓失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱難名曰撮口不開病七日之內尤甚急風散主之

急風散方

蛇蛻皮 微炒

朱砂 壹分 細研 水飛

釣藤

好麝香

乾蝎稍 各壹分 搗羅為細末

真牛黃 各半錢 並研極細

右件都拌勻再研為細末每服壹字取竹瀝一兩  
點同乳汁調下

辰砂殭蠶散 治初生撮口

辰砂水飛半錢 殭蠶真的去絲炒壹錢 蛇蛻皮炒壹錢

麝香研半錢

右為極細末少許用蜜調傅唇口

撮風散 治小兒撮口

赤脚蜈蚣半條 鈞藤貳錢 朱砂

直殭蠶焙 全蝎各壹錢 麝香壹字

右為末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱極好

辰砂膏

辰砂叁錢 鵬砂 馬牙硝各壹錢

玄明粉貳錢 全蝎 真珠末各壹錢

麝香壹字

右為末和棗同好單包起自然成膏每服一字或  
一豆許治諸驚用金銀薄荷湯下潮熱甘草湯下  
月內嬰兒用乳汁調傅妳上令吮下

臍風鎖口方

金頭蜈蚣壹箇 蝎梢伍箇 直殭蠶柒箇

瞿麥半錢

右為末每十字吹入鼻中啼則可用薄荷湯調下  
一字然後服千金龍膽湯朱銀丸

疆蠶方

直疆蠶貳枚去嘴略炒為末調傅唇口中

甘草方 治小兒撮口取吐

甘草 壹錢

右煎服令吐出血涎即以豬乳點入口中即差

**臍風** 千金有臍風臍濕臍瘡二者皆因斷臍後為風  
濕傷而成夫風入臍臍腫腹脹四肢不利多啼不能  
乳甚者發搐為臍風腫濕經久不乾為臍濕風濕相

搏令臍生瘡久不差為臍瘡有一不巳入於經脈多  
變為癩癩成作癩治 臍風者謂斷臍之後被水濕  
風冷所乘風濕之氣入於臍而流入心脾遂令肚腹  
脹滿臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳  
甚則發為風搐若臍邊青黑撮口不開是為內搐不  
治爪甲黑者即死其或熱在胸堂伸縮努氣亦令臍  
腫宜千金龍膽湯主之方見前條 錢氏云小兒洗浴拭  
臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛胃氣不和  
宜調氣益黃散主之方見臍部 類萃云宜先用控痰飲  
吐風痰次用益脾散和脾又用辰砂膏利驚即愈或

治臍風

刀針

五

手足攣拳，禁口不開者，不治。曾氏法：先投劫風膏，次以五苓散加寬氣飲入薑汁，葱白燈心煎湯調服。與解風痰及用一字金煎荊芥湯，或薄荷湯調抹口內，證輕即快。如稟賦充實，發熱有痰，驚搐投黑白藥湯，水薑棗煎服，常用此法亦妙。若臍凸音吐緊微，有青色口撮不開，肝風盛而脾土受制，不可施治。凡有此候，百無一治，縱使得安，亦非長壽。控痰散

蝎尾

銅青各半錢

朱砂壹錢

膩粉壹字

麝香少許

右爲末，每服一字，臘茶清調下，先吐風痰，然後和胃，或有段甘草方吐痰，隨輕重用。益脾散

白茯苓

人參

草菓煨

木香濕紙裹煨

甘草

陳皮

厚朴薑製

紫蘇子炒各等分

右爲末，每服一錢，薑棗水煎。

辰砂膏方見前

宣風散

治初生兒因斷臍後外傷風濕唇青口撮



多啼不乳口出白沫

全蝎 貳拾壹箇頭尾全去毒用麝香壹小字

右研為極細末用半字金銀煎湯或麥門冬去心

煎湯調化食遠服

防風散 治初生兒臍風

防風 去蘆

羌活

黃耆

當歸

川白芷

甘草 各半

右為極細末少許用燈心麥門冬去心煎湯調化不拘時候服

劫風膏 治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅

盛咽喉腫痛

歲靈仙 去蘆壹兩半細剉焙研為末

右用皂莢叁兩去皮弦槌揅擲溫水一盃絹濾過慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候冷用前藥末亭分乳鉢內杵勻丸莢實大先用鹽梅肉擦牙根次以此膏一丸或二丸溫白湯濃調抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得瓦器為上銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少與含嚙咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

五苓散

五苓散

五苓散

五苓散

寬氣飲俱驚

一字金 治初生嬰孩一七之外欲成臍風撮口及  
卒中急慢驚風牙關緊閉壅上痰涎

殭蠶炒去絲

葳靈仙去蘆各肆錢

明白礬生用貳錢

細辛去葉壹錢

甘草生用貳錢半

右剉焙為末每服壹字至半錢薑汁沸湯調勻以  
指抹入牙關內治卒中急慢驚證口禁不開用鹽  
梅湯調擦上下牙根二處

黑白飲 治臍風氣實者及急驚壯熱發搐

黑牽牛半生半炒

白牽牛半生半炒

大黃生用

陳皮去白

檳榔各半兩

甘草炙叁錢

玄明粉貳錢

右除檳榔不過火餘五味或曬或焙仍合檳榔為  
末同玄明粉入乳鉢內再杵勻每服半錢至一錢  
溫蜜湯調化空心投服或無時此藥新合最妙久  
則効遲

白芍藥湯方見

張渙封臍散 治嬰兒初生因乳母不謹洗浴水入  
臍中或兒尿在襁褓之內濕氣傷於臍中或解脫  
風冷邪氣所乘令兒臍腫多啼不能乳哺名臍風

病宜急用此

好川當歸

半兩洗焙乾

天漿子

微炒

亂髮

壹錢燒灰存性

右件同搗羅為細末入麝香壹字拌勻用藥壹字至半錢傳臍中時時用

三因小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一効坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證者兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裏指輕輕擦破即開口便安不藥神効小兒初生臍風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝

前起太骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立

効臍風目上插刺絲竹空臍腫灸腰對臍骨節

間三壯炷如麥

臍風撮口在百日內多不治

臍濕嬰兒臍中腫濕經久不差若至百日即危急宜

速療之顛顛經治臍濕方枯礬龍骨為末入麝少

許拭臍乾用避風絳帛灰傳臍中乾蝦蟆牡蠣

各壹枚燒灰細研少許傳臍中白三兩上差

封臍散

甌帶灰

亂髮灰

白薑灰

紅帛灰四灰不得夾別灰

白欵

當歸頭

南星

赤小豆

五倍子

血竭

龍骨

赤石脂煨

海螵蛸

百草霜

臘脂各半錢

右合研為極細末濕乾傳乾則清油塗忌生水浴

又方

紅綿灰

黃牛糞灰

龍骨

髮灰

乾臘脂各半錢

右為極細末濕乾摻乾清油塗臍

又方

治臍內出水汗不乾

當歸頭去蘆壹錢

綿縛臍帶燒灰壹錢或舊錦

右為極細末入麝香一小字同研少許乾摻臍

錢乙藥墨散

釜下墨

亂髮灰各等分

右為細末每用少許傳之

張煥胡粉散

胡粉

乾薑燒灰

白石脂燒存性

右各等分研極細再同研勻用藥一字至半錢傳

臍中時時用

莊氣臍大如栗虛腫而軟疼用竹瀝塗日數上消  
兒臍濕淹破屋爛草為示煩摻効

臍瘡巢氏曰因浴兒水入臍中或尿濕襁袍致臍中

受濕腫爛成瘡或解脫為風邪所襲入於經絡則成

風癩若臍腫不乾久則發搐肘後乾蝦蟆燒灰傅

日三四佳聖惠有枯礬

異功散 治臍中瘡

龍骨煨

薄荷葉

蛇床子各貳錢

輕粉半錢

右為極細末少許乾摻臍

龍骨散 治臍中瘡

龍骨煨

輕粉各半錢

黃連去鬚壹錢半

右為極細末少許乾摻臍

治兒滿月啼叫臍中出血用白石脂炒研極細末乾

摻

治兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾方

白明礬煨

龍骨煨各半錢

右研為極細末乾摻

張煥金黃散 治臍瘡久不差風氣傳於經絡變為

治臍中瘡

治臍中瘡

治臍中瘡

癩疾

川黃連貳錢

胡粉

龍骨燒灰各壹錢

右各另研復合研為細末每用少許傅臍中時時用

**預防**初生兒臍風着噤撮口最為急證十難救一預治之法宜時用軟帛包指拭口中牙齒上有筋兩條使用葦刀輕輕割斷以豬乳點

黃連去鬚半錢

豆豉貳拾肆粒

甘草壹寸

葱白貳寸

右用童子小便煎綿蘸拭口中

抱兒向明看臍上有赤脉直上便赤脉頭上灸三壯者生

**臍突**初生之兒有熱在胸堂則頻頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可怕無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也此由胎中母多驚悸或恣食熱毒之物所致宜對症與藥其熱自散其臍歸本不必以藥傅之恐反為害曾氏曰臍突一證又非臍風此亦因初生洗浴繫臍不緊穢水侵入於內產後旬日外臍忽光浮如吹捻動微響間或驚悸作啼治用白芍藥湯加薏苡仁水煎空

心溫服次以外消散塗貼自然平復

白芍藥湯

見疝

外消散 治嬰孩初生旬日外臍突或痛或不痛痛

則啼聲不已及療小兒因感濕熱搏致陰器膚囊

浮腫

大黃

牡蠣各半兩

朴硝貳錢

右前二味剉焙為末仍入朴硝乳鉢內同杵勻抄一錢或二錢取田螺淨洗再以水半盞活過一宿去螺用水調塗腫處即消其螺仍放水中勿害之昔賢有曰殺生救生去生遠矣物命雖微亦可戒

也治陰器膚囊腫車前子煎湯候冷調傅

二豆散 治嬰孩小兒臍突腫

赤小豆不去皮

豆豉

天南星去皮

白欬各壹錢

右為極細末半錢用芭蕉自然汁調傅臍四傍二日一次二日二次若得小臍下白即安

胎驚小兒壯熱吐喎心神不寧手足抽掣身體強直

眼目反張是胎驚風證 胎驚者以妊婦調攝乖常

飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風

邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內壯

驚翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚  
啼腮縮頰開或頰赤或面青眼合凡胎風眼合不可  
藥其有搭眼噤口之類亦此一種之所發也視其眉  
間氣色赤而鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口指  
紋曲入裏者可治反出外者不治先宜解散風邪利  
驚化痰調氣及貼頰法甚則以朱銀丸利之若面青  
拳搐用保命丹通治急慢驚釣藤散方見慢驚全蝎散方見偏之  
類大抵小兒臟腑脆弱不可輒用銀粉鎮墜之劑如  
遇此候急取豬乳細研牛黃麝香各少許調抹入口  
中仍服導赤散以瀉肝之子即愈矣 石壁經歌末

出胎中一月來母驚成患子臨胎腰直哭時先口撮  
面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急受氣時若陰氣  
消甚陽氣弱胎難驚落手足細肌肉瘦皆不盡天年  
若日月滿因驚落口撮腮臉起鼻塞口噤勿作驚治  
微汗次治驚調氣乳任喚千聲眼不開退却風涎為  
母服調氣藥兒貼頰失治則目瞑先治驚則吐瀉  
治療延去驚邪自不回秋夏必脾風初見勿作脾風  
治恐汗不出生別候鳳髓烏錢百日内發搐真者  
犀丸次生銀丸見急慢驚門不過三兩次必死假者頻發不為重真者内生驚癩  
假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲  
知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之可用  
塗頰法 田月裏生驚急取豬乳細研辰砂牛黃各

胎驚  
胎驚  
胎驚



少許調抹口中神效乳母服防風通聖散三劑其驚  
自消。王小兒未滿月驚搐似中風欲死者用辰砂  
以新汲水濃磨汁塗五心上最效。湯治胎癩驚風  
皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏  
火上炙燥為末別研生硃麝香各少許煎麥門冬湯  
調下。薛一小兒患胎驚諸藥不應用紫河車研爛  
如泥每用錢許乳化服之更以十全大補湯加鈞藤  
鈞漏盧與母服兩月餘舉發漸輕服年餘舉發漸稀  
服年餘不再發至出痘後復發取紫河車研爛入糯  
米粉丸小豆大每服百丸以乳送下服二具全瘥畢

姻又發仍用前丸及十全大補湯六味丸加當歸黃  
耆肉桂五味子年餘喜其能遠惟幕得痊後因勞役  
更作又用前丸及十全大補等藥不應用大劑獨參  
湯服數斤然後舉發稍緩乃用人參貳兩附子壹錢  
數服頓止仍用前藥間用獨參湯而痊。一小兒患  
胎驚用紫河車丸及十全大補湯及鈞藤膏而愈畢  
姻後復發用大劑獨參湯六味丸加五味子黃耆當  
歸煎服半載舉發稍輕年餘不再發後每勞役怒氣  
仍發即用前藥隨愈又傷寒愈後復作虛症悉具莫  
能名狀用紫河車一具獨參煎湯十餘斤而痊後患

胎驚胎癩  
胎驚胎癩  
胎驚胎癩

傷風咳嗽咽乾內熱用六味地黃丸料加五味子煎服及十全大補湯而痊

獨活湯 治胎驚發散風邪

獨活

羌活各壹分

檳榔

天麻

麻黃去節

甘草各半分

右剉散每服半錢煎服於內加南星末蜜調下可

貼額用

驅風散

胡黃連貳錢半

全蝎去毒焙

犀角

天竺黃

麻黃去節各半錢

麝香壹字

右為細末用乳汁調化食遠服

右二方發散之劑實有表證方可用之

青金丸 治嬰孩小兒解散胎熱化痰涎鎮驚邪

人參去蘆

天麻煨

茯神去皮

白附子炮

牛膽南星炒各貳錢

甘草炙壹錢半

青黛壹錢

朱砂水飛半錢

麝香壹字

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用鈞藤皂莢

子煎湯研化不拘時候服

太乙散 治芽兒胎驚病瘥亦宜常服

天漿子去殼微炒

南星

白附子各微炮

治疾胎驚

刀針

卷七

天麻

全蝎

防風

朱砂各壹錢

茯苓

麝香各貳錢少許

右為末每服半錢乳汁化下張煥方天漿蝎梢各貳拾壹箇防風天麻朱砂各半兩麝香壹錢無茯苓白朮

參蝎散

治小兒胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬蛻各等分

麝香少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

豬乳膏

治小兒諸驚胎癩

全蝎

壹箇焙

琥珀

朱砂

少許

右為末每服一字麥門冬煎湯調下

朱銀丸

治小兒胎風壯熱痰盛翻眼口禁取下胎

中蘊受之毒亦治驚積但量與之

水銀

壹錢蒸棗研如泥

白附子

壹錢半

全蝎

南星

朱砂

各壹錢

天漿子

蘆薈

牛黃

各半兩

鉛霜

牛錢和米煨研

腦壹字

麝香

少許

直僵蠶

炒朱

右為末煉蜜丸桐子大薄荷湯化下

張煥聖星丹

諸癩皆宜服之曾經大效

天南星一般大者四十九箇端午取活蝎四十  
九箇瓦器盛鹽泥固濟吊靜室中臘日取出揀  
南星蝎蜇着處有小窠子者其餘不用只將蝎  
蜇南星以酒浸一宿焙研細末次用

牛黃

麝香

龍腦各壹錢  
研細

辰砂

細研水飛  
貳錢半

右件再一處研勻薑汁和桐子大服一粒至二粒  
人參薄荷湯化下

白金散

治諸癩潮發不省者

白殭蠶

半兩湯洗炒微黃  
搗羅為細末次用

天竺黃

貳錢  
伍分

牛黃

壹錢

麝香

龍腦

各半  
錢

細研拌勻每服半錢薑汁調放溫灌之

烏金膏

治胎癩潮發頻併

烏梢蛇

壹條取淨肉  
酒浸一宿焙

蠶紙

壹張  
燒灰

蟬殼

全蝎

朱砂

飛各  
半兩

金箔

貳拾  
片

龍腦

麝香

各半  
錢

右各取細末研勻蜜和如皂子每服壹粒人參薄  
荷湯化下

天南星煎

治胎癩潮發遲省

肝疾 卷一

天南星微炮

白附子

白花蛇酒浸去皮骨炙

黃各壹兩

乾蝎炒

天麻各半兩

已上搗羅為細末用好酒兩大盞慢火熬不住

手攪以酒盡為度次用

朱砂細研水飛半兩

膩粉貳錢五分

牛黃

麝香

龍腦各半錢

細研入膏內和如皂子每服一粒竹瀝化下無時

祛風散 治胎瘤多啼叫

胡黃連半兩

全蝎

犀角

天竺黃

麻黃去節各貳錢五分

右各取細末和勻每服半錢入麝一字乳汁調下

鐵粉散 驚風面赤口乾大便不利尤宜服

鐵粉半兩

鬱金

牛黃

真珠

胡黃連各貳錢五分

各研細拌勻每服一字温蜜湯調下

羗活膏 治胎瘤昏困不省

羗活

獨活各壹兩

天麻

全蝎

人參去蘆

白殭蠶微炒各半兩

烏蛇肉壹兩酒浸一宿焙

右搗羅為細末煉蜜和膏每服皂子大麝香荆芥

治天

方

生

胎癩  
湯化下

麝香膏

治胎癩不得安臥

麝香

研

牛黃

研

白附子

蠶蛾

微炒

白殭蠶

微炒各一錢五分

全蝎

壹拾

右取淨末更研細蜜和膏如皂子每服一粒人參  
荊芥湯化下

胎癩

曾胎癩者因未產前腹中被驚或母食酸鹹過多或為七情所汨致傷胎氣兒生百日内有者是也發時心不寧面微黃氣逆痰作目上視身反張啼聲

不出先用參蘇飲和解次以不驚丹或琥珀抱龍丸

問投輕則可愈重者難全

參蘇飲

發熱

不驚丹

驚

琥珀抱龍丸

驚

胎風

小兒初生其身有如湯燄火傷者此皆乳母過食膏粱所致也其母宜服清胃散牙方見雜病及逍遙散以清其氣血兒亦飲數滴可也身無皮膚而不燄赤者皆由產母脾氣不足也用粳米粉傅之燄赤發熱者皆由產母胃中火盛也用石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如腦額

胎風

胎風

胎風

生瘡者火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治如脚土有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而斃如未滿月而撮口握拳腰軟如隨者此肝腎中邪勝正弱所致也三日內必不治如男指向裏女指向外尚可治眉紅亦不可治可治者用全蝎散方見口噤釣藤散方見驚等類治之若因大病虧損胃氣而諸臟虛弱所致者用補中益氣湯方見虛羸錢氏地黄丸方見腎藏若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軟者內稟氣不足肌肉未堅也當參五軟而施治之 聖惠所云胎風原與胎驚

混濫故此不取

**胎驚**兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物降生之後旬日之間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目胞浮腫神困呵欠呢呢作聲遍體壯熱小便赤色大便不通時復驚煩此因胎中受熱或悞服溫劑致令熱蓄於內薰蒸胎氣故有此證若經久不治則鵝口重舌木舌赤紫丹瘤自此而生宜先以木通散煎與母服使入於乳令兒飲之通心氣解煩熱然後以四聖散溫洗兩目目開進地黃膏天竺黃散及牛蒡湯當歸散亦令母服凡有胎疾不可求速效當先令乳母服

藥使藥過乳漸次解之百無一失若即以涼藥攻之必生他病乳母仍忌辛辣酒麪庶易得安不致反覆

生地黄湯湯氏

治小兒在胎時因母有熱或恣飲酒

麪熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體先熱哭聲不止口熱如湯乃胎熱之候也

生地黄

赤芍藥

川芎

當歸

桔荳根

右件等分咬咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服以此少抹入兒口中

水通散

主小兒上膈熱小府閉諸瘡丹毒母子同

服

木通

地蓄篇各半兩

大黃

甘草

赤茯苓各叁錢

瞿麥

滑石

山梔子

車前子

黃芩各貳錢半

右水一鍾燈心三莖或入薄荷同煎

釀乳法

豬苓去黑皮

澤瀉

赤茯苓去皮

天花粉

茵陳

生甘草

生地黄

山梔去殼

治

切

七



胎疾  
右劉散用水煎食後令乳母捏去宿乳却服此藥

甘草 壹錢 黑豆 貳錢 淡竹葉 柒莖

右咬咀用水一鍾入燈心七莖煎不拘時候服

四聖散 主芽兒胎受熱毒生下兩目不開

燈心 黃連 秦皮

木賊 棗子 各半

右水一鍾煎澄清去渣無時起洗兩目自開後服

地黃膏

地黃膏 治胎熱

山梔仁

菉豆粉 各壹兩半

粉草 陸錢

右為末用生地黃爛杵壹兩半和好蜜壹兩半以薄瓦器盛在銅銚中煮成膏如稀糊相似候冷停分入前藥末同在乳鉢內再研勻茶實大每以半丸麥門冬湯化服

天竺黃散 見口

牛蒡湯 見咽

當歸散 見潮

清胃散 見雜病 薛氏治胎熱用此

胎寒 嬰兒初生百日内覺口冷腹痛身起寒粟時發

戰慄曲足握拳晝夜啼哭不已或口禁不開名曰胎

寒其證在胎時母因腹痛而致產經云胎寒多腹痛  
 亦有產婦喜啖甘肥生冷時果或胎前外感風寒暑  
 濕治以涼藥內傷胎氣則生後昏昏多睡間或嘔乳  
 瀉白若不早治必成慢驚慢脾凡有此候宜以冲和  
 飲當歸散合和水煨薑煎服使之微泄泄行進勻氣  
 散調補泄止氣勻神安痛定手足舒伸次用參苓白  
 朮散以養胃氣白芍藥湯去其寒濕乳母宜節生冷  
 飲食庶易瘥也○又有手足稍冷唇面微青額上汗  
 出不顧乳食至夜多啼頗似前證但無口冷寒戰名  
 曰藏寒其疾夜重日輕腹痛腸鳴泄瀉清水間有不

泄者此證亦在百日內有之皆因臨產在地稍久冷  
 氣侵逼或以凉水參湯洗兒或斷臍帶短而又結縛  
 不緊為寒氣所傷如此宜以白芍藥湯及冲和飲加  
 鹽炒茴香茱萸水薑煎服并乳母同服 湯小兒胎  
 中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四  
 肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒乘虛  
 入藏作腹疼盤腸內疝治法詳寒腹痛條

冲和飲方見

白芍藥湯見

參苓白朮散見

當歸散方見潮熱

勻氣散見

異功散 方見

薛氏治胎寒用此

胎肥胎怯錢氏曰胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻 貳錢

蝎尾 去毒

硃砂 各伍分

烏蛇肉 酒浸焙乾為末

白礬 各叁錢

麝香 壹字

青黛 叁錢

右研勻每用參錢水叁碗桃枝壹握并葉伍柴枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

大連翹飲 治胎熱臍風小便不通及諸般瘡毒

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬殼

甘草 炒各壹錢

山梔子

黃芩 各半錢

右為末每服二錢加紫草水煎熱甚加大黃更詳證加減

薛氏曰胎肥乃受母胃熱所致兒用浴體法以疎通其腠理乳母服大連翹飲

胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精采亦宜以浴體法主之 初虞世曰母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顛眼白多

**胎黃**小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因乳母受濕熱而傳於胎也凡有此證母子皆宜服地黃湯及地黃飲子有生下百日及半週不

因病後身微黃者胃熱也若自生而身黃者胎疸也經云諸疸皆熱色深黃者是也犀角散主之若淡黃兼白者胃怯也白朮散主之

生地黃湯 治小兒生下胎黃

生地黃

赤芍藥

川芎

當歸

枳實根 各等分

右以咀每服半兩水煎乳母服時時少抹入兒口中

地黃湯

生地黃

赤芍藥

天花粉

赤茯苓 去皮

川芎

當歸 去蘆

豬苓

澤瀉

甘草

茵陳 各等分

右剉散用水煎食前服

地黃飲子 治小兒生下滿身面目皆黃狀如金色

或面赤身熱眼閉不開大便不通小便如梔子汁

滿身生瘡

生地黃

赤芍藥 各貳錢

羌活 去蘆

當歸 去蘆

甘草 壹錢

右為極細末用燈心煎湯食前服乳母宜服仍忌

酒麪五辛之物

犀角散 治小兒胎黃一身盡黃

犀角

茵陳

栝萋根

升麻 煨

甘草

龍膽草

生地黃

寒水石 煨等分

右咬咀用水煎不拘時候服

胎赤 田氏云月裏生赤脫膚如赤丹塗者先用半黃

散托裏續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑

牛黃散或即牛黃奪命散方見喘門清涼飲方見腹痛

洗目令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼背中使臉赤

爛至長大不差者名曰胎赤宜用二金散曾純陽  
之子始生旬月忽兩目俱紅弦爛澀癢成翳此因在  
胎為母感受風熱傳於心肝而得先以百解散加當  
歸散水薑燈心煎服次導赤散及牛蒡湯加黃連木  
賊蟬殼水煎服自効有因難產胎氣頗澀轉側差  
緩其血壓於兒首遂至濺血滲下盛則灌注其眼不  
見瞳人輕則外胞腫赤上下弦爛若投涼藥必寒臟  
腑宜與生地黃湯主之

百解散方見驚搖  
導赤散方見心藏

當歸散方見  
牛蒡湯方見喉痺

二金散方

黃連去鬚

黃蘗各壹錢

右搗為麤末以乳汁浸一宿焙乾每用少許以新

綿裹用荆芥湯浸放溫熱時時洗之

真金散

治小兒初生洗眼不淨則穢汁浸漬於眼

皆中使臉赤爛至長不瘥母食熱物熱藥名曰胎

赤赤  
黃連去鬚

黃栢

當歸

赤芍藥各壹錢

杏仁去皮尖

石剉散乳汁浸一宿曬乾為極細末用生地黃汁

調一字頻頻點眼新綿裹荆芥湯浸温時時洗浴  
母服洗心散

洗心散

甘草生

當歸

麻黃

芍藥

白朮

荆芥穗

大黃煨各半錢

右為極細末用生薑薄荷煎湯調化食遠服

生地黄湯見服不開

幼科證治準繩集之一

