



門中
第 82
卷 44



癩

Faint vertical text columns within a blue border, likely bleed-through from the reverse side of the page.





癇

驚癇卽急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也 仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脈不斂氣骨不聚爲風邪所觸爲乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面自牽引口噤涎流腹肚脹膨手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者爲癇若一身強硬終日不醒則爲瘖證矣



陰陽二癇陽癇初作時病先身熱痰驚啼叫噉而後發脈浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治 若病先身冷不驚痰不啼呼而作脈沉者為陰癇乃慢驚也此病內在五藏外在骨髓劇者難治 曾陽癇者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便為癇即此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫齧牙手足掣搦面色紅紫六脈浮數以百解散加五和湯水煎疎解次下痰用水晶丹或半夏丸 陰癇者因慢

驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脈息沉微故嬰孩寶書云睡中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加日生湯同煎調寬氣飲和解

風驚食三癇千金云小兒之癇有三風癇驚癇食癇也風癇緣衣煖汗出風因入也初時先屈指如數物乃作驚癇起於驚怖太啼乃作食癇其先不哺乳吐而變熱後發然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二凡是先寒後發熱者皆食癇也驚癇皆按圖灸之風癇當以豬心湯食癇當下乃愈紫霜丸佳 按

此論三癩蓋有三因之分風癩屬外因驚癩屬內因
食癩屬不內外因也又按全嬰方云風癩因將養失
度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪而入之其
病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐宜驅風膏太
青膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下
其痰涎驚癩因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精
神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽
然叫聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲
利驚丸下之不生別病也食癩其病在脾胃納食驗
其證嘔吐酸氣卽發搐此病或大便酸臭紫丸子下

之已上三證大同小異並屬陽也各目睛斜手足
潮搐或作豬聲發過卽差皆十生一死也

五藏癩三因云古方有五癩五藏癩六畜癩等名證
不同難於備載別錄有五癩之證一曰馬癩作馬嘶
鳴以馬屬在干干少陰君火主之故其病應於心二
曰羊癩作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應平
脾三曰雞癩作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之
應平胃四曰豬癩作豬叫聲以豬屬亥壬厥陰心包
主之應平右腎五曰牛癩作牛吼聲以牛屬丑壬太
陰濕土主之應平肺此五癩應平五畜應平五藏者

也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搖擗背脊強直食頃乃甦各隨所感施以治法錢氏治五癇皆隨臟治之每臟各一獸犬癇反折上竄犬叫肝也羊癇目瞪吐舌羊叫心也牛癇目直視腹滿牛叫脾也雞癇驚跳反折手縱雞叫肺也豬癇如尸吐沫豬叫腎也五癇重者死病後甚者亦死輕者五色丸主之薛百赤目瞪吐舌齧舌心煩氣短其聲如羊者曰心癇面青唇青兩眼上竄手足攣肘反折其聲如犬者曰肝癇面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如猪者曰腎癇面如枯骨目白反視驚跳反折

搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癇面色痿黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癇五癇通用五色丸爲主仍參以各經之藥心癇屬血虛者用養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱用妙香散肝癇者虛證用地黃丸抽搐有力爲實亦用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸腎癇者用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之肺癇者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸脾癇者用五味異功散結面青瀉利飲食少

思用六君子加木香柴胡按千金叙六畜癩無五
藏之分屬錢氏始分之而無馬癩一證曾氏謂初發
作羊犬聲者咽喉爲風痰所梗聲自如此其理甚明
言六畜者特強名耳故丹溪謂於經既無所據而治
法亦未見有五者之分所以不必分五也

治法仁齋曰大槩血滯心竅邪氣在心積驚成癩通
行心經調平血脉順氣豁痰乃其要也假令小兒有
熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癩之
漸卽以紫霜丸導之方見發癩時間量與紫霜丸減其
盛氣則無驚風癩釣之患癩證方萌耳後高骨間必

有青紋紛紛如線見之則爲爪破須令出血啼叫尤
得氣通諸癩發不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷
其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通
所致耳南星炮爲末雄豬膽汁調和少許啖之輒効
若夫錢氏五癩丸并南星散以菖蒲煎湯調下甘遂
豬心湯和蘇合香丸一丸皆治癩之要藥也 **劉小**
兒神尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食
失節脾胃有傷積爲痰飲以致痰迷心竅而作者治
法當尋火尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以
治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在

上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用之也。潔如有客痰發熱而有聲煎大黃荆芥湯下五色丸。潮熱有時積熱也桃枝丸主之。積熱壯熱不退當用地骨皮散。潮熱下五色丸。風熱當用防風黃芩湯下太青膏。身温不熱當用白虎湯加蒼朮下五色丸。薛此皆元氣不足之證須以紫河車即小兒胞衣丸為主而以補藥佐之。設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多至不救。一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐似驚癇過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益

氣湯而愈。一小兒十歲一小兒七歲各有癇證歲發二次後因出痘及飲食停滯舉發頻數用六君子補中益氣二湯而愈。一小兒患前證每發吐痰困倦半餉而甦諸藥不應年至十三而頻發用紫河車生研爛入人參當歸末丸桐子大每服三五丸日進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈。一小兒七歲發驚癇每作先君令其恣飲人乳後發漸疎而輕至十四歲復發仍用人乳不應余令用肥厚紫河車研爛入乳調如泥日服二三次至數具而愈後常用加減八味丸而安至二十三歲發而手足

厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊
通治五癩錢氏五色丸

硃砂兩半

水銀壹分

雄黃熬壹兩

鉛參兩同

真珠末兩研壹

三因六珍丹

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

雄黃

雌黃

未鑽珍珠各壹兩

鉛貳兩熬成屑

水銀壹兩半

右研令極勻蜜丸桐子大每服三丸至五丸薑棗湯下須搗二三萬杵乃可丸

風癩口議云先用化痰寬利胸膈開通關節安鎮心神然後與治風癩藥服之又云先用化痰風丹去其風

熱次服奪魂散定癩

散風丹治小兒風癩先用此藥

牛膽南星貳錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荆芥穗

細辛各壹錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷

紫蘇湯不拘時送下

保安丸治小兒諸風癩久後亦驗

五靈脂 半兩

川烏 生用去皮 尖一錢半

右為末豬心血為丸如梧桐子大每服一丸用生薑湯化下不拘時服

獨活湯 治小兒風癩解表通裏

獨活

麻黃 去節

川芎 各壹錢

大黃

甘草 炒各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時溫服

細辛大黃湯 治小兒風癩肉熱

天麻

防風 各半兩

細辛

大黃 焙

川芎 各壹錢半

甘草 炙壹錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四分不拘時服

牛黃丸 治小兒風癩迷悶抽掣涎潮

牛膽南星

全蝎 焙去毒

蟬殼 各貳錢半

防風

牛黃

白附子 生

直僵蠶 炒去絲嘴

天麻 各壹錢半

麝香 半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不拘時服

化風丹 涼風化痰退熱定搐

牛膽南星 貳錢 羌活

天麻 防風

荆芥穗 人參

右件為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯

化開服 一方有全蝎壹枚 一方有細辛無甘州

驚瀇口議先涼三焦利驚去熱安神定志平調藏府
溫化痰涎然後與治驚瀇藥服之

比金丹

人參

白茯苓

遠志 去心

獨活

甘草

川芎 各壹錢

山藥

辰砂

天麻

石菖蒲

川芎

甘草 炙各壹分

天南星 炮貳錢生薑洗製

麝香 壹字

右為細末煉蜜為丸皂子大每服一粒煎金銀薄

荷湯化下 一方有琥珀錢壹無山藥

錢氏蛇黃丸 治驚瀇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃 真者二三箇火煨醋淬 鬱金 朱分一處為末 麝香 另入壹匙

右為末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水

化下

鎮驚丸 治小兒一切驚瀇

茯神 去木

紫石英 燒醋研

滑石

龍齒

鐵粉

人參

蛇黃 煨醋

熊膽 各半

遠志 去心薑

琥珀

南星 炮各貳錢半

輕粉 分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三五丸煎金銀湯磨化不拘時服

虎睛丸 治小兒驚癇邪氣入心

虎睛 細研

大黃 濕紙裹煨

蜚蠊 足翅去

遠志 薑製焙

石菖蒲

犀角 鎊

麥門冬 去心各貳錢半

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五七丸竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸 治小兒驚癇心熱

遠志 去心薑製焙

琥珀 各貳錢

麝香 少許

雄黃

硃砂 壹錢

鐵粉

金銀箔 肆片

右為細末煮棗取肉為丸如梧桐子大每服三五丸煎去心麥門冬湯化下不拘時服

清神散 治小兒驚癇

犀角

白蘚皮

石菖蒲

遠志去心姜製

半夏湯包各一錢半

茯神半兩

大黃焙

人參

甘草炙各壹錢半

右為末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

食癩妙聖丹 治小兒食癩通利

雄黃

蝎稍

硃砂

代赭石煨醋淬

輕粉

麝香各貳錢半

巴豆參筒去皮出油

杏仁去皮尖微炒貳錢

右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯磨化不拘時服

天麻丸 治小兒食癩有痰

商星炮貳錢

白附子炮

天麻

牙硝

川靈脂

全蝎焙各壹錢

輕粉半錢

巴豆霜去油貳錢半

右為末稀麩糊為丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

清鎮蛇黃散 治小兒諸癩

蛇黃壹箇煨醋淬七次研細

鬱金

雄黃各貳錢

青礞石

硃砂各壹錢

鐵粉篩淨細研參分

右為末搗粳米飯為丸如梧桐子大每服三五丸

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散 治小兒諸瀉發歇無時

乾地龍 半兩 焙 虎睛 壹對 炙

金銀箔 叁拾 片 天竺黃

代赭石 煨醋 淬 鐵粉 各貳 錢半

輕粉 半錢

人參 貳錢 半

硃砂

雄黃 壹錢 半

右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓 叁兩

人參

地骨皮

甘草

麥門冬

桑白皮 各貳 兩

馬牙硝 貳錢

龍腦

麝香 各叁 錢

牛黃 半兩

硃砂 貳錢

烏犀 壹兩

金箔 叁拾 伍片

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣如風痲冬月溫水化下夏月凉水化下不以時二三歲者日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新汲水下

奪菟散 定癩

白殭蠶 去絲炒令 黃色半兩

蛇含石 燒紅用 米醋淬

七八次 碾碎

白附子 炮各 二分

生銀

生金

牛黃如元以膽製

烏梢蛇頭柴物寸許酒炙

白茯苓

天麻各貳錢

天南星末壹分生薑汁浸一宿焙

半夏末貳錢薑汁浸一宿焙

赤脚蜈蚣壹條酒浸

焦炙

犀角錢貳

腦子少許

麝香少許

右件為末蒸棗肉為丸如麻子大每服十丸至十五丸二十九煎金銀薄荷湯下硃砂為衣本草古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮心

雌黃丸

治小兒癲癩欲發眼暗瘰癧聲惡嚼舌

雌黃

黃丹各壹兩

麝香研壹錢

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵三五百下丸如棗豆大每服三丸溫熱水下一日三服此方得自名醫之家極有神効拔萃妙香丸 安神通關辟惡氣

辰砂研兩

龍腦

膩粉

麝香研各柒錢半

牛苗半兩

金箔研拾片

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者柒錢半同煉

勻為丸每兩作二十九丸米飯化下

鎮心丸

硃砂

龍齒

牛黃各占壹錢

鐵粉

琥珀

人參

茯神

防風

全蝎米箇炙

右為末煇心湯調下三歲丁字

蜜陀僧散治心癩不語及諸驚失音用蜜陀僧為末

每服一匙米醋湯調下大人服一錢熱酒下

代赭石散

治陰陽癩

代赭石

煨醋淬研為末水飛過曬乾

右為末每服半錢以金銀煎湯和金箔銀箔調連

進一服脚脛上有赤斑乃邪氣發出可治無赤斑

則難治

神應丹

辰砂不以多研少

右以豬心血和之得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就

丸如桐子大每服一丸後食臨卧煎人參湯下

清心牛黃清心丸

治小兒躁悶項背強直腰背反

張時發時醒

牛黃壹兩二錢研

麝香研

龍腦另研

痛... 外科... 卷四

羶羊角 未銹各一兩 當歸 去芦 防風 去蘆

黃芩 麥門冬 去心 柴胡 去苗 白芍藥 杏仁 去皮尖雙

白朮 各壹兩半 桔梗 阿膠 剉碎蛤粉炒 白茯苓 去皮

研另 芎藭 各壹兩 貳錢半 神麴 炒各貳兩半 肉桂 去皮

大豆卷 兩半 碎炒各壹兩 白斂 乾薑 各半 蒲黃 炒

人參 去蘆 雄黃 捌錢另 白斂 犀角 未貳兩 甘草 炒伍錢

金箔 壹千貳百片 內肆百片 為衣餘入藥內另研 犀角 未貳兩 乾薑 各半

乾山藥 拾兩 大棗 壹百枚 蒸熟去皮 核爛研成膏入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九用

金箔為衣每服一丸温白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉煎湯温温化服

比金丸 虎睛丸 二方俱見前

清神湯 治驚癇 犀角 銹 遠志 薑製焙 白蘇皮

石菖蒲 人參 甘草 炒各壹錢半

右為末每服五七分麥門冬煎湯調下

酸棗仁丸 見驚

...

...

...

...

...

...

養心定志丸 見敬馬

養心湯 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐

發熱煩躁

黃耆

白茯苓

茯神

半夏麴

當歸

川芎

辣桂

栢子仁

酸棗仁

五味子

人參 各叁錢

甘草 肆錢

右每服一二錢薑棗水煎

妙香散 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少寐

盜汗等證

辰砂 叁錢

麝香 壹錢

木香 伍分

茯苓

山藥

茯神

遠志

黃耆 炒各壹兩

桔梗

甘草

人參 各伍錢

右各另爲末每服一錢溫酒或白湯調服

治痰 半夏丸 方見驚搖

星蘇散 治諸風口噤不語

天南星 略炮

右每服五七分薑四片紫蘇五葉水煎入雄豬膽

少許溫服

治癩方 治太陽陽明二經為病

荆芥穗肆兩

白礬為細末

右棗肉為丸如桐子大每服二十九荆芥湯下次
三十九四十九又次五十九俱食前

礬丹

號丹

晉礬各壹兩

右丹塼鑿一窠可容一兩許先安丹在下次安礬
在上以炭五斤煨令炭盡取出細研以不經水豬
心血為丸如菉豆大每服十九至二十九橘皮湯
下

元戎二白丸

白礬壹塊約壹兩

右用生蒸餅劑裏蒸熟去皮可丸入輕粉壹字或
半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十九生薑
湯下小兒丸小

硃砂滾涎散

治小兒五癩

硃砂

白礬生用

赤石脂

硝石各等分

右為細末硃蒜膏為丸如菉豆大每服三十九食
後荆芥湯下

琥珀壽星丸

天南星 壹箇掘坑用火煨燒坑內紅出炭淨人好
通氣過一宿 琥珀 肆兩
取出焙末

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十丸煎
人參湯送下

南星五生丸

南星

半夏

川烏

白附子

大豆 壹兩 去皮各

右為細末滴米為丸每服二九至五九不過七九
薑湯下

斷癩丸

治小兒諸癩痰盛

皂角 盈尺者去皮搥碎水參升

浸收汁濾過磁器內熬成膏

白礬 壹兩半 煨枯研細

雄黃 另研

蝟稍 炒

直僵蠶 炒

麝香 壹錢 另研

烏蛇 酒浸取肉焙

赤蜈蚣 壹條酒浸

白附子 各半 兩

南星 壹兩 濕紙裏炮

赤蜈蚣 壹條酒浸

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸如梧
桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癩丸

治小兒五癩

赤脚蜈蚣 一條去頭

足酒浸炙

蝟稍 土去毛

烏蛇肉 酒炙 白附子 生

天南星 末 熊膽

圓白半夏 末用薑汁和

白礬 新瓦上煨枯各壹錢貳分半

右為末稀麩糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服

二三丸用薄荷煎湯磨化不拘時服

治小兒驚癇

膽星 貳兩 全蝎 去毒炒半兩

川芎 各壹兩 薄荷 半兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸薑湯下

世痰碧穹丹

石綠 研九度 飛拾兩

附子尖

烏頭尖

蝎稍 各伍拾箇

右為末入石綠令勻麩糊丸如雞頭每服用薄荷

汁半盞化下二丸更以酒半合溫服之須臾吐出

痰涎然後隨證治之

下痰控涎丸

川烏 生 半夏 各半兩

全蝎 去尖 鐵粉 叁錢

僵蠶 生薑洗 貳兩 甘遂 貳錢

右為末生薑自然汁或薄荷丸如菉豆大朱砂為衣每服十五丸姜湯下忌甘草

治小兒痢用甘遂末一錢豬心一箇取三管頭血參條和甘遂末將豬心批作兩片入藥在內以線縛定外濕紙包裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末壹錢和勻分作四丸每服一丸豬心湯化下再服另取豬心煎湯此方神効

利水 水晶丹 方見癖積

五和湯 二方並見熱

紫霜丸 方見變蒸熱

當歸大黃湯 治小兒諸痢作熱利下心中惡血

大黃 濕紙裹微煨

甘草 炙

當歸

利驚丸 方見驚搐

四順飲

赤芍藥 各叁錢

半夏 製

川芎 各貳錢

為末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

天 百解散

大青膏 並見驚搐

驅風膏 湯青加辰砂全蝎

固真湯

溫 日生湯 並見驚搐

扶神湯 方見驚悸

元戎小靈寶丹

附子 炮壹兩

天麻

全蝎

白殭蠶 炒

藿香葉

南星 炮

白附子 炮各半兩

右爲末酒糊丸桐子大温酒下二十五丸
 羅謙甫治魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆僧
 念呪因而大恐遂發驚搖痰涎壅塞目多白睛項背
 強急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多
 服硃犀龍麝鎮墜之藥四十餘日前證猶在又添行
 步動作神思如癡予診其脉沉弦而急黃帝鍼經云
 心脉滿大癩瘕筋攣又云肝脉小急癩瘕筋攣蓋小
 兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於
 肝肝主筋故癩瘕筋攣病久氣弱小兒易爲虛實多
 服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如癡內經云

暴攣癩眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太
 陽之脉所發陽蹻附而行也又云癩瘕瘖瘖不知所
 苦兩蹻主之男陽女陰潔古云晝發治陽蹻申脉夜
 發治陰蹻照海先各灸兩蹻各二七壯次處沉香天
 麻湯

沉香 益智 川烏炮去皮臍 各貳錢
 天麻 防風 半夏湯泡
 附子炮去皮臍 各叁錢 羌活伍錢 甘草炙
 當歸 薑屑各壹錢半 獨活肆錢
 右咬咀每服五錢生姜三片水煎温服舉痛論云

恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之
以菟活獨活苦温味之薄者陰中之陽引氣上行
又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛温
以散之當歸甘草辛甘温以補氣血之不足又
養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛温
行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以
生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛温
體重氣清去怯安神故以為使氣味相合升陽補
胃恐怯之氣自得平矣

牛黃丸 治因驚中風五癩天釣客忤潮涎灌壅

白花蛇

酒浸取肉

白附子

全蠍

真川烏

壹枚半兩者生

天麻

薄荷葉

各半兩已上六

味先為細末次入

雄黃

伍兩

辰砂

叁錢

腦子

另研半兩

牛黃

叁錢

麝香

壹錢

右為一處和勻麻黃去根貳兩酒壹升煎麻黃至
一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤象手疾丸
如茱實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯
磨化大能發散驚邪

治五癩得効方

露蜂房

石綠

各壹兩

桂心

遠志去心

人參各半

硃砂壹錢

右為末粥丸如桐子大每服二三十九丸白湯下

補劑 斷癇丹 治癇瘥後復作連綿不除服之有驗

黃耆蜜水

釣藤鈎

細辛

甘草炙各半兩

蛇蛻皮酒炙

蟬蛻去土

牛黃壹錢

右為末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸

量兒加減

紫河車丸

紫河車即小兒胞衣肥厚者壹箇洗淨重湯蒸爛

研化入人參當歸末和勻為丸如芡實大每服五

六丸乳汁化下

八味地黃丸即六味地黃丸加附子肉桂各壹兩治稟賦命門火衰不

能生土以致脾土虛寒或飲食少思或食而不化

臍腹疼痛夜多漩溺等證經云益火之源以消陰

翳蓋謂此也或乳母命門火衰兒飲其乳致前證

者子母並宜服之

加減八味丸治稟賦腎陰不足或吐瀉久病津液虧

損口乾作渴或口舌生瘡兩足發熱或痰氣上湧

或手足厥冷等證即地黃丸加肉桂

地黃丸治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患癩癧結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎疳腦熱肢體消瘦手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齲潰爛爪黑面黧遍身或兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等證其功不能盡述即六味地黃丸方見腎臟

八珍湯治氣血俱虛陰火內熱或因尅伐之劑脾胃虧損肌肉消瘦等證即四君四物二湯方見虛勞

十全大補湯治氣血虛弱或稟賦不足寒熱自汗食減體瘦發熱作渴頭痛眩暈最宜用之方見虛勞

灸法小兒癩癧驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻柱直上入髮際五分小兒諸癩如噦吐清沫灸巨闕穴三壯在鳩尾下一寸陷中是穴小兒雞癩善驚及掣目搖頭灸少陰二壯取法在掌後去腕半寸陷中是穴小兒驚癩者先驚叫乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大小兒驚癩灸鬼祿一穴三壯取法在上唇內中央絃上是穴小兒食癩者先寒熱灑淅乃發也灸鳩尾穴上五分三壯小兒牛癩目視直腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯取法胸蔽骨下五分陷中是穴小兒馬癩張口

前灸法

列科二

百七

搖頭身折及馬鳴也灸僕參穴各三壯取法在足跟
骨下白肉際陷中拱取之是穴 小兒羊癇目瞪吐
舌羊鳴也灸第九椎下節間三五壯 按靈樞經云
暴攣足不任身取天柱天柱穴足太陽也又云癲癇
瘈瘲不知所苦兩躄之下男陽女陰潔古云晝發灸
陽躄夜發灸陰躄各二壯陽躄起於眼中循內踝上
行至咽喉交貫衝脈照海穴也

不治證 錢五癇重者死病後甚者亦死 小兒癇病
目直無聲目覩不轉眼生白障眼慢唇黑瞳人瞬動
目間青黑面青指黑口出涎沫如白膿口禁肚脹不

乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿
軟不醒腹內虛鳴唇逆而痛吐利不止汗出壯熱不
正卧久不寢身體反張太人脊下容一手小兒脊下
容一指並不治

中風

張煥等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則為害不淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也况小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽掣氣麤涎涌甚至昏憤口噤即似中風誤以續命等湯投之多至不救大人且無真中况小兒乎凡有前證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者

為外因足厥陰肝火熾盛筋脉偏急者為內因脾肺
虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗
損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜
者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

中風

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎
治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸 丹溪云瘳比癩為
虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不
用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘳候十
無一生蓋未嘗有此法施於人也 醒錢仲陽曰角
弓反張者由風邪客於太陽經也經曰風從上受足
太陽主周身之氣其脉起於目内眥而行於背肝屬
木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易

角弓反張

角弓反張

角弓反張

傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搖者
風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒
而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其證益甚
者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補
之若因肝經虛熱或因尅伐真氣虛熱生風者宜用
異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊腹肚膨脹
者此中氣損也宜用白朮散補之若氣血素弱或服
攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急
用地黃丸以補之仍與肝藏參覽 一小兒忽腰背
反張目上視面青赤面青屬肝主風赤屬心主火此

風火相搏用柴胡梔子散倍加鈎藤鈎頭安而痰如
舊又用抱龍丸而愈 一小兒忽腰背反張服治驚
之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異
功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨
用前藥卽愈遂日以參朮末每服五七分炮薑大棗
煎湯調下服至一二兩而不發已上二證元氣虛而病
氣實也若用攻邪之藥皆誤矣 一小兒素患前證
痰盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘
脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用
六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非

逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲
余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用
人參伍錢炮薑叁分水煎服而醒至第四劑後加棗
貳枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執
常方鮮有不誤者

人參羌活散 方見驚搐

小續命湯 方見病中風

瀉青丸 方見肝藏

異功散 方見吐瀉

柴胡梔子散 方見積熱

抱龍丸 方見驚搐

六君子湯 方見吐瀉

灸角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯 大椎下節

間灸三壯

診湯氏曰身軟時醒者為癰身強直反張如弓不時
醒者為瘕瘕候十無一生

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

搖頭

湯肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土為木所尅脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂瀆於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白濃遂得以安

清肝益胃丸

犀角屑

甘草各壹分

瓜蒌根

黃耆蜜炙

羌活

白芍藥各半兩

蛇退皮炙赤

釣藤鈎

麻黃去節各壹錢

防風伍兩

右為末，棗肉丸。食後薄荷湯下，只二服，作効頭搖，即止。便血隨愈。次間服胃風湯數日，頓除沈舍人子服之，亦驗。

薛經曰：諸風掉眩皆屬肝木。木得風則搖動，乃肝經火盛而生虛風也。便血者，風木搖動，則土受凌虛而

不能統血也。或食酸味過多，以益其脾，致令陰結。經曰：結陰者，便血一升，再結二升，三結三升，又邪在五臟，則陰脉不和，陰脉不和，則血留之。結陰之病，陰氣內結，不得外行，滲入腸間，故便血也。血亦有乳母患怒風熱熾盛，或肝木傷脾，使清氣不升，或風邪侵入大腸者。治法若因風熱，用柴胡清肝散；若因怒火，用加味小柴胡湯；若清氣不升，脾氣下陷者，用補中益氣湯；若風邪侵於大腸者，用清肝益胃丸；肝經血熱妄行者，用六味地黃丸；脾土不能培肝木者，用六君柴胡鈎藤鈎，肝木勝脾土者，用四君芍藥鈎藤鈎結。

陰者用平胃地榆湯一方小兒傷風咳嗽痰湧余謂脾虛肺弱腠理不密風邪外乘用六君子湯加桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹脹仍用六君子加山查厚朴而安又停食作瀉服消導之藥更加咳嗽余謂當調補脾土不信自用發表尅滯前證益甚更加搖頭余以天麻散倍加釣藤鈎及異功散而愈內一小兒項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此肝木尅脾土也用六君子湯及九味蘆薈丸頓愈 一小兒病後遇驚即痰甚咬牙抽搐搖頭作瀉恪服腦麝朱砂等藥以致慢驚而卒

海食療云蛇蛻皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱痔蠱毒安胎熬用 治癇弄舌搖頭者宜用全蛻

余猶憶少時聞友人孫彭山云嘗見姻家一小兒患驚搐延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫至於常服藥中加入紫河車即時愈按紫河車草名神農本經名蚤休唐本名金線重樓錢氏方名白甘遂主治驚癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂遵白字療病多効不虛也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

偏風口噤

薛小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋
 急由風木太甚而乘於脾以勝水濕則筋太燥然燥
 金主於收斂勁切故也又曰風之為病善行而數變
 或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經
 氣虛風邪所乘其筋脉偏急者屬外因若足厥陰肝
 經風熱乘脾筋脉偏急者屬內因若脾肺虛弱膝理
 不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後
 內亡津液不能養肝致口眼歪斜或半身不遂諸證

偏風

口噤

百三

皆屬肝血不足肝火生風宜滋腎水艱肝血壯脾土
治洪脾胃虛而動風者異功散加柴胡鈞藤鈎脾肺
虛而外邪所乘者用鈞藤飲肝火血燥者用六味地
黃丸津液不足者用白朮散若兼目緊上視寒熱往
來小便淋漓面色青潔兩脇脹痛之類皆肝經之本
病也或唇口歪斜腹痛少食目胞浮腫面色青黃肢
體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五藏相勝而
主之設執其見證槩投風藥反成壞證者有矣
小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也
朝用柴胡清肝散夕用異功散加鈞藤鈎而愈其時

有意前證服祛風導痰之藥者皆不能起
痢後意前證發搐面色痿黃肢體倦怠此元氣虛尅
伐多矣余用補中益氣湯加鈞藤鈎子服而漸愈後
因乳母七情飲食失宜或兒乳食過多前證仍作服
補中益氣湯五味異功散而愈
錢全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正
手足偏廢不舉

- 全蝎去毒炒
- 黃芩去心炒
- 赤芍藥
- 麻黃去節
- 天麻陸錢
- 僵蠶直者炒
- 甘草
- 川芎
- 桂枝

風口禁
切
百

天南星

湯泡米泔次去皮
臍切焙乾伍錢

右為麤末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分溫
服無時量大小與之一日三四服忌羊肉

胃風湯

治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注
下及腸胃濕毒下如豆汁或瘀血日夜無度

人參

白茯苓

芎藭

肉桂

當歸

白芍藥

白朮

各等分

右為散每服二錢入粟米數粒同煎食前服

口喎失音

論見前中風條

硃砂丸

治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂

伍錢

全蝎

炒

天麻

白附子

炮

僵蠶

炒去絲嘴

乾薑

牛黃

各伍分

麝香

壹分

右為末粳米糊丸如黍米大每服三十九用薄荷

湯不拘時化服

全蝎散

治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎

炒

川芎

黃芩

口暗
僵蠶炒去絲

赤芍藥

甘草

硃砂

南星湯泡去皮

天麻各錢

右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲 治小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳殼去穰

人參去蘆

天麻

僵蠶炒去絲

羌活

甘草各錢

右剉碎每服一錢用冰一盞生薑三片煎五分不

拘時服

木通湯 治小兒血滯於心心竅不通語言不出

木通

石菖蒲多用

防風

枳殼

全蝎焙

僵蠶炒

甘草

木香

南星炮各等分

右剉碎每服一錢用冰一盞豬心三片生薑一片

紫蘇五葉煎至五分不拘時服

天釣

內釣附

天釣亦驚風之證但天釣發時頭自仰視驚風則無也

湯氏法

湯小兒瘰癧不定翻眼擡睛狀若神祟頭自仰視名為天釣凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半男先灸左女先灸右及兩足大母指中間各三五壯又灸前後手心各五壯此皆得效之法九龍控涎散 治天釣

赤脚蜈蚣

酒塗灸一條

滴乳

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 甘草, 木香, 蘇合香丸, and 九龍控涎散]

天竺黃二味另研各壹錢

雄黃另研

甘草炙各

臘茶

荆芥穗炒

白礬枯各壹錢

菘豆半生半炒壹百粒

右為末每服半錢人參薄荷湯調下

釣藤飲 治天釣潮熱

釣藤

人參

犀角屑各半兩

全蝎

天麻各貳分

甘草半分

右為末每服一錢水煎服

張氏法

張小兒心膈壅滯邪熱痰涎蘊積不得宣通或乳母飲酒食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱

毒氣乘於心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢

痲痺其病名曰天釣甚者爪甲皆青狀如神農公集

經効名方治之於後

一字散 醒風爽精神

天南星半兩微炮裂 蟬殼微炒

乾蝎

白殭蠶各壹分

右件搗羅為細末次入蕎麥麩壹分用醋石榴殼

壹枚將諸藥入在石榴殼內以鹽泥封裹於竈下

慢火上燒之泥乾燥為度取出再研勻每服壹字

溫酒調下

雙金散

治天釣驚風目久不下

蜈蚣壹箇去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砧
兩半箇左邊者入一貼子內寫脊縫中亭利作
亦入一貼子內寫右字不得交錯即大誤矣
麝香壹錢細研先將左邊者同於乳鉢內研作
右邊字者入麝香同研極細却入右字貼內收
不得相犯每有病者眼睛釣上止見白睛兼角
弓反張更不
能出聲者

右用細蒂筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻
裏右亦如之用藥不可多若眼未全下更添些小
以意量度其眼隨手便下即止

牛黃散 清心截風

牛黃牛兩

硃砂細研

麝香

天竺黃並細研

蝎稍

釣藤俱為木

右件一處研勻每服壹字新汲水調下

白銀丹 治驚風涎潮

天南星壹兩半生用

白殭蠶牛兩

全蝎

白附子各壹分

牛黃研

麝香研

粉霜各半分已上搗羅為細末

水銀半兩煮青州棗肉貳拾

右都和上件藥石臼內搗一二百下如黍米大每
服五粒至七粒薄荷湯下

抵聖丹 治驚風胸膈不利乳食不下

錫恡脂

壹兩細研水飛去黑水令盡

牛黃

研

鉛霜

細研

熊膽

各壹分研

蟾酥

壹錢

麝香

半分研

右件通研勻粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒新汲水下

薛氏法

薛天鈞者發時頭自仰視驚悸壯熱兩目反張淚出不流手足搐掣不時悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青蓋因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰鬱滯或外挾風邪為患法當解利其邪用釣藤飲上氣喘

麤者用烏蝎四君子湯內釣者腹痛多喘唇黑囊腫偃僕及張眼尾赤此胎中受風及外驚所致若內藏抽掣作痛狂叫或泄瀉縮脚內證一作外證亦然極難調理內證服聚寶丹外證服釣藤飲進乳食者可治若腹痛唇黑囊腫之類用聚寶丹若外驚內藏抽搐之類用釣藤飲若因乳母醇酒厚味積毒在胃用加味清胃散若因乳母鬱怒積熱在肝用加味道遙散加味歸脾湯俱加漏蘆子母俱服凡母食膏粱厚味飼兒之時先擠去宿乳然後吮之 一小兒因乳母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭而曲腰用四物加

天約

切斗二

百四

柴胡防風又用加味逍遙散加熟地黃以清肝熱生
肝血再用地黃丸滋腎水以生肝木母子俱安 一
小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘內釣腹痛也
用五味異功散加木香乾薑一劑與母服之頓愈後
因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母服其
子亦安 一 小兒曲腰乾啼手足並冷用六君加乾
薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而愈 一 小
兒忽乾啼作瀉睡中搐手足冷此脾土虛寒肝木侮
之而作發搐乃內釣也用益黃散一劑而安用四君
加柴胡升麻乳食漸進而安 一 小兒乾啼面青或

赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝
火氣滯用加味逍遙散及越鞠丸以治其母時灌子
數滴不旬日子母並愈 一 小兒患前證服魏香散
而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘麤此元氣虛
寒也余先用烏蝎四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補
中益氣湯及五味異功散而痊 一 小兒因母每感
寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實
熱之天釣也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐
瀉面色或青或白手足並冷屬脾氣虛寒用六君木
香乾薑而愈三歲後傷寒腹痛唇黑作瀉數去後而

無糞或糞少而青此氣虛寒下陷用補中益氣湯漸愈
一 小兒啼哭陰囊腫大眼自上翻赤脉流淚此
肝熱內釣用柴胡清肝散加釣藤鈎治之諸證漸愈
又用釣藤飲而痊後復發或用祛病根之藥致乳食
日少肚中脹痛手足浮腫余先用六君升麻柴胡數
劑諸證稍愈又傷乳食吐瀉用平胃散一服即愈
一 小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈用加
味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母大怒發厥而
甦兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先用小柴胡湯二
劑母子並服少愈其母又嘔酸腹脹用越鞠丸加味

歸脾湯佐以加味逍遙散而痊

釣藤膏

魏香散 三方並見腹痛

釣藤飲 治小兒臟寒夜啼陰極發躁此方主之

釣藤

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘草

芍藥 各壹錢

右為末每服一錢薑棗水煎若心經熱臉紅舌白
小便赤澀用釣藤飲去木香加硃砂末壹錢木通
湯下

釣藤飲 治天釣風搐

釣藤

犀角

天麻

全蝎 伍箇

木香

甘草 各伍分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

釣藤飲子

治驚風天釣卒然驚悸眼目翻騰

釣藤 炒伍分

麻黃 去節

甘草 各叁分

天麻

川芎

防風

人參 各柒分

全蝎 炒去毒母 伍箇

殭蠶 炒柒分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

乳香丸

治驚風內釣腹痛驚啼

乳香 半錢

沒藥

沉香 各壹錢

蝎稍 拾肆箇

雞心檳榔 壹錢

右為末蜜丸桐子大每服一二三錢菖蒲釣藤鈎煎

湯下

木香丸 治全前

木香

全蝎 各伍分

沒藥

藿香

釣藤鈎 各壹錢

右各別為末以大蒜研爛和丸桐子大曬乾每服

二九釣藤煎湯下

牛黃丸 治小兒一切驚風五癩天釣客忤痰涎四

肢抽掣

白花蛇酒浸取肉 白附子

川烏壹隻重半兩生用去皮臍

薄荷葉各半兩已上先為細末次入

辰砂叁錢 牛黃壹錢

片腦各半錢另研

右件為細末一處和勻麻黃去節貳兩酒壹升煎

麻黃至一盞去麻黃用酒入蜜少許熬成膏剗前

藥末為丸如芡實大用金箔為衣每服一丸用薄

荷湯七下大能發散風邪

塗頂膏 治天釣風備急

烏頭主用去皮臍 芸薹子各貳錢

右為末每用壹錢新汲水調敷兒頂上

天漿子散 治小兒天釣驚風

天漿子炙 蝎稍 犀角屑

丹砂另研 雄黃另研 附子去皮臍

南星炮去皮 白附子 半夏

水銀另研 乳香另研 白殭蠶

膩粉另研 牛黃另研各壹錢 麝香壹字另研

銀箔伍片另研

右為細末和勻每服一字用薄荷湯調下量兒大

小加減服

青黛丸 治小兒天釣客忤五疳八痢十二種驚癇

青黛

天竺黃

乾蝦蟆壹箇黃泥包裹

燒赤去泥

乾蝸牛殼

黃連

人參

地龍去土

釣藤炒

龍膽草各貳錢半

蘆薈

熊膽各半兩

牛黃

麝香

雄黃

丹砂各壹錢

夜明沙去土淨

胡黃連各叁錢

右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三九空心

米飲湯送下

再生散

治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥

冷

烏蛇酒浸取肉

天麻

南星炮去皮

全蝎炒去毒各貳錢半

麝香

膩粉各伍分

丹砂貳錢

牛黃另研

白附子炮各壹錢

右為細末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯調下量

兒太小加減服

三白散 治小兒盤腸氣釣先服此藥後服釣藤膏

白牽牛壹兩炒

白朮

桑白皮

陳皮

木通各錢

天鈞
右為細末每服半錢用生薑湯調不拘時服
廣利方治癩迷嚼舌仰視牛黃大豆許和蜜水調

拘攣

續命湯 治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草 炙

防風

杏仁

官桂

防已

附子

炮裂去皮

右剉碎每服一錢水一鍾生薑三片煎至五分不

拘時服

追風散

治小兒感冒發熱手足拘攣

人參

茯苓

防風

川芎

柴胡

羌活

枳殼

桔梗

甘草

右剉碎每服一錢水一鍾生薑二片煎至五分不

拘時服

手拳不展

張漢云小兒所受肝氣怯弱致筋脉攣縮兩手伸展無力薏苡丹主之

薏苡丹 治手拳不展

薏苡仁湯浸去皮研細當歸洗焙

秦艽去苗

防風

酸棗仁炒

羌活各等分

右為細末煉蜜和如芡實大每服壹粒至貳粒麝香荆芥湯化下不拘時候

聖惠方兒在胞母藏府虛為風冷所乘兒生肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散

就此加減以其平和故列於首

薏苡仁朱錢伍分

秦艽

防風

酸棗仁微炒

甘草微炙各半兩

當歸焙

桂心各貳錢半

為散每壹錢水壹小盞煎五分不計時候量兒加

減

羶羊角散 治兒手不展是風邪滯氣所客不榮榮衛不通

羶羊角

羌活

五加皮

白蘚皮

桂心各貳錢半

麻黃牛兩去根節

甘草炙微赤壹錢貳分半

為散每服壹錢水壹小鍾煎伍分量見加減不計時溫服

脚拳不展

張渙云緣稟受腎氣不足者氣血未榮脚指拳縮無

力不能伸展海桐皮散主之

海桐皮散 治脚拳不展

海桐皮

當歸湯洗焙乾

牡丹皮

熟地黄

牛膝酒浸焙乾各壹兩

山茱萸

補骨脂各半兩

右為細末每服壹錢水捌分入葱白貳寸煎至伍分去滓溫服食前

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸焙

麻黃去根節各半兩

羌活

酸棗仁微炒

人參

杜仲微炙

桂心各貳錢半

右為細末每服壹錢水壹小盞薑少許煎伍分量
兒大小乳前分減服

乾地黄丸

生地黄

郁李仁湯浸去皮尖

牛膝

防風

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁各貳錢半

右為末蜜丸如棗豆乳前溫酒下七丸量兒加減

驚癰鶴膝

肝者東方青龍木也其動則應於風病則主驚駭
諸熱引肝風有風則生痰有痰亦作搐小兒驚風之
際手足動掣當聽其自定然後療之免生異證或父
母見其病勢可畏從而按伏之豈知筋者肝之合也
臨病發時若按束其手足則筋不舒伸遂至經絡為
風所閉終為廢人內經曰頑弱名緩風疼重名濕痺
又有四肢痿痺不仁致手足稍脹痛不堪忍者此風
毒之氣使然故傳曰風淫末疾是也凡小兒心悸不

汗亦不可
輕發
麻黃
湯先
宜慎
用

常及遍身腫痛或手足不隨此為驚癱候也若治之稍遲至臂腕膝脛骨節之間流結頑核或膝大而腫肉消骨露如鶴膝之狀或為癰為癩此名鶴膝候也已上形證并宜發汗為先使腠理開通則風熱可除有濕亦去用百解散和咬咀五苓散倍加麻黃水薑葱煎服微得汗為度或以麻黃湯發散尤佳次防已湯祛風散及獨活湯加桑寄生投服并防風湯或黑虎丹作小丸子間服使風不生而痰不作則其疾易愈若為癰為癩疼重者用黑牽牛半生半炒略研碎煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒濕則腫毒可

消如大腑閉而不通此是風熱內蘊其右腮紅紫及右手三部脈浮而實滑宜五和湯或當歸散枳殼丸治之其加減之法尤在臨機審處若泥一方非良醫也前證更宜間服排風湯
啞鶴膝風者其腿漸細其膝愈羸狀如鶴膝是以名之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難若一二月間焮腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用太陽風湯為主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯為主佐以太陽風湯切勿用十宣流氣等藥若不

文房雜考

初年二

有

遺不斂或發熱等證者須調補脾胃為善否則必變敗證矣

大防風湯 治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子炮 牛膝酒炒各壹錢 白朮

羌活 人參 防風各壹錢

杜仲去皮薑製 川芎 肉桂去皮

黃耆炒 熟地黃自製 芍藥炒各壹錢伍分

甘草壹錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯

獨活 桑寄生 杜仲炒

細辛 牛膝酒炒去土 秦艽

茯苓 白芍藥炒 桂心

川芎 防風 甘草

人參 熟地黃 當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

益氣養榮湯療癰 百解散驚 麻黃湯傷寒

五苓散驚

防已湯 治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癰瘕

防已去黑皮

麻黃去節存根幼全表裏剉碎湯泡瀝過焙乾用

薄桂去麋皮各半兩

赤芍藥

蒼朮米泔水浸一宿去麋皮瀝乾

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分

分空心熱服或入薤白同煎

祛風散 治卒暴中風不能言全口眼喎斜驚癱瘓

掣痰實煩躁神昏有熱睡卧不穩

防風去蘆

南星生用

甘草生用

半夏製

黃芩各壹兩

右碎每服二錢水一盞半薑二片慢火煎七分不

狗時溫服

獨活湯 治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足

疼痛晝輕夜重及四肢痿痺不仁

川獨活黃色如鬼眼者佳半兩

當歸酒洗

白朮

黃耆蜜水

薄桂去麋皮

川牛膝酒洗各貳錢半

甘草炙叁錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薤白一根煎

七分空心熱服或無時

防風湯驚

黑虎丹 治諸般風證

草烏去黑皮二兩生用

甘草各半錢半

麻黃根節不去

熟乾地黄淨洗

藿香葉

油煙墨燒存性

豬牙皂莢

當歸

何首烏

殭蠶去絲

赤小豆

白膠香

木鼈子去油各半兩

右件剉碎或焙或曬研為細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服三十九至五十九或七十九稍空心用淡薑湯下兒小者丸作粟穀大治法如前

五和湯

當歸散

枳殼丸大便秘

排風湯 治中風狂言失音不語精神昏困驚癩鶴

膝等證及腫疾纔愈後偶感外風滿面遍體虛浮並宜可服

白蘚皮

白朮

白芍藥

薄桂去蘆皮

防風去蘆

川芎

當歸酒洗

杏仁湯泡去皮尖

甘草炙各半兩

川獨活

麻黃去根節

白茯苓去皮各半錢半

右每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

眼目

薛經曰目者五藏六府之精榮衛魂魄之所常營也
神氣之所常主也又曰諸脉者皆屬於目目得血而
能視五藏六府精氣皆上注於目而為之精故白睛
屬肺黑睛屬肝瞳人屬腎上下胞屬脾兩眦屬心而
內眥又屬膀胱五藏五色各有所司心主赤赤甚心
實熱也用導赤散赤微者心虛熱也用生犀散肝主
青青甚者肝熱也用瀉青丸淡青者肝虛也用地黃
丸脾主黃黃甚者脾熱也用瀉黃散淡黃者脾虛也

此處為書寫或印刷的模糊區域，文字難以辨認。

用異功散目無睛光及白睛多黑睛少者肝腎俱不足也用地黃丸加鹿茸晝視通明夜視罔見者因稟陽氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰故不能視也用冲和養胃湯凡赤脉翳物從上而下者屬足太陽經用東垣選奇湯從下而上者屬足陽明經用局方流氣飲蓋翳膜者風熱內蘊也邪氣未定謂之熱翳而浮於外邪氣已定謂之冰翳而沈於內邪氣既深謂之陷翳宜升發之退翳之藥佐之若上眼皮下出黑白翳者屬太陽寒水從外至內者屬少陽風熱從下至上綠色者屬足陽明及肺腎合病也疳眼者因肝火濕

熱上衝脾氣有虧不能上升清氣故生白翳睫閉不開眵淚如糊久而膿流遂至損目用益氣聰明湯茯苓瀉濕湯及四味肥兒丸目閉不開者因乳食失節或過服寒涼之藥使陽氣下陷不能升舉故目不開用柴胡復生湯若胃氣虧損眼睫無力而不能開者用補中益氣湯暴赤腫痛者肝火熾盛也用龍膽瀉肝湯多淚羞明者肝心積熱也用生犀散亦有肝腎虛熱者用地黃丸風沿爛眼者膈有積熱也用清胃散時時作痒者濃潰生蟲也用點藥紫蘇膏眼睫連劄者肝經風熱也用柴胡清肝散若生下目黃壯熱

大小便秘結乳食不思面赤眼閉者皆由在胎時感
母熱毒所致兒服瀉黃散母服地黃丸若乳母膏粱
積熱致兒目黃者令母服清胃散若肢體面目爪甲
皆黃小便如屋塵色者難治又有痘疹後餘毒未盡
上侵於目者屬腎肝虛也用滋陰腎氣丸前證多宜
審治其母無調其兒

初生眼不開

胎赤

並見初
生門

目赤腫痛曾熱極挾風則目赤腫痛晝夜不開驚啼
不已先用九仙散水薑葱煎服次一解散溫米泔水

調下反點以黃連膏 若夫天行時證暴赤腫痛晝
夜苦甚久則昏矇治法先以九仙散解表次以小柴
胡湯去半夏加大黃薄荷竹葉生地黃水煎服併投
草龍膽散及點以黃連膏貼以清涼膏 有孩兒胃
氣素虛脾氣實盛眼胞赤腫毒澁不開遽按苦寒之
劑以退赤腫反傷脾胃不吐則瀉或四肢微冷復以
溫藥調治則目疾轉加宜先用吹咀五苓散水薑燈
心煎服次投瀉黃散自愈 有心脾蘊熱經久及肝
受邪熱致兩目羞明眼胞浮腫微有紫色大腑閉或
流利小便澁或通順先以自解散發表次投明目飲

自然平復仍忌酒葷三五日 有小兒薄劣多致塵埃塵入目揩摩成腫發熱作痛啼哭不已宜用辟塵膏治之立效

湯導赤散 治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥

羌活

防風各半兩

大黃

甘草各壹錢

右為末燈心黑豆同煎食後服

余平生無赤眼之患用之如神大人小兒可通用凡眼赤澁之初只用自已小便張目灑出用一指接抹眼中便閉目少頃即效此以真氣逼去邪熱也

本治小兒赤熱腫眼

大黃

白礬各等分

右為末同冷水調作罨子貼眼立效

小防風湯 治小兒熱毒眼患

大黃蒸

山梔子

甘草炙

赤芍藥

川當歸洗

防風

羌活各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

小流氣飲 治小兒風毒眼患

蟬蛻去足

羌活

天麻

川當歸

防風

大黃

薄荷

赤芍藥

杏仁 各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

小菊花膏 治小兒積毒眼患

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

蒼朮 米泔浸

荆芥穗

防風

右各等分爲末煉蜜和膏如小指頂大每服一餅細嚼白湯嚥下不拘時服

通頂散 治眼疾風熱腫脹作楚

瓜蒂

梨蘆 各壹錢

皂角肉 半錢

麝香 少許

右爲細末研勻每少許吹入鼻中

九仙散 解諸目疾不拘歲月遠近並宜先服

柴胡 去蘆

蒼朮 米泔浸刮去麋皮

赤芍藥

荆芥

甘草 各陸錢半

麻黃 剉去節湯泡濾焙乾

薄荷 連梗各半兩

旋復花 去老梗

右碎每服二錢水一錢薑二片葱二根煎七分不

眼目

外

重

狗時溫服

三解散心湯

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁

氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣

入參去蘆

防風去蘆

天麻

茯神去皮木

鬱金無以山

白附子

大黃各貳錢

赤芍藥

黃芩

僵蠶各伍錢

全蝎拾伍尾

枳殼水浸去瓢

粉草陸錢

右焙為末每服半錢至一錢用溫荷湯無時調下或燈心湯

草龍膽散

治暴赤火眼晝夜澁痛作腫淚多

草龍膽

木賊去節

荆芥

菊花

防風去蘆

草決明半生

甘草柒味各

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服痛甚加

羌活乳香同煎

明目飲

治心脾蘊熱肝受風邪致兩目羞明經久

不瘳

山梔仁

淨香附各壹兩

夏枯草去梗

右剉每服二錢水一盞蜜一匙煎七分無時溫服

金波散

治時行赤眼腫痛成翳有熱多淚

淨黃連壹兩

鵬砂

寒水石

大黃各貳錢

海螵蛸

銅青各壹錢

玄明粉貳錢

全蝎去尖毒壹枚

麝香壹字

右除玄明粉麝香餘七味剉晒為末仍入玄明粉麝香乳鉢內同前藥末杵勻每用一字至半錢溫淨湯或凉水調化澄清去滓無時頻洗有風夾蟲作痒入輕粉取効仍忌酒葷三五日

黃連膏

治時行火眼赤腫澁痛晝夜煩啼

淨黃連貳錢半

右件細剉雞子一枚筋蒲札開一頭大處取清瓦盞盛入黃連和勻釀一時見黃色以絹濾過成膏患者仰面卧外令人挑一字許頻點目內覺口中苦味滿舌上藥之驗也豆瘡餘毒攻眼眵多有熟用之驗

清涼膏

治暴赤火眼腫痛及血癆作疼發熱

大黃

淨黃連

黃礬

赤葛

細辛和葉

薄荷葉

風化朴硝

柴味各壹兩

右前六味或晒或焙為末臨入朴硝乳鉢內同杵

勻每用一錢至二錢冷水加薑汁調塗太陽或新
汲井水調妙熱癰以涼米湯水調搽患處
辟塵膏 治小兒塵埃入目搯成腫熱作痛啼哭不
已

已

右以油煙細墨新汲井水濃磨入玄明粉半錢和
勻為膏用筆多點目內三五次即効仍忌飲酒一
晝宵

速効飲 治長成小兒因他物或跌着觸損兩目血
脹腫痛

荆芥穗

薄荷葉 微炒

草决明 微炒各壹兩

甘草 參錢生用

右為麤末和半生半炒芝麻等分抄二錢掌中盛
乾嚼之味盡吐去粗如此法投三五次即効

薛一小兒目赤作痛咬牙寒熱余謂肝經風熱用柴
胡飲子一劑而赤痛止又用四物參芪白朮柴胡而
寒熱退又用補中益氣湯而飲食加 一小兒眼素
白或青患眼赤作痛服降火之劑眼如血貫脉洪大
或浮緩按之皆微細用十全大補湯加柴胡山梔數
劑外證漸退而脉漸斂又數劑而愈 一小兒患眼
赤痛服大黃之藥更加寒熱如瘡余謂脾胃復傷用

四君升麻柴胡炮薑釣藤鉤而寒熱愈又用補中益氣湯間服而目疾痊一小兒目痛恪服瀉火治肝之藥反加羞明隱澁睡中驚悸悲啼此肝經血虛火動傷肺也用五味異功散加山梔補脾肺清肺金用地黃丸滋腎水生肝血而安仍兼服四味肥兒丸而瘥

龍膽瀉肝湯

方見瀉

生犀飲

方見心

生熟地黃散

治眼初患之時因候築到感肝受驚

風致目腫赤痛痒

生地黃

洗

熟地黃

各壹兩

麥門冬

去心伍錢

當歸

枳殼

米泔浸去瓢殼炒

甘草

炙

防風

杏仁

湯泡去皮尖麩炒赤

赤芍藥

各貳錢半

右每服一錢黑豆七粒水煎服

犀角飲

治脾火眼疼

犀角

壹兩鎊

射干

草龍膽

炒

黃芩

炒各伍錢

人參

貳兩

茯苓

貳錢伍分

釣藤

釣柴錢半

甘草

參錢

右每服一錢水煎

東垣廣大重明湯

治兩瞼或兩眦赤爛熱腫疼痛

及眼胞痒極抓之至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多

眵淚隱澁難開

草龍膽 防風 生甘草根

細辛 苗葉 各壹錢

右用水一椀半煎龍膽至七分入餘藥再煎至半碗熱洗日五七次洗畢合眼須臾瘡

東垣助陽和血補氣湯 治發後熱壅白睛紅多眵

淚癢澁此過服涼藥而真氣不能通九竅也

防風 柴分 黃芪 壹錢 蔓荊子

白芷 各貳分 升麻 柴分 炙甘草

柴胡 當歸身 酒洗各伍分

水壹鍾煎至半鍾稍熱服

潔古方 治眼赤暴發腫

防風 羌活 黃芩 炒

黃連 炒各等分

右剉每服一錢水煎如大便秘加大黃貳分痛甚加

川當歸地黃各貳分煩躁不得卧加梔子仁叁分

保命點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸 黃連 各貳錢 防風 貳錢

細辛 伍分 甘草 壹錢

右水一大碗文武火熬滴水不散為度入熟蜜少許點用

柴胡復生湯 治紅赤羞明淚多眵少腦頂沉重睛
珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉久視則酸疼翳
下陷者

藁本

蔓荊子

川芎

羌活

獨活

白芷 各貳分半

白芍藥 炒

炙甘草

薄荷

桔梗 各肆分

蒼朮

茯苓

黃芩 炒各伍分

柴胡 陸分

五味子 拾貳粒杵

右每服二錢水煎食後服

黃連羊肝丸 治目中赤脉洪甚眵多

黃連 為末不

白羊肝 壹員

先以竹刀將羊肝刮下如糊除去筋膜再搗細入
黃連末丸桐子大每服十九茶清送下

外障 小兒病目生翳不可輕用點藥只以服藥內消
為主看赤脉上下内外分經處治已見雜病第七卷
及前薛氏總論茲不贅錄 薛一女子年十四因恚
怒先月經不行寒熱脇痛後兩目生翳青綠色從外
至內余謂寒熱脇痛足厥陰之證也翳從外眥起足
少陽之證也左關脉弦數按之而瀉肝經風熱兼血
滯也遂以加味逍遙散加防風龍膽草四服而寒熱

勝痛頓減用六味九月餘而翳消 一小兒十五歲
兩目白翳腹膈遍身似疥非疥瞞熱口乾形體骨立
此肝疳之證也用六味肥兒丸而痊後陰莖作痒小
便澄白瘡疥益熾狀如大風用大蘆薈四味肥兒丸
諸證漸愈又用大蘆薈湯而痊 一小兒九歲素有
肝火兩目生翳服蘆薈肥兒等丸隨愈至十四歲後
遇用心過度飲食不節即夜視不明用補中益氣湯
人參補胃湯四味肥兒丸而愈 一小兒眼每生翳
皆因乳母恚怒而作用九味蘆薈丸柴胡梔子散毋
子並服而愈 一小兒乳哺失節服藥過劑腹脹少

食大便不調兩眼生花服治眼之藥漸生浮翳余用
異功散加當歸柴胡飲食漸進便利漸調少佐以九
味蘆薈丸其眼漸明乃用人參補胃湯肥兒丸而痊
一小兒十一歲傷寒咳嗽發熱服發散之藥目漸
不明服降火等藥飲食日少目漸生翳余謂中氣虛
用人參補胃湯飲食漸進又用千金補肝丸及薰眼
之法而痊 一女子十一歲目生白翳面黃浮腫口
乾便泄用四味肥兒丸而痊
本事方 治大陽寒水陷翳膜遮睛

防風

白蒺藜 各壹兩

羌活 壹兩

眼目

初昇二

百六

甘菊花 參兩

右為末每服一錢入鹽少許百沸湯點服

保命羚羊角散 治水翳久不去

羚羊角 屑 升麻

甘草 減半 細辛 各等分

右為末一半煉蜜丸桐子大每服五七十九丸一半
泔水煎吞送丸子熾發陷翳亦羚羊角散之類用
之在入消息若陰虛有熱者無服神仙退雲丸
東垣補陽湯 治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅
不通令青白翳見於大眥乃足太陽少陰經中鬱

遏厥陰肝經之陽氣不得上通於目故青翳內阻
也當於太陽少陰經中是九竅之下以益肝中陽
氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陽標中瀉
足厥陰之火下伏於陽中內經曰陰盛陽虛則當
先補其陽後瀉其陰每日空心服升陽湯臨卧服
瀉陰丸須預期調養體氣和平天氣晴明服之補
其陽使上升通於肝經之末利空竅於目矣

羌活 獨活 當歸身 酒洗

甘州稍 熟地黃 人參

黃芪 白朮 各壹兩 澤瀉

橘紅 各半兩

生地黄 炒

白茯苓

知母 炒黃色 各叁錢

柴胡 貳兩

防風

白芍藥 各伍錢

肉桂 壹錢

右每服五錢水煎空心服候藥力行盡方可飲食

東垣羌活退翳湯

柴胡

甘草

黃芪 各叁錢

羌活

黃連

五味子

升麻

當歸身 各貳錢

防風 壹錢

黃芩

黃藥 酒浸

芍藥

草龍膽 酒洗各伍錢

石膏 貳錢

右分二服水煎入酒少許臨卧熱服忌言語

謙甫五秀重明丸

治眼翳膜遮睛隱澁昏花常服

清利頭目

甘菊花 伍伯朵

荆芥 伍伯穗

木賊 去節伍百

楮實 伍百枚

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九白湯送下

鎮肝散 去痰熱退翳

胡黃連

梔子仁 各壹兩

甘草 微炙

馬牙硝

青柏子 各半兩

以上搗羅為細末次用

真珠末 研

牛黃 研各貳錢半

右件都拌勻細研每服壹錢水八分入荆芥薄荷各少許煎四分去滓溫服食後

井泉石散 治眼疳邪熱攻於眼目漸生障翳致損睛瞳

井泉石 壹兩

石决明

甘菊花

夜明沙 微炒

黃連 去鬚

晚蠶沙 微炒各半兩

右件搗羅為細末每服壹錢用米泔壹盞入生豬肝少許煎五分肝爛為度放溫時時服乳食後羅氏養肝散 治小兒疳眼翳膜羞明不見服十日必退如大人雀目者一服效

夜明沙

青蛤粉

穀精草 各壹兩

右件為細末每服壹錢五七歲已上貳錢他豬肝一大片批開糝藥在內攤勻麻線纏定以米泔半碗煮肝熟取出肝湯傾碗內熏眼分肝作三服嚼訖却用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時日一服龍膽飲子 治疳眼流膿生疳翳濕熱為病神效不

青蛤粉

蛇蛻皮

穀精草 各半兩

羌活

草龍膽 各叁錢

麻黃 貳錢半

黃芩炒

升麻各貳錢

鬱金

甘草炙各半錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

灸雀目疳眼法 小兒雀目夜不見物灸手大指甲

後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯炷如小麥大

小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手太

指次指兩骨間陷中

內障東垣人參補胃湯 治勞役飲食不節內障眼

痛神効

黃芪根

人參各壹兩

炙甘草捌錢

蔓荊子

白芍藥炒

黃蘗酒拌炒肆次各叁錢

右每服一匙錢水煎稍熱服臨卧三五服

冲和養胃湯 治內障初起視覺微昏空中有黑花

神水變淡綠色次則視岐觀則成一神水變淡白

色久則不觀神水變純白色

柴胡柒錢

人參

當歸

炙甘草

乾生薑

升麻

葛根

白朮

羌活各壹兩

防風伍錢

黃芪壹兩伍錢

白茯苓叁錢

白芍藥陸錢

五味子貳錢

右每服二錢水煎服

滋陰腎氣丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸

觀空中有黑花視物一體久則光不收及內障神

水淡白色者

熟地黄 參兩

當歸尾

牡丹皮

五味子

乾山藥

柴胡 各伍錢

茯苓

澤瀉 各貳錢半

生地黄 酒炒肆兩

右為末煉蜜丸如桐子大辰砂為衣每服十九空

心滾湯化下

瀉熱黃連湯

治內障有眵淚眊燥

黃芩

黃連

大黃 並酒洗

柴胡 各壹兩

升麻 伍錢

龍膽草 叁錢

右每服一錢水煎午前服

千金補肝散

治目失明

青羊肝

壹具去膜薄切以火燒新瓦上炙乾

決明子 壹錢半

藜香

壹合熬令香多

右為末每服方寸匕日三服久而有驗

局方菊睛丸

治脾腎不足眼花昏暗

枸杞子

肉蓯蓉 酒浸炒

巴戟 去心各壹兩

甘菊花

肆兩

右為末煉蜜九梧子大每服十九空心白湯送下
真珠膏 專治眼病久不差眩眩不見物

真珠末 細研 甘菊花 為末 香豉 炒黃

井泉石 細研各 貳錢半

右搗勻用白蜜壹合鯉魚膽壹枚同藥慢火熬成
膏入好龍腦壹錢同拌勻每用少許時時點眼中
生熟地黃散 見前

雀盲 千金治雀盲方

地膚子 伍兩 决明子 壹升

右為末煮米飲和丸每服二三十九

世傳方 治雀盲

蒼朮 米泔浸去皮 切片焙肆兩

右為末豬肝貳兩批開摻藥在內用麻絲紮定以
粟米壹合水壹碗砂鍋內煮熟熏眼候温臨卧每
服叁錢大効

聖惠方 治雀盲不計時月用蒼朮壹兩為末每服
壹錢

復明散 治小兒每至日暮即不見物乃雀盲也

蒼朮 米泔浸刮去皮 剉片焙乾貳兩 穀精草 壹兩

地膚子 决明子 黃芩 各半兩

右件搗羅為細末每服壹錢水搗分入荊芥少許煎五分去滓溫服食後

眼白多 初虞世曰眼白多多為虛山茱萸丸主之

山茱萸 貳兩

熟地黃

牡丹皮

牛膝

茯苓

澤瀉 各壹兩

鹿茸 半兩

右為末煉蜜丸如梧子大食後鹽湯下二十丸

薛 小兒白睛多吐痰發搐先用抑青丸四服而痰

搐止後用地黃丸年許而黑睛多 一 小兒白睛多

三歲不能行語聲不暢兩足非熱則冷大便不實朝

用補中益氣湯加五味子乾山藥以補脾肺夕用地

黃丸加五味子牛膝鹿茸補肝腎不三月而瘥 一

小兒眼白腿軟兩足熱面似愁容服地黃丸兩月餘

漸健服年餘白睛漸黑出痘無恙

通睛 湯氏牛黃丸 治小兒通睛皆因失悞築打觸

着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目闔

睛名曰通睛宜服此

牛黃

白附子 炮

肉桂

全蝎

芎藭

石膏 煨各壹錢

白芷

朱砂 各貳錢 研

藿香 半兩

眼目

切斗

麝香 壹分

右為末煉蜜丸如芡實大三歲已下每服壹丸薄荷湯下乳食後忌油麵豬肉

眼割 一小兒雀盲眼割服煮肝丸而目明服四味肥兒丸而目不割 一小兒發搐目割屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散治其肝後用地黃丸補其腎而愈 一小兒因驚眼割或搐先用加味小柴胡湯加蕪荑黃連以清肝熱又用六味地黃丸以滋腎生肝而痊 一小兒兩目連割或色赤或時拭眉此肝經風熱欲作肝疳也用四味肥兒丸加龍膽草而痊

目睛瞶動

目直

目動

胎黃

俱見驚搐門

見初生門

小便不通

曾嬰兒小便不通者有陰陽二證陰閉者為冷濕乘
虛入裏因而不通名曰陰閉以白芍藥湯加南木香
及用炒鹽以絹帕兜令帶熱熨臍四圍併投五苓散
入靈砂末鹽湯空心調服其效尤速陽閉者因暴熱
所逼澁而不通名曰陽閉又有癃閉與淋不同內經
宣明五氣篇曰膀胱不利為癃蓋癃者乃內臟氣虛
受熱壅滯宣化不行非澁非痛但閉不通腹脹緊滿
但以吹咀五苓散加車前子燈心之類及投木通散

玉露飲益无散皆可用之或貼薑豉餅於臍上取效不拘陰陽二證悉能療之併與萬安飲尤妙薛東垣云小便不利有在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱之所主長生於申申者金也金能生水肺中伏熱水不能生是絕小便之源也治法用清燉金之正化氣薄之藥茯苓豬苓澤瀉琥珀燈心通草車前瞿麥篇蓄之類皆為淡滲能泄肺中之熱而滋水之化源也若不渴熱在下焦是熱澁其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕

故不渴也二者之殊至易分別耳竊謂前證若津液偏滲於腸胃大便瀉利而小便澀少者宜分利若熱蘊於下焦津液燥而小便不行者宜滲泄若脾胃氣澀不能通調水道者宜順氣若乳母肝心二經有熱者用梔子清肝散肝經怒火者用柴胡梔子散若因父母曾服燥劑而致者用四物麥門甘艸數而黃者用四物加山茱萸黃蘗知母五味麥門肺虛而短少者用補中益氣加山藥麥門陰挺痿痺而頻數者用地黃丸熱結膀胱而不利者用五淋散脾肺燥不能化生者用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無以生而淋瀝

小便不通

力手二

三

者用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝者用六味丸若因乳母厚味酒麵積熱者用清胃散五淋散仍參諸淋覽之 一小兒十四歲肢體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝或面目赤色躁不欲衣此稟賦腎虛陰躁也用補中益氣湯加減八味丸而愈 一兒五歲小便不利用五苓散分利澹泄之藥益加不通小便陰囊漸腫先兄謂前藥復損真陰也用六味丸料加牛膝肉桂車前子佐以補中益氣湯而痊 一兒八歲先小便澀滯服五苓散益甚加木通車前之類腹脹吐痰加枳殼海金沙而胸滿

陰腫徧身發浮余用六味丸煎送滋腎丸而痊此皆稟父氣所致其作濕熱痰氣治之而歿者多矣 一兒八歲先因小便黃赤服五苓導赤等散後患便血余以為稟賦虛熱也用六味丸及補中益氣湯而痊 錢捻頭散 治小便不通

玄胡索 川苦楝 各等分

右同為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量本

小多少與之食前服 捻頭湯即泔湯中滴油數點是

湯木通散 治心經伏熱小便不通啼叫

木通 壹兩 牽牛子 炒半兩 滑石 壹兩

小便不通

幼科一

百三

右為末燈心蔥白水煎服

冬葵子散 治小兒腹急悶

冬葵子 兩壹 木通 兩

右為末每服壹錢水煎

張葵石散 治小便不通悶亂者

葵根 壹握 滑石 木通 各壹兩

牽牛子 半兩炒

右件搗為麤末每服壹錢以水壹大盞入燈心蔥

白各少許煎陸分去滓放温服乳食前

車前散 治熱盛積於小腸甚則尿血

牡蠣 燒為粉 半兩 車前子 甘草 炙微黃

川朴硝 各壹分

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五

分去滓温服不拘時量兒大小加減

芎藭散 治臟腑有熱小便澀兼大便不通

芎藭 壹兩 川大黃 劉微 郁李仁 湯浸去

各朱 錢半

右件搗羅為散每服壹錢以温水調下量兒大小

加減

朱砂丹 治證今前

小更不道

方科二

行三

朱砂

細研

水飛

續隨子

各半

膩粉

壹錢

右件藥都研令勻煉蜜和如黍米大每服七粒以

溫水下量兒大小加減乳食後

朱砂散 治心神煩躁小便赤澀不通

朱砂

壹兩另

滑石

黃

犀角屑

各半

黃芩

赤剉

甘草

炙微

車前子

各半

米錢

右件藥搗羅為散入朱砂同拌勻每服半錢煎竹

葉湯調下食前

曾白芍藥散 見茹

五苓散 見驚

玉露飲

益元散

萬安飲

俱見

木通散

見驚

清肺散 治渴而小便閉或黃或澀

五苓散加琥珀 半錢

燈心

通草

車前子

炒各貳錢半

瞿麥 半錢

木通

篇蓄

各壹兩

右為麤末每服叁錢水煎食前服

薛八正散

治蘊熱咽乾口燥大渴引飲心忪面熱

煩躁不寧目赤睛疼或咽舌生瘡小便赤閉或熱

淋血淋

車前子

瞿麥 炒

大黃

麵裹煨

小更不通

幼科

山梔

滑石

篇蓄

木通

甘草各壹兩

右為末每服貳錢入燈心水煎食前服

梔子仁散 治小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁伍枚

茅根

冬葵子各半兩

甘草炙貳錢

右為末每服壹錢水煎空心服

滋腎丸

梔子清肝散

柴胡梔子散

即柴胡清肝散三方並見發熱

淋

曾巢氏病源曰諸淋皆腎虛所致腎與膀胱為表裏至水下入小腸通於胞行於陰而為溲腎氣通於陰下流之道也淋有五名曰膏曰冷曰熱曰血曰石各具于後

膏淋見小便有脂肪似膏而浮於小便之上此腎虛不能制其肥液而下行也 冷淋先戰慄而後小便此亦腎虛而下焦受冷冷氣入胞與正氣交爭故小便澀而戰慄 熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其溺黃多而澀間有鮮血而同來者

血淋熱之極也。心者血之主，外行經絡，內行臟腑，熱盛則失其常道。心與小腸為表裏，故下流而入於胞，則為血淋。石淋，腎主水，水結則化為石，腎為熱所乘，遇小便則莖中痛，不得流利，痛引小腹，則沙石從小便出，甚至塞痛，令人昏悶，遍身有汗，而後醒，此痛之使然。蓋五淋者，雖曰腎虛所致，然小腸為受盛之府，氣通於膀胱，膀胱為津液之府，氣通於腎，餘化下流而不通，皆曰腎氣不足。熱入膀胱，水道澀而不利，出入起數，臍腹急痛，蘊作有時，或如豆汁膏血，並以局方五淋散下，龍腦雞蘇丸自然平愈。及香芎丸補

腎地黃丸與之，疎導補益為上。薛夫小兒諸淋者，腎與膀胱熱也。二經相為表裏，俱主水道，水入小腸，下行於胞，則為溺。若膀胱熱，則津液內涸，水道不通，腎氣熱，則小便淋瀝，或少腹引臍而痛。夫淋有五，石淋者，腎熱化石，內塞水道，痛引膀胱，氣淋者，肺氣壅熱，小腹脹滿，小便澀滯，熱淋者，三焦有熱，傳入腎膀胱，流入于胞，小便赤澁，血淋者，心熱血散，失其常經，溢滲入胞，寒淋者，膀胱氣冷，與正氣交爭，寒戰氣解，是也。亦有因妊母肝熱及乳母恚怒者，當分五臟蓄熱治之。若心藏有熱者，導赤散加黃連，肝藏有熱者

柴胡梔子散大便不通瀉青丸脾藏有熱者瀉黃散
脾氣不足者異功散脾氣下陷補中益氣湯肺藏有
者瀉白散肺氣虛熱異功散加炒黑山梔腎藏有熱
者地黃丸或因乳母肝經熱者用梔子清肝散毒怒
者用柴胡清肝散乳母厚味者用加味清胃散心小
腸熱者用清心蓮子飲或兒早近色慾小便澀滯或
疝痛及更去後大小便牽痛者皆屬肝腎不足也用
六味地黃丸補中益氣湯加牛膝車前肉桂末應當
參五臟所勝不可輕用滲泄寒涼之藥大損胃氣仍
參前小便不通證覽之 一 小兒小便不通服五苓

之類不應頰間及左腮色赤及肝腎虛熱也用四物
山梔及地黃丸而愈後因感冒誤汗小便仍不利余
用補中益氣湯加麥門五味而安 一 小兒小便不
利莖中澀痛時或尿血此稟父腎熱為患也先用五
淋散以疎導又用滋腎丸地黃丸補肝腎漸愈後出
痘色紫小便短赤頰間右腮或赤或白用補中益氣
湯六味地黃丸前證並愈 一 丹鄭蕙使之子年十六
初生七箇月患淋病五七日必一發其發則大痛水
道狀如黍如粟者約一杯許然後定診其脉輕則澀
重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父必因多

林 力斗二

服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫雲
和黃檗末丸桐子大晒極乾熱湯下百丸以食物壓
之又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者
一大碗許其病減十分之八後又與陳皮壹兩桔梗
木通各半兩作一貼與之又下如黍粟者一合許而
安父得燥熱且能病子况母得之者乎予書此以證
東垣紅瘤之事此亦熱在血分也

五淋散
赤茯苓 去皮 赤芍藥 炒 山梔子 去殼
甘草 生 當歸 去蘆 黃芩 炒

車前子 小泉 淡竹葉 燈心

木通 去皮節 滑石 水飛 葵子

右咬咀用葱白壹莖水煎入車前草杵擣取汁用
五苓散調化食前服或硝石末調化服 白淋白
茅根燈心煎湯服 有氣淋小腹脹滿尿後有餘
瀝木通煎湯服 熱淋小便赤而淋瀝臍下痛新
水煎服或黃芩煎湯服 石淋莖內痛尿澀有砂
石令人悶絕滑石膈紙煨焦為細末葵子煎湯服
局方五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或

尿如豆汁或成砂石或如膏或熱沸便血

赤茯苓 陸錢

當歸

甘草 各伍錢

赤芍藥

山梔子 各貳錢

右咬咀每服參錢水壹小盞入燈心煎服

導赤散 治小兒血淋

生地黃

木通 各貳錢

黃芩

甘草 生用 各壹錢

右為末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調

油髮灰空心灌下

葵子散 治小兒諸淋

葵子

車前子

水通

桑白皮

瞿麥

赤茯苓

山梔子

炙甘草 各等分

右水壹盞煎服

香芎丸 治諸淋證若患風閉尤效

淨香附 鹽水炒 川芎

赤茯苓 去皮 各半兩

海金沙

滑石 各壹兩

枳殼 泡去瓤 炒黃 各

澤瀉

石葦 去老梗 取葉

檳榔 不過火 各

右剉晒為末糯米粉煮為清糊丸麻仁大每服三十丸至五十五丸或老平七丸並用麥門冬熟水空心送下若小便澀痛滴三五點者取流水用

滅微温入鹽少許調勻空心嚥下

木通散 見驚

清心蓮子飲 治小兒上盛下虚心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並宜服之

黃芩

車前子

甘艸炙

麥門冬

去心

地骨皮

各半兩

黃芪

蜜炙

白茯苓

石蓮肉

去心

人參

各柴錢半

右剉碎每服伍錢水壹盞煎至六分去滓食前服如發熱加柴胡薄荷

金沙散 治小便淋瀝不通

鬱金

海金沙

滑石

甘草 各等分

右為末每服壹錢煎地膚子湯調下燈心木通亦可

又方 冬瓜最治實熱小便不通內熱口渴立効散 治小兒諸淋不通莖中作痛

木通

甘草

王不留行

胡荽

滑石

海金沙

山梔子

檳榔 各等分

右每服壹錢水煎

治血淋神效方

紫草

水煎服

又方

海螵蛸

生地黄

白茯苓

右等分為末，栢葉車前草煎湯調下。

治氣淋

赤芍藥 壹兩

檳榔 壹枚

右為末，燈心同棗子煎湯調下。

張石鷲丹 治小便淋澀痛悶

石鷲

燒赤醋淬 瞿麥

滑石 各壹兩

木通

剉

海蛤

細研各半兩

右件搗羅為細末，煉蜜和如黍米，大每服拾粒，以

葱白湯下，食前量兒大小加減。

石葦散 治諸淋澀水道中痛，臍下妨悶

石葦

去毛壹兩

冬葵子

木通

剉

赤茯苓

各半兩

車前子

瞿麥

榆白皮

滑石

甘草

各貳錢半

右件藥搗羅為散，每服壹錢，以水壹小盞，入葱白五寸煎至陸分，去滓溫服，如人行十里再服，量兒

大小加減

葵子散 治腎熱水結化為石淋甚者水道中澀痛不可忍

冬葵子 壹兩

石楠

榆白皮 判

石葦 去毛

木通 剉各半兩

右件藥搗羅為散每服半錢以葱白湯調下日二服量兒大小加減

滑石散

滑石

猪鬃根

石葦 去毛各等分

右件藥搗羅為散每服半錢煎大麥飲清調下日

二服量兒大小加減

蒲黃散 治膀胱熱甚血淋水道澀痛

蒲黃

冬葵子

生地黃 各半兩

右件藥搗羅為細末每服壹錢以水壹大盞煎至陸分去滓溫服量兒大小加減

遺尿

原病式云遺尿不禁者為冷內經云不約為遺溺仁齋曰小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能拘制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出者謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也以雞腸散主之亦有熱客於腎部干於足厥陰之經挺孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也薛氏用六味地黃丸脾肺氣虛者

遺尿

力斗一

百七

用補中益氣湯加補骨脂山茱萸曾氏謂乃心腎
傳送失度小腸膀胱關鍵不能約束有睡夢而遺者
皆是下元虛冷所致亦因稟受陽氣不足用三因方
家韭子丸治之及參苓白朮散補腎地黃丸然又當
實土以存水乃免滲泄之患所謂補腎不如補脾是
也平胃散倍加益智仁剉碎薑棗燒鹽煎空心溫服
雞腸散

雞腸

壹具男用雌雞女用雄雞燒存性

茯苓

去皮

桑螵蛸

炒各伍錢

桂

去粗皮

龍骨

各貳錢半

牡蠣

燒存性

右為極細末仍以雞胗壹具雞腸壹具燒存性
研極細末每用前藥末壹錢用溫酒調化食前服
張雞腸散 治因膀胱有熱服冷藥過多小便不能
禁止或遺尿病甲

雞腸草

龍骨

麥門冬

去心

白茯苓

桑螵蛸

各半兩

牡蠣粉

半錢

右件藥搗為麤散每服壹錢水壹小盞入生薑少
許棗貳枚煎至陸分去滓溫服量兒大小加減
按此與前方蓋一方而傳寫之訛竊詳用雞腸較
是而張氏婁氏薛氏皆主用草今兩存之

遺尿

力斗

遺尿

益智丸 治脾腎虛熱心氣不足遺尿白濁

益智仁

茯苓

扶神各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十九空心白滾湯下

破故紙散 治膀胱虛冷夜間遺尿或小便不禁

用破故紙為末每服壹錢熱湯調下

又方 破故紙炒為末黃蘗湯調下

外臺療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分搗

丸如小豆大溫水下日三服

初虞世治小兒遺尿薏苡仁壹合去心不去殼猷碎

入鹽一小撮同炒黃色用水一鍾煎至半鍾空心

服之累効

三因家韭子丸

方見雜病小便不禁

尿白便濁

仁齋曰小兒尿白如米泔狀由乳哺失節有傷於脾致令清白不分而色白也又則成疳此亦心膈伏熱兼而得之全嬰方云小便初出微赤良久白濁者乃熱疳之邪也初出黃白久白濁者乃冷疳之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸主之冷熱者蘆薈丸主之純下白濁者厚朴丸主之諸失津液欲成疳而小便白者茯苓散主之薛氏曰小便如泔或良久變白亦有脾虛食積濕熱下注者先用茯苓散五七服

尿白更前

幼科三

百六

三四五六七八九十
 十一十二十三十四十五
 十六十七十八十九二十
 二十一二十二二十三二十四二十五
 二十六二十七二十八二十九三十
 三十一三十二三十三三十四三十五
 三十六三十七三十八三十九四十
 四十一四十二四十三四十四四十五
 四十六四十七四十八四十九五十

次用四味肥兒丸若乳食少思或肚腹脹大小便頻
數此脾虛元氣下陷也朝用五味異功散夕用四味
肥兒丸若肥體色黃小便不調髮黃脫落鼻下瘡瘻
嗜土少食大便青褐者用梔子茯苓湯仍審其乳母
飲食七情治之 一 小兒發熱懶食小便良久變白
余用四味肥兒丸即愈或誤以為積熱用清涼祛逐
之劑形體頓弱虛證悉至小便如疳用補中益氣湯
及四味肥兒丸而愈 一 小兒面色痿黃眼胞微腫
作渴腹脹飲食少思小便澄白大便不實此脾疳之
證也用四君子加山梔蕪荑兼用四味肥兒丸而愈

一 小兒白濁兩耳內耳外生瘡膿水淋漓用大蘆
薈丸而愈後遍身如疥肌體消瘦發熱作渴大便酸
臭小便白濁用九味蘆薈丸五味異功散而愈 一
小兒白濁發熱口乾體瘦骨立余謂腎經虛羸朝用
補中益氣湯夕用六味地黃丸而愈後兩目或生白
翳面黃浮腫小便仍白此變肝脾疳證用四味肥兒
丸月餘漸瘥

益黃散 方見脾臟

牛黃丸 方見疳積

蘆薈丸 方見疳

君朴丸 治小兒小便白濁久則黃瘦不長肌肉

厚朴便泄

史君子煨去殼厚朴製

黃連各壹兩

木香叁錢

右為末蒸餅糊丸桐子大每服壹貳拾丸米湯下

茯苓散治乳食傷脾或心經伏熱小便白濁

三稜煨蓬莪茂煨砂仁

赤茯苓各半兩青皮 陳皮

滑石 甘草各壹錢半

右為末每服壹錢燈心湯調下

三稜散治小兒尿白久則成疳宜補脾消食化積

三稜炒蓬莪茂炒各壹兩益智仁

甘草 神麴炒 麥芽

橘皮各半兩

右為末每服壹錢白湯點下

清心蓮子飲見前

又方用大甘草頭煎湯服

梔子茯苓湯即大蕪荑湯方見疳

香砂丸治嬰孩小便白濁

香附子炒壹兩縮砂去殼伍錢三稜煨

蓬莪茂煨 陳皮 麥蘖炒

蘆薈各伍錢半

尿白便濁

幼科二

百九十三

右為極細末者煮麵糊丸如黍米大用米飲鹽湯食前服

此為末

蘇史

甘草

疝

曾按內經大奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆為疝證心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝蓋疝者寒氣結聚之所為故令臍腹絞痛者是也又巢元方曰諸疝者陰氣積于內復為寒氣所傷榮衛不調二氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則為寒為實為痛血為寒泣則為瘕氣為寒聚則為疝皆因本臟氣虛外感於寒濕內傷於生冷遂使臍腹絞刺激搏而痛無有定處倉卒之際不堪忍者謂之

疝也並宜先用五苓散沸湯調服和解輕則但以白芍藥湯烏梅散釣藤膏為治重者金菜丸散氣丸未有不愈也
仁齋癰疝者陰核氣結腫大而釣痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下繫結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此證惟是陰氣不得流行加以風冷入焉白水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有大硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法
醇小兒陰腫疝氣者多屬肝腎氣虛及生

卧寒濕之地或風邪所傷血氣相搏或啼叫氣逆水道不行或稟父肝經虛熱或妊娠肝氣鬱結或乳母怒動肝火而致者若兒肝經熱用梔子清肝散兒啼躁怒用勻氣散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火氣逆用加味逍遙散小腹作痛小便澀滯用龍膽瀉肝湯久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔車前子不時寒熱者加味小柴胡湯經云肝氣熱則莖痿宗筋弛縱腎莖腫脹或出白液痒痛或裏急筋縮挺縱不收或精隨便下者此名筋疝俱屬肝火不係於腎宜詳治之

茱萸肉消丸 治小兒陰癩偏大上致臍腹痛膚

囊腫脹或生瘡瘍時出黃水

川棟子炒壹兩半 大腹皮 五味子

海藻洗 玄胡索各壹兩 貳錢半 桔梗

青皮 山茱萸去核 各壹兩 木香朱錢半

懷香炒 桂心 川烏頭炮去

吳茱萸 桃仁炒研 食茱萸各伍錢

右為細末酒糊為丸如麻子大每服叁拾九空心

溫酒送下

當歸散 治小兒癩疔

牽牛微炒 取仁 辣桂各半兩 當歸

大黃各貳錢半 全蝎壹錢半 桃仁湯泡去皮 貳錢半

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食

前服以利為度

川棟丸 治小兒癩疔小腹痛引腰脊攣曲身不能

直

木香 檳榔 三稜

蓬莪茂炮 青皮去白 陳皮去白

川棟肉 芫花米醋浸炒 各半兩 辣桂

蜜牛生取仁 各叁錢 巴豆不去油 壹錢

面 切料二 煎

右為細末飛麵糊為丸如麻子大每服參九空心

用生薑湯送下

五苓散 方見驚搐

曾白芍藥湯 治冷痢腹痛及誤汗誤下即壞證傷

寒是也並宜先服次投對證之劑

白芍藥 壹兩

薄桂 去粗皮 壹錢半

澤瀉 去粗皮 米錢半

甘州 貳錢

右件吹咀每服貳錢水壹盞煎柒分空心溫服誤

汗誤下加入參南木各貳錢臍下痛入生薑及

鹽同煎或加釣藤亦好

烏梅散

烏梅 去核

乳香

右件吹咀每服貳錢水壹盞煎柒分空心溫服

金鈴散 治疝氣腹痛投諸藥後瘡而復作宜服

金鈴子肉 陸錢

青皮 去白

懷香 各半兩

檳榔

右除檳榔木香不過火餘剉焙仍同檳榔木香為

治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾

玄胡索

沒藥

粉草 半生半炙 各伍錢

釣藤 各貳錢半

我茂 醋煮剉

陳皮 去白 各貳錢半

南木香 貳錢

枳殼 去瓢 炒黃

甘草 炙肆錢

赤茯苓 去皮

釣藤 和鈎 各叁錢

禾每服半錢至壹錢仍用炒穰香煎無灰酒空心
調服不飲酒者煎炒穰香湯調下

釣藤膏 方見夜啼

金菜丸 治冷疝氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉 壹兩

家園菜莖 半兩

右研末酒煮麵糊丸味甘仁大每服三十丸至五十
丸空心溫鹽湯下溫酒亦可兒小者九粟粒大丸
數下法同前

散氣丸 理諸疝氣小便利或不通臍下作痛不可
忍者

海藻 湯浸洗柴 澤瀉 去蘆皮 懷香 炒

車前子 焙 蘿蔔子 瓦上慢 川棟肉 用蠶絲

翅足同炒少 大腹皮 淨洗焙乾

右剉焙為末酒煮麵糊丸菜豆大每服叁拾丸至
五拾丸南木香煎酒空心下或防風牡丹皮煎酒
下不能飲者於木香湯防風丹皮湯中各少入酒
並空心投亦可再用鹽炒穰香煎湯尤妙

湯治小腸疝氣家傳妙方

蕘花 醋浸炒 木香 檳榔 青皮
三稜 各半兩 茯苓

全蝎

Y 礶砂 各貳錢半

桂枝

附子

右為末將礶砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麵糊為丸如豆大每服參拾丸空心温酒下未効再服

勻氣散

主調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗

貳兩剉炒 陳皮 去白壹兩

縮砂仁

藜香 各半兩

白薑 貳錢半

粉草 肆錢

右剉焙為末每服半錢或壹錢空心沸湯調服冷疝腹痛燒鹽湯調下

木香飲 治小兒小腸氣痛

川棟肉

拾箇用巴豆柴粒同炒令黃色去巴豆不用入藜香半兩

玄胡索

半兩

南木香

貳錢

史君子

去殼

右為極細末用米飲食前調服

梔子清肝散

柴胡清肝散 二方並見發熱

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱不利下部生瘡兩拘腫

痛或腹中作痛小便澁滯等證

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉

車前子

炒

木通

生地黃

酒拌

當歸

酒拌

山梔

黃芩

炒

甘艸

各叁分

右水煎食前服
四苓散即五苓去穉
小柴胡湯 方見發熱

陰腫

全嬰方云小兒陰腫核腫者由兒啼怒氣逆不順乘
虛而行陰核偏大又因甘肥不節生冷過度致生疳
氣氣結不行流入陰中或傷暑毒或觸風邪使血氣
與邪氣相搏停結不散則成陰腫也 仁齋云若腎
經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕
氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉繫於下
結聚不散加以水實不行亦能發為此疾治用桃仁
丸主之丹溪謂脫囊腫大墜下不收用紫蘇莖葉為

陰腫

幼科二

百九

宋水調荷葉包之。一人傳此方，用野白紫蘇為末，濕則搽之，乾則香油調傳。雖皮潰子墜，皆有神效。此用紫蘇蓋亦同功也。曾巢元方論曰：諸筋會于陰器，邪客於厥陰，少陰之經與冷氣相搏，則陰囊腫痛而引縮。經中雖分四證，曰腸癰、氣癰、水癰、卵癰。然小兒患此，若治之不早，則成痼疾。如腰曲、腹痛、冷汗自出，而陰囊二子弔縮，入腹痛止，方出名為內弔，用烏梅散勻氣散、金菜丸、金鈴散為治。有陰莖全縮不見，有陰囊光腫不痛，此因肝腎氣虛，宜以橘子仁煎湯調下。金鈴散勻氣散皆可投之。內經曰：癰瘡疔膚脹。

者陰亦盛而脈脹不通，故曰癰瘡疔。由是觀之，乃陰氣盛而致有此弔縮者，筋急也。筋遇寒則引縮，遇熱則弛張，故三因所用方法以寬小腸氣，疎風為治。然小兒此證多因坐陰潤之地，感風濕而得，用當歸散加檳榔、蒼朮、水薑煎服，并青木香湯、釣藤膏外以立消散傳之。有外腎無故而膚囊腫大，不燥不痛，光亮如吹，此名氣虛所致，以勻氣散調治。三因方家韭子丸主之。一證外腎膚囊赤腫，通明及女兒陰戶腫脹，乃心熱之所傳，皆以木通散導赤散為治。或用薏苡仁煎湯調五苓散及以外消散傳之，併投天花

散用無灰酒煎下不能飲者水煎少入酒同服亦好
張煥曰小兒足少陰之經虛而受風邪者衝於下經
則成陰腫病桃仁丹主之

桃仁丹

桃仁二錢半湯浸去皮尖

白蒺藜微炒去刺 桂心各半

牡丹皮

郁李仁湯浸去

右伴藥搗羅為細末煉蜜和黍米大每服拾粒以
溫酒下乳食前量兒大小加減亦可水煎服
胡連散 治陰腫生瘡

胡黃連去鬚 胡粉各半

白礬枯 貳錢半

湯小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜

海蛤散

海蛤參錢 藜香炒末 錢半 薏苡仁

白朮 檳榔各半

右為末食錢溫酒調下大小加減

桃仁丸

桃仁去皮尖 炒參錢 桂枝去皮 牽牛炒頭末

蒺藜 牡丹皮各貳錢

右為細末煉蜜丸如黍米大用青皮木香葱白入鹽少許同煎湯食前服

三白散 治小兒解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風濕相乘

桑根白皮炒 白朮 木通去皮節

陳皮去白 白牽牛半生半炒 甘草炙各伍錢

右咬咀用水煎食前服

丹脫囊即外腎腫大

木通 甘草 當歸

黃連 黃芩 右水煎服

錢 蚯蚓散 治腎子腫硬成疝用乾蚯蚓為末唾調

傳常避風冷濕地先用花椒蔥湯避風處洗却用此傳之累驗

世治小兒囊腫如升用甘州煎汁調地龍末塗之立

退累効

傳藥方

牡蠣粉貳分 乾地龍碾末壹分

右用津唾調敷外腎熱者雞子清調敷

牡蠣散 治小兒外腎腫大莖物通明

用牡蠣粉研十分細先以唾津塗腫處次以牡蠣粉摻

又方 治小兒卵腫研桃仁唾調敷

罌烏梅散

勻氣散

金菜丸

金鈴散 方並見酒

當歸散 見痢

牡蠣大黃湯 治三五歲小兒感受溫濕之氣侵襲

膀胱致陰莖膚囊浮腫作痛

牡蠣用熟黃泥包裹炭火煨透出地上候冷用

大黃紙裏水浸透煨過候冷用貳味各壹兩

右剉研為末每服壹錢無灰溫酒空心調服不能飲者溫湯調少入酒同服

青木香湯 治小兒陰莖無故而腫或痛縮因陽明

經有風熱濕氣相搏法當寬此一經自愈蓋陽明受病不能養其宗筋故也咳嗽痰喘亦宜服之

青木香去蘆 枳殼浸去穢殼 甘草貳錢半

右每服貳錢水壹盞煎七分不拘時溫服

立消散 治膀胱久受熱毒致陰器膚囊赤腫脹痛

赤小豆 赤芍藥 生枳殼

商陸 風化朴硝另研後入

右件不過火剉晒為末栢枝煎湯候冷調貳錢或參錢塗腫處仍服改咀五苓散加車前子薏苡仁

水煎

木通散 見驚

天花散 治外腎膚囊腫痛

天花粉 貳兩 甘草 叁錢

右剉每服貳錢無灰酒壹盞煎七分空心温服不能飲用水煎少入酒同服

偏墜

田小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛拾肆枚熬焦桂枝半兩二物為散每服八分日再酒調下蜜

丸亦通

黑散

黃連

黃芩

大黃

黃檗 各貳錢

右同燒存性為極細末雄豬膽汁蜜同調傅
灸偏墜亦宜防葵丸令兒坐於土中灸即下偏墜

灸

力

二百四

偏墜

之處七壯

防葵丸未詳

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間弦子上灸七壯立愈

明胎產疝卵偏墜

囊縫後十字紋上灸三壯

夏灸冬瀝

偏墜

陰瘡

臘茶散 治小兒陰囊生瘡疼痛水出久不瘥

臘茶

五倍子

各伍錢 膩粉少許

右為末先用葱椒湯洗後用香油調敷

一方 治陰囊生瘡疼痛

右先用川椒荆芥槐枝柳枝蛇床子煎湯洗後用

朴硝為末雞子清調敷

一方 治陰生瘡膿水不乾

右用烏鰂魚骨為細末乾摻患處

陰瘡

幼科二

二百五

一方 用紫蘇葉煎湯淋洗及作細末摻之妙
一方 治小兒陰生瘡不乾

右用輕粉蜜陀僧為末貼之如痒加山梔子訶子
燒存性研同前藥為末先將米泔水洗淨然後敷
貼此藥

不寐

不寐

薛經曰陽明胃脉也胃者六腑之海其氣亦下行陽
明逆不得從其道故不得卧也又曰胃不和則卧不
安夫人身之衛氣晝則行於陽夜則行於陰陽主動
陰主靜寤則魂魄志意散於腑臟發於耳目動於肢
體而為人身指使之用寐則神氣各歸五官而為默
運之妙矣若脾胃氣盛則腑臟調和水穀之精各各
融化以為平和之氣若胃氣一逆則氣血不得其宜
腑臟不得其所不寐之證由此生焉當用四君遠志

不寐

力計二

三十一

酸棗仁肝腎虛熱者六味丸心血不足者真珠母丸
思慮過度者歸脾湯精神短乏者人參養榮湯病後
餘熱者酸棗仁湯膽虛不得眠者人參竹葉湯肝火
不寧者加味小柴胡湯振悸不得眠者四君生薑酸
棗仁夜啼驚哭不寐各詳別證當參求之

仲景酸棗湯 治虛勞虛煩不得眠

知母 炒

茯苓

芎藭

生薑 各伍分

右水煎服

本事鼈甲丸 治膽虛不得眠四肢無力

鼈甲

酸棗仁 炒

羌活

黃芪 炒

牛膝 酒炒

人參 各壹兩

五味子 伍錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三四十丸溫酒下

聖惠治骨蒸勞熱煩心不得眠用酸棗仁叁錢水煎
熟下地黃汁一蛤蜊殼服之

本事真珠母丸 治肝膽二經因虛內受風邪臥則

魂散而不守狀若驚悸

真珠 別研細末 錢半

當歸

熟地黃 各壹兩半

人參

酸棗仁 炒

栝子仁 各壹兩

犀角屑

茯神

沉香

龍齒研各半兩

右為末煉蜜丸小豆大辰砂為衣每服二十丸白湯下日午夜卧各一服

人參竹葉湯 治虛煩不得眠

人參

竹葉

甘草 各貳錢

半夏

小麥

麥門冬 各壹錢 伍分

右每服貳錢薑貳片粳米壹撮水煎服

人參養榮湯 見盜汗

歸脾湯 見驚悸

咽喉

心鑑咽喉為一身之總要與胃氣相接呼吸之所從出若胸膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉内生瘡或狀如肉腐為腫為痛窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌治之尤宜先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝干上腭而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病詳審治之 咽喉之疾本傷熱毒上攻也四時受熱藏心腑之間一旦所觸上攻咽喉

所謂腎傷寒也然其證有單肉蛾雙肉蛾有重舌木
舌疔腮有懸癰腫脹有裏外皆腫甚者上攻頭面皆
腫大法先洗去口中舌上白胎其次掃去風涎如是
單雙肉蛾可針則針有不可針者則用熏摻藥退後
方依次用服藥如是木舌服藥之外仍用摻藥疔腮
則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及藥點其
瘡而自消也 薛小兒喉痺因膏粱積熱或稟賦有
熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裏與
證之輕重經之所主而治之若左腮色青赤者肝膽
經風熱也用柴胡梔子散右腮色赤者肺經有熱也

用瀉白散額間色赤者心與小腸經熱也用導赤散
若兼青色風熱相搏也用加味道遙散鼻間色黃脾
胃經有熱也用瀉黃散若兼青色木乘土位也用加
味道遙散兼赤色心傳土位也用柴胡梔子散額間
色赤腎經有熱也用地黃丸凡此積熱內蘊二便不
通者當疎利之風邪外客而發寒熱者當發散之外
感風邪大便閉結煩渴痰盛者當內疎外解若因乳
母膏粱積熱者母服東垣清胃散若因乳母恚怒肝
火者母服加味道遙散稟賦陰虛者兒服地黃丸大
槩當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之藥以

傷真氣也 一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降
火之藥益甚仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虛證
蓋胃為五臟之本先用五味異功散以補胃加桔梗
甘草以消毒諸證頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈
一小兒發熱引冷大便黃色手足並熱不能吮乳
視口內無患捫其喉間則哭此喉內作痛乃脾胃實
熱也用瀉黃清胃二散各一劑母子並服而愈後因
乳母飲酒兒躁不安口內流涎仍用前二散而愈
一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肝與大腸
有熱也先用牛蒡子湯加硝黃一服大便隨通乃去

硝黃再劑頓愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散
母子並服而痊

甘桔湯 治嬰孩感冒風熱火氣熏逼痘瘡蘊毒上

攻咽喉腫痛痰氣不順咳嗽失音

人參去蘆半兩 桔梗蜜浸炒壹兩 甘草半生半炙叁錢

右剉散用水煎不拘時候服

立効散 治嬰孩小兒咽喉痺痛不能吞嚥

鵬砂 龍腦 雄黃

朴硝各半錢

右為極細末乾摻

吹喉散

治嬰孩咽喉腫痛氣塞不通

甘草

生貳錢半 朴硝 壹兩

右為極細末乾摻喉中如腫甚者用小竹管吹入喉內

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及

諸瘡赤紫丹毒咽喉腫痛

牛蒡子

叁兩畧 炒細研

大黃

壹兩半

防風

去蘆

薄荷

去老梗 各壹兩

荊芥

去根梗 肆兩

甘艸

壹兩壹錢半

右吹咀每服貳錢水壹盞煎七分無時溫服

化毒湯

解風熱上攻咽喉腫痛飲食不便

桔梗

半兩 剉炒

薄荷葉

荊芥穗

甘草

各貳錢半

山豆根

取淨皮壹錢半以上五味俱焙為末

牙硝

鵬砂

朴硝

雄黃

硃砂

各貳錢以上五味乳鉢細研

右五味焙為末五味研為末同一處再研勻每用一字至半錢乾點舌上花下或以溫湯濃調少與含嚥亦可

備急散

治小兒諸般骨哽咽喉腫痛

五倍子

壹兩 研

先春茶末

半兩

右二味和勻抄壹錢溫湯半盞調化無時少與嚥

下依法服餌不過三五次即效如骨出或刺破處血來多者鵬砂末陸錢水煎消毒散飲調服血止痛住腫消食進

牛蒡子湯

牛蒡子 炒杵

玄參

升麻

桔梗 炒

犀角 鎊

黃芩

木通

甘草 各等分

右每服壹貳錢水煎

拔萃桔梗湯

治熱腫喉痺

桔梗 炒

甘草 炒

連翹

梔子 炒

薄荷

黃芩 各等分

右為末每服壹貳錢水煎服

消毒飲

解急驚風毒赤紫丹瘤壯熱狂躁睡卧不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行及遍身瘡

疥

牛蒡子 陸兩

荆芥穗 貳兩

甘草 壹兩

右剉每服貳錢水壹盞煎七分無時温服

柴胡飲 見積熱

東垣人參安胃散 見吐利

三因玉鑰匙

九味蘆薈丸 見痢

濟生犀角地黄湯 見吐

五味異功散 見吐利

中卷

卷下二

二百十二

柴胡清肝散

見發熱

東垣入參安胃效

長江

甘草

黃芩

芍藥

龍胆

黃連

梔子

薄荷

黃芩

芍藥

龍胆

黃連

梔子

薄荷

黃芩

芍藥

龍胆

黃連

梔子

薄荷

黃芩

芍藥

龍胆

黃連



