

Inches
Centimetres
KODAK Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2000
Kodak
LICENSED PRODUCT
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
A
M
B


設公準論
湯利

門 貳 9
號 82
冊 59

癰疽初發壅腫而未見膿者也　集驗論瘡瘍之法
其名有三曰癰曰疽癰者初生突起浮赤而無
根脚腫見於皮膚間止闊一二寸有少疼痛數日後
則微輭薄皮剝起始出清水後自破膿出如不破用
替鍼先拔毒膏貼之膿出即愈癰者初生紅腫突起
無頭便用火鍼鍼之即散不散鍼侵根脚闊三四寸
發熱惡寒煩渴或不發熱抽掣疼痛四五日後按之
微輭此證毒氣浮淺春夏宜用防風敗毒散加蔥顧
薑棗煎服秋冬去薑棗蔥頭加木香身半已上加括

蔓身半已下宜加射干治早者即散或用追毒丸返
魂丹復元通氣散微利之膿成用鈹針破開或用替
針丸咬開又一等皮色不變但畧微腫肌肉内痛夜
間痛甚發熱惡寒煩渴此熱毒深亦名為疽謂其能
傷筋脉骨髓也日久按之心中微輭膿成後用火烙
烙開以決大膿外用拔毒乳香膏貼之宜服内托之
藥初發急用大針於腫硬處針之則散疽者初生白
粒如粟米大便覺療痛觸著其痛應心此疽始發之
兆也急用火針於白粒上針開或誤觸破或入湯便
覺微赤腫痛三四日後不散根脚赤暈展開須詳看

之方見其暈闊狹如闊四五寸左右渾身發壯熱微
渴瘡上亦熱此疽也用火針於初起白粒上刺入一
寸餘徑寸之間四邊刺四處便用四味紫葛湯淋洗
一日夜共五六次洗了以輭帛拭乾看疽上或
有漸生白粒如黍米或多或少可用銀篦兒挑去勿
令見血或有少血亦不妨不見血尤妙却用老皮散
傳之用涼水調大鐵箍散貼之未可用膏藥如再要洗須先去
圍藥令淨然後洗之一次洗一次點檢疽上漸生白
粒有則如前挑之六七日瘡頭無數如蜂房膿不肯

出初淋洗圍貼冬月用五香連翹湯大黃一味隨虛實加減夏秋用黃連羌活散春末夏初用防風敗毒散加葱白裹煎服秋去之加木香若形氣實脉洪滑有力痛腫煩開壯熱便閉於五利大黃湯漏蘆湯返魂丹追毒丸復元通氣散選一藥以通利之若大便潤便止藥四十歲已前可用之虛弱年老之人雖有便閉之證須愼之勿令過也瘡熱暈赤煩開圍貼如赤暈收斂却再換鐵箍散不及用火針證七八日後中間初起白粒處此竅已潰逼內大膿可用皮紙撚小紙紝撚入竅中令透漸漸流出可不用針砭如要

膿透必以大針刺開或周圍四五處其竅四邊如蜂房處膿不肯出用正鐵箍散香油調貼一證初生白粒誤觸後便覺情懷不舒暢背上沉重如負五七斤米樣身體煩疼胸膈痞悶而躁飲食無味怕聞食氣所謂外如麻裡如瓜者疽毒深惡內連腑臟也二十五日內皆可用烙於中間左右上下冷毒氣通暢後膿從諸竅而出五六日不散疽頂生白粒如椒者數日後漸生多間有大如蜂房蓮子者指捺有膿血而不流時有清水流出微腫不突根腳紅暈漸漸展開或痒痛或不痛或根腳暈紫赤煩開至七八寸疽不甚

熱此證甚重用紫葛湯加米醋一盞淋洗可使紅活如法去白粒傅老皮散圍大箍散瘡口塗正鐵箍散每用前法如得根脚紅暈收疽突此藥力到變重爲輕如起第一顆頂上白粒雖有膿而紝引不透按之猶硬或漸不疼便宜用火烙開透若根脚仍舊紫黑瘡及陷下如牛項之皮漸變黑色肌骨腐潰恍惚沉重用拔毒乳香膏貼四邊仍用大鐵箍散圍却用猪蹄湯洗此數項變證必多又宜隨證調理脉若虛弱便用大料人參當歸濃湯調解毒行經之藥凡癰疽必服萬全散夏月用桃紅散服以護心若見膿之後

當以潰瘍法調理（按集驗治法未可盡據爲準繩更當因以後論爲主參酌諸方用之）

大法腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之如內托復煎散　腫硬痛深脉沉者邪在內也宜下之如黃連內疎湯仙方活命飲苦參丸　外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衛如托裡榮衛湯白芷升麻湯　焮痛躁煩或咽乾作渴者宜降火如黃連解毒湯　焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之如荊防敗毒散人參敗毒散　大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒如仙方活命飲　煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之如清

涼飲或金銀花散 惡寒而不潰者氣實無寒邪也宜宣而補之如十宣散 瘍痛發熱汗多大渴便秘譫語者結陽證也宜下之如黃連肉疎湯破棺丹輩

不作膿或熟而不潰者虛也宜補之如補中益氣湯八物湯十全大補湯輩 瘍痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜炙之 腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之如仙方活命飲 腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之如清心湯或防風通聖散加黃連 不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之如托裏消毒散

潔古云瘡瘍者火之屬須分內外若其脈沉實當先疎其內以絕其原也其脈浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚過絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脈沉實發熱煩躁外無瘀赤痛甚邪氣深於內也故先疎通藏腑以絕其原連湯 外之內者其脈浮數瘀腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也 內托復煎

散内外之中者外無瘀惡之氣内亦藏腑宜通其在經當和榮衛也當用歸黄湯無變證亦可使邪氣峻減而易痊也　東垣云瘡疽之發其受之有内外之別治之有寒温之異受之外者法當托裏以温劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之内者法當疎利以寒劑反用温劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰其爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍經則危殆重則死矣予聞潔古云瘡瘍之生也表裏不同或攻或發必有差舛變證隨能殺人甚於傷寒也針灸施治各隨其宜所用之藥用此三法之後雖未知其瘡必

脈沉實痛深者宜寫劑疎通

又當明入五臟君臣是其法也

内疎黄連湯　治偏晩心逆發熱而煩脈沉而實腫硬木悶而皮色不變色根係深大病遠在内臟腑秘澁當急疎利之

黄連　芍藥　當歸
檳榔　木香　黄芩
梔子　薄荷　桔梗
甘草各壹兩　連翹貳兩

右除檳榔木香爲末外並剉每服壹兩水壹盞半煎壹盞先喫壹貳服次每服加大黄壹錢再加貳

錢以利爲度如有熱證止服黃連湯大便秘澁加大黃如無熱證止用復煎散時時呷之如此內外皆通榮衛和調則經絡自不遏絶矣

內托復煎散　治腫瘍於外根盤不深形證在表其脉浮痛在皮內恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裡

地骨皮	防風	各貳兩
芍藥	白朮	
茯苓	甘草	
當歸	人參	各壹兩
	防己	
	桂	伍錢

右㕮咀先將蒼朮壹斤用水伍升煎至叁升去蒼朮滓入前藥拾貳味再煎至叁肆盞絞取清汁作煎拾貳味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平參肆服終日服之又煎蒼朮滓爲湯去滓再依前如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芪湯　治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸	地黃	
川芎	黃芪	
地骨皮	芍藥	各半錢

右咬咀水煎服　如發熱加黄芩　如煩躁不能睡卧者加梔子　如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

右三方乃易水師弟治瘡之三法今持列於篇首而以古今諸方臚列於後臨病之工詳審脉證而施用之庶乎可以無失矣

發表　内經曰汗之則瘡已東垣云東南二方者在人則爲内小腸熱甲膽風小腸與膽皆居其下其性炎上其瘡外有六經之形證内無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疽瘡也止癰癤也小則爲癤大則爲癰其邪所受於下風濕之地氣自外而來

侵加於身者也經云營氣不從逆於肉理乃生病腫諸痛痒瘡皆屬心火此瘡自外而入是丙小腸左遷入於膽作痛而非瘡也此二方皆主血血爲病必痛此元氣不足營氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌肉之上皮毛之間只於風濕熱六經所行經絡地分出矣宜瀉其風濕熱鬱發汗者乃濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使榮衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赤而腫微黯色東方青埠没之色也風木之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色亦赤腫硬微帶黯色

其瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛也其脉止在左手左手主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以托裏榮衛湯主之　劉宗厚曰前論大要三法即此瘡宜汗之及先托裏恐邪氣入內言外因也宜先疎內以絕其源言內因也當和榮衛謂不內外因之證也故瘡之發於皮表者因大畧言汗其汗下和之間然亦有外治之次第焉如鄧氏治驗云一婦人五十九歲右耳下天容穴間患一片瘡其頭黑黧四邊泡起黃水時流渾身麻木發熱譫語時

時昏沉六脉浮洪用烏金散汗之就以鈚針先刺瘡心不痛周遭再刺十餘下紫黑血出方知疼痛就以寸金錠子紅入瘡內外用提丁錠子放於瘡上膏藥貼護次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病即定其疔潰動後用守效散貼塗紅玉錠子紅之八日其疔自出矣茲所謂審脉證汗下之間外治次第如此殊勝不察脉證但見發熱譫語便投涼劑與下或無以香氣之藥遂致候入者遠矣

丹溪曰癰疽因積毒在臟腑非一朝夕今發於外宜以標本爲治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經

活血爲佐參以經絡時令使毒氣外發此正仲景解表用麻黃桂枝之意施治之早可以內消此乃內托之本意也

托裏榮衛湯　治癰疽腫及無名腫毒

桂枝 柒分　人參　黃芪
紅花　蒼朮　柴胡
連翹　當歸身　羌活
黃芩　防風　甘草 炙各壹錢

右作壹服水壹鍾酒壹鍾煎至壹鍾食前服加味當歸飲子　治諸瘡瘍諸痛癢瘡皆屬心火火

鬱則發之

當歸　生地黃　升麻 各伍錢
防風 貳伍分　荆芥穗　何首烏 各貳錢
柴胡　白芍藥　川芎
羌活　黃芪 各貳錢　紅花
蘇木　甘草 各壹錢

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑參片煎至捌分食遠服沐浴取微汗効速使血氣通和服之應効

人參敗毒散

人參　柴胡
獨活

桔梗炒　羌活
茯苓　枳殼麩炒
甘草各壹錢　川芎　前胡

作壹劑水貳鍾薑叁片煎壹鍾服後服內托復煎散

郭氏神効烏金散　治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏昧譫語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡起

蒼耳頭端午日午時收　火麻頭火日收
木賊去節　蝦蟆頭　樺皮節酥炙

解毒

麻黃去根節　乾各等分同入磁罐內鹽泥固濟炭火內從早煆至申分如黑煤色為度碾為末每服貳錢病重者叁錢用熱酒調下未汗再壹服如汗乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天晴好日於靜室中勿令雞犬猫畜及陰人見也又名首功玄黑奪命丹　治諸般腫毒疔疽惡瘡

蟾酥　輕粉各伍分
白礬枯　寒水石　硃砂叁錢　銅綠各壹錢

蝸牛 參拾壹粒兄研 乳香 沒藥
麝香 壹錢

右件為細末將蝸牛另碾壹處丸如丸不就用好酒糊為丸如菉豆大每服壹丸生葱叁伍莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行伍柒里汗出為効重者再服壹貳丸

蟾酥丸 治疔黃一切惡瘡

川烏 蓮花蕊 珠砂各壹錢半
乳香 沒藥各貳錢 輕粉
蟾酥各壹錢 麝香伍分

右為細末糊為丸菉豆大每服壹丸病重者貳丸依前法服取汗

右二方郭氏稱為首藥皆主乎發散首出太陽例後二方出少陰例然皆劫劑也智者當較輕重陰陽之分取擇用之

寸金丹 二名返魂丹三名再生圓四名追命丹五名延壽圓六名來甦圓七名知命圓八名得道圓非入勿示此方若有入患瘡身未爛者與三圓服之嚥下便活如口噤不開牙關研化三圓灌下喉中立生此方治發背腦疽癰腫偏身附骨腫痛

先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱
麝香壹分　南乳香　烏金石
輕粉　雄黃　狗寶
沒藥各壹錢　蟾酥貳錢　粉霜
黃蠟各叁錢　硇砂伍錢　鯉魚膽
狗膽各壹箇乾用
頭首男孩兒乳壹合　金頭蜈蚣柒條全者炙黃色
右件爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸
如菜豆大小兒九箇始芥子大每服壹丸病重者加
叁丸白丁香柒箇研爛新汲水調送下用衣服蓋
之睡勿令透風汗出爲度大段疼痛如無頭瘡腫
不過二服立效服藥後喫白粥瓜薑就睡大妙
烏金散　治疔毒腫痛
牙皂肆分　人言製　蟾酥
麝香各伍分　血餘煅過　蛇蛻煅過
蜂房煅各壹錢　蟬蛻酒洗　血竭
乳香炙　殭蠶炒去絲各貳錢　辰砂研水錢
雄黃　穿山甲炙黃各貳錢伍分　全蝎叁錢湯泡柒次
天龍肆錢酒炙去頭足　沒藥炙
右各爲細末稱準分兩和勻每服叁分赤砂糖調

葱頭酒送下取汗爲度
勝金丹　治症同前
麝香　白砒製各伍分
雄黃　辰砂
沒藥　血竭各壹錢伍分
天龍去頭足炙　穿山甲炙各叁錢
右爲細末和勻服法同前
奪命丹　治證同前
輕粉　麝香
白礬煅　辰砂爲衣
白砒製各伍分
乳香　全蝎泡炙
血竭各壹錢
蟾酥壹錢
殭蠶炙去絲伍錢

蟾酥乾者貳錢酒化入藥銅綠
乳香　沒藥
蝸牛貳拾壹箇連殼
寒水石煅
雄黃各貳錢
右爲末先將蝸牛研爛如泥勻和前藥爲丸如棗
豆大如丸不就加好酒打叁伍百下每服貳叁丸
先用葱白叁寸與病者嚼爛吐於男左女右手心
將藥丸裹入葱白用無灰酒叁肆盞温熱送下被
蓋取汗爲度重者不過叁服
右自烏金散以下皆治毒瘡初發憎寒壯熱面赤
身拘急疼痛者取汗之峻劑東垣雖左袒汗而托

裏榮衛一方則固丹溪所謂助氣壯胃使根本堅固而以行經活血爲佐者也與烏金奪命之取汗異矣當歸飲子亦同此意而微有氣血温涼之分爲故與敗毒散同列爲發表之方而後所列東垣分經諸方則正丹溪所云云雖曰解表不以取汗爲功尤可師法學者詳之

垣 通父家禮梗於尻髀上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脈俱緊按之無力內托羌活湯

羌活 黄柏 酒洗各壹貳錢 防風

藁本 連翹 當歸各壹錢

肉桂參分 甘草炙 蒼朮

陳皮各伍分 黄芪壹錢伍分

右作壹服酒貳大盞煎至壹盞盡去渣熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之壹服愈

丹 王姑丈七十餘患項疽脈實而稍大此因憂悶而生太陽經治之

歸頭貳錢 黄柏壹錢半酒 黄芪

羌活 地黄酒 黄芩酒炒

桔梗壹錢 黄連酒炒 連翹

防風　甘草生
陳皮　人參
防己　澤瀉伍分
白水煎服

淨腋湯　治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

麻黃　草蔻　防風
柴胡　黃芩酒　蒼朮各壹錢
桂枝　黃芩各貳錢　桔梗
甘草　生地伍分　當歸稍洗分
紅花少許　升麻半分　連翹壹錢半

右剉如麻豆大都作壹服水貳大盞煎至壹盞去

查稍熱服

尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明經分出癰第四日忽腫幼有癩疝其證大小便如故飲食寸皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脉斷之邪氣在表然其證大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裏既和知邪止在經脉之中凝滯爲癰出身半已上風從生受之也故與卻寒邪和經脉中氣血使無凝滯也

白芷升麻湯

白芷 柒分　升麻
甘草 炙　黃芩 生
生地 各壹錢　酒黃芩
連翹 各貳錢　中桂 少
右水酒各壹盞同煎至壹盞臨卧熱服壹服愈

此證雖曰經脉之中然得之自八風之變其藥制度皆發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

升麻　桔梗 各伍分
連翹　歸稍
葛根 各壹錢半　黃芪

肉桂 參分　歸身
甘草 炙 各壹錢　黃芪
黍粘子 伍分　黃栢 貳錢

右作壹服水壹盞酒半盞煎至壹盞貳服愈

羅汗之則瘡已　丁巳年委子從軍回住曹州有趙同知員經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安卧一瘍醫腫上砭刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然予往診視其脉浮緊按之洪緩此寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒地凍則水氷人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣强內

堅濇當是之時善行水者不能注水善穿地者不能
鑿凍善用針者亦不能取四厥必待天温氷釋凍解
而水可行地可穿人脉亦猶是也又曰冬月閉藏水
氷地拆故用藥多而火針石也宜以苦温之劑温經
散寒則已所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之也宜
以托裏温經湯麻黄苦温發之者也防風辛温散之
者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中
之邪故以爲臣血流而不行者則痛以香白芷歸身
辛温以破血散滯瀦熱則腫蒼朮苦甘温體輕浮力
雄壮能泄皮膚腠間瀦熱人參甘草甘温白芍藥酸

微寒調中益氣使托其裏也故以爲佐各剉如麻豆
大同秤水煮飲之以薄衣覆其手以厚被覆其身且
卧於暖處則經血温腠理開寒乃散陽氣伸大汗出
腫減八九再服去麻黄防風加連翹黍粘子痛腫悉
去經言汗出則瘡已信哉

托裏温經湯　治寒覆皮毛鬱過經絡不得伸越熱
伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢
體疼痛

麻黄去根節去蘆　各貳錢
防風去蘆　葛根各參錢
白芷　當歸各貳錢
升麻肆錢

火陽厥陰分野藥

甘草炙 白芍藥各壹錢半 人參
蒼朮各壹錢

右剉如麻豆大每服秤壹兩水貳盞先煮麻黃令沸熟去沫再下餘藥同煎至壹盞去查大温服訖臥於暖處卽以綿衣覆之得汗而散

垣蒲津王世祥年七十感寒濕地氣一月間得附骨癰於左腿外側足少陽之分少侵足陽明分闊六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛與藥下咽疼痛立止二十日後乘輿而腫消矣

內托黃芪酒煎湯

柴胡 黍粘子各半錢 連翹
肉桂各壹錢 黃芪 當歸稍各貳錢
黃柏 甘草炙各伍分 升麻米分

作壹貼好酒壹盞半煎至壹盞大温空心食消盡服之少時以早膳壓之使不冷大熱上攻犯上中二焦也

賈德茂男十歲四月天氣大熱於左足大腿近膝股內足厥陰肝之經少侵足大陰脾之經分出附骨疽不辨肉色漫腫皮澤木硬痛勢甚大其脉在三部細

弦按之洪緩暑有力
內托黃芪柴胡湯

黃芪 貳錢
連翹 壹錢貳分
生地 壹錢
柴胡稍 壹錢
肉桂 參分
黃柏 酒洗參分
羌活 伍分
土瓜根 酒製壹錢
當歸尾 柒分半

右作壹服酒壹盞水參盞煎至壹盞空心熱服壹
服愈

右方皆東垣及羅謙甫丹溪隨癰疽所發分野制
之也其方皆以發表爲先不過二三服而愈如癰
疽發在太陽經分野必用防風羌活陽明經分野

必用香白芷升麻少陽經分野必用柴胡太陰經
分野必用芍藥升麻少陰經分野必用獨活厥陰
經分野必用酒水多熟煎之空心服使藥下行身半已下者
必用酒水多熟煎之空心服使藥下行身半已上
者必用酒水少帶生煎之臨卧服使藥上行脈細
小無力必於本經藥中加辛熱劑脈洪大有力必
於本經藥中加苦寒劑隨證加減活潑潑地其效
如神真良醫也

辛涼解表 脈有力而數者春夏者宜之其藥則前條
東垣謙甫丹溪諸方（除托裏溫經湯）皆是也

丹呂儒人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥

白朮　連翹貳錢半　防風貳錢　川芎叁錢　陳皮　黃芩　木通壹錢半　甘艸伍分

分五貼水煎服

又治一切好酒老媼腦疽脈弦緊急且濇用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌炒人參入薑煎調壹錢重過兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已亦辛涼解表之意

赤芍藥

當歸拈痛湯　治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外臁瘡膿水不絕或痒或痛脈沉緊實數動滑者並宜服之

羌活　升麻　甘草炙　防風　知母酒製　苦參酒製　蒼朮各貳錢　葛根　黃芩酒製　茵蔯葉酒炒半兩　澤瀉　白朮壹錢半　當歸身　豬苓各叁錢

右㕮咀每服壹兩水煎空心服臨睡再服之

按此足太陽陽明三陰藥也東垣本處為治脚氣

瀑熟之劑然世人用治已上諸瘡甚驗故錄之

縮毒金粉散 兎遺 治徂瘀痛不急脹

乾葛　甘艸　鬱金
川芎　瓜蔞根　白芷 各等分

右並生爲末每服壹錢温酒入蜜調下不拘時此藥大散五臟積毒凝滯日三服

復煎散 治癰疽發背

黄蘗　黄芩　黄連
知母　生地黄 酒洗 各壹錢　防已
山梔　羌活　黄芪

麥門冬　甘艸炙
人參 各半錢　獨活
防風稍　當歸尾 貳錢　陳皮
當歸身　甘艸稍生
蓁本　五味子　蘇木
連翹　桔梗 各壹錢半　豬苓

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓隨證上下食前後服

羌活當歸湯 腦疽
黄連消毒飲 腦疽
散腫潰堅湯

黄蘗當歸湯 發背
内托升麻湯 乳癰
升麻調經湯 並瘰癧

連羌散堅湯
柴胡通經湯 馬刀
中和湯 時毒

辛平解表 不寒不熱半陰半陽者宜之

良方升麻和氣飲 治瘡瘤癤疥痒痛
甘草
大黄 半兩 煨
桔梗
茯苓
枳殼 各半錢
陳皮 各壹兩半
乾葛 各壹兩
升麻 各貳兩
白芷
芍藥 朱錢半
蒼朮
當歸
乾薑
三因方有厚朴 半錢

消腫湯 並馬刀
郭氏升麻牛蒡子散 時毒

右咬咀每服壹兩水煎按此手足太陰陽明經藥也五積散加減法世俗多用之故收入蓋欲煥脾胃勝濕和氣為治瘡之劑然臨證而不通變恐未合宜也

當歸飲子 見前

聖濟總録金鍼散 治發背諸瘡腫

皂角針 春取一半新採一半黑者
右一味不拘多少晒乾為末食後酒調貳叁錢服按丹溪曰此藥治癰疽已破未破皆用直領到潰處謂當入羣隊中用也

辛温解表 脉無労而緩者秋冬者宜之

精要十宣散

人參　當歸　黄芪各貳兩
川芎　防風　厚朴
桔梗　官桂　甘草
白芷各壹兩

右爲細末每服貳錢加至陸錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得于都下異人濟苦者不可勝數陳無擇謂此藥在第四節服者非

也早服中病者必消散

衛生寶鑑曰諸瘡痛癢瘡湯皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨其宜治之可收十全之功矣故此方用之於癰疽初發或已發或內托然瘡證脉緩澁或身倦惡寒熱少脉弦或緊細者宜用之散風寒助陽之劑也表裏氣血之藥若施之於積熱煩毒更不分經絡時宜不能無誤也丹溪曰精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言

也若用之於此小癰疽與冬月時令儘收肉托之功若於冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺若潰瘍於夏月用之其桂朴之温散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此者不分癰疽冬夏無經絡無前後如盲人騎瞎馬夜半臨深池危哉

十六味流氣飲　治無名惡腫癰疽等證

川芎　當歸　芍藥
防風　人參　木香
黄芪　官桂　桔梗
白芷　檳榔　厚朴
烏藥　甘州　紫蘇
枳殼

右吹咀水煎服

按此表裏氣血藥也復以疎風助陽之劑世俗多用之故收入非脉之洪緩沉遲緊細者不宜用此每見外科諸家載此往往不分經絡脉證不具時宜但云化毒消腫有云不退者加以補氣血之藥蓋又使人不能無疑也用者當觸類而長之

凡治瘡瘍不審元氣虚實病在表裏便服敗毒流氣等藥必有失候蓋敗毒散發表藥也果有表症

止宜二一二服多則元氣損毒愈盛雖有人參亦莫
能補流氣飲耗血藥也果氣結胸滿只宜二三服
多則血反致敗雖有芎歸亦難倚仗丹溪曰此不
係膏粱丹毒之變因虛勞氣贊所致也
千金托裏散　治二一切瘡腫發背疔瘡
黃芪　壹兩半　厚朴　防風
桔梗　各貳兩　連翹　貳兩　木香
沒藥　各叁錢　乳香　貳錢　當歸　半兩
川芎　白芷　芍藥
官桂　人參　甘草　各壹兩

右為細末每服叁錢酒壹大盞煎三二沸和滓溫
服

手執解表　脉無力而遲者陰證者大寒之時者宜之
托毒散　兒遺　治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗
附子　當歸　麻黃
甘州　官桂　川芎
羌活　石韋　龍膽州
右九味等分為末每服貳錢水一大盞薑叁片鹽
少許同煎
丹溪治一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛

骨下痛甚脉數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黄桂枝湯加酒黄蘗生附子括蔞子甘艸芍活青皮人參黄芪半夏生薑六貼而消此非内托之意歟

攻裏

内疎黄連湯 方見前

聖濟射干湯 治癰疽發背諸瘡腫痛脉洪實數者

射干　犀角　升麻

玄參　黄芩　麥門冬

大黄各壹兩　山梔半兩

右㕮咀每服伍錢加竹葉芒硝壹錢以利爲度

按此足陽明手太陰經藥也

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪弦實數腫甚欲作膿者三服消盡

大黄　牡蠣

皂角針　朴硝

當歸　瓜蔞根

黄芩各貳錢　連翹各參錢

金銀花各壹兩　赤芍藥

按此足厥陰太陰陽明經藥也

破棺丹 治諸熱腫一切風熱瘡症發熱多汗大渴便祕譫語結陽之證

大黃貳兩半生半熟芒硝
右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸病重壹丸至貳丸食後童便入酒半盞化服或白湯合酒化服
按此仲景正陽陽明經藥也

瀉心湯　治瘡毒癰腫發躁煩渴脉實洪數者
大黃肆兩　黃連　山梔
漏蘆　澤蘭　連翹
黃芩　蘇木各貳兩　犀角壹兩
右吹咀每服叁伍錢水煎服
按此手少陰太陰少陽藥也出足陽明例

清涼飲　治瘡瘍煩躁飲冷煞痛脉實大便祕結小便赤澁
大黃炒　當歸
甘草各貳錢　右水煎服
精要漏蘆湯
生黃芪　連翹
漏蘆叁兩　粉草半兩　沉香
大黃壹兩
右爲細末每服貳錢薑棗湯調下
內消升麻湯　治血氣壯實若患癰疽大小便不通
升麻　大黃各貳兩　黃芩壹半

枳實 麩炒　當歸　芍藥
甘艸各壹兩　右㕮咀水煎食前服
孫眞人單煮大黃湯 脈實沉而數膏粱食肉之
錦文大黃 酒洗去皮 軍大腑祕者詳審用之
右一味剉如麻豆大水煮服
宣毒散 治一切毒瘡其功不可盡述
大黃 煨　白芷 各伍錢
作一劑水貳鍾煎壹鍾食前服
[醫]按此方乃宣通攻毒之劑若脈沉實便祕者乃毒在臟也宜服之以絕病源其功甚大或臟腑調和而脈不實恐不可用醫林集要方大黃壹斤白芷陸兩爲末每服參錢熬酒調下更用茶清調搽患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送爲丸令可服吳江申翁憲兒背患疽木悶堅硬脈沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消恐患者忽此一藥故以所嘗治驗者告之
治背疽荊芥穗木鼈去肉大黃歸頭甘艸節除荊芥穗爲君外餘各等分酒水各壹盌煎至柒分空心向東飲卽下積與粥便止若結成者用川楝子柒枚燒灰酒下次與拾肆枚又次與廿一枚二貼後雖結亦

小矣陶氏

內托散　治諸腫毒惡瘡一服立瘥

大黃
甘草 各叁錢
牡蠣 各半兩　瓜蔞 貳枚

右剉每服叁錢水壹大椀煎柒分去滓溫服

祕傳背瘡方

大黃 伍錢　甘草節 壹錢　木鼈仁 伍枚

右先將甘草木鼈剉碎同酒水各半小椀砂銚內文武火熬數沸後下大黃煎至柒分去滓盛磁器內以青布覆之明星下露一宿五更溫服打下膿血是驗卽去用生料四君子湯煎服

漏蘆湯 見二四卷股部附骨疽條

漏蘆
紫背車螯 壹雙鹽泥固濟火煅通紅地上出火毒用
甘草 各貳錢
大黃 伍錢　瓜根 各半兩
黃芩

漏蘆去須

右為末每服貳錢薄荷湯下速利酒亦可

內消丸 寶鑑

之內消

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服

走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥真濟世衛身之寶毒藥如嶺南兩廣最多若從宦於此纔覺意思不快服之即安彼澗有草曰胡蔓草又名斷腸草陰置水中飲之即死又有取毒蛇殺之以草覆上以水洒之數日菌生其上取為末酒調以毒人始亦無患再飲酒即發立死其或淫婦多與北人配合北人回密與藥置食中乃戒之曰子某年來若從其言婦乃以藥解之過期則必死矣名曰定年藥凡北人至彼方亦宜知之若覺中毒四大不調即便服此況彼下藥時必於鷄豚等

例 奏戟

神仙解毒萬病丸 又名追毒丸 又名玉樞丹 治一切毒及蕈子
屈菜菌蕈金石或熬淫死牛馬河豚等毒或時行瘟疫山嵐瘴癘急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼及衝冒寒暑熱毒上攻或自縊或溺水或打撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或中邪狂

薄荷葉 皂角 不蛀者水煮至軟
牽牛 半斤取頭末 青皮 二味各半斤煎膏
沉香 半兩 廣茂 炮 陳皮 各壹兩
京三稜 炮 蓬莪 各叁錢

右為末入牽牛頭末用煎膏和丸如菉豆大每服叁拾丸煎連翹湯送下食後

肉投之後再食前物必發其毒急服此一錠或吐或利隨手便差昔有一女子久患勞瘵為屍蟲所噬磨一錠服之一時吐下小蟲千餘條後只服蘇合香丸半月遂如常如牛馬六畜中毒亦以此藥救之無不效者

文蛤 叁兩 淡紅黃色者搥碎洗淨一名五倍子 紙包煨以紙以研壹兩

續隨子 去殼研細以壓去油再研壹錢 伍錢

麝香 叁錢

右各另為細末和勻以糯米粥和合於米臼中杵千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如

山茨菇 貳兩

紅芽大戟 洗淨壹兩

欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雞犬之類見之合宜珍重否則無效 如瀉痘發背未破用冷水磨塗痛處并服良久覺痒立消 陰陽二毒傷寒心悶語狂胸膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下 蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯下 小兒急慢驚風

五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下　牙關緊急磨一錠外塗内服量大小用之牙痛酒磨塗及含少許吞下　湯火傷東流水磨塗傷處　打撲傷損炒松節酒下　年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太陽穴上并服之　諸般癇疾口眼歪斜眼目掣眨夜多唾涎言語謇澁卒中風口噤牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服

薛治一婦人腹内結塊久而不消又一婦人月經過期不至腹内作痛服破血行氣之劑不効服此並痊　一婦人苦頭風作暈數年亦服之吐痰碗許遂不再發　一男子疾閉水漿難下　一男子纏喉風痰涎壅盛　一婦人中風牙關緊急痰涎湧出隨服並愈　一男子便毒堅硬　一男子患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次痛即止不日而消　一男子患發背瘡頭如粟重如負石内服外塗後去三四次每去肛門如炙即日而瘳　三男子剃自效牛郎日遍身患紫泡不計其數已而俱憒各灌一錠吐瀉而甦一藥不下者遂死　一小兒感風發昏憒六日不省　一小兒驚風發

搐諸藥不效宂口灌之並蘇　一男子中風牙關緊急口出涎水亦灌之壽愈　一女子爲邪所交腹作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜更灸二三錠使烟氣盈屋遂不再至　一家患瘧屍勞兄弟五人已死者二三人有方士令服此藥遂各進一錠一下惡物如膿狀一下死蟲如蛾形俱獲生其人遂以此藥廣濟屍證無不驗者余常用治一切雜病及瘡疽等毒未成膿者甚效其已成膿者亦能殺大勢考其藥品雖不言補今贏瘦之人服之並效誠神劑也然以價計之用銀叁錢藥有七十錠可救七十人有力之家當合之以濟人近人製此往往加以硃砂雄黃考之諸方並無此味余故不用恐亂其真也識者當自知之

郭氏瑞効丸　治腸癰胃癰內積羔男子婦人積聚

證

當歸　京三稜　檳榔
木鱉子　穿山甲 炒各壹兩　牡蠣 爲末炒 甲都用
連翹　枳殼 炒各壹兩半　硇砂 焙
琥珀 各壹兩　巴豆 貳拾壹粒去油　麝香 少許

右爲末酒糊爲尤桐子大每服拾丸至貳叁拾丸

溫酒下臨臥再服如利動臟腑減先數大小便有膿血出者却用別藥調治之

萬靈奪命丹 鄭氏○又名延壽濟世膏下

脉沉實及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之

朱砂 明礬生用 黃丹 麝香 琥珀 片腦各壹錢 蕪荑子 兄研各肆拾玖个

鹽花各貳錢半 楓香 雄黃 赤石脂 輕粉各壹錢半 巴豆去殼水一煮十沸

右爲末用巴豆革麻子膏和藥爲先如和不就加

煉蜜就成膏收磁器內如用時旋丸茨實大每服壹先井花水下或湯亦得忌熱物半日大人小兒以意加減與服

一粒金丹 治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香 木香 乳香各伍分

巴豆霜壹錢伍分

各爲細末照稱分數和勻用黑肥棗一箇半去皮搗爛爲先如茨實大每服壹先量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用氷一口送藥下行盡數次以米飲補之

威靈仙飲

生威靈仙（不拘多少爲末）每服壹錢空心温酒調服逐日微利爲度戴復菴治癱疽瘡毒並威靈仙飲微利之

發表攻裏 五香連翹湯　治諸瘡腫初覺一二日便厥逆悶悸塞發寒熱

沉香　木香　麝香
丁香各壹兩　乳香貳兩　連翹
射干　升麻　獨活
桑寄生　甘艸炙各壹兩　大黄壹兩半

木通貳兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎柒分温服取利

按丹溪曰精要第二論云不問癱疽瘡瘍虛熱冷熱先與内托散五香連翹湯沉麝湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實冷熱多服爲妙夫癱疽瘡瘍臟腑陰陽有淺深虛實冷熱用藥有補瀉温凉老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損柰何欲以不冷不熱四五方而通治之又以多服爲妙此不能無疑也學者當審經絡察病機而處治豈可伏此爲通治之法乎

千金漏蘆湯　治癰疽丹疹惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆　連翹　黃芩
白斂　枳殼　升麻
粉艸　麻黃　朴硝　各壹兩
大黃　壹兩半

右除硝外每服貳錢水壹盞薑叁片薄荷叁葉同煎溫服取利爲度

防風通聖散　治時毒熱毒便秘熱燥若時毒饑饉之後胃氣虛損者須當審察非大滿大實不用

防風　當歸　川芎

芍藥　大黃　芒硝
連翹　薄荷　麻黃
桔梗　石膏　黃芩
白朮　山梔　荆芥
甘草　滑石

右水煎服或爲末白湯調下仍量人虛實

按此表裏氣血之藥也治一切風毒積熱瘡腫脉候弦洪實數浮緊氣血實盛者不可缺此見近有秘傳外科家方以是藥加人參赤芍參黃芪蒼朮金銀花名消腫托裏散雖以參芪爲主復去人參

無亦可盖使人不能無疑而難用也且臨證加減須較表裏之法如表證多者當從此方以辛甘發之裏證多者當從此方以辛苦寒之異

升麻和氣飲　治瘡腫瘰疬痒痛

升麻　桔梗
乾葛　甘草
陳皮　當歸
茯苓　白芷
枳殼各伍分　芍藥　蒼朮
大黃
半夏
乾薑

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

半表半裏中和湯　治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參　陳皮各貳錢
白朮　黃芪
茯苓　當歸
乳香　川芎
甘艸節各壹錢　沒藥
　皂角刺炒
　金銀花

右水酒各半煎服

内托散一名護心散　一日至三日内宜連進十數服

眞菜豆粉 壹兩 明乳香 半兩慢火手銀石器中炒手揩攪使乾急傾出扇冷研極細
右研令勻每服貳錢至叁錢濃煎甘草湯調下時時細呷要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之證大宜服此（如有寒而嘔逆不宜服此當用竽熱）
丹溪云此散菜豆解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補爲君乳香去惡腫入少陰性温善竄爲佐甘草性緩解五金八石及百藥毒爲使此方專爲服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理國老膏 治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述

甘草（大者貳斤）
右搥碎河水浸壹宿揉令汁濃去盡滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之（本事方有甘草壹斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也）

牛蒡粥 治瘡腫

用牛蒡根叁莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋膜汁中卽下米煮粥鹹淡任性服壹椀甚良無忌解毒散 治癰瘡始覺便宜服

犀角屑　川升麻
赤芍藥　木通各壹兩劉
玄參　麥門冬去心　甘草生劉各半兩
右每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓温服無時

清心内固金粉散又名金花散
辰砂另研　白茯苓去皮　人參去蘆
甘草各半錢半　菉豆粉肆兩研　白豆蔻仁
朴硝另研各半兩　雄黄研　腦子
麝香并研各貳錢半
右以參苓白豆蔻爲末入研藥令勻每服壹錢半

蜜湯調下無時候此藥專治惡瘡熱盛煩痛作渴煩躁此藥解毒散潮

内追毒丹　清心解毒
大朱砂　雄黄各伍錢　生麝香壹錢
生犀角　琥珀已上並別研細　黑角沉香各伍錢
右爲末煉蜜丸梧桐子大每服貳拾丸燈心薄荷湯下

精要云憤懣不遂志欲之人多犯此疾三因云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿于經絡與血俱濇而不行壅結爲癰疽不言

熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也

獨勝散　治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子（去毛令淨以生薑汁淹一宿焙乾研極細）

右無時以白湯調貳錢服之又一云疽疾多因怒氣得之若有此疾必多怒但服香附進食覺氣自有効

丹溪云獨勝散治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施於體實氣鬱之人予見吳兄厚味氣鬱而形實性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰時此以安然此等體實而又病實乃瘥千百而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子薑黃香附子甘草三味而以不老為名且引鍼灸先生與劉君為証夫豈無其故哉蓋於行氣中有補之之理耳天之所以為天者健而有常也因其不息所以生生無窮正如蒼朮活血行氣有補陰之妙故名益母胎前產後所時者氣血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯草治瀦癧亦然遠志酒　治一切癰疽發背瘡毒惡候浸有死血陰

毒在中則不痛傳之則痛不可忍傳之即不痛或膿熟在內熱逼入手不可近傳之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈

遠志 不以多少泔浸去心乾爲末
酒一盞盞調末參錢澄清飲之以滓傳于患處

越鞠丸 治六鬱牙齒作痛口舌生瘡或胸膈痞滿噁吐吞酸或腹脹腿酸等症

蒼朮炒 神麯炒 香附
山查 山梔炒 撫芎

麥芽炒 等分

右爲末水調麵糊爲丸桐子大每服柒拾丸白湯下

五香散 升降諸氣宣利三焦凍導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香
乳香 藿香 各等分

右剉散每服參錢水壹盞半煎食後溫服

補遺謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結

三證有異耳予嘗婦人海滿則行月閉一證固異然婦人情性執着比之男子十倍雖有虛證宜補亦當以執着爲慮向見樓氏婦早寡善飲形肥偉性沉毒年六十六七月間生背疽近正疼醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之嚼酒肉之毒執着之滯時令之熱卒至于陷淹延兩三月而不救可不慎歟此或多之中或鄉僻田夫忍冬酒　初發便當服此

野老百發百中

忍冬藤生取壹把以葉入砂盆研爛火酒少許調和得所塗痛四圍中心留一口又取

伍兩用木槌搗碎不犯鐵器

甘艸生剉壹兩

右二味入砂瓶內用水貳椀文武火煎至壹椀入好酒壹大椀煎十數沸去查分爲三服一日連夜進盡病勢重一日夜可二劑忍冬藤補血如氣虛及寒多人不宜用是故田夫野老百發百中也

金銀花湯　治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等證金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熟酒半鍾溫服甚者不過三五服可保無虞

槐花酒　治發背及一切瘡毒不問已成未成徂煞痛者並治之

用槐花雙伍兩微炒黃乘熱入酒貳鍾煎十餘沸去粗熟服未成者二三服已成者一二服

黃芪湯　治諸瘡退風熱

黃芪劉　黃芩去黑心劉各　麥門冬去心焙　生地黃肆兩　甘艸炙壹兩半　當歸切焙　大黃劉炒　芍藥　半夏薑製半兩　人參各壹兩　石膏碎　茯苓

右劉如麻豆每服伍錢匕用水壹盞半竹葉柒片煎至壹盞去滓空心溫服日晚再服

生地黃散　治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生地黃貳兩　川大黃劉炒碎　川升麻　地骨皮　當歸劉微炒　黃芩　木通　赤芍藥　玄參　甘草生各壹兩　黃芪　赤茯苓壹兩半

右爲散每服肆錢水壹盞中盞入竹葉貳柒片煎至陸分去滓不拘時溫服

阿膠飲子

明阿膠　粉艸各壹兩　牛膝　橘紅半兩

右㕮咀分作二服以水壹盞煎柒分去滓溫服

截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于

內

牛膝 通明者 肆兩　用酒壹椀入膠內重湯煮熔透攪勻傾出更浸酒隨意飲能飲者以醉爲度此方活人甚多

黃礬丸　服過壹兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數

白礬 壹兩　黃蠟 半兩

右和丸如桐子大每服拾丸漸加至伍拾丸溫酒送下如未破即消已破即合一百服百粒則有效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後

服之尤佳治蛇咬溶化白礬乘熱滴瘡處痛即止一方用明礬飛過研細以雞子貳个取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒放開服之膿未成者即消已成膿者從大小便出神效其功大勝黃礬丸

丹溪云阿膠飲牛膠飲黃礬丸以牛皮屬金屬土補肺氣實大腸壯胃止泄黃礬丸以蠟味甘淡入大腸有補難化國老膏以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有補性歸心歸血用之頗切善用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛亦奏捷功

托裏消毒散　治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服

之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主並忌寒涼消毒之劑

人參　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌
川芎　芍藥炒　白朮炒
茯苓各壹錢　金銀花各伍分　白芷各柒分
甘草炙　連翹各伍分　右水煎服

托裏散　治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情及諸經錯雜之邪而爲患者當各審其因而參以主治之劑其屬胃氣虛弱者當以六君子湯爲主

人參氣虛者多用之　黃芪炒各貳錢　白朮炒
陳皮　當歸　熟地黃自製
芍藥酒炒　茯苓各壹錢半　右水煎服

治癰疽初覺腫結未成可以消散毒飲子

黃芪貳兩　甘草炙
山藥炒各壹兩　鬼哩腰帶葉半兩生竹籬陰濕石岩絡石而生者妙
禾者無用其藤柔細兩葉相對形生三角
天羅生

右爲粗末每服參錢水壹盞煎至柒分入酒參盞

同煎一二沸去查溫服
神效托裏散精要 治癰疽發背腸癰痔癰無名腫毒
煩赤疼痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之
黃芪去蘆 忍冬藤葉各伍兩 當歸壹兩 捌錢
粉草灸捌錢
右為細末每服伍錢酒壹盞半煎至壹盞病在上
食後服在下食前服少頃再進留滓外傅
金銀花湯 廻瘡金銀花散見癰疽無證痛條
本事黃芪散
綿黃芪壹兩 甘草半兩 皂角刺揀紅紫者炙黃壹兩

細末每服伍錢酒壹盞乳香壹塊煎柒分去滓服
海藏云黃芪湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補也
黃芪四物湯
人參 白朮
茯苓 甘州
生薑 當歸
川芎 地黃
右多加金銀花水煎服
內固黃芪丸本事
綿黃芪 人參各半兩

右細末入真生龍腦壹錢研細生藕汁和丸菜豆大每服叁拾丸温熟水下加至肆拾丸日三服寒發熱食少

連翹　黄芪生參錢　人參貳錢
陳皮　茯苓伍分　甘草炙
白朮各壹錢　縮砂仁參分十貼煎服

右方皆以黄芪爲君甘草歸參爲佐乃實內補虛之中兼托裏也

右丹溪實內補虛法皆以參朮歸芪又甚者獨參

膏其法並見後分經條及散見潰瘍門虛實寒熱條真轉死回生之捷法也

元戎　素問寒癰疽例　經云腎移寒於肝發爲癰腫少氣脾移寒於肝發爲癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脉聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸耎而成膿如泔而稀久不能差瘡口不合變爲疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以滑碎補先主之方見久漏瘡

李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常冷脉沉微細或自汗出急用薑附之藥甚者於臍下關元着艾三五百壯待手足温泄瀉止飲食知味方可爲喜

回陽湯　治脾腎虚寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等症

乾薑炮　附子炮各貳錢　人參
白朮　黄芪各叁錢　當歸
陳皮　甘草炙各貳錢　柴胡

升麻各伍分

右酒水煎服不應薑附倍之敷藥用回陽玉龍膏清熱消毒散　治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

黄連炒　山梔炒　連翹
當歸各壹錢　川芎　芍藥炒
生地黄各壹錢半　金銀花貳錢　甘草壹錢

右水煎服

黄連消毒散　治腦疽背疽腫熾疼痛或麻木

黄連製　羌活各壹分　黄芩
黄檗各半錢　生地黄　知母製

獨活　防風
連翹各肆分　藁本
桔梗各半錢　黄芪
陳皮　澤瀉各貳分　人參
甘艸各叁分　右水煎服

黄連解毒湯　治瘡瘍燃痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

黄芩　黄蘗炒　黄連炒
山梔各壹錢　右水煎熱服

清心湯　治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧

當歸尾
防已
蘇木
人參

卽防風通聖散每料加黄連伍錢每劑壹兩水煎服

滋陰湯　治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹　山梔炒
黄連炒各壹錢　芍藥壹錢伍分
牡丹皮壹錢貳分　甘艸壹錢

右水煎服大便秘加大黄敷藥用洪寶丹

玄參散　治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢疼痛

玄參　甘草生劉各
麥門冬去心壹錢半　前胡半兩去蘆
石膏貳兩
枳實麩炒

人參去蘆　赤芍藥　黃芪
赤茯苓　川芎　生乾地黃
黃芩各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹中盞入竹葉貳柒片小麥壹佰粒煎陸分去滓不拘時温服

仲景排膿湯

甘草貳兩　桔梗叁兩　生薑壹兩
大棗拾枚

右四味以水叁升煮取壹升温服伍合日再服

排膿散

枳實拾陸枚　芍藥壹兩半　桔梗伍錢

右三味杵爲散取雞子黃壹枚以藥散與雞子黃相等攪和煎如薄粥温服壹升即瘥

本事托裏排膿生犀散

皂角刺炙黑紫者不拘多少

右置瓶中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出研爲細末每服壹錢薄酒微温調下暑月陳米飲調下

連翹飲　治癰腫瘡瘕排膿

連翹　防風去叉各叁兩　蒼耳
白芍藥　黃芩去黑心　玄參各貳兩

人參　白茯苓去黑皮　桔梗剉炒
前胡去蘆　甘草炙各壹兩　黃芪生肆兩
桑根白皮剉炒壹兩半
搗篩每服伍錢水壹盞半煎捌分去滓溫服日二
或問腫瘍何膿可排曰家嫂嘗苦癰疽連患不已烏
程凌藻湖謂針血海可以除根以長針刺之半日出
針膿血相雜臭不可聞後果不復發當是時竟無瘡
也膿從何來哉

內消　精要柞木飲子

乾柞木葉肆兩半　乾荷葉中心蒂　乾萱草根
甘草節　地榆各壹兩

右細剉每服半兩水貳椀煎壹椀分作二服早晚
各一服未成者自消潰者自乾其荷蒂去惡血萱
根下水解毒利胸膈柞木有苦刺能驅逐地榆主
下焦血病輕小證候或可倚仗

車螯散

車螯壹兩煅通赤本草云車螯消酒毒　生甘草貳錢半
輕粉伍分

爲細末每服肆錢濃煎括蔞酒調五更服轉下惡
物爲度未知再用效在五香之上本草云車螯大蛤也一名蜃

又方 車螯 肆箇黃泥固濟火煅赤出次壹枚去皮 瓜蔞 壹枚去皮 燈心 叁拾莖

右為粗末作一服酒貳盞煎壹盞去粗入蜜壹大匙和勻每用酒八分盞車螯末貳錢臘粉少許調勻空心溫服取下惡物黃涎為効

內消散 治癰疽結硬疼痛

人參 去蘆 白斂
川升麻 當歸 微炒
防風 黃芪 剉
甘草 生剉各壹兩 赤小豆 煮熟壹合

為細末每服貳錢不拘時溫酒調服

丹溪云車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其效腫消毒下積安詳穩重輕小症候可以倚仗

化毒為水內托散 凡患癰疽發背對口惡疔瘡乳花百種無名無頭及瘡此藥能令內消去毒化為黑水從小便出萬不失一此方不可秘藏不可輕

乳香 穿山甲
知母 貝母
金銀花 皂角刺

白芨
生夏
天花粉 各壹錢

右吹咀用無灰酒壹椀煎半椀去租作一服温進
不宜加減將粗搗爛加秋過芙蓉葉細末壹兩以
蜜水潤過一宿自消不必用第二服忌發物大效
仙方活命飲又名眞人活命飲　治一切瘡瘍未成膿者内
消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香　防風　白芷
貝母　赤芍藥　當歸尾
明沒藥研　皂角刺炒　天花粉
甘草節　穿山甲炮各壹錢　陳皮
金銀花各參錢

在腹募白芷爲君
在四肢金銀花爲君

在背俞皂角刺爲君　貳錢
在胸次加瓜蔞仁　貳錢
如亢瘡加紫河車草根參錢無水可知
右爲粗末大者肆兩作一劑無灰酒拾
茶鍾煎小伍茶鍾入有嘴瓶内以厚紙封口勿令
泄氣煎至參大鍾去租作三次服接連不斷隨瘡
上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無
酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鐵器服後側
睡覺痛定回生神功浩大不可臆度
潔古保安湯　治瘡托裏或已成者速潰

瓜蔞 新者壹枚去皮火焙 沒藥 通明者壹錢研 各半兩

甘草 生薑各半兩 金銀花

右為細末用好無灰酒叁升干銀石器內煎至壹升分作叁盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此

葦航紀談云戶部尚書沈詵為入仁厚一兵卒患背疽乞假親為合藥治之時旱蝗當致齋園丘猶丁寧料理藥內用酒恐市酤不中用自取酒入藥服之即愈其法用瓜蔞子一枚乳香沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九盞臨服嚼沒藥一塊飲此酒

極妙

祕方托裏散 治一應瘡毒始終常服不致內陷

瓜蔞 大者壹枚拆 當歸 酒拌 白芍藥 各壹兩半 黃芪 鹽水拌炒 皂角刺 炒 熟地黃 用生者酒拌入

甘草 金銀花 蘿蔔蒸半日四味各壹兩 天花粉

用無灰酒伍茶鍾和藥伍兩入磁器內厚紙封又再用油紙重封置湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香取出分服直至瘡愈

此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑

不傷氣血不問陰陽腫潰俱用屢効誠仙方也常治發背腦疽勢盛者更隔蒜灸若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此其功甚捷若太毒已退不作膿或不潰者用托裏潰而不斂及膿清用峻補

秘方拔毒散　治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香　沒藥　穿山甲炮　木鼈子各壹錢　瓜蔞實捌錢
當歸　甘草炙伍分　忍冬藤貳錢　牙皂角炒分　大黃生熟各壹錢半　連翹壹錢　貝母朱分

作一劑用酒水各壹鍾煎至壹鍾食前服按此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若有膿或已潰者大黃不可用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實者火邪尚在又所宜用

歸芪湯　治癰疽無頭但腫痛

黃芪　當歸　瓜蔞　甘草　皂角刺　金銀花

右㕮咀水壹鍾半煎捌分去滓入乳香酒再煎服

又方

貝母　穿山甲　天花粉

右爲末每服叁錢水貳鍾煎半鍾二十日四服其毒自在大小便下矣　可與前方合爲一貼

破毒無比散　猪牙皂角去皮如法醋炙焦黄爲末每服半錢加穿山甲全者看患人證在何處就取此處用之用以蛤粉炒爲末壹錢與皂角末相和温酒調下痂在上食後服在下食前服神効

消毒散　治一切無名腫毒瘡瘡

貝母一味去心細切一半生晒一半微炒和勻爲末病在上食後服病在下食前服酒調壹貳錢

一男子肩患毒腫硬作痛惡症迭見用白礬末叁錢糊丸以葱頭柒莖煎湯調下腫痛愁退再服諸症亦退更以仙方活命飲二劑出氷而消此秘方名千金化毒湯本礬末葱湯調服因末難服故易爲丸一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥二十服後用消毒藥甚効常治匆羌之人用此即退不用托裏藥亦愈蓋止熱毒爲患血氣不虧故也若金石毒藥發疽者尤効蓋礬又能解金石之毒也一方用礬末伍錢硃砂伍分熱酒下亦効此藥托裏固内止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏

僻之處不可不知此方或犬所傷溶化熱塗患心處更以熱酒調末服皆効

榮衛返魂湯 又名通順散 又名何首烏散

何首烏 不犯鉄 當歸 木通 去皮尖

赤芍藥 炒 白芷 不見火 藘香 炒

土烏藥 炒 陳枳殼 麵炒若惡心 加薑汁炒

甘草

右方止此玆味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加獨活每服肆錢病在下食後服病在上食前服

此一藥流注癰疽發背傷折非此不能効至於救壞病活死肌弭患於未萌之前拔根於既愈之後中間君臣佐使如四時五行更相迭旺真神仙妙劑隨證加減其効無窮何則此藥大能順氣匀血故也夫氣陽也血陰也陽動則陰隨氣運則血行陽滯則陰疑氣弱則血死血死則肌死肌死則病未有不死者矣必調其陽和其陰然後氣血匀二者不可偏廢只調陽不和陰則氣耗而血疑肌必不活如五香連翹之類是已只和陰不調陽則血旺而氣弱疾必再作如內補十宣之類是已然二十

藥亦須參用不可執一爲妙此藥扶植胃本不傷元氣蕩滌邪穢自然順通不生變證眞仙劑也用法列之于左

一發背既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外氷其血脾主肌肉脾既受傷飲食必減顏色痿瘁肌肉不生血爲脉絡血一受氷則氣不旺肌肉糜爛故必理脾脾健肉自生宜於此方中去木通少用當歸倍加厚朴陳皮盛則用家傳對金飲子又盛則加白豆蔻之類爲妙

一凡治流注可加此藥者可以動蕩一身血脉血脉既動豈復有流注乎

一流注起於傷寒傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡澁於所滯而後爲流注也如病尚有潮熱則裏有寒邪未盡散此方中可加升麻蘇葉如服此而熱不退可加乾葛如有頭疼加川芎並用萬水煎如無潮熱可用水酒相半煎酒大能行血生氣故也氣生血行病愈可必然流注須表者何也所以推其因究其源不忘病之根本也寒邪既盡表之太過則爲冷流注尤爲難治故宜略表爲妙表後第二節宜服溫平之藥乃十宣內

補是已如不効弟三節宜加附子或服四柱散數服即止溫藥亦不可多用恐增痛苦反成膿血不乾弟四節仍歸本方收効然表未盡則餘毒附骨而為骨癰夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注之敗證也流注非傷寒之罪乃醫者表之未盡也骨癰非流注之過又庸醫涼藥之過也庸醫無識心盲志聾妄稱明見雖知為骨癰而治之無法又復投之涼藥烈之毒又則毒氣滯涼藥鍋鉄器則愈附骨而不能愈矣不然則人之骨何以有癰骨而成癰非藥所治故名附骨疽又名白虎飛尸留

連周甚展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈其不愈者至於終身有之此皆失於初也其骨腐者多為副骨猶或可痊正骨腐則終身廢疾故膿白而清者碎骨初脫肉深難取膿黃而濃者碎骨將出肉淺可取宜以利刀取之詳在後章此不過治骨癰之槩耳　又有病經數月傷於刀刃羸弱拳攣咳嗽膿血壞肉陰爛者此皆冷極陽弱陰盛不可以唾紅為熱宜以好附子加減治之　又有毒自手脚頭面而起疼痛徧身上至頸項經絡所係去處如瘍瘧貫珠者此為風濕流氣之證宜以加減小續

命湯及獨活寄生湯與此方參錯用之　又有兩膝痛起以至偏身骨節皆痛婦人類血風男子類軟風此名風濕痺又名歷節宜以附子入物湯加減用之　又有癰腫在項腋兩乳傍兩胯軟肉處名爲瘰癧癰此冷證無熱宜以內補十宣散與此方參用小兒不可輕用附子恐生驚癎切不可更犯針刀薄血無膿努肉難合宜以濕熱藥貼散內消猶犯針刀生努肉亦以此藥收功倘用藥微疼略有驚癎宜用全蠍觀音散加減用之驚定藥如故事又有小兒亦患宿痰失道者癰腫見於頸項

脅脾胸背等處是爲冷極全在熟藥敷貼之功 ‖ 病須再作爲佳治法見後　又有流注大如匏瓠覆椀見於胸背其證類發而甚後用藥之後形勢一有微動即非發矣宜以內補十宣與此方隨證通變用之可以內消大抵諸證皆原於冷故爲痛者骨痛也骨者腎之餘腎虛則骨冷骨冷所以痛者所謂骨疽皆起腎者亦以其根於此也故補腎必須大附子方能作効腎實則骨有生氣疽不附骨矣凡用藥不可執一貴乎通變　凡癰疽初萌必氣血凝滯所成爲日既久則血積於所滯而後

盛作故病人氣血盛者此方中減當歸多則生血發於他所再結癰腫生生不絶斯乃祕傳醫者少知也　一凡癰疽生痰有二證一冒寒生痰此方中加半夏健脾化痰一熱鬱而成風痰此方中加桔梗以化咽膈之痰並用生薑和水酒煎　一凡腦發背發在上者此方中可去木通恐導虛下元爲上盛下虛之病難於用藥老人虛弱者尤宜去之　一凡病人有瀉者不可便用此方宜先用止瀉藥（白朮生用爲末滾開黃蜆爲丸米飲下叁拾丸）俟瀉止方用此藥蓋人身以血氣爲主病癰之人氣血潮聚一處爲膿

若臟腑不固必元氣泄而血愈寒難愈此藥大能順氣故也大抵氣順則血行氣耗則血寒氣寒則血死血死則肌肉不生投之熱藥則肌肉無元氣不足以當之徒增苦楚投之涼藥則無是理是方雖仙授要在用之得當不然則有刻舟之患矣至於流注又不可一槩論也若涼藥耗散元氣虛敗有用三建取效者其疾多緣於冷故也元當審其所辨其證的出於冷然後用之亦不可過過亦有害但陽胍回腫處紅活骨有生氣寒氣不能相附為疽即歸功本方以取效此萬全妙法　一此藥丸

散未皆可水酒湯使隨時裁度用之貴人加木香為衣病者有熱痰咳嗽富沉香蘇葉湯皆可下丸用蜜劑 一此方非但治癰疽發背傷折至於男子婦人疝氣血氣皆可用屢獲効矣有一婦人患氣疾五年發時只是塊痛嘔逆水漿不下一發便欲死用此藥為丸木香湯下一服嘔止再服氣順疾遂愈 一凡傷折類中如尋常打破傷損或傷心胞並皆詳見傷折類中如尋常打破傷損或傷心胞並皆不脫此方但加減有差治之在頭上則去木通枳殼加川芎陳皮常用加丁皮蘇葉能活血加破故紙五靈脂能破宿血水

煎熟用濃酒一盞侵入候再沸却入大黃末空心服之如通順藥只四服先二服中入大黃後二服不必用只是催發便下如不通只枳殼湯一向催如苦不通即不可治不可坐視人死而不知也補血十宣散之類 一凡傷折常用此方可去木通名何首烏散蓋首烏能扶血故也如刀刃傷有潮熱面腫氣喘乃破傷風證可服索血散葛根湯數服薑葱煎發散或敗毒散三四服外用敷貼藥依法治之無不愈者矣 一經年腰痛加萆薢玄胡索以酒煎服 一脚氣加檳榔木瓜穿山甲水煎

服之 一宿痰失道非惟人不識自仙授以來惟
余一派知之人身有痰潤滑一身猶魚之有涎然
痰居胃中不動則無病動則百病生或喘或咳或
嘔或暈頭痛睛疼偏身拘急骨節痺疼皆外來新
益之痰乃血氣敗濁凝結而成也何則臟腑氣逆
鬱結生痰當汗不汗蓄積生痰飲食過傷津液不
行聚而生痰其常道則自胃脘達肺脘而出其失
道自胃脘而流散於肌肉皮毛之間脾主肌肉肺
主皮毛故凡胸背頭項腋胯腰腿手足結聚腫硬
或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不

熟堅如石破之無膿或有薄血或清水或如乳汁
又有壞肉如破絮又或如瘰癧在皮肉之間如雞
卵浮泊於水中可移動軟活不硬破之亦無膿血
針口努肉突出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱即
皆其證急於此方中加南星半夏等藥以治其內
外用玉龍熟藥以拔其毒便成膿破為良其輕無
膿者必自內消如熟極痰壅則用控涎丹（紫大戟 甘遂 白芥子等分為末米糊為丸）如遍身腫硬塊大如盂盆生於喉項
要處者尤為難治夫血氣和暢自無他病氣行不
順血化為痰痰復失道則血氣衰敗不能為膿但

能爲腫硬理必然也此證陽少陰多隨證用藥回陽生氣補血控涎外則用後法作起一身氣血引散冷塊萬一腫不消不作痛不爲熟體氣實無他證肉塊與好肉無異此又一證也切不可輕用針刀自戕如艸醫曾用針灸陰爛其肉或用毒藥點脫使人增寒壯熱法當通順其氣血於此方中加升麻以除其寒邪用飲口結痂之藥以安之使爲疼贅而已萬一病自作臭穢糜爛不免動刀則有妙劑可以代刀不可輕泄（即白蘞枯朴硝二味爲末敷之）一肚腸內癰宜服十宣散與此方相間用之並加忍冬藤此藥最治內癰但當審其虛實或通或確確須用附子通則用大黃如不明虛實則此方皇自肺通順十宣自能內補可無他變至於肺癰作嘗飲食有碍胸膈微痛即是此證急須察脉審其虛實虛則用此方加附子相出入用之若稍再作即用十宣散內補之即自消散實則用此方加大黃略通之使毒氣下宣爲妙蓋肺與大腸相表裏故也如內癰已成宜以海上方與此方加減參用之喘咳膿血者肺癰也大便有膿自臍出者肚癰也忍冬藤甘草節煮酒妙

龍虎交加散　治發黃癰疽發腦發髻發髭又治脛
虛頭暈風濕之病
製藥法
南木香 對碎用紙墊鍋焙乾爲細末 鬱粟殼 去頭穰筋炙焙乾爲細末
甘艸 用濕紙裹煨焙乾爲細末 吳白芷 麪裹煨去麪焙乾爲細末
川芎 濕紙裹煨焙乾爲細末
右件藥末各另包收看瘡加減用之
加減法
若瘡勢紅腫熱大先服如神托裹散一貼卧蓋取
微汗如紅暈大腫高瘡頭有似碎米大白膿點者

可進交加散一貼用木香 陸分 鬱粟殼 貳錢貳分 甘草 陸分
白芷 壹錢肆分 川芎 壹錢半 共爲一貼用水柒分生白酒
參分共壹盞用銀器煎分如無銀器新瓷器亦
好不用銅鐵舊器於炭火邊先滾五七滾用細絹
水濕扭乾濾去粗食後服以乾鹽菜壓之粗敷瘡
四圍用襄絹帕包之如惡心嘔吐即服護心散一
貼止嘔次服前藥若胸腹膨滿或大小便閉澁可
服當歸連翹散一貼行五七次用温米粥湯補止
如瘡已成潰膿不寒不熱止是爛開疼痛木香 參分 甘草 陸錢 川芎 壹錢半 白芷 壹錢肆分 粟殼 貳錢 水伍分酒伍

分合煎捌分服若紅暈白者好也仍紅其瘡不退若紫黑稍可如紅暈不退每日於晩進藥一貼與交加散四五貼可服當歸連翹散一貼要行加大黄只有熱腹不脹不用大黄如瘡患要瀉灯腐肉不脫可用針刺破皮令隨膿出將水紅花根煎湯洗之用生肌散摻上每日洗一次依此法無不効有蛆者難治最忌酸辣醬麵發氣并生冷之物

護心散　治證見前交加散

甘草炙壹錢　菉豆粉　朱砂

右爲細末作一服白湯調下

當歸連翹散　治證同前

當歸　連翹　梔子仁

芍藥　金銀藤各壹兩　黄芩伍錢

右㕮咀每服伍錢用水貳盞煎至柒分空心温服要行加大黄貳錢待藥熱入大黄煎一上一沸去粗服

如神托裏散　治發背等瘡初起又治斤瘡一切腫毒及發散傷寒

蒼耳根　兎耳草根

金銀藤　五味子根

右㕮咀每服五錢用生白酒貳盞煎至柒分去租
服卧盖取微汗祖再煎
生肌散
水紅花葉
右為細末先用水紅花根剉碎煎湯洗淨却用葉
末撒瘡上每日洗一次撒一次
前鋒正將 治一切癰疽不問發眥發背作瘭疼痛
其効如神
荆芥 薄荷
老公鬚 天花粉
山蜈蚣
菇美

菇片 敗荷心
猪牙皂角 切炒赤 川白芷
紅内消 倍其數 甘草
右為末每服貳錢薄荷茶清調下欲快利用酒調
服効若服經日未見効恐是涼藥澁血可加當歸
羌活如熱重雄黄酒調乳癰加萇草根研汁調其
餘候只用酒下不飲麥門冬去心煎湯亦可但較
緩耳
引兵先鋒 凡用内消先用此藥退潮止瀉解熱以
升麻葛根湯表散後服此

木通　瞿麥　荊芥
薄荷　白芷　天花粉
甘草　赤芍藥　麥門冬去心
生乾地黃　山梔子　車前子
連翹各等分

右剉每服貳錢燈心生地黃煎熟潮加淡竹葉煎溫服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活

加味十奇散主內護治癰發已成未成服內消一二五日不効或年四十已上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而止內能固濟去舊生新又名固壘元帥

當歸酒浸　桂心不見火　人參
土茯苓　白芷　防風去蘆
桔梗　厚朴去粗皮薑汁炒　甘草炙
乳香　沒藥並別研

右件藥各等分研爲末每服貳錢酒調日二三服病愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極効

右洗淨入砂盆內研酒以好酒溫起濾去粗頓服未効再服一二服必愈

敷貼溫藥 戴院使云發散諸般毒多碾白芙蓉葉入草烏末少許蜜調傳重者加入南星末凡諸毒用敷貼藥欲散搓入麝香欲潰搓入雄黃冲和仙膏〔二名黃雲膏〕冷熱不明者用之茶酒隨證治之

川紫荊皮 伍兩炒〔紅肉〕又名內消

赤芍藥 貳兩炒 白芷 壹兩〔不見火〕 獨活 叁兩炒〔不用節〕 木賊〔又名望見消〕又名陽

槐花 壹兩炒〔焦色〕 胡桃 拾个新鮮不油者

右二味入砂盆內研爛如泥熟酒調和粗溫服如能飲酒人多飲愈効一醉後而癰腫散矣

蒴藋散 治癰疽發背及一切瘡毒等證如神

蒴藋草〔其葉長如牛舌其氣如豬臭者〕 小薊根

五爪龍〔即五藤〕 生大蒜

右四物各等分細研用酒和勻濾去粗服一小椀得大汗通身而愈

又方 治諸般癰腫神效

新掘天門冬〔一味約叁伍兩〕

右五味並爲細末用法詳見于後

夫癰疽流注雜病莫非氣血凝滯所成遇温即生遇涼即死生則散死則疑此藥是温平紫荆皮水之精能破氣逐血消腫獨活土之精能止風動血引氣拔骨中毒去痺濕氣更能與木臘破石腫堅硬赤芍藥火之精微能生血住痛去風木臘水之精能生血住痛消腫破風散血白芷金之精能去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不煩作風去則血自散氣破則硬可消毒自散五者交攻病安有不愈乎

一凡病有

三十證治有三十法如病極熱則此方中可倍加煞荆皮木臘少用三品亦能消散之但功少遲耳如病極冷則此方微加赤芍藥獨活亦能活血而消散之功亦稍遲而不壞事病

一如病熱勢大盛切不可用酒調但可用葱泡湯調此藥熱敷上葱亦能散氣故也血得熱則行故熱敷如病稍減又須用酒調酒能生血遇熱則血愈生酒又能行血遇温則血愈行矣

一瘡面有血泡成小瘡不可用木臘恐性粘起藥時生受宜用四味先敷後用木臘蓋在上面覆過四圍以截助攻之血路凡敷藥

皆須熟敷乾則又以元湯濕透之使藥性濕潤而行病自退矣　一如用正方四面黑暈不退疼古皆無血色者是人曾用冷藥太過不可便用玉龍蓋肌未死也恐藥力緊添痛苦宜於此方加肉桂當歸以喚起死血自然黑暈退見功效血回即除加藥只以正方取效　一如用正方痛不住可取酒化乳香沒藥於火上使溶然後將此酒調藥熱塗痛止　一流注筋不伸者可於此方加乳香敷之其性能伸筋故也　一如疽口有赤肉突出者其證有三一是着水二着風三是刀破後刀口番

突宜以此方加少南星以去風用薑汁酒調其不消者必是膏醫以手按出膿核太重又以涼藥涼了皮以致如此若投以熱藥則愈瘰此又有口訣焉宜用白礬柿村硝二味為末敷之次用硫黃末撲之外服藥衛加對金飲外貼沖和一若病勢熱盛者不可便用涼藥熱盛則氣血壅會必多大凉則血退不徹返疑於涼故宜溫冷相半用之血得溫則動挾凉則散可用此方加對停洪寶丹用蔥湯調塗貼之　一此方乃發背流注之第一藥也學者當通變妙用表裏相應則病在掌握之中但發背甚者死生所係惟此藥功最穩

重終始可恃決無變壞若發之輕者草醫亦能取
效然有變證流弊之患此無他發於陰則非草醫
之可治矣豈如是劑兼陰陽而並治奪造化之神
功哉至如流注一疾雖不能死人而十有九爲廢
疾廢疾流連死亦隨之縱有醫之能愈者亦必半
年周歲之後方見其效此乃百中之一然終爲殘
弱之身矣惟吾此派仙方藥奇效速萬不失一端
有起死回生之效非言所能盡述夫流注乃傷寒
餘毒故有表未盡者餘毒客於經絡氣血不勻則
爲熱流注所謂醫之能愈者熱也熱病少見有表

散太過氣血表者餘毒流入腠理腠理或踈或密
爲冷流注所謂醫之難醫者冷也冷病常多故傷
寒表未盡者非特爲熱證皆原於腎虛故作骨疽冷則氣愈滯而血愈積
故但能爲腫而不能爲膿若醫者投之以涼劑則
所謂冷其所冷而陰死於陰惟有壞爛腐肉毒氣
着骨而爲骨癰流爲廢疾故曰骨癰者流注之敗
證也流者動也注者住也氣流而滯則血住而凝
氣爲陽血爲陰陽動則陰隨氣運則血行吾所以
能移流注於他處而散之者取其能動故也動則

可移陽既移而動矣陰豈能獨住而不隨之者乎是故以獨活引之者以其性能動盪氣血也引之一動則陰陽調和不能為膿而散之於所移之處勢必然矣　一流注在背膊腰腿緊要處當用此方厚敷患處却單用獨活一味末之酒調敷塗一二層路其盡處以玉龍膏之此移法也使血氣趨於他所聚於無緊要處作膿又或消之若以成膿則引不下急將此藥拔之出毒氣免作骨疽如庸醫用了涼藥犯了針刀使成骨癰非藥所愈又待其碎骨出盡方愈若怯用針刀取之則用玉龍治法在

後若正骨出無治法副骨出可安　一方用白芷紫荊皮酒調以內消初生癰疽名一勝膏又方只用赤芍藥木鼈紫荊皮作箍藥名二勝膏　一方治大人小兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落而未斷用雞白軟皮袋了舌頭用破血丹蜜調塗舌根斷血却以蜜調和蠟稀稠得所調此正方敷在雞子皮上取其軟薄能透藥性故也如在口溶散勤勤添敷三日舌接住方可去雞子白皮只用蜜蠟調藥勤勤敷上七日全安學者觀此則知通變活法妙用不在師傳之功如無速效以金瘡藥參錯

治之尤妙　一治癰腫未成膿不可便用洪寶丹敷貼頭上恐爲冷藥一氷血凝不消不能成膿反能爛肉只用此方敷貼如不消欲其成膿却以玉龍貼癰頭以燥之次用此正方在玉龍之下四圍用洪寶丹箍住以截新潮之血又若病未甚氷於涼藥者玉龍之下不必用此方上以洪寶丹圍之一如救壞病未見可用玉龍只用此方自然穩當免病人苦　一發背初生未成單用紫荆皮末酒調箍住自然撮細不開服藥止用柞木飲子乃救貧良劑也　一此方加南星草烏二味三味分之

二熟酒調敷諸癰可以潰膿不痛若單玉龍要洪寶丹箍住實此法妙　一猘犬咬人單用紫荆皮沙糖塗留白金丹退腫嚼杏仁置口中去毒　一法加南星草烏二味與此方各二半熱酒調敷可治久損至妙　一小兒軟癤用此方加軍薑酒調敷若初發即用此方酒調敷成膿而止若初發時用紫荆皮本蠟酒調敷可以必消切不用洪寶丹　一癟疽心火熱毒也見於五心痛不可忍其狀如泡瘡而血赤外形雖小內有熱毒在心腌者難治在手足心者可療然治之須早稍遲或在心腌

則腐肉粉碎神仙莫醫凡有此疾在手心則用洪寶於手心環圍敷之以截其血却用沖和於手心留口收功在足心則用洪寶敷在脚脛交骨四圍一二寸長以沖和收功如前

神功散　專治發背癰疽一切疔毒并瘰癧等瘡已未成患者効驗不可備述

川烏頭炮去皮尖　川黃檗炙去粗皮

右二味爲細末後各等分用小兒或大人唾津調成膏如唾少嗽口水亦可發背癰疽等瘡纔起者敷於患處留頭候藥乾用淘米水常潤濕每日換

藥敷一次如瘡已成重患將潰爛者先將棍枝艾葉煎湯頓温將瘡洗淨用絹帛展去膿血以香油潤患處用綿紙仍照患處剪成圓錢留頭貼上後用藥塗於紙如乾依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不可手擠如敷藥後病人覺瘡生疼痛減熱即愈如生肌則腐肉自落腐而不落者剪割亦可最不宜用針發背不宜貼膏藥凡醫瘡屏去別醫止飲別藥方可治忌氣怒房事勞役并孝服體氣飲酒之人飲食忌酒并羊雞魚肉瓜茄薑辣之物若因氣怒反復發腫者依前治之如治對口

并腦疽不必洗去舊藥逐次添藥恐動瘡口惹風也

圍藥 南星 草烏頭 黃檗 白芨 各貳兩 五倍子 炒壹兩 右為細末調如糊隨血圍匝如墻壁可移險處於不險處如神效敷藥 白斂 白芷 天南星 白芨 貝母 各等分 右為末水調傳外用圍藥束定內用傳藥提起制之有理

將軍鐵箍膏 治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓走注毒氣

鹽霜白梅 南星 大黃 蒼耳根 各壹兩 白芨 白斂 防風 川烏頭 草烏頭 各半兩 雄黃 各叁錢

右為細末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以鷄羽蘸水掃之日換二三次大妙

又方 治一切癰疽腫毒 草烏 貝母 天花粉

南星　芙蓉葉各等分
右用醋調搽四圍中留頭出毒如乾仍用醋潤之
按此方藥性温和常用不問陰陽腫潰並效

正鐵箍散
貝母去心　白芷
各貳兩　或加龍骨貳錢尤妙
右爲細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散
芙蓉　豬卷皮　木鼈子各肆兩
白芷　黄檗　寒水石

赤豆　白斂　貝母各貳兩
大黄　熟荆皮　白芷
眞地青　芙活各壹兩　防風半兩
右爲細末凉水調圍癰四畔如肉脆去白芷白斂
加生地黄地榆用芭蕉油調傳熱甚者用三消散
水黄散　圍腫毒

犀角屑　大黄
草烏皮尖　白斂
朴硝各等分　麝香
右爲細末蜜醋調薄攤油紙上稍乾揭下再添潤

濕貼之即消

外用漬毒藥　治諸腫毒堅硬不消

升麻　葛根　鼠黏子
地骨皮　金銀花　黃花地丁
甘艸生各等分

右爲麁末每用伍柒錢水壹升煎拾沸於腫處四畔熱用冷則再煖圍腫方

白斂　草烏　白芨
黃檗　朴硝各等分

右爲末用蜜醋調圍腫外即便收起

神白膏　貼五發未破

南星　大黃　草烏
白斂各半兩　蚌粉　大柏皮各壹兩

小赤豆壹兩　加乳香沒藥光妙

右爲末取芭蕉頭研取油調角四畔

雄黃散郭氏　治癰疽發背紫暈疼痛不止

栗米小粉炒　草烏頭　南星
絡石　百合各壹兩　白芨貳兩
乳香　沒藥　雄黃
黃丹各半兩

右爲極細末溫水調敷之

治無名腫毒或背疽 治法腫圍定名鐵井欄
芙蓉葉重陽前收研末 蒼耳端午前收燒灰存性
右同研細以蜜水調敷之
烏龍膏一名烏金散 治一切腫毒癰疽收赤暈
木鼈子去殼 半夏各貳兩 小粉肆兩
草烏頭半兩
右於鐵銚內慢火炒令轉焦為細末出火毒再研
以水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣或用
醋調亦得
宣毒散 初發或灸後敷貼消腫收赤暈圍聚

露蜂房炙兩炒焦 南星
小米壹合 赤小豆各壹兩
生草烏貳錢半 生白礬半錢
右為細末用淡醋調塗四畔乾即再上
拔毒散 癰疽腫結通用能散能潰
南星一等者壹兩 草烏頭
木鼈子仁壹箇 白芷各半兩
右為細末分兩次法醋入蜜調敷紙貼之
蝕毒散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿
大南星壹兩 貝母柒錢半 白芷

赤小豆　直僵蠶（炒各半兩）　雄黃貳錢

右爲細末初用醋調敷後用蜜水調敷

退毒散　癰腫通用

木鼈子（去油）　大南星　半夏生

赤小豆　白芷　草烏（連皮尖各等分）

右爲細末硬則法醋調敷熟煨則蜜水調敷

神功妙貼散　塗敷癰疽暈內使膿血化爲水出收

暈斂毒

大南星（圓白者）　蓖麻子仁（各肆錢）　五倍子（次紅者）

半夏生　白芷（稍片）　薑黃

貝母　白芨（各叁錢）

乳香（各貳錢）　花蕊石散（貳貼）　沒藥

右爲細末夾和井水入蜜調敷瘡色黯晦薑汁調

敷從暈邊抹收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡

開大全用紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片

如瘡勢先貼藥上次後貼瘡久年蓬仰上竹葉亦

得竹葉出水藉藥以行之凡敷藥須是細末則不

痛

特異萬靈散　治癰疽發背腫毒等患神效

軟石膏（燒通紅鹽覆在泥地上二宿）　大白南星

赤小豆　草烏連皮尖各半兩　乳香貳錢別研
右爲細末蜜水調成膏從外抹收入留最高處如
錢多敷如瘡已破切忌藥入瘡口恐痛飲毒排膿
不致潰爛屢効
治冷癰青硬無頭陰毒并瘡疥毒瘡皆効
生鍊銹　輕粉各貳錢　白松香壹兩半
麝香少許
先將鍊銹松香爲細末入銚內加麻油壹兩慢火
煎數沸離火待熱少退入輕粉麝香末攪勻即爲
膏矣收貯量瘡大小攤貼患處

飲瘡內消方　黃明膠壹兩水半升鎔消入黃丹
壹兩再煮二十五沸又放溫冷以雞毛掃在瘡口上
如未成即塗腫處自消
凡癰不問已潰未潰者以膠壹片水浸令軟隨腫大
小貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發
之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣
治發背祕法李北海云此方神受極奇祕以甘草參
大兩生搗別篩末大麥麵玖兩於一盤中相和攪
令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜和
如餅劑方貝大于瘡一分熱傅腫上以油紙隔令

通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消

隔皮取膿法 治諸般腫毒

驢蹄 細切壹兩炒 蕎麥麵壹兩 白鹽半兩

草烏 肆錢去皮 雄黃 細研

右爲末水調作餅子慢火炙黃出火毒研米醋調成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

雄黃散 治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黃 槟榔 川大黃 黃蘗 騏驎竭 各柒錢半 麝香 研壹錢

黃連 壹兩 白芷 木香

苦蘬 桂心 各半兩 當歸 炒叁錢

右爲細末用臘豬脂調令勻塗於絹上貼腫處候膿潰後卽用膏藥搜膿生肌

萬應針頭丸 濟生

一粒卽愈 治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者

麝香 貳錢 血竭 如蠟者用散者不用非眞也

輕粉 蠍酥 舌試辣者 硇砂 各叁錢

片腦 壹錢 蜈蚣 壹對全用

右爲極細末煉蜜和丸爲劑如瘡有頭者用針頭

挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈　如兩腋見無頭瘡即是暗疔即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥封蓋忌鷄鴈酒濕麵一切發熱之物

針頭散保命　治瘡瘍熾腫木硬

右以乳香壹錢同研勻細以兒乳汁和如泥入磁石盒收之乾不妨每用以唾調搽少許點於腫處上以膏藥貼之毒氣自消縱然有瘡亦輕萬槌青雲膏　治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿拔毒追膿腹中瘡塊貼塊上　瘡疾貼大椎及身柱其効如神

白松香壹斤去木屑　銅青參兩　乳香　輕粉貳錢

右共作一處用鐵槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯中做不見火

敷貼熟藥鬼遺方云凡癰疽外令內疼者由陰氣外逼用熟物熨之大熟亦不覺者須用熟物熨令透膚

手便用緊急漬膿藥使膿外出盡腫平即用生肉煖
瘡和正氣藥令進飲食不倦
治癰疽發背初腫時方
風化石灰 貳兩 細辛 壹兩
右為粗末用熟醋傳患處乾再傳三上其腫即消
四虎散 治發背初生筋脉緊急不舒
大南星 半夏
附子 生去皮 壹兩 天南星 方無附子有草烏各等分
狼毒 各半兩
右四味為末熟酒調成膏攤上腫處以熟絹覆定
覺患處如火燒不妨

回陽玉龍膏
草烏頭 叁兩 炒 南星 壹兩 煨 軍薑 貳兩 煨
白芷 壹兩 不見火 赤芍藥 壹兩 炒 肉桂 半兩 不見火
此方治陰發背冷流注故椎風久損痛冷痺風濕
諸脚氣冷腫無紅赤者冷腫不痛者足頑麻痺婦
人冷血風諸陰證之第一藥也用熟酒調塗用法
詳具于後
夫雜病雖見於皮膚手足之間而因必本於五臟
六腑蓋臟腑之血脉經絡一身晝夜運行周而復
始一臟受病必見於本臟脉息所經之處即陰陽

分手足之所屬也爲病有冷有熱熱者易治冷者難療夫冷必由臟腑元陽虛弱然後風邪得以乘間而入血氣不勻遂自經絡而客於皮膚之間脈息不能周流遂澁於所滯愈冷則愈積而不散復加庸醫用涼劑而內外交攻則其爲病鮮有不危者矣學者當觀其外之爲證而察其內之所屬表裏相應萬無一失此藥有軍薑肉桂足以熱血生血然既生既熱而不能散又反爲害故有草烏南星足以破惡氣驅風毒活死肌除骨痛消結塊換陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦生肌肉

加以酒行藥性散氣血雖十分冷證未有不愈端如發寒灰之焰回枯木之春大抵病冷則肌肉陰爛不知痛痒其有痛者又多附骨之痛不除則寒根透髓非尋常之藥所能及惟此藥大能逐去陰毒迎回陽氣住骨中痛且止肌肉皮膚之病從可知矣當斟酌用之不可太過則爲全美一發背發於陰又爲冷藥所誤又或發於陽而誤於藥冷陽變爲陰滿背黑爛四圍好肉上用洪寶丹把住中間以此藥數之一夜陽氣回黑者皆紅察其紅活即住此藥却以沖和仙膏收功如不效欲作膿

又以南星草烏加於沖和用之如陽已回黑已紅惟中間一點黑爛不能紅者蓋血已死可以朴硝明礬又云白丁香硇砂乳香用雞調勻於黑紅交處作一圈上用沖和蓋之至明早起藥自然去黑肉如割却以藥洗之拔以生肉合口藥收功一丁流注冷證多附骨肉硬不消骨寒而痛筋縮不伸若輕用刀針並無膿血若止有乳汁清流或有瘀血宜用此藥敷之若稍緩止以軍薑白芷肉桂草烏等分熟酒調敷骨寒除而痛止則氣温和而筋自伸肉硬自消矣然治流注不可無木蠟以其能

破積滯之氣消堅硬之腫最妙又不可多多則能解藥性蓋此證主於濕藥故也　一鼓椎風起於中濕或傷寒餘毒又或起於流注之壞證或起於風濕虛痺此證有三一是兩膝相搕行步振掉膝脾脛骨微腫一是膝脾脛骨交接處大如椎腿胶肉消皮縮裹骨三是上腿腫大下胶冷消蓋足膝屬肝肝經有風寒濕氣則血脉不流而作此遂爲膝寒所凝凝流不動下胶之血脉有去無返是以愈瘦愈冷而筋愈縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熟而肉愈瘦其原若起於流注則肉凝

者爲爛爛則冷毒腐骨骨一出神仙無術未破則肌肉尚未死急以此藥熟酒調敷膝脗骨上腿處以住骨痛回陽氣又以冲和塗下腿冷處引其血氣使流動而不通貫血脉又以此方敷脛骨交處以接所引之血脉又以散所積之陰氣內用追風丸倍加乳香以伸筋如法服之無不愈者如人欲出方可用五積散加薑桂疋歸又加大川芎牛膝檳榔木瓜或茶或酒調之一男子婦人久患冷痺血風手足頑麻或不能舉動可用綿子來袋此藥在中心却以長長纏在痛處用絹袋繫定此藥

能除骨痛附在肉上覺皮膚如蟻緣是其功也如痺可加丁皮柴胡黃芩追風九表裏交攻去病如神一風脚痛不可忍內用追風九外用此方加生麵薑汗調熟敷欲得立止可依法加乳香沒藥化開酒調爲效一久損入骨者蓋因墜壓跌撲傷折不曾通血以至死血在所患之處久則如雞肺之附肋輕者苔癬之暈右年少之時血氣温和尤且不覺年老血衰遇風寒雨濕其病即發宜此方熟酒調敷內則用搜損尋痛九表裏交攻爲效雖然血氣虛弱之人病

在胸肋腰背之間者謂之脫疽不除變爲血結勞不論老少年遠近歲大而徧身小而一拳半肘臂之則一此等乃根蒂之病則非一劑可愈磨以歲月方可安未成勞者易已成勞者難　一法只用南星草烏加少肉桂能去黑爛潰膿謂之小玉龍此法大効　一治石癰用此方熱酒調敷外却用洪寶攙在四圍待成膿後破　一婦人乳癰多因小兒斷乳之後不能回化又有婦人乳多孩兒飲少積滯凝結又爲經候不調逆行失道又有邪氣內鬱而後結成癰腫初發之時切不宜用凉藥冰

之蓋乳者血化所成不能漏泄遂結實腫核其性清寒若爲冷藥一氷凝結不散聚久而外血不能化乳者方作熱痛蒸逼乳核而成膿其苦異常必爛盡而後已故病乳癰者既愈則失其乳矣蓋乳性最寒而又滯以凉劑則陰爛宜也然凉藥亦未嘗不用用於既破之後則佳如初發之時宜於此方中用南星薑汁酒兩停調勻熱敷即可內消欲急則又佐以草烏此藥味性烈能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰如已成癰腫則又從中和倣常法用之或加此草烏南星二味亦可破後觀其

原原於冷用冲和收功原於熱用洪寶生肌且須用乳没住痛以減其苦至於哮藥只用瓜蔞散隨人虚實參以通順散十宣相間服之多口者為乳發乳房堅硬者為乳石正在乳嗽處腫者為吹乳在乳嚢下為乳漏以肉懸垂而血易滿故也故為難治一嚢一口為乳癰五十歲老人無治法外有老人乳節又為可治蓋在垂嚢肉上為癰若近胸則為節矣一宿痰失道癰腫無膿者可用此藥點頭病必旁出再作為佳不然則元陽虚耗此為敗證如元陽虚耗敗證者急用全體玉龍散之

拔出成膿服藥則通順散加桔梗半夏當歸肉桂等藥若病紅活熟驟則當歸冲和為佳切不可誤投凉劑此方但能拔毒作膿病回即止不可過若能參用陷胸神劑尤妙出外科精要一肚癰一證十有九死蓋胃屬陰外寒裏熱凡氣血潮聚趨熱避寒故多為内癰不能外現間有微影欲出則又為冷藥所觸及服凉劑雖有神仙莫施其功醫者可不慎乎凡有此證初覺腰痛且以手按之痛若走閃移動則為氣塊若根不動外面微有紅腫則為内癰急以此方拔出毒氣作成外癰然後收

功冲和內則用通順散加忍冬藤治法如前若癰自能外現者不必用此方只用冲和爲妙不可輕用針刀如犯鐵器口不能合只用玉龍貼癰頭上四面以冲和圍之依法自破若膿流不快依法用洪寶三分薑汁七分茶調敷之膿出皆盡內用十宣平補生肌外則依然收功冲和此證陰多陽少損人最甚將安之際倍服內補以生氣血庶幾易愈否則消而復脹口不合既安之後尤宜多服內補加附子否則氣弱難平證冷者未破之先尤宜先服附子方好既破之後切不可用急澁飲口之

藥恐食毒不散服藥力到自然合口至於內癰已成不能拔出只用冲和外貼使在外温和成膿自臟腑而出不至內爛死生所係全在服藥之功治法見前最忌毒食食毒即發反復難療又有孕婦病此者又與此異內用紫蘇飲安胎勿輕與他藥若臨月則兒與膿俱下若尚遠則膿自太肠中下若初萌只服藥可消若癰在外面其證必熱惟可用冲和收功亦須審輕重用之恐有誤也

敷貼涼藥 鬼遺方云凡癰疽外熱內疼者是有客邪內有積毒欲作膿透之候

洪寶丹 又名金丹 四黃散

天花粉 叁兩　赤芍藥 貳兩　薑黃 白芷 各壹兩

右爲末茶酒湯使隨證熱塗諸般熱證癰腫金瘡此藥一涼而已能化血爲水又能使血瘀積又能涼肌生肉去死肌爛肉又能破血退腫又能滯氣爲浮能止痛又能爲痛閉膿又能出膿一反一復此方藥性無他遇涼效少遇熱效多故非十分陽證不可輕用恐或疑寒治療費力若夫金瘡出血非此不可乃第一藥餘外但可爲前二藥之佐使

爾當審之審之　大抵此三藥可合力同功者可獨將專權者可分司列職者可合圖交攻者可借援求救者可勇力相持者可正兵先鋒奇兵取勝者可奇兵先鋒正兵取勝者神聖工巧端與兵法無異然兵隨印轉將逐令行故立功取勝存乎其人苟非明理通變之士何足言哉用法如後　一若病勢太熱可用熟茶調敷如證稍温則用酒調若用以攝膿可用三分薑汁七分茶調何也此藥最凉能使血退薑汁性熱能引血潮故血退則被引血潮被逐進退相持而後成膿作破逼膿盡流

也　一凡瘡口破處肉硬不消者瘡口被風所襲
也此方中加獨活以去風用熟酒調如又不消則
風毒已深肌肉結實又加紫荊皮有必消之理矣
一此方莫善去金瘡及諸熱證赤腫斷諸血根
不使瘀赤若癰疽不可輕用恐貼處不散貪毒入
內在骨則成骨癰在喉項則毒氣聚喉在胸背則
陰爛臟腑在腹肚則為內癰殺人不救可不慎哉
只以沖和玉龍依法詳證用之為妙　一年少血
壯之人衰老血敗之士如有濺血無藥可止血盡
人亡若在手足可用茶調敷手足上下尺餘遠若

在胸背腰腹則全體敷之把住血路方能止却用
斷血藥（五倍末方見金瘡條中）或神効軍中方於臼方得安
愈　一治金瘡重者筋斷脉絶血盡人亡如要斷
血須用繩及絹袋縛住人手臂却以此方從手臂
上用茶調敷住血路然後却用斷血藥按口却不
可使內補及四物等藥却又能令人發嘔吐甚則
口眼喎邪少焉發熱成破傷風只可下對金
飲加川芎白芷薑棗煎自安却徐徐補血如或有
破傷風證又須用破傷風藥即葛根湯之類（方見）
後瘡口用軍中方加九肋鼈甲酥炙碾　一凡金

瘡在頭面上者血不止急用此方茶調圍圍數頸上截血瘡口邊亦用此敷軍中方捺口重者十日輕者三日効　一凡金瘡着氷肉者可用薤汁調此方敷瘡口兩旁以火微炙之或燒早稻稈烟熏之瘡口水出即愈如無水出即是風襲可用南星茶調敷之即愈然後以軍中方捺口妙　一治婦人産後或經絶血行逆上心不能生或吐血鼻衄舌衄可以此方用井花水調敷頸上生艾汁調亦妙其血立止然後服藥以絶原如舌衄必有血泡破之復脹可用線於舌根頸縛住勿除於頸

項上截血內用黃芩荊芥涼心之藥以收其原舌上用蜜調結口之藥以治之泡破除線血不脹矣服涼心藥四物湯加荊芥薄荷硃砂　一此方用藥調塗熟毒恐隨乾隨痛赤腫不退當用雞子清調敷諸熟毒難乾妙湯火瘡同　一打破傷損在胸膈上者藥通血不下可用菜豆水調此藥末吞之即吐出而安又有從高墜下用通血藥不下敷日病人幾死此必天時寒凍服大黃等藥氷之血凝片不行可用熟酒調重薑末飲之片時血通人得更生蓋借熱性以活死血則前藥方能行矣

治發背初發時小後五七日赤腫高即看藥令內毒
散減疼免牽引乳香膏

乳香壹兩　青薄荷葉肆兩洗乾

右研勻厚看患處以青絹盖之如乾以新汲水潤
之常令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用氣
毒攻結不可用

金黃散　貼癰毒令內消

白芷　白芨　白斂

右等分為細末用新汲水調傳

治陽證腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹壹段刮去青兩頭留節開一小
竅入草在內滿後却用油灰塞竅從冬至日放葉
缸內待立春先一日取起竪在有風無日陰處二
十一日驗雨竅好却破竹取草為細末用水調傳
藥性論甘蕉根搗傳一切癰腫上乾即更傳無不瘥
者

梅師治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即
死速消方搗苧根傳之數易效

諸瘡腫痛不可忍者以桑花根去黑皮搗爛若稠黏
井花水少許若不稠不須用水以紙攤如膏藥貼

之立効
又方芙蓉葉搗爛罨立効晒乾爲末水調傅亦妙
治發背蝸牛百箇活者置淨甁內新汲水壹盞浸甁
中封閉自晚至曉其水如涎取水將真蛤粉不拘
多少調之刷瘡上効
治背癰與癤久年煙壁土黃檗等分爲細末生薑汁
捏成膏傅之夏月以茅香湯下壹貳錢妙(經驗)
七寶散(本事) 治癰疽止痛拔毒
乾荷葉心當中如錢片(不拘多少)
右爲末每用參匙水貳盞慢火煎至壹盞半放溫
淋洗乾以太白膏傅之
太白膏 寒水石(研飛過) 用臘月豬脂調成膏隨瘡大
小薄紙攤貼之
天花青露散 罨圍一切腫毒
白芨 白薇
白芷 朴硝
青黛 黃檗 老龍骨(各壹兩)
天花粉 大黃(肆兩)
右爲細末醋蜜調均如疽毒未成則當頭罨退若
已成四面圍之中留頭用替針膏貼之

消腫散　圍癰腫毒一切瘡癤並治

大黃　水仙子　山藥
苧根　青露　小赤豆
寒水石　水蕳薑　香蛤粉
花蕊石

右將前藥搗和如乾加醋蜜調勻如痘毒未成則當頭癤退若已成四面圍之留一頭用替針膏貼之

神護膏　圍癰一切腫毒

小赤豆　黃皮　白斂
白芷　天花粉　南星各等分

右為末陰用米醋與蜜水同陽用當陸根亦用芭蕉油此是邵色婆黃金散加黃皮為主

水澄膏　秘方圍敷腫毒

鬱金　白斂
五倍子各壹兩　乳香
雄黃各伍錢

右為細末水調敷如熱極者用臘水尤妙

五金膏三名葵花散

黃葵花柒朵　川連貳錢去須
黃檗伍錢　川鬱金叁錢　山梔叁个肥者

右為末井華水調成膏傳此藥性急宜速打之
清凉膏　治初患癰腫瘡瘭熱煽疼痛消腫毒
大黃（不拘多少）
右為細末用漿水調攤貼之醋摩亦得
治諸瘡腫不散者
右取白藥根搗爛傳貼乾則易之無生者用末新
水調塗之亦得
治諸瘡腫馬毒瘡
右以馬齒莧水煮冷服壹升及塗瘡上治濕癬自
禿以馬齒膏和灸塗之效治緊唇面腫搗汁塗冬

用乾末水調塗治丹毒發背腫搗傳之不住者以
藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傳之尤良治三
十六種風結瘡取馬齒莧壹石水貳石一斗煮之
澄清內蠟叁兩重煎之成膏塗瘡上并服之
清水膏　治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔
瘍腫抽熱毒散腫氣
川大黃　黃芩
羊桃根　黃檗（各壹兩）　赤小豆
菜豆粉
右為細末用芸薹菜取自然汁入蜜少許相和調
藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻

攤可厚一錢許貼之乾卽易

水調膏　治癰疽毒熱赤炊疼痛

川大黃生用研末　杏仁去皮尖研　鹽花各叁分

右爲細末研令勻以新汲水和調稀稠得所旋卽塗腫上乾卽易之

水澄膏郭氏　治風熱腫毒赤紅色攻炊疼痛不止

白芨　白斂各肆錢　鬱金壹對

大黃　黃檗　黃藥子

榆皮各錢半　乳香　沒藥

雄黃各半兩

右爲細末用新汲水壹椀藥末不以多少澄於水內藥定去水敷於腫處上用白紙封之用雞翎掠此水濕潤

二黃膏　治一切腫毒

黃檗　大黃各等分

右爲末用醋調搽如乾以水潤之

揭毒散

大黃壹兩半　白芨壹兩　朴硝貳兩

右爲末用井水調搽如乾再搽

按此二方乃寒涼之藥若瘡瘍炊腫作痛屬陽

之證宜用之或微腫痛而不赤者恐不宜用蓋氣血喜溫而惡寒若冷氣入裏反爲難治之證矣

三消散 退極熱證赤腫炊開者

朴硝 焰硝 大黃
梔子 炒黑色 寒水石 南星 各等分
右爲細末生地黃汁調塗貼芙蓉葉搗汁調亦可四面楚歌 敷諸般疽發腫赤痛不可忍未成角散已成角破至瘡口合而止

荊芥 和根劉碎 赤芍藥 大葉皮
土當歸 山大黃 土白芷

天南星 赤小豆 商陸根 劉片炒
白芨 赤飲 白飲
草烏 寒水石 煨或炒 各等分

右爲末生地黃汁調角四畔或苦蘆根汁腫用商陸根研汁未潰則滿塗上或有未起處則留出瘡口

水師晶明 治諸發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去故肉生新肉洗後淨乾再用角貼摻藥

一日一次

大柏皮 澤蘭 莽草

荊芥　赤芍藥　山大黃
土白芷　土當歸　獨活 各等分
右剉細散用水壹斗入葱白大椒橘葉同煎熏洗如已爛入猪蹄下脚水骨肉煎可免乾痛淨洗爲度

黥藥癮疹有小白頭者初起即以膏子點之毒輕者自消毒重者出水甚至流黑汁而愈最甚者即未散亦大殺其毒矣

硇砂膏　治癮疹腫毒并治瘰癧點落肢痣等

硇砂 生用 壹錢　石礦灰 壹兩 炒黃色　白丁香 叁錢 炒黃色

黃丹 半斤 生用　碱 壹斤 淋水伍碗

前四味研爲極細末次將碱水煎作壹碗成膏待冷以前末入膏和勻藏磁器中不應毒物以此膏點之白丁香即麻雀兒屎用堅矢者不用軟糞者

六灰膏　治發背疔瘡癤子腫毒癮疹瘡痔瘡痣子肢子其功用與硇砂膏同也

灰莧　桑木　棗木
喬麥科　茄科 各燒爲灰　石礦灰 研細
右件多少不妨和勻湯泡水淋淋下之水煎成膏

如糊裝磁器中一應毒物以膏點之若點瘡瘡瘡待爛去少許再點之再爛去如是漸漸點去援生膏 治諸般惡瘡及瘰癧鼠瘡纔起者點破即愈

血竭 壹錢　蟾酥 輕粉 各叁錢
麝香 伍分　雄黃 伍錢　乳香
沒藥 各壹錢　以上藥俱為極細末

右用蕎麥稭灰或桑柴灰壹斗叁升淋灰湯捌玖盆用栗柴或桑柴艾武火煎作叁盆取壹盆收留將貳盆盛於好磁器內候温將藥末入灰湯內用鐵瓢或桑柳枝右攪又用好細石灰壹升入藥灰湯攪勻取出候冷遮宿盛於小白磁罐內凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留灰湯和用

灸法

癰疽初發小點一二百間急以大蒜頭橫切如錢貼其中心頓小艾炷灸之五壯而上若形狀稍大以黃稈紙蘸酒全貼認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯止又法屈指從

四圍壽按遇痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之更於別處灸若或大腫即搗蒜爲餅焙乾釀法醋灸熟更換頻頻熨之更換熟餅頻熨如覺患處走散即以綿帛覆蓋勿令氣泄候少間數藥凡癰疽展大如龜之形且看頭向上卞先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以

白芷 參分　漢椒

桑白皮 各壹分

連鬚葱白 拾片

右㕮咀水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可以辨驗頭尾

神仙隔蒜灸法　治一切癰疽腫毒前論言之詳矣凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至痛其毒隨灸而散此拔引瘡毒從治之法也信有同生之功其法用大蒜頭切二分厚安瘡頭上用艾炷於蒜上灸之五炷換蒜再灸未成即消已成殺其大勢瘡患大以蒜杵爛攤患處將艾鋪蒜上灸之蒜敗再換瘡色紫或白而不起發不作膿不

大痛不問日期最宜多灸
神効葱熨法　治流注結核骨癰鶴膝等症腫硬或
先已隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而
行壅滞其功甚大又爲跌撲傷損止痛散血消腫
之良法用葱白頭搗爛炒熱頻熨患處冷再換
神効桑枝灸　治發背不起或瘡肉不潰此陽氣虚
弱用桑枝燃灭着吹熄焰用火灸患處片時日三
五次以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔
其陰疽瘡癆流注腫毒瘡久不愈者亦宜用之
大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則
補陽氣散餘毒生肌骨其陽症腫痛甚或重如負
石初起用此法出毒水即肉消日久者用之雖潰
亦淺且無苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用
此也
砭法　治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用
細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筯一根破開頭
尖夾之用線縛定兩手指輕撮筯稍令磁芒正對
患處懸寸許再用筯一根頻擊筯頭令毒血遇刺
皆出毒入腹脹悶者難治
豆豉餅　法見無證痛條