
Inches
Centimetres
KODAK Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2000
Kodak
LICENSED PRODUCT
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


教会雑報
滝科

内閣文庫
181
60

瘍醫準繩卷之二

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

潰瘍

大法癰疽已破膿出者是也　集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脉之洪數漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿根腳赤暈反展開闊或

不痛或大痛此毒氣不退金銀白芷散十宣散去厚朴桂倍入參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角瓜蔞根消毒之藥春宋夏間及秋初宜加酒芩黃連黃檗羌活腰已下可去桔梗見膿後須以補氣血藥為主解毒藥助之或不宜於補藥者宜忍冬丸四圍腫煞處用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮服藥脉得和緩為佳或破後不潰瘡口堅硬者風也用蜈蚣蝎散傳之或蠹肉不腐用雄黃輕粉數之大忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃或兼他證又另議藥治腐肉不知痛痒正黑者可去之但不傷四畔好肉及

裏面良肉當去外之黑腐者下皆去黃白如絮之狀膿內有紅血絲路又不可動此項大膿次日必自脫落庶免傷其良肉若怕刀砭二四日必自脫落但用刀去者新肉易長毒氣漸消凡腐肉亦有少臭氣腐敗去後則無變四圍腐者漸漸去令淨用長肉膏貼間日用豬蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下面良肉色白而平略無紋理亦不能如米如粟不見漸生之意或膿水清淡或臭此積毒內連五臟血氣枯竭乃是危證肉不能長氣血不榮衛氣不護瘡則

風寒着之用北艾黃芪湯熏洗生肌長肉藥傅之用乳香膏長肉等膏貼之或肉雖長起色紫者遺毒也用地榆湯活血散敷追毒膏貼之即自紅活瘡口漸收仍用長肉膏貼或瘡口痒用細茶葱鹽煎湯熱洗或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消即使長肉必防流注之患或更迷違瘡口如錢大時恐轉他證危殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可便去膏藥 鬼遺方云凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一二尺已上者其赤腫煽熱者即用緊急收赤腫藥圍定不令引開中心即用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止矣（內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬）薛 膿熱而不潰者陽氣虛也宜補之如聖愈湯之類 瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑柴火灸之 一不作膿膿不潰氣虛也托裏

消毒散去金銀花白芷連翹三味加參朮肉桂如不應暫用十全大補湯一腫赤作痛血疑滯也本方加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲一膿出反痛氣血虛也去三味加參芪歸地一潰後食少無睡或發熱者虛也宜補之內補黃芪湯之類一倦怠嬾言食少不睡者虛也宜補之黃芪人參湯之類一寒氣襲于瘡口不斂或陷下不斂者温補之十全大補湯脉大無力或濇而微肌肉遲生者氣血俱虛也峻補之十全大補湯倍用參芪一肉赤而不斂血虛有熱也托裏消毒散去三味加熟地丹皮一肉黯而不斂

陽氣虛寒也前散去三味加參芪白斂官桂一漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也前散去三味加人參白朮如不應加黃耆桂更不應急加附子一肉白而不斂陽氣虛也前散去三味加參芪歸朮一膿多而不斂氣血虛也前散去三味加參芪歸朮一膿用十全大補湯一飲食少思而不斂胃氣虛也前散去三味加參芪如不應暫用補中益氣湯一飲食難化而不斂脾氣虛也前散去三味加參朮如不應暫用六君子湯一又不應佐以八味丸一膿多而帶赤血虛也前散去三味加歸地參朮如不應暫用八珍

湯加牡丹皮（出血作痛發熱在後）

辨膿 集驗云脈緊而數爲膿未成緊去但數爲膿已成以手按上熟者爲有膿不熟者爲無膿按之牢硬未有膿也按之半軟半韌已有膿也大軟方是膿成也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之即復者爲有膿也不復者無膿也小按便痛薄皮剔起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深也淺者宜藥點破高突者宜鈹針深者宜烙更詳虛實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久積陰生陽寒化爲熱以此潰必成瘻宜早服內塞藥以排之諸癭瘤疣贅等至年衰皆自內潰不一於補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒熱蒸渴經久不消其人面色萎黃被熱上蒸已成膿也（治見本條）手足指稍及乳上宜膿熟大潰方可開之麻豆後肢節上癰稍覺有膿便須決破遲則成竇曲之疾

（膿成宜急破之）

取膿 凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按

之白良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消　夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿成則宜針疽膿成則宜烙切宜熟視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用替針先自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不可用針刀也（丹溪云精要論戒用針刀業外科者當拳拳服膺）

皮薄者用替針丸

替針丸　治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香（壹字）　礬砂（壹字）
乳香（各壹字）　以上　沒藥

石灰餅藥內種糯米拾肆粒其法用石灰伍升爐

灰叁升以水伍升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至叁貳升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米拾肆粒種在皮紙面上二宿即是

右為細末糯米飯丸如麥粒大每用壹粒未破用津貼瘡頭薄處即破膿滿不快則用壹粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

又方

雄雀糞（貳拾粒）　礬砂
沒藥（各壹字）

陳倉米

右研勻以米飯丸如粟大每用壹粒貼瘡口眼中
即潰膿出
替針丁香丸
草烏尖　礬砂　白丁香 即土者
右為末酸醋調點將破者令速潰若急則無知刀
快蜆針一法亦妙見後
梅治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀
糞塗頭上乾即易之雀糞中豎者為雄
本事治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥綵
即膿出巴豆壹枚去皮膜不去心油鹽豉拾肆粒

口中含去皮令軟同研爛真麝香少許如黍丸入
少稀糊捏作餅子如鼠糞大大小臨時看瘡口縱
之只以紙撚子送入藥須更必痛忍之良久膿遂
出
丹出一切瘡口用出蛾蘭殼燒存性無灰酒調下每
服壹枚服下一个時辰便有瘡口兩个
精癰成膿宜針其鐵用馬銜鐵為之形如韭葉兩面
皆利可以橫直裂開五六分許取其毒血如覺病輕
須先灸而後裂　婁按癰如椒眼數拾粒或如蜂窠

蓮房而膿出痛不除宜用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各灸之亦佳不必裂也

皮厚毒深宜烙

靈鈹針者末如劒鋒以取大膿 素夫癰氣之息者宜以針開除去之 病疑篇王注云息瘜也死肉也今世用刀割去死肉者是也

治腐腫者刺腐上視癰大小深淺刺大者多血小者深之必端內針為故正長刺節論○大者多血小者深之八字衍文也大小深淺之法盡矣備矣

精疽成膿宜烙可用銀篦大二寸分長六寸火上燒令赤急手尉烙毒上得膿為效

鬼遺 凡癰覺在虛處及眼不見處皆是惡症如發高腫紫赤皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼煽不破者宜用熟銅鍼於油火上燎透先用墨筆點定却當頭以鍼淺刺入隨針出膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紲紲入針孔引出膿毒當時腫退可及三七分如腫不退是一逆也腫疼不退疼不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕二逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害稍緩即恐傷筋骨內疼凡近筋脉骨節處不得亂行針烙及致他病也 患疽初

生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅當用熟鉄大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作紙子紙入候次日取出其膿即隨紙下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙 凡患發背覺似有膿成便用大熟鉄針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通紅烙入可二寸許初入肉即須橫抽入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰氣更不得用針烙如是橫長赤引開闊當須兩頭下炙針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也尤宜詳審不可造次便行針烙亦看患人氣脉勻和榮衛氣不節滯血脉不致疑澁即行針烙無畏切須仔細患人氣虛脉氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不

可用針烙 丹或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難究者既前無內托之藥先致力於內後又不用烙以開竅脉膿何由出 膿本肉腐所成皆挾毒熟之氣若久留肉腠間則毒氣浸淫好肉亦化爲膿腐此所以烙法有功於潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐痲而脇取利也

發表 一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而無表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈 一男子風寒咳嗽胸背及張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而歛 一男子患癰將歛遍身作痒脉浮以消風散二服而止更以托裏藥而愈

攻裏 薩一人胸患癰燃痛煩躁發熱作渴脉數而實時季冬守謂此熱毒內畜須捨時從證欲治以內疎黃連湯彼以時當隆寒乃雜用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連翹山梔四劑出水而消 羅謙甫治賈倉使父見發背癰潰而飲酒燃痛發熱服黃連解毒湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便秘脉實者用清凉飲治之

已寒 羅至元壬午有王伯祿者年五十七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼亦脉沉細而微脉症俱寒舉瘍醫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔起之膿清稀解待日再開之加吃逆不絶彥和與丁香柿蒂湯兩服稍緩待日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸二十七壯又處以乾薑附子木香沉香茴香羌活類藥咬咀二兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎亦應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆屬心火是定理也此症內外相反須當捨時從症非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸症悉去飲食進瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者大人之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣況醫乎守常知變豈可同日而語哉 陳錄判母治案 見腦疽

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促吃逆不絶不得安卧時有昏憒

香
益智仁
羌活
黑附子 炮去皮臍 肆錢
沉香
茴香
陳皮 各壹錢
木香 壹錢半
乾薑 炮各參錢
甘艸 炙貳錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦温以附子乾薑大辛熱温中外發陽氣自裏之表以爲君羌活苦辛温透關節炙甘艸甘温補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒爲佐瘡氣内攻氣聚而爲滿木香茴香陳皮苦辛温治痞散滿爲使也

右咬咀作一服水參盞生薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時温服忌一切冷物

補虛 薛一童子腋下患癰不欲膿清脉大倦怠懶食少寐自汗口乾以内補黄芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不朱肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可 一男子腰患毒膿熟不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈此火後患瀉氣遂爲癇疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必

難治療慎之　一婦人患臂癰瘡口甚陷膿清不歛彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈　一婦人患附骨癰久而不歛致腿細短軟脉來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脉澁遲緩者易愈以其有胃氣故也脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未發也洪滑麤散者難療以其正氣虛而邪氣實也　一男子腰中患此發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿

也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸朮膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生大凡癰疽藉氣血為生若患而不起或潰而不腐或不收歛及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦治膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脉大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收歛怯弱之人多不起發不腐潰及難於收歛若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若瘡瘡流注之證尤當補益否則

更患他證必難措置慎之　一上舍年踰四十因怒
脇內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不
赤按之微痛予謂怒氣傷肝致血傷氣鬱為患以小
柴胡湯對四物倍用芎歸黃芪貝母肉桂治之彼謂
丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主又云凡瘡
未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用況此證為氣血
疑滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證俱
臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予謂急者先治遂
以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當
歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪肉桂芎歸

數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成針之
却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血
疑滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲
以益其虛況各經氣血多寡不同心包絡胸脇小腸
肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證
正屬膽經少血之臟入年四十以上陰血日衰且脉
證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主乃補
氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫熾
痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍
亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲

老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥槩治結腫之證以致取敗者多矣

趙無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而色赤想是平日多服金石藥毒發所致問之果然因令侵晨飲羊血三五升始用退熱解毒生氣血之劑協以生肌膏半月後肌生膿少寧因歸令服此藥百餘貼方可安全二月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不服脉之沉微甚因知其氣血止可供給瘡平而已於眞氣則已竭不可治卽古人所謂死於瘡結

疤之後果不出半月而死不獨此膿出後之虛若因虛而發癰疽者亦然若以常法攻之則氣血不勝藥力之散而愈虛邪得以乘機入內多成不救

加味十全湯 治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸　當歸
川芎　茯苓
芍藥炒　陳皮各壹兩
粉草炙　桂心
烏藥米錢　五味子各半兩

右�once咀每服壹兩用水壹椀生薑伍片棗貳枚同

煎分作二服留查晒乾爲末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱症之緩急時之寒熱加減用之

丹溪云加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實爲切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平痛寬遂以爲安漫不加省往往于結痂後兩三月或半年虛證乃見醫者不察病者不悟無補接調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言悶不答肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾於臂背腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予爲作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者太半病者自喜呼吸有力補藥應效以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸子作料煎飲子頓服之予諫之不聽因而不救書以爲警云

補中益氣湯　治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脈洪

大而無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆炙壹錢　甘草炙各壹錢　人參伍分　酒拌　當歸　白朮炒各壹錢　升麻　柴胡　陳皮各參分

作一劑水貳鍾薑參片棗貳枚煎壹鍾空心服

人參養榮湯　治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色萎黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥壹錢半　人參　陳皮

黃芪蜜炙　桂心　當歸酒拌

白朮　甘草炙各壹錢　熟地黃酒拌

五味子炒杵　茯苓各柒分半　遠志去心炒伍分

作二劑水貳鍾薑參片棗壹枚煎捌分食前服

四君子湯　治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜

於前湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參　茯苓　甘草炙壹錢　白朮各貳錢

右薑棗水煎服

六君子湯　治脾胃虛弱或寒凉尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈即前方加陳皮半夏

異功散　治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

四物湯　治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致脯熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮以補脾

熟地黃　當歸各叁錢　芍藥貳錢　川芎壹錢伍分

右水煎服

八珍湯　調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸 酒拌　川芎
熟地黃 酒拌　人參
茯苓 各壹錢　甘草 炒伍分

作一劑水貳鍾薑棗各片棗貳枚煎捌分食前服

十全大補湯　治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參　肉桂　地黃 酒洗蒸焙
川芎　白芍藥 炒　茯苓

白朮 炒　黃芪 鹽水拌炒
甘艸 炙伍分　當歸 酒拌各壹錢

歸脾湯　治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不准晡熱內熱或唇瘡流注等症不能消散潰斂

白朮　白茯苓
當歸　黃芪 炒
龍眼肉　遠志肉

酸棗仁 炒各壹錢　木香 伍分
人參 壹錢　甘艸 炙參分

右薑棗水煎服

黃芪入參湯 治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢氣所觸者

黃芪 貳錢　人參
麥門冬　蒼朮
升麻　五味子
甘草 各壹錢　黃檗 炒肆分

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

白朮
陳皮
當歸身
炒麴 伍分

托裏當歸湯 治瘡瘍氣血俱虛瘡口不歛或脯熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等症

當歸　人參
熟地黃　芍藥 各壹錢
川芎
甘艸 各伍分　右水煎服
柴胡

內補黃芪湯 見癰疽兼症痛條

人參散 治癰疽內虛不足

人參　白朮
枸杞子 各壹兩　熟地黃

白茯苓
黃芪 對各貳兩

桂心　白芍藥　當歸微炒
甘草炙各半兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞入生薑半分棗叁枚
煎至陸分去滓不拘時温服

麥門冬湯　治癰疽潰後膿水不絶

麥門冬去心　黄芪剉
白茯苓去黑皮　人參去蘆
當歸切焙　遠志去心
甘州炙錢半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半入生薑半分擘碎大
棗貳枚擘破同煎至壹盞去滓空心温服
護壁都尉　治諸發已潰未潰空心温服

宜補之此潰後服至愈而止

防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炙　苦梗
白芷　黄芪炙各半兩　川芎
甘草　柳桂　當歸各叁錢
人參貳錢

右為末每服貳錢空心温鹽酒調服至瘡口合後
更服為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見
六味丸一名六味地黄丸　此壯水之劑夫人之生以腎為主

凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血瘡水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃（生者自製者捌兩）　山茱萸肉　山藥（各肆兩）
白茯苓　牡丹皮　澤瀉（各叁兩）

右地黃杵膏餘爲末蜜和丸桐子大每服柒捌拾

丸滾湯下

八味丸　治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多旋溺即前方加肉桂附子各壹兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸　治症同前即六味丸加肉桂五味子各壹兩

東垣離疽用藥加減法　如發背疔腫膿潰前後虛而頭痛者托裏藥內加五味子　恍惚不寧加人參茯神　虛而發熱者加地黃瓜蔞根　潮熱者加柴

胡地骨皮ヲ 渴不止者加知母赤小豆ヲ 虛熇者加枸杞天門冬ヲ 自利者加厚朴ヲ 膿多者加當歸川芎ヲ 痛甚者加乳香ヲ 肌肉遲生者加白斂官桂ヲ 有風邪者加羌活細辛ヲ 心驚悸者加丹砂ヲ 口目瞤動者加羌活細辛ヲ 嘔逆者加丁香藿葉ヲ 痰多者加半夏陳皮ヲ

作痛 丹溪云膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此爲虛也宜補之（托裏消毒散去後三味加參芪歸地） 脉數虛而痛者屬虛火宜滋陰（托裏散加生地） 脉數實而痛者邪氣實也宜泄之 脉實便秘而痛者邪在內也宜下之（定痛托裏散） 脉濇而痛者氣血虛寒也溫補之（東垣黃芪人參湯丹溪云芎藥乳香之類） 亦有癢氣所觸者宜和解之（敗毒散去羌活加防風桂枝之類） 若有亦有風寒所逼者宜溫散之 膿爲脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之或用利刀剪之腐肉堵塞者去之

丹 權小娘瘡後右腿股生癰破後筋吊疼脉虛而濇詢之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

當歸頭 條芩
川芎 牛膝
生地黃 甘草炙貳分
黃檗 青皮炒

檳榔 伍分　通草 參分　桂皮 壹錢
右煎食前熱飲之
人參　黃芪　當歸
川芎　厚朴　防風
桔梗　白芷　官桂
紫草　木香　甘草
右入糯米壹撮水煎服
餘見後兼證痛門宜參看

發熱 戴院使云未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見鬼神膿去已多而大熱不休者似為難治蓋毒之得膿猶傷寒表證之得汗汗已而反大熱則為壞傷寒矣又云患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴縱有發熱躁擾等證不可以治宜用益榮生津之劑若大熱不止者難療　脉浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣（補中益氣湯）補血（四物湯）也宜補血（四物湯）為主（四物湯）

午前熱補氣為主（人參養榮湯）午後熱補血為主（四物湯聖愈湯）　脉浮數發熱而痛者邪在表也宜散之（黃芪六一湯）　脉沉數發熱而痛者邪在內也宜下之

膿瘡發熱煩躁或出血過多或潰膿大泄或汗後亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也若發熱無寐血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕氣血虛也用八珍湯大渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也用四君加薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發熱者重陽無陰也當峻補其陰治者詳之

托裏消毒散加減法

川芎羌活若外邪在表也本方加頭痛發熱邪在表也本方加毒散頭痛惡寒表而元氣實者暫用人參敗參芪發熱飲冷便祕內虛也去金銀花連翹二味倍黃芪發熱飲熱便祕內熱也去參芪歸朮加大黃面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去連翹金銀花白芷三味倍黃芪當歸加熟地當歸補血湯身熱惡衣欲秡於水脉沉微細氣脫發躁也去三味加肉桂附子如不應暫用附子理中湯若婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語

或夜間熱甚病在血分也去三味加生地黄牡丹皮柴胡如不應暫用加味四物湯

一男子膿熟不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之膿涌出熱益甚乃虚故也急以人參黄芪湯二劑熱愈甚此藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虚發躁宜當歸補血湯主之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脉洪大按之無力此氣血虚寒也用十全大補加麥門五味治之其症益甚仍用前藥加附子壹錢四劑諸證悉退却去附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰吐痰作渴頭痛惡寒或熱來復去或不時而動仍用補中益氣數劑諸症漸愈元氣漸復乃去附子再加肉桂五分百餘劑而愈

一男子背瘡不斂小便赤澁腎腫發熱口乾體倦脉洪數而無勞用參芪歸朮熟地芍藥陳皮麥門五味炙草肉桂以補元氣引火

宿食宜下

歸經脉症益甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉桂又數劑而愈此症因前失補元氣故耳　操江伍都憲背瘡愈後大熱誤為熱火用苦寒藥一鍾寒熱益甚欲冷水浴身脉浮大按之全無余曰此陽氣虛浮於肌表無根之火也急用六君子加附子二劑即愈

外舅于見素膏粱厚味四十三歲疽發于背瘍醫投五香湯躁熱欲狂予固沮之而後已潰後平靜一日熱復大作五六日益甚脉洪數無倫醫皆以為虛宜補予私計膏粱之變重以五香之熱當治以苦寒且大便不行數日矣盍下之以泄其毒乎乃研石膏末兩許知母二三錢甘草為一劑命僮熾炭注水而煎之隆冬潰瘍無用白虎法余故復加石膏兩許而置大黃片五錢於袖中湯既沸則以袖籠藥銚若為移遠火者而潛下大黃於銚中時妻叔二三輩皆環爐坐注目而視不覺也夏生語于聲甫飲是藥必死別去聲甫以告余哂之藥成持以飲舅少頃大便下結糞及食物未化者滿行清中熱退身涼乃以四君子湯調之月餘而平先是每旦診脉皆言不思食食

少而瘡大去死肉多自慮何以生肌飲已乎予信之初意其便溺阻隔而漫下之亦不知為傷食發熱也夏生愧甚遂徙去

黃芪散　治癰潰後補虛去客熱

黃芪　石膏各貳兩　知母
麥門冬去心　白芍藥　白茯苓
桂心　熟地黃　人參去蘆
川升麻各壹兩　甘艸炙微赤半兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓溫服日三四服

當歸補血湯　治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若候服白虎湯必死宜此主之

黃芪炙壹兩　當歸酒拌參錢

作一劑水壹鍾半煎陸分服

沉香散　治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香剉　柴胡去苗　黃芪
麥門冬去心各壹兩　甘草生剉各半兩　熟地黃貳兩
黃芩　瓜蔞根

右剉每服肆錢水壹中盞入竹葉貳柒片小麥伍

拾粒煎至陸分去滓不拘時溫服
加味逍遙散　治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒
寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽
乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛
或胸乳腹脹小便欠利
甘草炙　當歸　芍藥酒炒
茯苓　白朮炒　柴胡各壹
牡丹皮　山梔炒各柒分
右水煎服
梔子黃芩湯　治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝
不到發熱不住用以退熱
滿蘆　連翹
黃芩去心　防風
生甘草　生犀角屑
若參各去蘆　茯苓去皮各貳錢半
右為粗末每服肆大錢水壹鍾煎至陸分去滓溫
服
寒集　一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪
太料四劑而止膿水尚多投八珍湯加桂數劑漸少
惟瘡口不合以附子餅灸十全大補湯每劑加炮附

潰後忌五香飛忌散忌大黄下積

子五分數劑乃去附子又服月餘而愈一男子潰後畏寒脉虛以四君子加炮薑四劑而愈以十全大補湯月餘而愈仲景云脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和養血信矣

嘔逆 丹溪治一老人年七十云云見兼症嘔條

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食方見內癰門肺癰條下

禁忌 丹 五香湯即五香連翹湯去射干大黄升麻連翹加參犀角若用於腫瘍猶可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用於潰瘍雖多有參芪甘草之緩補而走泄大多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎

清要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香美益其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾土若香美者但能起火經以熱傷脾熱傷氣為戒今曰益脾養氣若施之於腫瘍者似有暢達之理潰瘍後用香美恐有發瀑熱損真陰之患矣

精要云熱盛脉數與漏蓋湯皁煮大黄等湯不甚熱脉緩弱只投五香連翹湯夫熱盛脉數若腫瘍將臟腑秘而體實者猶可與大黄若潰瘍後膿血出多者

膿出忌追毒丸

熱盛脉數去死爲近其可下乎緩弱之脉古人皆以爲邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

渴忌追毒丸

精要云初成膿宜用烙得膿利爲効亦服神仙追毒丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膽湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則

潰後咽痛忌琥珀犀角膏

津液生氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示脉症何以知其當下後又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脉症恐是但有大渴必與峻下下後尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪于不得內托以致熱毒衝心與琥珀犀角膏夫於腫瘍時用之猶或近理若於潰瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不妨病邪致虛以速其死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪

潰後寒熱思正氣散

用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰體虛縱有舊熱將自漸退膿血而消何必以峻冷利動臟腑若在秋冬何異用刀劍耶

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱解大汗出不可專以爲有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此證者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是温散瀉衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之

元戎合順正氣散

瀉衛可乎若用於腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又未知用於腫瘍耶潰瘍耶

鬼遺 穴有孔愼風仍愼再合如再合者爲風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣害人之命也 三因瘡瘍未合風入爲破傷濕二者害人最急會卒不知其因甚難認治離疽瘰癧潰後尤宜謹之

追蝕膿毒癰之薄皮剝起離疽之瘡口緊細瘰癧火針破核之後皆可用追蝕破膿之藥離疽開後瘡口

再閉宜用藥紝以通之或用紙或用髮或用乾稻草葉皆可塗撚紝塗以蟾酥硇砂白丁香巴豆寒食麵之類或用五灰膏隨輕重塗紝用之瘡疽腐敗可用手法去之或用金寶膏去之或用雄黃輕粉傳之多待數日亦自脫落疽破後有蟲肉努出者逶志末酒調塗之則漸漸消去如不消用五灰膏塗之則消癰疽久流膿水不腐不敗氣血不能滋養瘡口滯毒日漸內侵好肉而為膿水過處漸成瞙管如鵝毛管而軟其瘡口如魚嘴樣日久不能愈筋爛骨壞用金寶膏或塗或紝或封之一日三四次用之不耐痛

者二日二次用之其蟲肉瞙管消盡以滋潤膏藥貼之

薛新甫云瘡瘍之症膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫丹溪先生云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣為生使根本堅固而行經活血佐之令其內消余常治脉症虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脉症實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已成自潰又何死肉之有若不大痛或大痛或不痛或內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝灸及

十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即有
其毒自解又何假於針割若脾胃虛弱飲食少思用
六君倍加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死
者自潰已潰者自斂若初起或因尅伐或犯房事以
致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附
湯溫補回陽亦有可生 吳岸史邦直之內仲夏患
背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少食口乾飲湯胍洪
大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用
六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進諸症頓退又用十
全大補仍加薑桂之類五十餘劑而死肉潰又五十

餘劑而新肉生斯人氣血充盛而瘡易起易斂使醫
者逆知預為托裏必無此患

六合回生丹 又名六合奪命散

治發背癰疽潰爛者有回生之妙

鉛粉 壹兩
雄黃 兩壹錢貳分半
輕粉
乳香 簪上 炙焦
銀硃
沒藥 亦炙各貳分半共壹

右六味各擇真正好者研為極細末收貯凡治其
病先煎好濃茶將瘡洗淨軟帛拭乾後剖開豬腰
子壹枚用藥壹分摻於豬腰子上却傳患處待豬

腰子上發熱如燃良久取去自此拔毒氣減痛苦定瘡口出膿穢不可手擠第二日依前法仍塗之第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同前

沁陽焦閣老先生嘗施此方用藥壹分傳一次則止茶仙施此方加藥至叁伍分傳數次見効尤速功多在拔其毒耳瘡口大者恐一个豬腰子傳之不足可以半个剖開腰子法不可剖脫做兩斷須要相連如勃太約量瘡口大小摻藥則可用豬豬腰子為佳其腰子有毒宜深埋之

若臁瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上量瘡大小裁其蠟紙炙熱摻藥壹貳分粘在蠟紙

上面貼瘡綿帛縛住任瘡出盡惡水即愈若患下疳用豬腰子切作寬片摻藥綁裹疳上或以尖刀穿開豬腰子納藥于內籠套其疳亦良羊魚鵝雞犬鴨及發毒菜物俱忌之

驪龍散　治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠伍分　牛糞十二月生用（除月燒存性）　鐵鏽各壹兩

右研細末以豬腦髓和好醋調傳瘡口三五次愈初起者自消凡發毒品味忌食之

參飯石膏　在膿潰後圍瘡口

麥飯石不拘多少炭火煆至紅以好米醋淬之如此煆淬十數次研爲末重羅去粗者取細末又乳鉢數人更遞研五七日如麵極細爲妙 白歛研細未 鹿角不用自脫者須用帶腦頂骨全者却是生取之角截作二三寸長炭火燒令烟盡研令極細未 貳兩 白歛末貳兩 鹿角灰肆兩

右用麥飯石細末最要研得極細方有効粗則反致甚痛細則大能止痛收口排膿精粗之異如此和合量藥末多寡用經年好米醋入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末用竹筷子不住手攪熬一二時久冷稀稠得所提出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令着塵用時先以豬蹄湯洗去膿血以故帛挹乾鵝翎蘸膏塗瘡四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大未潰能令內消已潰則排膿如淅水逐日瘡口收歛瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥貼瘡但肉膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉亦不可口氣吹着合藥亦忌腋氣之人及月經有孕婦人見之仍可熬好米醋一大椀收磁器內候逐日用藥于瘡上又則藥乾以鵝翎點醋拂拭藥上勿令綳也初則一日二洗一換藥十日後兩日一換

古方云麥飯石顏色黃白類麥飯曾作磨者尤佳按麥飯石不可作磨狀如麥飯團生粘點如無此石常以舊麵家磨近齒處石代之取其有麥性故也或溪中尋白石如豆如米大者即是也其石大小不等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯解毒百用膏

豬牙皂角燬 南星 各壹兩 大米壹合炒黑

臭小粉乾者肆兩炒焦去火毒

右為末和勻蜜水調圍 治癤撲酒醋調圍

劉氏貼發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡

用逼毒散

黃藥子 白藥子 各壹兩 赤小豆貳兩

雄黃壹錢

右為末水調傅

青散子 治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口生肌

槿花葉盛時取肆兩為末 青赤小豆各貳兩

白芨

右為末臨時用槿花末參錢匕白芨小豆末各壹錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

用貼
雄黃解毒散　治一切癰腫潰爛毒發盛者先用此
藥二三次以後用豬蹄湯
雄黃 壹兩　白礬 肆兩　寒水石 煆 壹兩
用滾水貳叁碗乘熱入前藥壹兩洗患處以太乙
膏或神異膏貼之
豬蹄湯　治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有
白便須用此湯洗
香白芷 不見火上　黃芩 去心　赤芍藥
露蜂房 取有蜂兒者 當歸 去蘆　羌活
生甘草 各等分

右爲粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將猪
猪前蹄兩隻壹斤只用白水叁升煮軟將汁分作
二次澄去面上油花盡下面滓肉每次用藥壹兩
投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸
藥湯温温徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗
訖以帛揩乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并
月經見行婦人猫犬並不許入病人屢洗瘡切勿
以手觸着洗疽之方所傳甚多唯此方極效其用
露蜂房有理蓋以毒驅毒也

集香散　洗癰疽潰爛

白芷　　藿香　　芎香

香附子　　防風 各叁錢　　木香

甘草 各壹錢

作一劑用水叁盌煎數沸去租淋洗患處

薛按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得臭則逆即此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡或有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後宜用此方須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有瘡口即用膏藥貼之至收口為度最忌生肌之劑

熏洗方　凡諸發及癰疽瘡瘍膿瘡湯盪火燒等疾或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤一握搥細用無灰酒濾汁服之以滓傅瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之上竣其瘡出膿便以豬蹄湯等十分淨洗又洗為妙至一二時辰不妨次用後藥熏之

楓香末

好降真香末

右二味於銚中攪熔先如彈子大却取香爐一枚依爐口造紙煙筒一個如燒龍涎香樣慢火熏之

緊以煙筒口熏瘡上不拘左數稍倦暫止然後更熏未出膿者即出已出膿者即乾直候生肌合口然後止向後有赤腫去處又再熏大槩欲屏去穢氣也

十七元肉輕劑

癰疽有死肉不去者用白丁香霜梅深則紝之淺則乾摻於膏藥上甚妙

海又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃壹錢另研巴豆不去皮研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

馬金雪　治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收歛者內有毒根以紙撚蘸紐其內有等發背因元氣虛弱或因尅伐元氣胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸黑漸脫須用純陽之藥以接其元氣庶能收歛若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益而又害之

用巴豆一味去殼炒黑研如膏點於患處臨用金之

追毒丹　治瘡疽黑陷者用針刀開瘡肉此丹使之潰然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆米粒去皮心不壬油研如泥　白丁香
各壹錢　雄黃　黃丹各貳錢

右件研和加白麵叁錢滴水為丸如麥大針破瘡內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾

小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散　治瘡口惡肉毒瘍潰膿血

巴豆伍錢　寒食麵壹兩　好細墨壹錠

右為細末用水和麵作餅子將巴豆包定休教透氣文武火燒成深黑色為細末量瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用掃五七次妙

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水調稠厚周圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸

勿令滾出麵外次日用金銀花煎湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

[醫]按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之劑治惡瘡有死肉者及追膿(保命)

白丁香　輕粉　粉霜

雄黃　麝香各壹錢　巴豆霜(去油)

右為細末新飯和作錠子用之

神異膏　治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃(伍錢)　滑石(倍用)

右為末洗後搽瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

止痛拔毒膏　治一切瘡發臭爛不可近未破則貼已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

盤蝥(肆拾玖枚)　水鱉子(柒个)

乳香　柳枝(肆拾玖條)

松脂(叁錢)　麝香(少許)

沒藥

右用眞清油拾肆兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹伍兩滴入氷中成珠為度却入諸藥攪令勻入蕊器中收了後用

郭氏青金錠子

銅綠 參錢　青礬　膽礬
砒霜　白丁香
輕粉　腦子 少許　麝香
苦葶藶 各壹錢

右將葶藶研細次下研藥同研極細打糊糊爲錠子或煉蜜加白芨末壹錢爲錠如麻黃粗細約二三寸長看瘡口深淺紙入疼者可治不疼難治

第一般緊峻碧雲錠子砒霜生開瘡口用

第二般緊緩碧霞錠子砒霜煆去死肉用

第三般緩慢碧玉錠子去砒霜加枯礬生好肉用

翠雲錠子　治年深冷漏日久惡瘡有死肉用之

銅綠　寒水石 煆　滑石 各叁錢
明礬　膩粉　砒霜
雲母石 研如粉 各貳錢半

右研細末糊爲錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡口深淺紙之如修合候天色晴明則可

信効錠子　治一切惡瘡

紅娘子　黃丹
鷹屎　土硝
銅綠 各壹錢半　腦子　麝香 各少許　砒霜　白芨

右研細末些兒乳汁和爲錠子用中病卽止
紅玉錠子　去歹肉生肌
乾臙脂　白礬枯各叁錢　輕粉
砒霜　黃丹　腦子
麝香各少許

右研極細末稠糊和爲錠子用之
時効針頭散　追蝕惡瘡歹肉兼治瘰癧
赤石脂半兩　乳香　白丁香各貳錢
砒霜生　黃丹各壹錢　輕粉
麝香各半錢　蜈蚣壹條焙乾

右爲極細末摻於瘡口歹肉自去矣若動刀針其瘡雖可有癥
追毒餅　治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不閉膿水自出瘡自乾好
極好信石半錢雄黃
大硃砂各壹錢輕粉少許

右研爲細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之
內服內追毒丹方見前

[醉]按此以毒攻毒之意也嘗治一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頻進用桃紅散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故攻毒有効然有氣血虛不能腐潰宜補養氣血常治瘰背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數點以殺其太勢更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處俟有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紝入瘡內若有

膿為筋膜間隔不出致作脹痛用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠煩痛飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好肉即去之如膿不稠不稀仍作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑枝灸患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不煩痛者服大補之劑仍用桑枝灸之以補接陽氣解散鬱毒其肉自腐

翠青錠子　又名蓋品効錠子治腦疽發背惡瘡并潰爛追膿水長肌

銅青肆錢　明礬枯
乳香另研　青黛各壹錢半
輕粉各壹錢　麝香半錢

如有死肉加白丁香壹錢
右為細末稠糊為餅子或糯米飯和亦得看淺深紙之直至瘡平復猶可用之大有神効如前數方不宜多用謂犯生砒也此藥無毒恐病家猜疑是毒藥請口內嘗之為憑也

摟膿錠子　先用追蝕等錠子蝕去歹肉惡物止有膿水皆宜用之

韶粉
白歛　各貳錢
杏仁貳柒粒去皮尖另研

自然銅
黃連　各半兩
白芷
木香　各壹錢半
麝香少許

川芎

右為極細末糯米飯和為錠子用之或作散末乾上亦佳

右二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人無算凡瘡口深而窄者先以綿杖子展淨膿水却以軟飯和成錠子長短大小一以瘡為準須令藥至底乃効外以膏藥護之若瘡口淺而闊大者藥湯洗過拭乾只以乾末摻之如瘡口乾燥以白死竹蘸豆

油點着以盌承取滴下油瀝調前藥末雞羽蘸塗膿汁自止新肉自生神効

麝香輕粉散　治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆治

麝香　輕粉　各半錢　白礬　飛過

乳香　沒藥　各壹兩　右為細末量瘡乾貼

膏藥方

神効當歸膏　治癰疽瘡毒及湯火扶瘡潰爛最能止痛推陳致新

當歸　貳兩　蘇油　肆兩　白蠟　伍錢如用黃蠟壹兩尤効

先用當歸入油煎至焦黑色去粗入蠟溶化即成膏矣此方用蠟為君前人每云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善於杖後隨食蠟兩許飲酒一兩碗一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功為大用者不可忽之

神異膏　精要　治諸般惡毒瘡瘍發背癰疽其妙如神

露蜂房　要用蜂兒多年者為妙　細剪淨壹兩　全蛇　蛻去鹽水洗淨焙乾

玄參　去蘆各半兩　黃丹　伍兩研細後入

杏仁　去皮尖一切小片壹兩　綿黃蕊　柒錢

眞麻油　壹斤　男子亂髮　洗淨焙乾如雞子大

右件藥先將麻油入銀銚中同亂髮於風爐上慢慢文武火熬候髮焦熔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好綿濾去粗再將所熬清油入銀銚內然後入黃芪玄參二味慢火熬一二時取出銚子安二冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移銚於火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用藥器內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟熬溶麻油在內藥器盛封蓋於甑上蒸熟攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛藥器置淨水盆中出火毒一晝夜數三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火裝千萬謹戒（膏藥方甚多效無出於此）

垣熱瘡寒膏藥

當歸水洗焙乾壹兩　杏仁湯浸去皮尖壹百个
黃丹研細陸兩　肥嫩柳枝壹兩半切如寸許水洗乾
肥嫩桃枝壹兩切如寸許水洗淨乾　麻油壹斤

右件先熬麻油熟下桃柳枝熬令半焦以綿裹當
歸杏仁同煎至柳枝黑焦為度去藥查濾油澄淨
抹去銚中查滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成
滴水中不散為度

寒瘡熟膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸稍桃柳枝分
兩倒過便是

神仙太乙膏　治八發癰疽及一切惡瘡軟癤不問
年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣蠆犬
咬傷湯火刀劒所傷皆可內服外貼如發背先以
温水洗瘡淨軟帛拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡即
用冷水下之血氣不通温酒送下赤白帶下當歸酒
下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置口中
含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服
以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下
腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白
皮湯下諸漏先以鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙
攤貼每服壹先如櫻桃大蛤粉為衣其膏可收十
年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘻瘡鹽湯
洗貼酒下壹丸婦人血脉不通甘草湯下一切瘡

癰并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參　白芷　當歸
赤芍藥　肉桂去粗皮　大黃
生地黃各壹兩

右剉碎用麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色濾去粗入黃丹壹斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不粘手爲度傾入磁器中以乾蓋石掘窖子埋陰樹下以土覆三百出火毒欲服九如雞頭子大

金絲萬應膏　治癲撲傷損手足肩背并寒濕脚氣疼痛不可忍小兒脾胃瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青貳斤半　威靈仙　黃蠟各貳兩
木鼈子貳拾捌个去殼切片子研　蓖麻子壹百个去殼研
沒藥　乳香各壹兩別研　麻油夏貳兩春秋叁兩冬肆兩

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪候焦黑色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤二斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟蓖麻木鼈子泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加

瀝青試得如法却下乳没未起鍋在炭火上再用楤柳條攪數百次又以麁布濾膏在氷盆内扯拔如金絲頻摸氷浸一日却用小銚盛頓如落馬墜車於彼傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉爲驗連摸熱氷數次浴之則熱血聚處自消小兒脾胃貼患處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

善應膏 得効 治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癆子牙腫打撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒犬狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼之即愈又治婦人吹乳以藥丸如梧子大新汲水下貳拾丸肺癰腸癰亦可爲丸吞服

溫酒米飲或北梗甘艸煎湯皆可不可犯葷手及火焙一

上等黄丹 捌兩研極細

明没藥　滴乳香 並別研

川白芷　香仁 去皮尖

草烏頭　大黄

檳榔　赤芍藥

乳髮 淨洗　生乾地黄

白膠香　土苓

當歸　滴青 別研各壹兩

右除乳香没藥外將鑵石銚子盛香油壹斤浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色再入蔥白乳髮煎少時

用生絹帛濾去滓留下壹兩藥油復將所濾油於
慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住
手攪候有微烟起提起藥銚將柳條點藥滴在水
面上凝結成珠不散方成膏如不成珠上火再熬
直待成膏提起藥銚攪無烟出却入乳香沒藥白
膠香末攪勻傾出藥器內將元留下浸藥銚油一
併收拾器內用新汲水將藥器坐放水內二十日一
換過三日出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃
蠟清油入膏內攪勻得所熬膏極難於火候須耐
中火發不担失藥性又
燎陽製藥人面自慎之

玄武膏　治癰疽發背丁腫內外腫瘡陰症下諸惡
瘡及頭頂癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿
散毒止疼生肌累有神驗若丁腫先用銀篦或鹿
角針於丁瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒
餅如小麥大擦扎孔中却用此膏貼之如瘡壞爛
至甚難以藥貼則將皂角二三片煎油調勻此膏
如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大巴豆去殼膜拾兩　木鱉子去殼各貳兩淨　黃丹肆兩研細
眞清油　槐柳嫩枝各柒寸長柒條剉細

右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏　治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋
寒諸病

當歸尾　川芎　杏仁 去皮尖
玄參　猪牙皂角 去皮弦 草烏 生剉用 各參錢
白膠香 明者 捌 西　連鬚葉蔥 肥者 拾根　滴青 明者 半斤
乳香　沒藥 別研 爲末 各半兩　黃蠟 明者 壹兩
男子亂髮 洗淨 接如大

右用清油半斤將入味依前法熬濾却入膠香滴
青攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥
貼膏法　如瘡有膿血不淨痂瘢閉礙須用藥水洗
淨拭乾候水氣乾掣却用膏貼貼後有黃水膿血出
流用紙揩從側畔出一日一換貼至愈
三日一換貼至愈

長肌膏　治年久諸般爛瘡貼之即愈

白燭油 肆錢　香油 捌錢
大楓子 去殼切細伍錢　黃蠟 捌錢
番木鱉肉 切細貳錢　黃連 參錢
枯礬 參錢　輕粉 參錢　黃檗 參錢　蜜陀僧 伍分 各研細

右將前七味前濾去粗入後
小做薄餅箬穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶

湯洗瘡洗餅再貼以好為度

生肌 夫肌肉者脾胃之所生也潰後收斂遲速乃血氣衰盛使然但當純補脾胃不宜泛數生肌之劑若膿毒未盡就用生肌反增潰爛壯者輕堵不過復潰或遲斂而已怯者重者必致肉攻或潰爛而不斂其害大矣 薛氏云瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪補熟肉熟陰血虛也四物加參朮膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應

竹葉石膏湯熱渴而小便頻數腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日而斂蓋瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源為人身之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本牢固誠哉是言也可不慎歟 外治用翠青錠子看淺深紅之如爻肉惡物已去止有膿水却用搜膿錠子瘡口淺平則以散末乾上直至膿淨肉滿方用生肌散四畔輕輕撚之庶令漸小以至於合則無他患矣

精要生肌散

寒水石 碎 滑石
龍骨 各壹兩 定粉
白礬灰 乾薑脂 各半兩

右為細末乾摻用之

平肌散 治諸瘡久不歛

蜜陀僧 煅 花蕊石 煅
乳香 另研 輕粉 各壹錢

右為細末和勻乾摻

立應散 郭氏 治金瘡血出不止并諸瘡久不生肌

烏賊骨
蜜陀僧
白龍骨 各壹兩

寒水石 煅壹兩半 花蕊石
黃丹 沒藥 各半兩

一方加白芨乳香輕粉

右為細末如一切金刃刀鎌傷者用藥敷上絹帛紮之不作膿血瘡膿水乾貼生肌定疼

龍骨
黃藥子 柒錢半

生肌散

白礬 枯
血竭 各壹錢

榧榔 各壹兩
輕粉 半錢

黃丹
蜜陀僧 壹錢半

紅玉散

軟石膏 煅半兩

黃丹 炒壹錢半

肌散

定粉　枯礬　黃連
乳香　龍骨 各貳錢　黃丹
輕粉 各壹錢

右各料爲極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用之

生肌散　治瘡口不斂

木香 貳錢　黃丹
輕粉 貳錢　枯礬 各伍錢

右件各另爲細末用豬膽汁拌勻晒乾再研細摻

患處

醉按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能生者當用托裏之劑又有風寒襲於瘡所不能療肉或瘡核須用針頭散腐之錢子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大潰當用神效當歸膏則能去腐生新止痛大有神效

神祕方　治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去膿

右用地黃汁壹升松脂貳兩薰陸香壹兩羊腎脂牛酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥更用蠟半雞子大一向相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗貼瘡口一二易

吹口　東垣歛瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡上生肌歛肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏粱熟瘡忌用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香檳榔散方

木香　檳榔　黃連 各等分

右爲極細末新汲水調攤紙上貼之濕則乾貼

治寒瘡歛瘡口藥

當歸身 壹錢洗淨晒乾　青皮 去白貳分　木香 壹分
黃連 伍分

右四味爲極細末蠟油調塗取效甚速

保命乳香散　瘡口大者

寒水石 煅 各壹兩　滑石 各壹兩　乳香
沒藥 各半兩　腦子 少許

右各研細和勻少許摻瘡口上
聖效散 收歛瘡口
黃蘗 壹兩去粗皮細切炒至赤黑色
檳榔 木香 各半兩炒令黃色 穿山甲 壹兩炒黃 雞脛胫 柴枝生用
右為細末每用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻
瘡上
桃紅散 歛瘡口定痛辟風邪
滑石 肆兩 乳香 輕粉 各貳錢
小荳粉 壹兩 寒水石 叁兩煅
右為細末乾摻口上 一方改小荳粉為定粉

又方治瘡口久不收
小椒 去目炒黑壹錢半 定粉 貳錢
白礬 乳香
右為細末摻之
有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔膜耳自謂必死用大鯽魚一尾去腸肚以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥為細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之
丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮於瘡遂致如此用

北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯洗洗瘡口四圍淨肉以絹帛兜艾葉乘熱洗沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無効夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪於冷滯大抵潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎（補接即參芪歸朮之類是也）

蘇亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取壹錢七酒調服治瘡久不合神驗（丹溪云髮補陰之功甚大）

丹收斂瘡口止有柳皮白斂散　斂瘡口

黃丹（煅）　白礬枯
寒水石　乳香
黃連　黃芩
膩粉（各參錢）　腦子（少許）

右為末隨瘡乾濕用之乾則用温鹽湯洗濕淨乾却摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則又腐作

龍骨
木香（不見火）
檳榔

久漏瘡

丹漏瘡須先服補藥以生氣血即參芪朮歸等為主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷隨漏之大小便灸令微熱不可令痛乾則易之乾者再研為末再和再灸如困則止來日再灸宜至肉平為効亦有用附片灸者仍以前血氣藥作膏藥貼之

婁經云肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛榮衛不行必將為膿內銷骨髓外破大腿留于節湊必將為敗積寒留舍榮衛不養肉縮筋肋肘不得伸

內為骨痺外為不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也

時康祖大夫患心痛二十年當胸數處血液長流醫皆莫能治或曰竅多則愈損閉則慮究他岐當存其一二猶為上策坐此形神困瘁又積苦腰痛行則傴僂不飲酒雖雞魚蟹蛤之屬皆不入口淳熙間通判温州郡守韓子温見而憐之為檢聖惠方載腰痛一門冷熱二症試之使自擇康祖曰某年老久羸安敢以為熟始作寒症治療取一方用鹿茸者服之逾旬痛減更覺氣宇和暢遂一意專服悉屏他藥消月餘

腰屈復伸無復呼痛心痛亦愈以告醫者皆莫能測其所以然後九年康祖自鎮江通判滿秩造朝訪子温則精力倍昔飲啖無所忌云痛愈之後且勝一日子温書吏吳彌亦苦是疾照方服之浹旬而愈其方本治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆貳兩鹽花叁分為末棗肉丸三十丸空心酒下　天聖中工部尚書忠肅公家有媼病漏十餘年一日有醫過視之曰此可治也即取活鰿一竹針五七枚乃褫鰿于地鰿因屈盤就盤以竹針貫之覆瘡良久取視有白虫數十如針着鰿即鈴置杯水中蠕動如線

復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰虫因未盡餘皆小虫請以常用藥傅之時得檳榔黃連一味即為散傅之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先洗瘡口然後傅藥蓋人血氣冷必假艾力以助陽而艾性亦能殺蟲也如是者再即生肌不逾月愈醫曰瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡漏不可遽合則結毒實虫所為又曰人每有疾經月不痊則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚疳二廣則并治瘴癘由此醫名大著　有人脚肚上生一瘡又遂成漏經二年百藥不効自度必死一山人見之云

此鼻漏耳但以石灰二三升白沸湯泡薰洗如覺瘡痒即是也如其言用灰湯淋洗果痒三兩次遂乾一婦項下忽生一塊腫漸緣至妳上腫起莫知何病偶用刀刺破出清水一碗日久瘡不合有道人見之曰此蟻漏也緣用飯誤食蟻得此耳詢之果然道人云此易治但用穿山甲數片燒存性灰為末傅瘡上遂愈蓋穿山甲蟻之畏也　柳休祖者善卜筮其妻病鼠瘤積年不痊垂命休祖遂卜得順之復按卦合得姓石人治之當獲鼠而愈也既而鄉里有奴姓石能治此病遂炙頭上三處覺往俄有一鼠逕前而伏

呼貓咋之視鼠頭上有二灸處妻逐差
梅師云經云腎移寒於脾發爲癰腫少氣脾移寒於
肝發爲癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰
生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉
筋脉聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如
此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後
變色疼痛漸爽而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口才
合變爲疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致瘥殫宜以此
骨碎補丸主之
骨碎補丸方

骨碎補　補骨脂　熟地黃
川當歸　續斷　石楠葉
黃芪　石斛　牛膝
杜仲　革薢以上各貳兩　附子炮壹兩
白芍藥　川芎　兎絲子
沙參　羌活　防風
獨活　天麻各壹兩半
此方與大僂方相表裏前桂枝拾遺後有木瓜兎絲子白朮
右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

元戎云邢三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿山甲湯透之復以地黄當歸湯補之繼以骨碎補丸外治陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂宜用

羌活　防風　細辛
附子　甘草　川芎
續斷　白芷　白朮
當歸　桂心　麻黄
黄芪　熟地黄

此方與前骨碎補丸相表裏營氣不從逆于肉理乃生癰腫陷脉爲瘻留連肉腠腧氣化薄傳爲善畏及爲驚駭桂附丸　治氣漏諸瘡

桂心　附子炮裂米醋中浸再炮二十五次去皮臍　厚朴薑製　粉草炙　木香貳錢半　乳香研貳錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下貳叁拾丸丹溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖温

其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮焦乎與病情相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之為當又虛甚者宜參术歸芪膏

陷脉散　治漏瘡及二三十年癭瘤或犬如盃盂久久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑炮　琥珀研　大黃

附子炮去皮各壹兩　丹參柒錢半　石硫黃研

白石英研　鍾乳粉研　烏賊骨研各半兩

右為末貯以瓷合蠟囊勿令泄氣若瘡濕即傳無汁即煎豬脂和傳之以乾為度或死肌不消加芒硝貳兩益佳一法胡燕窠壹枚

蜜煎丹　治漏瘡

川芎半兩　細辛貳錢半　白芷稍貳錢半

甘草細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小用隔年黃麻根刮去粗皮搥軟撚成繩子撚入孔中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

攻裏

予和小渠表三因強寇入家傷其兩脛外膲作瘡數

年不已膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延爲濕瘡求治戴人戴人曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬表曰何也戴人曰當被盜時驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也兼兩外腨皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如瀆既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經兩旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上湧寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而痂乾眞可怪也

嘗治足膝下至踝漏瘡遍足腫大於好足二倍行步不全用五龍丸大下之者六番每番皆五七行下後

用黃蘗蒼朮芪芎地黃甘草升麻葛根南星半夏牛膝滑石桂調之近三四個月而安

本草治瘻有頭出膿水不止以啄木鳥壹隻燒灰酒調服壹錢匕立瘥

東垣云瘡醫自幼至老凡所經驗必須窮源之嘗記其瘻惡瘡諸藥不效者取螃蟹煎去兩頭安瘡口上以艾炷炙之七壯一易不過柒枚無不效者又法用乞火婆蟲兒炙之同前法累驗神效人皆祕之往往外科中有者

子不傳

取朽骨灸疽及痔漏中有者

取黑骨雞脛骨上等硇霜實之鹽泥固濟火煅通
紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟
米大以紙撚送入孔竅內更用膏藥貼之

本事雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻
之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之用黃丹置
石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三百三夜其烟上
着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗
記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒輔車外腫
若覆杯肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方
彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃取

朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃整郎

諸瘡口方

瓦盒也

豬骨膏　治諸瘡口氣冷不瘥

豬筒骨貳箇取髓　松脂貳錢通明者研　乳香　另研
黃連去鬚為末各半　白芨研末貳錢半　鉛丹別研

右搗研熔蠟和為膏不拘時傳之

附子散　治冷瘡日夜發歇疼痛

附子半兩炮去皮臍　川椒去目貳錢　雄黃細研各貳錢半
白礬柴錢半火煆研　臘粉研

爲細末研勻每用清麻油調傅瘡上
雄黃散 治冷瘡煖瘡口
雄黃研 乳香 百合 黃檗炙去粗皮 墻上爛白蜆殼小蚌蛤子是各壹分
右爲細末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯温洗拭乾傅之
墨靈散 治漏瘡
牡蠣粉 號丹 硫黃研各壹分 露蜂房剉貳分
右同炒令烟盡爲細末入髮灰壹分麝香少許和勻傅之

馬齒莧膏 治一切瘻
馬齒莧陰乾 臘月燭燼各等分一作臘月鼠灰
右爲細末以臘豬脂和先以温泔清淨洗拭乾然後以藥傅之日三
治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止
右以鹽少許安白牛耳內然後取牛耳中垢以傅瘡上即瘥如不用鹽即牛耳不痒難取垢
治諸瘡久不合口用炮附子去皮尖爲細末唾津和隨瘡大小作餅置患處用艾壯於餅上炙之更服

欽瘡口方

大補氣血藥用江西豆豉爲餅多灸之亦効
神應膏 宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此
膏愈之如腸毒胃毒爲先服之神効

當歸壹兩壹錢　赤芍藥　大黃各壹兩伍錢
香白芷　官桂各壹兩　玄參壹兩參錢
川續斷壹兩貳錢　莪朮壹兩　生地黃壹兩貳錢

右九味細剉用眞香油貳斤浸春五日夏三日秋
七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去查
如熟天用黃丹甘兩冷月十五兩旋旋下丹不住
手攪試水中沉爲度不可令婦人雞犬見如漏有
孔者以膏逆入孔內外以膏攤貼之

攪膿散　治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫焮
硬膿水清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊
干及好肌不生及療疳瘡惡瘡浸潰不斂方見潰瘍門

口藥即木香攪膿黃連等分爲末是也

治漏外塞藥

蘆甘石童便煅淬　牡蠣粉　右爲極細末傳之

烏金散　貼惡瘡疳瘻

椽子貳個一實黃丹一實白礬末相合定用黑
俏麻皮纏了火內燒研細加麝少許洗淨瘡貼之

東垣截疳散　治年深疳瘦瘡

黃連　麝香兄研　龍腦各半　蜜陀僧

黃丹　白芨　白歛各壹兩　輕粉壹錢

右爲細末和勻乾摻在紙上以膏貼之

應効散又名托裏散不以名多少冬月陰乾爲細末每用紙撚蘸紙瘡口內自然生肉更用米飲調貳錢無時服日三冬

治漏瘡以五倍子末和血竭末塞之

久漏瘡　足內踝上一寸炙三壯　六壯

肺脉微緩爲痿瘦緩者多熱