

證治準繩 瘍科


紙 9  
82  
62





門 武  
冊 82  
卷 62









瘍科證治準繩卷之三

金壇王肯堂輯 門人新安閔承詔校

癰疽部分

靈樞五臟身有五部 伏兔一 腓二腓者腓也 卽足肚

背三 五臟俞四 項五 此五部有癰疽者死

王海藏云 腦 鬚 鬢 頤 亦為癰疽必死

之處

鬼遺方不可患癰疽者七處 眼後虛處 頤接骨

處 陰根上毛間膀與尻骨接處 耳門前後車骨

接處 諸因小腹風水所成癰疽 頷骨下近耳後

癰疽部分

小耳

一



虛處 鼻骨中 並能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險

背上九處不可病癰 第一入髮際為玉枕亦為舌本 第二頸項節 第三椎為崇骨 第四大椎為五藏 第五脊骨兩邊肺俞穴 第六夾脊兩邊脾俞及肝俞 第七脊骨兩邊腎俞二穴 第八後心鳩尾 第九鳩尾骨穴

正面五處不可患癰 第一喉骨為垂膺 第二當胸為神舍 第三心鳩尾 第四當兩乳穴 第五臍下二寸為腸屈間

側面三處不可患癰 耳下近耳後牙車尖中央陷中為喉脉一穴 當膊下一穴為肩骨 承山上三寸一穴膈腸

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱上攻外即貼消腫逼毒藥如已結定即用發穴藥候穴破出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後飲冷瘡口亦慮外傷風水勿食發風熱醬麵毒物等忌房事

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是澁滯候亦乘虛而作不拘大小前起心鳩尾者最要緊近



兩腋是虛處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬難潰膿為此等處偏難發穴穴後難合瘡口並須先用煖內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破即朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易為將息後心者唯有十一椎脾俞下十四椎上為腎俞腎俞下為腰俞兩處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡有癰起先須補內氣令實方可攻破內氣實則不內攻且易得潰唯腰腿兩處多成漏疾預防節慾則危矣

下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長

橫摺內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和平藥內服三五日後用發軟散及罨藥罨令軟即穴穴後其瘡口即隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿膿盡便貼合瘡口藥為此處無肉可壞更不須長肉也

右靈樞鬼遺諸書所言部分甚悉今已散采入各條矣其經絡所屬及引經之藥已見首卷分經絡篇其初中後內消外治之法及表裏虛實之別則當於腫瘍潰瘍門求之今世專科方士所託以為祕傳之書圖寫形像分別名目以立治法者多不



足憑此中亦有蒐采者如或問姑以廣聞見耳不必泥也

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

△頭部一

○百會疽

或問百會穴生疽何如曰此名玉頂發初如麥米頓增痛楚寒熱大作由虛陽浮泛宜以鹽湯下入味丸引火歸源甚則黑錫丹或元氣素厚六陽經受風邪風火相扇臟腑熱毒上攻而然者宜黃連消毒飲兼玉樞丹勝金丹更以附子切片置湧泉穴灸五壯以泄其毒七日無膿者死

○頂門癰

或問頂門生癰何如曰此屬太陽經風熱所致一名



佛頂疽穴名上星由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成  
宜服活命飲加芩連梔子藁本清熱之劑及紫金丹  
烏金散奪命丹汗之虛者十全大補湯加羌活稍遲  
潰爛黑陷惡證多脉大神昏一便閉結者不治

○額疽

鬼遺方云左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急  
宜藥貼破見膿無害右額角一處發毒疽及惡癰為  
近太陽穴如腫滿太陽即成虛損為近穴而難消不  
可破如破後傷外風水即能害人亦宜用藥潰膿後  
速斂合瘡口如經冬月即成冷瘡緣此處近太陽穴

上至額角都為險處 或問當額生疽何如曰此屬  
陽明胃積熱宜服活命飲加升麻桔梗羌活酒水煎  
服壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯或十  
宣散黃芪內托散托之過時潰爛腦髓出者死

○太陽疽

鬼遺云左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒  
氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風  
水所入即損其睛疰損眼臉而成太疾 或問兩太  
陽生疽何如曰此名勇疽亦名腦發疽屬足陽明胃  
經狀如伏鼠寒熱併作面自浮腫宜活命飲加升麻



桔梗烏金散十日刺得黃白膿者生清稀黑血者及潰爛透腦者死

○鬢疽

鬢疽屬手少陽三焦相火是經少血多氣尤忌見膿若妄加針灸必至不起余見之屢矣薛新甫以為屬肝膽二經怒火或風熱血虛所致若發熱作渴者用柴胡清肝散腫譽痛甚者用仙方活命飲若大勢已退餘毒未散用參芪歸朮為主佐以川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參芪之類托而潰之若欲其生肌收斂脾虛者六味九血虛者四物加參芪或

血燥或水不能生木者用四物湯六味地黃丸氣虛者用補中益氣湯皆當滋其化源為善

一老腫痛發熱膿清作渴脈軟而瀋此氣血俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而愈補例以上一人患此焮痛作腫發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉四劑而消一人因怒後鬢際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿熟針之更以托裏消毒藥而愈一人腫痛寒熱



拘急脉浮數以荆防敗毒散二劑表證悉退更以托裡消毒散潰之而安 一人焮腫痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而實此表裏俱有邪也以荆防敗毒散加芩連大黃一劑少愈更以荆防敗毒散四劑而消 俞黃門年踰三十冬患鬢毒腫焮煩躁便祕脉實此膽經風熱壅上也馬氏曰瘡瘍熱實不利者大黃湯下之一劑便通瘡退更以荆防敗毒散二劑十宣散去桂加天花粉金銀花數劑而愈 一人頭面焮腫作痛時仲冬脉弦緊以托裡溫經湯汗之而消 趙宜人年踰七十鬢疽已潰焮腫痛甚喜冷

脉實便秘東垣云煩躁飲冷身熱脉大精神昏悶者臟腑實也以清涼飲二劑腫痛悉退更以托裏藥三十餘劑而平

汪前疽雖出少陽血少之分然證與脉皆屬于實故年壯者用瀉劑之重老年者用瀉劑之輕若拘以年老或守其經禁而投補劑實實之禍難免矣

以上瀉例

待御朱南臯患前證腫痛發熱日晡尤甚此肝膽二經血虛火燥也用四物湯加玄參柴胡桔梗炙草治之而愈又因勞役發熱畏寒作渴自汗用補中益氣



湯去柴胡升麻加五味麥門炮薑而瘥州守胡廷  
器年七十患前證腫焮作痛頭自俱脹此腎水不足  
肝膽火盛而血燥也用六味丸料四劑瘡頭出水而  
愈後因調養失宜仍腫痛煩熱喘渴脉洪大而虛此  
脾胃之氣傷也用補中益氣以補脾胃用六味地黄  
丸以補腎肝而痊以上補例

柴胡清肝散 治鬢疽及肝膽二焦風熱怒火之證  
或項胸作痛或瘡毒發熱

- 柴胡 山梔炒各壹錢伍分 黃芩炒
- 川芎 人參各壹錢 連翹

桔梗各捌分 甘草伍分

右水煎服  
髮際瘡

鬼遺云左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺  
此疾婦人患多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜  
出膿無傷 或問髮際生瘡何如曰此名髮際瘡也  
狀如茱實漫腫寒熱或痛或痒者髮際疽也此由風  
熱上壅所致宜服防風通聖散紫金丹奪命丹汗之

○癩頭瘡

丹防風通聖散為末酒浸焙乾凡三次食後白湯調



服日三服至頭有汗効  
世濃煎鹽湯洗三五日一洗用一上散傳之久年不愈神効

丹用好紫霄炭燒通紅入水淬之又燒又淬以水熱為度取所淬之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏龍肝懸龍尾屋梁塵也黃連白礬為末調傳又服酒炒通聖散効

一方單用黃連末傳之累効  
或問頭上生瘡狀如葡萄痛甚久而無膿何如曰名鬚毛瘡治法上同必須詳驗其瘡若中陷而四畔高

起色如黃蠟者廣瘡也

松脂膏 治頭瘡經年月不瘥

松脂

各壹兩

黃連

去鬚各  
朱錢半

黃芩

苦參

各壹兩

蛇床子

貳錢

大黃

白礬

枯各  
半兩

水銀

壹兩

胡粉

半兩合水  
銀入少水

同研令無  
星為度

右為細末研勻用臘豬脂調傳瘡上大効

貝母膏 治頭禿瘡

貝母

半夏生

南星

五倍子

白芷

黃蘗



苦參

各貳錢半 號丹 燉壹錢半

雄黃

壹錢

右為細末先以蜂房白芷苦參大腹皮荆芥煎湯熏洗拭乾即用蜜水調傅兩三次後乾摻藥加味平胃散 治一切惡瘡頭上瘡

右平胃散入膩粉清油調傅之甚妙

螵蛸散 治頭上生瘡俗曰粘瘡

海螵蛸 貳錢

白膠香

輕粉 各半兩

為細末研勻先用清油潤瘡後摻藥只一上可治頭極痒不痛生瘡方

鵝鴿糞 伍合

右以好醋和膏煮三兩沸日兩三次塗之

○腦疽

鬼遺正腦上一處起為腦癰及腦疽腦鑠並在太椎骨上入髮際生腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可腦鑠一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外皮如犬咬去肉之跡難愈 靈樞云陽氣大發消腦溜項名曰腦燥其色不樂腦項痛如刺以針煩心者死不可治



薛腦屬足太陽膀胱經積熱。或濕毒上湧。或陰虛火熾。或腎水虧損陰精消涸。初起腫赤痛甚。煩渴飲冷脉洪數而有力。乃濕熱上湧。當用黃連消毒散并隔蒜灸以除濕熱。漫腫微痛渴不飲冷脉洪數而無力。乃陰虛火熾。當用六味丸及補中益氣湯以滋化源。若口舌乾燥小便頻數或淋瀝作痛。乃腎水虧損。急用加減八味丸及前湯以固根本。引火歸經。若不成膿不腐潰陽氣虛也。四君加歸芪。不生肌不收斂脾氣虛也。十全大補湯。若色黯不潰或潰而不斂。乃陰精消涸。名曰腦燥。為不治。若

積熱  
挾風  
濕虛

攻補得宜亦有可愈治者審焉

元好問記曰予素飲酒於九月中患腦之下項之上出小瘡後數日腦項麻木腫勢外焮瘍醫遂處五香連翹湯至八日不下而云不可速療十八日得膿出用藥或砭刺三月乃可平四月如故予記醫經云凡瘡見膿九死一生果如醫言則當有束手待斃之悔矣乃請李明之診且謂膏梁之變不當投五香事已無及當先用火攻之策然後用藥以太艾炷如桃核許者攻之至百壯乃痛覺次為處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脉中得弦緊按之洪大而數



又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已必先歲氣無伐天和以時言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之鹹以奠之然受寒邪而禁鹹諸苦寒為君為用甘寒為佐酒熱為因用為使以辛溫和氣血太辛以解結為臣三辛三甘益元氣而和血脉滲淡以導酒濕扶持秋令以益氣瀉火以入本經之藥和血且為引用既以通經為主用君以黃芩黃連黃蘗生地黃知母酒製之本經羌活獨活藁本防風防已當歸連翹以解結黃芪人參甘草配諸苦寒

者三之一多則滋營氣補土也生甘草瀉腎火補下焦元氣人參橘皮以補胃蘇木當歸尾去惡血生地黃補血酒製防已除膀胱留熱澤瀉助秋令去酒之濕熱凡此諸藥必得桔梗為舟楫乃不下沉投劑之後疽當不痛不拆食進體健予如言服之投牀太躄日出乃寤以手捫瘡腫減七八至瘡痂都斂十四日而已世醫用技豈無取効者至於治効之外乃能歷數體中不言之秘平生所見唯明之一人而已方名黃連消毒飲見本條一人素不慎起居飲食焮赤腫痛尺脉洪數以黃連消毒散一劑濕熱頓除惟腫硬作痛以仙



方活命飲二劑腫痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂  
加金銀花藁本白木茯苓陳皮以托裏排膿彼欲全  
消自製黃連解毒散二服反腫硬不作膿始悟仍用  
十宣散加白木茯苓陳皮半夏腫少退仍去桂又四  
劑而膿成腫勢亦退繼以八珍湯加黃耆五味子麥  
門冬月餘膿潰而愈夫苦寒之藥雖治陰證尤當  
分表裏虛實次第時宜豈可始末悉用之然焮腫赤  
痛人脈數按之則濡乃膀胱經濕熱壅盛也故用黃  
連消毒散以解毒除濕顧腫硬作痛乃氣血凝滯不  
行而作也遂用仙方活命飲以散結消毒破血也其

瘡頭不消蓋因熱毒熏蒸氣血凝滯而然也宜用甘  
溫之劑補益陽氣托裡以腐潰之況此證原屬督脈  
經因虛火盛而出若不審其因專用苦寒之藥胃氣  
已傷何以腐化收斂幾何不致于敗耶凡瘡易消散  
易腐潰易收斂皆氣血壯盛故也一人腦疽已十  
餘日面目腫閉頭焮如斗脈洪數煩躁飲冷此膀胱  
濕熱所致用黃連消毒飲二劑次飲槐花酒二碗頓  
退以指按下腫則復起此膿已成于頸額肩頰各刺  
一孔膿並湧出口自始開更以托裏藥加金銀花連  
翹三十餘劑而愈一人患腦疽勢劇脈實用黃連



消毒散不應以金銀藤二兩水二鍾煎一鍾入酒半碗服之勢去三四再服漸退又加黃檗知母瓜蒌當歸甘草節數劑而潰止加黃芪川芎白芷桔梗數劑而愈 一婦年將七十形實性急好酒腦疽纒五日脉緊急又濇急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌人參炒入薑煎調一錢服過兩時再與得卧而止半身汗睡覺病已失此亦內托之意按此治因性急脉而制此方脉緊急且濇由其性急嗜酒以傷其血而然故用大黃以洩酒熱人參以養氣血也杜清碧病腦疽療之不愈丹溪往視之曰何不服防風通聖散曰已服數劑丹溪曰合以酒製之清碧乃

自悟以為不及 一婦腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如坐舟車許叔微曰肝虛風邪襲之然也以川芎一兩當歸三錢羌活旋復花細辛防風蔓荆子石膏藁本荆芥穗半夏麩乾地黃甘草各半兩每服壹兩一料而愈按此條認作肝虛風邪襲之而因其掉眩痛偏于左也經曰諸風掉眩皆屬肝木又病偏左乃肝膽所主又曰風從上受之又曰無痰不成眩暈又曰肝藏血又曰風乃陽邪故方以風熱痰血而主治者理也一老患此色赤腫痛脉數有力與黃連消毒飲二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消 一婦人冬間患此腫痛熱渴余用清熱消毒藥潰之而愈次年三月其舌腫大遍



身發疔如葡萄不計其數手足尤多乃脾胃受毒也  
 先客刺出黑血隨服奪命丹柴粒出臭汗瘡熱益甚  
 便秘二日與大黃芩連各叁錢升麻白芷山梔薄荷  
 連翹各貳錢生甘草壹錢水煎三五沸服之大小便  
 出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及  
 齒縫出臭血諸毒乃消更以犀角地黄湯而愈  
 以上治按皆足太陽經積熱挾風挾濕挾虛者其  
 進退出入可以用黃連消毒散之活法也

黃連消毒飲

黃連 伍分

黃芩 伍分

黃蘗 酒洗 伍分

人參 伍分

知母 肆分 酒炒 此以苦寒引用通經為君

羌活 壹錢

獨活 伍分

防風 伍分

藁本 伍分

連翹 壹錢 此以天辛解木上經之結為臣

黃芪 壹錢

甘草 叁分 此以甘溫配諸苦寒者三之一多則滋榮氣

當歸身 壹錢 酒洗

生地黄 壹錢 酒洗 此以

陳皮 伍分 補胃氣 甘草稍 伍分 此以甘

澤瀉 伍分 酒洗 此以淡導酒

防已 伍分 酒洗 除胸膈留熱

蘇木 伍分 去惡寒

桔梗 壹錢 使諸藥不沉為舟楫之用 凡所用之藥用酒洗併

入酒煎者用酒熱為因為使



右俱作一服水參蓋煎減壹半去滓入酒少許再煎食後溫服投劑之後不得飲水必再作膿効遲初患二三日者服之立効凡瘡皆陰中之陽陽中之陰一證而已東垣治疽陽藥七分陰藥三分名曰昇陽益胃散老人宜之亦名復煎散或加沒藥乳香各壹錢

右東垣論膏粱肉食之變治宜苦寒不宜芳香者如解裏條撮要內消升麻湯孫真人單煮大黃湯皆為富貴肉食之輩設也

羌活當歸湯 治腦疽

黃芩

黃連

各酒炒

當歸身

酒浸

炙甘草

各壹兩

羌活

黃蘗

酒浸

連翹

各伍錢

澤瀉

獨活

藁本

各叁錢

防風

梔子仁

各伍分

右咬咀分作四服水壹小椀先浸一時許入酒壹匙煎至捌分去渣大溫服食後日二服和查計陸服三日服盡去渣清藥調下後檳榔散

檳榔散 檳榔為細末將羌活當歸湯調下

陳錄判母年七十餘於冬至後腦出疽形可甌面大衆瘍醫診視俟瘡熟以鍼出膿因答待妾瘡輒內陷

寒



四一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脉極沉細而遲蓋緣衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥濃之氣獨存瘦悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議速製五香湯一劑加丁香附子各伍錢劑盡瘍復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛痒瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣按此條年老冬寒理宜溫補茲用五香湯

加丁附以辛散何也蓋因其怒氣鬱結阻礙陽氣不得營運致疽四陷且脉極沉細而遲其為氣鬱可知矣故用五香以開結丁附以助陽則鬱散陽復疽乃大發此亦因其性因其脉而為治也錦衣葉夫人患腦疽口乾舌燥內服清熱外敷寒涼色黯不厥胸中氣噎證屬陽氣虛寒彼疑素有痰火不受溫補許以參芪各伍錢薑桂各貳錢一劑頓然腫潰人用大補藥而愈

陰虛火熾

一人膿將成微痛兼渴尺脉大而無力此陰虛火動之證彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈熾復求治乃以四物湯加黃檗知母五味麥門黃芪及加減八味丸渴止瘡潰更以托裏藥兼前丸而愈



腎水

一婦人年踰八十腦疽已潰發背繼生頭如粟許脉大無力此膀胱經濕熱所致脉無力血氣衰進托裏消毒藥數服稍可更加參耆雖起而渴此血氣虛甚以參芪各壹兩歸芩各伍錢麥門五味各壹錢數服渴止不潰加肉桂十餘劑膿成針之瘀肉漸腐徐徐取去而膿清不斂投十全大補湯加白斂貝母遠志三十餘劑膿稠而愈設不峻補不去腐肉以渴為火投以涼藥寧免死哉 瘡疽之證雖屬心火當分表裏虛實果元氣充實內有實火寒劑或可貴効若寒涼過度使胃寒脾弱陽證變陰或結而不潰或潰而不斂陰陽垂戾水火交爭死無白矣 一人腦疽作渴脉雖洪按之無力予呶咀加減八味丸與之彼不信自用滋陰等藥七惡併至而歿精要曰患疽雖云有熱皆因虛而得之愈後作渴或先渴後疽非加減八味丸不能治 一人腦患疽發熱口渴醫用苦寒藥膿水益多發熱益甚面目赤色唇舌燥烈小便淋痛晝夜不寐死在反掌請薛治之乃以加減八味丸料加參芪歸木麥冬甘草煎服之熟睡半日覺來諸證悉退不數劑而瘡愈薛曰病雖愈當固其本元彼不經意且不守禁次年患中風後患背疽而歿

不斂陰陽垂戾水火交爭死無白矣 一人腦疽作渴脉雖洪按之無力予呶咀加減八味丸與之彼不信自用滋陰等藥七惡併至而歿精要曰患疽雖云有熱皆因虛而得之愈後作渴或先渴後疽非加減八味丸不能治 一人腦患疽發熱口渴醫用苦寒藥膿水益多發熱益甚面目赤色唇舌燥烈小便淋痛晝夜不寐死在反掌請薛治之乃以加減八味丸料加參芪歸木麥冬甘草煎服之熟睡半日覺來諸證悉退不數劑而瘡愈薛曰病雖愈當固其本元彼不經意且不守禁次年患中風後患背疽而歿



渴

一老人膿清兼作渴脉軟而濇予以為氣血俱虛用八珍湯加黃耆五味彼不信乃服降火之劑果反作嘔少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈 一人未潰兼作渴尺脉大而無力以四物湯加黃檗知母黃耆麥門四劑而渴減又與加減八味丸渴止瘡潰更用托裏藥兼前丸而愈 一人頭項俱痛雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲食少思其勢可畏診其脉毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味麥門酸棗仁四劑諸證少退食頗進睡少得及與參苓白

瀉

朮散數服飲食頗進又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗月餘瘡

鬼遺赤色疽發頭額及腦前并手掌中十日不亢者死七日可刺出赤血七日未有膿不可治也不亢者而東攻之 疔疽發鬚鬚及兩耳不亢十五日死可刺其膿色黑如豆豉或見血者死



八面部二

○發眉

鬼遺云左右眉稜兩處發為發眉不拘在頭屋宜慮未究已前攻擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻下太陽並宜戒慎或問眉發疽毒何如曰此疽從肩至頭生瘡黑色漸漸腫漫滿面瘡頭堅硬如石刺之無膿惟出黃水痛不可忍悶亂嘔逆是也由臟腑積熱風毒上攻而然急服紫金丹勝金丹汗之活命飲加黃連桔梗升麻或黃連消毒飲降火消毒之劑六七日刺得黃白膿者可治乾枯紫陷刺之無膿吐

此書內容極為模糊，文字多已褪色或模糊不清，難以辨識。依稀可見一些零散的字句，如“發眉”、“鬼遺”等，與左頁內容相呼應。右頁上方有“面部二”字樣，與左頁標題一致。右頁下方有“卷二”字樣，與左頁下方一致。右頁中間有“小字三”字樣，與左頁中間一致。右頁最下方有“發眉”字樣，與左頁最下方一致。



逆煩躁神昏不食者死。或問眉心生疽何如曰是名眉心疽一名面風毒屬足太陽膀胱經風熱壅結陰陽相滯而生急服紫金丹蟾酥丸汗之或一粒金丹下之若黑色痛甚或麻或痒寒熱併作者疔也。目眦湯詳見雜病眼目門茲不贅

○鼻疽

或問鼻柱上生疽何如曰是名鼻疽屬手太陰肺經風熱及上焦鬱火所致宜千金漏蘆湯活命飲加梔子木通薄荷桔梗

○發髭

鬼遺云鼻下一處人中兩處為發髭此多因摘髭外入風而結攻作不常寒熱相併此亦害久。或問兩腮及鼻下焮腫生瘡惡血淋漓何如曰此名疔疽屬陽明胃經二日口禁如瘞角弓反張按之如疔釘着骨痛不可忍是也急服烏金散活命飲加桔梗升麻梔子壯實者一粒金丹下之稍緩則毒攻心嘔吐不食昏迷躁亂譫語者死。或問地角上生癰何如曰是名髭毒屬足陽明經風熱所致用活命飲加芩連玄參梔子桔梗以清熱壯實者一粒金丹下之若撼之有根肌肉不仁或麻或痒寒熱大作煩悶嘔逆者



疔也

○顴瘍

或問顴骨內卒然而痛經宿而痛甚寒熱大作何如  
曰此顴骨內肉疽也屬上焦與陽明經鬱火所致宜活  
命飲加升麻桔梗乾葛水酒煎服仍與烏金散奪命  
丹汗之可消 或問一人年五十忽顴骨上初覺如  
松子漸大如胡桃不甚腫微赤微痒或云痰核或云  
結毒或作瘤治何如曰皆非也是名顴疽屬陽明經  
積熱所致用紫金丹烏金散活命飲加製過南星服  
之而消 按靈樞曰心病者顴赤又曰腎病者顴與

顏黑然則當察其色赤者宜以黃連安神丸降心火  
補心充養心血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委  
之陽明鬱火也

○頰瘍

或問頰腮生瘡何如曰此名金腮瘡初如米粒漸大  
如豆久而不治潰蝕透頰屬陽明經初宜服勝金丹  
活命飲加升麻桔梗黃連消毒散選用壯實者一粒  
金丹下之治不得法潰爛不斂口吐臭痰喘急神昏  
者死

犀角升麻湯

治陽明經絡受風熱口唇頰車髮質



腫痛及鼻額間連頭痛不可開口雖言語飲食亦相妨

犀角 朱錢半

川升麻 半兩

防風

黃芩 各錢半

香白芷

白附子

川芎 各錢半

羌活 參錢壹字

生甘草 壹錢半

右咬咀都作一服水伍盞煎至參盞半去滓分作參服一日一服訖其證必減如臟腑有些滯不妨足陽明胃經也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市塵無所不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食之毒聚於胃故

此方以犀角為主飲食之毒陽明經絡環唇挾口起於鼻交額中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛昔王公患此一經亦以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經故用有效

發頤 非腮

或問腮臉生毒何如曰此名腮頤發肌肉浮而不著骨者名非腮俱屬陽明風熱所致急服活命飲加玄參本連水酒煎服及紫金丹汗之 或問顛骨之下顛頤之上耳前一寸三分發疽何如曰此名顛發古云不治之證屬陽明經熱毒上攻宜活命飲加升麻



桔梗黃連水酒煎服紫金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯黃芪內托散人參養榮湯若治不得法延及咽溢潰爛穿口不食者死嘗見一婦人患此證經水適至一醫開之嘔逆不食而死又一人患此醫用點藥潰爛臭穢以致虛火上升吐血痰譫語而死

**薛** 疥腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱者白芷胃風湯內熱腫痛者升麻黃連湯外腫作痛內熱口乾者犀角升麻湯內傷寒涼不能消潰者補中益氣湯發熱作渴大便秘結者加味清涼飲表裏俱解而

仍腫痛者欲作膿也托裏散若飲食少思胃氣虛弱也六君子湯肢體倦怠陽氣虛弱也補中益氣湯膿毒既潰腫痛不減熱毒未解也托裏消毒散膿出而反痛氣血虛也人參內托散發熱晡熱陰血虛也八珍湯惡寒發熱氣血俱虛也十全大補湯若腫焮痛連耳下者屬手足少陽經當清肝火若連頤及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水患此而有不治者多泥風熱執用尅伐之藥耳

按素問云腎熱者頤先赤故頤屬足少陰腎經也而今醫師以耳後一寸三分發銳毒者名曰發頤則是少陽分野薛氏亦以為



屬足少陰經當補腎水者何也蓋腎為相火之宅宅完且固而火得歸息焉則治腎正所以治少陽也此證傷寒汗出不徹者多患之亦有雜證客熱久而不散而發於頤者宜以藥速消散之失治成膿則費手矣若又服剋伐之藥而不滋補其氣血即穿口穿喉而死一人年逾三十夏月熱病後患頤毒積日不潰氣息奄奄飲食少思大便不禁診脈如無經曰脈息如無似有細而微者陽氣衰也齊氏曰飲食不入大便滑利腸胃虛也以六君子加炮薑肉豆蔻破故紙數劑泄稍止食稍進更加黃蘗當歸肉桂潰而膿

水清稀前藥每服加熟附壹錢數劑泄止食進膿漸稠再以十全大補湯加酒炒芍藥白斂月餘而愈地官陳用之服發散之劑寒熱已退腫痛不消此血凝滯而欲作膿也用托裏消毒散而膿成又用托裏散而潰但膿清作渴乃氣血虛也用八珍加麥門五味三十餘劑而愈上舍盧懋樹患此而尺脈數證屬腎經不足誤服消毒之劑致損元氣而不能愈余用補中益氣六味丸料而痊上舍熊棟卿頤後患之膿清體瘦遺精盜汗晡熱口渴痰氣上湧久而不愈脈洪大按之微細屬腎氣虧損所致遂用加減八



味丸料并十全大補湯而愈。一婦人素內執因怒耳下至頸腫痛寒熱此肝膽經火燥而血虛用柴胡梔子散而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退用八珍湯加丹皮而內熱止。

連翹敗毒散 治發願初腫服此消之

羌活 中

獨活 中

連翹 上

荆芥 中

防風 中

柴胡 中

升麻 下

桔梗 中

甘草 下

川芎 中

牛蒡子 新尾上炒研

蘇木 下

當歸尾 酒洗

紅花 酒洗

天花粉 中

右用冰壹鍾好酒壹鍾同煎至壹鍾去滓徐徐濕服如未消加穿山甲蛤粉炒壹錢腫至面者加香白芷壹錢漏蘆分如大便燥實者加酒浸大黃壹錢壯者倍用之凡內有熱或寒熱交作者倍用柴胡加酒洗黃芩壹錢酒炒黃連壹錢

加味消毒飲子 治搭腮腫

防風

荆芥

連翹

牛蒡子

羌活

甘草 各等分

右為麗末水煎二三兩服散毒然後用藥塗腮腫處



切不可先便用藥塗毒氣入喉中不救  
內托消毒散 治發願有膿不可消者已破未破服  
之

人參 中

黃芪 上

防風 中

白芷 中

川芎 中

當歸 中

桔梗 中

連翹 中

升麻 中

柴胡 中

金銀花 中

甘草節 中

右用冰壹鍾好酒壹鍾同煎壹鍾去滓徐徐溫服  
瘡破者以玄武膏貼之四圍赤腫不退者仍以  
藥塗之兼服蠟礬丸最妙

外治 消毒救苦散 消腫散 毒用米醋調塗傳 四圍留頭

如乾即又傳

大黃 叁錢

黃芩

黃連

黃蘗

芙蓉葉

大薊根

白芨

白斂

天南星

半夏

紅花

檀花

當歸尾

赤小豆

白芷 各壹錢半

朴硝

雄黃 另研末以各壹錢

一方用見腫消草生白芨白斂土大黃生大薊根野  
苧麻根共搗成餅入朴硝壹錢和勻貼腫上留頭



勿貼如乾即換之若更加山慈菇金線重樓根尤妙

百合散 治頤頰瘡一名獨骨瘡

百合

黃蘗各壹兩

白芨貳錢半

草麻子伍拾粒研

右為末用朴硝水和作餅貼之日三五次

二金散 治大人小兒蝕透腮頰初生如米豆名蝕頤瘡

雞內金

鬱金

右等分為末先用鹽漿盥漱了貼之

芙蓉傳方 治頤頰腫痛或破成瘡

芙蓉葉不拘多少右搗爛傳之以帛紮定日一換

神効方 治疔腮及癰疽發背瘡癰等證

赤小豆為細末以新汲水調敷瘡上及四邊赤腫處

乾則再傳之

○面瘡

或問面遊風毒何如曰此積熱在內或多食辛辣厚味或服金石剛劑太過以致熱壅上焦氣血沸騰而作屬陽明經初覺微痒如蟲蟻行搔損則成瘡痛楚難禁宜服黃連消毒散去人參加薄荷梔子及活命



飲加桔梗升麻紫金丹烏金散選用外用祛風潤肌之劑敷之

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不效者惟

此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令

淨如面油用之數日間瘡腫處自平赤亦自消如

風刺粉刺一夕見效仍塗藥勿近眼處

生硫黃

香白芷

瓜蒌仁

膩粉

各半錢

全蝎

柒枚

蟬蛻

伍枚

芫青

柒枚去足翅

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法火熬溶取

下離火入諸藥在內每用少許塗面上

山面瘡水調平胃散塗之

手治臉上熱瘡涎出以蒲黃傅上瘡

東洗面藥方治面有黥點或生瘡及粉刺之類并去

皮膚燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角

叁斤去皮另搗

棗豆

捌合揀淨另搗

楮實子

伍兩

三柰子

縮砂

連皮半兩

白芨

貳兩肥者剉

甘松

柒錢

升麻子

半兩

白丁香

伍錢臘月收揀淨

右七味同為細末訖和棗豆糯米粉及皂角末



處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黃 伍錢

當歸身

白檀香 任分

升麻

白芨 各壹錢

防風 各貳錢

羌活 去皮壹兩

右以縣裏定前藥於銀石器中用油伍兩同熬得所澄清去渣以黃蠟壹兩再煎熬為度

瑩肌如玉散

白丁香

白芨

白蒺藜

白欬

白牽牛

小椒 各壹兩

香白芷 米錢

當歸稍

升麻 各半兩

楮實子 肆錢

白茯苓 叁錢

白附子 貳錢半

麻黃 去節貳錢

連翹 壹錢半

右為細末每用半錢多少洗之塗點不令生瘡

豬苓

麻黃

桂枝

白蒺藜

白附子

連翹

防風

香白芷

白欬

當歸身

升麻根

白芨

右等分為細末洗面用之臨卧唾調少許塗面上



肘瘰面多，肝黯如雀卵色，以殺羊膽壹枚酒貳升煮參沸塗拭之，三日瘥。治面上粉刺，搗鬼絲子絞汁塗之。

白附子 壹兩

白芨

白蘇

白茯苓

蜜陀僧

白石脂

定粉各等分

右為細末，用洗面藥洗淨，臨睡用牛乳汁，如無用牛乳，或鷄子清調和，丸如龍眼大，逐旋用溫漿水磨開傳之。

白附子散 治面上熱瘡，似癩或生赤黑斑點。

白附子

蜜陀僧

茯苓

白芷

定粉各等分

右為末，先用蘿蔔煎湯洗面，淨後用羊乳調，至夜敷患處，次日洗去效。

祛風白芷散 治面上風癩瘡。

白芷

黃連

黃檗

黃丹

茯苓

輕粉

右為細末，用油調搽癩瘡上，或加孩兒茶貳錢麝香貳分亦可。

○牙又發



鬼遺云左右牙文骨接處發癰疽腫處脹攻骨及牙  
關張口不得因諸風熱上攻或多食燒炙之物所為  
或因患牙癰即從牙縫中破出膿血切忌針風水觸  
犯スル按此係陽明經鬱熱治宜清胃散甘露飲防風  
通聖涼膈之屬量虛實表裏用之若服寒涼過多火  
不歸源者服理中之屬佐以薑附始安

○承漿癰

或問地角下生疽何如曰是名頰癰屬陽明胃經積  
熱所致用白芷升麻湯活命飲加升麻桔梗更服紫  
金丹汗之壯實者一粒金丹下之

耳部

○耳發

或問耳輪生疽何如曰是名耳發疽屬手少陽三焦  
經風熱所致六七日漸腫如胡桃或如蜂房之狀或  
赤或紫熱如火痛徹心是也十日刺出黃白膿者生  
刺之無膿時出鮮血飲食不下神昏狂躁者死小兒  
耳竅旁生者相傳指月而生恐未必然大抵風濕熱  
毒成疔故名月蝕疔瘡

水銀膏 治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍隨月虛盈

水銀貳錢半 胡粉研 松脂



黃連

去鬚為末 各半兩

豬脂

肆兩

右先熬豬脂令沸下松脂諸末及水銀攪令勻磁盒盛先以鹽湯洗淨瘡塗敷日三五度

胡粉散

治月蝕瘡

胡粉

炒微黃

白礬

煨

虢丹

煨

黃連

淨

輕粉

各貳錢

臘脂

壹錢

麝香

少許

右為末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調敷

○耳內瘡

或問耳中生毒何如曰耳中所患不同皆由足少陰手少陽二經風熱上壅而然其證有五曰停耳亦曰耳濕常出黃膿有耳風毒常出紅膿有纏耳常出白膿有耳疔生瘡臭穢有震耳耳內虛鳴常出清膿雖有五般其源一也皆不寒熱有耳聾耳痔則不作膿亦不寒熱外無臃腫但耳塞不通已上纏綿不已令入耳聾活命飲黃連消毒飲治之若寒熱間作內外紅腫疼痛日增者為耳癰用活命飲加升麻桔梗紫金丹烏金散壯實者一粒金丹下之若寒熱大作痛楚難禁者疔也作疔治之



東垣黍粘子湯

治耳內痛生瘡

桔梗 半兩

柴胡

黃芪 各叁分

連翹

黃芩

黍粘子

當歸稍

生地黄

黃連 各貳分

蒲黃

甘草 炙

草龍膽

昆布

蘇木

生甘草 各壹分

桃仁 壹錢

紅花 少許

右件剉如麻豆大，作一服水貳大盞煎至壹盞去

查少熱服，食後忌寒藥利大便。

羅治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也，其氣通於

耳，其經虛風熱乘之，隨脉入於耳，與氣相搏，故令耳

門生瘡也。曾青散主之。

曾青散 治耳內有惡瘡

雄黃 朱錢

曾青 半兩

黃芩 貳錢

右件搗為細末，研勻，每用少許納耳中，有膿出即

以綿杖子拭乾，用之。

黃連散

黃連 半兩

白礬 枯朱錢半

右搗為細末，每用少許綿裹納耳中。

餘詳雜病第八耳門。

耳部耳根毒

下耳門

三三



耳根毒

或問耳根結核何如曰是名耳根毒狀如痰核按之不動而微痛屬足少陽膽經兼三焦經風熱所致用活命飲加升麻柴胡水酒煎服或烏金散汗之壯實者一粒金丹汗之老弱者黃芪內托散十宣散托之  
一人勞倦耳下焮腫惡寒發熱頭疼作渴右脉大而軟當服補中益氣湯彼自用藥發散遂致嘔吐始信予用六君子湯更服補中益氣湯而愈 大抵內傷榮衛失守皮膚間無氣滋養則不任風寒胃氣下陷則陽火上衝氣喘發熱頭痛脉大此不足證也誤

作外感表實而反瀉之寧免虛虛之禍東垣云內傷

右脉大外感左脉大當以此別之按左脉大屬外感

形觀色審證參之以脉乃得不誤丹溪治一老人創

寒作勞患頭疼發熱惡寒骨節疼無汗安語脉洪數

而左甚治以參芪歸木陳皮甘草每貼加附子壹片

五貼而愈又少年九月間發熱頭痛妄語大渴

形肥脉數大左甚以參木君芪芍臣芪佐附一片使

蓋人肥而脉左大干右事急矣非附則參芪無捷効

五十貼大汗而愈此皆左脉大丹溪悉以一婦耳

內傷治之若依東垣認作外感寧不殺人下腫痛發寒熱與荆防敗毒散四劑表證悉退以散

腫潰堅湯數劑腫消大半再以神効瓜萋散四劑而

平 一人肝經風熱耳下腫痛發熱脉浮數以薄荷

丹治之而消 一婦因怒耳下腫痛以荆防敗毒散



加連翹黃芩四劑而愈。嘗治此旬日不消者以益  
氣血藥及飲遠志酒並効無膿自消有膿自潰。一  
婦因怒耳下焮痛頭痛寒熱以荆防敗毒加黃芩表  
證悉退但飲食少思日晡發熱東垣云雖有虛熱不  
可大攻熱去則寒起遂以小柴胡加地骨皮芎歸苓  
木陳皮十餘貼而愈次年春復腫堅不潰用八珍湯  
加香附柴胡地骨皮桔梗服至六七貼以為延緩仍  
服人參敗毒散勢愈盛又服流氣飲則盜汗發熱口  
乾食少至秋復求診視氣血虛極辭之果歿。一人  
每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮紅花桃

仁四劑而愈。一女性急好怒耳下常腫痛發寒熱  
肝脉弦急投小柴胡加青皮牛蒡子荆芥防風而寒  
熱退更以小柴胡湯對四物數劑而腫消其父欲除  
病根謂肝內主藏血外主榮筋若恚怒氣逆則傷  
肝肝主筋故筋蓄結而腫須要自加調攝庶可免患  
否則肝迭受傷不能藏血血虛則難差矣後不戒果  
結三核屢用追蝕不斂而沒。一人遠途勞倦發熱  
脉大無力耳下患腫此勞損也宜補中益氣養榮湯  
自然熱退腫消彼不聽服降火藥及必効散果吐瀉  
不食而死。夫勞倦損氣氣衰則火旺火乘脾土故

耳下耳根毒



倦怠而熱此元氣傷也丹溪曰宜補形氣調經脈其  
瘡自消不可汗下若不詳脈症經絡受病之異而輒  
用峻厲之劑鮮不危矣

○耳後疽

參發頤

或問耳後一寸三分生疽古云不治之證今有一人  
年二十四歲耳後結塊如拳肉色不變亦不甚痛七  
日不食何如曰此名耳後毒非癭也隔蒜灸之活命  
飲加柴胡桔梗升麻八陣散下之愈 張通府耳後  
髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛彼謂痰結  
脈軟而時見數經曰脈數不時見瘡也非痰也仲景

云微弱之脈主血氣俱虛形精不足又曰沉遲軟弱  
皆宜托裏遂用參芪歸朮川芎炙甘草以托裏少加  
金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火消痰  
外貼涼藥覺寒徹腦患處太熱頭愈重食愈少復請  
治以四君子加藿香炮乾薑數劑食漸進膿成刺之  
更以十全大補湯去桂灸以豆豉餅又月餘而愈  
羅宗伯耳後髮際患毒焮痛脈數以小柴胡加桔梗  
牛蒡子金銀花四劑而愈 一人耳後患毒脈證俱  
實宜用內疎黃連湯彼以嚴冬不服寒劑竟至不起  
一人耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛寒熱煩躁



喜冷此膽經蘊熱而然先用神仙活命飲一劑勢減  
二三時值仲冬彼感于用寒遠寒之禁自用十宣托  
裏之藥勢漸熾耳內膿潰喉腫開藥不能下而沒

○總論

耳瘡屬手少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱  
或肝經燥火風熱或腎經虛火等因若發熱熾痛屬  
少陽厥陰風熱用柴胡梔子散若內熱痒痛屬前二  
經血虛用當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱用  
小柴胡湯加山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火用  
加味地黃丸如不應用加減八味丸餘當隨證治之

文選姚海山耳根赤腫寒熱作痛此屬三焦風熱  
也但中氣素虛以補中益氣加山梔炒黃芩牛蒡子  
治之而愈 一儒者因怒耳內作痛出水或用祛風  
之劑筋攣作痛肢體如束此肝火傷血也用六味丸  
料數服而愈 舉人毛石峰子年二十耳內出水或  
作痛年餘矣脉洪數左尺益甚此屬肝腎二經虛熱  
也用加減八味丸料一劑而愈 一男子每入房耳  
內或作痒或出水常以銀簪探入甚喜陰涼此屬腎  
經虛熱也用加減八味丸而愈 一婦人因怒發熱  
每經行即兩耳出膿兩太陽作痛以手按之痛稍止



怒則胸脇乳房脹痛或寒熱往來或小便頻數或小  
腹脹悶此皆屬肝火血虛也先用梔子清肝散二劑  
又用加味道遙散數劑諸證悉退又以補中益氣加  
五味而全愈 一婦人經行後因怒氣勞役發熱寒  
熱耳內作痛余以經行為血虛用八珍湯加柴胡怒  
氣為肝火用加味道遙散勞役為氣傷用補中益氣  
湯加山梔而愈 一婦人耳內作痛或腫聾寒熱發  
熱面色素青黃經行則變赤余以為怒氣傷肝鬱結  
傷脾用加味歸脾湯加味道遙散而愈 一婦人耳  
內腫痛寒熱口苦耳內出水燠連頸項飲食少思此

肝火甚而傷脾也用小柴胡湯加山梔牡丹皮稍愈  
用加味道遙散及八珍湯加柴胡山梔丹皮調補肝  
脾而全愈 一孀婦或耳內外作痛或項側結核內  
熱晡熱月經不調唾痰少食胸膈不利余以為鬱怒  
傷肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味道  
遙散以清肝火生肝血而愈 太卿魏莊渠癸卯仲  
冬耳內作痛左尺洪大而澀余曰此腎水枯竭不能  
生肝木當滋化源彼不信仍雜用直補之劑余謂其  
壅陸時若曰莊渠不能生腎水來春必不能起至明  
年春季春十八日復請治昏憤不語願耳之分已有膿



矣且卯縮便數方信余言求治辭不克用六味丸料壹鍾陰莖舒出小便十減六七神思頓醒余曰若砭膿出庶延數日為立嗣之計否則膿從耳出死立待矣或謂不砭可生者余因辨歸翌日果耳內出膿至二十一日巳未火日而卒 憲副姜時川癸卯冬右手寸口浮數而有痰口內若有瘡然余曰此胃火傳於肺也當薄滋味慎起居以禦之甲辰秋尺脈洪數而無力余曰此肺金不能生腎水無根之火上炎也宜靜調養滋化源以治之彼云今喉耳不時燥痛肢體不時發熱果是無根之火殞無疑矣後會劉古峽

云姜公之病已如尊料遂拉同往視喉果腫潰脈愈洪大又誤以為瘡毒而投苦寒之劑卒於仲春二十八日乃藥之促其亡也否則尚能延至仲夏當歸川芎散 治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭自不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹痞痛

- 當歸 川芎 柴胡
- 白朮 芍藥 各壹錢 山梔 炒壹錢
- 牡丹皮 茯苓 各捌分 蔓荊子
- 甘草 各伍分



右水煎服

若肝氣不平寒熱加地骨皮<sub>ラ</sub> 肝氣實加柴胡黃  
芩<sub>ラ</sub> 氣血虛加參芪歸地<sub>ラ</sub> 脾虛飲食少思加苓  
朮脾虛胸膈不利加參芪 痰滯胸膈加米半<sub>ラ</sub>  
肝氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時攻痛加青  
皮<sub>ラ</sub> 肝血不足胸膈不利或小腹滿痛加熟地黃  
肝血虛寒小腹時痛加肉桂<sub>ラ</sub> 日晡發熱加歸  
地<sub>ラ</sub>

梔子清肝散 梔子一名柴胡 治三焦及足少陽經風熱  
耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒

熱往來<sub>ラ</sub>

柴胡

梔子 炒

牡丹皮 各壹錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子 炒各柒分

甘草 伍分

右水煎服

若太陽頭痛加羌活<sub>ラ</sub>

加味地黃丸

治肝腎陰虛瘡證或耳內痒痛出水

或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等證<sub>ラ</sub>

乾山藥

山茱萸

牡丹皮

澤瀉

白茯苓

熟地黃

柴胡

五味子 各另為柒等分



右將二地黄搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉  
蜜為丸桐子大每服百丸空心白湯送下不應  
用  
加減八味丸

燕掛末  
柴貼  
甘本  
當歸  
牛膝子  
甘草  
芒藥  
廿廿文

八口齒部

四

○口瘡

詳雜病第八口門此撮其遺者耳

丹王四叔公口瘡舌強多痰

白木

甘草稍

壹錢

人參

赤芍藥

木通

生地黄

半錢

黃連

炒壹錢

瓜蒌子

拾貳枚

右作一貼煎

羅黃連升麻湯

治口舌生瘡

升麻

壹錢半

黃連

叁錢

右為細末綿裹含津燕

口齒部

小半三

四十一



辛能散鬱

丹治口瘡黃檗炙同細辛各貳錢研極細傅之噉少時當滿口有涎啞之少刻又傅又噉如是五七次愈

羅綠袍散 治大人小兒口瘡多不効者

黃檗 肆兩

甘草 炙貳兩

青黛 壹兩

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

衍黃檗蜜炙與青黛各壹分同為末入生龍腦壹字

研勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐之

垣蜜檠散 治口瘡久不愈者用黃檠不計多少蜜

炙灰色為細末乾搽上臨卧忌酒醋醬犯之則瘡

難愈

丹好酒煮黃連呷下立愈

本治膈上熱極口舌生瘡

膩粉 壹七

杏仁 柒粒不

右二味臨卧時細嚼令涎出則吐之用温湯嗽口

未痊可又用

肘治口瘡以薔薇根避風處打去土煮濃汁温冷

易之

衍五倍子治口瘡以末搽之便可飲食

本治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可

酸能收

口瘡

小科三

四



瘡入分方 一方用白礬湯漱口亦妙 凡口瘡用西  
瓜漿水瘡甚者以此徐徐飲之 冬月無留皮燒灰噙  
之

**實**

治口瘡以好墨研蜈蚣極細傳之立效胡氏方 蜈蚣走  
小瘡膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者  
戒勿用惟體實有熱在上焦者用之  
子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽喉下至  
胃腕皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次  
服黃連解毒湯不十餘日皆釋

**虛**

丹口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火沉上先

用理中湯甚則加附子

**本**治滿口生瘡此因虛火上攻口舌生瘡

末草烏頭壹枚

南星壹枚

生薑壹塊

右焙乾為細末每服貳錢臨卧時用醋調作掩子  
貼手足心來日便愈

**丹**口瘡以遠志醋研鵝毛掃患處出涎

**本**治口鼻生瘡用生薑壹塊臨睡時細嚼含睡不得

開口出氣眠着不妨睡覺嚥下

**保**半夏散

治少陰口瘡聲絕不出者是寒遏絕陽

氣不伸

半夏製兩桂

烏頭壹

水同煎壹盞

**麻**



分作二服

甘礬散 治太陰口瘡

甘草貳寸 白礬栗子大

右含化嚥津

乳香散 治赤口瘡

乳香 沒藥各壹錢 白礬半錢 銅綠少許 研末摻之

沒藥散 治白口瘡

乳香 沒藥 雄黃各壹錢 輕粉半錢 巴豆霜少許 為

末摻之

丹治口瘡豬蹄殼燒為末傅之立止張氏方

與走馬疳茄蒂中木去皮燒存性入少白梅灰與少

禁細末傅之立安

羅紅芍藥散

心病口瘡 紫桔紅蒼 二錢四兩 五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末羊肝

肆兩批開摻藥末參錢用麻絮定火內燒令熟空

心食之白湯送下大効

聖主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白僵蠶

炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

陳主口內熱瘡以古文錢貳拾文燒令赤投酒中飲

之立瘥



口舌生瘡胸膈疼痛用炒豉細末含一宿便瘥  
聖治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末摻瘡即愈  
又法用檳榔燒灰存性為末入輕粉傳之

干治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傳之

垣化毒法凡口瘡無問新舊遇夜卧將自己兩丸以  
手攪緊左右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如  
此三五度因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三五夜  
愈如鼻流清涕惡寒者握二丸向上揉之數夜可愈

○牙癰

或問牙根生癰何如曰此名附牙癰屬足陽明胃經

熱毒所致宜服清胃散黃連消毒飲或刺出惡血則  
愈

清胃散 治膏梁積熱唇口腫痛齒齦潰爛焮痛連

頭面或惡寒發熱

升麻 貳錢

生地黄

牡丹皮

黃連

當歸 酒洗各壹錢

右水煎服痛未止石膏之類可量加

○骨槽風

或問牙齦腫痛寒熱大作腐爛不已作疳治之無益  
何如曰此骨槽風也一名穿腮毒由憂愁思慮驚恐



悲傷所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內  
 略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或  
 右牙關緊急不能進食先用鷲翎探吐風痰服黃連  
 解毒湯活命飲加玄參桔梗柴胡黃芩切不可用刀  
 針有一人因用藥點破入風虛火上升嘔吐血痰謔  
 語臭穢不食而死又一人上齒根連外腫痛後齒根  
 潰膿醫者皆以牙癰治之久而不斂濃汁不絕詢其  
 故乃曾生廣瘡者即以結毒治之而愈  
 東垣神功丸 治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕  
 斷肉將脫牙落血出不止

黃連

去鬚淨酒洗壹兩

縮砂仁

半兩

生地黃

酒洗

甘艸

各壹錢

藿香葉

木香

當歸身

各壹錢

升麻

貳錢

蘭香葉

如無以藿香葉

代之貳錢

右為細末水浸蒸餅為丸菉豆大每服壹百丸加  
 至貳百丸止白湯下食後服兼治血痢及下血不  
 止血下褐色或紫黑色及腸澼下血空心米飲送  
 下其脉洪大而緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行  
 腰間者

○上膠癰



或問上膠生疽狀如紫蒲萄何如曰是名懸癰屬手  
太陰手厥陰心包絡令人寒熱大作舌不能伸縮口  
不能開闔惟欲仰面而卧鼻中時出紅涕屬手足少  
陰經及三焦積熱所致宜黃連消毒飲加桔梗玄參  
急刺出惡血犀角琥珀膏敷之壯實者一粒金丹下  
之過時不治飲食不入神昏脉亂者死

唇瘡

世唇瘡以醃上滴下汗傳之累效如神  
羅多効散 治唇緊瘡及疹

訶子肉

五倍子 各等分

右為細末乾貼上効

丹唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傳之 胡氏方

唇上生瘡連年不瘥以八月藍葉壹斤搗取汁洗之  
不過三百瘥 千金方

唇上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即  
止



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

項部五

○百脉疽

鬼遺云百脉疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止稍懈不能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五日可刺導引不刺導引見血八十日必死

○頸癰

靈樞云發於頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脉内熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣或問頸上生癰疽何如曰是頸癰也

百脉疽 頸癰

五



手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致初覺卽隔蒜灸服活命飲加玄參桔梗升麻及勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯若潰而不斂煩躁脹滿小便如淋嘔吐者死一婦頸痛不消與神効瓜萋散六劑少退更以小柴胡加青皮枳殼貝母數劑痛腫減大半再以四物對小柴胡數劑而平一人神勞多怒頸腫一塊久而不消諸藥不應予以八珍湯加柴胡香附每日更隔蒜灸數壯日飲遠志酒貳盞漸消一婦月水不行漸熱欬嗽肌體漸瘦胸膈不利頸腫一塊日久不

消令服逍遙散月餘更服八珍湯加牡丹皮香附又月餘加黃芪白斂兩月餘熱退腫消經行而愈一人年踰三十每勞心過度頸腫發熱服敗毒散愈盛用補中益氣湯數貼而消一人因暴怒項下腫痛胸膈痞悶兼發熱用方脉流氣二劑胸膈利以荆防敗毒散二劑而熱退肝脉尚弦濇以小柴胡加芍歸芍藥四劑脉證頓退以散腫潰堅丸一料將平唯一核不消服遇神仙無比丸貳兩而瘳一兒甫周歲項患胎毒予俟有膿刺之膿出梳許乳食如常用托裡藥月餘而愈又一兒患此待膿自出幾至不救



太抵瘡淺宜砭深宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消也况小兒氣血又弱膿成不針不砭鮮不斃矣  
一人項下患毒膿已成因畏針焮延至胸赤如霞其脈滑數飲食不進月餘不寐甚倦予密針之膿出即睡覺而思食用托裏散兩月餘而愈又一人患此及時針刺數日而愈一人素虛患此不針潰透頰頰血氣愈虛而死 一婦因怒頸腫後月水不通四肢浮腫小便如淋此血分證也先以椒仁丸數服經行腫消更以六君子湯加柴胡枳殼數劑頸腫亦消矣亦有先因小便不利後身發腫致經水不通名曰水分

宜葶藶丸治之良方云婦人腫滿若先因經水斷絕後致四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜服椒紅丸

○項中疽

或問頸後腦下發疽何如曰此即對口瘡也屬督脈陽獨盛氣有餘火炎上而發疽也急服烏金散勝金丹汗之壯實者一粒金丹下之稍遲潰出膿水入風發搖者難治有毒邪雍盛鮮血暴湧而歿毒攻心腹膨脹謔語者死 此證焮赤腫痛可治若根大精神昏憤即難治也量表裏虛實而為汗下內托內消外



用大圍藥箍住中點大灰膏之類破泄其毒不可走  
失根脚若欲流兩肩脊者不可療也或云先服追疔  
奪命湯二貼後服活血化毒湯  
治對口瘡効方用新鮮茄蒂柴箇秤若干重又用鮮  
何首烏秤同茄蒂重用冰壹鍾半煎服一服出膿  
一服收口如無鮮茄蒂首烏乾者亦可但不及鮮  
者有力此方輕劑不可以治重病觀者勿泥也

○天柱疽

或問天柱骨上極痒入骨惡心吐逆肩背拘急何如  
曰此名天柱疽急隔蒜灸痒止爲度無蒜明灸可治

服活命飲加羌活桔梗烏金散勝金丹選用灸而有  
泡者吉無泡者凶服汗劑得汗可治無汗難治若潰  
爛神昏嘔噦惡心血不止者死

○疔疽 參耳後

或問頸上兩耳後生疽何如曰此名疔疽初不甚腫  
但痛痒不時而出清水漸漸長大如玳瑁斑點者是  
也亦名化骨瘡急服八陣散奪命丹活命飲加桔梗  
柴胡若過時潰爛日久出骨者大惡之證也此證多  
生於積鬱之人七惡多見犯禁者不治

○夾喉疽



或問喉之兩旁生疽何如曰此名夾疽屬手少陰心經足太陰脾經足厥陰肝火熱毒上攻而然宜琥珀犀角膏犀角散黃連消毒飲活命飲加玄參桔梗黃連消內者難治虛火上升痰壅飲食不進者死

○結喉癰

靈樞云癰發于噎中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽半日死其化為膿者瀉則合豕膏冷食三日而已 或問當結喉生癰何如曰是名喉癰又名猛疽以其勢毒猛烈可畏也屬任脉及手太陽手少陰經積熱憂憤所致急宜清熱攻毒用琥珀犀角膏

及黃連消毒飲紫金丹烏金散選用壯實者一粒金丹下之若過時不治潰穿咽噎者死

○瘰癧馬刀

結核連續者為瘰癧形長如蛤者為馬刀 一云瘰癧者結核是也或在耳後耳前或在耳下連及頤頤或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在胸及胸之側或在兩脇皆謂之馬刀 手足少陽主之

集驗云夫瘰癧瘡者有風毒熱毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊其證皆由忿怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝經蓋怒傷肝肝主筋故令筋縮結畜而腫也其候多生於頸項胸腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽



項強痛腫結不消者便當服散腫潰堅湯或五香連翹漏蘆湯之類散之或用牡蠣大黃湯疎利二兩行瘡上可用十香膏之類貼之及諸淋洗敷貼等藥治之庶得消散若不散可用內消丸之類消之或隔蒜灸之仍斷慾息氣薄滋味調理之不然恐日久變生寒熱咳嗽而成勞瘵之疾不可治矣又有馬刀瘡亦生於項腋之間有類瘰癧但初起其狀如馬刀赤色如火燒烙極痛此瘡甚猛宜急治之不然多成危殆也臨證辨之 丹溪云夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經太抵食味之厚鬱氣之積

曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉為潮熱其證危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也戴復菴云瘰癧之病皆血氣壅結根在臟腑多結於頸項之間纍纍大小無定發作寒熱膿血潰爛或此沒而彼起宜於隔宿用米飲調下桂府滑石貳錢鐘動時進黑白散必有物如葡萄肉從小便出至數枚其腫核則愈仍常服四七湯加木香或蘇子降氣湯



其匝頸者俗名蟠蛇癰難治 薛新甫云癰癧之病  
屬三焦肝膽一經怒火風熱血燥或肝腎一經精血  
虧損虛火內動或毒怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內  
搏於肝蓋怒傷肝肝主筋肝受病則筋累累然如貫  
珠也其候多生於耳前後項腋間結聚成核初覺憎  
寒惡熱咽項強痛若寒熱熾痛者此肝火風熱而氣  
病也用小柴胡湯以清肝火并服加味四物湯以養  
肝血若寒熱既止而核不散者此肝經火燥而血  
病也用加味道遙散以清肝火六味地黃丸以生腎  
水若腫高而稍軟面色痿黃皮膚壯熱膿已成也可

用針以決之及服托裏之劑若經久不愈或愈而復  
發膿水淋漓肌體羸瘦者必純補之劑庶可收斂否  
則變成九瘦內經曰陷脈為癰留連肉腠即此病也  
外用豆豉餅琥珀膏以驅散寒邪補接陽氣內服補  
中益氣湯六味丸以滋腎水培肝木健脾土亦有可  
愈者大抵肝膽部分結核不問大小其脈左關弦緊  
左尺洪數者乃腎水不能生肝木以致肝火燥而筋  
攣須用前藥以滋化源是治其本也外臺秘要云肝  
腎虛熱則生癰病機云癰癧不係膏梁丹毒火熱之  
變因虛勞氣鬱所致止宜補形氣調經脈其瘡自消



散蓋不待汗之下之而已也其不詳脉證經絡受病之異者下之則犯經禁病禁虛虛之禍如指諸掌若脉洪大元氣虛敗為不治若面眦白為金尅木亦不治若眼內赤脉貫瞳人見幾條則幾年死使不從本而治妄用伐肝之劑則誤矣蓋伐肝則脾土先傷脾傷則損五臟之源矣可不慎哉 按脉經云人年五六十其脉浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠瘦者皆為勞得之可見瘰癧之證多起於虛也薛氏之論可為典要故詳著之

**瘰癧** 初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者以

羌活連翹湯又宜長服消癧丸却以稜針刺破出血以拔毒湯熱淋洗一日洗五七次針五七次放蟾酥末少許於針處上以琥珀膏貼之更以內消膏貼之久久自然消也如不散者用鐵筒拔毒膏點破次以下品錠子取去惡肉可作潰瘍治之用十宣散之類托裏若毒攻心嘔吐者用粉乳托裏散發出毒此要兼針灸法同施若已潰不愈者宜益氣養榮湯八物湯加柴胡地骨皮夏枯草香附子貝母多服取效凡用錠子藥線必用托裏之劑服之 焮赤腫痛脉沉數者邪氣實也宜泄之以化毒消腫和裏散加裁



腫痛憎寒發熱或拘急脈浮數者邪在表也宜散  
表以荆防敗毒散加減。因怒結核或腫痛或發熱  
者宜疎肝行氣以小柴胡湯加青皮青木香紅花桃  
仁。腫硬不潰者宜補氣血以益氣養榮湯。折鬱  
所致者解鬱結調氣血以益氣養榮湯。潰後不斂  
者屬氣血俱虛宜大補以益氣養榮湯次用十全大  
補湯加香附子貝母遠志。虛勞所致者宜補之先  
以補中益氣湯次以益氣養榮湯加減。因有核潰  
而不斂者腐而補之以針頭散腐之以益氣養榮湯  
補之。肌實而不斂或不消者下之以羌活連翹湯

腫痛發寒熱太便秘以羌活連翹湯次以神仙活  
命飲。耳下結核腫痛發寒熱宜荆防敗毒散表證  
悉退以散腫潰堅湯。潰後核不腐以益氣養榮湯  
更敷針頭散腐之。腫硬久不消亦不作膿服散堅  
敗毒藥不應宜灸肘尖肩尖服益氣養榮湯而消。  
氣血壯實之人肌沉實而大者亦不覺損方可進必  
効散遇仙無比丸下其毒若其毒一下即止。一藥更  
服益氣養榮湯調理。瘡口不斂宜用豆豉餅灸之  
以琥珀膏十香膏貼之。潰後發熱煩躁作渴脈大  
無力此血虛也宜以當歸補血湯次以聖愈湯再八



物湯加貝母遠志 每勞心過度頸腫發熱服敗毒藥愈甚以補中益氣湯數劑而消

**治驗** 閣老楊石齋子年十七發熱作渴日晡頰赤左關尺脉大而淨此肝腎陰虛用補陰八珍湯五十餘劑又加參芪二十餘劑而潰但膿水清稀肌肉不生乃以參芪歸朮為主佐以芍藥熟地麥門五味膿水稠而肌肉生更服必効散一劑癰毒去而瘡口斂容臺張美之善怒孟春患此或用伐肝之劑不愈余以為肝血不足用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源至季冬而愈 一儒者愈後體瘦發熱晝夜無定

此足三陰氣血俱虛用八珍加麥門五味二十餘劑又用補中益氣加麥門五味及六味丸而愈 儒者張子容素善怒患此久而不愈瘡出鮮血左關弦洪重按如無此肝火動而血妄行證屬氣血俱虛用補中益氣湯以補脾肺用六味丸以滋腎肝而愈 一人耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞而發熱脉數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復患處已消一核尚存以必効散二服而平 一人先於耳前耳下患之將愈延及項側缺盆三年遂延胸腋診之肝脉弦數以龍會散堅二丸治



項部 夕承三  
之將愈肝脉尚數四年後小腹陰囊內股皆患毒年  
餘不斂脉診如前以清肝養血及前丸而愈 一人  
因怒耳下及缺盆患癰潰延腋下形氣頗實瘡口不  
合治以散腫潰堅丸而愈 一人因勞而患怠惰發  
熱肌洪大按之無力宜用補中益氣湯彼不信輒服  
攻伐之劑吐瀉不止而死 太抵此證原屬虛損若  
不審虛實而犯病禁經禁鮮有不誤常治先以調經  
解鬱更以陽蒜灸之多自消如不消即以琥珀膏貼  
之候有膿則針之否則變生他證設若兼痰兼陰虛  
等症只宜加兼症之劑不可干擾餘經或氣血已復

而核不消却服散堅之劑至月餘不應氣血亦不覺  
損方進必効散或遇神仙無比丸其毒一下即止二  
藥更服益氣養榮湯數劑以調理瘡口不斂豆豉餅  
琥珀膏貼氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不  
治然此證以氣血為主氣血壯實不用追蝕之劑彼  
亦能自腐但取去使易于收斂若氣血虛不先用補  
劑而數用追蝕之藥適足以敗矣若發寒熱眼內有  
赤肌貫瞳人者亦不治一肌者一年死一肌者二年  
死 一人患之痰盛胸膈痞悶脾胃肌弦此脾土虛  
肝木乘之也當實脾土伐肝木為主彼以治痰為先



乃服苦寒化痰藥不應又加破氣藥病愈甚始用六君子湯加芎歸數劑飲食少思以補中益氣湯倍加白朮月餘中氣少健又以益氣養榮湯四月腫消而血氣亦復矣夫右關肌弦屬木乃木盛而尅脾土為賊邪也虛而用苦寒之劑是虛虛也况痰之為病其因不一主治之法不同凡治痰利藥過多則脾氣愈虛虛則痰愈易生如中氣不足必用參朮之類為主佐以痰藥一人久而不斂神思困倦肌虛予欲投以托裏彼以為迂乃服散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求治投益氣養榮湯三月喜其謹守

得以收效 齊氏曰結核癰癧初覺宜內消之如經久不除氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之太抵托裏之法使瘡無變壞之證所以宜用也

婦女

一婦患癰癧延至胸腋膿水淋漓日久五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食少嗜臥月水不調臍腹作痛予謂血虛而然非癰故也服逍遙散月餘少可更服八珍湯加牡丹皮香附



子又月餘而經通再加黃耆白斂兩月餘而愈  
婦久患瘰癧不消自汗惡寒此血氣俱虛服十全大  
補湯月餘而潰然堅核雖取瘡口不斂灸以豆豉餅  
仍與前藥加香附烏藥兩月而愈  
一婦瘰癧後發  
熱煩躁作渴脉大無力此血虛也以當歸補血湯六  
劑頓退又以聖愈湯數劑少健加以八珍湯加貝母  
遠志三十餘劑而斂  
一婦潰後核不腐以益氣養  
榮湯三十餘劑更敷針頭散腐之再與前湯三十餘  
劑而斂  
一婦久潰發熱月經過期且少用逍遙散  
兼前湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收敷針

頭散更灸前穴而痊  
一婦肝經積熱患而作痛脉  
沉數以射干連翹湯四劑少愈更用散腫潰堅九月  
餘而消  
一婦瘰癧與養氣順血藥不應服神效瓜  
萸散二劑頓退又六劑而消却與托裏藥氣血平復  
而愈  
一婦年踰三十瘰癧已潰不愈與八珍湯加  
柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉  
更與必效散二服瘡口遂合惟血氣未平再用前藥  
三十餘劑而平  
一婦瘰癧不消膿清不斂用八珍  
湯少愈忽肩背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當  
服防風通氣湯彼云瘰癧臆經病也是經火動而然



自眼涼肝降火之藥反致不食痛盛予診其脉胃氣  
愈弱先以四君子加陳皮炒芍藥半夏羌活蔓荊子  
四劑食進痛止繼以防風通氣一劑而愈 一女年  
十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱咳嗽飲食少  
思老嫗欲用巴豆肉桂之類先通其經予謂此證潮  
熱經候不調者不治但喜脉不瀦且不潮熱尚可治  
須養氣血益津液其經自行彼欲効仍用巴桂此標  
悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈  
虛果通而不止飲食愈少更加潮熱遂致不救 一  
婦人瘰癧久不愈或以木旺之證用散腫潰堅湯伐

之腫硬益甚薛以為肝經氣血虧損當滋化源用六  
味地黄丸補中益氣湯至春而愈此證若肝經風火  
暴病元氣無虧宜用前湯若風木旺而自病宜用瀉  
青丸虛者用地黃丸若水不能生木亦用此丸若金  
來尅木宜補脾土生腎水大凡風木之病壯脾土則  
木自不能尅矣若行伐肝則脾胃先傷而木反尅土  
矣 一婦患之恐不起致少寐年餘瘰癧破膿水淋漓  
經水或五十日或兩月餘一至誤服通經丸展轉無  
寐午前惡寒午後發熱薛以為思慮虧損脾血用歸  
脾湯作丸午前以六君送下午後以逍遙送下兩月



餘得寐半載後經行如期年餘瘡愈 一婦瘰癧後  
 遍身作痒脉大按而虛以十全大補湯加香附治之  
 而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作  
 風症治之必死 子和治一婦人病瘰癧延及胸臆  
 皆成大瘡相連無好皮肉求戴人療之戴人曰火淫  
 所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之即一吐而着痂次用  
 涼膈散解毒湯等劑皮肉反復如初  
 東垣連翹散堅湯 治耳下至缺盆或至肩上生瘡  
 堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經  
 中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並皆治

分經 虎治

之

當歸 酒洗

黃芩 生

連翹

廣茂 酒炒

京三稜 細剉同廣茂酒洗一次

土瓜根 酒炒

草龍膽 酒洗各壹兩

酒炒芩 朱錢

炙甘艸 陸錢

柴胡根 壹兩 貳錢

蒼朮 各叁錢

芍藥 壹錢

右以一半為細末煉蜜為丸如菉豆大每服壹伯  
 丸或壹百伍拾丸一半咬咀每服半兩水壹盞搗  
 分先浸半日煎去滓熱服臨卧頭低脚高去枕而  
 卧每口作十次嚥留一口送下丸子服畢如常安



卧

升陽調經湯 治遠項下或至頰車生瘰癧此證出足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是戊土傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻 捌錢

連翹

草龍膽 酒炒

桔梗

黃連 去鬚 酒洗

京三稜 酒洗同廣茂微炒

葛根

甘草 炙已上 各半兩

知母 酒洗

廣茂 酒洗炒 各壹兩

細黃芩 酒炒 陸錢

黃礬 去粗皮 酒炒 貳次朱錢

右秤一半作丸煉蜜丸如菜豆大每服壹伯丸或

壹伯伍拾丸一半咬咀每服半兩若能食大便硬可旋加至柒捌錢止水貳盞先浸半日煎至壹盞去滓熱服卧身脚在高處去枕頭噙一口作拾次燕之留一口在後送下丸子服藥畢卧如常此治法也

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石在耳下至缺盆

或至肩上或至脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍下頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之



柴胡稍

肆錢

草龍膽

酒炒

黃檗

去粗皮酒炒

知母

炒

瓜蒌根

酒洗

昆布

去土

桔梗

各半兩

甘草根

炙

京三稜

酒炒

廣茂

酒洗炒

連翹

各參錢

當歸

各參錢

白芍藥

葛根

黃連

各貳錢

升麻

陸錢

黃芩稍

捌錢一兩半酒洗炒一兩半生用

右吹咀每服陸錢或柴錢水貳盞先浸半日煎至壹盞去渣稍熱服於臥處仰脚在高處頭微低每噙一口作十次嚥至服畢依常安卧取藥在胸中停留故也另攢半料作細末煉蜜為丸如菜豆大

每服壹百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒

食後量虛實加減多少服皆倣此例

救苦勝靈丹湯

治馬刀挾瘦者從耳下或耳後下

頸至肩上或入鉢盆中者乃手足少陽經之分野

其瘰癧在於頰下或至頰車者乃足陽明經之分

野受心脾之邪而作也今將二證合治之

黃芪

壹錢護皮毛實腠理及活血氣又實表補元氣乃瘡家之聖藥也

人參

叁分補肺氣如氣短及不調而喘者加之

真漏蘆

半錢勿以白頭翁代之

升麻

壹錢

葛根

半錢此三味俱足陽明本經藥



甘草

半錢能調中和

連翹

壹錢此味乃十一經瘡中之藥不可

牡丹皮

貳分去腸胃

當歸身

叁分

生地黄

叁分

熟地黄

叁分此三味諸經中

白芍藥

補中益氣治腹痛如冬月寒症勿用

肉桂

貳分大辛熱能散結聚如陰症瘡瘍少用

柴胡

功同連翹如瘡不

黍粘子

腫分無昆布貳分味鹹若瘡堅硬甚

京三稜

炮貳分廣茂者用之此二味瘡堅硬甚

羌活

獨活

防風

各壹錢已

關手足太陽證脊痛項強不可回顧腰似折項

證亦當用之為能散

益智仁

貳分如唾多者胃不和也或吐沫

麥芽

壹錢消神麩炒貳分食不

黃連炒叁分

厚朴

壹錢壹錢貳分

黃檗炒叁分如

脚無力加之煩躁欲去之

右共為細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒

大每服叁錢白湯下如氣不順加橘紅甚者加

木香少許量病人虛實消息之母令藥多妨其飲

食此治之大法也如止在陽明分者去柴胡黍



粘子二味餘皆用之 如在少陽分爲馬方挾瘦  
 去獨活漏蘆升麻葛根加瞿麥參分 如本人氣  
 素弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平  
 素宜作氣盛而從病變治之權也加黃芩黃連黃  
 檨知母防已視邪氣在上中下而用之假冷在上  
 焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半酒洗在下焦  
 加酒製黃檨知母防已之類選而用之 如大便  
 不通而滋其邪盛者加酒製大黃以利之 如血  
 燥而大便乾燥者加桃仁泥大黃 如風結燥不  
 行者加麻仁大黃以潤之 如風澁而大便不行

加煨皂角仁大黃秦艽以利之 如脉澁覺身有  
 氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥  
 如陰寒證爲寒結祕而大便不通者以局方半硫  
 丸或加炮附子乾薑煎候冰冷服之  
 太抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯  
 弱者當去苦寒之劑多加入參黃芪甘草之類以  
 瀉火而補元氣餘皆倣此  
 柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬  
 刀亦治瘰癧

柴胡

當歸尾

生甘州



連翹

黃芩

牛蒡子

京三稜

桔梗各壹錢半

黃連壹錢

紅花少許

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服此是攻裏肉消之劑

柴胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

柴胡

連翹

知母酒製

黃芩炒各半兩

黃蘗酒製

生地黄

甘艸炙各錢

當歸尾壹錢半

桂叁分

牛蒡子貳錢

瞿麥穗陸錢

右剉如麻豆大每服叁錢或伍錢水貳大盞煎至壹盞去滓食後稍熱時服之

消腫湯 治馬刀瘡

柴胡

黃芩生用各貳錢

黃連

牛蒡子炒各半錢

黃芪

瓜蒌根各壹錢半

連翹叁錢

當歸尾

甘草各壹錢

紅花少許

右吹咀每服半兩水貳大盞煎至壹盞去滓食後稍熱服忌酒濕麵

羅謙甫云曲陽縣劉禪師善治瘡瘍瘰癧其効更捷

表裡夾攻

瘰癧

六二七



授予四方太乙膏玉燭散尅効散翠玉膏用之每每見効

太乙膏 治癩子瘡神効

沒藥 肆錢 清油 壹斤

腦子 研壹 麝香 叁錢 輕粉

乳香 各貳

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用蔥薑米枝旋旋加下蔥薑為度下火不住手攪至滴水不散却入乳沒腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

尅効散

蟹螯 肆拾玖箇不去翅足炒

赤小豆 肆拾玖粒 官桂 粳米 肆拾玖粒

右五味研為細末初服壹字次服半錢次服叁字又次服肆字煎葦柳根湯送下空心服以小使淋瀝併作瀉為効惡心嘔吐黃水無妨其癩癧日日自消矣

玉燭散 治癩癧自消和血通經

當歸 芍藥 大黃

甘草 熟地黄 芒硝

黃芩 川芎 各等分



右為粗末每服參錢水壹盞生薑參片煎至米分  
去香溫服日進二服七八日効

翠玉膏

方見  
廉瘡

羌活連翹湯

治癩癰初發寒熱腫痛

防風

羌活

連翹

夏枯草

柴胡

昆布洗

枳殼

黃芩

酒炒

川芎

牛蒡子

甘草

金銀花

右薄荷水煎服

次以追毒散行之以化堅湯消

乏大効

防風羌活湯 治癩癰發熱者

防風

羌活

連翹

升麻

夏枯草

牛蒡子

川芎

黃芩

酒浸

甘草

昆布

洗

海藻

洗

僵蠶

右薄荷水煎服

虛者加入參當歸

實者加黃

連大黃

加味敗毒散

治風熱上壅頸痛或因怒氣增寒壯

熱如服四五劑不退宜服益氣養榮湯

即荆防敗毒散  
加牛蒡子玄參

解表

頁

小

六



內除  
臟腑  
之本

楊氏家藏治癰癧方

荊芥

白僵蠶

黑牽牛各貳錢

蟹螯貳拾捌箇去頭翅足用大米炒

右為末臨卧時先將滑石末壹錢用米飲調服半夜時又一服五更初却用温酒調藥壹錢或貳叁錢量強弱用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以葱心湯下調琥珀末壹錢重服以小便內利去惡毒為愈如小便痛用青黛壹錢以甘草湯調送下即止

嚴氏三聖丸

治源瀝

丁香伍拾粒

蟹螯拾箇

麝香另研壹錢

右為末用鹽豉伍拾粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸如菜豆大每服伍柒丸食前温酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麵毒食

保命連翹湯

連翹

瞿麥各壹斤

大黃叁兩

甘草貳兩

右剉每服壹兩水貳椀煎至壹盞半早食後巳時



服在項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨  
泣穴灸貳柒壯服藥不可住至五六十日方効  
一方加大黃木通貝母知母作母各伍兩雄黃柒分檳  
榔半兩減甘草不用同前藥為細末熟水調下叁  
伍錢

三因必勝丸

治瘰癧不以年深月近及腦後兩邊

有小結塊連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚

壹箇去腸并子

雄黃

壹塊雞子大

礶砂

壹錢已上二味並入

蓬朮

半兩

梔子

皂角

貳挺四味並燒存性

葶麻子

壹斤去皮燒

黃明膠

壹斤

右為末另用皂角貳挺去皮槌碎以水叁碗揉去  
滓者精羊肉四兩爛軟入輕粉伍匣男子乳汁半  
兩同研成膏和藥末丸如菽豆大硃砂為衣溫酒  
侵晨下拾丸一服至晚看肉疙瘩子若項有伍箇  
則以五服藥取之視其所生多少以為服數既可  
更進數服

白花蛇散

治久漏瘰癧發於項腋間增寒發熱或

痛或不痛

白花蛇

酒浸軟去皮骨焙乾貳兩

犀角屑



青皮

黑牽牛 半生半炒以上  
三味各半兩

右為末每服貳錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲  
調下已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再  
進一服忌發風壅熱物如已成瘡一月可効神驗  
小犀角丸 常服除去根本截其源流應効如神諸  
癰並宜服之

犀角

青皮

黑牽牛 半生  
半炒

陳皮 各壹  
兩

連翹 半兩

右為細末用皂角貳挺去皮弦子泡槌以布絞取  
汁壹椀許又用新薄荷貳斤研取汁同熬成膏以

前藥末為丸如桐子大每服叁拾丸連翹煎湯食  
後服間以薄荷茶湯服

是齋立應散 治癰癤神効已破未破皆可服

連翹

赤芍藥

川芎

當歸

甘草 炙

滑石 研各  
半兩

黃芩

白牽牛 生取末

川烏尖 朱  
筒

土蜂房 蜜水洗飯上蒸  
日乾各貳錢半

地膽 去頭翅足  
拌米炒米

右為細末每服抄壹大錢匕濃煎木通湯調下臨  
臥服毒根從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊



血爛肉是也如未効再服繼以薄荷丹解其風熱且地膽性帶毒濟以烏尖或衝上麻悶不能強制嚼蔥白一寸茶清下以解之如小便澁燈心湯調服五苓散瘡處用好膏藥貼若癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

雌雄散 治癩癧

蟹螯 一雌一雄足翅全者新瓦焙焦去頭翅足

鶴蝮 甘草

貫衆 貳錢

右細末作兩服飽飯後好茶濃點壹盞調下

遇仙無比丸 專治癩癧

白朮

檳榔

防風

黑牽牛 半生半炒

蜜陀僧

郁李仁 湯泡去皮

蟹螯 去翅足用糯米同炒去米不用

甘草 已上各伍錢

右為細末麵糊為丸如梧子大每服貳拾丸早晚煎甘草檳榔湯送下服至一月覺腹中微疼於小便中取下癰子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消

射干連翹湯

治癩癧寒熱

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻



前胡

山梔仁

當歸

甘草

炙各壹兩

大黃

炒貳兩

右咬咀每服叁錢水壹盞煎柒分去香入芒硝少許食後溫服日再服

括婁子散

治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

括婁子

連翹

何首烏

皂角子仁

牛蒡子

大黃

白螺殼

梔子仁

漏蘆

牽牛

甘草

右為細末每服貳錢七食後溫酒調下

枳殼丸

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼

去穰炒

牽牛

炒取頭末

木香

青皮

各壹兩

甘草

大黃

右為細末用皂角長壹尺許者叁挺約叁兩炮焦搥碎以好酒煮軟採取汁熬膏稠粘和前藥末為丸如梧桐子大每服叁伍拾丸食後蔥茶下日進二服

內消丸

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之

內消矣大効

青皮

陳皮

各貳兩

牽牛

搗兩取頭末貳兩



薄荷葉 初兩

極乾採汁去  
淫熬成膏

皂角

初兩用不蛀者去龜皮  
碎以冷水壹斗煮令

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏于和丸  
如菜豆大每服叁拾丸食後荆芥茶清溫水皆可  
下

必効散 治癩癧氣血雖無虧損內有癩核未去而  
不能愈

南礪砂 貳錢

輕粉 壹錢

麝香 伍分

巴豆 伍粒去  
心膜

白檳榔 壹箇

蟹螯 拾肆枚去  
足翅同糯

炒米

右同研極細末取雞子貳箇去黃用清調藥仍入  
殼內以濕紙數重糊口入飯甌候乾取出曝乾研  
末虛者每服半錢實者壹錢用炒生薑酒五更初  
調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從大便  
出胎婦勿餌毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合  
精要云治癩癧用必効散與瓜蒌散相間服神効  
後有不問虛實既用必効散殊不知蟹螯性猛大  
毒利水破血大損元氣若氣血實者用此劫之而  
投補劑或可愈若虛而用此或用追蝕之劑蒸肉  
雖去而瘡口不  
合反致不救

雞鳴散 治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而  
不寒者

頂部

小

三



牽牛 壹兩

胡粉 壹錢

大黃 蒸貳錢

朴硝 煉成粉者叁錢

右為細末每服叁錢雞鳴時井花水調服以利為度如未利再服

法製靈雞彈 治癩癧馬刀腋下生者

蟹螯 去頭翅足

右將雞子壹箇頂上敲開些小入藥在內紙封固了於飯上蒸熟取出去殼切開去藥五更空心和米飯嚼服候小便通如米泔水狀如脂即驗也如大便小便不通却服琥珀散三二貼催之然後常

服後二藥尤佳

妙靈散 服前藥後却將此散與連翹丸相間常服六瘡愈方止

木香 叁錢

沉香 貳錢

牛膝

何首烏

當歸

海螵蛸

桑寄生 各壹兩

海藻 貳兩

海帶

青葙子

昆布

甘草節 各半兩

右為末每服叁錢食後溫酒調下

內消連羌丸

連翹 叁兩

漏蘆

胡桃仁



夏枯草

土瓜根

射干

澤蘭

沙參

白芨

各壹兩半

右為末入胡桃仁研勻酒糊為丸如桐子大每服  
叁伍拾丸空心食前鹽酒下

土屑妙靈散

滑石 細研為粉

右每服壹錢煎川木通湯調下

六丁神散

苦丁香 陸枚或秤半錢

白丁香 壹錢

苦參末 伍分

磨刀泥 青石者佳

赤小豆

白僵蠶 去絲此炒

大蟹螯 柴箇去頭足炒

右六味共為細末每服壹錢重空心用無灰酒調下

宜毒後徹其餘邪

薄荷丹

解瘰癧風熱之毒自小便去宜毒後常須服

杜薄荷

皂角 不蛀者去弦皮

連翹

何首烏 米泔浸

蔓荆子

京三稜 煨

荆芥 各壹兩

右為末好豉貳兩半以米醋煎沸灑豉淹令軟研如糊和九桐子大每服叁拾丸食後熟水下日壹



服病雖愈常服之

四聖散 治瘰癧服白花蛇散轉利後服此藥調之

永去其根

海藻洗

石決明煨

羌活

瞿麥穗各等分

右件共為細末每服貳錢用米湯調下清水盡為度

瞿麥飲子 治瘰癧馬刀

瞿麥穗半斤

連翹壹斤

右為粗末水煎臨卧服此藥經効多不能速驗宜

待歲月之久除也

海菜丸 治瘰癧生於頭項上交接名蛇盤瘰癧宜早治

之

海藻菜蕎麥炒

白殭蠶微炒去絲嘴

右等分為細末海藻菜旋炒研篩湯泡白梅取肉減半用所泡湯為丸如梧桐子大每服陸柒拾丸食後臨卧米飲送下其毒自大便內泄出若與淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦治此病忌豆腐雞羊酒麪日五六服

檳榔散

治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食



檳榔

前胡

赤茯苓

牛蒡子

人參

枳殼

沉香

防風

甘艸

右剉碎每服肆錢以水壹盞入生薑半分煎至陸分去粗空心及晚食前溫服

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角

不蛀者叁拾挺內拾挺炮黑拾挺酥炙拾挺用水壹鍾煮軟揉取汁用

何首烏

玄參

薄荷葉

右為細末以皂角汁熬膏同鍊蜜為丸如豌豆大每服叁肆拾丸食後溫湯送下

祛風丸

首烏九

治風毒瘰癧

何首烏

乾薄荷葉

玄參

精羊肉

皂角

叁拾挺用拾挺火燒欲過拾挺酥炙去皮拾挺水接

取汁

右以皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服貳拾丸空心溫酒或薄荷湯送

絳宮丸

大黃

白朮

山查

連翹

川芎

當歸

麥芽

桃仁

蘆薈



甘草

南星

羌活

黃芩

右為末用神麴糊為丸已破加入參壹兩煎膏用

甘草節僵蠶同煎

治癩癧結核丸藥

芸薹子

海藻

桔梗

防風

升麻

黃連

苦參

玄參

枳實

麥門冬

青木香

茯苓

桂心

升麻

人參

蒼耳子

甘草

朴硝

水紅花

右粗搗篩每服貳錢水壹盞煎藥分去滓溫服食

各壹兩

酒洗各壹兩半

各半

各半

各半

各半

捌分

炒

去心各伍分

各肆分

去蘆

各肆分

各肆分

不拘多少

生用

生用

生用

生用

生用

生用

生用

生用

生用

生用

生用



後臨卧日叁好酒調亦可

又方

牡蠣

不以多少用灰深培上以炭叁斤煨火盡取半斤為細末

甘草

取末貳兩

右研勻每服貳錢食遠以建茗同點日一服忌魚酒鮓醬油鹽海味等物

治頸上塊動者

夏枯草

陸錢

甘草

壹錢

右各另為末和勻每服壹錢至貳錢茶清調下食後

許學士云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効此草三四月開花夏至邊便枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之

本事方治鼠瘰癧瘰

土附子

壹枚

食鹽

叁升

小便

伍升

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用黑豆爛煮研為膏丸附子末如梧子大每服拾丸酒吞下早晚二服



藏藥

治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一稱煨通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取肆兩玄參參兩并搗羅為末以麵糊為丸如梧桐子大早晚食後臨卧各服參拾丸酒吞下此藥將盡瘰亦除根

肘後治頷下瘰癧如梅李大宜速消之海藻壹斤酒壹升漬數日稍稍飲之

辛散

衍取蓼子微炒研為細末薄荷酒調貳錢服治瘰癧久則効

酸收

初虞世治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名

合明俗名連錢母出禾田中貼水面生取其葉搗

自然汁服之查奩患處効

甘緩

保命文武膏

治瘰癧用桑椹黑熟者貳斗以布袋

絞取汁石器中熬成膏子白湯化下壹匙日三服紅者晒乾為末湯調服

雜方

聖惠治瘰癧腫痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥炙

黃搗羅為散每日空心粥飲調下壹錢匕

破結散大成治石瘦氣瘦血瘦肉瘦馬刀瘰癧等證

海藻

酒洗淨

龍膽草

酒洗

海蛤粉

通草

貝母

去心

礬石

枯



昆布

酒洗淨

松蘿

各叁錢今以桑寄生代効

麥麩

炒肆錢

半夏麩

貳錢

右為細末每服貳錢熱酒調食後服忌甘艸鯽魚  
雞肉五辛生菓有人於項上生癩大如茄子潮  
熱不食形瘦日久百方不効後得此方去松蘿加  
真桑寄生一倍服五日後其瘡軟而散熱退而愈  
屢醫數人皆効

**補虛**

益氣養榮湯

治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項

等處患腫不問軟硬赤白腫痛或潰而不斂

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附子

當歸

酒拌

川芎

黃芪

鹽水炒

熟地黄

酒拌

芍藥

炒各壹錢

甘草

炙

桔梗

各伍分

白朮

炒貳錢

柴胡

陸分

右薑水煎服

附散腫潰堅丸

治癩癧馬刀瘡服益氣養榮湯不

能消散者宜服此丸五日又服益氣湯五日如此  
相兼服之不應以針頭散傳之

知母

黃蘗

各酒拌炒

瓜蒌根

酒拌

昆布

酒洗炒

桔梗

蓬茂

酒拌炒



連翹

黃連炒

京三稜酒拌炒

葛根

白芍藥各參錢

升麻

當歸尾酒拌

柴胡

甘草各壹兩

草龍膽肆兩酒炒

黃芩壹錢伍分酒炒

為細末煉蜜為丸如菉豆大每服壹佰丸或壹佰

伍拾丸滾湯送下

又治瘰癧

人參

白朮

當歸

陳皮

芍藥酒浸各壹錢

川芎

香附子

茯苓

半夏各伍分

甘草少許

右作一服薑貳片以金銀藤煎湯壹鍾半煎前藥

食後就吞絳宮丸伍拾粒方見前

補陰八珍湯 治瘰癧等瘡屬足三陰虛者

當歸

川芎

熟地黄

芍藥

人參

白朮

茯苓

甘草

黃蘗酒炒黑

知母酒炒各柒分

右水煎服

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久成

漏用夏枯草陸兩水貳鍾煎至柒分去粗食遠服



初氏診治法

此生血治瘰癧之聖藥虛甚當前濃膏服并塗患處多服益善煎十全大補湯加香附子貝母遠志尤善

初虞世云瘰癧多生肩項或赤或白或沉或浮初生如豆久似核年月浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或生六七俗云蟠蛇癧是也用性努力思慮過久則疾痛赤腫繼之早治為上

流注癧婦人多有之其性急躁其氣佛鬱其心執着初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癧也

又名千歲瘡宜服托裏救苦神應丸

川烏附去皮臍生用 當歸酒浸壹宿

白芷 陳皮 甘草節各壹兩

烏頭伍兩 薑黃壹兩半

大皂角柴錠去皮弦子 蟬蛻水洗半兩

右用皂角敲碎水肆大椀煎至貳大椀濾去渣用汁一同煮烏頭川烏候烏頭爛為度搗如泥其餘諸藥却另為末和烏頭泥為丸如桐子大每服陸拾丸飢飽皆用薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指大或黑或白乃風與氣搏宜驅



風行經散氣之劑以化氣調經湯主之

化氣調經湯 與神應丸間服治流注癰

香附子 酒浸壹宿日乾 羌活 白芷 各壹兩

牡蠣 火煨 甘草 天花粉

皂角刺 各半兩 橘皮 貳兩

右為細末每服貳錢用白湯不拘時調下日三次如脉有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂 血竭 各壹錢 麝香 壹字共研細

大黃 大甘草節 各半兩共為咬咀

右為咬咀河水壹鍾煎至半鍾調前末子臨卧服之

單窠癰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之日久自消或發於顙骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日久 蓮子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬挨不動者乃不可生憎寒發熱躁渴凡遇此證至難治雖神聖亦無知之何也已

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在

下重疊見之是名重臺癰此證藥不可療不可針灸



若是毒行其腫痛發渴生痰萬死一生害入極速初  
覺有之急用小犀角丸粉金散治之 燕窠癰形似  
燕窠不可治

外治

程石香治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏  
於中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡  
取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥  
後出者皆愈或不肯收如銀杏者盡皆開了用藥取  
之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故  
膿水淋漓久難得愈治者用鐵烙燒赤烙去其破核  
猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去毒

惡之根遂能長肉而愈隨經絡證候服除風熱兼引  
經之藥以除根本可獲全功也

蟾酥膏

蟾酥 如大豆許  
巴豆 伍粒

白丁香 拾伍粒 寒水石 些少  
寒食麵 些少

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如菜豆大每  
用壹丸或貳叁丸納入針竅中如膿未盡再用數  
丸以膿盡為度

綠雲膏

黃連

大黃

黃芩



玄參

黃礬

木鼈子

去殼各壹錢

右細切用香油壹兩同煎焦色去藥入淨松香伍兩再煎成膏濾入水中扯拔令金色入鈔再熬放温入後藥猪膽汁叁枚銅綠叁錢醋浸壹宿綿濾去粗右用竹筴帶温攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙

金寶膏

去腐肉朽肉不傷良肉新肉

桑柴灰

伍梳用沸湯拾梳淋汁先以草帚一層皮帚二層放羅底次置灰於上淋之

穿山甲

貳兩煨胖

信砒

貳錢

杏仁

柒粒去皮同信砒穿

山甲

研細

生地黄

貳兩

辰砂

壹錢

粉霜

另研

麝香

各半錢

右將灰汁濾清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下麝香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

龍珠膏

龍牙草

伍兩

棘棗根

半兩

海藻

貳錢半

蘇木

半兩

桑柴灰

石灰

蒼耳草灰

各貳半

右細切量水貳拾碗煎至拾貳參碗濾去粗又用草紙兩層皮紙兩層放籬底次置灰於上用煎



**散**

湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉磁罐子收貯取傳核上再傳即去舊藥併壓再上新藥其核即潰而愈根小者但只塗藥於根上其核自潰

蝸牛散因治瘰癧潰與未潰皆可治

蝸牛

不拘多少以竹筴穿其壳上晒乾燒存性

右為末入輕粉少許豬骨髓調用紙花量瘡大小貼之一法以帶殼蝸牛柴箇生用取去肉入丁香柴粒於柴殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

粉金散

黃蘗

草烏各等分

為末蜜調傅之

東垣龍泉散

塗瘰

瓦粉

龍泉粉炒即磨力石上粉也

廣茂

京三稜各酒浸 昆布洗去土各半兩

右件同為極細末煎熟水調塗之用此去疾尤速

奇功散郭治瘰癧馬力頑惡等瘡

野糞尖乾壹兩

蜜陀僧

無名異各半兩

皂角

乳香

沒藥各叁錢

右糞用鹽泥封固炭火煨之去泥取出同藥五味



研為末加麝香少許用清油調勻漫敷上濕即乾  
摻其功神效

蝙蝠散 治癩多年不瘥

蝙蝠 壹箇 貓頭 壹箇

右同燒作灰撒上黑豆煨其灰骨化碎為細末濕  
即乾摻乾則油調傅內服五香連翹湯  
螺灰散

大田螺 連殼燒

右為細末破者乾貼未被者香油調傅  
治癩癰未破者如神百藥不應者累效

杏樹葉 陰乾為末伍分

蝙蝠 火焙乾為末

蜜蜂 采箇焙為末

萬年霜 火煨為末貳分  
白花蛇蛻 燒為灰存性為末各貳分半

右將杏樹葉末用清調却入前四件藥末調勻  
傅患處却將皮紙一片用針刺孔貼藥上如乾用  
清水就紙上刷之每一晝夜換藥一次如面上發  
熱服清涼飲子數貼其熱自退  
敗散癩癰方神效

白膠香

海蝶蛸

降真香

右等分為末摻患處外以水帛掩之一夕而退

用氣者無



已破者

蜜蜂貳拾壹個

蛇蛻未分半

蜈蚣貳條

右用香油肆兩將前三藥入油內用文武火熬成入光粉貳兩用桑枝柴條如筋大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用帛攤作膏貼患處得於義門

鄭氏累驗不須服藥貼上五七日便消

丹貼瘰癧方用大烏頭伍個火炮伍箇生用並去皮臍大皂莢貳條半以好米醋貳鍾刷炙醋乾為度一半焙乾並去黑皮又用炒糯米一百六十粒同研末以好米醋於火上略頓微煖傳貼患處入蜜少許尤

佳 不問有頭無頭大蟾伍枚日乾細研酥調如麵

日兩度貼之出聖惠方蟾一作蜘蛛 或破或不破項以下至

胸前者皆治之用九真藤如雞卵大洗生嚼常服之

取葉搗傳瘡上數服即止出斗門方九真藤即何首烏也

治瘰癧用鯽魚芫花燒灰存性水調傳 治鼠瘰小嫩

鼠未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各為

末和勻油調傳乾再傳之

本治鼠瘰癧刺蝟皮瓦上炒右一味研為末加水

銀粉乾傳

廣治瘰癧經年不瘥者生玄參搗碎傳上日一易之



外治瘰癧燒狼屎灰傳上  
治諸瘰疾事本

硃砂

砒霜

礞砂

馬牙硝各等分

右乳鉢內研細麵糊搜如香附子狀相瘡口大小作之盡送入瘡口中恐腫時用薄荷研細塗之待收口却將大礪皮白丁香並為末盡入孔中如邊不乾却用江子去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入臘合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立効

治漏瘰用蛇瓜子不拘多少瓦上晒乾為末用紙燃

入瘡口立効蛇瓜子未詳

神聖換肌散郭氏

去瘰癧頑瘡此方乃追蝕死肉

白僵蠶貳錢

白礬壹錢半

砒霜生

蟹螯去翅足

草烏頭

青黛各壹錢

麝香少許

右研極細末乾摻此少於瘡口內用膏藥蓋護其惡肉化膿水

生肌乾膿散

治瘰癧馬刀膿汁不乾者

黃連

貝母

降真香燒存性

白芨

海螵蛸

五倍子炒黑



芸香

各伍錢

輕粉

伍分

右為末用藥水洗次揆此末外貼膏藥

如神散 治瘰癧已潰腐肉不去瘡口不合者

白礬

煨參錢

松香

焙化傾地上壹兩

右末揆少許於瘡口上外貼膏藥

三品錠子

上品 治一切痔漏

白礬

貳兩

信石

壹兩零伍分

乳香

沒藥

各參錢半

雄黃

參錢

中品 治五漏六瘤氣核瘰癧

白礬

貳兩

信石

壹兩參錢

乳香

沒藥

各參錢

雄黃

貳錢

下品 治瘰癧氣核惡瘡六瘤

白礬

貳兩

信石

壹兩伍錢

乳香

沒藥

各貳錢半

雄黃

壹錢

右三品俱同製度先將信石打碎如豆大置甘鍋內上以礬末蓋之瓦片蓋上以炭火煨令烟盡取出候冷為末用秫米糊為線挺陰乾隨瘡大小深淺長短臨時裁度先以鉄筒拔毒膏點破次以藥線縫入瘡內膏藥貼之藥線消盡又要換藥三四



次年深者五六次其根自腐潰如瘡露在外更用  
蜜水調搽濕則乾上亦可

紫霞錠子 治瘰癧痔痛惡瘡

信石煨 白礬煨 硃砂各壹錢 膽礬

雄黃分各伍 硃砂分各伍 乳香 沒藥各貳分半

麝香 片腦各半

右末稠糊為錠子如豆大帶扁些及作藥線隨瘡  
大小深淺長短臨時裁度先以拔毒膏點破次以  
藥錠放在瘡口膏藥貼上三日一換藥待肉腐之  
時藥線插入瘡口膏藥貼上直候腐肉去盡為度

三才絳雲錠子 治瘰癧痔漏六癰惡瘡

天才 初開瘡口緊峻之藥

白礬煨伍錢 雄黃叁錢 信石生 硃砂生

朱砂各貳錢 膽礬生 乳香 沒藥各壹錢半

麝香 片腦各少許

地才 次去死肉緊緩之藥

白礬煨伍錢 雄黃叁錢 信石煨過 朱砂各貳錢

硃砂生 膽礬生 乳香 沒藥各壹錢半

兒茶 血竭 輕粉各伍分 麝香

片腦各少許



人牙 又次生新肌去瘀肉緩慢之藥

白礬煨伍錢 雄黃叁錢 赤石脂煨 兒茶

硃砂各貳錢 硃砂水煮乾 膽礬煨 乳香

沒藥 輕粉 血竭各壹錢半 麝香

片腦各少許

右末用秫米糊為錠子如豆大帶扁些陰乾又作藥線如麻黃樣先用鐵確膏點癰頭令黑次紙此錠膏藥貼上三日一換藥腐肉不盡出者可更用下品錠子及針頭散取盡腐肉止有膿汁不乾者用生肌乾膿散摻瘡口膏藥貼上如要生肌速用

生肌散摻瘡口上膏藥貼之

碧玉錠子 治瘰癧惡瘡

銅青叁錢 膽礬生 白礬煨 白丁香

信石煨 硃砂生 雄黃 朱砂

乳香 沒藥 輕粉各壹錢 麝香

片腦各少許

右末稠糊為錠子如豆大帶扁些及作藥線陰乾先用拔毒膏點破瘡口上貼膏藥直至腐肉去盡只貼膏藥以肉生滿為度

有一老媪亦治此證索重價始肯醫治其方法乃是



下品錠子絀瘡內以膏藥貼之其根自腐未盡再  
用去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之予見其  
治氣血不虛者果驗若氣血虛者雖潰亦不愈  
餅項後側少陽經中疔瘡不辨肉色不問大小及月  
日深遠或有赤硬腫痛用

生山藥 壹塊去皮 草麻子 壹粒

右研勻攤貼之如神丹溪云山藥補陽氣生者能  
消腫硬經曰虛之所在邪必

湊之留而不去其病為實非腫硬之  
謂乎固其氣則留滯自不容不行

清涼散餅

山慈菇 生用 良薑 等分

右俱搗為餅去汙番之能散去寒熱或以山慈菇  
磨調酒服大妙此藥大能散癰如神

香附餅 治癰癰腫核或風寒襲於經絡結腫或痛

香附子 不拘多

右末酒和為餅覆患處以熱熨半熨之未成者內  
消已成者自潰若風寒濕毒用薑汁作餅

治癰癰不問有頭無頭者

右用天蜘蛛伍箇晒乾細研酥調如面脂日二度  
傳之蜘蛛用屋簷頭結網者其他不可用

又方 用黃頰魚破開入草麻子貳叁拾粒在肚內



以綿纏定於廁坑內放冬三月春秋二月夏二月  
取出洗淨用黃泥固濟文武火煨帶性爛研為末  
香油調傅及治廉瘡

膏荔枝膏 治瘰癧

荔枝肉壹兩輕粉 麝香 白豆蔻

川芎 砂仁各半錢 硃砂 龍骨

血竭 乳香各壹錢 全蠍伍枚

右將荔枝肉搗爛軟米飯和為膏看瘡大小攤貼  
如有三五箇者止去點為頭者妙

琥珀膏治頸項瘰癧初發如梅子腫結硬強漸若連

珠或穿穴膿潰肌汁不絕經久不瘥漸成瘻疾並  
皆治之

琥珀壹兩丁香 木香各叁分 桂心半兩

硃砂 白芷 當歸 木鼈子去殼

防風去蘆 木通各半兩 黃丹柒兩 垂柳枝叁兩

松脂貳兩 麻油壹斤

右除琥珀丁香桂心硃砂木香為細末餘藥細剉  
以油浸一宿入鑪中以慢火煎候白芷焦黃漉出  
次下松脂末瀘去滓再澄清油却入鑪中慢火熬  
下黃丹以柳木篦不住手攪令黑色滴水中成珠



不散看軟硬得所入琥珀等末攪勻磁器盛用時  
看大小用火煨紙上勻攤貼

蜂房膏 治熱毒氣毒結成癰癤

露蜂房 炙 蛇蛻 炙 玄參 蛇床子

黃芪 剉各參分 杏仁 壹兩半 亂髮 雞子許 鉛丹

蠟 各貳兩

右先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令  
酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡  
即綿濾更下鎊中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉  
出於磁盆中盛取貼瘡上一日一換

鐵筒拔毒膏 治癰疽疔毒癩癧六瘤疔瘡頑癬痔

漏瘰癧惡瘡腫瘍一切惡肉惡核等毒已成者點  
破膿腐即去未成者自然消散其毒雖不能全消  
亦得以殺其毒也

蕎麥稽灰 桑柴灰 礦石灰 各壹碗 真炭灰 壹盞

右將四灰和勻用酒漏壹個將棕帕塞住竅用水  
參拾碗熬滾淋灰汁將汁復熬滾復淋過取淨藥  
力慢火入磁罐煎熬以紙數重固口熬至壹碗為  
度乘滾入礦石灰末攪勻如糊之樣入黃丹取如  
微紅之色密封固罐口候冷次日將厚實磁罐收



貯密塞其口每用少許塗毒頂之上即時咬破不  
黑又點以黑為度如藥乾以唾調塗如要急用只  
將燒大柴灰九碗石灰三碗淋灰汁熬濃汁如前  
製用更有枯瘤膏十陳膏治法並同  
黑虎膏 治瘰癧諸瘡神效

大黃

黃連

黃芩

黃蘗

當歸

各壹兩

木鼈子

伍錢

穿山甲

叁錢

亂髮

壹丸

蛇蛻

壹條

麻油

壹斤

黃丹

水飛炒搗兩無真  
的好光粉代之妙

乳香

壹兩

沒藥

伍錢

阿魏

壹錢半

右將前九味剉碎入油浸五七日煎熬微黑濾去

查入黃丹慢火熬成膏候冷入乳香沒藥阿魏末  
攪勻油紙攤貼

十香膏

治五發惡瘡結核瘰癧疔瘻疽痔

沉香

麝香

各壹錢

木香

丁香

乳香

甘松

白芷

安息香

藿香

零陵香

各伍錢  
為細末

當歸

川芎

黃芪

木通

芍藥

細辛

升麻

白欵

獨活

川椒

藁本

菖蒲

厚朴

商陸根

木鼈子

官桂

各貳錢

桃仁



柏子仁 松子仁 杏仁各伍錢 槐枝

桑枝 柳枝 松枝各貳兩 沒藥

輕粉 雄黃 硃砂 雲母石

生犀角 亂髮灰 白礬灰各貳兩另

真酥 羊腎脂 豬脂各貳兩 黃丹壹斤

清芝麻油叁斤

右先用木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入酥脂煎十餘沸再以新綿濾過油澄清拭錫令淨再入火上煎油沸下丹用濕柳枝作篋子不住攪熬一日滴

在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉入味輕煎令沸出火不住攪此食時於磁盒內密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服柒丸空心溫酒送下

又方治瘰癧已破核不腐致瘡口不斂或貼琥珀膏不應時效針頭散傳之以去腐肉以如神散傳之更服益氣養榮湯若氣血虛者先服益氣養榮湯待氣血稍充方用針頭散仍服前湯

九治瘰癧 右先於瘡上灸三壯然後用藥潰作瘡



外科 癩癧 卷之三

口用新活鱧魚截長一指大批開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚覷魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡蟲子後用歛瘡口藥

龍腦 乳香各壹字 麝香 粉霜

雄黃 輕粉各半錢

右為細末水糊為丸如小麥大每用壹丸兩丸紐在瘡口內覺腫痛是效

洗方拔毒湯 治癩癧百雜瘡腫悉能內消

防風 荆芥 羌活 獨活 細辛 藁本 川芎 白芷

大黃 苦參 當歸 赤芍藥

威靈仙 玄參 何首烏 黃蘗

甘草 蜂房 甘松 藿香

蒼朮 石菖蒲 零陵香 枸杞子

針灸

靈樞寒熱篇黃帝曰寒熱癩癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在於臟其末上出於頸腋之間其浮於脉中而未內着於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使

外科 癩癧 卷之三 二百一



衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已

右經一章皆從經脈取臟腑之本以治癩癰之本也其末出於耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者當於手足少陽經取之或針或灸如後穴

扁癩癰天井 肩井 撮癩癰天井 半寸灸

東腋腫馬刀挾癭善自嚙舌頰天牖中腫寒熱

臨泣 丘墟 各壹分 太衝 壹分灸 腋下頸項腫

天池 順皮叁分 如頰腫加後谿 伍分灸 腋下

腫馬刀挾癭喉痺 陽輔 伍分灸 申脈 壹分灸

甲胸中滿腋下腫馬刀癭善自嚙舌頰天牖中腫淫

灤脛痠頭眩枕骨頰痛目澀身痺洒淅振寒季脇

支滿寒熱脇腰腹膝外臄痛臨泣主之 馬刀腫癭

淵腋章門支溝主之 出於頰下或至頰車者當於

手足陽明經取之或針或灸如後穴 三里 足陽

合谷 手陽

丹搗生商陸根作餅子置於癩癰上艾炷灸餅子上

乾即易之灸三四餅

世當癩上貼肉灸十四壯神効

東癩癰馬刀將先出一瘡用四楞鐵環定住不令出



移破作口子以油紙擦之勿令合了以絕其瘡之源其効至速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以龍泉散主之方見前

肩尖肘尖二穴圖



此穴治瘰癧之秘法蓋瘰癧屬肝膽二經故患在耳前後項腋之間男子多因恚怒虧損肝經之血陰火內作或不慎起居耗損腎水不能生肝血婦女多因恚怒傷肝火動血燥或鬱結傷脾火動血耗或患於胸孔間亦屬前經此證若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴疎通經絡若因火鬱怒元氣虧損而不愈當推其所屬而調補化源如取其穴當以指甲搯兩肘兩肩四所患處覺酸麻方是其穴又方灸瘰癧未成膿者用大蒜切片如二錢厚安患處用艾壯於蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十

頁下 瘰癧

小 十三

七



數蒜片以拔毒如破久不合內有核或瘀肉此  
因血氣不足不能腐爛以銅錢挺輕輕連衣膜取  
去縱取重亦不痛不必畏懼更用江西豆豉為末  
唾津和為餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼  
琥珀膏或太乙膏瘡口自合

診

靈樞黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其  
中有赤脉上下貫瞳子見一脈一歲死見二脈半一  
歲半死見三脈一歲死見四脈半一歲半死見五脈  
三歲而死見赤脉不下貫瞳子可治也 肺脉微瀼  
為鼠瘦在頸支腋之間下不勝其上其應善瘵

八肩部 六

○肩疽

靈樞云發於肩及臑名曰疔癰其狀赤黑急治之此  
令人汗出至足不害五臟癰發四五日逆熯之 鬼  
遺云丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔  
疽五日腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十  
日死 陳乾疽腫發起兩肩及兩大臂連胛骨二十七  
日痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺  
刺之無血者死 或問肩上生疽何如曰此處手足  
三陽交會之所名曰肩疽由風熱鬱結所致或因負

肩疽 小斗三



重損傷而作服烏金散勝金丹活命飲加柴胡桔梗  
壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯托之

○肩胛疽

或問肩胛內痛漸至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽  
卽蓮子發屬手太陰肺經積熱所致宜活命飲加桔  
梗黃芪奪命丹勝金丹黃芪木香散選用壯實者八  
陣散一粒金丹下之赤色者可治青黑者不治喘嗽  
太渴曾滿脉微者死

○左右串

或問左右搭串何如曰左肩骨上生疽串於右者可

治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說愚謂不  
然故注左右者氣血不調陰陽交錯也宜勝金丹活  
命飲加羌活桔梗壯實者八陣散一粒金丹下之七  
惡證少何慮難痊元氣虛憊治之何補哉

○缺盆疽

或問一人年六十肩前陷中生疽寒熱大作飲食少  
進肩背拘急小水不利胸腹膨脹何如曰是名缺盆  
疽又名鎖骨疽屬足陽明胃經手少陽三焦經宜隔  
蒜灸先服紫金丹奪命丹而惡證退惟苦小水不利  
投以六一散而利後服十全大補湯而安若治之稍



緩必致潰爛是經少血多氣滄口不合危篤者多矣

○肩後疽

或問肩膊後骨上生疽何如曰此名上鼠疽即上搭也怒氣積鬱所致屬太陽兼少陽經初覺宜隔蒜灸活命飲加羌活桔梗柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既潰十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

○過肩疽

或問肩後來脊兩邊腫硬疼痛何如曰此名筋疽亦名過肩疽初得寒熱似瘡但腫硬無頭急隔蒜灸服活命飲加羌活勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金

丹萬病解毒丹選用

○瘰癧癰

或問項腋兩乳旁結核或兩胯軟肉處生腫塊何如曰是名瘰癧癰屬手少陽三焦經其發緩慢是冷證非熱證也宜用回陽玉龍膏熱藥敷貼服內補十宣散何首烏散勝金丹選用

○腋發

靈樞云發于腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀挾瘦急治之鬼遺云內疚疽發兩



腋下及臂并兩手掌中振寒熱血益乾飲多即嘔煩  
心悁悁脉盛六七八日診如此可汗不汗死

○夾肢癱

或問肩膊下隙内生疽何如曰是名夾肢癱屬手少  
陰心經手厥陰心包絡風熱所致宜服內托黃芪柴  
胡湯壯實者八陣散一粒金丹下之及紫金丹勝金  
丹選用老弱者黃芪木香散人參養榮湯十全大補  
湯主之

八臂部 七

○臂癱

鬼遺云垂臂兩處發接骨下臂驚上起如雞鴨卵大  
皆由榮衛不調所為也喜患實處而不透內亦宜急  
消或發穴早療 兩臂肘起在接骨下引手至小骨  
之上發癱瘡此處雖實柰連大小筋骨舉動不便垂  
手多墜疼如膿深沉徹骨即傷筋脉牽縮不舒搗撮  
宜急以緩慢筋脉藥餌治之 玄機云在臂外為癱  
在臂內為魚肚發在臂上節腫連肩髃為臂風毒宜  
活命飲加羌活獨活桂枝桔梗水酒各半煎服及奪



命丹紫金丹勝金丹選用壯實有裏證者一粒金丹  
八陣散下之若漫腫無頭服敗毒之藥不能消者宜  
十全大補湯加桂枝桔梗托之有嘔吐而數日不食  
者潰出膿則愈

**治驗**一人年將六十五月患右臂膊腫盛上至肩下  
至手指色變皮膚涼六脉沉細而微此脉證俱寒乃  
附骨癰也開發已遲以燻針啓之膿清稀解次日肘  
下再開之加吃逆不絕與丁香柿蒂散兩服稍緩次  
日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿食減時發昏憤灸  
左乳下黑盡處二七壯又處托裡溫中湯一兩半與

服或曰諸痛瘡瘍皆屬心火又時當盛夏者而用薑附  
可乎予曰經云脉細皮寒瀉利前後飲食不入是為  
五虛况吃逆胃中虛寒此證內外相反須當捨時從  
證遂投之諸證悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正復用  
五香湯數服月餘而愈機按此證多屬虛寒此方專  
以補其虛蓋因吃逆腹滿乃氣鬱壅也想必其人  
年雖老脉證雖虛而形體頗實非陰虛吃逆比  
一揮使臂腫一塊不痛不赤脉弱嬾食時嘔以六君  
子加藿香酒炒芍藥嘔止食進再以八珍湯二十餘  
劑膿成刺之又以十全大補湯而愈次年傷寒後臂  
復腫微痛乃傷寒餘毒也然無表證但虛弱耳先用



十宣散四劑取參芪芎歸扶助元氣防風桔梗白芷  
厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再用八珍  
湯膿潰而愈至冬臂復作痛因服祛風藥反筋攣痛  
甚此血虛不能養筋筋虛不能束骨用加味十全大  
補湯百貼而愈 一女臂患腫潰久不斂寒熱交作  
五心煩熱飲食少思月水不通以逍遙散月餘少可  
更服八珍湯加丹皮香附又月餘經通再加黃芪白  
斂兩月餘而愈 一人臂腫患毒作痛服寒涼藥食  
少大便不實予用理中丸二服更以六君子加砂仁  
藿香再以托裏膿潰而愈 凡瘡痛甚者若厚有

近五十左膊外側紅腫如粟予曰勿輕視得獨參湯  
數斤乃佳數貼而止旬餘值大風拔木瘡上起一紅  
線繞背抵右肋與大料人參湯加芎木補劑兩月而  
安 一婦臂痛筋攣不能屈伸遇寒則劇脉緊細此  
良甫所謂肝氣虛為風寒流于血脉經絡搏于筋筋  
不榮則乾急為痛先用舒筋湯次用四物湯加牡丹  
皮澤蘭白朮而愈亦有臂痛不能舉或轉左右作痛  
由中腕伏痰脚氣滯不行宜茯苓丸或控涎丹治之  
一人手臂結核如粟延至頸項狀似瘰癧此風濕  
流注用加减小續命湯及獨活寄生湯更以托裡藥



倍加參芪歸木百貼而愈機按此條有證無脈認作所見也後用補劑百貼而愈是終不離于虛也一兒三歲臂患毒焮痛服解毒丸搽神功散而消此條證脈不詳當時必有所見嘗治臂毒便閉煩躁服五福化毒丹亦效若膿成急刺用紙燃蘸麻油維瘡內以膏藥貼之若兒安靜不必服藥候有膿取去仍用絳貼一人臂患疽脈數飲槐花酒一服勢頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平槐花治濕熱之功最為神速胃寒不宜過劑尹老家貧形志皆苦自幼頰疔腫痛在手陽明大腸經分出癰第四日稠膿臂外皆

此得自八風之變以脈斷之邪氣在表飲食如常大小便如故腹中和口知味知不在裏也不惡風寒只熱躁脈不浮知不在表也表裏既和邪在經脈之中故曰疑于血脉為癰是也癰出身半已上故風從上受因知為八風之變而瘡只在經脈之中法當却寒調和經脈中血氣使無疑滯可愈矣宜以白芷升麻湯機按此方舉一身而言故陽明為一身之中若以各經言之而陽明亦自有表裏中二等之劑太陽亦多有表裏之中之方一人年踰三十臂患癰潰而不痛膿稀脈弱丹溪曰疽潰深而不痛者胃氣太虛不知痛也東垣曰膿水清稀瘡口不谷氣血俱虛也

臂痛 小斗三



理宜大補彼不聽服消毒藥氣血愈虛遂不救丹  
 溪曰纔見腫痛叅之脉證倘有虛弱便與滋補氣血  
 可保終吉又曰潰瘍內外皆虛補接為主茲則見善  
 不從自用已智寧免死乎一人年逾四十臂患毒  
 焮痛作嘔服托裏消毒藥愈盛予用涼膈散二劑頓  
 退更以四物湯加芩連四劑而消機按此所謂腫瘍  
熱毒攻心而作嘔  
 也一人兩臂腫痛服托裏藥日盛予謂腫屬濕痛  
 屬火此濕熱流注經絡也用人參敗毒散加威靈仙  
 酒炒黃芩南星數劑漸愈更以四物湯加蒼朮黃蘗  
 桔梗二十餘劑而消按此托裏藥日盛  
故改作濕熱治也 一尚書左

右砍爛入些醋温塗敷患處

赤葛膏 治病藕節及臂臑腕掌等處結毒

赤葛根皮 山布瓜根 山蘇木

山樟根皮 紫金皮 赤牛膝

赤芍根 赤毛桃根

右用皮砍爛糟炒敷塗患處

敷病肌石蝮藥

山樟子葉

右砍爛糟炒縛之又用根煎酒服之

○臍癰 俗名病藕包

外科 小兒科 百七



醫部 卷之三

臍臂表裏俱腫痛赤色惟肘節處差小故名藕包以

內外分陰陽俱如上法

泥油膏 治病藕包

塘泥 壹分 桐油 叁分

右和勻以鴨毛掃時時塗勿令乾

二瓜散 治病藕包

山布瓜根 天布瓜根

右砍爛入米醋少許和煖塗之

或問手臂陽明經分生癰初如粟米漸大如赤豆痛不可忍旬日大如胡桃枯紫色何如曰此名骨蟻疽

若毒遊遍身拘急發搐嘔噦不食冷汗自出滑泄煩躁脉亂者死犯房勞怒氣者死一人患此證一月之後遍身攻串口吐黃水穢氣滿室既而嘔吐膿血旬日而亡其人三四日前尚進飲食人與沐浴扶起皮肉俱爛患者不信醫者不識以致隕身此由七情不和積怒積憂積熱所致真元虛敗不能勝邪故也縱有丸丹天命而已惟智者防患於未然急服黃連消毒散勝金丹烏金散活命飲加羌活選用治之稍緩七惡證多者必死也 按此證發之暴死之速乃陰虛極而火獨光之故前藥不滋化源而揚湯止沸其

醫部 用癰

小年三



能濟乎

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

手部

○手發背 俗名蜘蛛背

鬼遺云兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿  
手背腫滿後聚毒成瘡深入至骨而為發手背此屬  
五種皆發毒之類也 手背腫毒乃三陽經風熱鬱  
滯而發宜服活命飲加芩連山梔桔梗升麻寒加桂  
枝熱加薑黃水酒煎服有表證者紫金丹烏金散奪  
命丹汗之有裏證者一粒金丹八陣散下之老弱者  
宜大補之劑

柿根膏 治蜘蛛背

*[Small vertical text on the left margin]*



紫背草

狐柿子根皮

右砍爛糟炒縛之又方加岩松子或單用亦可

○手心毒

手心結毒焮赤腫痛俗名病穿掌又名穿窟天蛇又名貧子孟若偏於掌邊者名穿邊天蛇又名穿埂天蛇此手厥陰心胞絡積熱所致初宜隔蒜灸之以泄其毒服活命飲加桂枝薑黃實者量表裏為汗下於紫金丹奪命丹烏金散一粒金丹選用既潰參芪大劑補之

蜈蚣散

治病穿掌

穿山蜈蚣

花心蜈蚣

背子蜈蚣

山蘇木

飛天蜈蚣

金頭蜈蚣

酒罈子根

赤牛膝

臭不待根

紫背草

紫金藤

右酒煎服不飲酒人水煎入少酒和服又用過路蜈蚣溪女葉煎水浸洗

又方

穿山蜈蚣

雞屎子

金腦香

紫金藤

右水煎入酒和服

敷穿掌穿板藥



手音 女和 三 百五

仙人掌根

雞屎根皮

赤葛根皮

葛合根

山布瓜根

背子蜈蚣

山樟根皮

赤牛膝

落鴉鎗根

天布瓜根

山枇杷根皮

紫河車

紫金皮

右搗爛入醋少許和塗患處

又方

仙人掌根磨米醋煖塗傳又用藜蘆子煎醋薰又

用零香子煎水浸洗

浸洗方

石楠藤

赤牛膝

赤麻蕒

八角茴香

赤薺子

九節香

豬屎蘇

穿山蜈蚣

鐵菱角

含笑葉

鐵梗子

落鴉鎗

山蓼葉

右煎水薰浸淋洗之

潰爛者用搽末

舊飯管燒存性為末相油掃患處次搽末或用生

肌散亦大効

飯管要用農家者取其日日貯飯

藏氣者効

○虎口疽

虎口結毒焮赤腫痛名合谷疽又名丫刺毒又名臂



蟹毒又名手又發又名病蟹又此手陽明太腸經風熱積毒之所致也初覺宜隔蒜灸之服活命飲加桂枝薑黃桔梗升麻水酒煎服壯實者量表裏為汗下老弱者十全大補湯十宣散托裏散中選用 五指又處結毒焮腫者俗名鴉文

草靈散

治病蠲又

解艾草

又名解艾穢

右砍爛酒炒縛之

又方

山馬稍根皮砍爛糟炒縛之

又方

宿地薤白根葉砍爛酒炒縛之

又方

楸子葉砍爛糟炒縛之又以小葉淨瓶子煎

水熏洗亦効

又方

碌礪草葉砍爛酒炒縛之又以梗煎水浸洗

落鴉鎗散

治鴉文

落鴉鎗

大金錢

羊蹄菜

水楊柳根

右砍爛糟炒縛之

又方

落鴉鎗

紫金皮

山布瓜根

天布瓜根

右砍爛糟炒縛之

又方

落鴉鎗根搗爛糟炒縛之

又方

落鴉鎗根天布瓜根砍爛糟炒縛之

手部

小科三



○腕癰

手屈之處結毒焮赤為手屈發俗名手牛押屈此手  
三陰經風熱聚毒之所致也治法同前一人年四  
十手腕生疽面目手臂俱浮腫飲食全不進者七日  
矣惟飲水數升神思昏憤小便不利時值盛暑穢氣  
逼人惡證疊見不應用藥姑以玉樞丹加蟾酥塗之  
出蛆合許膿升許惡證悉退補養而痊

紫金牛皮

赤葛根皮

赤毛桃根

焮痛者

紫金牛膝散

治手半押屈及脚上一切腫毒堆核

山布瓜根

赤牛膝

魚桐根皮

天布瓜根

落鴉鎗根

右砍爛糟炒執縛患處

又方

魚桐皮根

落鴉鎗根

紫金皮

右砍爛糟炒縛之

又方

落鴉鎗

葛合根

馬藍草

天布瓜

山蘇木

紫金皮

赤毛桃

赤牛膝

芙蓉葉



山布瓜

赤葛根

魚桐根

李子根

右搗爛糟炒縛之久不退加山樟子葉及根皮  
○手大指疽

手大指頭發小點如粟漸大如豆或如桃李或青或紫乍黃乍黑乍白或痒或麻木不痛或大痛徹心此名調疽屬手太陰肺經積毒毒盛者宜截去之四日刺得血膿者生得黑血者死急服烏金散紫金丹汗之壯實者一粒金丹下之毒氣攻心嘔吐不食膨脹者死齒縫出血者死一人患此色黑不痛其指已

死令斬去之速服補藥恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救

○天蛇頭

手中指頭結毒焮赤腫痛或不拘何指名天蛇頭若有膿裂開有口唇如蛇頭狀是以名焉屬手厥陰心包絡積熱所致宜服活命飲加柴胡羌活桔梗黃連消毒飲紫金丹烏金散選用雖黑色頑麻潰爛脫指者亦不死

丹溪云蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朶花如菊花者取乾與蒼耳艸二味等分為末以好醋濃



煎浸洗即愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭極効累驗見乳癰

世治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盒患處累効

治天蛇頭用野落蘇即兼金銀花藤天薺麥

右細切用好米醋濃煎先薰後洗

又方用入糞雜黃泥搗之裹在患處即愈

拔毒散治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為發指

徹骨疼痛不可忍者

乳香少許研泥蜂巢壁間採研

右為末用醞醋調塗乾則以醋潤之痛立止

治惡指謬云天蛇頭

蜈蚣壹條火燒右以烟熏病指一二次即安

治蛇消腫散治蛇咬及蛇節疔蛇腹疔蛇頭疔蛇

背疔等證

蛇頭瓜 天菰藤 木虱藥

仙人薯 土木香 紫金藤

大小青 右搗酒温服以查敷之

除瘡消痛散治蛇頭子及一切蝮蛇瘡

紫金藤又名開右搗酒服之以查敷患處大効



又方 金腦香葉搗酒服以查敷之

又方 蛇頭瓜草又名赤田黃又名一麻二麻有三箇根即一麻有二箇根名一麻

右砍爛酒炒縛之

又方 紫金鍾 六月雪 二味砍爛糟炒縛之

又方 溪汝子葉 過路蜈蚣 砍爛糟炒縛之如

痛不止用雄黃末燒烟熏之不拘已成未成即尅

取効或加蜈蚣等分亦妙

又方 紫金鍾 到金鍾 野芋子 香附子

右砍爛糟炒縛之

又方 井邊羊苣子砍爛糟炒縛之

又方 山布瓜根磨醋刷以赤梗蜈蚣過路蜈蚣穿

山蜈蚣飛天蜈蚣煎水薰洗亦効

又方 獨龍鬚根即六葉白欄根 砍爛糟炒敷之

地菡蓄散 治病蛇頭子

耳環尻又名琉璃草又名花管草又名各地菡蓄

右搗酒服又以砍爛酒炒縛之

敷毒方 治蛇頭子一切蝮蛇瘡

地菡蓄 金腦香 紫河車

飛天蜈蚣 紫蜈蚣 金鳳尾



金雞舌

右砍爛酒炒縛之

又方

地蜈蚣葉

溪汝樹葉

砍爛冷縛之

又方

飛天蜈蚣葉

砍爛冷縛之

又方

金腦香葉

又名社茶砍爛冷縛之

又方

雞卵壹枚開竅傾出以指時數浸之

又方

軟骨草

赤麻蕒

金盞草

耳環屍

右砍爛鹽酒炒縛之

又方

山蓼葉

田麻蕒

地篇蓄

田螺

右搗爛鹽酒炒縛之

又方

山布瓜根

金腦香葉

右搗爛酒炒縛之

浸毒散

治前證並効

毛藤子

石楠藤

鐵菱角

穿山蜈蚣

背子蜈蚣

赤麻蕒

金腦香

梭婆子根

飛天蜈蚣

赤梗過路蜈蚣

右煎水入此醋和煖浸洗

治蛇頭瘡

其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇

口之狀痛而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蠍各壹錢



右為細末看瘡濕癩開入藥擦在瘡上却以小油抹裁帛拴住如乾小油調搽

五指頭生疔名為敦疽係臟腑積熱治不可緩宜內疎黃連湯紫金丹烏金散及一粒金丹下之

○手指節發

手指節結毒焮赤腫痛又名病繭又名蛇節疔又名釘節天蛇又名病蛇節治法與天蛇頭大同小異金雞舌散 治病繭

又方 金雞舌根磨酒服 或磨半泔半醋煖塗之 落鴉鎗根搗酒煖服以香敷患處

○代指

代指者先腫焮熱痛色不黯緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落但得一物冷藥汁瀉漬之佳爪者筋之餘筋賴血養血熱甚注於指端故指腫熱結聚成膿甚則爪甲脫落此病類於指疽然無蘊毒故色不黯黑雖久亦不殺人 內服方聖濟總錄有漏蘆湯藍花湯中用漏蘆藍花升麻大黃黃芩玄參朴硝既無蘊毒何為用硝黃下藥輕病重治能無過乎故今不取升麻湯

升麻

甘草 各半兩



右細劉水貳升煎至壹升去滓下芒硝末半兩攪  
 勻溫浸指上數十遍冷即再煖以差爲度 一方  
 用梔子仁甘草各壹兩 一方單用甘草 一方  
 單用芒硝 一方單用麻黃 並如上法煎浸  
 千金治指痛欲脫用豬脂和鹽煮令消熱內指中一  
 食久住 千金翼和乾薑 一方用醬汁 一方醬  
 合蜜煎沸稍熱傳日五七上  
 丹治手指忽腫痛名爲代指以烏梅入醋研浸患處  
 立瘥  
 治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易

八 胃部 九

○井疽

靈樞云發於胸名曰井疽其狀如太豆三四日起不  
 早治下入腹不治七日死矣 或問心窩生疽何如  
 曰此證初起如黃痘肉色不變名曰井疽又名穿心  
 冷瘻若冷氣攻心精神恍惚嘔吐冷痰惡聞食臭毒  
 氣內陷腹脹滿者不治若心躁如焚肌熱如火不時  
 盜汗唇焦舌乾黃色渴飲冷水者是正候也急服活  
 命飲加黃連桔梗勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒  
 金丹下之惡證多治稍遲多致顛危宜服犀角解毒

胃部

外科三

百五



九

○甘疽

靈樞云發於膺膺胸兩旁高名曰甘疽色青其狀如穀實瓜瓢常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日死死後出膿

○臙中疽

或問心窩上兩乳間生疽何如曰此臙中發疽也蓋臙中為氣之海氣所居焉能分布陰陽若臟腑陰陽不和七情不平則發此證宜活命飲加紫蘇薄荷葉汗之奪命丹勝金丹紫金丹選用稍遲則潰爛惡症

多者難治

○脾發疽

或問心窩下旁生疽何如曰此名脾發疽毒由多食煎燻醉飽入房以致毒聚脾經而作活命飲加桔梗升麻紫金丹勝金丹汗之壯實者八陣散下之老弱者十全大補湯稍遲則潰傷脾膜膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死

或問一人年三十胃前肋上堅硬如石者尺許寒熱大作飲食不進遍身疼痛煩躁不寧胃膈填脹何如曰凡在胸及胸之側或是肩前下延及脇形長如蛤



皆為馬刀瘡屬手少陽三焦經足陽明胃經手厥陰  
心包絡鬱火怒氣積痰所致宜灸宜汗攻補兼施則  
消宜服勝金丹烏金散壯實者一粒金丹下之活命  
飲加柴胡過時則潰爛徹骨久而不斂者死未潰而  
謔語神昏泄利嘔吐者不治

一夫人性剛多怒胸前作痛肉色不變脈數惡寒經  
曰洪數脈應發熱反惡寒瘡疽也今脈洪數則膿已  
成但體豐厚故色不變似乎無膿以痛極始肯針入  
數寸膿數碗以清肝消毒藥治之而愈設泥其色而  
不用針無可救之理 一人年踰四十胸患瘡成漏

日出膿碗許喜飲食如常用十全大補湯加遠志貝  
母白斂續斷灸以附子餅膿漸少調護歲餘而愈  
一少婦胸膈間潰一竅膿血與口中所欬相應而出  
以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈或曰此因肺痿  
所致 一人胸腫一塊半載不消令灸百壯方潰服  
大補藥不斂灸附子餅而愈 一百姓胸患毒腫高  
焮赤發熱脈數大小便澁飲食如常齊氏曰腫起色  
赤寒熱疼痛皮膚壯熱頭目昏重氣血實也又曰木  
小便澁飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛身  
熱脈大精神昏塞臟腑實也進黃連內疎湯二劑諸



證悉退更以荆防敗毒散加黃芩山梔四劑稍愈再  
以四物加芩連白芷桔梗甘草金銀花數劑而消此項治法雖因脈證皆實而用泄法然泄法又有先後次序先攻裏後發表最後又用和解前賢治病不肯孟浪如此學者可不以此為法哉

○乳癰乳巖

丹溪乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知  
調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣  
不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚  
而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而  
睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍

軟吮令汗透自可消散失此不治必成癰疔治法疎  
厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之  
血以生甘草節消腫導毒以瓜蒌實或加沒藥青橘  
葉皂角針金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息  
然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効  
尤捷彼村工喜於自銜便妄用針刀引惹拙病良可  
哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積  
累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鼈棋子不痛不  
痒十數年後方為瘡陷名曰乳巖以其瘡形嵌凹似  
巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使



心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脉稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成又有滯乳因兒口氣吹嘘而成又有拗怒氣激滯而生者煨石膏燒樺皮瓜蒌實甘草節青皮皆神效藥也婦人此病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無月經時不可輕易看也薛男子房勞恚傷於肝腎婦人胎產憂鬱損於肝脾若嗽痛寒熱當發散表邪

腫嗽痛甚當清肝消毒並宜隔蒜灸不作膿或膿成不潰托裏散為主不收斂或膿清稀補脾胃為主若膿出反痛或作寒熱氣血虛也十全大補湯體倦口乾中氣虛也補中益氣湯肺熱內熱陰血虛也八珍湯加五味子欲嘔作嘔胃氣虛也香砂六君子湯食少作嘔胃氣虛寒也前湯加藿香食少泄瀉脾氣虛寒也前湯加炮黑乾薑若勞碌腫痛氣血未復也八珍湯倍用參苓歸朮若怒氣腫痛肝火傷血也八珍加柴胡山梔若肝火血虛而結核者四物湯加參朮柴胡升麻若肝脾氣血虛而結核者四君子加芎歸



柴胡升麻鬱結傷脾而結核者歸脾湯兼瓜萋散若鬱怒傷肝脾而結核不痒不痛者名曰乳岩最難治療苟能戒七情遠厚味解鬱結養氣血亦可保全內托升麻湯治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼并乳癰初起者亦治

升麻

葛根

連翹

當歸身

黃檗 各貳錢

黃芪 叁錢

牛蒡子

甘草 炙各壹錢

肉桂 伍分

右作一服水壹鍾酒半鍾煎至壹鍾食後服又方治婦人乳中結核

升麻

連翹

甘草節

青皮

各貳錢

瓜萋仁

叁錢

濁氣  
汚血  
乳癰

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後細細呷之

青皮

瓜萋

橘葉

連翹

桃仁 留

皂角刺

甘草節

如破多加參芪

神効瓜萋散

治乳癰乳巖神効丹溪亦云妙捷恐

貧賤之家未能辦集者用後蒲公英尤妙

瓜萋

壹枚去皮焙為末用子多者有力

生甘草



當歸 酒浸焙 各半兩 乳香 另研 沒藥 另研 各

右為末用無灰酒參升於銀石器內慢火熬取壹升清汁分作三服食後良久服如有你最便服此藥可杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便中通利如疾甚再合服以退為度立効散與此方間服神妙但於瓜萋散方減去當歸加紫色皂角刺壹兩陸錢是也

究原五物湯 癰疽發背乳癰通用

括萋 研壹枚 皂角刺 半燒 沒藥 各半兩 乳香 各貳錢半

右釐末以醇酒參升煎取貳升時時飲之痛不可忍立止

連翹飲子 治乳癰

連翹 川芎 瓜萋 皂角針 橘葉 青皮 甘草節 桃仁 各貳錢

右作一服用水貳鍾煎至壹鍾食遠服 已破者加參芪當歸末破者加柴胡升麻 清肝解鬱湯 治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血 乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之



症皆宜用此藥

人參 去蘆

茯苓

貝母 去心

山梔 炒

熟地黄

芍藥 各壹錢

白朮

當歸 各壹錢

柴胡

川芎

陳皮 各捌分

甘草 伍分

牡丹皮

右水煎服

復元通氣散

治婦人發乳癰疽及一切腫毒

木香

茴香

青皮

穿山甲 酥炙

陳皮

白芷

甘草

漏蘆

貝母 去心薑製

右為細末每服參錢好酒調下

消毒散

治吹乳乳癰并便毒如增寒壯熱或頭痛

者宜先服人參敗毒散一二服方可服此藥如無

前證即服此藥二三劑或腫不消宜服托裏藥

青皮 去白

金銀花

天花粉

柴胡

僵蠶 炒

貝母

當歸 酒拌

白芷 各貳錢

用水貳鍾煎至壹鍾食遠服如便毒加煨大黃壹

錢空心服

本草蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水者汁



飲之及封之立消

丹浦公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊味甘解毒散滯意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

兵部手集方 治乳硬欲結膿服此即消

用鹿角於麓石上磨取白汁塗之乾又塗不得近手并以入啣却黃水一日許即散或用鹿角剉為極細末酒調貳叁錢服亦効 孕婦忌服 乳癰初發方

貝母為末每服貳錢温酒調下即以兩身覆按於草上垂乳良久自通

時康祖為廣德宰事張王甚謹後授温倅左乳生癰繼又胸臆間結核大如拳堅如石荏苒半載百療莫効已而牽掣臂腋徹于肩痛楚特甚亟禱王祠下夢聞語曰若要安但用薑自然汁製香附服之覺呼其子檢本草視之二物治證相符訪醫者亦云有理遂用香附去毛薑汁浸一宿為末貳錢米飲調方數服瘡膿流出腫硬漸消自是獲愈 一婦人稟實性躁懷抱久鬱左乳內結一核按之微痛以連翹飲子二

外科三



十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑而消

帶升食痰

張氏橘皮湯

治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍

可忍者神效因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之  
用陳皮湯浸去白晒乾麩炒微黃為細末麝香研酒調貳錢初發覺赤腫疼痛一服見效

丹乳癰初發腫硬一服瘥用真樺皮為末酒服方寸匕

睡醒已失出靈苑方

羅勝金丹 治婦人吹乳極有神效用百齒霜即不

髮右一味不拘多少用無根水為丸如梧桐子大每

服參丸倒流水送下食後令病左乳者左卧右乳者

右卧於温處汗出愈用新汲水傾於房上接之乃倒流水也

圖經治婦人妳疼痛不可忍用穿山甲炙木通各壹兩

自然銅生用三味搗細末每服貳錢温酒調下無時

簡易獨聖散 治婦人吹妳 白丁香半兩搗羅為末每服壹錢七温酒調服無時

雲岐治婦人吹乳皂角散歌曰

婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和煖酒壹盃調壹字頃間揉散咲呵呵

又方



熟者清之

乳香研壹錢 瓜蒌根末兩壹 右研勻温酒調服貳錢  
產後乳腫以大麥芽壹兩炒研煎湯飲之自消  
丹楊孺人乳腫痛

青皮

石膏煨研

連翹

皂角刺炒

黃藥子

當歸頭

木通各壹錢

甘草生叁分

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處  
義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳邊又有  
腫核却頗有些痛

黃芩

川芎

木通

陳皮各肆錢

人參貳錢

大腹皮叁錢

炙甘草

生甘草

當歸頭

芍藥各壹錢

右分二貼煎服

二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食  
少減脉左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮  
茯苓帶熟下與點丸叁拾粒  
一後生作勞風寒夜熱左乳痛有核如掌脉細澁而  
數此陰滯於陽也詢之已得酒遂以瓜蒌子石膏乾  
葛台芎白芷蜂房生薑同研入酒服之四貼而安  
一婦人內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若



卧而起急則臍下牽痛此帶脉為患用小柴胡加青  
皮黃連山梔二劑而瘥一婦人發熱作渴至夜尤  
甚兩乳忽腫肝脉洪數乃熱入血室也用加味小柴  
胡湯熱止腫消

實者下之雲岐連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝各壹兩

玄參

芍藥

白鯁

防已

射干各捌錢

大黃貳錢

甘草陸錢

杏仁肆拾枚  
去皮尖

右咬咀以水陸升煮貳升下大黃次芒硝分三服

陰虛

一儒者兩乳患腫服連翹飲反堅硬食少內熱胸脇  
作痛日晡頭痛小便赤澁此足三陰虛而兼鬱怒前  
藥復損脾肺先用六君加芍歸柴胡山梔四十餘劑  
元氣復而自潰仍作痛惡寒此氣血虛也用十全大  
補湯六味丸而愈 封君袁陽涇左乳內結二核月  
餘赤腫此足三陰虛兼怒氣所致用八珍加柴梔丹  
皮四劑赤腫漸退內核漸消又用清肝解鬱湯而愈  
時當仲秋兩自連劄肝脉微弦此肝經火盛而風動  
也更加龍膽草伍分并六味地黃丸而愈若用清熱  
敗毒化痰行氣鮮不誤者 一儒者兩脇作脹兩乳



作痛服流氣飲瓜萋散半載後左脇下結一塊如核  
肉色不變勞則寒熱此鬱結氣傷而為患虛而未能  
潰也八物加柴胡遠志貝母桔梗月餘色赤作痛膿  
將成矣又服月餘針之出膿碗許頓然作嘔此胃氣  
虛而有痰也令時啗生薑服六君子湯嘔止加肉桂  
而瘡愈彼後出宰每傷勞怒胸乳仍痛并發寒熱用  
補中益氣加炒山梔愈 一婦人久鬱右乳內腫硬  
用八珍湯加遠志貝母柴胡青皮及隔蒜灸兼服神  
効瓜萋散兩月餘而消 一婦人左乳內腫如桃不  
痛不赤發熱漸瘦用八珍加香附遠志青皮柴胡百

餘劑又兼服神効瓜萋散三十餘劑膿潰而愈 一  
婦人因怒左乳作痛發熱表散太過腫熱益甚用益  
氣養榮湯數劑熱止膿成不從用針腫脹熱渴針膿  
大泄仍以前湯月餘始愈此證若膿未成未被有薄  
皮剝起者用代針之劑其膿自出不若及時用針不  
致大潰若膿血未盡輒用生肌反助其邪慎之 一  
婦人膿清腫硬面黃食少內熱晡熱自汗盜汗月經  
不行此肝脾氣血俱虛用十全大補加遠志貝母及  
補中益氣各三十餘劑外用葱熨患處諸證尋愈  
一婦人膿成脹痛欲針之不從數日始針出敗膿三



四碗許虛證蜂起幾至危殆用大補兩月餘而安若  
元氣虛弱不作膿者用益氣養榮湯補之膿成即針  
若腫痛寒熱怠惰食少或至夜熱甚用補中益氣兼  
逍遙散補之為善 一婦年二十有五素虛弱多鬱  
怒時疫後脾胃愈虛飲食愈少又值氣忿右乳脇下  
紅腫應內作痛用炒麥麩熨之腫雖稍散內痛益甚  
轉側胸中如物懸墜遂與加減四物湯內腫如鷄卵  
外大如盤胸脇背心相引而痛夜熱勢甚時治者皆  
以攻毒為言薛云此病後脾弱而復怒傷肝治法惟  
主於健脾氣平肝火則腫自消而病自愈矣定方以

八物加陳皮黃芩柴胡山梔白芷服八劑病減六七  
去白芷加青皮木香桔梗又六劑而全愈若用攻毒  
之劑病胡能瘳

外治

葛稚川方 治婦人乳癰  
人牙齒 燒存性

右為極細末以酥調塗貼癰上  
敷乳方

天南星

生半夏

皂角針

燒帶性  
各各各分

白芷

草烏

直疆蠶

壹分

右細末多用葱白研取汁入蜜調敷若破瘡口作

小科三

百七



膏藥貼

乳巖丹溪云一婦人年六十厚味鬱氣而形實多如夏無汗而性急忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食味絕半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一日夜五六次至五七日消矣此乃妳岩之始不早治隱至五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦以夫為天失於所夫乃能生此謂之巖者以其如穴之嵌呀空洞而外無所見故名巖患此者必經

久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安隆慶庚午予自秋聞歸則亡妹已病蓋自七月乳腫痛不散八月用火鍼取膿醫以十全大補湯與之外敷鐵箍散不効反加喘悶九月產一女潰勢益大而乳房爛盡延及胃脘膿水稠粘出膿幾六七升略無斂勢十一月始歸就醫改用解毒和平中劑外搽生肌散龍骨寒水石等劑膿出不止流涎所及即腫泡潰膿兩旁紫黑瘡口十數胃前腋下皆腫潰不可動側其勢可畏余謂產後毒氣乘虛而熾宜多服黃芪



解毒補血益氣生肌而醫不敢用十二月月中旬後益甚瘡口甘餘諸藥盡試不効始改用予藥時膿穢粘滯煎楮葉豬蹄湯沃之頓爽乃治一方名黃芪托裏湯黃芪之甘溫以排膿益氣生肌為君甘草補胃氣解毒當歸身和血生血為臣升麻葛根漏蘆為足陽明本經藥及連翹防風皆散結踈經瓜蒌仁黍粘子解毒去腫皂角刺引至潰處白芷入陽明敗膿長肌又用川芎三分及肉桂炒藥為引用每劑入酒一盞煎送白玉霜丸踈膿解毒時膿水稠粘方盛未已不可遽用收澁之藥理宜追之以羣青錠子外搽明日

膿水頓稀痛定穢解始有向安之勢至辛未新正患處皆生新肉有紫腫處俱用葱熨法隨手消散但近腋足少陽分尚未斂乃加柴胡一錢青皮三分及倍川芎膿水將淨者即用搜膿散搽之元宵後遂全安萬曆癸卯二月時侍御趙蓋菴提學南畿托敝縣令致意約會于茅山予以館誼不容辭特往赴之則有病欲求治也袒其胸左乳側瘡口大如碗惡肉紫黯嶙峋嵌深宛如巖穴之狀臭不可近予問何從得此曰館試屢下意不能無鬱夏月好以手捋乳頭遂時時有汗出或曰是真液也不可泄因覆之以膏藥



汗止而乳旁有核既南來校閱勞神乳核輒腫痛一  
書吏頗知醫謂汁欲出而為膏藥所沮又不得歸經  
故滯為核聞婦人血上為乳汁今汁亦血類也宜飲  
芎歸酒行其滯血核自消矣吾以為然而飲之核如  
故而吐血衄血大作飲京口張醫藥吐衄止而腸風  
作張矜自功謂血從下出者順然體則重困矣復飲  
他醫藥便血亦止乳核之勢日益張遂至於潰二草  
澤醫能煉砒治痔漏私計此亦漏瘡也納藥其中痛  
欲死潰不可支故至此予意在法為不治而見其精  
神尚王飲噉自如無甚惡候尚可延引歲月為之定

方而別後校士廣陵不相聞問遂改用它醫藥至八  
月初以滯下發噎死夫男子患乳巖者少矣其起又  
甚微眇而三為盲醫所誤遂至此砒誠不可納也等  
歸何罪乎不可不書之以為後鑒

蒲公英草搗爛會患處神妙 天南星末以溫酒調  
塗之 治婦人乳痛成癰以益母草為末水調塗乳  
上一宿自瘥生搗爛傅之亦得 婦人吹乳用桑樹

飯搗成膏貼之 乳頭裂破丁香末傅之  
乳癰 乳中穴在乳下中針入 甲乳癰  
寒熱短氣卧不安膈痞主之 乳癰瘻素寒熱痛不



可按乳根主之 大驚乳痛深丘主之 乳癰有熱

三里主之 乳癰諸藥不能止痛者 女子乳癰驚巨

虛下廉主之 千金云臂腫重 乳癰太衝及復溜主

之 妬乳太淵主之 婦人乳餘疾育門主之

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



