

Inches
Centimetres
KODAK Color Control Patches
© The Tiffen Company 2000
Kodak
LICENSED PRODUCT
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


整治準則
泌尿器科



國立武漢
82
65

癮疹

孫眞人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛眞氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則爲癢也所以有風疹瘙癢皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩癢極者重抓疹起瘙之逐手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱　夫風癮疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則爲癮疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結爲白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則瘥着厚煖

衣亦瘥也其脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏則成瘾疹致身體爲痒也　丹溪云疹屬熱與瘡在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者　疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也　朱院君三十餘久患瘾疹身癢而紫色可與防風通聖散加牛蒡子爲極細末每貳錢水盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰甫則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱表則赤若風濕搏於氣分則氣液不行因邪并發於表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕者故惡甫而喜晴矣方論中又有風疹瘟者即內經所謂汗出見濕乃生痤瘡又曰勞汗當風寒薄爲鬱乃生痤瘡即瘾疹屬也皮疹瘟類也此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝爲丹疹外發者方論不則

無有也故人氣君相二火欝發而變者宜平未之及耳若此條是人氣所變之一者也故二火欝發出血有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也初虞世治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以導荊湯調下貳錢日二服

衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臂腹及癮處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皂角貳兩水壹升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如梧子大食後溫水服貳拾丸次日便愈

千金方治法白疹宜煮礬石汁拭之或煮朔雚和少酒以浴之良（姚氏以治赤疹）或煮石南汁拭之良或水煮雞屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風尸盛者石南湯主之

治風癮疹瘙之則作瘡風尸身痒辛風面白腫起

石南湯（神巧方亦名石南根飲主之）

石南葉（神巧用根）　乾薑炮　黃芩
人參（去蘆各壹兩）　桂心
細辛（去苗）　當歸　芎藭（各壹兩半）
麻黃（去節）
甘草（炙貳兩）　乾地黃（柴錄壹兩半）　食茱萸（壹兩貳錢半）

右為㕮咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至剩分去粗熟服不拘時候衣盖令出汗
加味羌活飲　治風寒暑濕外搏肌膚發為癮疹增
寒發熱遍身瘙痒隨藏氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活　前胡並去蘆各壹兩　人參
桔梗並去蘆　甘草炙　枳殼去穰麩炒
川芎　天麻　茯苓去皮各半兩
薄荷　蟬蛻去頭各參錢

右為細末每服參大錢水壹盞生薑參片煎至柒分去粗溫服無時

羚羊角散　治風癮疹遍身瘙痛心胸滿悶

羚羊角屑　白鮮皮
防風去蘆　麻黃去節
羌活去蘆各壹兩　甘草炙
杏仁去皮尖麩炒　枳殼麩炒去穰半兩
黃芩各柒錢半　人參去蘆
生乾地黃

右為㕮咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入
薤皮散　治肺藏風毒遍身瘡疥及風癮疹

枳殼去穰用麩炒焦存性　薤皮燒灰各肆兩　甘草炙半兩

荊芥穗　杏仁 各貳兩 湯浸去皮尖
右件除杏仁用水壹椀於銀器內熬去水一半已來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻入杏仁末內收之每服叁錢食後溫酒調下
犀角散　治風癮疹心悶
犀角屑　川升麻
玄參　人參
白鮮皮　防風 四味各 去蘆
馬牙硝 各半兩 研　甘草 炙
右爲細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉湯調下不拘時
鬼箭羽散　治風癮疹累醫不効
鬼箭羽　白蒺藜 炒去刺
白斂　甘草 炙
右爲細末先用粟米粉壹合粉身了每服貳錢溫熟水調下不拘時
漏蘆丸　治風癮疹
漏蘆 壹兩 去蘆　枳殼 麩炒去穰
防風 去蘆　川大黃 煨
右爲細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每
苦參 各叁兩
烏蛇

服叁拾丸用温漿水送下食後服

楓香丸　治風癮疹痒不可忍

楓香　白鮮皮　白蒺藜
蛇床子　羚羊角屑各壹兩　川烏頭炮去皮臍
藁本去蘆　仙靈脾　蔓荆子
莽草　赤箭各半兩

右製服法同前

加味烏荆丸　治癮疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮
脫落作瘡作痒或痛浮液走注有如蟲行
川烏頭湯洗浸三十五次炮乾去皮臍　荆芥穗各半兩

當歸水浸三日洗焙乾秤壹兩　薄荷伍錢

右爲細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸
温酒或茶清送下

治風癮疹瘙痒不可忍

赤土不拘多少細研　每服壹錢空心温酒調下

治遍體疹風　側子作末冷酒調服

治風癮疹痒不止

枳殼麩炒去瓤焙秤壹兩　爲細末每服叁錢水壹中盞煎至柒
分去滓温服無時　一方水煮枳殼爲煎叁之

治風疹入腹身體腫舌强乾燥

蔓菁子 叁一兩爲細末 每服貳錢溫酒調下

又方

白蜜 壹合 酒 貳合 二味調和空心溫服

又方

白僵蠶 不拘多少 焙令黃色 右爲細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏 治風癮疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治筋脉攣急

烏蛇 當歸 去蘆 木鼈子 去殼
枳殼 去穰 大黃 各兩 天麻
附子 烏喙 天南星

桂心 細辛 去苗 吳茱萸
羌活 去蘆 蒼朮 去粗皮 防風
牛膝 川椒
白殭蠶 乾蝎 各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌浸一宿用臘月煉成豬脂貳斤於鍋中入藥以慢火煎看白芷變黃紫色下火濾去相令淨入於甕合內盛之用摩塗於所患處立效

崩龍膏 治風癮瘡疹皮膚中若痒搔之血出

薔薇根 各貳兩 白蒺藜

附子　獨活去蘆
防風去蘆　苦參去蘆　白芷
漏蘆　漢防己　川升麻
木香　蛇銜草　川椒
枳殼一方作枳實　莽草　羌蔚子
右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥同煎令白芷赤色膏成濾去粗盛甕合中每取塗摩患處累用即差　一方無薔薇根
莽草膏　治身體赤瀿疹而痒瘙之隨手腫起

莽草柒錢半　當歸　芎藭
大戟　細辛　芍藥
芫花　川椒　躑躅花
附子　朔雚根各壹兩　苦參貳兩
豬膏成煉者參斤
右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏成去粗以敷病上日三用之
青羊脂膏　治風熱赤疹搔之逐手作瘡
青羊脂肆兩　芍藥各參兩
白芷　黃芩
白芨

防風 去蘆 黃耆 升麻
寒水石 各壹兩 石膏 竹葉 切各壹升

右為㕮咀先用水搗升煮石膏竹葉取肆升去粗浸諸藥豬脂貳斤合煎膏成敷病處效

葫荎煎　治赤白風癮疹

葫荎根 白蒺藜 兎藿
細辛 虎杖 各參兩 辛夷
白礬 鹽 各貳兩

右剉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去粗再煎至半升用綿醮藥塗患處頻塗之即效

治風腫及癮疹

白礬 石灰 各壹兩

右件為末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處日用一上效

治風癮疹宜用楓香湯洗之

楓香 半斤 苦蔘 川大黃
黃芩 當歸 川升麻
甘草 射干 各貳兩 苦參 參兩
蛇床子 壹兩

右件藥並生用㕮咀每用伍兩水壹斗煮取伍升

去粗看冷熱洗病上日三五度
治風身體生癮疹宜用蘋藿根湯洗之
蘋藿根　蔌蘇苗　當歸各伍兩
蛇床子　細辛各貳兩
右件細剉用水壹斗伍升煮取壹斗去粗看冷熱
洗患處日用三五度藥水冷再温用之
地骨皮湯　治風癮疹
地骨皮半斤　當歸肆兩
白礬末壹兩　鹽貳兩
右件細剉每用藥伍兩水玖升煎取貳升去粗再

煎至壹升收藥盛器中用綿醮拭患處五七度瘥
治風癮疹淋洗神効
蘋藿　白蘞細研後入
茵芋　馬蔺子
細辛　萹竹各貳兩
右剉用醋漿水壹斗煮取伍升去粗入白礬洗之
治風癮疹百治不瘥神効
白礬伍兩右為末用酒叁合小便壹升煎如稀膏
以綿醮藥於上輕手揩之令熱徹入皮膚其風疹
須臾消散　一方只用白礬末酒浸帛醮染患處

治干種癮疹
右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即滅　千金方用石灰淋取汁洗之良
又方　蒴藋湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴之良
治癮疹痒　芫薤子莖作湯浴之
治風疹痊不止
蕓薹菜叁握搗取汁於疹上熟揩時時取少藥揩令熟徹又續煎椒湯洗之
又方
蛇蛻皮壹條水壹升煎取半升鷄翎蘸執藥湯塗

上即差
單方　治面目身體生瘡或痒或瘭子腫起不即治甚殺人
右用羚羊角燒爲灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙
癮疹入腹亦能殺人用蠶沙煎濃湯洗之
風瘡癮疹成瘡　夫風邪客熱在於皮膚遇風寒所傷則起癮疹熟多則色赤風多則色白甚者痒痛搔之則成瘡也
卷栢散　治風皮膚癮疹及風熱生瘡

卷栢　枳殻炒去穣　羌活去蘆
麻黄去節　五加皮各壹兩　赤箭
天竺黄　葉本去蘆　防風去蘆
苧菊　黄芪　桑耳
犀角屑酌各半　烏蛇酒浸貳兩
右為細末每服貳錢食前薄荷湯調下忌熟麵鷄豬魚芥等物
丹參散　治風瘡皮膚赤瘾疹瘙痒隨瘙生瘡
丹參　人參並去蘆　苦參
雷丸　牛膝酒浸　防風去蘆

白附子炮　白花蛇酒浸貳兩
右為細末每服貳錢食前煎甘草酒放温調下
升麻膏　治諸熱風毒氣攻衝皮膚瘙生瘾疹赤起生瘡無有黄水結為膿疱痛
川升麻　白斂　漏蘆
枳殻　連翹　藍葉
黄芩　梔子仁　朝藿根
玄參去蘆　大黄　蛇銜草
川芎硝　犀角屑各壹兩
右件細剉用竹瀝叁升拌勻經一宿用成煉豬脂

貳斤同煎候白歛色焦黃絞去相令凝用摩塗患
處日六次瘥
治風瘙癮疹遍身皆痒搔之成瘡
苦參 各伍兩 茵陳生用
右件細剉用水壹斗煮取貳升溫熱得所釀綿拭
之日五七度瘥
又方
蠶砂 壹升
右用水貳斗煮取壹斗貳升去粗溫熱得所洗之
宜避風處

疥癬

夫疥癬者皆由腠經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所
致也風毒之浮淺者爲疥風毒之深沉者爲癬蓋癬
則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久
而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二
者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰太疥脈
赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三
曰水疥痛癗含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮
起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常溼汁是也癬之狀
起於肌膚癮疹或圓或斜或如錢皆走散內藏汁而

外有筐其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然
彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔
則痺頑不知痛癢四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而
且堅五曰狗癬時時作徵癢白點相連六曰刃癬則
輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒
之藥數之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絶其根
又面上風癬初起痘瘟或漸成細瘡時作痛癢發於
春月各吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽
氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風
疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱
之藥數之則自愈矣　戴院使云此雖皮膚小疾不
足爲害忽然瘡有惡瘡癬有頑癬瘡癢有經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傳
藥須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼
飲屢有角飲皆可用

通治疥癬方

升麻和氣飲　治瘡腫瘭疥痒痛

升麻　桔梗　蒼朮
乾葛　甘草　大黃　煨各壹錢
陳皮　當歸　半夏

茯苓　枳殻各伍分　白芷　芍藥壹錢半　乾薑
右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服
當歸飲子　治瘡疥風癬濕毒燥痒
當歸　川芎　白芍藥
生地黃　防風　白蒺藜
荆芥各壹錢半　何首烏　黃芪
甘艸各壹錢
右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服或爲末亦可
除濕散　大治一切風毒疥癬瘙痒狀如風癩

苦參　蔓荆子　何首烏　荆芥穗
天麻　薄荷各壹兩　白芷
烏蛇酒浸壹宿焙乾各半兩　川芎　防風並生用
右爲細末每服參錢茶酒任調下無時日進三服
六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故
苦參丸　治遍身瘙痒癬疥瘡瘍
苦參肆兩　玄參　黃連去鬚
大黃剉碎炒香　獨活去蘆　枳殻去穰炒
防風去叉各貳兩　黃芩去黑心　梔子

菊花 各壹兩

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服
叁拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得
四生散 治腎臟風疳癬等瘡及眼目昏花視物不
明

白附子 下注生㕮用熏附子
沙苑蒺藜
黃芪 各貳兩
羌活

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下若於豬腰子
切開夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患
赤眼睛痛不可忍臨睡一服目反大痛至二三時
乃得睡更二三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥
俱不効後得此藥二兩服盡除此方治人腎臟風
及眼疾頑癬無不効
治一面身瘙痒明目爽神
威靈甘州石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末貳錢酒
壹椀渾身瘙痒一時無
羌活散 治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者
羌活 獨活 明礬
白鮮皮 硫黃 狼毒 各壹兩
輕粉 貳錢半 白附子 黃丹

蛇床子 各半兩

右為細末油調成膏傅之

疥藥神效散　治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔　蛇床子 各壹兩　全蠍半兩

倭硫黃 壹兩伍錢

右化開硫黃入荆芥末參錢滾數沸候冷加輕粉貳錢冷再碾末加二味半兩妙右為細末先將小油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥氣神効

香疥藥　治風癬瘡黃水瘡疣瘡牛皮癬瘡

輕粉　水銀

大楓子 去殼　川椒 各肆拾致粒　樟腦 各參錢

杏仁 少許　柏油燭 壹對

右為細末疥用絹包裹瘡上慰黃水瘡摻上此藥功効如神

八仙散　治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘡痒生瘡

細辛　荆芥

黃芩　川芎　白芷

地骨皮　甘艸 各等分共為細末　防風

右每用藥貳兩水貳盌煎十沸去滓熱擩患處
一上散　治諸般疥癬必效
雄黃通明手可碎者　黑狗脊
蛇床子炒各半兩　熟硫黃
寒水石陸錢　盤蟄參個去翅足研碎

右先研雄黃硫黃寒水石如粉次入盤蟄和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去油調手中擦熱鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔痒不効者

百部半兩酒炒切　亂髮
鮓魚壹箇不要見水切片　苦參碎切各壹分
檳榔鋸碎　木香碎切
　　川椒參錢

右以油伍兩前前藥得所去藥却用麝香壹分臘粉拾錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏　治疥癬

硫黃　白礬　白芷

吳茱萸　川椒各等分

右為細末前油調塗之

楓實膏　治風瘡燥痒疥癬

大楓子肉半兩　輕粉　枯礬各此少

右搗爲膏擦瘡上

疥

嚴子禮云夫痂疥之爲病雖皆不害人然而至難可者多矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痒或痛或瘃或腫或皮肉隱嶙或抓之凸起或膿水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈　夫痂疥者皆由風熱而生遍體瘙痒搔之皮起或血出或水出結作乾痂其中有蟲人往往以針頭挑出狀如水內瘕蟲此蓋由肌肉之間深

受風邪熱氣之所致也 丹瘡在上多服通聖散
在下多以藏用丸下 脚腫出益加血分濕熱藥
薛 疥瘡屬脾經濕毒積熱或肝經血熱風熱或腎經
陰虛發熱其體倦食少為脾經濕熱用補中益氣湯
飲冷作痛為脾經積熱用清熱消毒散搔痒發熱為
脾虛風熱用人參消風散搔痒作痛為風熱用當歸
飲子便祕作痛為熱毒用升麻和氣飲熱渴便利為
脾肺虛熱用竹葉黃芪湯內熱脯熱或時寒熱屬肝
經血虛風熱用加味逍遙散六味丸體倦少食或盜
汗少寢為脾氣鬱結用加味歸脾湯逍遙散地黃丸

若發熱盜汗或吐痰口乾者為腎經虛熱用六味丸
料煎服 稽勳李龍岡遍身患此腿足為甚日脯益
煩口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯
六味丸而痊 一儒者善噫患痒余以為內有濕熱
膝理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎
治之不從自服荊防敗毒散盜汗發熱作渴煩痛膿
水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊 一儒者患
在臂脚日脯或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處
裹腫小便赤澁此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五
味子麥門冬而愈 一儒者患此悞用攻伐之劑元

氣虛而不能愈用補中益氣湯加茯苓其瘡頓愈又因調養失宜日晡益甚用八珍湯加五味麥門五十餘劑而愈 一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其腿日腫夜消余以爲氣血虛而有熱朝用補中益氣湯夕用加味逍遙散而愈 一男子時疫愈後所患如之用前藥補養而愈有同患用砭法出血而死此因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉 一婦人久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地

黃治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用逍遙散以補脾胃生陰血亦有寒熱如瘧亦治以前藥

丹 何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精

九

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見腫瘍

麻黃飲 治上體生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂推起蔓延於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃去根節 防風 陳皮 紫背萍 各柒錢半 滑石壹兩 黍粘子 羌活 各半兩 蒼术

石膏煅 陸錢半 縮砂 荊芥 各貳錢半
蒼耳草 生甘草 各參錢半 薄荷葉 壹錢半

右㕮咀每服陸錢水壹鍾半猛火煎取陸分入好酒四五滴去滓熱服須得通身有汗其瘡自安其者服至二服之後看汗出到何處若自上而下出過脚曲脉其瘡自愈

消毒散 局方

防風 壹兩 甘州 貳兩 荊芥穗 參兩
黍粘子 炒 兩

爲粗末每服叁錢水壹盞煎柒分去粗食後温服

子和治頰皁韓吉卿自髀至足生濕蠹瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行痛楚愈而復生瘢痕成凹十餘年不瘥戴人哂之曰此濕蠹瘡也由水濕而得故多在足下以舟車滀川大下十餘行一去如掃

升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚致增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫及癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛

蒼术 貳兩 桔梗 去蘆 乾葛 各壹兩 陳皮 去白 陸錢 升麻 甘州 炙

芍藥各柒錢半　半夏洗柒次　當歸去蘆　白芷　茯苓去皮各貳錢　枳殼麩炒去穰　厚朴薑製　乾薑胞各半錢　大黃蒸半兩

右爲㕮咀每服肆大錢水壹盞半生薑叁片燈心拾伍莖煎至柒分去滓食前服

枳殼散　治痂疥瘙痒痲瘕

枳殼貳兩麩炒去穰　白蒺藜半升　苦參去蘆　蔓荊子各壹兩

右爲細末每服叁錢温酒調下不拘時日進二服

枳殼丸　治一切風熱生瘡疥

枳殼肆兩麩炒去穰　苦參壹斤爲末　皂角貳斤

右用皂角將水壹斗浸揉濃汁濾去粗用清汁熬成膏子和苦參末爲丸如梧桐子大每服叁伍拾丸煎荆芥酒送下或薄荷酒亦得不拘時候

赤小豆散　治乾濕疥

赤小豆貳合炒乾内中如此七次醋　升麻

薏苡仁　黄芪劉去蘆各半　人參
白斂　瞿麥穗　當歸切劉
黄芩去黑心各半兩　猪苓去黑皮　防風去叉
甘艸炙各半兩

右爲細末每服叁錢匕空心粥飲調下日二夜一
脂調散　治疣瘡膿窠瘡神効

蛇床子貳兩　蔺茹　草烏頭
荆芥　花椒　苦參各壹兩
雄黄　硫黄　明礬各半兩

右爲細末豬脂調捺

右爲細末生豬油調傅
四一上散　治諸般疣瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

蛇床子暑炒　雄黄別研　黑狗脊
寒水石別研　白膠香銅銚熬溶過傾乾石頭上放冷研　五味各壹兩
白礬　黄連各半兩　吳茱萸叁錢
硫黄貳錢半另研

右爲細末香油調傅治疣瘡先用蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡痂然後用前藥傅可二次愈

又諸般瘡疥加減法　腫多加白芷開鬱　痛多加
白芷方解石　癢多加枯礬　陰囊瘡加吳茱萸
濕多香油調　乾癢出血多加大黃黃連豬脂調
蟲多加蕪荑銀灰檳榔黎蘆盤蠶　紅色加黃
丹　青色加青黛
羅蔔茹散　治疥經年不差
水銀壹錢　好茶貳錢　蔔如參錢
輕粉少許
右為細末每用不拘多少麻油調塗之
本事治疥瘡不問新久方

白蘞　壹兩　檳榔　吳朱萸各半兩
硫黃貳錢另研　右為末麻油調抓破揩之
世治疥癬以臘月豬脂不拘多少同生白礬杏仁加
輕粉搗爛擦之陳無擇云杏仁粉最殺蟲甚妙
丹疥癩瘡春大發焦疥開鬱為主不宜抓破
白礬　吳茱萸
黃檗　大黃
寒水石貳錢半　檳榔伍分
輕粉拾盞　右為末豬脂油調搽
丹砂膏　治一切惡瘡疥癢不止宜用此藥殺蟲

硃砂
亂髮
蘭茹爲末 貳兩
右件藥先以豬脂煎亂髮令消盡次下巴豆蠟松明煎十餘沸用綿濾去粗候稠卽入雄黃硃砂等末攪令勻凝合內盛不拘時候用少許摩塗之以瘥爲度

雄黃 並研細
白蠟 松脂 研末各壹兩
巴豆 拾粒 豬脂 貳斤

巴豆膏 治一切疥瘡有蟲時作瘙痒

巴豆 柒粒
蕪荑
白礬 枯各半兩
豬脂 參兩
硫黃 研細

右爲細末煉豬脂成油入前藥末調和令勻每用蓮子大於手掌內搓塗之

雌黃 並研細
松脂 研末各壹兩
豬脂 貳斤

神異膏 治一切瘡疥

雄黃 細研
皂角 壹定
蛇床子 參錢
黃蠟 半兩
輕粉 半字
巴豆 柒粒
清油 壹兩
全蝎 柒枚

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷入雄黃蛇床子末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗却以藥擦瘡疥上神效

白礬散 治一切疥

白礬枯 硫黄 雌黄並細研
胡粉 黄連各壹兩 蛇床子半 米錢
右為細末研令勻以豬膏和如稀麵糊每以臘蒸
水洗拭乾塗之
苦參散 治一切疥及風瘡痒搔之成瘡
苦參 丹參各肆兩 蛇床子半片
右為細末先以温水洗瘡拭乾後敷之
大蒜另研 鼠糞
為細末以蒜研和如膏塗瘡上日二三次甚妙

苦參湯
苦參 蛇床子 荆芥穗
白礬各等分
右為㕮咀煎湯放温洗
治瘡疥因風致腫
苦參 蛇床子 白礬各貳兩
右以水叁斗濃煮汁却入鹽壹把漬之淋洗其瘡
腫日夜數次為妙
一笑散 治渾身疥癩搔痒生惡瘡
檳榔 葉本 硫黄

蛇床子　枯礬　五倍子
白膠香 各等分

右為細末濕者乾傳乾者香油調傳如頭上瘡便搽上不用剃其者不過三五次平復如故

神捷散　治諸疥瘡

吳茱萸　白蔹　各壹兩
輕粉 各半兩　赤小豆 肆拾玖粒　白蕪荑仁
石硫黃 少許研

右為細末研勻每用半錢乞生油調於手心內摩熱後偏指周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根 生切壹兩　草烏頭 壹箇　硫黃 壹錢
白礬 半錢　生薑 壹分

右以米泔水淹一宿研極細入醯醋和勻入浴時抓破瘡傳之遲頃以溫湯洗去妙

治疥神効

狼毒　細辛
輕粉 錢　水銀 各壹錢

右為細末油蠟和劑作兩先綿裹兩手將於周身疥多處擦之

葛氏療疥瘡方

右取楝根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下篩腊實和搔疥去痂以塗之護風勿使安人小兒雞犬見上

熏疥方

明信　雄黄各半錢　椒目壹錢

右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錠充兩口合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油塗眼耳目鼻小兒只空衣盖被臥亦効宜淨室温床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻為効治癎疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黄水出瘥後復發取羊蹄根去皮細切熟熬以大醋和先洗淨傳上二時再以冷水洗之日一傳瘥若為末傳尤妙千金翼

外臺秘要翼　治疥取羊蹄根和豬脂塗上或着鹽少許即焦治偏身風痒生瘡疥苦陳煎湯濃洗立安千金

衍有人患偏身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止粘著衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以菖蒲三斗刈日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣被覆之既七日其瘡如失應手神驗

乾疥 乾疥者但搔之皮起作乾痂此風熱氣深在肌肉間故也

秦艽丸 治偏身生疥乾痒搔之皮起

秦艽 去蘆 土 黄耆 苦參 各去蘆 各半

大黄 各貳兩 防風 各去蘆 各半 蒲蘆 烏蛇肉

黄連 各壹兩半

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧子大每服參拾丸食後温酒送下

皂角膏 治皮膚風熱生疥乾痒

皂角 去皮 巴豆 烏頭 生 豬牙皂角

吳茱萸 硫黄 膩粉 白礬 枯 黄蠟 各半兩

右為細末研令勻先入清油參貳合以慢火消蠟了攪和令勻日用二十三次塗之

治疥瘡生乾痂瘙痒不止

硫黄 貳錢半 為末 巴豆 壹斤 豬脂

右先煎豬脂令沸入巴豆煎候黄次下蠟鎔開方下硫黄末攪令勻盛於甕合内日二十五度塗之

一上散 治風痒裂折燥瘡

苦參 壹兩　白芷
枯礬 各半兩　荆芥穗 參錢
白芨 參錢　寒水石 貳兩 煅

右爲末油調搽

濕疥 夫濕疥者起小瘡皮薄常有黃水出此風熱毒氣入皮膚間故也

烏頭散 治濕疥常有黃水搔痒不絶

川烏頭　藜蘆　馬蘭根
石菖蒲　杏仁　苦參
硫黃 研細　膩粉　白礬 各半兩 枯用

右爲細末研令勻用時先以桃湯洗拭乾後以油漿水和塗之三十日一塗不過三七兩上瘥

黃連散 治濕疥有黃水瘙痒

黃連 貳兩　蛇床子 半兩　赤小豆
糯米　胡粉 各壹兩　水銀 壹兩半

右件爲細末以生清油和研候水銀星盡如膏旋取塗之

治濕疥遍身

黃蘗　綠礬
硫黃 細研各等分　膩粉

右為細末研令勻用生油調塗之
又方皂角 硫黃各貳兩 共為細末以醋貳升熬為膏
塗之

兼疥 元希聲侍郎治卒發疥祕驗方用石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傅

又方 淋石灰汁洗之 孫真人

久疥 木香散 寶鑑 治多時不歇一切惡瘡此肉能生肌肉止痛

木香 檳榔 黃連各半兩

白芷 參錢

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未效又貼 又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用温漿水洗濕挹乾後上藥治之效不可述 暨治下疳瘡神效

丹 諸瘡疥久年者千年韭根炒存性末之豬油調傅三次 經驗

多年惡瘡不瘥或痛痒生蟲爛研馬糞并齒灰傅上不過三十兩遍效 武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得此方便瘥 兵部手集

丹風瘡久不痊燒菰蔣末傅之按本草菰蔣即野茭白

沙瘡 丹溪云沙瘡殺蟲爲主

蕪荑　寒水石　黄檗各貳錢　蛇床子炒錢　白礬飛　明礬　剪草　吳茱萸各壹錢　蒼朮　厚朴　雄黄各半錢　輕粉拾盞

世治沙瘡山蟻窠黄荆葉雞毛等分燒存性爲末香油調傅又方用陳年船底灰揭細篩過桐油調傅立効又方治沙瘡用水萬苣燒灰存性香油調傅立愈水多者乾傅水萬苣如百合狀生水邊七八月結子又如野蘇狀

瘑瘡 夫瘑瘡者由腠理虛風濕之氣入於血氣結聚所生也多著手足遞相對如新生朱黄子痛痒爬抓成瘡黄汁出浸淫生長坼裂時差時發變化生蟲故名瘑瘡也

漏蘆散 治風瘑瘡熟腫

漏蘆去蘆　川升麻　赤芍藥　甘草炙　羌活去蘆　枳殼麩炒去穰　木通去皮　防風各壹兩　川朴硝各貳兩

右爲㕮咀每服伍錢水壹大盞煎至陸分去滓食後温服

治熱毒風生瘑疥
螺殼 陳腐者 壹兩 燒灰 龍膽艸末 各半兩 亂髮
胡粉
右件爲細末研令勻用清油脚調塗之

治濕瘑瘡
胡燕窠 壹枚 取最大者用 抱 兒子一處餘處不用
右爲細末先以水煎甘艸及入鹽少許淨洗乾便以窠末敷之三七兩上便差若愚惡刺以醋調成膏敷貼日用一度

又方
生韭 壹握 切研
右用温醋五合浸良久以布絞取汁塗揩瘡上日三四度用之

治乾瘑濕瘑疥癬
右取連根生葱白豬脂和搗塗之

夫瘑瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間生長則常痒痛故經久不差也

藜蘆膏 治諸瘑瘡經久則生蟲
藜蘆 松脂 細研
雄黃 細研 白礬 拈各用 貳兩 研

苦參

右件先搗萊菔苦參爲麤末入豬脂壹斤相和煎十餘沸綿濾去粗次入松脂雄黃白礬等末攪令勻待冷收於瓷合旋取塗之以差爲度

治瘡瘡經年久不差宜用之

薰陸香　杏仁各半兩　硫黃細研　風粉各貳錢半　黃蠟壹兩　油貳合

右件細研如粉先熬清油沸下蠟令消次入諸藥末同煎如稀膏候冷收於瓷器中旋取塗之

苦參湯洗方

地榆　桃皮　苦參各伍兩

右件藥並細剉以水貳斗煮濾去粗稍温每日一度洗之甚妙

玉手疥六　勞宮灸　大陵灸

世瘡疥頑癬六　絶骨三里各寸半瀉　間使灸　解溪各伍分　血郤參寸瀉

集渾身生瘡疥　曲池　合谷　三里　絶骨　行間　委中

田疥癬二　陽谿主之

癬

病源論云癬發之狀皮肉瘾疹有如錢文漸漸長瘡或圓或斜痒痛有匡闌癬內生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏血氣閉澁則發此疾○風癬者是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡闌但抓搔頑痺不知痛痒內亦有蟲○又有逸風瘡生則遍體狀如癬痒而痒此由風氣逸於皮膚因名為逸風瘡也○乾癬者但有匡闌皮枯索痒搔之白屑起是也亦是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若風毒氣多濕氣少

故風沉入深故無汞而為乾癬中亦有蟲○又有白癬其狀白色而痒此由勝理虛而受風風與氣并血澁而不能榮肌肉故也○濕癬者亦有匡闡如蟲行浸淫赤濕遇痒搔之多汞成瘡蓋風毒氣淺濕氣偏多而為濕癬中亦生蟲

丹溪云癬瘡用防風通聖散去芒硝大黄加浮萍皂角刺

又方治癬用

浮萍壹兩　蒼耳　蒼朮貳兩
苦參壹兩半　黄芩半兩　香附貳兩半

右為末酒調服或酒糊丸

何首烏散羅氏　治脾肺風毒攻腫遍身癬變成瘡疹搔之成瘡或有背拘急肌肉頑痺手足痿裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癜白癜頑麻等風並宜服之

荆芥穗　蔓荆子　威靈仙
何首烏　甘草炙　防風
蚵蛸草各等分

右搗羅為末每服壹錢食後　温酒調下沸湯亦得

白蒺藜散　治一切癬及疥風痒瘑瘡等疾

白蒺藜　秦艽　去蘆　枳殼　麩炒去瓤
獨活　防風　並去蘆各壹兩　人參
苦參　玄參　丹參
沙參　各去蘆　甘菊花
黃芩　梔子仁
細辛　去苗　茱萸
　　烏蛇　酒炙肉

右爲細末每服貳錢食前溫酒調下

苦參丸　治肺毒邪熱生瘡疥癬並宜服之以苦參一味爲細末粟米飯丸如桐子大每服伍拾丸空心溫水飲湯送下

苦參丸　治一切癬皮膚瘙痒

苦參　去蘆壹斤半劑　菖蒲　肆兩

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服參拾丸熟水送下不拘時候

三神丸　治一切癬

蒺藜　炒用各壹兩　海桐皮　剉

右爲細末麵糊和丸如菉豆大每服拾丸加至拾伍丸溫酒鹽湯送下

治
胡粉散　治一切癬瘡瘙痒甚者
胡粉 別研　雄黄 別研　硫黄 別研各壹錢半
大草烏 參錢生用　盤蝥 壹錢　砒 伍分
蠍稍 參錢　麝香 參分
右為細末先用羊蹄根釀醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散　治一切頑癬
輕粉　黄丹　白膠香
瀝青 各等分
右為細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑糝二次便

乾數次剝去殼也治牛皮癬如神
八寶散　治風癩松皮頑癬久不愈者一鄉人患此疾數年不愈後得此方試用有効
藿香　破故紙
大腹皮　雄黄
硫黄　輕粉
白礬 枯各壹兩　檳榔
右為細末小油調擦日上三五次痒則擦之
五倍子散　治癬久不瘥
五倍子 壹兩火煅烟盡　黄蘗 剉炒
膩粉　漏蘆　白礬 煅各壹分　當歸 剉炒

右爲細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

丁香散　治一切癬

丁香　研　蝦蟆灰　各壹兩　麝香　研貳錢半
白礬　熬令汁枯　研　五倍子　研　臙粉　研各半兩

右研勻乾傅癬上以瘥爲度

水銀膏　治一切癬

水銀　貳錢半　無黃仁　研末　薑黃　研末各半兩
酥　貳兩

右先將酥和水銀以柳椎研攪候水銀散即下無黃末攪勻磁盒盛旋取塗癬上日三二次

定粉膏　治乾濕癬風癬不拘年月

定粉　水銀　各壹兩
胭脂　各分

右同研勻用陳豬脂壹兩同研成膏先用湯洗後以膏子臨臥塗之一上便瘥本法豬脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

棟實　半升如無實以根皮代之　棟葉及嫩枝　剉細
凌霄花及藤　剉細各壹升　枳殼　去穰
蛇床子　丹參
皂莢　地榆　苦參　並細剉各叁兩

右同煎濃汁熟洗患處

黃連膏　治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱赤黑痒不可忍搔之出血

黃連去鬚　黃檗去粗皮　皆細研
蔓菁子　杏仁湯浸去皮尖雙仁細研各半兩
水銀壹錢

右先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生油壹合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

癬瘡方　櫧樹皮不犯銅鐵每貳兩入蘆薈叁錢白

芨叁錢細研為末刮癬出血用好醋調傅雖痛却一傅可愈

一方用　蘆薈　大黃　輕粉　雄黃　蛇床子　櫧樹皮　檳榔　右先刮破癬用醋調藥末塗之

頑癬用櫧樹皮加巴豆斑蝥為細末又加生砒少許水調傅

治癬積年不瘥者

右用蟹整壹個去頭翅足以針劄燈焰上燒米醋內淬如此三兩次就燒成存性黑灰研為細末用紅棗壹個湯泡剝去皮核與蟹螯一處同研爛先

以手抓或生布擦動癬然後搽藥不可侵好肉恐有毒

治牛皮癬用清香油壹兩入全蝎柒枚巴豆貳拾枚盤螯拾枚同熬候色焦者先去之去尸入黃蠟壹錢候熔收起朝擦暮愈不猶皮肉一

又方

綠礬根不拘多少　花椒壹兩　信半少
防風　白芨　百部
白歛各半兩　江子拾伍粒

右各爲末和綠礬根搗熟成團將藥於癬上搽之候痛過洗浴

又方一味綠礬根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋調塗癬上立愈

治癬用蔡蘆細搗爲末生油調傅

治癬神効方

蔡蘆根半兩　輕粉貳錢半

右爲細末凉水調搽癬上

簡要濟衆治癬疥久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉少許調如膏塗傅患處二十五遍即瘥如乾即用豬脂調和傅之

取楮皮枝中白汁塗癬甚妙
治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上
經驗方　治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以豬脂調傳之三二五度瘥　又方患癬瘡搗山豆根末臘月豬脂調塗之
半夏散　治一切癬
右以半夏叁兩搗爲末以陳醬汁調和如糊摩叁癬上日兩三度即瘥
東坡先生家藏方
決明子　不以多少爲細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研爲膏散以物擦破癬上用藥傳之立瘥
鯽魚膏　治諸癬瘡或乾或濕痒痛不可忍
鯽魚　中七者壹尾　亂髮　如雞子大貳枚　猪脂　半斤
雄黃　壹兩半　硫黃　壹兩
右件藥先煎猪脂令沸即下魚煎令烟盡次下髮令銷濾去相下雄黃硫黃末攪令勻於瓷器中不拘時候塗之以瘥爲度
凌霄花散　治風濕無數生諸癬久不愈
凌霄花　白礬　各貳錢半
黃連

雄黃　天南星　羊蹄根各半兩

右爲細末抓破用生薑汁調藥擦之如癬不痊只用清油調藥立効

昨葉荷草散　治一切癬無問風濕氣血與夫相染而生並宜服之

昨葉荷草即瓦上晒乾壹兩　枯白礬壹錢

雄黃半錢

右爲細末用羊蹄菜根先醮醋擦癬上令痒破即用藥末乘濕塗敷不過兩三次即愈

是齋治諸癬

貫衆　吳茱萸

右爲細末先用手抓破用藥擦之米醋調敷亦得

砒霜散　治諸癬不問乾濕積年不痊

砒霜貳錢半研　硫黃研　臘粉各柒錢半研　宮桂各等分　蜜陀僧研

右件同研令勻如癬乾即用生油調塗若癬濕即用藥摻之

治癬疥瘡痒不可忍

皂角去皮子炙錠煨　黃連半兩爲末　臘粉貳錢半

右將皂角爲末用米醋貳大盞同煎如稀餳用綿

濃去粗入黃連末膩粉調令勻候癬發時惡水出便可先用構樹白皮搔破後塗藥二七兩上便愈

治疥癬　用松膠香研細約入輕粉和勻先疥癬上先用油塗了錯末一白便乾頻者二三兩度

治癬瘡　取蟾蜍燒灰為末用豬脂和敷之

戴院使云瘡如牛皮模樣痒甚不可忍者又疼用黃連木香黃檗皮杉木節貳個明礬少許以上各等分為末用好眞香油調塗大效

風癬　烏蛇九　治一切風癬多年不瘥者

烏蛇 酒浸去骨　白附子 炮　附子 小便浸壹宿

天麻 各貳兩　全蠍 炒　羌活

乳香　殭蠶 炒各壹兩半　苦參 拾兩

槐花 半斤

右為細末用生薑汁壹斤蜜壹斤一味同熬成膏入藥和丸如梧桐子大每服參肆拾丸空心用溫酒送下夜晚荊芥湯送下

白花蛇丸　治風癬瘡皮膚瘙痒久不瘥

白花蛇 參兩酒浸　苦參 貳兩去蘆　麥門冬 壹兩半去心

黃芩　防風 去蘆　白鮮皮

甘草 炙　枳殼 麩炒去穰　梔子仁

赤芍藥　川大黃　蒼耳子
羌活去蘆　黃芪剉去蘆　白蒺藜各壹兩
右件爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服叁拾丸食後薄荷酒送下
本事烏頭丸治風癬妙方見紫白癜風
宣風換肌散　治一切風癬瘡疥瘡風瘡
甘草炙　黃芪　當歸各壹兩
黃連　黃芩各浸炒　大力子炒
防風　白芷　荆芥穗
川芎　烏蛇肉各半兩　羌活

蒼术　何首烏各叁錢　全蝎捨枝炒
右爲細末酒調服茶清亦可每服貳錢
雄黃膏　治風毒疥癬
雄黃細研　臘粉研　白礬枯
川椒　蒺藜各貳錢半　附子半兩炮去皮臍
右爲細末入乳鉢內再研如粉用煉了臘月豬脂半斤黃蠟貳兩淨鐺內慢火煎候蠟銷傾於瓷合內入雄黃等末攪勻每日四五度取少許敷塗之
硫黃散　治風毒癬徧身皆生瘙痒
硫黃研　雄黃研　硃砂細研

麝香 細研 吳茱萸 附子 生用各
芭苴 去皮 川椒 各壹錢 貳錢半
油

右爲細末同研令勻先用新布擦癬令水出便用
醋調塗之不過三兩上即瘥

治風癬及寒熱瘡疥

韭根 炊多年者 藜蘆
白礬 雄黃
胡粉 各貳錢半 瓜蒂
水銀

右先將雄黃白礬胡粉研極細却入水銀用柳木
槌研勻用豬脂壹斤將韭根藜蘆瓜蒂煮數沸去

相放溫調前藥塗瘡大有神効

祛風白芷散 見面部瘡

丹參湯 治風癬瘙痒洗浴

丹參 去蘆 蛇床子 各參兩 苦參 伍兩
白礬 貳兩 研細

右除白礬外㕮咀爲麁散用水參斗煎取貳斗濾去
粗入白礬攪令勻乘熱於避風處洗浴用水冷爲
度拭乾了用藜蘆末粉之相次用之以瘥爲度

乾癬

治乾癬痒痛不止

草烏頭 狼毒 各貳錢半 螫螫 柒介去頭足翅

右件生用爲細末用唾津調用竹篦子刮破塗藥
熱擦入肉候出黃水三二兩日即瘥
又方 蟾蜍五月五日取拾枚 麝香半錢 同研爲細末醋調
塗癬上出少黃水瘥
又方 川烏頭貳枚生用 乾蝎伍箇 爲細末面油調作膏
塗之
治乾癬積年生痂搔之黃水出每遇陰雨即痒
巴豆拾粒
右於炭火燒之令油出盡即於乳鉢內用少許酥
和研如膏薄塗之不過二兩度愈

又方 用狼毒醋磨塗之
又方 蟾蜍半兩微炒研細末蜜調薄敷即瘥
羅氏柏脂膏 治乾癬
柏油壹斤 黃蠟半斤 杏仁肆拾伍粒劉碎
朴硝壹抄
右件相和於鐵器內用老生薑葱白參根一順攪
五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之
一抹散 治乾癬不瘥
天南星 草烏頭各壹枚 生用
爲細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

濕癬 癬在頸項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈壹兩甘草末半兩和勻先用温漿水洗癬拭乾傳之神妙（劉禹錫方名蘆薈散）

硫黄散 治濕癬痒痛不可忍

硫黄 半兩　膩粉 貳錢半研　龍腦 壹錢　蜜蠟 半兩

右件藥同研細如粉用面油調如泥塗痛時抓破後用藥擦之立瘥

又方

烏梅 拾肆枚用肉　大蒜 拾肆顆　梁上塵 貳合

右件相和入鹽叁合熟搗用釅醋壹升浸一宿塗於瘥上即瘥

黄連散 治癬濕痒不可忍

黄連　黄蘗 雄黄 半兩研細　胡粉 各壹兩研細

右為細末同研令勻先用温漿水洗蒼然後取藥敷之不過四五度即瘥

治濕癬白禿

右取馬齒莧膏塗之若燒灰敷之亦瘥

孟詵云蕪荑和蜜治濕癬

治濕癬方

黃連　明礬煅各半兩
黃丹　水銀各貳錢

右爲細末用豬脂油壹兩炙研令水銀星盡散磁盒收用

螺殼散　治濕癬痒不可忍

螺殼壹兩　亂髮灰　胡粉研各半兩

右爲細末研勻以油淀和塗之

荆芥散　治多年濕癬　龍腦

荆芥穗不拘多少以瓦礶盛鹽泥固濟只留一竅用炭火燒候出青烟便去火用濕紙塞了竅放冷取出研細末半兩　麝香壹錢　膩粉伍錢

右研勻先以白礬漿水抓洗瘡令破帛子揾乾了以生油調藥傳之

羅佐濕散　治多年濕癬大有神效

蠶沙肆兩　薄荷半兩

爲細末每用不拘多少乾摻瘡上或用生油調搽

子和　一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至脛發痒時杷搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可忍灸炳薰漸流黃蘭茹白僵蠶羊蹄根之藥皆不效

其父母求療於戴人戴人曰能從予言則癒父母諾之以鈹針磨尖快當其癢時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐爲癬藥所誤濕淫於血不可不從者矣

灸法 日中時灸病處影止三壯灸之呪曰癬虫蟲毛戎戎若欲治待日中 又法八月日出時令病人正向東面戶內長跪平舉兩手持脅兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯十日愈

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔癢者初如疥搔之轉生汁相連者是也仲景云從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可治 運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚濕浸淫是也

升麻湯 治忽有風熱生浸淫瘡徧體

升麻 大黃 刮微炒
枳實 麩炒 芍藥 各壹
甘草 炙各半兩 當歸 切焙

右剉碎每服伍錢七水壹盞半煙心壹握煎至壹

盞土淬空心温服

香瓣瘡方　治面上耳邊生浸淫瘡有黄水出久不愈

羖羊鬚　荆芥　乾漆去核各貳錢

右燒灰存性研勻入臘粉半錢同研極細每用少許清油調搽先以温湯淨洗拭乾塗藥一二十次効亦治大人小兒兩吻生瘡

雞冠血塗方　治卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝能殺人外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心

右以雄雞冠上刺血傅之日三五度

簡要濟衆方浸淫瘡痛不可忍者發寒熱剌薊末水調傅瘡上乾即易之

又方鯽魚壹尾長叁寸者豆豉壹合右杵如膏塗之亦療馬鞍瘡

又方苦瓠壹兩燒半兩露蜂房微炙半兩梁上塵　右爲末油調塗

又方伏龍肝柒錢半亂髮燒柒錢半右爲末豬脂和塗

又方以鷄冠血和黄連末塗　煎鯽魚膏塗　生切鯽魚片和鹽貼　燒胡燕窠水和塗

山妻年五十舊患發瘭之處膝理虚疎每食則汗出

成流一日忽成浸淫瘡膿汁所至輒皮破肉腐傳銀粉黃連黃丹枯礬之屬皆不驗用豬膽汁調蘆薈末塗之膿水即乾而瘉

熟汁浸漬成瘡　玉粉散　七寶散　並見熟瘡瘍子

天泡瘡

天泡瘡即丹毒之類而有泡者由天行少陽相火爲病故名天泡瘡火熱客於皮膚間外不得泄佛熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裏達於外發在春夏二焦俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角或加葉芩一二味外傳如馬齒莧吳藍赤小豆芦根之類皆解毒消腫可用於初起之時或蚶殼或龜甲水龍骨各煅存性則收濕

濕生肌可用於淫之後」

痙

痙小癎世謂之熱癎是也王註云大如酸棗或如豆色赤而內有膿血也

風濕

海藏云汗出見濕乃生痙痙弗痛為瘡癎也

勞汗當風寒薄為酘贊乃痙　痙色赤膚內有膿血

旋覆花丸

旋覆花　參兩　防風　白芷

甘菊花　南星　半夏

石膏　川芎　陳皮

白附子　各半兩　蝎稍　僵蠶炒各一錢

右細末壹汁糊丸梧桐子大薑湯下參伍拾丸食後服

黑豕子　治癎毒

用羊角連肉骨燒存性為末酒調參錢分上下服之瘡可散

按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得赤斑或痒或瘭毒不治殺人以羖羊角燒存性研令極細末以雞子清調塗之甚効本草亦云然

熱瘡痱子

千金云凡熱瘡起便生白膿即合俗名膿窠瘡是也其初起即淺但出黃汁名肥瘡又名黃爛瘡初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢坼裂春夏秋冬隨瘥劇者名膿胞瘡治法已見疥門

黃芩　黃連

蛇床子　寒水石　貳錢　大黃　各參錢

白蘞　壹錢　黃丹　伍分

輕粉

無名異　各少許　木香　少許痛處加　白芷

右為細末麻油調塗
又方 蕎麥麵壹兩 硫黃 研 勻錢 水銀 制鉛 壹錢 研 或油
或豬膽汁調搽
白蘞蔹散 治熱毒瘡癤心神壅躁
白蘞蔹 炒去剌 防風 去蘆
川大黃 剉炒 梔子仁
子芩 麥門冬 去心焙 玄參
桔梗 去蘆 甘艸 炙赤剉 各一兩 前胡 去蘆
右為細末每服貳錢食後用薄荷湯調服
蜜陀僧散 治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

蜜陀僧 雄黃 雌黃
定粉 各半兩 膩粉 叁錢
右研為細末先用柳枝壹握生甘草壹兩搥碎以
漿貳升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之
白金散 治風毒攻注遍身及手足生熱瘡瘙痛出
黃水
用粳府滑石為細末先用虎杖甘艸豌豆各等分
約半兩許水貳椀煎上項藥至壹椀去滓微熱淋
洗瘡水冷拭乾上摻滑石末令通身便睡至明決
愈

玉粉散　治熱汗浸漬成瘡腫痒煞痛

定粉 壹兩　蛤粉 玖兩半　白石脂
白龍骨　石膏 各半兩　滑石 捌兩
寒水石 燒通赤放淨地上冷出火毒 壹兩　粟米粉 貳兩

右爲細末研勻每用些少乾搽患處

七寶散　治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪　當歸　防風
荊芥穗　地骨皮　木通 各貳兩
白蘞 壹兩

右爲麤末每用藥壹兩水參大椀煎至八沸濾去

清稍熟淋漬患處避風少時

赤石脂散　治痂子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂 細研　黃蘗 去粗皮炙　臘茶末 各半兩
白麪 貳兩　龍腦 半錢 另研

右爲細末研勻每用時綿揾撲之

龍腦粉方　治痂瘡痒痛

龍腦 壹錢 研　粟米粉 伍兩

右研勻先用東葉湯洗後用綿揾撲之

玉女英　治痂瘡痒痛

滑石 半兩細研　菉豆粉 肆兩微炒

右研勻以綿揾撲之一方有棗葉壹兩
榡花粉傅方　治瘇子瘙痒
右用苦楝花不拘多少焙乾爲末入蚌粉滑石末
各少許研勻日頻傅之
治暑月汗漬腋下赤腫及瘇瘡
右取臘雪水和蛤粉傅之
戴院使治瘇子用香撲粉入朴硝末如常撲使更入
少許枯礬末
治熱瘇瘡徧身如蟲子用不灰木棗葉爲末瘡上揉
之即止　又法用茨菰葉陰乾爲末傅之　又方用

臘雪以瓶收貯遇生瘇時以所化水塗傅　又方用
黃瓜切斷擦瘇子上即安　又方用棗葉煎湯浴之
又方用蚌粉肆兩菉豆粉貳兩滑石壹兩爲末乾
擦之

癘瘋

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣并則生癘瘋狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡也

犀羊角散　治風熱皮膚生癘瘋痒痛

犀羊角屑下　烏蛇肉酒浸　川大黃
玄參去蘆各壹兩　枳殼去穰麩炒　白蒺藜
甘艸各半兩炙　秦艽去蘆土　防風去蘆各柒錢半

右件㕮咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去粗入牛蒡根汁半合更煎一兩沸温服不拘時候

秦艽湯　治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡瘾如麻豆

秦艽去蘆壹兩　防風去蘆　黃芩
麻黃去節　甘州炙　玄參去蘆
犀角屑　生薑子炒　枳殼去穰麩炒
川升麻各柒錢半

右件㕮咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去粗溫服不拘時候

當歸飲子　治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚徧身瘡疥或瘙痒或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡瘾

當歸去蘆　白芍藥　川芎
生地黃　白蒺藜　防風去蘆
荊芥穗各壹兩　何首烏去蘆　黃芪去蘆
甘草炙各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎至捌分去粗溫服不拘時

烏蛇散　治風熱遍身生瘡瘾瘙痒

烏蛇肉酒浸貳兩　白鮮皮
桂心　枳殼去穰麩炒
蒲黃炒　甘草炙
蔓荊子　苦參

當歸 去蘆 各半兩　天麻　麻黃 去節
秦艽 去蘆　牛蒡子 炒　藁本 去蘆
白殭蠶 炒 各半錢

右爲細末每服貳錢温酒調下不拘時

荆芥散　治風熱皮膚瘙痒生瘡瘍

荆芥　赤茯苓 去皮　苦參 去蘆 各壹兩
蔓荆子　天麻　人參 去蘆
防風　獨活 各去蘆　枳殼 麩炒 各半兩
牛蒡子 炒　黄芩 各半錢　烏蛇肉 貳兩 酒浸

右爲細末每服同前法

防風散　治風瘡瘍

防風 去蘆　杏仁 麩炒 去皮 研爲泥
甘草 炙 壹兩　白殭蠶 炒 各貳兩

右爲細末每服叁錢空心蜜水調下或温酒調服亦得日進二服

牛膝散　治風瘡瘍

右用牛膝酒浸搗爲末每服貳錢食前温酒調下兼治骨疽風癩皆効

疾藜丸　治風瘙痒生瘡瘍

白疾藜　秦艽 去蘆　赤茯苓 去皮 各壹兩

羌活　苦參　並去蘆　黃芩
細辛　去苗各半兩　枳殼　炙錢半去穰炒　烏蛇肉　參兩酒浸
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾丸溫
蜜湯送下不拘時候
黑龍丸　治風毒上攻頭面多生瘡瘍
羌活　去蘆　薄荷葉　蔓荊子
細松烟墨　獨活　去蘆各壹兩　川芎
甘艸炙　白附子　炮　山梔子
白芷　防風　去蘆　荊芥穗
天南星　薑製　草烏頭生　白殭蠶炒

川烏頭　炮去皮臍各半兩
右為細末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸細
嚼茶湯或溫酒送下食後服
莽草膏　治風瘙癢皮膚生瘡瘍體腫疼痛
莽草　壹兩　當歸　去蘆
大戟　去皮　川椒
細辛　去苗　赤芍藥
鼯鼠花　附子
蒴藿　各貳兩　芫花
右細剉用醋參升浸壹宿用豬脂參斤同煎令附
子色黃為度綿濾去粗每塗摩病處日二五上

治風瘙痒皮膚生瘡瘟搔之成瘡宜用此粉身即瘥

苧蜀　麻黃根　劉寄奴　白芷　各參兩
雷丸　伍兩　藿香　貳兩　藜蘆　壹兩半

右爲細末入英粉伍兩相和令勻逐日粉身上

治風熱皮膚瘙痒搔之生瘡瘟粉身

麻黃根　伍兩　蛇床子　肆兩　白蘞藜
白蘞　各貳兩　白米粉　貳升

右爲細末用踈生絹袋盛痒即粉身

治風瘙皮膚生瘡瘟搔之腫痒柳枝湯洗之

嫩柳枝　桃枝　葫蘆

苦參　各伍兩　槐白皮　肆兩　茵蔯　麻黃　各參兩
狼毒　青葙葉

右細剉和勻每取壹斤用水伍斗煮取肆斗去粗更入鹽及朴硝各貳兩攪勻看冷熱於溫室中洗浴寢衣覆出汗瘥切愼外風

治風熱皮膚生瘡瘟苦痒成疥丹參湯洗之

丹參　苦參　各肆兩　蛇床子　生用　參兩

右件藥用水壹斗伍升煎至柒升去粗乘熱洗之

治皮膚風熱生瘡瘡瘟或痒痛宜用垂柳湯洗之

垂楊柳　壹斤　杏仁　參兩　白蘞　生用　貳兩

右件用水壹斗伍升煎至柒升去粗於無風處洗浴極妙

結核 獨形而小核者爲結核

河間云結核火氣熱甚堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消 丹溪云結核或在項在頸在臂在身皮裏膜外不紅不痛不硬不作痛多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核 結核在頸項方偃蠶炒大黃酒浸青黛膽星各等分爲末蜜丸噙化 結核在下頦二陳湯加連翹防風黃連翹桔梗柴胡 結核在臂二陳湯加酒炒大川芎酒苓蒼朮皂角刺僵蠶香行大陰厥陰之積痰使結核自消甚捷 風核以去風消核散常服消

之　風熱結核以大連翹飲加薑蠶牛蒡子　凡一
切風核疼痛宜以大蕎麥根及金線釣葫蘆根磨半
泔半醋煖塗之
儒者楊澤之鉄盆間結一核余謂此肝火血燥而筋
攣法當滋腎水生肝血彼反用行氣化痰外敷南星
商陸益火如碗余用補中益氣湯六味地黄丸以滋
腎水間用蘆薈丸以清肝火年餘元氣復而消　一
男子頸間結核大潰一婦人左眉及髮際結核並用
梔子清肝散海藻散堅丸以清肝火養肝血益元氣
而愈此症亦有大如升斗者亦治以前藥可愈　一

婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥
愈甚治以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘貼愈　一
婦因怒結核腫痛察其氣血俱實先以神効散下之
更以益氣養榮湯三十餘劑而消　常治此症虛者
先用益氣養榮湯待其氣血完充乃取神効散去其
毒仍進前藥無不効者　一兒七歲項結二十核時發
寒熱日久不愈治以連翹丸而消若患在面臂等處
尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏之藥　一兒項結
一核堅硬如癤面色痿黄飲食不甘服托裏藥不應
此無辜瘡毒也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按

之轉動軟而不痛者內有蟲如粉急針出之若不速去則蟲隨氣走內蝕藏府不治（蟾蜍夏月溝渠中腹大不跳不鳴者先取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食晝夜去以新布袋包繫置水急處浸一宿取出先上焙爲末入麝香一字軟飲丸如麻子大每服二三十丸空心米飲送下）

一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉痿疾體瘦面黃經漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之少可彼自誤服冰蛭等藥血氣愈虛遂致不救

海藻連翹湯　治諸般結核瘰癧馬刀瘿瘤疾核

白茯苓　陳皮去白　連翹
半夏薑製　黃芩酒拌炒　黃連酒炒
南星薑製　牛蒡子炒　柴胡
三稜酒炒　莪茂酒炒　殭蠶炒去絲
昆布　海藻　羌活
防風　桔梗　夏枯草
川芎　升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

連翹　防風去蘆
肉桂去麁皮　桑白皮
獨活　秦艽　黃檗
香豉
牡丹皮各半兩

海藻貳錢半

右為末煉蜜丸如菜豆大每服拾丸燈心湯下

五香散　治肉中忽有惡核生腫硬不消惡肉惡脉瘰癧風毒腫氣

木香　鷄舌香　沉香各壹兩
麝香細研貳錢半　射干　薰陸香
乾葛坐　川升麻　獨活
桑寄生　連翹　甘草生各貳兩

川大黄參兩剉碎微炒

右剉碎入麝香研勻每服參錢水壹中盞煎至五分去滓入竹瀝半盞更煎一二沸温服日三夕

連翹散　治項上惡核瘰癧腫

連翹　獨活
川升麻　沉香
木通剉各壹兩　木香　丁香各半兩
川大黄貳兩剉碎微炒　桑寄生

右為細末每服貳錢清粥飲調下日三服

獨活散　治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活　射干
桑寄生　升麻
木香　連翹

沈香 川大黃生用 甘草生各壹兩
右劑碎每服半錢水壹甲盞煎至陸分去滓入竹瀝半合更煎一二沸放溫服日三得快利爲度
清肝益榮湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛或作瘍子并一切肝火之症

山梔 當歸
茯苓各壹錢 柴胡
芍藥炒各柒分 熟地黃壹錢半
龍膽草捌分 木瓜不犯鉄器
川芎 白朮貳錢
炙甘草伍分
右壹水煎服

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏又留而內着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕有所疾前筋（疾前二字衍文也筋當作結）筋屈不得伸邪氣居其間而不及發爲筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得反津液又留合爲腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘤以手按之堅有所結深中骨骨氣因於骨骨與氣并日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而不去

有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也（刺節眞邪篇○此皆虛邪中人爲病弗去而久留着故積成累月而成疽瘤也）三因云癭多着於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變者名曰肉癭筋脈露結者名曰筋癭赤脈交結者名曰血癭癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄決決破則膿血崩潰多致不起瘤則有穴骨瘤脂瘤氣瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人惟脂瘤破而去其脂粉則愈（丹溪云服癭瘤藥先須斷厚味）

海藻丸　治癭瘤通用

海藻 洗晒　川芎　當歸
官桂　白芷　細辛
藿香　白斂　昆布 洗晒
明礬 煅各壹兩　海蛤 煅　松蘿各半錢
爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食後含嚥下
守癭丸　治癭瘤結硬

通草貳兩　杏仁 去皮尖研　牛蒡子 各壹合
昆布 洗　射干
海藻 洗各肆兩　訶梨勒

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食後嗽化吞三

海藻酒方　治頸下卒結核漸大欲成癭瘤

右用海藻洗去鹹壹斤酒貳升漬一宿取壹貳合飲之酒盡將海藻曝乾搗末酒調壹錢七日三服瘥如浸用絹袋盛了浸春夏二十日秋冬三日

白頭翁丸　治氣癭氣瘤

白頭翁 半兩　昆布 拾分洗　通草

海藻 洗各柒分　連翹　玄參 各捌分

桂心 叁分　白斂 陸分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服伍丸日漸加至拾丸臨臥白湯送下忌蒜麵生葱豬魚

海藻散堅丸　治肝經癭瘤

海藻　昆布 各貳兩　小麥 肆兩醋煮炒乾

龍膽草 貳兩

右爲末煉蜜丸梧子大每服貳參拾丸臨臥白湯送下并喻化藥之

五癭在頸項間皮寬不急緊而垂者是也宜破結散消癰丸海藻丸昆布丸黃藥酒藻藥散兼以針灸法同施方有効及常服復元通氣散蠐螬丸自然縮

小
木通散　治頸下卒生結囊欲成癭

木通　松蘿　桂心
蛤蚧　酥炙　白斂　琥珀
海藻　洗　昆布　洗各壹兩

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下

五癭丸

菖蒲　貳兩　海蛤　白斂
續斷　海藻　松蘿
桂心　倒掛草　蜀椒

半夏　各壹兩　神麴　參兩　羊靨　白敛

右為細末以牛羊脂髓為丸如梨大每服壹丸食後臨臥嚼化服

昆布丸

檳榔　昆布

右為末煉蜜丸彈子大每用壹丸含嚥化下

海藻　各貳兩

藻藥散　治氣癭

海藻　酒洗壹兩　黃藥子　貳兩萬州者佳

右為末置掌中以舌時時舐以津嚥下消三分之二止藥先須斷厚味戒酒色　按本草黃藥子主諸惡瘡瘡斗門方以

浸酒療項下癭氣醫學綱目及丹溪誤作黃蘗蓋蘗藥字相近之訛蘗爲連則其失愈遠矣

二海丸　治氣癭

海藻　昆布　各酒洗晒乾

右等分爲末煉蜜丸杏核大稍稍嚥汁又用海藻洗淨切碎油醋熟作常菜食之消癭散　治癭氣

海藻　酒洗　昆布　酒洗　海帶　酒洗

海馬　酒炙　海紅蛤　石燕　各煅

海螵蛸各壹兩

右爲末清茶下兼服含化丸兼灸相濟以收全功

合化丸　治癭氣

海藻　海蛤煅

昆布　文蛤　即花蛤背有玫文

訶子　去核　五靈脂　各壹兩　龍子煅　豬臕　拾肆个焙乾另研

右爲末煉蜜丸臨臥含化時時嚥下兼灸法以助丸功

通氣丸　治癭氣

海藻　海帶

夏枯艸　木通　各壹兩

薄荷　各伍錢　杏仁　少許

昆布

訶子

右為末煉蜜丸如芡實大每用壹丸嚼化　兼灸
以泄瘿氣方効
黃藥酒　治忽生瘿疾及二三年者
右用萬州黃藥子叁斤須緊重者為上如輕虛即
是他州者力慢須加二倍以無灰酒壹斗投藥在
內固濟瓶口以糠火燒一伏時停待酒冷即令患
者時時飲壹盞勿令絕酒氣經三五日常把鏡自
照覺消則停飲不爾令人項細也用火時不可多
惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待經宿也已
驗如神忌毒食

昆布散　治癭氣去風火欝滯散痰氣壅結
防風　荊芥　黃連酒炒
昆布　海藻　海粉
羌活　升麻　連翹
青皮　膽星　貝母
牛蒡子炒　夏枯草　沉香
香附子　撫芎　黃芩酒炒
右薄荷煎服或末或丸俱可痰多加南星半夏
又宜灸天突穴為妙
三因破結散

海藻洗　草龍膽　海蛤
通草　昆布　礬石枯
松蘿各參分　麥麵肆分　半夏
貝母各貳分

右爲末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜諸雜毒物十日知二十日愈

土壺散　治三種癭

海藻洗　海帶洗　昆布
雷丸各壹兩　青鹽　廣茂各半兩

右等分爲細末陳米飲丸如楸子大嚼化以煉蜜

九亦好

孚和人參化癭丹

海帶洗　海蛤
昆布已上四味皆焙　澤瀉炒　連翹已上各等分
豬臛　羊臛各拾枚豬羊臛卽豬羊外腎乃囊中之卵也

右爲末蜜丸如芡實大臨臥嚼化壹貳丸忌油膩物

羅氏寶金散　偏醫癭氣無不瘥

豬羊臛拾對煖水洗去脂膜後晒乾杵爲細末　海藻洗
海帶各貳兩洗　木香
丁香

琥珀 研
右件先將丁香木香海藻海帶杵爲細末入下項藥末合和再研細重羅過每服壹錢熱酒壹盞調服夜卧服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

麝香 研各貳錢半　眞珠 研半兩
海帶丸　治癭氣久不消

海藻 洗　貝母　青皮
陳皮 各等分

右件爲細末煉蜜爲丸彈子大食後嚥化壹丸効

右用針砂浸於水缸中平日飲食皆用此水平日一撚針砂服之半年自然消散

昆布散　治癭氣結腫胸膈不利宜服

昆布 洗　海藻 洗　松蘿
半夏 湯泡　細辛　海蛤 細研
白斂　甘草 炙各壹兩　龍膽 炒
土瓜根　檳榔 各貳兩

右爲細末每服貳錢食後温酒調下

治癭氣胷膈壅塞頸項漸麤宜服此方

昆布 洗各貳兩　射干
商陸

羚羊角 鎊 木通 海藻 洗
杏仁 湯浸去皮尖 炒黃各壹兩 牛蒡子 壹兩半 微炒
右㕮咀每服叁錢水壹中盞入生薑半分煎至陸分去滓不拘時溫服
治癭氣神驗方
琥珀 桔梗 各半兩 烏賊魚骨
昆布 洗各壹兩 赤小豆 酒煮熟焙 小麥 酒煮各叁分
右為細末煉蜜丸如小彈大綿裹壹丸常嚼嚥津
神効開結散 治癭疾不問年歲極驗
沉香 木香 橘紅 肆兩

豬腰子 生於豬項上 珍珠 肆拾玖粒 砂鍋內炙
封口煅過絲壹枚 如棗大取肆拾玖
右為末每服壹錢臨臥冷酒調捻徐徐嚥下輕者三五服重者一料全愈修合用除日効忌鹹酸油膩濁氣等物
六癭者隨氣凝結皮膚之中忽然腫起狀如梅李皮軟而光漸如杯卵若發腫都軟不痛者血癭發腫日漸增長而不太熱時時牽痛者氣癭氣結微腫久而不消後亦成膿諸種癭疾資等至年衰皆自內潰治於壯年可無後憂按之推移得動者可用取法去之

如推之不動者不可取也瘤無大小不量可否而妄取之必妨人命俗云瘤者留也不可輕去不為無理

治法先以鐵鑷膏點瘤頂上令肉黑腐不痛方可以刀剪去黑腐又以藥塗令肉腐潰又可剪之又塗又剪瘤根去盡為度若怕針刀者却以井金散塗之令肉黑極十分腐爛方可用刀剪之刮之若稍有此肉不黑盡恐肉未死血亦未死血未死則不可剪刮恐血來多致有昏暈之失其肉十分黑極十分腐爛推得動者此肌肉死也肌死則血死其血死乃可剪刮無妨雖血瘤肉瘤取之亦無妨也小瘤取之自愈大瘤取之有半載肌肉麻痺也宜服養氣血藥久之自愈 薛 內經云肝統筋而藏血心裹血而主脉脾主肉而統血肺主氣而司腠理腎統骨而主水若怒動肝火血涸而筋攣者其自筋腫起按之如筋久而或有血縷名曰筋瘤用六味地黃丸四物山梔木瓜之類若勞役火動陰血沸騰外邪所搏而為腫者其自肌肉腫起久而有赤縷或皮俱赤名曰血瘤用四物茯苓遠志之類若鬱結傷脾肌肉消薄外邪所搏而為腫者其自肌肉腫起按之實軟名曰肉瘤用歸脾益氣二湯若勞傷肺氣腠理不密外邪所

搏而壅腫者其皮膚腫起按之浮軟名曰氣瘤用補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而為腫者其自骨腫起按之堅硬名曰骨瘤用地黃丸及補中益氣湯主之夫瘤者留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血乖違當求其屬而治其本大凡屬肝膽二經結核八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二地丹皮酒炒黑膽草山梔甘草氣虛者補中益氣兼服若治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒氣凝於瘡口榮氣不能滋養於患處以致久不生肌而成漏者悉調補脾胃則氣血壯而肌肉自生矣若不慎飲食起居及六淫七情或用寒涼蝕藥蛛絲纏芫花線等法以治其外則誤矣　長洲庠王天爵辛丑春左腿近環跳患之狀如大桃按之濡軟恪服除濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脈洪大而虛氣瘤也肺主之蓋膽屬木肺屬金然發於膽經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰矣遂用十全大補湯數劑出清白稀膿甚多頓加寒熱煩渴頭痛殊類傷寒狀余謂此因膿泄而血氣益虛耳仍用前湯其勢益甚脈洪數大按之如無乃加

附子壹錢其勢愈甚而脉復如前此虛甚而藥未能及也更加附子貳錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸症更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子壹錢服之諸症悉愈二旬不服肉病悉至患處復潰一年後又患服前藥不應診其尺脉微細如絲此屬命門火衰用八味丸為主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿一男子左腿外側近臀腫一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此膽經受證故發於腿外側診其脉左尺洪數右關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊一男子小腹患疝水淋漓此足三陰之症用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用薑蠶丸以清肝火而斂一老儒眉間患疔二年其狀如粟桃下墜蓋冒按之如水囊此肝脾之症膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿冒即開以炒黑膽草山梔苓歸芍藥柴胡白朮茯苓之類而愈

嘉善周上舍兩耳下項間筋攣臃腫堅硬咳嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚予

診之左關弦澁左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須
滋腎水生肝血慎調攝至氷旺之際庶可愈矣彼欲
速効乃外敷商陸石灰等藥內服海藻蓬朮之類至
秋金旺之際元氣愈虛其腫愈甚而歿　鎮江孫上
舍缺盆間癰如覆甌既堅硬色赤內熱晡熱自汗盜汗
就治於余曰賤疾皆以散堅行氣降火破血之劑欲
其內消而反甚其肌左尺洪數按之而弱左關洪數
按之而澁此怒氣傷肝血涸而筋攣也因其急於仕
進了辭不能治彼亦不信後果發此症若補脾肺滋
肝腎則木得水而敷華筋得血而滋潤多有得生者

張子和治新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人
令以臧吐之三涌三汗三下瘦已消半次服化瘦之
藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法
耳　又在西華衆人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽
之與戴人入肆中見一夫病一瘤正當目上綱內皆
色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾
不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取
此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割
別有一術其人從之乃引入一小室中令俛臥一床
以繩束其肢刺委中大出血先令以手探其目瘤上

亦刺出雀糞立平出尸壽之人驚戴人曰人之有枝可盡窺乎 鄂城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類雞距二類羊角腕不能釧向明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者爲膠瘤在面者爲粉瘤此膠瘤也以鈹鍼十字刺破挼出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

清上消瘿湯 治痰火氣血瘿結作核成瘤脉弦而滑在上部者

昆布 洗 玄明粉 陳皮

半夏 薑製 黃連

莪术 川芎 海藻 香附

青黛 白芥子 右薄荷煎服

解下除濕湯 治濕熱瘿結血氣凝滯作核成瘤在下部者

海藻 洗 黃蘗

香附 青皮

連翹 檳榔

右薄荷煎服

南星散 治皮膚頸項面上瘤大者如拳小者如栗 三稜 梔子 炒 木通

或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不救

生南星 大者壹枚

右細研爛入好醋伍柒點杵如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效

枯瘤膏 治六瘤瘰癧瘡痔漏如無此膏以鐵鑵膏代之更捷

草烏 肆兩　川烏 貳兩　乾桑耳　桑柴灰

桑柘木 各壹兩半　礦石灰 各壹碗　蕎麥稭灰

右將草烏川烏桑耳桑柘木共燒成灰和礦石灰桑柴灰蕎麥稭灰二處裝入酒漏內以棕塞其漏竅用冰二斗煎滾淋汁慢火熬濃以十碗取一碗為度以厚實磁器收貯密封固如用入礦石灰調勻為糊點瘤頂上以濕紙數重貼藥上如若未乾不須貼若留久藥乾以唾調塗直待十分黑腐以刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀後却以膏藥貼之去盡腐肉為度

井金散 治六瘤瘰癧大有神効

土黃 叁錢　硃砂 生晒乾　雄黃 各貳錢

輕粉　朱砂　乳香
沒藥 各壹錢　麝香　片腦 各少許

爲末以唾調爲稀糊塗瘤頂上唾濕紙兩重蓋之後用黃龍膏貼紙上間日一度上藥次添藥徹的周廻大如韭葉如此上之無復漸漸折之後根搖自然有裂豐隨後自下來若腐肉未去盡者挾針頭散於瘡口腐肉上貼膏藥一日一換直待腐肉去盡爲度

造土黃法

信石 生貳兩　硇砂 生貳錢　木鱉子肉　巴豆肉 各五錢

右以信硇研末以木鱉巴豆搗成膏入石腦油和作一塊油紙數重包裹埋於土坑內四十九日取出磁器收貯聽用如無石腦油亦可

黃龍膏　凉肌退腫

黃蘗　黃芩　大黃

右末蜜水調爲糊餅貼紙上

又枯瘤方

硇砂　硇砂　黃丹
雄黃　輕粉 各壹錢　硃砂

乳香　沒藥各一錢　蟾蜍生用叁拾箇

右研爲末糯米粥爲丸捏作棋子樣爆乾先灸破瘤頂三壯以藥餅蓋上用黃蜡末以水調貼之數日自然枯乾落下

一方以銅綠爲末草刺瘤破摻上以膏藥塗之

【世】黑瘤贅方神驗

桑柴灰　棗樹灰　黃荊灰

桐殼灰各貳升半

右以沸湯淋汁五碗許澄清入蟾蜍肆拾箇穿山甲伍片乳香腦子不拘多少約伍碗煎作貳碗用磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙傅瘤上乾以清水潤之其効如神

龍骨散　生肌肉

訶子肉　龍骨生

右末乾捻

療藥

南星　半夏

川椒　石灰各等

右六味各生爲末醋調塗瘤上用藥則不痛

止血藥

川烏　草烏各等分

京墨煅 百草霜各等
右為末捻之即以手按住
桃紅散 止血大効
石灰拾兩 麻油半盞
右將石灰炒紅入麻油大黃汁和勻慢火炒如桃
花色磁器收貯聽用

貼 諸癰惡氣 肩顒男左炎拾柒壯女右炎拾捌壯左拾柒壯
又法 天府拾柒壯 衝陽隨年壯
甲癰天窓作天容千金作天府及臑會主之 癰瘤氣舍主之

本事治果報面生贅瘤方用艾灸拾壯即用醋磨
硫黃塗紙上剪如螺螄掩子大貼所灸處更用膏藥
重貼一百一換候痒擠出膿如菜豆粉即愈硫黃羅
謙甫作雄黃

肘 肘音休俗呼雞眼子是也

手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生肘小者指痂疥取之所別也 肘後方手足生肘目鹽傅之舌舐之只三次瘥 初虞世方用雞胃中食指肘上指餘者以石壓之驗 鬼饅頭尖上捎破有白汁出頻拭之佳

[醉]肘屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以生肝血爲善若用蛛絲纏螳螂蝕著艾灸必多致誤大抵此症與血燥結核相同

故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗症　府庠朱宏仁年二十右手背近中指患五肢中一大者如黃豆餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益榮湯五十餘劑而愈　府庠沈姬文幼齒指甲及長不能自禁余曰此肝火血燥也又頸側常生小肢子屢散屢發又臂生一塊如棗豆大若觸碎如斷束縷拉之則長縱之則縮後兩鬢發白黜求治余曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪爲筋之餘膽行人身之側正與齒爪生肢等症相應須滋補腎水以生肝

膽則諸病自愈矣乃與六味地黃丸服之二年白黜自退肢亦不生　一男子臉患肢初如赤椹雜用敷貼之藥翻張如菌又用腐蝕煉大如瘤此足三陰經虛症悉具治以補脾肺生肝腎等劑而尋愈　一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應尤以爲血鼈服行氣逐血之劑後手背結一肢子漸長寸許形如鼈狀肢節間如豆大者甚多彼泥鼈生子發於外亦用行血虛證悉至左尺洪數關肌洪數弦余以爲腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸證悉愈

一男子因勞役過度面色青黑發熱咳嗽面生胝子腹內一塊攻上攻下作痛口乾小便祕澁服消尅之藥愈甚察其脉左右關俱弦洪元氣弱甚此肝脾受病而筋攣也投以加味逍遙散合地黃丸料元氣遂復若誤以爲血鼈之類消之必致不起　一男子素膏粱醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆如胝子如鼠乳大小不一用清熱消毒等藥半載之間腿內股亦然又用化痰之藥寒熱吐痰頸間俱作肝腎脉浮數按之而弱余以爲足三陰經血虛火熾法當滋化源彼不信別服四物黃檗知母之類諸症蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中益氣湯三十餘劑諸症漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五十餘劑諸症尋愈於是夕改用六味丸加五味子又半載諸症悉愈　一婦人左手背并次指患五六枚如熟椹肉熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸症自愈不信乃用艾灸手腫脹發熱手指皆攣兩脇項及胸乳間皆患胝經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃連數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯其患漸愈又百餘劑經行如期再用地黃丸三料而痊　一婦人

小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胸痞小便淋瀝或用行氣化痰等劑前證愈甚月經兩月餘而一行或以爲內有肉鼈啖飲其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一肬如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患數枚疑以鼈子行於外仍行驅逐兩耳下各患腫又疑爲瘡毒余曰此屬肝火血燥也用加味逍遙加味歸脾二藥兼服佐以六味丸三月餘而愈一婦人患之用蛛絲纏元花線螳螂啖毒藥蝕着艾灸大潰腫痛發熱出血余曰此陰血虛也不信仍服降火之藥而歿

世取瘕餅藥

糯米百粒　石灰拇指大　巴豆參粒去殼研

右爲末入磁瓶同窖三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

潔取靨

風化石灰壹兩　花碱半兩

右爲細末上三次如天色冷濕用

行石灰水調壹盞如稠粥揀好糯米全者半置次中半置灰外經宿次中米色變如氷精若入手面上有

黑靨子及紋刺者微微以針頭撥動置藥少許於其上經半日許靨汁自出則去藥不用且不得着氷二三日愈　又方用氷蛭一條雞子一枚開雞子小頭內氷蛭以皮兒蓋合封之直至氷蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

夫秋冬風寒燥烈人手足爲之皸瘃者血少肌膚虛故易傷也外潤以膏澤內服益氣和血之藥可也

東垣潤肌膏治手足皸瘃皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青 肆兩 白黃蠟 捌錢 乳香 貳錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鍋內隨手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿濾淨入水中折疊捉之以白爲度

油當旋旋入勿令軟了以瓷器内盛之或油紙裏
亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合
裂子藥亦炙上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之
自然合矣

東垣老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車
者皮膚皴裂甚痛兩手不能執轅足不能履地而
車上宿制此藥傳之即効明日遂行自後屢用屢
効故錄於此

初虞世治手足皴裂春夏不愈者

生薑汁　紅糟　白鹽

豬膏臘月者佳

右研爛炒熱擦入皴内二時雖痛少頃便皮軟皴
合再用即安

丹手足寒皴裂合椒三四合煮浸半食頃須臾再浸
又傳以羊豬髓腦甚妙梅師方

世治脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器内
熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰
入每用百沸湯泡洗皴裂令軟傳其上即安一方加
水粉

山脚裂爛蒸藕研成膏傳之

世用五倍子爲末同牛骨髓摸縫內卽好
又治脚指縫爛瘡搔鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性爲末濕則摻之 一方用生桐油塗之妙
黃蠟膏 治冬月手足坼裂
右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎熔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色爲度先以熱湯洗尽上烘乾卽用藥傅以紙貼之其痛立止入氷亦不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火炙動挑傅不妨 一方無五倍子

凍瘡

[子和]經曰寒瘡流水俗呼爲凍瘡或經年不愈者用野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上炙之不計壯數以泥乾爲度去乾餅子再換濕餅子炙不問多少直至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

[世]足跟紅腫凍瘡 足跟左足指面後跟赤白肉際骨下刺入叁分彈針出血

可灸參一
柒壯

足跟凍瘡潰破用蔥椒湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傳之効

禹錫取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出相半煎成膏塗凍瘡及拆破瘡

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

丹治凍瘡用煎熟桐油調蜜陀僧傅

山用五倍子煎湯洗

如神散 羅氏 治凍瘡皮爛痛不可忍用川大黃不拘多少爲細末新水調掃凍破瘡上痛止立効

于和戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸滯川散大下之遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

雉腦膏 治凍瘡久不瘥年年發歇先痒後痛然後腫破出黃水及血出不止

雄雉腦壹枚研爛 黃蠟各等分 清油減半

右同於慢火上熬成膏去滓入瓷器中盛每用塗瘡上

栢葉膏 治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

栢葉炙乾爲末肆兩 杏仁去皮研肆拾个 頭髮壹卷大

食鹽半兩研　乳香貳錢半研　黃蠟壹兩
油壹升

右先煎油沸次下前五味藥待髮盡再下黃蠟攪勻磁盒收先以熟小便洗瘡以綿挹乾後以藥塗即以軟帛裹勿令寒氣侵入每日二換如瘡漸差三四日一換

橄欖散　治脚凍瘡

右用橄欖核燒灰存性爲末入輕粉油調塗

一女年數歲嚴寒上京兩足受凍不仁用湯泡漬至春十指俱爛牽連末落予用托裏之劑助其陽氣自潰脫得保其生此因寒邪遏絶運氣不至又加熱湯泡漬故然而不痛也余嘗見人之被寒而出凍傷其耳二不知痛痒若以手觸之其耳即落當以煖處良久或熱手熨之無恙若以炊烘湯泡其耳即死至春必潰脫落矣北方寒氣損人若此可不察乎

漆瘡

聖濟總錄治漆瘡諸方

生柳葉三斤冬用皮煎湯適寒温洗之

苦硝五兩湯化浸洗之

豬膏一味熬去滓停冷塗貼之

生螃蟹一味取黄塗傅日三五次

荷葉燥者一斤煮汁洗之以貫衆末摻之乾則油和塗

鷄子黄塗瘡上乾則易之不過三五次

黄櫨木煎湯頻洗之

一方穀精草煎湯洗甚速効
又方用白礬煎湯浸洗之効
又方用杉木煎湯洗
又方用莽艸葉煎湯洗
又方用無名異末水調傅
又方用羊乳傅之愈亦治蜘蛛瘡飲之尤妙
治漆瘡東瘡犬咬瘡並用秫米齏爛塗傅
治漆瘡久不差用漆草搗爛傅患處立効

發痙

瘡瘍發痙因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其形牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔痙風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛痙寒能澁血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣　秋官張同野舊有流注因暴寒睡炕口目抽搐手足戰掉余以為氣血虛熟而然用參芪歸朮川芎山梔柴胡半夏天麻炙甘艸治之愈　吳瞻之

給事隆馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕或作
破傷風欲發汗驅風余曰此亡血火動也無風可驅
無汗可發當峻補其血用聖愈湯二劑頓愈又用健
脾胃養氣血而全愈 一儒者背瘡將愈發熱煩躁
自用降火之劑頂強口禁自汗惡寒此汗多內亡津
血筋無所榮也用補氣血之劑及地黃丸而愈 一
男子素勤苦早行遍身發瘩口禁目直胍弦緊此
勞傷氣血內熱外邪所搏也用補中益氣加山梔羌
活川芎而瘥半載後遍身作痒搔破成瘡發熱作渴
脉洪大而虛復以前湯加芍藥麥門熟地天麻而愈

一儒者善怒患瘭癘復因大怒跳躍忽仆地兩臂
拘攣唇口喎斜左目緊小此肝火血虛內熱生風用
八珍散加牡丹皮釣藤山梔而愈次年春前病復作
兼小便自遺左關脉弦洪而數余謂肝火血燥用六
味丸加釣藤五味麥門等歸治之漸愈又用補中益
氣加山梔釣藤牡丹皮而安 一癆婦因怒仆地瘡
口出血語言謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或
用驅風之劑六脉洪大肝脉尤甚此肝火熾盛也用
加味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈 一婦人患內
痔因勞出血甚多不時發痙飲食少思形體倦怠甚

面色白余謂此氣傷而不能統血也用補中益氣湯
久寒熱出血此陽氣虛寒也仍以前湯加炮薑四劑
寒熱漸止飲食漸進又四劑而血頓止後因勞役或
怒氣即便血或發瘧投以補中益氣湯加釣藤而愈

一婦人素性急善患偏身瘙痒或項間結核常服搜
風順氣之劑後大怒吐血唇口牽紧小便頻數或晴
自遺此怒動肝火而血妄行也用小柴胡湯加山梔
牡丹皮而愈 一癈婦因勞兼怒四肢攣屈頭痛自
汗小便短少畏見風寒脈浮弦緩此氣血虛而風寒
濕熱相搏也先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遥
散及八珍湯加牡丹皮而痊 一婦人素有肝火兩
拘間或腫痛或寒熱忽然昏憒瘛瘲抽搐善伸數欠
四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚而血液衰少也用
清燥九六味丸兼服瑞愈 一婦人因大勞患膲瘡
發疣瘡搔碎成瘡日晡熱甚或口禁發搐或頭目眩
暈此肝脾氣血虛而內熱以八珍散加柴胡山梔治
之諸症少愈復因怒前症復作經行不止此肝脾血
熱用加味逍遥散漸愈又用八珍散加柴胡山梔而
痊 一婦人發疣瘡日晡熱甚月經先期或頭目昏
眩或寒熱發熱或四肢抽搐此肝經風熱血燥用加

味逍遥散治之尋愈後因怒前證復作口噤遺尿此肝火血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更用加味逍遥散調理而安　一婦人患齲唇月經先期余以爲肝火血熱不信乃泥用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脉洪大面目赤色用八珍加五味山梔丹皮麥門數劑漸愈蕭用逍遥散六味丸料各三十餘劑全愈　一婦人經行過怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涌抽搐瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡加熟地黄山梔

子釣藤鉤而愈　一婦素陰虛患遍身搔痒誤服祛風之藥口噤抽搐肝脉洪數余曰肝血爲陰爲氣爲陽爲火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熟搐頻止又以八珍加黄芪麥門五味釣藤炙草調理而愈　一婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目瞤手揚足擲難以候脉視其面黄中見青此肝木乘脾土也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏茯苓而安

類破傷風

破傷風方論已載雜病第五此其似是而非者爾

[癖]大凡癱疽潰後筋脈拘急惡寒惕搐甚者舌強口噤項背反張痰逆壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症亦須以大補氣血爲本而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣　司徒邊華泉肩患癱潰而發熱目直或瞤殊類中風日晡熱甚脈益數此足三陰氣血虧損虛火妄動用參芪歸朮炙草加酒炒黑

黃蘗五味麥門肉桂四劑而愈又數劑而歛　陸文行背瘡內潰出膿二盆許用托裏之劑痛止腫消停藥忽寒熱作渴頭痛自汗此元氣虛而未能復也用十全大補加麥門五味肉桂二劑益甚診其脉如故此藥力未及仍用前藥加附子一錢三劑諸症悉愈乃去附子加肉桂數劑而歛　一儒者患腿癰深蓄於內肉色不變久不穿潰針出膿瘀五椀許惡症駢臻全類中風此脾胃虛而變症也用六君子加當歸炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯而愈　一儒者傷寒後患流注腫痛潮熱用十宣散

敗毒等劑出稀膿五六碗許發熱惡寒煩躁作渴殊類破傷風症而歿一男子背瘡未痊歛以膏藥剪孔貼之患破傷風症而歿此先失於內補外邪襲其虛耳余見此症貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷風禁歛藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致歿者多矣可不慎哉

水入瘡

皂子散　治水毒入瘡腫痛或刺入骨者

皂莢子 炙 粒　大乾蝦蟇 壹枚　胡椒 拾伍粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每用藥先以温漿水洗瘡口拭乾摻藥次以別膏藥貼之良久水盡出有刺者自見

鉛丹散　治被傷入水腫潰不愈

鉛丹　蛤粉 等分

右同炒令變色摻瘡口上水即出漸愈

去水膏　治癰疽破穴後誤入皂角水及諸毒水以

致疼痛及驢馬尿糞一切毒氷入瘡並治

糯米粉　砂糖各叁兩　甘艸生末壹分

右為膏攤在絹上貼毒水出效

馬汗入瘡

治馬汗入瘡毒氣攻腫痛方

右用馬鞭上手執處皮燒灰研細和豬膏塗瘡上一方以馬鞭稍燒灰豬脂和塗瘡上

治驢涎馬汗入瘡

右用乾冬瓜燒灰洗淨瘡口撦藥在內一方用冬瓜青皮陰乾為末傅之

瘍醫準繩　卷五　終