



門武 9
第 83
卷 19



保嬰全書卷十九

明太醫院院使薛己著

痘稠密

張潔古先生云一發稠密如針頭者形勢重也輕其表而涼其內連翹升麻湯主之然稠密之處各有經絡部分所屬額主心面主胃腹與四肢主脾脇主肝兩腋主肺下部主腎肩背主膀胱當隨見症治之若面色黃大便

黑煩躁喘渴或腹脹者瘀血在內也用犀角
地黄湯或挹龍丸生犀角汁但根窠分明肥
滿者無妨竊謂前症若屬心經用導赤散之
類胃經用犀角散之類肝經用柴胡湯之類
大凡稠密者熱毒熾盛也若密而不痛用東
垣消毒散若密而作痛用仙方活命飲若密
而小便不通用八正散若密而大便不通用
承氣湯若密而惡寒發熱用麻黃甘草湯

一小兒十三歲痘瘡稠密而痛脉洪數而有
力先君用仙方活命飲二劑先出者痛頓止
後出者隱於肉裏用東垣消毒散二劑隱者
悉消又用活命飲一劑脉靜身安而痊
一小兒出痘稠密身側尤甚焮赤呻吟飲乳
不徹先君謂肝膽之火助邪為患故身側尤
多乃乳母肝火傳變也用柴胡梔子散治其
母子飲數滴而靨

一 小兒痘瘡甚密身側尤甚貫膿不滿不紅活或云當歿於十二日余以為氣血虛弱用八珍湯加糯米百粒數劑至十五日而愈

一 小兒痘密而灰白色始末悉用補托之藥安後飲食過多嘔吐面青白唇目牽動先君以為慢脾風症之漸不信翌日手足時搐用五味異功散加木香乾薑而愈

一 小兒痘稠密色赤先君以為熱毒用東垣消毒散一劑初出者頓起後出者悉沒再劑如期而靨

一 小兒稠密色黑煩躁喜冷手足並熱先君謂火極似水令恣飲芹汁煩熱頓止先用犀角地黃湯次用地黃丸料服之而愈

一 小兒稠密出遲用四聖散而起發用參芪內托散而靨後發熱惡寒用八珍湯而愈

一 小兒痘密而痛用東垣救苦湯一劑痛頓

止用紫草木通湯而愈

一小兒痘密身痛如刺用活命飲一劑其痛即止又用犀角消毒散而愈

一小兒痘初出密痛用東垣救苦湯痛頓止又用四聖散而發用犀角消毒散而愈

麻黃甘草湯治表實痘毒熅盛稠密

麻黃

生甘草

右水煎服

柴胡梔子散

方見作痒抓破

甘桔防風湯

方見痘咳嗽

紫草甘草枳殼湯

方見痘喘

東垣消毒散

一名救苦湯方見痘身痛

紫草木通湯

方見小便不利

仙方活命飲

方見痘癰

六味地黄丸

方見痘瘡發熱屬陰陽

小柴胡湯

方見癰症

四聖散

方見痘腹脹氣促

柴胡清肝散

即柴胡梔子散
一方見痘潮熱

紫草散

方見頂陷心煩

抱龍丸

方見痘癩搖

犀角消毒散

方見痘疔

痘吐瀉

痘疹方云痘疹吐瀉蓋因脾胃不和飲食不
調煩渴嘔吐泄瀉並用白朮散然瘡疹皆賴

脾土脾土實則易出易靨萬物得土氣溫煖
而生吐瀉則傷脾土遂有更變之症夏月中
暑煩渴瀉或腹痛或欠筋用五苓散加藿香
傷食吐瀉用小異功散手足並冷者用益黃
散豆蔻丸頂陷灰白用木香散痘正出而吐
瀉者或見血者俱為逆症難治竊謂前症雖
因脾胃不和然邪實上焦則宜吐邪實下焦
則宜瀉如吐瀉噎腐吞酸皆宜宣發但微甚

不同耳張翼之二云若痘疹吐瀉少食為裡虛
陷伏倒靨灰白為表虛二者俱見為表裏俱
虛合用十二味異功散救之甚至薑附靈砂
亦可用若止裡虛去官桂止表虛減肉豆蔻
若能食便秘倒靨為裡實而補當用錢氏及
丹溪法下之皆為能食為裡實裡實而補則
結癰毒紅活綻凸為表實表實而補則潰爛
不結痂凡痘見癰便忌葛根湯恐發表虛也
如有更變當隨症治之

一小兒痘初出忽吐瀉飲乳不歇屬脾胃虛
弱用人參白朮散作大劑母子並服又用五
味異功散為末時以乳調服吐瀉止而靨
一小兒出痘作瀉手足並冷用十二味異功
散稍愈又用五味異功散加薑桂一劑而止
又去薑加木香一劑再用參芪四聖散而靨
一小兒痘瘡愈而作瀉不食此脾氣內虛先

用五味異功散而瀉止食進後又傷食吐瀉
發搐仍以五味異功散加天麻柴胡而愈
一小兒痘後作瀉腹中疼痛手足並冷此脾
氣虛也用五味異功散加乾薑一劑乃去薑
又數劑而痛止又用六君子湯加柴胡而瀉
止

益黃散治瘡疹因煩渴飲水過多而傷脾胃
吐瀉

丁香

訶子煨

青皮

陳皮

木香各等分

右為末每服一錢水煎

橘皮湯治嘔吐不止飲食不入

陳皮

生薑各一錢

人參五分

右水煎作三四次服之

生氣散治脾胃氣虛吐瀉肚腹膨脹飲食不
化或腹痛不止

丁香

甘草 各五分

白木

青皮

木香

人參 各七分

右水煎徐徐服

五苓散

方見小便不利

五味異功散

方見寒戰咬牙

對金飲治傷食吐瀉

方見不靨悶亂

豆蔻丸

方見泄瀉咬牙

十一味木香散

十二味異功散

二方見頂陷灰白

人參白朮散

方見發熱屬陰陽

參芪四聖散

方見腹脹氣促

六君子湯

方見不靨悶亂

自汗

痘疹方云初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而然也竊謂前症因邪在經絡自能發散使邪氣外泄若見此症不當用芪桂之屬以實腠

理且自汗則痘熱已輕升麻葛根之類在所
當禁恐發泄太甚則津液內耗陰隨陽散難
以收靨靨後最宜審治若血虛者用當歸補
血湯氣虛者用四君子加黃芪氣血不足者
十全大補湯若飲食自汗者異功散楊氏云
痘瘡一見紅點升麻葛根便不可用此語甚
是但此為表虛及無表症者而論若或邪在
表痘赤綻焮者又當用麻黃甘草湯汗之腫

焮作痛者用活命飲加麻黃散之蓋自汗盜
汗為病不同自汗者汗無時而自出也屬陽
虛盜汗者睡則汗出寤則汗收也屬陰虛汗
者血之所化陰氣不能閉藏所以睡則汗出
也痘家當以補血為主若當歸補血湯六味
地黃丸八珍湯人參養榮湯之類皆可因証
施治又有胃虛者宜用四君及浮麥散食積
內熱者宜用四君麴蘖未靨之際恐致氣血

虛而不能結痂既靨之後充防血脫陰虛陽無所附矣

一小兒痘將出自汗作渴發搐此心肝二經熱甚用柴胡麥門冬散而熱症退用紫草快癍湯痘悉見又用四聖散而結靨

一小兒痘出自汗發搐流涎此木火侮土先用五味異功散加釣藤鈎諸症頓減次以五味異功散加柴胡而安

一女子出痘色赤自汗發搐作嘔此肝火侮土先用五味異功散加柴胡釣藤鈎熱搐悉愈又用托裡散漿貫而愈

一小兒痘出自汗面赤作渴手足並熱大便乾黃此腸胃皆熱用瀉黃散末一服諸症頓退又用五味異功散加山梔麥門冬而痊
人參養榮湯治氣血俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉或久病虛損口乾欬而下痢

驚熱自汗盜汗

白芍藥炒一錢半 人參

陳皮

黃芪炒 桂心

當歸

白木炒 甘草炙各一錢

熟地黃自製七分

五味子杵炒七分 遠志五分

右每服二三錢薑棗水煎

麻黃甘草湯

麻黃 甘草等分

右每服一錢水煎

浮麥湯

浮麥不拘多少炒香

右每服三五錢水煎

當歸六黃湯治血氣不足虛火內動煩躁自

汗盜汗不止方見煩躁

痺塌

陳文宿先生云痘瘡痺塌若臟腑調和血氣

充實外常溫煖內無冷氣必無此症設服宣
利之藥所致宜用異功散治之丹溪云痘疹
痒塌者於形色脉上分之實則脉有力氣壯
虛則脉無力氣怯虛痒則實之更加涼血藥
實痒則大便秘結以涼藥下之竊謂前症若
色赤而兼痒者屬血虛有熱用四物牡丹皮
色白而兼痒者屬氣虛有熱用四君加芎歸
若發熱大便秘結者用犀角消毒散發熱大
便調和者用麥門冬飲寒戰渴瀉喘嗽聲啞
氣急先用十一味木香散如未應急用十二
味異功散外用敗草散敷之若寒戰咬牙煩
熱喘渴足冷灰白內陷腹脹渴瀉者皆不治
一小兒出痘六日痒塌寒戰錢密庵謂血氣
虛寒用十一味木香散二劑而漿貫用參芪
托裡散而靨脫後痕作痒用大補湯而痊
一小兒第七日痒塌少食手足俱冷發熱惡

寒先君謂陽氣虛寒用十二味異功散一劑而痒止又用托裡散加肉桂四劑而漿貫用十全大補湯而結靨後痕赤作痒此血氣虛熱用八珍湯二十餘劑而愈

一婦人出痘熱數日而發見用紫草快癩湯雖紅活而痒塌詢其素勤勞元氣頗不充實用八珍湯煩熱漸止又用托裡散而靨

一小兒十六歲第九日痘塌口乾發痒手冷

腹脹先君謂脾胃血氣虛弱用五味異功散加歸芪薑桂四劑痒漸止又用十全大補湯六劑漿貫用八珍湯數劑而靨後遍身不時作痒或痘痕色赤用補中益氣湯而痊

一小兒痘漿不滿面赤作痒余謂血氣虛而有熱欲與溫補不信服清熱之藥至十三日瘡痕色赤煩渴腹脹不食手足逆冷而歿

五味異功散治痘瘡脾胃氣虛痒塌

方見寒熱咬牙

紫草快癩湯

方見頂陷心煩

四物湯

方見痘瘡出遲

四君子湯

即六君子湯出陳皮半夏方見不靨悶亂

托裡散

犀角消毒散

二方見痘癰

十全大補湯

方見腹脹

八珍湯

十一味木香散

十二味異功散

三方見頂陷灰白

倒靨

丹溪先生云痘瘡倒陷因真氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參紫草酒製治之若將成就之際却淡色者屬血虛用當歸川芎之類或加紅花紫草屬熱毒者用升麻苓連梗翹之類甚者用犀角屑大解痘毒竊謂前症若熱毒方出忽被風寒閉塞肌竅血脉不行

身體作痛或四肢微厥癍點不長或變青紫
黑色者此為倒靨若胃氣虛弱不能補接榮
衛出而復沒者謂之陷伏誤用解毒之藥必
致陷塌若喜熱飲食手足並冷者乃脾胃虧
損陽氣虛寒之症宜用辛熱之劑補之喜冷
飲食手足並熱乃陽氣實熱之症宜用苦寒
之劑瀉之外感風寒者溫散之毒入腹者分
利之陽氣虛者溫補之外寒觸犯者薰解之
州先生用十二味異功散以預保脾土
未敗之先實發前人之未發開萬世之朦
瞶也

一小兒痘將愈忽黑陷余謂氣血虛用紫草
散加人參當歸又用參芪托裡散而愈
一小兒將愈而倒靨咬牙寒戰手足並冷飲
沸湯而不知熱用十二味異功散一劑諸症
頓退却用五味異功散倍用參朮數劑而愈

一小兒痘飲食多而作吐服枳朮丸色黑將
陷用五味異功散加乾薑二劑貫漿而靨
一男子發熱昏憤數日發紅點用快癍湯托
裡散貫漿將靨忽發熱惡寒瘡黑倒靨手足
並冷口渴飲湯此陽氣虛寒也用獨參湯四
劑諸症漸愈而靨

一小兒兼嘔手足並冷余謂脾氣虛寒欲用
十二味異功散不信另用雜藥而歿

成都方士禹太和治痘瘡黑陷垂死者用壁
間喜蛛如黃豆大者一枚搗爛一歲兒用雄
黃一分二歲二分十歲者用一錢入蜘蛛內
研勻用好燒酒調服愚意此即木香散異功
散之類也若因陽氣虛寒不能榮運週身以
致四肢逆冷腹脹唇青黑陷者宜用燒酒若
因元氣虛弱色白隱於肌膚而不能起發者
宜用陳酒亦不可拘泥於燒酒也若小兒未

及週歲或兒大者宜酌量與之不可拘於杯
許也又有一等症氣血俱虛者或色淡紅不
光澤不起發或驚悸咬牙者加紫葺紅花以
用之

七味白朮散

方見發熱屬陰陽

十一味木香散

十二味異功散

二方見痘灰白色

癰爛

聞人氏云痘癰爛之症因當發散而不發散
則毒氣閉塞以致喘促悶亂不當發散而誤
發散則毒隨陽氣暴出於外遍身皮膚潰爛
治宜調脾胃進飲食大便調和榮衛健旺毒
氣自解而無目赤咽痛口瘡吐衄等症竊謂
前症若發表過甚大便自利急用理中丸豆
蔻丸以救其裡亦有痘疹如蚊所嚙而色黑
乃危症也若大小便秘結煩躁用山梔子湯

猥猪尾血調腦子治之自利不食者不可用
蓋毒發於表而妄汗之則腠理開泄榮衛益
虛轉增瘡爛由是風邪乘虛變症者有之若
毒根於裡而妄下之則內氣愈虛毒不能出
而反入焉由是土不勝水變黑歸腎身體振
寒兩耳尻冷眼合肚脹其瘡黑陷十無一生
治者審之

一小兒患此發熱作渴手足並冷此脾經熱
者先用瀉黃散五分又用七味白朮散而愈
一小兒患此但心寒發熱體倦頭痛人迎脉
大於寸口二三倍此風邪外傷用補中益氣
湯加川芎蔓荊子愈而自靨

一小兒患此口舌生瘡手足並冷余謂此中
氣虛而內熱耳用五味異功散議論不一猶
豫未服翌日腹痛口噤余用前藥更加乾薑
一劑諸症稍緩再劑而愈

一 小兒患此或痒或痛發熱口渴先用白朮散次用補中湯而愈後因作課勞心發熱頭痛痘痕赤用補中湯加蔓荊子及八珍湯而愈

一 小兒患此作痛喜飲熱湯發熱惡寒手足並冷余謂此中氣虛而外假熱也用補中湯加參芪各三錢四劑而愈

一 小兒患之多在兩脇時發寒熱此肝經之症用加味逍遙散而寒熱退又二劑而脇痛止及立効散而痊

一 小兒患之作渴發熱額間為甚此心經有熱先用導赤散母服漸愈又用柴胡梔子散傳三黃散而痊

一 小兒患之發熱作渴面目多白尺脉數而無力此稟足三陰虛也用地黃丸補中湯尋愈畢姻後患瘵症服黃栢知母等藥幾危余

仍用前藥而痊

一小兒患此體倦惡寒此脾胃氣虛也用補中益氣湯數劑而愈後因飲食停滯發熱而痘痕復赤先用參朮陳皮神麩山查消食仍用補中益氣湯調補脾胃而愈若誤用敗毒之劑決不起矣

一小兒痘愈後因勞痘痕作痒搔破膿水淋漓面色皎白脉浮大按之如無余用補中益氣湯漸愈或云先攻其邪而後補之乃用清風散變痘汗出口噤而死惜哉

山梔子湯治痘疹及癩毒狀如蚊蚤嚙毒盛黑色者

梔子仁一兩

白蘚皮

赤芍藥

升麻各一兩

寒水石

甘草炙各五錢

右為末每服一錢水八分入紫草

黃散治疔熱生瘡膿水浸淫膿流處便濕

爛

松香

五倍子

黃連

黃丹

海蝶蛸各一錢

輕粉

雄黃

右為末用瑩肌散煎洗滲之乾者香油傳

豆蔻丸 方見泄瀉咬牙

五味異功散

補中益氣湯 二方見寒戰咬牙

柴胡梔子散 即柴胡清肝散

加味逍遙散 方見欲齧不齧

地黃丸 即六味地黃丸

七味白朮散 二方見發熱屬陰陽

瀉黃散 方見齧後發咽痛

導赤散

立効散 二方見風邪搏於肌膚

痘癩搗

錢氏云痘疹癩搐由內相勝也惟心癩脾疹
能作搐蓋疹為脾所主脾虛而不勝土風熱
相搏而動於心神心喜熱神氣不安因搐成
癩癩為心所生心主熱熱生風風屬於肝二
臟相搏風火相爭故發搐當瀉心肝若涼經
用涼驚丸溫經用粉紅丸海截云諸痛痒瘡
瘍皆屬心火無論虛實皆從心火上說脾虛
則肝氣乘之與心火相合耳若脾土實心火

旺而逆乘以致癩者此實邪也

丸便軟者瀉心湯潔古云未出

外感風邪之寒內發心火之熱所

解毒丸犀角地黄丸主之世傳云瘡疹欲出
身熱煩躁忽發驚搐宜用驅風膏小如聖飲
小便不通八正散痰涎壅盛利驚丸抱龍丸
丹溪云欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚
風宜用發散之藥竊謂前症痘疹未見而先



發搐者乃毒氣自心經出也若病勢輕緩或形氣虛弱者不宜用峻厲之劑恐元氣內損則毒氣內陷而瘡不能起發也或外感風寒之邪內因瘡疹之熱而相搏或肝血虛火動而内生風當補元氣為主佐以見症之劑然前方多峻厲之劑審有是症方可用須察其色赤白而以脾胃為主虛則用溫補實則用解毒若先發搐而後發瘡多有生意瘡凡火而發搐或吐瀉者難治

一小兒痘痂脫盡因其穢氣用葱椒煎湯浴之發搐痰喘用八珍加白殭蠶蟬蛻一劑痰喘頓止又用四君芎歸鈞藤鈞而搐止

一小兒痘瘡色赤四肢發搐眉唇牽動此心肝二經熱甚乘脾所致也用四君防風鈞藤鈞而痊

一小兒痘後四肢發搐眉稜尤動小便頻數

臉目青赤此肝經風熱用四物柴胡山梔少
愈但四肢倦怠飲食少思大便不實此脾氣
受傷而未復也用四君升麻當歸而痊

一小兒痘後寅卯申酉時熱甚或兼搐余謂
寅卯時發熱此肝火本症申酉時發搐乃肝
木侮金先以四物白朮茯苓釣藤鈎煎送柴
胡二連丸而愈夕用地黃丸朝用四君山梔
柴胡及四君子加當歸而痊

一小兒痘瘡色赤發搐痰盛服抱龍丸而頓
愈又因母大怒兒仍搐母服柴胡梔子散加
味道遙散母子並愈

一小兒痘愈後發搐左額青赤唇口牽動余
謂肝心二經風熱所致先用柴胡梔子散加
釣藤鈎後用味道遙散而搐止再用五味
異功散而痘愈

一小兒痘將愈發搐痰湧頭目不清脾氣虛

弱肝木侮之先用五味異功散加柴胡鈞藤
鈞搗愈而靨

柴胡二連丸治肝經實火

柴胡

宣黃連

胡黃連

各末糊丸桐子大每服二三十丸白湯下

補中益氣湯

二方見寒戰咬牙

六君子湯

方見不靨悶亂

四神丸

方見泄瀉咬牙

十一味木香散

方見頭暈眼花

痘風

丹溪先生曰痘風分氣血虛實虛則黃芪生
血之劑主之佐以風藥實則白芍黃芩為君
連翹白芷續斷之類為佐竊謂前症更當分
痘瘡已出未出已靨未靨外邪所傷內虛火
動若未出而搗搗熱毒內蘊也紫草快癍湯
加鈞藤鈞已出紅綻而搗搗熱毒作痛也東

垣消毒散加釣藤鈎貫膿而搐搦血氣虛也
參芪四聖散加釣藤鈎若靨後而搐搦血氣
尤虛也八珍湯加釣藤鈎或目暈或直視者
風火相搏也柴胡梔子散或六味地黄丸加
柴胡山梔或口角流涎者木乘土也五味異
功散加升麻柴胡釣藤鈎或目赤眵淚者肝
血虛而生風也四物湯加柴胡釣藤鈎或角
弓反張者水不生木也六味地黄丸加柴胡
當歸隨用補中益氣湯加天麻釣藤鈎不可
直用治風之藥蓋風藥能燥血散氣必驗其
手足冷熱溫和三症而用補瀉調理之法庶
無誤矣如嬰兒當審乳母而治之
一小兒痘瘡將愈發搐服牛黃清心丸更口
噤流涎此脾胃復傷肝木所侮而涎不能歸
經耳先用五味異功散加釣藤鈎諸症頓減
次以五味異功散加柴胡而安

一婦人出痘因怒發搐痘痕赤色發躁作渴
面目皆赤此汗多亡陽血脫而然也先用當
歸補血湯二劑躁渴頓止又用八珍柴胡牡
丹皮鈞藤鈎熱搐悉愈又用八珍湯而痊
一婦人痘瘡將愈因怒發搐口噤頭痛如裂
痘痕皎白用補中益氣湯加蔓荊子鈞藤鈎
頓愈又因怒發搐頭暈不食先用補中益氣
湯加天麻又六君柴胡而安

當歸補血湯治痘瘡血氣虧損發搐熱渴喜

飲脉洪大而虛重按如無者

方見寒戰交于

抱龍丸治痘瘡風熱發搐或痰甚者

膽星四兩

天竺黃一兩

雄黃

硃砂各五錢

麝香少許

右為細末用甘草一觔煎膏為丸每一兩
作二十九丸用薄荷或燈心湯化下

按前方肝經清熱豁痰利氣祛風之藥過

劑則脾肺復傷而反甚或更加胸腹作脹
食少作嘔者宜用人參白朮散倍補中氣
造牛膽南星法蜡月南星中大者為末用黃
牛膽汁拌勻仍入膽殼內以線扎口懸掛
當風處陰乾隔年方可用重製二三次者
尤妙

小柴胡湯

方見癰症

柴胡二連丸

方見前

六味地黃丸

方見發熱屬陰陽

四物湯

方見痘瘡出遲

十全大補湯

方見腹脹氣促

痘潮熱

張潔古先生云痘疹未有不因潮熱而出者
觀其熱之時知自何臟發出寅卯辰時屬肝
出水泡巳午未時屬心出癰瘡申酉戌時屬
肺為膿泡亥子丑時屬脾出疹子惟腎獨居

腑下不受穢濁故無症耳竊謂前症當察其
虛實若壯熱飲水便秘屬實熱也少用清涼
飲下之發熱飲冷大便不秘屬虛熱也宜人
參白朮散補之若下而發熱愈甚此陰虛而
陽無所附也用四物參芪之類補之若下而
潮熱面赤者血氣發躁也用當歸補血湯補
之若見驚搐等症乃肝虛而內生風也用四
物天麻釣藤鈎補之用發散之劑而熱愈甚

此表虛而外熱也用四君當歸黃芪補之

一小兒先潮熱午前甚面青痘赤出而熱不
止或時發搐手足不熱不冷此陽明胃經症
為肝木所侮先用補中益氣湯加釣藤鈎四
劑而熱止痘色紅活乃去釣藤鈎又四劑而
胃漿用八珍湯而痊

一小兒痘紅活寅卯時潮熱作渴此肝經風
熱症用柴胡梔子散末三服熱止漿貫又用

八珍湯山梔丹皮而靨

一小兒靨後潮熱手足微冷余謂胃氣虛弱用五味異功散佐以補中益氣湯而愈因飲食過度前症復作更腹脹大便不實小腹重墜此脾虛也用補中益氣湯而痊

一小兒痘後不時寒熱噫氣飲食吞酸服二陳枳實黃連更寒熱如瘧腹墜下氣此中氣復傷而下陷也朝用補中益氣湯夕用五味

異功散各加乾薑木香而愈

一儒者先潮熱出痘面青脇痛此肝經之症用四君柴胡當歸山梔二劑脇痛稍緩又佐以加味道遙散而痛止却用托裡散漿貫而靨後又潮熱用地黃丸而愈

一婦人患此誤服寒涼之劑煩躁作渴飲沸湯而不知熱脈洪數按之微細此血氣俱虛用大劑十全大補湯加薑桂四劑更惡寒咬

牙此虛極而藥力未能及也於前藥內更加
附子一片二劑諸症頓退乃去附子又二劑
將安去薑桂常服而痊

一小兒痘愈後潮熱飲食少思面色痿黃久
治不愈熱後面與手足如冰余謂脾氣虛寒
當用六君薑桂不信而死手足皆黑惜哉

柴胡梔子散治痘瘡肝經有熱寅卯時發熱
或寒熱往來或發熱驚搐或咬牙不止四

肢勁強

方見膿水淋漓

加味道遙散

即味道遙散加牡丹皮山梔

治因乳母肝脾血

虛發熱致兒發潮熱瘡不能愈者

方見欲靨不靨

人參白朮散

六味地黃丸

二方見發熱屬陰陽

八珍湯

方見頂陷灰白

清涼飲

方見大便不通

托裡散

方見痘癰

十全大補湯

方見腹脹氣促

四君子湯

方見不醫問

當歸補血湯

補中益氣湯

五味異功散

三方見寒戰咬牙

四物湯

方見痘出遲

痘吐逆

傳方云痘瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳

或橘皮湯半夏湯不止加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異功散吐而身熱煩渴腹滿氣促大小便澀而赤者當利小便竊謂前症若手足並冷渴飲熱湯或腹作痛中氣虛寒也宜用益黃散手足不冷吐逆痰涎中氣虛弱也宜用橘皮半夏湯手足並熱熱毒壅滯也宜用導赤散口乾飲乳不徹胃經氣熱也宜用竹茹湯吐逆不乳或吐

乳酸穢此脾氣虛而乳食停滯也宜用枳木
丸

一小兒痘不紅活手足微冷此陽氣虛弱也
先君用五味異功散加乾薑肉桂二劑乃去
薑桂加木香又二劑而愈

一小兒十一歲出痘第九日吐逆不食手足
並冷此陽氣虛寒之極也用十二味異功散
一劑頓愈用五味異功散而安用參芪四聖

散而屬

一小兒吐逆作渴手指並熱此胃經有熱也
用竹茹湯而熱稍止用人參胃愛湯而吐亦
止用化毒湯而貫膿四聖散而結屬

一小兒吐逆作瀉腹脹煩渴痘出不快手指
微冷用七味白朮散而諸症退用四聖散而
諸痘出用人參蟬蛻散而諸痘屬

一小兒吐逆腹脹發熱作渴大便乾臭此因

腸胃實熱用竹茹湯加黃連枳殼諸症稍退
用紫草快癩湯瘡勢頓發如期而靨
一小兒痘出甚密嘔逆飲冷手足並熱此胃
經熱甚先用葛根麥門冬散一劑熱症頓退
又用瀉黃散末一錢用米飲調服而安用白
朮散而痊

人參胃愛散治痘瘡已發未發吐瀉不止不
思飲食或吐逆等症

人參

藿香

紫蘇

甘草

炒

丁香

茯苓

木瓜

各等分

糯米

右每服三錢薑棗水煎

葛根麥門冬散治熱毒癩瘡頭疼壯熱心神

煩悶亂吐逆者

方見頂陷心煩

按此陽明胃經之藥也外除表邪內清胃
火兼補元氣若非發熱作渴表裏俱實者

不可用若表裏俱虛而發熱作渴宜用人參麥門冬散

七味竹茹湯

橘紅

半夏各等分

白茯苓二分

甘草

竹茹

黃連薑炒

葛根各二分

右薑水煎服

人參蟬蛻散治小便不利痘瘡不發煩躁作

渴咬牙喘滿

人參

蟬蛻

白芍藥

木通

赤茯苓

甘草

紫草茸

右每服三四錢水煎

橘皮半夏湯

橘皮

半夏等分

右每服三錢薑棗水煎

化癍湯 方見水痘麻痘

紫草快癍湯 方見痘陷心煩

六君子湯 方見痘腹脹

導赤散 方見風邪搏於肌肉

十一味木香散

十二味異功散 二方見痘灰白色

六味地黃丸

七味白朮散 二方見發熱屬陰陽

四聖散 方見涕唾稠粘

五味異功散 方見寒戰咬牙

咳嗽

痘疹方云痘瘡未出之先咳嗽升麻湯頭疼

身熱惡寒咳嗽參蘇飲嘔吐痰涎白朮湯時

氣頭疼咳嗽或屬後餘毒咳嗽惺惺散瘡不

起發升麻湯感寒頭痛亂咳嗽木香散發

熱嗽甚別無他症生地黃散風熱咳嗽五味

字湯咽喉不利甘桔防風湯竊謂痘疹未出
欲出之際乃熱毒上薰清道肺氣不寧宜用
惺惺散若已出之後則屬元氣虛弱不能固
衛腠理風邪乘虛而襲宜用五味異功散加
桔梗五味子以補脾肺

一男子咳嗽噴嚏頰赤目胞皆赤遍身赤
瘤余謂此心臟痘疹彼疑感而求用藥旬餘
皆紅活起發余謂既紅活起發不必服藥至

十七日大便下血膿瘡痂而痊

一小兒痘赤壯熱咳嗽痰甚煩熱作渴用人
參清膈散一劑諸症頓退日用芹菜汁旬餘
而靨

一小兒痘漸愈咳嗽肺脉大而無力用參蘇
飲咳嗽漸愈因母飲酒又復咳用五味異功
散加桑白皮杏仁山梔母子並服而愈

一小兒痘瘡十二日患咳嗽唾痰胸中隱痛

肺脉數滑余曰此兼患肺癰也當用桔梗湯不信翌日果吐膿血用桔梗湯而愈

一小兒十四歲痘愈後咳嗽脉數而無力朝用補中益氣湯夕用六味丸料各數劑漸愈

畢姻後咳嗽發熱仍用前藥及八珍等藥而痊

一小兒痘將愈咳嗽面色黃白嗽甚則赤用五味異功散調補而愈

生地黄散治小兒斑疹身熱口乾咳嗽心煩等症

生地黄兩半 麥門冬去心七分 杏仁

款冬花 陳皮各三錢 甘草炙二錢半

右每三五錢水煎徐徐服兒大加之若痰氣痘熱內作宜用桔梗甘草防風湯若痰上壅者佐以抱龍丸

桔梗湯治久嗽肺氣傷而吐痰有血痰或腥

穢或咳吐膿血肺癰等症

桔梗炒

貝母去心

知母

桑白皮

枳殼各一錢

地骨皮

瓜蒌仁

薏苡仁

杏仁各五分

當歸

黃芪微炒各一錢

五味子

百合

炒各一分防已一錢

葶藶炒五分

右每服三五錢水煎服

甘桔防風湯治痘症餘毒瘡毒咽痛

桔梗

甘草

防風

右水煎服

六味地黄丸

七味白朮散

二方見發熱屬陰陽

五味異功散

補中益氣湯

當歸補血湯

三方見寒戰咬牙

十六味清膈散

即人參清膈散方見頂陷心煩

惺惺散

方見癩症

五味子湯

即小柴胡湯加五味子

參蘇飲

方見涕唾稠粘

喘症

痘疹方云若痘瘡已出未靨之間喘渴白木散甚者木香散收靨後腹脹喘渴大便利小便澀葶藶木香散喘嗽五味子湯喘渴靨後餘毒不除大便堅實前胡枳殼散頭疼身熱

惡寒微喘是有表邪也用參蘇飲竊謂前症若因脾肺虛弱宜用白朮散脾肺虛寒宜用木香散熱毒內蘊紫草甘草枳殼湯風邪外感用參蘇飲內外壅滯人參清膈散大便自利小便澀滯葶藶木香散大便堅實前胡枳殼散

一小兒痰喘痘赤作痛熱渴喜飲冷水大便不利此胃經實熱先用前胡枳殼散諸症漸

退又用犀角地黄湯而靨

一小兒面赤有痰口乾作渴右寸口脉洪數
此心火刑肺金用人參平肺散一劑又用地
黃丸料四劑而痊

一小兒痘赤而痛喘嗽作渴脉洪數左尺右
寸為甚此腎火上炎乘肺為患用地黃丸料
煎與恣飲如期而靨

一小兒十四歲痘方愈而喘促咳嗽余謂脾
肺氣虛用五味子湯而愈後停食發熱喘嗽
用五味異功散而安用補中益氣湯而痊

一男子出痘愈而喘嗽面赤服參蘇飲面色
痘痕皆白此脾肺氣虛而復傷也用補中益
氣五味異功散而痊

一小兒喘渴面白手足時冷此脾肺氣虛用
人參白朮散五味異功散而愈

一小兒痘將愈喘渴腹脹大便不結小便澀

此脾肺氣虛而然也先用葶藶本香散又用人參白朮散而愈

一小兒痘出氣喘大便秘結手足並熱作渴飲冷用前胡枳殼散而安但飲食少面白此邪氣去而真氣虛也用補中益氣湯五味異功散而愈

一小兒十四歲痘方愈而喘手足不熱余謂脾肺氣虛用補中益氣湯而愈後停食發熱手足不冷余謂脾胃虛熱而喘嗽用五味異功散二劑而熱退又用補中益氣湯而愈

一小兒痘瘡狂喘躁熱作渴飲冷痰涎不利先君謂熱毒壅滯用人參清膈散犀角地黃湯各一劑頓愈又用當歸補血湯而愈

一男子痘愈而喘嗽面赤眼發表之劑喘嗽益甚面色痘痕皆白手足並冷余謂脾肺之氣復傷而虛寒也用補中益氣湯加乾薑一

劑元氣漸復却佐以八珍湯而痊

一男子痘愈而患喘發熱惡寒余用十全大補湯不信反服清熱之劑汗出如雨身熱如炙面月痘痕如赭赤余曰汗多亡陽而虛熱也不信後果歿

六味涼血消毒散

犀角如無用升麻 牡丹皮

當歸

生地黄 赤芍藥 生甘草等分

右每服三五錢水煎

紫草甘草枳殼湯

紫草 甘草 枳殼各等分

右每服一二錢水煎

五味子湯

參蘇飲

前胡枳殼散 三方見涕唾稠粘

六味地黄丸

人參白朮散

一名七味白朮散
二方見發熱屬陰陽

聖濟犀角地黃湯

人參清膈散

即十一味清膈散
方見頂陷心煩

十一味木香散

方見痘灰白色

葶藶木香散

方見腹脹氣促

藜草

甘草

味藜

各等

藜草甘草味藜散

本喜眼三五錢水煎

