



武門
93
卷1

官

許

明治六年新刷

醫方啓蒙

醫卜堂聚珍版



醫方啓蒙序



大矣哉 皇國之取於人以為善也
建洋醫延洋師文武諸省之法莫
不一亦參諸西教而如我方技因得
以沐其餘澤纏綿郭索之文日新
窮理之術戶譚家誦渙然冰釋四

醫方啓蒙序

布於海內可謂斯民之洪福矣夫醫之
為道專就人身以窮理順理以施治至
公無我應變至窮無歎於已而有濟
於人故謂之仁術然則何擇萃夷辨
古今喋々乎爭門戶之為也香城喜
多村先生學博行脩每穿鑿拘泥之

弊脫黨同伐異之習著書等身闡
聖言之微發至理之蘊扶世翼教者
有年於茲今又為童蒙著書若
千卷名曰醫方啟蒙微序於余々
受而讀之其所論皆足以通華夷
之旨折今古之衷而其要以濟世利

民為歸庶幾不悖于國家
制令之意為讀者勿以并覽視
之可也是為序

明治六年一月栗園淺田惟常拜撰
於東京牛門町課藥室



醫方啟蒙序

凡事有古未明而後人發之者譬如
日食有定數秦漢以前不能詳之及
至後世推步精詣上下數千年可坐
致焉如脚氣痘瘡微毒等古昔不詳
其治法而後人皆能闡發秘蘊濟生
不少蓋事物之變日新無窮而所以

待之者，亦何有定方，而亦醫言漢者，
詆洋為荒唐不經，言洋者譏漢為迂
濶不適用，所謂楚則失齊，亦未為得
也。嗚呼！醫者衛生之任，一撮之石，半
匕之草，既有裨於生命，固不擇內外，
况漢洋乎？香城喜多村先生，我曹之
老國手也，嘗於醫經經方有所撰著，

而頃又著一書，命曰醫方啟蒙，乃取
古書之所未備，與己之新得者，各摘
其要而折之於中，以授子弟輩，不敢
偏於漢，亦不敢黨於洋，其意謂尺有
所短，寸有所長，苟裨益於我道，奚分
彼此，是與世之言醫者異矣。先生學
術精良，忝所共知，而胸有成竹，目無

全牛予與先生相知久矣迨是書竣
功聚珍刷印使予題其首予謂是書
布於世則生民之受賜蓋有不可量
者焉不得不拋擲百事而應其請弗
敢以不文辭也

紀元二千五百三十三年第五月識
於日本橋南邁種德舍今村亮



醫方啓蒙序

喜多邨栲翁一日携書一編來謁余曰是
我近日所草聊爲黃小計耳非敢示大方
也然相知之久請予爲予序之余受而繙
之其病論治方粲然臚列而綴以國字令
人易讀洵爲刀圭家之祕笈也當今醫家
漢洋互競言漢者曰洋家支離狡獪其言
雖巧而無裨於治術談洋者曰漢醫陳腐
之論徒爲芻狗執拗不已何以活人余平
心夷致之如中風一證漢以爲虛邪賊風
所致洋則謂腦靈性之病瘧疾爲夏傷暑

醫方類聚卷一
一
所得洋則謂腐草敗禾之氣觸人爲孽婦人帶下則爲子宮敗濁小兒變蒸則爲生牙之候凡此等類漢人所未嘗言而明核精微微之今日確有應驗然而如傷寒時疾脾氣治法漢是而洋非者亦不復數矣醫若不詳方士何以言治此我醫經所以有異方法宜之論也抑本邦之爲域環海而立焉寒暖得中五穀豐饒魚鮮般富不假牛羹狗臠之力而其人聰明伶俐是以彼論說精妙者我取而用之器械巧緻者我做而製之言語乃有舌人譯司文字乃

有漢文翻譯宴然坐而受其賜顧不亦善哉又何嗷々自用之爲矣今視此編不黨於漢不阿於洋卓然自爲一家翁又嘗於醫經經方既有撰著皆纂其精粹而自稱不能讀洋書概取之漢文翻譯則未必無千慮之失洋學大家或諭而告之翁海涵之量必喜而納之然則此書雖老醫國手亦宜置一本於几案上而可也豈特啓蒙之云哉余辱翁知殆三十年平生稱其學術之良用心之公讀此編而後益服其採擇之精而切當日用也敢忘固陋弁蕪詞

于卷首云

明治六年五月廿日

小田縣隱醫森立之



醫方啓蒙序

己巳冬月予僑居下毛鹿鳴堂中主人溫厚長者延予教督孫兒雖刀圭不暇饗待甚厚家又富典籍予課業之餘閑居無營因抽繹架藏之醫書兼縷述平素之所得國字綴文聊備診候處療之用題曰醫方啓蒙嗚序疾疢洪繁不可端倪醫方千卷未盡其理况此瓊々冊子何足以示人雖然童蒙學醫或省疾問病而時寓目此編庶幾可以知其證候方治之端緒也初學輩以此爲階爲榜而更升堂入室則圓機

醫方類聚
之妙自存乎其人焉耳若夫大方君子何
取于此矣鹿鳴堂在都賀郡關根井村土
人姓手塚氏名玄僊累世醫師今年越古
稀而勉勵不怠精志診處起死肉骨豈啻
千百近里蒙其惠者尤夥人稱爲老國手
云
明治二年仲冬下浣香城老人喜多村直
寬誌

凡例

一此書ハ予カ少壯ノ時ヨリ年來經驗
シタル治療ノ方法論說ヲ録メ予弟
輩ニ示スモノナリ故ニ病論症候モ
簡約ナルヲノミヲ舉テ今日ニ的切
ナラサルハ皆省テ記セス其治方モ
亦然リト爲ス觀者幸ニ疎漏ヲ嘗ル
ヲ勿レ
一古來方書ノ病門自ラ一定ノ次序ア
ルニ似タリ今ハ惟其病ノ世ニ普ク
有テ證候多端ナルモノヲ首ニ載テ

編ト爲ス必古人ノ成例ニ拘ラサルナリ

一 近日西洋ノ醫方盛ニ世ニ行ル予ハ横行ノ文字ヲ讀テ能サレハ洋人漢文翻譯ノ書ニ就テ其論說ノ卓絶ナルヲ舉ク邦人譯述ノ如キハ槩之ヲ省ス宜其書ニ就テ看ヘシ

一 湯煮煎劑ハ亞細亞州中ノ治法ニノ邦人古ヨリ用ヒ來ル所ナレハ布帛菽粟ト同ク一日モ廢スヘカラサルナリ然レモ西洋製鍊ノ藥モ奇驗ア

ル方ハ必録出ノ用ニ備フ總テ短ヲ捨テ長ヲ取ヲ要ト爲ス彼是齷齪スルトヲ欲セス

一 此書ニ載スル所ハ其大槩ヲ示ノ子弟輩ノ醫ヲ學フ指南ト爲ノミ畢竟臨症處治ノ妙義ニ至テハ言語文字ノ盡スヘキニ非レハナリ

一 傷寒論金匱要畧中ノ方劑ハ茲編ニ載セヌ又方中ノ分量ハ原方ニ因テ調藥ノ用ニ充ツ萃侘傳ニ心識分録不假稱量ト云フ其多少斟酌ハ自ラ

醫人ノ心得ニアルナリ煮服ノ法ハ
每方後ニ薑棗煎服又薑水煎服ト記
ス若方中姜棗無レハ單ニ水煎トノ
ミ書ス而其煎煮ノ法尋常ニ異ナル
ハ更ニ方後ニ詳ニス假令ヘハ升陽
散火湯ノ金首飾ヲ入レ煎シ導水茯
苓湯ノ如熬阿刺吉酒ト云類ナリ
一古來ノ醫書汗牛充棟ニノ粹ニ讀ヘ
カラス其方法モ浩繁ニメ容易ニ究
難シト爲ス今古方ニ就テ當世ニ確
驗アルモノヲ主ト爲シ後世ノ方本

邦試驗ノ方其他西洋ノ方ニテモ今
日ノ治術ニ裨切ナルモノヲ舉録ス
其迂遠ナルハ省テ記セス古人モ醫
方千卷猶未盡其理ト云テ此編著ノ
悉備フヘキニ非レハナリ
一此編己巳冬月予鹿鳴堂中ニ在テ草
ヲ起ス僅ニ一卷ヲ成セリ庚午ノ四
月再ヒ此ニ來テ業ヲ卒フ計ルニ前
後三旬ナラスメ藁ヲ脱セリ故ニ癰
疽金創痘疹ノ如キハ未タ記載ニ及
ス其他尚詳考ニ遑アラズ遺漏モ亦

醫學文獻考

多シト爲ス後ノ再訂ヲ俟ツト云
庚午四月
香城老人識

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

卷一 目次

中風
痰飲
虛勞

脚氣
水氣
瘡

醫學文獻考 卷一 目次

醫方啓蒙卷一

東京

隱醫香城老人編述

中風

中風ノ証ハ素問ニ風論アリ金匱ニ中
 風ノ篇目ヲ載テ其來ルヲ久シ其所因
 ハ飲啖不節嗜慾過度ヨリノ氣血衰壞
 シタルニ偶賊風邪氣ニ遇テ病ヲ發ス
 ルナリ然レハ風字ハ其病發ニ就テノ
 名ナラシ西洋ニテハ是ヲ腦ノ病ニ屬
 ノ其說ニ云此症ノ病源實ハ腦ニ由ル

風ト關ルヲナシ若肢體癱瘓スル者是
 腦氣筋動作ノ功用ヲ失スルナリ痛癢
 冷熱ヲ知ラサルモノハ是腦氣筋知覺
 ノ功用ヲ失スルナリ又云此症發スル
 前ニ病媒ノ徵スヘキアリ病媒トハ病
頭目眩暈手足麻痺等ヲ云ナリ其說甚精確ニシ理或
 ハ然ラン乎詳見西醫論中風ノ證ハ
 卒然トメ暈倒シ昏冒ノ人事ヲ知ラズ
 或痰涎壅盛メ咽喉作聲或口眼嚙斜手
 足癱瘓或半身不遂或舌強不語等ノ候
 アリ其脈ハ緩大或洪滑ナルヲ風ノ常

ト爲ス微濇細數或濶大虛軟無カハ難
 治トス此病卒然トメ發シ速ニ斃ル者
 アリ荏苒トメ不治不死モノアリ旬日
 ニメ癒ルアリ又類中風ト云テ古人ハ
 真中風ニ對メ因氣因火因濕モノトス
 レ凡原ト卒中風ニ別ツノ各ナレハ延
 日不治ノ証ヲ類中風ト云テ可ナラン
 又本事方ニ氣中ノ各アリシヨリ中風
 中氣ノ別アレ凡中風ハ外熱ノアル証
 中氣ハ外熱ノ無キ証トメ宜シ凡中風
 癱瘓不遂ノ証ニ輕重急慢ノ別アリ此

ヲ枯樹ニ譬フ枝葉繁茂スト雖凡根幹
乍枯テ暴折スルアリ半身枯テ存スル
アリ一枝枯テ活スルアリ然レ凡寒烟
再燃ヘ枯木再榮シ理ナキヲ以其枯所
アルモノハ狂風猛雨ニ倒レ易シト知
ヘキナリ

治療ノ法ハ外熱アリテ發表スヘキニ
表ノ實スルハ大續命湯虛スルハ小續
命湯桂枝加附子湯ノ屬痰涎盛ナルハ
三生飲沈香半夏湯更ニ養正丹黑錫丹
ノ類ヲ兼用スヘシ又獨參湯加竹瀝姜

汁可服之或加附子若大便閉ルモノハ
三黃湯或加辰砂或加牛黃可ナリ卒倒
昏冒ノトキハ蘇合圓ヨシ頑涎上潮メ
牙關不開ニハ稀涎散又搐鼻ノ方アリ
或白梅肉ヲ牙齒ニ揩スレハ口開ク因
テ灌藥ノ法モアリ其緩證ニハ烏藥順
氣散干味判散ノ類選用スヘシ言語蹇
澁ニハ資壽解語湯兼テ清心散ヲ擦メ
効アリ

中風ニ閉脫ノ二證アリ點ハ紫ノ眼
証重ヲ別チ痰涎ノ有無ニ因テ卒然ト

メロ噤シ目張り兩手握固シ痰壅氣閉
此閉證ナリ目合シ口開キ汗出如珠昏
臥遺溺手ヲ撒ケ足ヲ擲チ聲如鼾睡ハ
是脫症ナリ閉證尚可治脫證尤難治ト
ス

三生飲

卒中昏不知人口眼喎斜半身
不遂咽喉作聲痰氣上壅或脉沈伏或
浮盛兼痰厥飲厥及氣虛眩暈

南星一兩

川烏

附子兩

木香一分

右姜水煎服

沈香半夏湯

主氣祛痰

附子

沈香兩

人參半兩

半夏二錢

南星一錢

右姜水煎服

三黃湯

卽本方或加辰砂或加牛黃

烏藥頃氣散

風氣不順手脚偏枯流注

經絡并濕毒進襲腿膝攣痺筋骨疼痛

烏藥

麻黃

橘皮兩

甘草

川芎

枳殼

桔梗兩

白芷一兩

白僵蠶一兩

乾姜 半兩

右薑棗水煎

十味到散 臂痛連筋及骨舉動艱難

附子 桂枝 白朮

茯苓 黃芪 地黃

川芎 當歸 芍藥

防風 各等

右姜棗水煎

資壽解語湯 風入心脾言語蹇澁舌強

不轉 附子 一枚 防風 天麻

酸棗仁 羚羊角 桂枝 各三

甘草 二兩 羌活 二兩

右姜水煎服

稀涎散 風涎潮於上膈痺氣不通

猪牙皂莢 四枚 礬石 一兩 附光明者

右為末溫水調灌下○一方研白礬為

末生姜煎湯灌服

清心散 中風舌強不能言語

青黛 薄荷 硼砂 各三

牛黃 龍腦 各三

右為末生姜自然汁以之舌上ヲ洗

淨シ白蜜ヲ塗リ此藥ヲ擦ス
皆鼻方 口禁不省人事者

用細辛皂角各少許或只用半夏爲
末以蘆管吹入鼻中

蘇合香丸 風痰相搏神暴絕

蘇合香油 白木 辰砂

沈香 訶子 丁香

木香 香附子 白檀

犀角 乳香 草撥

安息香略 麝香 龍腦各半

右爲末煉蜜丸溫酒嚼下人參湯亦得

養正丹 中風涎潮不省人事

硫黃 水銀 黑錫與水銀

辰砂略

右黑蓋ヲ用テ火上ニ黑錫ヲ鎔メ汁

ト成シ次ニ水銀ヲ下シ柳杖子ヲ以

テ攪テ汁ト成シ和シ勻ヘ如シ燂ア

レハ醋ヲ以テ之ニ酒キ冷ヲ候テ取

出シ研メ粉ノ如ク極テ細ニメ糯米

粉ヲ以テ糊ニ煮テ丸ト爲シ鹽湯ニ

下ス

黑錫丹 卒暴中風痰潮上膈言語艱澁

咽喉中痰饗

苦棟子 胡蘆巴 木香

附子 肉豆蔻 破故紙

沈香 茴香 陽起石

肉桂 黑錫 硫黃略

右黑蓋或新鐵鍋ヲ用テ常法ノ如ク

黑錫硫黃ト砂子ヲ結シ冷テ候テ研

細ニシ餘ノ藥末ト和シ白ヘ酒糊ニ

丸ト爲シ姜鹽湯ニ下ス

洋方ノ治療ハ都テ腦中ニ膿血水脹ア

リト認シエエ蟻吮鈞膿ノ法ヲ用ヒ或

草麻油巴豆油大黃元明粉等ノ瀉劑ヲ

與ルナリ其大便ヲ瀉スルハ宜シケ

レ凡他ハ用ルニ中ラス

中風七處灸時ニ隨テ用ヘシ

一百會穴 二耳前髮際

三肩井穴 四風市穴

五三里穴 六絕骨穴

七曲池穴

此外聽會頰車天樞氣海肩髃溫溜曲池合谷環跳三里絕骨等ニ灸ノ往々

醫學文獻卷之二

効アリ左結右人左説右ハ左若右灸左ス右レ左ハ右必左舊右説左ハ右説
此左ヲ按メスルヲ論スト拘此ヲ説在但ナ疾リノ

脚氣

古來脚氣ノ名ナシ晉唐以降始テ此症アリ其濕蒸ノ氣脚ニ着テ發スルニ因テ脚氣ト名ク其病春末夏初ニ多ク有リ秋冬ハ少シ証候ハ兩脚酸麻腔腿頑痺或ハ屈弱無力或轉筋或微腫行步艱澁等ノ候アリ腫氣アルヲ濕脚氣ト云腫氣ナキヲ乾脚氣ト稱ス若舌上胎ヲ生シ少腹麻痺不仁心下動悸呼吸短促小便不利嘔吐メ脉數急ナルハ脚氣衝心ノ候ナリ大ニ畏怖メ速ニ治療ヲ爲

醫學文獻卷之二 脚氣

へシ若胸脇逆滿上氣肩息嘔吐不止者
ハ死不旋踵此証ノ初或寒熱アルヲ以
テ脚氣類傷寒ノ語アリ若疑似ノ候ア
レハ早ク其兩脚ノ麻痺アルヤ否等ニ
心ヲ用テ診察スへシ往々醫治ヲ誤ル
コアリ此病酒色縱恣奉膳奉養ノ人患
易シ故ニ王公貴人多ク此証ヲ病ナリ
又世俗婦人ニ脚氣ナシト云ハ誤ナリ
外臺ニモ脚氣之爲病無問男女ト云ヒ
聖忠ニモ婦人中ニ脚氣門アリ濟生方
ニモ婦人ノ脚氣ヲ病コト云へリ又婦

人産後ニ脚氣ヲ患ルコトマ々有リ凡テ
脚氣ノ脉ハ遲緩微遲ニ宜シ洪大滑數
ハ共ニ吉兆ニアラス古人モ浮大緊駛
ナルハ最悪脉也ト云へリ又西洋ニハ
絶テ此症アルコトナシト云故ニ洋方ニ
ハ治法ナキナリ大凡脚氣ノ證ハ兩脚
少ク平日ニ異ナルコトアレハ速ニ灸ス
ルヲ良トス又脚氣外發テト兩脛生瘡
臙瘡ノ如キモノアリ發毒ノ藥ヲ用へ
シ收斂ノ品ニ宜シカラス然レモ如此
證ハ衝心ノ患ナシト知へシ

治法輕證ハ栝蘇散木瓜散疼強キハ神
効栝蘇散若表候了レハ越婢湯或加栝
榔木瓜若惡心メ藥ヲ納レサレハ犀角
旋覆花湯若小便不利表候ナキハ六物
附子湯若衝心ノ候アルハ木朮湯唐侍
中方廣濟一方等酌用スヘシ兼テ養正
丹黑錫丹或紫雪ヲ用ヘシ更ニ童子小
便ヲ取テ生姜汁ヲ加ヘ服ス尤妙ナリ
以犀角屑栝榔末沈香末皆佳ナリ又緩
證ニノ腫氣アルハ黑豆飲唐風引湯ニ
宜シ大勢去テ後三和散腎氣丸證ニ隨

テ選用スヘシ愈後調攝ヲ善スヘシ尤
房室ヲ慎ニ且シ一切酒麪粘膩酸醎膏
粱ノ味ヲ忌ム然ラサレハ日後再發ス
栝蘇散 風濕脚痛踈通氣道

香附子 紫蘇 陳皮 酪 三

甘草 二兩 栝榔 二兩 木瓜 二兩

右姜水煎服○大便秘滯或加大黃

木瓜散 脚氣衝心胸膈痞滯煩悶

大腹 紫蘇 木瓜 甘草

木香 羌活 茯苓 陳皮 各等

右水煎服

神效栝蘇散 治脚氣如神

榔板三錢 紫蘇 防風 羌活

當歸 木瓜略二 乳香 沒藥略半

右姜水煎服

越婢湯 風痺脚弱

麻黃六兩 石膏半斤 白朮四兩

附子一枚 甘草二兩 大棗十五枚

右姜水煎服○或加茯苓或加栝榔木

瓜或加犀角

犀角旋覆花湯 脚氣腫滿或行起澁弱

小便秘澁喘息氣衝喉食嘔不下

犀角 旋覆花略三 橘皮 茯苓

生姜略三 紫蘇一握 大棗十五枚

右水煎○或加桑白皮

六物附子湯 骨節煩疼四肢拘急小便

不利手足時時浮腫

附子 桂枝略四 茯苓三兩

甘草 防己四兩 白朮三兩

右姜水煎服

木茶湯 脚氣入腹因悶欲死腹脹

吳茱萸六升 木瓜兩顆

右水煎○或加犀角

唐侍中方 專主脚氣衝心

檳榔 生姜略 橘皮 吳茱萸

木瓜略

右水煎服○或加桑白皮

黑豆飲 脚氣遍身腫

大豆三升 桑白皮一握 檳榔七

茯苓二兩

右以水一斗煮大豆取五升去豆以三

物浸豆汁煮服

唐風引湯 痺滿上氣遍身脹膝疼并去

風濕痛

大豆三升 附子三兩 枳實 澤瀉

橘皮略 甘草 茯苓 防風略

右取大豆煮汁內藥煮服

三和散 三焦不和脚氣上攻

大腹皮 紫蘇 獨活 沈香

木瓜 川芎略 白朮 木香

甘草 檳榔略 三陳皮二分

右水煎

腎氣丸料 脚氣少腹不仁上氣喘急

卽本方加沈香

右水煎服

醫方類聚卷一

養正丹

黑錫丹

中并見風

紫雪 脚氣衝心煩躁者最良

黃金 十兩 寒水石 石膏 磁石

滑石 各四兩 玄參 二兩 羚羊角 二錢

升麻 二兩 沈香 二兩 丁香 四分

木香 犀角 三錢 甘草 三錢

右水一斗ヲ以テ先五種ノ金石藥ヲ煮テ四升ヲ得テ滓ヲ去リ後ニ八物ヲ内テ煮テ一升五合ヲ取り滓ヲ去リ芒消一斤ヲ取テ汁中ニ投シ微火ニ煎シ柳木篋ニテ攪シ木盆中ニ投

シテ凝レト欲スルトキニ辰砂二分

麝香五分ヲ内テ攪キ調ヘ之ヲ寒スル

一二日ニメ霜雪ノ如ク紫色ト成ル

取テ之ヲ服ス冷世量ニ依テ本方

脚氣八處灸穴

風市 伏兔 犢鼻 膝眼

三里 上廉 下廉 絕骨

此外ニ三陰交承山ニ灸スルモ良シ
○按蘇恭云若脚氣盛發時自腰以上并不得鍼灸

醫方類聚卷一

十三

痰飲

痰ト飲トハ一類ノ病ニノ少異ナリ稀
ヲ飲ト爲シ稠ヲ痰ト爲ト云テ稀トハ
清稀トテスミテウスキナリ稠トハ稠
濁トテコクニコリタルナリ古ハ痰ノ
コヲ濁唾涎沫ト稱ス其痰ト云ハ淡字
ト通ノ淡飲トハ今ノ留飲ナリ痰飲ハ
本人身中ノ津液ニノ常ニ滋養ヲ爲ス
モノナレバ若壅滯凝閉スルハ病ヲ
爲ナリ証候ハ金匱ニ委シ其大畧ヲ言
ヘハ心下痞滿倚息短氣頭目眩暈嘔吐

吞酸或黃苦水ヲ吐シ胸背痛或背如手
掌大冷ルモアリ又僻飲トテ脇下ニ牽
テ痛ムモアリ又僻囊ト云ハ脇下ニ水
飲ノ窠曰ヲ爲ナリ痰ノ病ハ眩暈嘈雜
忪悸嘔逆咳喘痞隔噫氣吞酸心下痛痞
或ハ濕痰流注トテ四支胸背ニ引テ痛
モアリ脊上一條如線ノ寒アルモノア
リ眉稜耳角痛ヲ爲アリ風痰迷心トテ
驚狂ヲ發シ又恠奇ノ狀ヲ見スモアリ
痰爲百病ト云テ種々ノ狀ヲ爲スモノ
ナレハ一槩ニ盡シカタシ然レモ其方

劑ハ痰モ流飲モ互ニ用ヲ爲ヘシ西洋
ニハ痰ハ是氣管ノ内ニ生スル所ノ津
液ニノ平人ハ多カラヌ少カラヌ濃カ
ラス薄カラヌ畧蛋青ノ如シ若中ニ風
氣アレハ滿溢ノ出ツ亦蛋青ノ如シ之
ヲ攪キ之ヲ撓セハ則泡沫ヲ生ル又凡
肺病必痰アリ大小腸ニ必膠血アルト
理ヲ同スト云ヘリ痰飲ノ脉ハ沈微弦
緊ヲ常候ト爲ス或時ニ伏絶不勻ノ狀
ヲ見ストアリ其治ハ淡飲ハ溫藥ヲ以
和之ト云ヲ常套トセリ

治法胸滿目眩アルハ桂苓朮甘湯宿水
 ヲ吐スルハ茯苓飲冷痰ニハ大半夏湯
 姜附湯二生湯半夏湯尋常ノ證ハ二陳
 湯導痰湯加味導痰湯ノ類ヲ選用スヘ
 シ胸膈作痛ハ瓜蒌枳實湯枳縮二陳湯
 小陷胸湯濕痰流注ニハ清濕化痰湯眉
 稜骨痛ハ水玉湯驅痰ノ劑ハ十棗湯甘
 遂半夏湯又控涎丹滾痰丸ヲ兼用スヘ
 シ温藥ニテ痰ヲ下スハ半硫丸ニ宜シ
 茯苓飲 心胸中有停痰宿水白吐出水後
 心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 三兩 人參 二兩 白朮 三兩

生薑 四兩 枳實 二兩 橘皮 一兩

右水煎服

大半夏湯 痰冷癖飲胸膈中不理

半夏 一升 白朮 三兩 生薑 八兩

茯苓 人參 桂心 甘草

附子 二兩

右水煎服

薑附湯 痰冷癖氣胸滿短氣嘔沫頭痛

飲食不消化亦主卒中風

生姜 八兩 附子 四兩

右水煎服

二生湯 專治痰

附子 半夏 等分

右姜水煎服

半夏湯 痰飲滯氣吞酸

半夏 吳茱萸 各三 生姜 六兩

附子 一枚

右水煎服

二陳湯 痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩
心悸或中皖不快或發為寒熱或食生
冷脾胃不和

半夏 橘皮 各五 茯苓 三兩 甘草 一兩

右姜棗煎服○或加枳實縮砂

導痰湯 一切痰厥頭目旋運胸膈痞塞

頭痛吐逆喘急痰嗽

半夏 四兩 天南星 橘皮 枳實

茯苓 半兩 甘草 半兩

右姜水煎服

加味導痰湯

於本方加木香沈香

瓜蒌枳實湯 痰結咯吐不出胸膈作痛

寒熱氣急痰迷心竅不能言語

瓜蔓 枳實 桔梗 茯苓
貝母 陳皮 黃芩 山梔各一
當歸六分 縮砂 木香各五
甘草二分

右姜水煎服

枳縮二陳湯 涎在心膈上攻走腰背嘔
噦大痛

枳實 縮砂 半夏 陳皮
香附各一 木香 草豆蔻
乾薑各五 厚朴 茴香
延胡索各八 甘草三分

右姜水煎服

清濕化痰湯 遍身四肢骨節走注疼痛
牽引胸背或四肢麻痺不仁或背心一
點如冰冷是濕痰流注經絡故也

南星 半夏 陳皮 茯苓
蒼朮 羌活 黃芩 白芷
白芥子各等 甘草減半

右姜水煎服

水玉湯 肩稜骨痛不可忍者此痰厥也
卽小半夏湯
控涎丹 凡人忽患胸背手脚頸項腰膝

牽引釣痛此乃痰涎在心膈變為此疾

甘遂 大戟 白芥子各等

右為末糊丸如梧子大薑湯或熟水下

滾痰丸 通治痰為百病

大黃 黃芩各八 青礞石礞石二兩

沈香五錢

右為末水丸梧子大白湯食後空心服

半硫丸 下痰

半夏三兩 硫黃二兩

右為末生薑麩糊丸梧子大白飲下

灸法 育膏 期門 四花 脊際

水氣

水氣ノ證脾腎二藏ヨリ發スル丁古
來ヨリ論ノ種々ノ名目ヲ立テ區別ヲ
為セ凡治術ノ急務ニアラス素問ニ諸
有水氣者微腫先見於目下也又靈樞ニ
モ水始起也目窠上微腫如新臥起之狀
トアリテ是ヲ水氣ノ初兆ト為メ手足
頭面浮腫シ或先腰肋微腫ノ漸々身體
洪腫シ小便不利大便燥結スル是其常
證ナリ甚キニ至テハ欬嗽喘急短氣促
迫腹脹煩滿外腎或腫肌肉崩潰足脛流

水ハ多ク救サルナリ又腫氣ノ腹ニ起
テ四支ニ散スルハ治シ易ク四支ニ起
テ腹ニ歸スルハ治シ難シト云ヘリ又
陽水陰水トテ手ヲ以テ腫上ヲ按スニ
凹メ起ラサルヲ陰ト爲シ直ニ起ルヲ
陽ト爲ス陽水ハ實ニ屬シ熱ニ屬ス故
ニ脉沈數ニメ色多黃赤或煩或渴小便
赤澁大便多閉是ナリ陰水ハ虛ニ屬シ
寒ニ屬ス故ニ脉沈遲ニメ色多青黃不
煩不渴小便澁少ニメ清大腑多洩是ナ
リ猶其他ノ証ヲ參照メ治療ノ方ヲ設

ルナリ水病ノ脈ハ沈遲ヲ常トナシテ
或ハ洪大ナルモアリ若沈微細小ナル
ハ危シ又瘡疥變メ腫滿トナルアリ是
亦一證ナリ西洋ノ説ニハ人身ハ水ト
血ノ融メ兩ナカラ相離レズ離レハ則
病ム又水ノ汗孔ニ外泄スルヲ得サ
レハ勢必吸管ヨリメ内ニ泄ル大小腸
ニ泄レハ瀉シ皮膚ニ泄レハ腫ヲ爲ス
其理一チリト云ヘリ水病ノ五傷トテ
唇黒ク缺盆平ニ臍出テ足下平滿シ背
平ナル是五不治ノ證ナリ

水病ノ治法ハ經文ニ腰以上腫ハ宜ク
發汗スヘシ腰以下腫ハ宜ク小便ヲ利ス
ヘシトアリテ發汗利水滲泄ノ三法ニ
分ツヘシ唯利水ニ濕利ト峻利トアリ
今左ニ列ス然レモ是其大端ナリ宜ク
症ニ隨テ參酌スヘシ又此證禁忌ヲ嚴
戒スヘシ尤鹽醬鹹味ヲ忌ム然ラサレ
ハ治セス

發汗ハ越婢湯或加茯苓或加水附麻黃
散麻黃湯溫利ハ實脾散壯原湯沈附湯
五苓散加沈香附子三聖丸峻利ハ牽牛

五靈煮散十棗湯塌氣散瀆川丸三花神
祐丸滲泄ハ牡蠣澤瀉散導水茯苓湯木
香分氣湯無礙丸大橘皮湯或消水膏亦
効アリ若瘡疥ノ腫滿ニ變スルハ麻黃
連翹赤小豆湯或加犀角又赤小豆湯兼
用聯步丸効アリ
臍下水分ノ穴ヲ刺ノ水ヲ取ルトアリ
古人ハ多ク禁スルトナレモ壯實ノ病
人ハ往往効アリ尤虛腫ニハ決メ施ス
ヘカラス
麻黃散 風水徧身腫滿骨節痠疼惡風

脚弱皮膚不利

麻黄 一兩 石膏 三兩 白朮 二兩

附子 一兩 防已 二兩 桑白皮 二兩

右薑棗煎服

麻黄湯 風水身體面目盡腫

麻黄 五兩 桂枝 四兩 甘草 二兩

附子 二枚

右薑水煎服

實脾散 陰水先實脾土

厚朴 白朮 木瓜 木香

草菓 大腹皮 附子 茯苓

乾姜 兩 甘草 半兩

右姜棗煎服

壯原湯 下焦虛寒中滿腫脹小水不利

上氣喘息陰囊兩腿皆腫

人參 白朮 茯苓 破故紙 各一

桂枝 附子 乾薑 砂仁 各五

半夏 七分

右水煎服

沈附湯 腫病喘滿小便不利用寒藥則

愈不通

沈香 附子 等分

右薑水煎服

五苓散

木方加沈香附子

右水煎服

牽牛五靈煮散 水腫凡肺氣脚氣黃豚

氣上築心胸不可忍皆治之

牽牛子 檳榔 木香 陳皮

茯苓附各三

右水煎服

塌氣散 水病渾身腫脹喘急小便不利

商陸 赤小豆 橘皮 檳榔

甘草 蘿蔔子各等 木香 一分

右姜棗煎服

導水茯苓湯 水腫徧身如爛瓜喘滿倚

息不能轉側溺出如割而絕少雖有面

如黑豆汁者

茯苓 麥門冬 澤瀉 白朮附各三

桑白皮 紫蘇 檳榔 木瓜附各一

大腹皮 縮砂 陳皮 木香附各半

右燈草水煎煎此藥時要如熬阿刺吉

酒相似約水一斗止取藥一盞服直至

小便變清白色為愈此藥濃煎ラスル

醫方大成卷之二

酒ハ効ナシ
ハ効ナシ
ハ効ナシ
ハ効ナシ

木香分氣湯 氣滯腫滿虛氣上衝神志不爽

木香 茯苓略 澤瀉 半夏

枳殼 紫蘇子 檳榔各三兩

猪苓三分

右燈心煎服

無礙丸料 四肢浮腫心腹脹滿喘不能臥

大腹皮 莪朮 三稜 木香

枳榔略

右薑水煎服○或加郁李人

大橘皮湯 濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄

橘皮半兩 木香 滑石六兩

枳榔三錢 茯苓一兩 猪苓 澤瀉

白朮 桂枝各半兩 甘草二錢

右姜水煎服

赤小豆湯 有患生瘡用乾瘡藥太早致遍身腫

赤小豆一升 商陸一升 連翹

反鼻 桂枝略

醫方大成卷之二

三

消水膏
右水煎○或加大黃

田螺 大蒜 車前子

右三味和シ研ノ膏ト作シ大餅ト作
テ臍上ヲ覆フ水小便ヨリノ出ル也
聯步丸 陽水腫脹

續隨子炒去油 大黃爲一兩

右爲丸白湯下

三聖丸 十種水氣凡脚膝腫上氣喘滿
大小便不利

蛇含石燒通赤入醋三兩 烏餘糧二兩

鐵砂五兩入醋餘糧一度即煎并藥
通赤候

右蒸餅丸白湯下切須忌鹽

三花神祐丸 一切水濕腫滿濕熱腸垢

沈積變生疾病

甘遂 大戟 芫花各半

牽牛二兩 大黃二兩 輕粉一錢

右爲末滴水爲丸服

瀉川丸一名平水腫利小便酒客虛熱腹

腫陰脹滿

商陸四兩 甘遂一兩 芫花

吳茱萸 大黃 略二

右研末蜜丸服

刺水分法

臍下二寸ニ針メ入ルヲ數分水ヲ
メ針孔ヨリ出シム今西洋筒管針
ヲ用テ必宜トス

虛勞

虛勞ノ証ハ古今良治法ナシ而肺痿骨
蒸乾血勞等皆虛勞中ノ一証ナリ分テ
言ヘハ虛勞ハ陰陽氣血ノ不足スルヨ
リ生スル病ノ總名ナリ肺痿ハ俗云勞
咳ナリ骨蒸ハ後世勞瘵ト稱ノ字面ノ
通り熱ノ勝タル證候ナリ乾血勞ハ瘀
血ヨリ發スル證ナリ此外婦人産後ノ
葶勞アリ小兒ノ疳勞アリ蚊蟲勞アリ
癩毒勞アリ疥癬勞アリ又馬刀夾纒ト
テ頸下ニ瘰核アルモノ能勞ヲ發スル

ナリ桃栳蛙トテ面色如故肌體自充如
無病人ニノ勞ヲ爲スモノアリ總テ難
治ノ証ナレモ古人ノ成法アレハ其證
ニ隨テ藥治ヲ施スヘシ一槩ニ抹撥ス
ヘカラス諺云傷寒勿治始勞証勿治終
トテ洵ニ醫者ノ手ヲ下シ難キ病ナリ
其證寒熱日久頭旋頭暈欬嗽不已吐血
吐痰紅線白沫身疼ミ脚弱ク心怯氣短
自汗盜汗或五心煩熱シ或午後潮熱シ
或骨蒸熱ヲ作シ夜惡夢多ク晝精神少
ク耳內蟬鳴咽痛聲啞飲食無味婦人ハ

必經閉不來此皆勞傷ノ證ナリ西洋ニ
テハ勞証ハ肺體ニ堅粒ヲ生スルト如
沙ナルニ因テ此ヲ番各ニ都吡迦叻ト
云或左肺ニアリ或右肺ニアリ或左右
俱ニ有リ右ノ多キト左ニ過ク上ノ多
キト下ニ過ク先多小粒ヲ生メ肺經本
體ノ内ニアリ漸合メ一大粒ヲ爲シ久
ク潰爛シテ穴ヲ成ス穴ニ大アリ小ア
リ肺體全壞スルモノアリ病源或父母
ノ延累ニ因テ性質此證ヲ患易キモノ
アリ云云男女此証ヲ患ルモノ毎二十

五歳以上三十歳以下ニ至ル病狀先乾
欬シ有血脊出シ漸氣短促ニ至リ行動
呼吸更ニ促ク困倦シテ精神無ノ手足
疲軟ニ羸瘦シ頸ハ細長ニ變シ胸膈ハ
窄ニ變シ操作辛苦スレハ則汗出瀉泄
シ食物消化セス夜臥不安脈微細ニノ
數心跳メ痰多ク或欬血シ胸膈時痛聲
首不清久ケレハ則啞ス夜晩顴色鮮紅
早起多冷汗舌苔先白後紅數年ニノ死
シ或半年一年ニノ死ス間三四年ニ死
スルモノ有リ將死時瀉多ク汗多ク更

ニ羸瘦ノ髮脫跌腫牙肉爛テ白泡ヲ生
シ發熱ノ痰更ニ膿ト相雜ル手足熱シ
脈更ニ細數是ヲ死徵ト爲ト云ヘリ凡
虛勞ノ脈ハ洪大無根或細數少力但脈
細數十ヲサレハ頼ム所了レ凡細數ノ
極ニ至テハ必不治ト知ヘシ張景岳説
并虛損ノ法ト載ステ長又診法ノ指一ノ端ナリ
虛勞寒熱腹痛スルハ小建中湯汗出ハ
黃芪建中湯大建中湯肺痿唾沫吐紅ニ
ハ炙甘草湯或加蛤蚧食切勞散蛤蚧散
或兼用蜜酪煎寒熱劇キハ小柴胡湯加

胡黃連鱉甲柴胡鱉甲湯或淨府湯又補
中益氣湯柴胡散骨蒸熱勝ニハ竹葉飲
解五蒸湯乾血勞ハ麥煎散小柴胡加地
黃湯或大黃蠱蟲丸ヲ兼用ス此他方法
多シ証ニ隨テ選用スヘシ蓋虛勞ノ治
法甚難シトス用藥溫燥ニ過レハ其熱
ヲ助ク清涼ニ過レハ其寒ヲ益ス補養
潤滋ノ劑ニ宜シ是其病ノ治シ難キ所
以ナリ

肉雞鴨臛汁半熟ノ雞蛋等ヲ用ルナル
ヘシ又レールフルタラーン或効アリ
虛勞將攝ノ法ハ諸書ニ載ヒテ皆人ノ
知ルコトナレ也西洋ノ書ニ宜ク散步間
適シ遊玩ノ情ヲ怡シ他處ニ遷徙シ水
土ヲ變易スヘシ所居ノ室戸牖ヲ開テ
風氣ヲ通スヘシト言ヘルハ大ニ佳ナ
ル說ナリ

大建中湯 虛勞裏急四支不和身體疼
痛不欲喫食

黃芪 四兩

人參 二兩

大棗 廿枚

當歸 一兩 桂心 六兩 半夏 一升
附子 一兩 芍藥 四兩 甘草 二兩

右姜水煎服

炙甘草湯

卽本方加蛤蚧

劫勞散 勞嗽寒熱盜汗唾中有紅線各

曰肺痿

芍藥 六兩 黃芪 甘草 人參

茯苓 當歸 五味子 地黃

半夏 阿膠 兩 二

右姜棗煎服

蛤蚧散 積勞久欬失音

蛤蚧 一對 訶子 阿膠

地黃 麥門冬 細辛 甘草 兩半

右水煎服

蛤蚧散 虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思

飲食

蛤蚧 一對 人參 百部 紫苑

貝母 五 款冬花 三 阿膠 五

鼈甲 柴胡 五 甘草 一

杏仁 三 黃耆 五

右水煎服

竹葉飲

骨蒸唇乾口燥欲得水止渴

竹葉 一握

麥門冬 一升 大棗 二十顆

甘草 二兩

半夏 一升 粳米 五合

右姜水煎服

解五蒸湯

甘草 一兩

茯苓 三兩 人參 二兩

葛根 一兩

地黃 兩 三知母 黃芩 兩 二

石膏 五兩

粳米 一合

右水煎服

麥煎散 少男室女骨蒸婦人血風攻注

四肢心胸煩壅

鼈甲 大黃 常山 柴胡

茯苓 當歸 乾漆 白朮

石膏 地黃 甘草 半兩

右小麥水煎

小柴胡加地黃湯 骨蒸勞熱

即本方加鮮竹

柴胡鼈甲湯 虛勞寒熱

柴胡 鼈甲 茯苓 各一 黃芩

知母 桑白皮 各三 甘草 半兩

右姜水煎服○今加胡黃連有效

淨府湯 虛勞骨蒸

柴胡 茯苓 澤瀉 三稜

莪朮 山查 各一 黃芩 半夏 各八

白朮 猪苓 各七 人參 胡黃連

甘草 各三

右薑棗水煎○或加鼈甲

補中益氣湯 飢飽勞役身熱頭痛

黃耆 甘草 各五 人參 升麻

柴胡 橘皮 當歸 白朮 各五

右水煎服

柴胡散 虛勞

柴胡 三錢 人參 茯苓 各一

桔梗 芍藥 當歸 各二 青皮

麥門冬 各二 甘草 一分

右水煎服

蜜酪煎 肺痿欬嗽

酪 二合 白蜜 二合 生地黄汁 三升

生姜汁 一合 生麥門冬汁 三升

右合煮如稀飴內貝母末紫苑末攪服

新定大黃蠱蟲丸

乾漆 炒一兩 蠱蟲 十箇 大黃 一兩

右酒煮搗膏為丸白湯送下

灸法 四花 患門 脊際 四推 二到 卅三

瘧

素問曰瘧瘧皆生於風是瘧ノ外感ヨリ
 得ルヲ云ナリ又云夏傷於暑秋必病瘧
 是瘧ノ秋夏ノ交ニ多キヲ云ナリ古人
 云無痰不成瘧是其内外相感ノ病ヲ爲
 ヲ云ナリ其寒熱ヲ發スルハ少陽部位
 ニ屬スルノ病ナリ寒多ヲ寒瘧ト云熱
 多ヲ溫瘧ト云久不瘥ヲ勞瘧ト云結爲
 癥瘕者ヲ瘧母ト云疫ヲ兼タルヲ疫瘧
 ト云痢ヲ兼タルヲ瘧痢ト云其病因証
 候ハ素問金匱以降諄々ト説來リテ明

了ナリ其脉候ハ弦數ヲ以常トナシテ
或浮數或緊實各一定ナシ大抵寒熱ノ
發スルトキハ浮數ニシテ寒熱ナキ時ハ
安靜ナリ其發時遲キヨリ漸早ハ輕ト
ス早キヨリ漸遲ハ重トス此其大畧ナ
リ瘧証洋說太簡ニシテ適切ナリ曰瘧証
ノ狀惡寒發熱汗出即愈ユ或日ニ一發
或一日ヲ間テ一發或二三日ヲ間テ一
發ス更ニ初起日ニ一發漸變ノ間日發
ト爲ルアリ或日ニ一發漸變ノ間日發
ノアリ其發作歷時久暫定ラヌ大約發

寒一時發熱一時出汗一時共ニ三時ヲ
歷テ而病退テ平人ノ如シ此其常ナリ
又曰瘧症ノ狀初起惡寒困倦精神ナク
懶惰ノ喜テ欠伸シ胃中空虛ニシテ安カ
ラス周身ノ皮皺冷ニシテ寒戰牙緊頭痛
腰痛唇青身青指甲青溺少便秘脉細數
ニシテ不定呼吸不利覆蓋メ衣被多ト雖
凡寒減セヌ半時或一時後漸熱メ覆蓋
ヲ欲セヌ忽ニシテ大熱面紅眼紅徧身紅
熱シ猶畧寒ス少頃ニシテ寒退テ全ク熱
シ脉數口渴溺少ニシテ紅一二時ノ後頭

向頸先汗アリ漸々全身大汗熱退脉靜
呼吸如常溺漸多ノ頗快適ラ覺ヘ平日
ニ異ナルヲナシ又云此症四時俱有日
ニ一發者春尤多其發自毎ニ晝時ニ在
テ準トスル者自發至退六時ニ過ス輕
キハ或三四時間日發自スル者春秋俱
ニ有其發作毎ニ午時ニ在テ準トスル
者自發至退四時ニ過ス二三日ヲ間メ
一作スル者毎ニ未申ノ間ニアリ或夜
晚更ニ多シ自發至退三時ニ過ス凡日
ニ一發作スル者惡寒時久間日作ルモ

ノ熱時久也大槩肝脾ヲ累スルモノ尤
多シ脾尤多ク肝ニ過ク肝脾生大ナル
トキハ則膨脹ノ原ト爲ス凡瘧證ノ原
蒿草敗禾ノ毒氣風吹テ人ニ傳染ス秋
收ノ期此證最多キ所以ナリ案ニ此論
尤精詳ト爲ス猶本書ヲ參看スヘシ
瘧ハ少陽部位ノ病ナレハ治法小柴胡
湯ヲ以テ套劑トナシテ出入加減ノ用
ヘシ大抵ハ柴平湯九味清脾湯ノ類ニ
宜シ熱多ハ柴胡去半夏加枳椇湯白虎
加桂枝湯寒多ハ柴胡姜桂湯疫瘧ニハ

柴苓湯達原飲勞瘧ニハ小柴胡加鷲甲湯若餘証アルトキハ斟酌加減ノ治スヘシ又截瘧ノ方冬シ輕キハ小柴胡湯柴陳湯ヲ露宿ノ用ヘシ重キハ常山湯虛人ハ獨參湯ニ宜シ又灸法モ効アリ大抵四五發ヲ待テ截スヘシ一二發ノ間病勢熾盛ナル片遽ニ截藥ヲ與ルハ宜シカラヌ又截藥ヲ服スルハ發日二時前ニ服スヘシ或早晨ニ服スルヲ宜トス

洋法ハ嘔納五六釐ヲ服シ二時ヲ過テ

後更ニ二三釐ヲ服ス日ニ二三或金嘔末毎服一二錢每次汗退後服之反復ヲ免ヘシ柴胡劑ヲ主用ノ兼テ出外信石酒ノ方アリ未試故ニ録セヌ又云若服藥不應宜ク他處ニ遷徙ノ水土ヲ改變スヘシ如貧人ハ遠遊ノ資ナシ亦宜別屋ニ移住スルヲ妙ト爲ヘシ此說特ニ瘧証ノミナラス甚佳ナリトス素問ニ移精變氣ノ論アリ孟子ニ居移性養易氣ノ類此亦治術ノ一端ナリ

○此症病後ノ調攝ヲ善シ房勞食餌ノ

禁戒ヲ嚴ニスヘシ然ラサレハ再發シ
或ハ他病ニ變シ易シ

小柴胡湯

即本方○若裁藥ト爲ストキハ生
薑ヲ倍ノ煎シ滓ヲ去リ益ニ入レ
前夜星月ノ下ニ露ノ發日ニ用ユ
ヘシ

柴平湯 瘧發時一身盡痛手足沈重寒

多熱少脈濡者各曰濕瘧

即小柴胡湯合平胃散

九味清脾湯 癰瘡脈來弦數但熱不寒

或熱多寒少口苦舌乾心煩渴水小便
黃赤大腑不利

青皮 厚朴 白朮 草菓

柴胡 茯苓 半夏 黃芩

甘草各等

右姜水煎服○或加檳榔

柴苓湯 傷風傷暑瘧大効

即小柴胡湯合五苓散

達原飲 疫瘧壯熱多汗而渴

黃芩 一錢 甘草 一錢 芍藥 一錢

知母 二錢 厚朴 一錢 檳榔 二錢

草菓 一考

右薑棗水煎發前熱服

柴陳湯 截瘧妙方

柴胡 五錢 陳皮 二錢 甘草 三分

右水二碗煎一碗臨發日五更空心温服已發時不可服

常山湯

常山 草菓 知母 檳榔各等

右水煎露宿ノ服ス發前二時ニ臨テ用ヘシ星月外ニ露ヲ器上ニ置カ

常山湯 截瘧

常山

右一味水煎露宿ノ發前ニ服ス○常山和名ヨクサキト云モノ良ナリ藥舖ノ品ハ土常山ニテ効ナシ

獨參湯 虛人截瘧

洋參即補廣東

右一味水煎曇子ニ入レ口ヲ固ク封ノ一夜井底ニ沈メ冷メ發前ニ服ス奇驗

阿魏丸 病瘧半年不愈者用此最効

阿魏 丹砂

右研末米糊為丸空心人參湯化服
灸刺法 大椎 膏肓 四花
刺手足十指間出血妙

山嵐瘴氣 霍亂吐瀉 肚腹疼痛 嘔吐酸水 傷風咳嗽 痰喘氣急 牙痛喉痛 耳痛目痛 一切瘡毒 疔瘡癰疽 跌打損傷 湯火灼傷 刀傷出血 止血生肌 萬應靈丹 功效如神 每服一丸 溫開水送下 忌食辛辣 生冷油膩 宜食清淡 飲食無忌 凡患此症 宜早服之 勿失良機 誠濟世之 靈丹也 每盒銀一 錢五分 凡貧苦 者減半 施送 凡有患 者請向 本堂購 取可也

