



門 卷 9
第 93
卷 20



卷二目次

疝氣
腹痛
諸氣
泄瀉
大小便血

奔豚
胸痺心痛
滯下
吐衄咳唾血



醫方類聚卷二 目次

醫方啓蒙卷二

東京 隱醫香城老人編述

疝氣

疝字說文ニ腹痛也トアリ劉熙釋名ニ
 モ疝詵也詵々然痛也顏師古急就章ニ
 モ腹中氣疾上下引也ト云金匱ニ寒疝
 腹痛ト稱シ王冰素問ニ寒氣結聚之所
 爲也ト注スル片ハ疝ノ寒ニ屬シテ腹
 中ノ痛ヲ爲ス其正證ナルヲ瞭然トシ
 明ナリ然レ疝病ノ變化ニ至テハ濕ニ

因ルアリ熱ニ因ルアリ是又其權証ニ
從テ治療ヲ爲サスンハアル可ラス其
腎ニ屬ン肝ニ屬シ及七疝々各ノ如キ
ハ治術ノ急務ニ非ラハ姑置テ論セス
其證候ハ少腹痛ヲ作シ或腰脇ニ攻刺
シ或背脊ニ遊走シ或冷氣心ニ搶テ心
下痛滿或手足厥冷臍ヲ繞テ痛ミ或脇
ノ左右孟々如ク或臍ノ上下臂ノ如ク
或腹中累々トヲ桃李ノ如ク或胃院ノ
間覆大盤ノ如ク壯熱惡寒スルアリ酒
浙寒熱スルアリ大小便ヲ得サルアリ

裏急ノ下利スルアリ白汗出ルアリ食
ヲ欲セサルアリ其陰間ニ於テハ卵ニ
大小アリ伸縮ノ上下常ナラス囊ニ腫
脹アリ急痛メ發歇定ラズ種々ノ證候
一ナラズ是其大畧ナリ婦人ニ疝ナシ
ト云ハ誤ニテ疝證アルヲハ諸書ニ詳
ナリ其脈ハ細小緊急ヲ常トノ其變態
ハ一槩ニ定カタシ西洋ノ書ニ小腸病
腹痛ト云モノ疝ニ近シ其說ニ曰小腸
病腹痛二種ニ分別ス輕キモノハ腹暴
ニ痛テ炎ナシ知熱痛其痛如絞忽作

忽止時有テ痛劇ク時アリテ稍安シ全
腹皆痛ムモノアリ痛一處ニ偏ナルモ
ノアリ或左或右或左右移動ノ按丁ヲ
喜ム脈常ノ如ク身無熱大便必秘ス腹
内ニ風氣アリテ或欲嘔或吐出ス此證
不拘男女四時皆有又初起輕漸重ニ變
スル者アリ云云此是變成炎証危險難
治ト云ヘリ又致病ノ原數端アリ或因
天時暴冷或感受雨濕汗管驟ニ閉或因
食酸果生瓜之類肚腹寒冷或因膽汁生
多味辣惱觸小腸或因大便久秘令小腸

不安皆能致此ナリ其小腸痙ト云腎囊
水痙ト云ハ陰痙又癩痙ノ一ナリ其証
候治法彼書ニ委シ茲ニ贅セス
治法ハ尋常ノ輕證烏苓通氣湯五苓散
加茴香苦楝子又柴胡桂枝湯ノ類ニ宜
シ温散ヲ要スルモノハ當歸建中湯當
歸四逆湯及加吳茱萸生姜湯ノ類又一
方當歸四逆湯吳茱萸加附子湯選用ス
ヘシ腹痛ノ劇キハ大黃附子湯烏頭桂
枝湯附子粳米湯蜜附子湯衝痙トテ心
下へ搶逆スル證ハ大建中湯解急蜀椒

湯若下ヲ取ラント欲セハ八味疝氣劑
借性丸ニ宜シ和血ノ劑ハ桃人當歸湯
洋家ニ云ラ小腸炎ノ証ハ大黃牡丹湯
復元通氣散ヲ佳トス洋方ノ外治法ハ
證ニ因テ採用メ可ナリ

烏苓通氣湯 一切疝氣无問遠近寒熱
風濕寒濕

- 烏藥 當歸 芍藥 山查子
- 香附 陳皮 茯苓 白朮
- 檳榔 玄胡索 澤瀉 木香
- 甘草 絡 三

右姜水煎服○或加吳茱萸
當歸四逆湯 臍腹疼痛相引腰股而痛

- 當歸 七分 附子 佳枝 茴香

- 柴胡 絡 芍藥 四分 茯苓 玄胡索

- 川棟子 絡 三 澤瀉 二分

右水煎服

吳茱萸加附子湯 寒疝腰痛牽引翠丸
屈而不伸脉沈遲

- 卽吳茱萸湯本方加附子 二

蜜附子湯 疝氣發作
於附子建中湯煎時加蜜一筋頭許

解急蜀椒湯 寒疝氣心痛如刺繞臍腹

中盡痛白汗出欲絕

蜀椒枚二百 附子一枚 粳米 乾姜碎

半夏擘二 大棗廿枚 甘草一兩

右水煎服

八味疝氣劑

桂枝 桃人 延胡 木通

大黃 烏藥 丹皮 牽牛子別末各

右水煎臨用點牽牛子末

桃仁當歸湯 疝因瘀血作痛

桃仁二錢 當歸 玄胡索各一錢半

川芎 地黃 芍藥 吳茱萸

青皮 牡丹皮八分

右薑水煎服

復元通氣散 小腸氣腎癰便毒腰疼氣

刺腿膝生瘡

延胡索 陳皮 白牽牛炒末 取

甘草略一 木香半兩 茴香

穿山甲二妙 各

右水煎服

借性丸 小腸氣下元閉塞不通

川棟子破一兩 烏和皮 巴豆一兩 碎殼

右同和勻入銚内炒令紫色取出去巴
豆只取川棟子淨刷研末爲丸每服十
丸服以得利下不妨

西洋外治法

罌粟殼ヲ用テ沸湯ニ沖シ布巾ニ浸
シ絞テ肚腹處ヲ合按スルト一二刻
或數刻ニメ能痛ヲ止ム若痛未止マ
サレハ酸醋ヲ用テ芥末ニ和シ畧滾
水ヲ加テ熬シ濃シ厚紙或布ニ攤シ
塊上ニ貼住スルト一二刻ナルヘシ

奔豚

難經ニ腎ノ積ヲ奔豚ト曰トアレ此
奔豚氣トハ自異ナリ此證ハ臍下ノ水
飲ヲ激動メ心下へ衝逆スルナリ其証
候ハ如豚奔走之狀ト云語ニテ形容ヲ
盡シタリ前人ノ論說モ別ニ發明ナシ
後世奔豚疝氣ト稱メ衝疝ナソノト
スルハ誤ナリ桂枝加桂湯桂苓甘棗湯
奔豚湯皆用テ効アリ又栝榔末ヲ與ル
ハ脚氣衝心ノ方ヲ活用シタルナリ今
前哲試驗ノ方一二ヲ左ニ録ス

奔氣湯 卒厥逆上氣氣支兩脇心下痛
滿淹淹欲絕此謂奔豚病氣從下上上
衝心胸臍間築々發動有時

甘草二兩 人參二兩 吳茱萸一升
生姜一斤 半夏一升 桂枝三兩

右水煎服

定悸飲 奔豚

李根皮二分 茯苓 桂枝

白朮一 吳茱萸五分 牡蠣二

甘草少許

右水薑煎服

壓氣散 奔豚氣上下衝走悶亂面青

栝榔三 羅敏一 薑汁半合

右件藥以童子小便一大盞入煎藥攪
令勻服

腹痛

腹痛ノ所因一チラス冷痛アリ熱痛アリ積痛アリ蟲痛アリ氣痛アリ血痛アリ感寒停食亦能腹痛ヲ爲ス奇効因感寒即食停不食停多食過渡而後停滯其原由同シカラス宜其証候ニ就テ方ヲ處スヘシ古人ノ說ニ痛通也宜通而塞則爲痛ト此說理アリト爲ス虛實ヲ辨スルノ法ハ手ヲ以テ重按メ不痛却テ按コヲ好者ハ氣痛ニ屬ス是ヲ溫ルニ宜シ按メ痛ミ手ヲ近ルヲ好マサ

腹痛

人

ルモノハ有積テ實ニ屬ス是ヲ攻ルニ
宜シ又形有テ痛常處アルハ血分ニア
リ無形ノ痛ニ定處ナキハ氣分ニアリ
又痛テ増減ナキハ寒ナリ時痛時止ハ
熱ナリ其脈ハ弦緊ヲ常候トノ滑實有
力ハ實邪ナリ虛弱無力ハ虛邪ナリ其
病ノ證候新久ニ因テ脈狀モ一樣ナラ
ストト知ヘシ又當臍痛モノハ燥屎アリ
トス小腹痛モノハ二便不通ノ證ナリ
西洋ニ小腸炎ト云ハ尤危険ノ證ナリ
其書ニ就テ考ヘシ

治法ハ小建中湯芍藥甘草湯邪氣アレ
ハ小柴胡湯四逆散ニ宜シ温中ニハ安
中散蟠葱散附子建中湯温下ニハ温脾
湯當歸大黃湯桂枝加大黃湯攻下ニハ
大柴胡湯承氣湯麻人丸ノ類選用スヘ
シ中ニ結實アリテ峻下スヘキニハ備
急丸走馬湯ナリ總テ痛甚キハ沈麝丸
又乳蠟散ヲ兼用ノ効アリ灸法熨法并
良ナリ

小建中湯 腹中切痛
即本方○加附子各附子建中湯

芍藥甘草湯 四時腹痛

即本方加姜煎

四逆散 熱鬱腹痛

即本方

安中散 遠年日近脾疼翻胃口吐酸水

寒邪之氣留滯於內停積不消脹滿攻

刺腹脇及婦人血氣刺痛

甘草炒 延胡索 良薑炒 茴香炒

肉桂各五兩 牡蠣四兩 乾薑炮

右水煎服○又為散熱酒或鹽湯下

蟠葱散 脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺

痛胸膈痞悶背膊拘急不思飲食

蒼朮 甘草半斤 玄胡索二兩

肉桂 乾姜炮 三稜 青皮

茯苓 莪朮各六兩 縮砂 丁香

檳榔各四兩

右連根葱白一莖水煎服

溫脾湯 腹痛臍下絞結繞臍不止

甘草 附子 人參 芒硝各二兩

當歸 乾姜各三兩 大黃五兩

右水煎服

當歸大黃湯 冷氣牽引腰背肋下腹內痛

當歸 三兩 芍藥 八分 桂枝 三分

乾姜 六分 吳茱萸 五分 人參

大黃 兩 甘草 二兩

右水煎服

沈麝丸 一切氣痛不可忍

沒藥 辰砂 血竭 木香 半兩

麝香 一錢 沈香 二兩

右熬甘草膏為丸姜鹽湯送下血氣醋

湯嚼下

乳蠟散 心脾疼不可忍

牡蠣 煨 研 乳香 研 細

右和勻沸湯調下

灸法 神闕 丹田 氣海

履法 腹痛不止冷汗自出手足厥冷

熟艾半斤白紙一枚ヲ以テ臍上ニ

鋪キ紙上ニ艾ヲ攤ケ勻ヘ又葱白

數枚ヲ取テ豎ニ割リ艾上ニ排シ

再白紙一枚ヲ以テ之ヲ覆ヒ慢火

熨斗ニテ熨之冷レハ易之腹中熱

ヲ覺テ綿帶ヲ以テ繫之冷時ヲ待

テ方ニ解ス

醫學綱目卷之三十一

胸痛心痛

胸痛心痛ハ一類二種ニ分ツナリ痺閉也ト訓メシヒレルコトハ非ス胸中痺閉窒塞シ胸背相徹ノ痛ナリ其甚キモノハ真心痛ニテ朝發夕死夕發朝死ス西洋ノ説ニ心暴痛如刺頃刻而死醫書其故ヲ詳ニセス大抵心力亂用シ或心房内ノ血暴ニ盡ルカ或心脉管病アリ或心房閉戸病アリ或心體本管病有テ血ノ養護ニ供スルニ足ラス今未定ヘカラス此證治法甚難ト云モノ是ナリ

醫學綱目卷之三十一 胸痛心痛

其脉候凡痛ノ甚キ寸ハ必沈伏スルナ
リ痛緩ナルトキハ浮數沈遲一十ヲス
又胃皖痛ハ心下ニアリ心痛ト同シカ
ラス辨別スヘシ又西洋ノ書ニ凡心痛
證應安養身體不可登山登樓不可遠行
辛勞不可思慮煩怒尤宜戒口戒酒色ト
云ハ實ニ確言ナリ

治法ハ括樓薤白半夏湯效アリ但白酒
今無シ醎醋ヲ代用ノ奇驗アリ小陷胸
湯加半夏亦良ナリ赤石脂禹餘糧丸モ
証ニ因テ兼用スヘシ其短氣スルモノ

茯苓杏仁甘草湯甚効アリ橘枳薑湯ニ
合スルモ亦佳ナリ今前哲ノ諸方此証
ニ應効アルモノ一二ヲ據テ左ニ列ス
括樓湯 胸痺短氣

白蘘 一枚 橘皮 二兩 半夏 一兩

枳實 二兩

右入生薑薤白水煎服

黃連湯 苦寒辛通

黃連 土瓜萋 白芥子 茯苓

半夏 橘皮 竹茹 絡等

右姜汁水煎

通氣湯 胸滿短氣噎塞

半夏 八兩 陳皮 三兩 吳茱萸 四兩

右水姜煎服

麝香散 胸痺

麝香 一兩 牛黃 半兩 犀角 一兩

右搗研為散溫酒調下

白礬散 急心痛

白礬 一錢

右為細末熱茶調服

諸氣

氣ニ七氣九氣アリ鬱ニ五鬱六鬱アリ
徒ニ其名義ヲ究ムルモ亦治術ニ益ナ
ケレハ茲ニ贅セス其證候多端紛絮ニ
ノ一舉カタシ舉ルモ亦盡スヘキニ
非ス大抵世ニ癩證ト云モノ多ハ氣道
不利ノ所致而婦人尤多シ男子モ亦有
リ其脈槩結滯ヲ見ス治法ニ至テハ疎
氣ニ宜キアリ降氣ニ宜キアリ利氣ニ
宜キアリ温散ニ宜キアリ今畧分類ヲ
為メ後ニ附ス當ニ其證ニ隨テ斟酌ノ

治ヲ施シテ可ナリ前人曰氣道壅滯ノ證胸襟洒落懷抱寬舒ニノ度ハ藥有效苟藏怒蓄怨藥亦何濟ント真ニ知言也
降氣

沈香降氣湯 陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿又脾氣上衝心膈堅滿肢體浮腫

香附子五斤 沈香一斤二
縮砂仁三斤 甘草七斤

右水煎服

沈香四磨湯 冷氣攻衝心膈疔痛脾胃

素弱食飲易傷嘔逆冷痰精神不清

沈香 木香 檳榔 烏藥

右濃磨水煎服○加枳殼大黃加六磨湯

五香散 升降諸氣宜利三焦疎導壅滯

諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤
木香 丁香 沈香 乳香

右水煎服

抑氣散 氣道壅滯不得升降脈盛氣粗或胸膈痰飲窒碍或脇肋肝氣逆滯凡氣實諸痛用此抑之

醫學方脈

烏藥 二兩 紫蘇 橘皮 檳榔 半斤

枳殼 縮砂 麝香 沈香 五錢 香附 半斤

右水煎服

勻氣散 氣滯不勻胸膈虛痞宿冷不消

心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心

白豆蔻 丁香 檀香 木香 各二兩

藿香葉 甘草 各五錢 縮砂仁 半斤

右水煎服

陳氣

理氣平肝散 七情所傷發瘕

烏藥 香附 各半斤 青皮 枳殼

芍藥 川芎 柴胡 木香 各一

甘草 五分

右薑水煎服

柴胡青黛湯 怒氣傷肝瀉肝火

柴胡 五分 青黛 五分 香附子 一錢

川芎 一錢 青皮 八分 黃連 八分

甘草 八分 梔子 八分

右水煎服

加味逍遙散 一切鬱證似虛者但其人

口苦嘔吐青水或苦水面青脇痛耳鳴

脉澹

醫學方脈

卷二

柴胡 芍藥 丹皮 陳皮

茯苓 當歸 白朮 貝母 絡

薄荷 七分

右水煎服○或加吳茱萸

利氣

四七湯 喜怒不節憂思兼并多生悲恐

或時振驚致藏氣不平增寒發熱心腹

脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙齶吐

嚔不下皆七氣所生

即半夏厚朴湯

右姜棗水煎

正氣天香湯 婦人一切諸氣作痛或上

湊心胸或攻築脇肋眩暈嘔吐

烏藥 二兩 香附 八兩 陳皮 紫蘇

乾姜 兩

右水煎服

三和散 五藏不調三焦不和心腹痞悶

脇肋膜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛

浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難

大腹皮 二兩 紫蘇 二兩 白朮 三分

獨活 一兩 沈香 一兩 木香 三分

甘草 三分 木瓜 一兩 橘皮 二分

枳殼 三分 川芎 二兩

右水煎服

溫散

七氣湯 虛冷七氣勞氣等

半夏 一升 人參 桂枝 甘草 各一兩

右薑水煎服

半夏散 藏腑虛冷心胸氣上勞乏不能

飲食

半夏 人參 白朮 桂枝 各一兩

厚朴 二兩 橘皮 三分 附子 沈香 各一兩

右薑水煎服

沈附湯 升降諸氣暖則宜流

附子 一隻

右水煎磨沈香入藥服

指迷七氣湯 七情相干陰陽不得升降

氣道壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 莪朮

桂枝 藿香 益智 各一兩

香附 半兩 甘草 三兩 半夏 三分

右姜棗水煎

醫方家卷二

下

滯下

滯下ハ今ノ痢疾ナリ内經ニ之ヲ腸澼ト名ク仲景ハ惟下利ト稱ス泄瀉ト相似テ同シカラス泄瀉ハ裏急後重ナシ又寒熱舌胎モ痢ノ如クナラス是ヲ以別ト爲ス其原因中ハ飲食停積外ハ邪氣中傷相合ノ病ヲ發ス故ニ夏秋ノ交此病多シ古人云無積不成痢ト正ニ此義ナリ初泄瀉ヨリ變スルアリ直ニ痢ト成ルアリ其證心腹絞痛恐ヘカラス或痛マサルモアリ下迫窘急裏急後重

醫方家卷二

滯下

七

登園頻數二三十度ヨリ百餘度ニ至ル
モノアリ所下或赤或白或赤白相雜ル
魚腸ノ如ク純肝ノ如ク或膿或血或膿
血相混淆スル是ヲ腸垢ト云古人赤ヲ
熱ト爲シ白ヲ寒ト爲セ凡必拘ル可ラ
ス正ニ他症ニ斷ノ決スヘシ又裏急ト
後重ト同シカラス裏急トハ腹裏拘急
ト云テ腹裏ノヒキハルヲナリ後重ト
ハ後肛重墜ト云テイキミノタツヲナ
リ是ヲ以テ二證ノ別ト爲ヘシ古諺ニ
飽死ノ痢病無シト云テ能食スルモノ

ハ輕ク食スル能サルハ重シ其脉ハ大
小遲數ヲ論セス總テ安靜ナルハ吉躁
動ノ象アルハ凶ト知ヘシ凡此病數種
アリ疫痢トテ疫熱ヲ兼タルアリ瘧痢
トテ虐ノ痢ヲ兼タルアリ血痢トテ純
血ヲ下スアリ噤口痢トテ飲食ヲ絶ス
ルアリ休息痢トテ年月ヲ隔テ屢發ス
ルアリ凡此等皆其証候ヲ詳ニメ治セ
サレハ性命ヲ誤ルヲ多シ爲醫者細心
究心セヌンハアル可ラス西洋ノ説ニ
痢証ハ大腸ノ内ニ炎紅腫前熱見痛タヌ炎ト

ヲ生スルニ因ル或一處或二三處アリ
小腸ニモ偶有レ凡但甚少耳ト云ヘリ
又云病直腸ニ在レハ裏急シ時ニ努擗
ノ出ルヲ得ス愈肛門ニ近ケレハ裏
愈急ナリ更ニ手ヲ以テ腹ヲ隔テ摸試
スルニ大腸ハ右臍骨ヨリ倒上メ上中
下三廻ニ分ツ上廻ハ小腸ニ横接シ中
廻ハ肝下ニ在リ横ニ胃底ニ過ク下廻
ハ脾下ニ至リ左軟脇ヨリ斜ニ落テ肛
門ニ至ル是ヲ直腸ト爲ス小腸ハ腹ノ
中ニ居ル何レノ處ヲ按メ更ニ痛メハ

即病ノ何レノ處ニ在ルヲ知ト云ヘリ
此說理アリト云ヘシ
痢ノ治法初起ハ表熱アレハ葛根湯又
葛根苓連湯ニ宜シ輕キハ逆挽湯升陽
除濕防風湯宜シ稍表ヲ過ルモノハ黃
芩湯黃芩加半夏生薑湯夫ヨリ裏ニ入
レハ下劑ニ宜シ大柴胡湯三承氣湯桃
核承氣湯選用スヘシ尋常ノ證ハ芍藥
湯檳榔順氣湯効アリ血痢ニハ黃連阿
膠湯白頭翁加甘草阿膠湯犀角散止瀉
スルハ斷痢湯霞片香連丸噤口痢ハ參

連湯連埋湯又金龍湯ハ奇方ナリ休息
痢ハ温脾湯効アリ泄ニ浮ニ痢後ノ調停
ハ六君子湯香參散枳實理中湯生姜瀉
心湯ノ類ニ宜シ西洋ノ方ハ用難シ凡
雞牛羊肉湯粥飯鮮魚俱可食鹽魚火煎
俱食不乳尤佳止瀉魚ト云ハ本草ニ鯽
魚作膾主久赤白痢ト云ノ意ニ合ス必
可チラシ又洋説ニ最他處ニ居ヲ遷シ
水土ヲ改變スルヲ妙トスト云是痢疾
ノミナラス
逆挽湯 一二日微熱泄瀉數十行而後

帶血裏急後重

蒼朮 一分 肉桂 一分 茯苓 八分
乾姜 八分 枳殼 五分 甘草 一分
人參 六分

右姜水煎服○腹痛加木香檳榔

升陽除濕防風湯 大便閉塞或裏急後

重數至固而不能便或少有白膿或少

有血慎勿刺之舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮 四兩 防風 二錢 白朮 扶苓

芍藥 已上 葛根 半錢 甘草 五分

右水煎服

芍藥湯 下痢膿血裏急後重腹痛作渴

日夜無度

芍藥 一兩 當歸 黃連 略半

檳榔 二錢 木香 二錢 甘草 二錢

大黃 三錢 黃芩 半兩 肉桂 半錢

右水煎服

檳榔順氣湯 下痢頻數裡急後重兼舌

胎黃得瘟疫之裡症者

檳榔 芍藥 枳實 厚朴

大黃

右姜水煎服

溫脾湯 下久赤白連年不止及霍亂冷

實不消

大黃 四兩 人參 甘草 乾姜 略

附子 一枚

右水煎服○或加桂枝

犀角散 熱毒痢痢血

犀角 末五 阿膠 四兩 黃蘗 四兩

艾葉 乾藍 各四

右水煎服○或以乾姜代乾藍

斷痢湯 胸心下伏水

半夏 一升 茯苓 甘草 龍骨 略

附子一兩 人參 黃連各三兩

大棗十二枚

右水煎服 霞片香連丸 久痢諸藥不効

黃連四兩 炒去吳茱萸 麩和 木香 八分

霞片 即 阿膠

右為末水丸白湯下

枳實理中湯

理中湯本方加枳實更加縮砂陳皮

木香豆蔻之類

連理湯

即理中湯加黃連茯苓

參連湯 一下痢噤口不食者

人參 五兩 黃連 一兩

右水煎

香參散 痢久積穢已蓋腹中不痛或微

痛不後重但滑溜不止

人參 白朮 茯苓 芍藥

白扁豆 陳皮 肉蓯 烏梅

木香 甘草 陳采

右水煎服滑溜加粟殼為末砂糖湯下

金龍湯 痢疾噤口病勢欲死者

金絲鯉魚化一尾重一二斤ナル
モノ如常治淨シ鹽醬葱ヲ用テ必
胡椒末三四錢ヲ入レ煮熟シ病人
ノ前ニ置テ之ヲ嗅シム吃セント
欲スレハ意ニ隨テ湯ヲ連テ食シ
ム一飽ノ病即根ヲ除ク屢治ノ効
アリ

泄瀉

泄瀉痢疾ノ辨ハ前帶下ニ詳ニセリ其
病源ハ脾胃ニ風冷濕氣ヲ客シ更ニ飲
食内傷生冷菓物等ヲ喫メ水穀不分消
導ノ權ヲ失テ泄瀉ヲ爲ナリ冷熱虛實
ノ別アレ凡寒ニ屬スルモノ多シ其熱
瀉ハ糞色赤黃彈響ノ疼ヲ作シ糞門焦
痛ノ口中煩渴小便赤澁不利スルナリ
總テ暴瀉ハ輕ク久瀉ハ重シ何トナレ
ハ暴瀉ハ元氣未タ衰ヘサレハナリ驚
瀉餐泄皆泄瀉ノ一證ナリ其他各目尚

多シ此外ニ暑瀉アリ食瀉アリ酒瀉アリ痢瀉アリ飯後瀉瀉アリ脾腎泄アリ其名ニ就テ其因ヲ察シ其証ヲ辨シ其治ヲ求ヘシ其脾腎泄ハ又五更瀉ト云テ毎日五更ノ初ニ洞瀉ス飲食ヲ節シ口味ヲ慎メハ但日間上半夜ノ無事ヲ得ルナリ五更ニ近テ必瀉ス此症老人ハ多ク難治トス泄瀉ノ脉狀ハ浮沈遲數ヲ論セス有力者胃氣強無力者胃氣弱トス是ヲ以虛實ノ一端ヲ知ルヘシ西洋ノ說ニ肝生膽汁太多能令大小腸

不安而瀉暑月最多又所瀉之水或黃或白或綠甚臭蓋膽汁太少則白太多則黃甚小兒則綠俱失其正此論漢人ノ未タ言ハサル所ナリ

治法理中湯五苓散理苓湯胃苓湯建理湯以上並豆蔻木香縮砂ノ類ヲ加ヘ或附子ヲ加フ又柴苓湯加味五苓散錢氏白朮散參苓白朮散ノ類總治也又腸胃濕毒ニ因ルハ胃風湯良シ熱瀉ニハ連理湯四苓散加黃連ニ宜シ五更瀉ハ七

成湯腎氣丸料加五味子効アリ酒瀉ハ

生薑瀉心湯葛根苓連湯ヲ用ヘシ中ニ積滯アルハ温脾湯或乾姜圓ヲ兼用ス

理苓湯 泄瀉 卽理中湯合五苓散

胃苓湯 夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散合平胃散

建理湯 泄瀉腹痛

小建中湯合理中湯

錢氏白朮散 吐瀉發熱咽乾口渴

人參 白朮 茯苓 葛根

藿香 木香 甘草 略五

右水煎

參苓白朮散 脾胃虛弱飲食不進多困

少力中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉

白扁豆 人參 茯苓 白朮

甘草 山藥 略二 蓮子肉 桔梗

薏苡仁 縮砂 略一

右水煎

柴苓湯 泄瀉發熱口渴裏虛之證

小柴胡湯合五苓散

右姜棗煎服

加味五苓散 伏暑熱二氣及胃濕泄瀉
注下或煩或渴或小便不利

茯苓 澤瀉 猪苓 白朮
肉桂啞 車前子半兩

右姜水煎服

胃風湯

風冷乘虛入客腸胃水穀不化
泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸胃
濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

芍藥 白朮 肉桂 人參
當歸 芎藭 茯苓各等

右粟米水煎服

連理湯

暑瀉內傷生冷
理中湯加黃連茯苓

右水煎服

七成湯

病愈後脈遲細而弱黎明或夜
半便作泄瀉者此命門真陽不足
破故紙三枚 附子一枚 五味子八分

茯苓一枚 人參一枚 甘草七分

右水煎服

溫脾湯

痼冷在腸胃間連年腹痛泄瀉
休作無時服諸熱藥不效宜先取去然
後調治易差不可畏虛以養病也

厚朴 乾薑 甘草 桂心

附子兩半 大黃四錢

右水煎服更以乾姜圓佐之

乾姜圓

乾薑 巴豆去心 大黃 人參各一

右蜜丸以前湯下

吐衄效唾血

吐衄效血唾血ノ證名目繁多論說紛紜
ナリト雖凡大抵體虛勞損酒食過度愁
憂思慮患怒氣逆ヨリ發スト云ニ過ス
其下行スルハ順ニメ治シ易ク上行ス
ルハ逆ニメ治シ難ト爲ス褚氏醫書ニ
云フ所簡易的切ニメ盡セリト謂ヘシ
其說ニ曰内熱スル寸ハ則上ハ喉ヲ蒸
シ下ハ大腸ヲ蒸メ小窾ヲ爲ス喉ニ窾
アレハ效血殺人腸ニ窾アレハ便血殺
人便血ハ猶止ムヘク效血ハ醫シ易カ

ラス又云喉ハ物ヲ停スス毫髪モ必咳
 ノ血喉ニ滲入ス愈滲ノ愈咳ス愈咳ノ
 愈滲ス此說符ニ西西澳溺ヲ飲メ八百ニ
 一死セス寒涼ヲ服スレハ百ニ一生セ
 ス此言誠ニ服膺スヘシ凡血証熱アル
 ハ治シ難ク熱ナキハ治シ易ト又吐
 血ト唾血トハ一類ニノ皆血ノ上湧ノ
 常道ヲ失スルナリ多ケレハ吐血シ少
 ケレハ唾血ス又衄血モ血溢ノ理ハ同
 シナリ只其竅ヲ異ニスルノミナリ
 其脉ハ沈細ニ宜ク浮數ヲ喜ス凡テ微

弱平緩ハ治シ易ク弦緊急實ハ治シ難
 トス西洋ノ説ニ欬血ノ一證人毎ニ其
 死ヲ慮ル其實ハ欬血是死證ナラス欬
 血ニ因テ肺壞レハ則死ヲ致スノ耳時
 ニ牙肉ノ出血或喉嚨ノ出血アリ誤認
 テ欬血ト爲ヘカラス凡血ヲ欬セント
 發スル先胸膈安カラス物アツテ傾壓
 スルカ如ク呼吸易カラス欬出ノ後痰
 中ニ混雜スルハ此血肺經ヨリ來ルヲ
 知ル蓋胃血ハ吐出シ大小腸血ハ瀉由
 シ肺血ハ欬出ス其理一也又云凡血泄

レテ氣管中ニ入テ氣管ヲ塞住スレハ
呼吸難艱ニメ大カヲ用テ效出セサル
コトヲ得ス此效血ノ由テ來ル所ナリ又
云天熱過度勉力操作ノ持重シ或言語
太多ク或大聲呼叫シ或跌打外傷ニ因
ル西國人壯健ナル者多シ效血多クハ
血ノ停滯ニ因ル虛メ泄出スルモノ較
少シ故ニ治宜ク放血スヘシ中土ハ則
虛メ而泄出ノ證多ト爲ス治法高枕安
臥寡言ニメ叫呼ヲ禁シ辛勞ヲ節スヘ
シ又云胃血ト肺血ト別アリ肺血ハ效

效出シ胃血ハ吐出ス肺血色紅胃血色
黒シ肺血痰アリ胃血ハ則或食フ所ノ
飯物ト齊ク出ツ且肺血少胃血多肺血
必者鮮紅但色俱ニ辨シ易キ也ト其言皆
是ナリ今治方ヲ別テ四款ト爲メ左ニ
列ス曰瀉下曰止過曰清涼曰溫住

瀉下

桃核承氣湯 吐血覺胸中氣塞上吐紫
血又積鬱火甚迫血上行爲衄數升餘

即本方

三黃瀉心湯

吐血衄血

即本方

犀角地黄湯 熱甚血積胸中

前方更加犀角生地黄

茜根散 吐血心躁煩悶

茜根 半兩 犀角 升麻 大黃

黃芩 甘草 各一

右水煎服

正過

花藥石散 五藏崩損湧噴而出成升斗

用此止之

花藥石 火煨研 為粉

右用童便調末服

黑散了 諸竅出血

蓮蓬 棕櫚 亂髮 並燒等分

右為末米飲調下

麝香散 鼻衄不止

白礬 枯過 龍骨 兩半 麝香 半字

右三味杵和勻先以冷水洗淨鼻內血

涕然後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥塞

鼻尤妙

阿膠散 肺破嗽血唾血

人參 茯苓 生芩 天門冬

五味子 阿膠 白芨格等

右姜棗水煎臨熟入白芨末服

西洋方 止血最妙

鉛散三五釐鴉片一二釐日服二三

次如無鉛散用白礬五七釐鴉片三

四釐溫水和服

清涼

小柴胡湯 男女諸熱出血血熱蘊隆

即本方○或加生地黄

犀角地黄湯 內瘀蓄血鼻衄吐血

芍藥三分 生地黄半斤 牡丹皮二兩

犀角屑一兩

右水煎服○或加黃芩大黃

涼血地黄湯 血熱上行或吐血或衄血

或下血一切失血

犀角二錢 生地黄五錢 芍藥五錢

牡丹皮二錢 黃連 黃芩各一錢

玄參一錢

右水煎服○或加大黃桃人

涼榮湯 吐衄諸血

生地黄 當歸 栝葉 蒲黃

芍藥 甘草 麥門冬 知母

黃藥分各等

右水煎服

輪迴酒元一名酒消瘀血止吐衄諸血

童子小便取十二歲以下無病者

右入生薑自然汁攪服

治鼻衄出血不止方

新汲水淋頭頂上并沒脚立效

溫佳

甘草乾薑湯 男子婦人吐紅之疾絕妙

即本方

理中湯 傷胃吐血

即本方

人參湯 吐血咯血

人參二兩

右水煎服

堅中湯 虛勞內傷嘔逆吐血

小建中湯加半夏

參附湯 嘔血吐血或血崩脫血盈盈

桶面色青慘六脉欲脫四肢厥冷或自

汗出危極者 附子二錢 人參一兩 姜灰八錢

右水煎服

附子理中湯 因冷飲中寒雜食生冷血
為寒凝而下必腹痛色晦淡
本方倍炮薑加酒黃連

斷紅飲 吐下血

當歸 八分 川芎 五分 蒲黃 二分

阿膠 八分 柏葉 一分 炒姜灰 七分

右水煎百草霜末點服

大小便血

大小便血其病因吐衄ト異ナラス惟血
ノ下竅ニ失スル耳然レ凡血ハ水ノ類
ナリ故ニ下ルヲ順ト爲シ上ルヲ逆ト
爲ス其治方モ彼是互ニ通用スヘシ但
小便血ニ血淋アリ大便血ニ痔血アリ
混看スヘカラス血淋ハ痛アリ尿血ハ
痛ス又大便血ハ腸胃ヨリ下ルナリ痔
血ハ肛門邊傍ニ一小竅アリテ出ルナ
リ是其別ト爲スヘシ又大便血ニ腸風
臟毒ノ二証アリ腸風ノ血ハ滑ニメ色

鮮ナリ臍毒ノ血ハ濁テ色黯ナリ又糞
前ヲ近血ト名ケ糞後ヲ遠血ト名ケ然
レ凡藥ハ互ニ用ユヘシ今方治ノ大畧
ヲ掲ク尋常ノ證ハ加減四物湯解毒四
物湯ニ宜シ下血久不愈ニハ平胃散効
アリ柏葉湯理物湯モ亦用ユヘシ尿血
ハ猪苓湯加車前子鹿茸散良シ尚欬血
門ノ方ヲ參用メ可ナリ

加減四物湯 腸風臍毒下血不止
生地黃 當歸 川芎 甘草
槐花 柏葉 荆芥 枳殼分等

右生姜烏梅水煎

解毒四物湯 大便下血不問糞前糞後
四物湯合黃連解毒湯更加地榆槐
花阿膠側柏葉
人參平胃散 大便下血百藥無効者
水方加人參

右水煎服

理物湯

卽理中湯四物湯併用

鹿茸散 小便尿血日夜不止

鹿茸酒洗生芩 當歸略

蒲黃 一合 冬葵子 兩炒 半四

右細末溫酒調服

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 蒲黃, 冬葵子, 酒, 調服, 大, 血, 不, 開, 其, 前, 其, 效]

