



門中武
雜 100
卷 1



重脩金匱要畧序



世稱余家不任仲景不用仲景吁冤
哉余求仲景於彙編而不落仲景之
巨釜嚼碎仲景而不生吞仲景自謂
善信仲景善用仲景也世之言仲景



或偏枯理中或膠柱公虎亦自謂善
但善用也以余觀之如牽馬之一毛謂
之馬也其於古仲景涉矣哉況復世
所謂仲景者特傷寒論耳凡仲景之
書正史不載數十卷傷寒其所以

治傷寒何與雜病哉世醫所以傷
寒治雜病圍柙方鑿難入必其措
乎仲景雜病書亡不復存僅有
金匱要畧三卷足以觀之既也代世
醫者不講求之真箇道云在遷其後

人所纂玉石混淆夫以世廢之傷寒固
然豈翅金匱若捨可於取而取傷寒
金匱何擇哉今坊間應刻金匱二書簡
錯文碎義不相接余每憾之近日余
門人袁亦中慙此意正謬共四百餘字

補瀕共五百字傳抄共百十五條其每
所秘考其姑仍舊中雖未能盡清
廓而比其故也條理洗然也使世之學
仲系共責傷寒於傷寒責難病於斯
書畏法如處如施方如脫免庶幾免

執一方待百病之拙吾耳世余所坐
於當世也是為序

壬戌之秋七月坐平安勝直惟寅
撰于篤敬齋中



金匱要略方叙

金匱要畧方蓋長沙雜病論之
遺而係後人之纂集玉石混
淆固不完璧矣方法出於長
沙氏者猶沙中拾金其不出
於長沙氏者亦古醫百言而為

雞肋以欺揚泚法存於續者哉余
從宋嘗校小本要略方已以于
世矣大本者為淺井翁之所校
也訛謬魯魚頗多頃日僱言校訂
正再壽之梨棗千鏤之書延津
之合翼与傷寒論永寶于世也

去弓調而後求勁烏馬服而後求良
烏是校正之勞余所不敢辭云尔
享和亭酉秋九月後孫徽書于

養浩堂之南窗



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '金匱要略' and '序']

新編金匱要畧方論序

雜一作卒

張仲景為傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷
雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王
洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要畧方二卷上
則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳
之士流纔數家耳嘗以對方證對者施之於人其効若神
然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備
國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱
玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒
之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以

廣其法以其傷寒文多節畧故取自雜病以下終於飲食
禁忌凡二十五篇除重複合二百六十二方勒成上中下
三卷依舊名曰金匱方論臣奇嘗讀魏志華佗傳云出書
一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚奇怪不
合聖人之經臣奇謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖
法屬我

盛且恭惟

主上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈
溢而萬物莫不盡和矣

太子右贊善大夫臣高保衡

尚書都官員外郎臣孫奇

尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上

仲景金匱錄岐黃素難之方近將千卷患其混雜
煩重有求難得故周流華裔九州之內收合奇異
摭拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救
療暴病使知其次第凡此藥石者是諸仙之所造
服之將來固無夭橫或治療不早或被師誤幸具
詳焉

宋學士王洙得是書於蠹簡林億等雖校理重刻
元金以來世寡經見諸家或載金匱方治多於他

書中得之耳不然何未有一人能語其顛末者嗟
予小子幸獲伏讀敢不寶惜山南真逸俞橋識

新編金匱要畧方論目錄

卷之上

臟腑經絡先後第一

痿濕喝第二

栝樓桂枝湯

葛根湯

麻黃杏仁湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

瓜蒂散

防己黃耆湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯 百合洗方 栝樓牡蠣散

百合滑石散 甘草瀉心湯 雄黃燻方

赤小豆當歸散 升麻鱉甲湯

癰病第四

鱉甲煎丸 白虎加桂枝湯 蜀漆散

附方

牡蠣湯 芫胡去半夏加栝樓湯 芫胡桂薑湯

中風歷節第五

侯氏黑散 風引湯 防風地黃湯

頭風摩散 桂枝芍藥知母湯 烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯 三黃湯 朮附湯 八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

桂枝五物湯 桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散 小建中湯 黃芪建中湯

大黃廔蟲丸 酸棗湯 薯蕷丸

附方

炙甘草湯 癩肝散

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾薑湯 射干麻黃湯 皂莢丸

厚朴麻黃湯 澤漆湯 麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯 桔梗湯 越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

生薑甘草湯 生薑湯 桂枝湯

桔梗白散 葶莖湯

奔豚氣第八

奔豚湯 桂枝加桂湯 茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

枳樓薤白酒湯 枳樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯 人參湯

茯苓杏仁甘草湯 橘皮枳實生薑湯

薏苡附子湯 桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸 九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯 附子粳米湯 厚朴三物湯

大芫胡湯 大承氣湯 大建中湯

大黃附子湯 赤丸 烏頭煎

當歸生薑羊肉湯 烏頭桂枝湯 桂枝湯

附方

瓜蒂散 芫胡桂枝湯 走馬湯

卷之中

五臟風寒積聚第十一

麻子仁丸 甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲咳嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯 五苓散 甘遂半夏湯

十棗湯 大青龍湯 小青龍湯 朮防已湯

朮防已加茯苓芒硝湯 澤瀉湯 厚朴大黃湯

小半夏湯 防已椒目葶藶大黃丸

小半夏加茯苓湯

附方

茯苓飲 茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味薑辛湯 桂苓去桂加薑辛夏湯

茯苓薑味辛仁湯 茯苓薑味辛夏仁黃湯

消渴小便利淋第十三

文蛤散 括萋瞿麥丸 蒲灰散

滑石白魚散 茯苓戎鹽湯 猪苓湯

水氣病第十四

防已黃耆湯

越婢湯

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

附子麻黃湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂薑草棗黃辛附湯

枳朮湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃滑石湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

豬苓散

四逆湯

小薤胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

薏苡附子敗醬散 大黃牡丹湯

王不留行散 排膿散

跌蹙手指臂膊轉筋陰狐疝蛇虫第十九

雞屎白散 蜘蛛散 甘草粉蜜湯 烏梅丸

卷之下

婦人妊娠第二十

桂枝茯苓丸 膠艾湯 當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸 當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散 當歸散 白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散 下瘀血湯 竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯 竹皮大丸

附方

三物黃芩湯 內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯 甘草小麥湯 溫經湯

土瓜根湯 旋覆花湯 大黃甘遂湯

抵當湯 礬石丸 紅藍花酒 當歸芍藥散

小兒疳虫蝕齒方 蛇床子散 狼牙湯

雜療第二十三

四時加減芫胡飲 長服訶梨勒丸

三物備急丸 紫石寒食散 救卒死方 共五方

救卒死而壯熱方 救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不救失便方 治尸蹇方 共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方 二方 救自縊死方 療中膈方

救溺死方 馬墜及一切筋骨損方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒方 治食鬱肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方 治食生肉中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方 二

治食馬肉中毒欲死方 二

治食噉蛇牛肉欲死方 三

治食牛肉中毒方 治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方二

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯀鯪魚中毒方 治食蠚中毒方

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方 食諸茵中毒悶亂欲死方

食躁或躁方 治誤食鈎吻殺人解之方

治誤食水菘若中毒方 治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方 治凡飲食中毒方

貪食食多不消必腹堅滿痛治之方

目錄終

新編金匱要略方論卷之上

漢張仲景著

晉 王叔和選次

○臟腑經絡先後病脉證第一 論十三首 脉證二條

問曰、上工治未病何也、師曰、夫治未病者、見肝之病、知肝傳脾、當先實脾、四季脾王、不受邪、即勿補之、中工不曉相傳、見肝之病、不解實脾、惟治肝也、夫肝之病、補用酸、助用焦苦、益用甘味之藥調之、酸入肝、焦苦入心、甘入脾、脾能傷腎、腎氣微弱、則水不行、水不行、則心火氣盛、則傷肺、肺被傷、則金氣不行、金氣不行、則肝氣盛、故實脾、則肝自愈、

微按心火氣盛之下當有心火氣盛四字

此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法，實則不在用之。經曰：虛虛實實，補不足，損有餘，是其義也。餘藏準此。

夫人稟五常，因風氣而生長。風氣雖能生萬物，亦能害萬物。如水能浮舟，亦能覆舟。若五臟元真通暢，人即安和。客氣邪風，中人多死。千般疾難，不越三條。一者經絡受邪，入臟腑為內所因也。二者四肢九竅血脈相傳，壅塞不通，為外皮膚所中也。三者房室金刃蟲獸所傷，以此詳之，病由都盡。若人能養慎，不令邪風干忤經絡，適中經絡，未流傳腑臟，即醫治之。四肢纔覺重滯，即導引吐納鍼灸膏摩，勿令九竅閉塞，更能無犯王法。禽獸疾傷房室，勿令竭乏，服

食節其冷熱，苦酸辛甘，不遺形體有衰，病則無由入其腠理。腠者，是三焦通會元真之處，為血氣所注。理者，是皮膚臟腑之文理也。

問曰：病人有氣色見於面部，願聞其說。師曰：鼻頭色青，腹中痛，若冷者死。一云腹中冷，苦痛者死。鼻頭色微黑者，有水氣；色黃

者，胸上有寒；色白者，亡血也。設微赤，非時者死。其目正圓者，瘞不治；又色青為痛，色黑為勞，赤為風，色黃者便難，色鮮明者有留飲。

師曰：病人語聲寂然，喜驚呼者，骨節間病；語聲喑喑然不徹者，心膈間病；語聲啾啾然，細而長者，頭中病。一作痛。

藏按赤字上當有色字

師曰、息搖肩者、心中堅、息引胸中上氣者、欬息張口短氣者、肺痿唾沫、

師曰、吸而微數、其病在中焦實也、當下之即愈、虛者不治、在上焦者、其吸促、在下焦者、其吸遠、此皆難治、呼吸動搖振振者、不治、

師曰、寸口脈動者、因其王時而動、假令肝王、色青、四時各隨其色、肝色青而反色白、非其時、色脈皆當病、

問曰、有未至而至、有至而不至、有至而不去、有至而太過、何謂也、師曰、冬至之後、甲子夜半、少陽起、少陽之時、陽始生、天得溫和、以未得甲子、天因溫和、此爲未至而至也、以

得甲子、而天未溫和、此爲至而不至也、以得甲子、而天大寒、不解、此爲至而不去也、以得甲子、而天溫如盛夏五六月時、此爲至而太過也、

師曰、病人脈浮者、在前、其病在表、浮者在後、其病在裏、腰痛背強、不能行、必短氣而極也、

問曰、經云、厥陽獨行、何謂也、師曰、此爲有陽無陰、故稱厥陽、

問曰、寸脈沉大而滑、沉則爲實、滑則爲氣、實氣相搏、血氣入臟即死、入腑即愈、此爲卒厥、何謂也、師曰、唇口青、身冷、爲入臟、即死、如身和汗自出、爲入腑、即愈、

問曰脉脫入臟卽死入腑卽愈何謂也師曰非爲一病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治病在外者可治入裏者卽死

問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛陰病十八何謂也師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急五臟病各有十八合爲九十病人又有六微微有十八病合爲一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏繫飢之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脉浮寒令脉急霧傷皮膚濕流關節

食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

問曰病有急當救裏救表者何謂也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也○夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

師曰五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者爲病病者素不應食而反暴思之必發熱也○夫諸病在臟欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯餘皆倣此

思一作食

○痙濕暍病脉證治第二

論一首方十一首

脉證十二條

解字下
一有其
字
如一作
而

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧一作瘧○太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧○太陽病發熱脈沉而細者名曰瘧為難治○太陽病發汗太多因致瘧○夫風病下之則瘧復發汗必拘急○瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也若發其汗者寒濕相搏其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇一云其脈滄滄○暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧○夫瘧脈按之緊如弦直上下行一作築二而弦脈經云瘧家其脈伏堅直上下○瘧病有灸瘡難治○脈

脈經云
云十二
字當刪
去

經云瘧家其脈伏堅直上下

太陽病其證備身體強几几然脈反沉遲此為瘧括樓桂枝湯主之

括樓桂枝湯方

括樓根二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩

生薑三兩 大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥發之

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之

葛根湯方、

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節

桂 二兩 去皮

芍藥 二兩

甘草 二兩 炙

生薑 三兩

大棗 十二枚

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌、

瘥為病、一本瘥字上有剛字

胸滿口噤卧不着席脚攣急必齟齬可與大承氣湯、

大承氣湯方、

大黃 四兩 酒洗

厚朴 半斤 炙 去皮

枳實 五枚 炙

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下止服、

大陽病關節疼痛而煩脉沉而細一作緩者此名濕痺、王函云中

濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便○濕家之為病一身盡疼、一云疼煩發熱身色如熏黃也○濕家其人

但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦或胸滿小便不利、一云利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得

飲而不能飲則口燥煩也○濕家下之額上汗出微喘小便利、一云不利者死若下利不止者亦死○風濕相搏一身盡

疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也○濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈脈經云病人喘而無濕家病以下至而喘十三字○濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃加朮湯方

麻黃	<small>三兩 去節</small>	桂枝	<small>二兩 去皮</small>	甘草	<small>二兩 炙</small>	杏仁	<small>七十箇 去皮尖</small>
白朮	<small>四兩</small>						

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃	<small>去節半 兩湯泡</small>	甘草	<small>一兩 炙</small>	薏苡	<small>半兩</small>	杏仁	<small>十箇去 皮尖炒</small>
右剉麻豆大每服四錢匕水一盞半煮八分去滓溫服有微汗避風							

風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之防已黃耆湯方

防已一兩

甘草半兩

白朮七錢

黃耆一兩一分

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半

煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃兩半胃中

不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分下有陳寒

者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐

被上又以一被繞腰以下溫令微汗差

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴

脈浮虛而濡者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者

去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯方

身解一作骨節

桂枝四兩

生薑三兩

附子三枚

甘草二兩

大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯方

白朮二兩

附子一枚

生薑一兩

大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身

痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是朮附

竝走皮中逐水氣未得除故耳

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短

氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之、

甘草附子湯方

甘草 二兩 炙

附子 二枚 炮 去皮

白朮 二兩

桂枝 四兩 去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙、

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒 二然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口前開板齒燥若發其汗則其惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚、

前開一作開前一惡寒上一無其字

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之、

白虎人參湯方、

知母 六兩

石膏 一斤 碎

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物瓜蒂湯主之、

一物瓜蒂湯方、

瓜蒂 二七 筒

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

○百合狐惑陰陽毒病證治第三 論一首 脉證三條 方十二首

論曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或有不欲聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之、百合病發汗後者百合知母湯主之、

然一作點

千金微作後

百合知母湯方、

百合 七枚 擘 知母 三兩 切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服、百合病下之後者滑石代赭湯主之、

滑石代赭湯方、

百合 七枚 擘 滑石 三兩 碎 綿裹 代赭石 彈丸大一枚 綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一

按外 甚滑石 上有百 合二字

升去滓後合和重煎取一升五合分温服、
百合病吐之後者用後方主之、

百合雞子湯方、

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水
二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分温服、

百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黄湯主之、

百合地黄湯方、

百合七枚 生地黄汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二

升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分温再服
中病勿更服大便當如漆

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之、

百合洗方

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮
餅勿以鹽豉也、

百合病渴不差者用後方主之、

括蕒牡蠣散方、

括蕒根 牡蠣熬等分

右為細末飲服方寸匕日三服、

百合病變發熱者原注一作發寒熱百合滑石散主之

百合滑石散方

百合一兩 滑石三兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

百合病見於陰者以陽脈經法救之見於陽者以陰法救

之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦

為逆○狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起

不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面

目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝一作甘草瀉心湯主

之脈經瀉心湯

微按脈經陽法作陰法陰法作陽法微按脈源目下有筆字

甘草瀉心湯方

甘草四兩 黃芩 人參 乾薑各三兩

黃連一兩 大棗十二枚 半夏半斤

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

蝕於下部則咽乾苦參湯洗之

蝕於肛者雄黃熏之

雄黃熏方

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之

病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目

赤如鳩眼七八日目四眦一本此黑若能食者膿已成也

再煎下三升三有取字 雄黃上有散字 雄黃上有散字 雄黃上有散字 雄黃上有散字

皆一本作周

赤小豆當歸散主之、

赤小豆當歸散方、

赤小豆

三升浸令芽出曝乾

當歸

關千金云三兩十兩

右二味杵為散漿水服方寸七日三服、

陽毒之為病、面赤斑斑如錦、咽喉痛唾膿血、五日可治、七日不可治、升麻鱉甲湯主之、

陰毒之為病、面目青、身痛如被杖、咽喉痛、五日可治、七日不可治、升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之、

升麻鱉甲湯方、

升麻

二兩

當歸

一兩

蜀椒

炒去汗一兩

微按本細目三升下有水字

微按弦緊下有數字千金同浮或作

甘草

二兩

鱉甲

手指大一片炙

雄黃

半兩研

右六味以水四升、煮取一升、頓服之、老小再服取汗、

肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯無雄黃

○瘡病脉證并治第四

證二條方六首

師曰、瘡脉自弦、弦數者多熱、弦遲者多寒、弦小緊者下之、差、弦遲者可溫之、弦緊者可發汗針灸也、浮大者可吐之、弦數者風發也、以飲食消息止之、

病瘡以月一日發、當以十五日愈、設不差、當月盡解、如其不差、當云何、師曰、此結為癥瘕、名曰瘡母、急治之、宜鱉甲煎丸、

驚甲煎丸方

驚甲 十二分

鳥扇 三分

黃芩 三分

柴胡 六分

鼠婦 三分

乾薑 三分

大黃 三分

芍藥 五分

桂枝 三分

葶藶 一分

石韋 三分

厚朴 三分

牡丹 五分

瞿麥 二分

紫葳 三分

半夏 一分

人參 一分

麈蟲 五分

阿膠 三分

蜂窠 四分

赤消 十二分

蜣螂 六分

桃仁 二分

右二十三味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半着驚甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服

師曰陰氣孤

素問作先

絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤

淵音手足

熱而欲嘔名曰癰瘡若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消鑠脫肉

溫瘡者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之

白虎加桂枝湯方

知母 六兩

甘草 二兩

石膏 一斤

粳米 二合

桂枝 三兩

右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

按千金作六合云五味一斗以水煮成湯一服去滓溫服三服

牝或作

微按一
本蜀漆
下洗發
作臨發
時服一
錢在七
半字上
錢字下
一錢有
字下

瘡多寒者名曰牡瘡蜀漆散主之

蜀漆散方

蜀漆燒去

雲母燒二日夜

龍骨等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢○溫瘡加蜀漆

半分臨發時服一錢七一方雲母作雲實

附外臺秘要方

牡蠣湯治牡瘡

牡蠣熬四兩

麻黃去節四兩

甘草二兩

蜀漆三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

二或作三

此胡去半夏加括蕒湯治瘡病發渴者亦治勞瘡

此胡八兩

人參

黃芩

甘草各三兩

括蕒根四兩

生薑二兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

此胡桂薑湯治瘡寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

此胡半斤

桂枝三兩去皮

乾薑二兩

括蕒根四兩

黃芩三兩

牡蠣三兩熬

甘草二兩灸

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫

服一升、日三服、初服微煩、復服汗出便愈、

○中風歷節病脉證并治第五

論一首 脉證三條 方十二首

夫風之為病、當半身不遂、或但臂不遂者、此為痺、脉微而數、中風使然。○寸口脉浮而緊、緊則為寒、浮則為虛、寒虛相搏、邪在皮膚、浮者血虛、絡脉空虛、賊邪不瀉、或左或右、邪氣反緩、正氣即急、正氣引邪、喎僻不遂、邪在於絡、肌膚不仁、邪在於經、即重不勝、邪入於腑、即不識人、邪入於臟、舌即難言、口吐涎、

侯氏黑散治大風四肢煩重、心中惡寒不足者、外臺治風癩

侯氏黑散風引湯防己地黃湯

菊花

四十

白朮

十

細辛

三

茯苓

三

牡蠣

三

桔梗

八

防風

十

人參

三

礬石

三

黃芩

五

當歸

三

乾薑

三

芎藭

三

桂枝

三

右十四味、杵為散、酒服方寸匕、日一服、初服二十日、溫酒調服、禁一切魚肉大蒜、常宜冷食、六十日止、即藥積在腹中不下也、熱食即下矣、冷食自能助藥力、

寸口脉遲而緩、遲則為寒、緩則為虛、榮緩則為亡血、衛緩則為中風、邪氣中經、則身癢而隱疹、心氣不足、邪氣入中、則胸滿而短氣、

風引湯除熱癰、

頭風摩散礬石湯諸方盡係附方

大黃 乾薑 龍骨各四兩 桂枝三兩

甘草 牡蠣各二兩 寒水石 滑石

赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各六兩

右十二味，杵麤篩，以韋囊盛之，取三指撮，并花水三升，

煮三沸，溫服一升。治大人風引，少小驚癇，痲痺，日數十發，醫所不療，除熱方。巢氏云：脚氣宜

風引湯

防已地黃湯，治病如狂狀，妄行獨語不休，無寒熱，其脉浮

防已錢一 桂枝三錢 防風三錢 甘草錢一

右四味，以酒一盃漬之一宿，絞取汁，生地黄二斤，咬咀

蒸之，如斗米飯久，以銅器盛其汁，更絞地黄汁，和分再

服、

頭風摩散方、

大附子一枚 炮 鹽等分

右二味為散，沐了，以方寸七，已摩疾上，令藥力行、

寸口脉沉而弱，沉即主骨弱，弱即主筋，沉即為腎弱，弱即為肝、

汗出入水中，如水傷心，歷節黃汗出，故曰歷節、

跌陽脉浮而滑，滑則穀氣實，浮則汗自出、

少陰脉浮而弱，弱則血不足，浮則為風，風血相搏，即疼痛

如掣，盛人脉濇小，短氣自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲

酒汗出當風所致、

微按自一作白 無 十八字 田以下 一章汗 筋通為 酸則傷 下文味 為肝接 以弱即 字脉經 金無已 微按千

諸肢節疼痛、身體尪羸、脚腫如脫、頭眩短氣、温温欲吐、桂枝芍藥知母湯主之。

桂枝芍藥知母湯方、

桂枝 兩四 芍藥 兩三 甘草 兩二

麻黃 兩二 生姜 兩五 白朮 兩五

知母 兩四 防風 兩四 附子 兩二

右九味、以水七升、煮取二升、温服七合、日三服、

味酸則傷筋、傷則緩、名曰泄、鹹則傷骨、骨傷則痿、名曰枯、枯泄相搏、名曰斷泄、榮氣不通、衛不獨行、營衛俱微、三焦無所御、四屬斷絕、身體羸瘦、獨足腫大、黃汗出、脛冷、假令

發熱、便為歷節也、

病歷節、不可屈伸、疼痛、烏頭湯主之、

烏頭湯方、治脚氣疼痛、不可屈伸、

麻黃 芍藥 黃氏 各三兩 甘草 三兩

川烏 五枚 取一升即出烏頭

右五味、咬咀四味、以水三升、煮取一升、去滓、內蜜煎中、更煎之、服七合、不知、盡服之、

礬石湯、治脚氣冲心、

礬石 兩二

右一味、以漿水一斗五升、煎三五沸、浸脚良、

治脚氣
九字
當刪去

附方

古今錄驗續命湯治中風痲身、體不能自收、口不能言、冒昧不知痛處、或狗急不得轉側。姚云與大續命同兼治婦人產後去血者及老人小兒

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

各二兩

芎藭

一兩五錢

杏仁

四十枚

右九味以水一斗、煮取四升、溫服一升、當小汗、薄覆脊、憑几坐、汗出則愈、不汗更服、無所禁、勿當風、并治但伏不得卧、欬逆上氣、面目浮腫。

千金三黃湯治中風手足拘急、百節疼痛、煩熱心亂、惡寒、經日不欲飲食。

麻黃

五錢

獨活

四錢

細辛

二錢

黃芪

二錢

黃芩

三錢

右五味以水六升、煮取二升、分溫三服、一服小汗、二服大汗、心熱加大黃二分、腹滿加枳實一枚、氣逆加人參三分、悸加牡蠣三分、渴加括蔞根三分、先有寒加附子一枚。

近効方、朮附湯治風虛頭重眩苦極、不知食味、暖肌補中益精氣。

白朮

二兩

附子

一枚半炮去皮

甘草

一兩炙

右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盞半煎七分去滓溫服

崔氏八味丸治脚氣上入小腹不仁

乾地黄兩八

山茱萸

薯蕷各四兩

澤瀉

茯苓

牡丹皮各三兩

桂枝

附子炮各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

千金方越婢加朮湯治肉極熱則身體津脫腠理開汗

大泄厲風氣下焦脚弱

麻黃兩六

石膏斤半

生薑三兩

甘草兩二

白朮兩四

大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風加附子一枚炮

○血痺虛勞病脉證并治第六論一首方九首 脉證九條

徽按病源無重字

問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出臥不特動搖加被微風遂得之但以脉自微澹在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃耆桂枝五物湯主之

黃耆桂枝五物湯方

黃耆三兩

芍藥三兩

桂枝三兩

生薑六兩

大棗十二枚

微按目眩病源作目眩痛

右五味以水六升、煮取二升、溫服七合、日三服。一方有人參
夫男子平人、脉大為勞、極虛亦為勞。○男子面色薄者、主渴及亡血、卒喘悸、脉浮者、裏虛也。○男子脉虛沉弦、無寒、熱、短氣、裏急、小便不利、面色白、時目瞋、兼衄、小腹滿、此為勞使之然。○勞之為病、其脉浮大、手足煩、春夏劇、秋冬瘥、陰寒精自出、酸削不能行。○男子脉浮弱而瀦、為無子、精氣清冷。一作冷○夫失精家、小腹弦急、陰頭寒、目眩、髮落、脉極虛、芤遲、為清穀亡血、失精、脉得諸芤、動微緊、男子失精、女子夢交、桂枝龍骨牡蠣湯主之、

桂枝加龍骨牡蠣湯方

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩

大棗 十二枚 龍骨 各三兩 牡蠣 各三兩

右七味以水七升、煮取三升、分溫三服、

天雄散方、

天雄 三兩炮 白朮 八兩 桂枝 六兩 龍骨 三兩

右四味、杵為散、酒服半錢匕、日三服、不知稍增之、

男子平人、脉虛弱、細微者、善盜汗也。○人年五六十、其病脉大者、痺俠背行、若腸鳴、馬刀俠瘦者、皆為勞得之、瘦脉沉小遲、名脫氣、其人疾行則喘喝、手足逆寒、腹滿甚則澹泄、食不消化也。○脉弦而大、弦而大、弦則為減、大則為芤、

微按喝脉經作渴

減則為寒、訖則為虛、虛寒相搏、此名為革、婦人則半產漏下、男子則亡血失精、

虛勞裏急、悸衄、腹中痛、夢失精、四肢痠痛、手足煩熱、咽乾口燥、小建中湯主之、

小建中湯方、

桂枝 三兩 去皮 甘草 三兩 炙 大棗 十二枚

芍藥 六兩 生薑 二兩 膠飴 一斤

右六味以水七升、煮取三升、去滓、內膠飴、更上微火、消解、溫服一升、日三服、嘔家不可用建中湯以甜故也

虛勞裏急、諸不足、黃耆建中湯主之、於小建中湯內加黃耆一兩半、餘依上法

虛勞腰痛、少腹拘急、小便不利者、八味腎氣丸主之、方見脚氣中

薯蕷丸方、

薯蕷 三十斤 當歸 桂枝 麴

乾地黄 豆黃卷 各十斤 甘草 二十斤 人參 七斤

芍藥 芎藭 白朮 麥門冬

杏仁 各六分 芫胡 桔梗 茯苓 各五分

阿膠 七分 乾薑 三分 白斂 二分 防風 六分

大棗 百枚 為膏

右二十一味、末之、煉蜜和、丸如彈子、大空腹酒服一丸、

一百丸為劑、

虛勞、虛煩不得眠、酸棗湯主之、

酸棗湯方、

酸棗仁 二升

甘草 一兩

知母 二兩

茯苓 二兩

芎藭 二兩

右五味以水八升、煮酸棗仁、得六升、內諸藥、煮取三升、分溫三服、

五勞、虛極、羸瘦、腸滿不能飲食、食傷、憂傷、飲傷、房室傷、饑傷、勞傷、經絡營衛氣傷、內有乾血、肌膚甲錯、兩目黯黑、緩中補虛、大黃蟻蟲丸主之、

大黃蟻蟲丸方、

大黃 十分

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 一升

芍藥 四兩

乾地黄 十兩

乾漆 一兩

蟻蟲 一升

水蛭 百枚

蟻蠶 一升

蟻蟲 半升

右十二味、末之、煉蜜為丸、小豆大、酒飲服五丸、日三服

附方

千金翼炙甘草湯、一云復脈湯治虛勞不足、汗出而悶、脈結

悸、行動如常、不出百日、危急者十一日死、

甘草 四兩

桂枝

生薑 各三兩

麥門冬 半升

麻仁 半升

人參

阿膠 各二兩

大棗 三十枚

生地黃介一

右丸味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫服一升日三服

肘後獺肝散治冷勞又主鬼疰一門相染

獺肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

○肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

論三首 脉證四條 方十六首

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又快藥下利重亡津液故得之○日寸口脉數其人欬口中反

徽按章首脉經有問字

有濁唾涎沫者何師曰為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰欬唾膿血脉數虛者為肺痿數實者為肺癰○問曰病欬逆脉之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死其脉何類師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於營吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可採膿成則死○上氣面浮腫看息其脉浮大不治又加利尤甚○上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

肺痿吐涎沫而不效者，其人不渴，必遺尿，小便數，所以然者，以上虛不能制下故也。此為肺中冷，必眩多涎唾，甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者，屬消渴。

甘草乾薑湯方、

甘草 四兩 炙 乾薑 二兩 炮

右咬咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服。

欬而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之。

射干麻黃湯方、

射干 十三枚 一作三兩 麻黃 四兩 生薑 四兩 細辛

紫菀 各三兩 欬冬 花 各三兩 五味子 半升 大棗 七枚

半夏 大者洗八枚 一作半升

右九味，以水一斗二升，先煮麻黃兩沸，去上沫，內諸藥，煮取三升，分溫三服。

欬逆上氣，時時唾濁，但坐不得眠，皂莢丸主之。

皂莢丸方、

皂莢 八兩 刮去皮用酥炙

右一味，末之，蜜丸，梧子大，以棗膏和湯服，三丸，日三夜一服。

欬而脈浮者，厚朴麻黃湯主之。

厚朴麻黃湯方、

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如雞子大

杏仁半升 半夏半升 乾薑二兩

細辛二兩 小麥一升 五味子半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服

脉沉者澤漆湯主之

澤漆湯方

半夏半升 紫參五兩一作紫苑 澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生薑五兩 白前五兩 甘草

黃芩 人參 桂枝各三兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

麥門冬湯方

麥門冬七升 半夏一升 人參二兩

甘草二兩 粳米三合 大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶熬令黃色鴉丸如彈丸大 大棗十二枚

微按七升千金作二升

右先以水三升、煮棗取二升、去棗內葶藶、煮取一升、頓服、

欬而胸滿、振寒、脉數、咽乾、不渴、時出濁唾、腥臭、又吐膿、如米粥者、為肺癰、桔梗湯主之、

桔梗湯方、

桔梗一兩 甘草二兩

右二味、以水三升、煮取一升、分溫再服、則吐膿血也、

欬而上氣、此為肺脹、其人喘、目如脫狀、脉浮大者、越婢加半夏湯主之、

越婢加半夏湯方、

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩

大棗十五枚 甘草二兩 半夏半升

右六味、以水六升、先煮麻黃、去上沫、內諸藥、煮取三升、分溫三服

肺脹、欬而上氣、煩躁而喘、脉浮者、心下有水、小青龍加石膏湯主之

小青龍加石膏湯方、千金更加脇下痛、引缺盆

麻黃 芍藥 桂枝

細辛 甘草 乾薑各三兩

五味子 半夏各半升 石膏二兩

右九味、以水一斗、先煮麻黃、去上沫、內諸藥、煮取三升、強人服一升、羸者減之、日三服、小兒服四合、

微按徐
鑿云干
金甘艸
作二兩

附方

外臺炙甘草湯治肺痿涎唾多心中温温液液者方見虛勞
千金甘草湯

甘草

右一味以水三升煮減半分温三服

千金生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生薑

五兩

人參

三兩

甘草

四兩

大棗

十五枝

右四味以水七升煮取三升分温三服

千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

皂莢

二枚去皮子炙焦

右五味以水七升微微火煮取三升分温三服

外臺桔梗白散治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出

濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗

貝母

各三分

巴豆

一分去皮熬研如脂

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者

吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定

千金葶苈湯治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

葶苈

二升

薏苡仁

半升

桃仁

五十枚

瓜瓣

二升

右四味以水一斗先煮葶苈得五升去滓內諸藥煮取

二升服一升再服當吐如膿

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

○奔狫氣病脉證治第八 論二首 方三首

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之○師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸

半夏

各二兩

四兩

黃芩

二兩

生葛

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貴豚氣從小腹上至心炙其核上各一壯與桂枝加桂湯主之

桂枝加桂湯方

桂枝

五兩

芍藥

三兩

甘草

三兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升

發汗後臍下悸者欲作貴豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤

甘草 二兩

大棗 十五枚

桂枝 四兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

胸痺心痛短氣病脉證治第九 論一首 方十首 脉證一條

師曰夫脉當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也○平人無寒熱短氣不足以息者實也○胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沉而遲關上小緊數

用後方主之

栝蒌薤白白酒湯方

栝蒌實 一枚

一枚

薤白 半斤

白酒 七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得卧心痛徹背者栝蒌薤白半夏湯主之

栝蒌薤白半夏湯方

栝蒌實 一枚

一枚

薤白 三兩

半夏 半斤

白酒 一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心中痞留氣結在胸膈滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

枳實薤白桂枝湯方、

枳實 四枚

厚朴 四兩

薤白 半斤

枳實 一枚

桂枝 一兩

右五味、以水五升、先煮枳實厚朴、取二升、去滓、內諸藥、煮數沸、分溫三服、

人參湯方

人參

甘草

乾薑

白朮

各三兩

右四味、以水八升、煮取三升、溫服一升、日三服、

胸痺、胸中氣塞、短氣、茯苓杏仁甘草湯主之、橘枳薑湯亦主之、

茯苓杏仁甘草湯方、

茯苓 三兩

杏仁 五十箇

甘草 一兩

右三味、以水一斗、煮取五升、溫服一升、日三服、不差更服、

橘枳薑湯方、

橘皮 一斤

枳實 三兩

生薑 半斤

右三味、以水五升、煮取二升、分溫再服、肘後千金云治胸痺、胸中幅幅
如滿噎塞習習如癢、喉中漉唾燥沫

胸痺緩急者、薏苡附子散主之、

薏苡附子散方、

薏苡仁十五兩 大附子十枚

右二味杵為散服方寸七、日三服、

心中痞諸逆、心懸痛、桂枝生薑枳實湯主之、

桂薑枳實湯方、

桂枝各三兩 生薑各三兩 枳實五枚

右三味以水六升、煮取三升、分溫三服、

心痛徹背、背痛徹心、烏頭赤石脂丸主之、

赤石脂丸方、

蜀椒一兩一分 烏頭一分 附子半兩一分

乾薑一兩一分 赤石脂一兩一分

一枚作兩

九痛丸上脫附方字

右五味末之、蜜丸如梧子大、先食服一丸、日三服、不知稍加服、

九痛丸治九種心痛、

附子三兩 生狼牙一兩 巴豆一兩

人參 乾薑 吳茱萸各一兩

右六味末之、煉蜜丸如梧子大、酒下、強人初服三丸、日

三服、弱者二丸、○兼治卒中惡、腹脹痛、口不能言、又治

連年積冷流注、心胸痛、並冷腫上氣、落馬墜車血疾等

皆主之、忌口如常法、

○腹滿寒疝宿食病脉證治第十論一首 脉證十

六條 方十五首

全圖要略 卷之五
跌陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩脚疼痛此虛寒
從下上也當以溫藥服之○病者腹滿按之不痛為虛痛
者為實可下之舌黃未下者下之黃自去○腹滿時減復
如故此為寒當與溫藥○病者痿黃躁而不渴胸中寒實
而利不止者死○寸口脉弦者即脇下狗急而痛其人嗇
嗇惡寒也○夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善
嚏○中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒云
痛○夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣
必衝不衝者心下則痞也

病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

厚朴七物湯方

厚朴

半斤

甘草

大黃

各三兩

大棗

十枚

枳實

五枚

桂枝

二兩

生薑

五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加
半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子粳米湯方

附子

一枚炮

半夏

半升

甘草

一兩

大棗

十枚

粳米

半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

痛而閉者厚朴三物湯主之、

厚朴三物湯方、

厚朴 八兩

大黃 四兩

枳實 五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利為度、

按之心下滿痛者此為實也當下之宜大芫胡湯主之

大芫胡湯方、

芫胡 半斤

黃芩 三兩

芍藥 三兩

半夏 半升

枳實 四枚

大黃 二兩

大棗 十二枚

生薑 五兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升

日三服、

腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯、

大承氣湯方、

大黃 四兩

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取

二升內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下餘勿服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭

足上下痛而不可觸近大建中湯主之、

大建中湯方、

蜀椒 二合

去汗

乾薑 四兩

人參 二兩

微按千
金發熱
二字無

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎
取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當
一日食糜溫覆之

脇下偏痛發熱其脉緊弦此寒也以溫藥下之宜用後湯

大黃附子湯方

大黃三兩 附子三枚 細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二
升半分溫三服服後如人行四五里進一服

寒氣厥逆赤丸主之

赤丸方

散按千
金有附
子二兩

射罔如
大棗一
兩共六
味

茯苓四兩 半夏四兩 烏頭二兩

細辛一兩 千金
作人參

右六味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食酒飲
下三丸日再夜一服不知稍增之以知為度

腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正
相搏即為寒疝寒疝繞臍痛苦發則汗出手足厥冷其脉
沉弦者大烏頭煎主之

烏頭煎方

烏頭大者五枚
熬去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取

極或
作緊

二升、強人服七合、弱人服五合、不差、明日更服、不可日再服、

寒痲腹中痛、及脇痛裏急者、當歸生薑羊肉湯主之、

當歸生薑羊肉湯方、

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味、以水八升、煮取三升、溫服七合、日三服、若寒多者、加生薑成一斤、痛多而嘔者、加橘皮二兩、白朮一兩、加生薑者、亦加水五升、煮取三升、二合服之、

寒痲腹中痛逆冷、手足不仁、若身疼痛、灸刺諸藥不能治、抵當烏頭桂枝湯主之、

烏頭桂枝湯方、

烏頭

右一味、以蜜二斤、煎減半、去滓、以桂枝湯五合解之、得一升後、初服二合、不知、即服三合、又不知、復加至五合、其知者、如醉狀、得吐者、為中病、

桂枝湯方、

桂枝 三兩 去皮

芍藥 三兩

甘草 二兩 炙

生薑 三兩

大棗 十二枚

右五味、剉、以水七升、微火煮、取三升、去滓、

其脈數而緊、乃弦、狀如弓弦、按之不移、脈數弦者、當下其

徽按後
千立作
許

寒脉緊大而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之、

附方

外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆方見上

外臺芫胡桂枝湯方治心腹卒中痛者

芫胡四兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝

生薑

各一兩半

甘草

一兩

半夏

二合

大棗

六枚

右九味以水六升煮取三升溫服一升日三服、

外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通、

巴豆

二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之及濡尺中亦微而濡故知有宿食大承氣湯主之○脉數而滑者實此有宿食下之愈宜大承氣湯○下利不飲食者有宿食也下之宜大承氣湯、

大承氣湯方

見前瘧病中

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散、

瓜蒂散方

瓜蒂一分
熬黃

赤小豆一分
煮

右二味杵為散、以香豉七合、煮取汁、和散一錢、溫服之、不吐者、少加之、以快吐為度而止、亡血及虛者、不可與之、

脉緊如轉索無常者、有宿食也、○脉緊、頭痛風寒、腹中有宿食不化也、一云寸脉緊、

新編金匱要畧方論卷上

書林

群玉堂 河内屋茂兵衛

大阪心齋橋通博勞町角

群玉堂中、のり舶來、のり唐本、のり法帖類、のりおひ、のりく
所持仕、のり間御用、のり乃節、のりは、のり経文奉希、のり和、のり本、のり後、のりハ、のり三、のり於
漢兒、のり社書籍、のりら、のりい、のり名、のり古屋、のりと、のりと、のりわ、のり清、のり周、のり清、のり花、のり板、のり物
當時流行、のり江、のり板、のり乃、のり後、のり入、のりと、のりと、のり本、のり類、のりハ、のり勿、のり論、のりを、のり新
本、のり古、のり本、のり海、のり上、のり仕、のり入、のり是、のりと、のり清、のり性、のりの、のり間、のりか、のりお、のり仕、のり仕、のり且
い、のりさ、のりの、のり小、のり本、のりよ、のりい、のりと、のり相、のりか、のりと、のり代、のり清、のり用、のり向、のり仕、のり作、のり付、のりと、のり下
度、のりも、のりや、のりと、のり奉、のり希、のり上、のりの、のり上

1240
501-240

