





貞庵立花先生著

# 古方分量考

浪華書肆

積玉圃



古方分量考凡例



一平井氏分量考曰夫物各有極本劑  
 考藥方之極者也其然故東洞氏分  
 割本劑而考其宜定之錄兩而記之  
 以國秤於此乎仲景氏之定方始可  
 行之於今日甚便於醫然韞匱而不  
 沽余患傳寫之久其誤為故校讐遂

上木云

一壹盞，漢一升也。今之一合弱也。何以言之？行葦詩云：洗爵奠學。注云：學，爵也。夏曰醖，殷曰學，周曰爵。馬融曰：一升曰爵，可以知考字書。盞，瓊醖同。

一壹方寸，比平井氏分量考曰：壹方寸，比之散為蜜丸。梧桐子之大，以得拾丸為律也。

一壹錢，比又曰壹錢，比之散，以蜜丸之梧桐子大，以得伍丸為律也。後世稱壹錢，比者，今之壹錢。

一平井氏醫衡曰：大烏頭、烏頭湯、烏頭桂枝湯，三方如法，不可日再服。惟經驗之言，宜書諸紳。

寬政五年癸丑孟春

貞庵山人識

目次

桂枝湯<sup>乙</sup>

桂枝加桂湯<sup>乙</sup>

桂枝加芍藥湯<sup>乙</sup>

桂枝去芍藥湯<sup>二</sup>

桂枝加葛根湯<sup>二</sup>

桂枝加黃耆湯<sup>二</sup>

枳朮桂枝湯<sup>三</sup>

桂枝加芍藥大黃湯<sup>三</sup>

桂枝加厚朴杏子湯<sup>三</sup>

烏頭桂枝湯<sup>三</sup>

桂枝加附子<sup>四</sup>

桂枝去芍藥加附子湯<sup>四</sup>

桂枝附子湯<sup>四</sup>

桂枝附子去桂加朮湯<sup>五</sup>

桂枝去桂加苓朮湯<sup>五</sup>

桂姜艸棗黃辛附湯<sup>五</sup>

桂枝去芍藥加皂莢湯<sup>六</sup>

桂枝加龍骨牡蠣湯<sup>六</sup>

桂枝加芍藥生薑人蔘湯<sup>六</sup>

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯<sup>七</sup>

桂枝二麻黃一湯<sup>七</sup>

桂枝二越婢一湯<sup>七</sup>

桂枝麻黃各半湯<sup>八</sup> 小建中湯<sup>八</sup>

黃耆建中湯<sup>八</sup> 黃耆桂枝五物湯<sup>九</sup>

黃耆桂枝苦酒湯<sup>九</sup> 桂枝甘艸湯<sup>九</sup>

半夏散及湯<sup>九</sup> 桂枝甘艸附子湯<sup>十</sup>

桂枝甘草龍骨牡蠣湯<sup>十</sup>

桂枝人蔘湯<sup>十</sup> 人蔘湯<sup>十一</sup>

茯苓甘草艸湯<sup>十一</sup> 茯苓杏仁甘草湯<sup>十一</sup>

茯苓戎塩湯<sup>十一</sup> 葵子茯苓散<sup>十二</sup>

苓桂朮甘湯<sup>十三</sup> 苓桂甘棗湯<sup>十三</sup>

苓桂五味甘草湯<sup>十三</sup> 苓甘五味姜辛湯<sup>十四</sup>

苓甘姜味辛夏湯<sup>十四</sup>

苓甘姜味辛夏仁湯<sup>十四</sup>

苓甘姜味辛夏仁黃湯<sup>十四</sup>

茯苓澤瀉湯<sup>十五</sup> 澤瀉湯<sup>十五</sup>

五苓散<sup>十五</sup> 茵陳五苓散<sup>十六</sup>

猪苓湯<sup>十六</sup> 猪苓散<sup>十六</sup>

牡蠣澤瀉散<sup>十六</sup> 八味丸<sup>十七</sup>

栝蒌瞿麥丸<sup>十七</sup> 麻黃湯<sup>十八</sup>

麻黃加朮湯<sup>十八</sup> 麻黃甘草湯<sup>十八</sup>

麻黃附子甘草湯<sup>十九</sup>

麻黃杏人甘艸石膏湯<sub>十九</sub>

麻黃附子細辛湯<sub>十九</sub>

麻黃杏仁薏苡甘艸湯<sub>十九</sub>

牡蠣湯<sub>二十</sub> 麻黃醇酒湯<sub>二十</sub>

半夏麻黃丸<sub>二十一</sub> 大青龍湯<sub>二十一</sub>

小青龍湯<sub>二十一</sub> 文蛤湯<sub>二十一</sub>

越婢湯<sub>二十二</sub> 越婢加朮湯<sub>二十二</sub>

越婢加半夏湯<sub>二十二</sub> 葛根湯<sub>二十三</sub>

葛根黃連黃芩湯<sub>二十三</sub> 小柴胡湯<sub>二十四</sub>

柴胡加芒硝湯<sub>二十四</sub>

柴胡去半夏枳實湯<sub>二十五</sub>

柴胡加桂枝湯<sub>二十五</sub> 柴胡姜桂湯<sub>二十五</sub>

柴胡加龍骨牡蠣湯<sub>二十五</sub>

大柴胡湯<sub>二十六</sub> 白虎湯<sub>二十六</sub>

白虎加人參湯<sub>二十七</sub> 白虎加桂湯<sub>二十七</sub>

小承氣湯<sub>二十七</sub> 厚朴三物湯<sub>二十七</sub>

厚朴大黃湯 二八

厚朴七物湯 二八

大承氣湯 二八

大黃黃連瀉心湯 二九

瀉心湯 二九

附子瀉心湯 二九

大黃附子湯 三十

大黃甘遂湯 三十

抵當湯 三十

抵當丸 三十一

橘皮大黃朴消湯 三十一

大黃消石湯 三十一

大黃牡丹湯 三十一

大黃甘草湯 三十一

調胃承氣湯 三十二

桃核承氣湯 三十二

下瘀血湯 三十三

土瓜根散 三十三

甘州湯 三十四

桔梗湯 三十四

排膿湯 三十四

芍藥甘州湯 三十四

甘遂半夏湯 三十四

甘麥大棗湯 三十五

芍藥甘州附子湯 三十五

甘州粉蜜湯 三十五

生姜甘州湯 三十六

甘州乾姜湯 三十六

四逆湯 三十六

通脈四逆湯 三十七

四逆加人蔘湯 三十七

茯苓四逆湯 三十七



通脉四逆加猪膽汁湯 三十七

附子粳米湯 三十八 薏苡附子散 三十八

薏苡附子敗漿散 三十八 大烏頭煎 三十八

烏頭湯 三十九 赤丸 三十九

真武湯 四十 附子湯 四十

天雄散 四十 梔子豉湯 四十

梔子甘州豉湯 四十 梔子生薑湯 四十一

枳實梔子豉湯 四十一 梔子大黃湯 四十二

茵陳蒿湯 四十二 梔子蘘皮湯 四十二

梔子厚朴湯 四十三 梔子乾姜湯 四十三

大陷胸湯 四十三 大陷胸丸 四十三

小陷胸湯 四十四 括蕞薤白酒湯 四十四

括蕞薤白半夏湯 四十四 瓜蒂散 四十五

文蛤散 四十五 大半夏湯 四十五

小半夏湯 四十六 生薑半夏湯 四十六

小半夏加茯苓湯 四十六 半夏苦酒湯 四十六

半夏厚朴湯四七

半夏乾姜散四七

乾姜人蔘半夏四七

半夏瀉心湯四八

甘艸瀉心湯四八

生薑瀉心湯四八

吳茱萸湯四九

黃連湯四九

厚朴生薑半夏甘艸人蔘湯四九

乾姜黃連黃芩人蔘湯五〇

大建中湯五〇

黃連阿膠湯五〇

黃芩湯五一

黃芩加半夏生薑湯五一

六物黃芩湯五一

三物黃芩湯五二

白頭翁湯五二

白頭翁加甘艸阿膠湯五二

木防已湯五三

木防已石膏加茯苓芩消湯五三

防已茯苓湯五三

防已黃耆湯五三

枳實芍藥散五四

枳木湯五五

排膿散 五十四

桂枝枳實生姜湯 五十四

枳實薤白桂枝湯 五十五

橘皮枳實生姜湯 五十五

茯苓飲 五十五

橘皮竹茹湯 五十六

橘皮湯 五十六

桂枝茯苓丸 五十六

芎歸膠艾湯 五十六

薤覆花代赭石湯 五十七

赤石脂禹餘糧湯 五十七

桃花湯 五十七

酸棗仁湯 五十八

葶藶大棗瀉肺湯 五十八

蜜煎導 五十八

麻仁丸 五十九

已椒薤黃丸 五十九

蜀漆散 五十九

十棗湯 六十

桔梗白散 六十

走馬湯 六十一

備急圓 六十一

礬石湯 六十二

消礬散 六十二

礬石丸 六十二

蛇床子散 六十三

都計一百九十六方

目次終

古方分量考

東都 立花貞庵 校

桂枝湯 治<sup>ス</sup>上衝頭痛發熱汗出惡

風者<sup>ス</sup>

桂枝 芍藥 大棗 生姜 各七分半

甘<sup>五</sup>艸 分

右五味以<sup>テ</sup>水一盞四分煮取<sup>テ</sup>六分

桂枝加桂湯

治本方証而上衝劇

者

於本方加桂五分

右煮法同前

桂枝加芍藥湯

治本方証而腹拘

攣甚者

桂枝 大棗各六分

芍藥二分

甘草四分 生姜六分

右煮法同前

桂枝去芍藥湯

治本方証而不拘

攣者

桂枝 大棗各九分

甘草六分

生姜九分

右煮法同前

桂枝加葛根湯

治本方証而項背

強急者

桂枝 芍藥各六分 甘草四分

葛根八分 大棗 生姜各六分

右六味以水二盞煮取六分

桂枝加黃耆湯 治本方証而黃汗

若自汗盜汗者

桂枝 芍藥 生姜 大棗各六分

甘草 黃耆各四分

右六味以水一盞六分煮取六分

枳實桂枝湯 治本方証而渴者

枳實四分 桂枝 芍藥 大棗

生姜各六分 甘草四分

右六味以水一盞八分煮取六分

桂枝加芍藥大黃湯 治桂枝加芍

藥湯証而有停滯者

桂枝 生姜各六分 大黃一分

大棗六分 芍藥二分 甘草四分

右六味以水一盞四分煮取六分  
桂枝加厚朴杏子湯 治本方証而

胸滿微喘者

桂枝 芍藥 大棗 生姜 各六分

甘州 厚朴 杏仁 各四分

右七味以水一盞四分煮取六分

烏頭桂枝湯 治腹中絞痛手足逆

冷或不仁或身疼痛者

烏頭 一分

右一味以水六勺煮取二勺去滓內

蜜四勺煮取二勺作桂枝湯二勺合

服之

桂枝加附子湯 治本方証而惡寒

或支節微痛者

桂枝 芍藥 大棗 生姜 各七分

甘州 附子 半三分

右六味以水一盞四分煮取六分  
桂枝去芍藥加附子湯 治桂枝去

芍藥湯証而惡寒者

桂枝 大棗各九分 甘草六分

生姜九分 附子四分半

右煮法同前

桂枝附子湯 治桂枝去芍藥湯証

而身體疼煩不能自轉側者

桂枝一分 附子一分半 大棗

生姜各七分半 甘草五分

右五味以水一盞八分煮取六分

桂枝附子去桂加木湯 治本方証

而大便硬小便自利不上衝者

木八分 附子九分 甘草四分

大棗 生姜各六分

右煮法同前



桂枝去桂加苓朮湯 治桂枝湯証

而悸小便不利不上衝者

芍藥 大棗 茯苓 朮

生姜各六分 甘州細

右六味以水一盞四分煮取六分

桂姜州棗黃辛附湯治桂枝去芍

藥湯麻黃附子細辛湯二方証相合

者

桂枝 生姜 大棗各六分 甘州

麻黃 細辛各四分 附子三分

右七味以水二盞煮取六分

桂枝芍藥加皂莢湯 治桂枝芍

藥湯症而吐濁唾涎沫者

桂枝 生姜 大棗各七分

甘州 皂莢各五分

右五味以水一盞四分煮取六分

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯証

而胸腹有動者

桂枝 芍藥 生姜 大棗

龍骨 牡蠣 各六分 甘州 四分

右七味以水一盞四分煮取六分

桂枝加芍藥生姜人蔘湯 治桂枝

湯証而心下痞鞭或拘攣及嘔者

桂枝 大棗 人蔘 各六分

生姜 芍藥 各八分 甘州 四分

右六味以水二盞四分煮取六分

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

治桂枝去芍藥湯証而胸腹動劇者

桂枝 大棗 生姜 蜀漆 各六分

牡蠣 一分 龍骨 八分 甘州 四分

右煮法同前

桂枝二麻一湯 治桂枝湯証多麻

黄湯証少者ラ

桂枝八分

芍藥 大棗

生姜各六分

麻黄三分

甘草五分

杏仁三分

右七味以水一盞半煮取六分ラ

桂枝二越婢一湯

治桂枝湯証多

越婢湯証少者ラ

桂枝 芍藥 甘草 麻黄各四分

大棗 石膏各六分 生姜七分

右煮法同前ニ

桂枝麻黄各半湯

治桂枝湯麻黄

湯二方証相半者ラ

桂枝五分 芍藥 生姜 甘草

麻黄 大棗各三分 杏仁三分

右七味以水一盞六分煮取六分ラ

小建中湯 治裏急腹皮拘急及急

八  
痛者

芍藥一分 桂枝 甘艸 大棗

生姜各六分 膠飴三分

右六味上五味以水一盞四分煮取

六分去滓內膠飴更上微火消解

黃耆建中湯 治本方証而盜汗或

自汗者

於本方加黃耆三分

右煮法同前

黃耆桂枝五物湯 治桂枝湯証而

嘔身體麻痺不急迫者

黃耆 芍藥 桂枝 大棗各七分

生姜一分

右五味以水一盞八分煮取六分

黃耆桂枝苦酒湯 治身體腫發熱

汗出汗沾衣色正黃如藥汁者

九  
黃耆一分 二

芍藥

桂枝各七分

右三味以苦酒二分水一盞四分煮

取六分

桂枝甘艸湯

治上衝急迫者

桂枝二分 甘艸一分

右二味以水一盞八分煮取六分

半夏散及湯 治咽喉痛上衝急迫者

半夏 桂枝 甘艸各一分

右三味搗篩以水一盞煎七沸內散

更煮三沸少飲之

桂枝甘艸附子湯 治桂枝甘艸湯

証而骨節煩疼小便不利者

甘艸一分 木各六分 附子九分

桂枝二分

右四味以水一盞二分煮取六分

桂枝 甘草 龍骨 牡蠣 湯 治胸腹有

動急迫者

桂枝分四 甘草 龍骨 牡蠣分各八

右四味以水一盞二分煮取六分

桂枝人蔘湯 治人蔘湯証而上衝

急迫劇者

桂枝 甘草分各八 人蔘 木

乾姜分各六

右四味以水一盞八分煮取一盞內

桂枝煮取六分

人蔘湯 治心下痞鞭小便不利或

急痛或胸中痺者

人蔘 木 乾姜分各七半

右四味以水一盞六分煮取六分

茯苓 甘草 湯 治心下悸上衝而嘔

者

十一  
茯苓 桂枝各一分 生姜一分

甘艸五分

右四味以水一盞二分煮取六分

茯苓杏仁甘艸湯 治悸而胸中痛

者

茯苓一分 杏仁一分 甘艸五分

右三味以水一盞二分煮取六分

茯苓戎鹽湯 治心下悸小便不利

者

茯苓四分 朮六分 鹽一分

右三味以水一盞二分煮取六分

滓內鹽令消私曰平井氏分量考

曰戎鹽一名青鹽漢渡只一種今不

易得無已則可以食鹽代用又曰食

鹽可用出于播州赤穗者

葵子茯苓散 治小便不利心下悸

腫滿者九

葵子一

之四分十八私日弱今

茯苓

三兩私日今

之九表

右二味為散飲服方寸匕日三服ス

苓姜朮甘湯

治心下悸小便自利

腰中冷如坐水中若疼重形如水狀者上

朮

甘州各四分

乾姜

茯苓各八分

右四味以水一盞煮取六分ラ

苓桂朮甘湯

治心下悸上衝起則

頭眩小水不利者ラ

茯苓

一枚桂枝半分

朮

甘州各五分

右四味以水一盞二分煮取六分ラ

苓桂甘棗湯

治臍下悸而欬急上

衝者ラ



茯苓一分 甘草四分 大棗九分

桂枝六分

右四味以水二盞煮取六分

苓桂五味甘艸湯 治心下悸上衝

咳而急迫者

桂枝 茯苓各八分 甘草六分

五味子二分

右四味以水一盞六分煮取六分

苓甘五味姜辛湯 治前方証而不

上衝痰飲滿者

茯苓六分 甘草 乾姜 細辛各四分

五味子九分

右五味以水一盞六分煮取六分

苓甘姜味辛夏湯 治前方証而嘔

者

茯苓六分 甘草 細辛 乾姜各三分

五味子 半夏各九分

右六味以水一盞六分煮取六分

苓甘姜味辛夏仁湯 治前方証而

微浮腫者

甘草 乾姜 細辛各三分 杏仁

半夏 五味子各六分 茯苓四分

右七味以水二盞煮取六分

苓甘姜味辛夏仁黃湯 治前方証

而腹中微結者

於前方加大黃三分

右煮法同前

茯苓澤瀉湯 治心下悸小便不利

上衝及嘔吐渴飲水者

茯苓一分 澤瀉六分 甘草

桂枝各三分 木四分 生姜六分

右六味以水二盞四分煮五味取八

十五  
分内澤瀉更煮取六分

澤瀉湯

治苦胃眩小便不利者

澤瀉

半二

木

一

右二味以水一盞二分煮取六分

五苓散

治消渴小便不利若渴欲

飲水水入則吐者

澤瀉

一

茯苓

猪苓

朮

各六

桂枝

分四

右五味為散白飲服方寸匕

茵陳五苓散

治發黃兼前方証者

茵陳蒿

十分

七

私

五分

日

今

弱

五苓散

五分

七

私

日

今

之

弱

右二物和服方寸匕日三服

猪苓湯

治小便不利若淋瀝若渴

欲飲水者

猪苓

澤瀉

茯苓

滑石

阿膠分各六

右五味上四味以水一盞二分煮取

六分內膠令消セ

猪苓散 治渴而心下悸小便不利

者ラ

猪苓 茯苓 木分各等

右三味為散飲服方寸匕日三

牡蠣澤瀉散 治身體水腫腹中有

動渴而小便不利者

牡蠣 澤瀉 括婁根 蜀漆

葶藶 麥海藻 高陸分各等

右七味為末白飲和服方寸匕日三

服ス

八味丸 治臍下不仁小便不利者

乾地黄之八兩 山茱萸

薯蕷之各十四兩 茯苓

之十四兩 芍藥私曰今

牡丹皮

今各三兩九

私曰

桂枝

附子

各方一兩

外臺私曰

秘要今之

作桂枝一兩

今附子

從之二兩

澤瀉

今三兩

九私曰

右八味末之煉蜜和丸

梧子大酒下

十五丸日再服

括萋瞿麥丸

治心下悸小便不利

惡寒而渴者

括萋根

今二兩六

茯苓

薯蕷

今各三兩九

私曰

附子

一私曰今

之四分弱

瞿麥

今一兩

三私曰

右五味末之煉蜜丸

梧子大飲服三

丸日三服

麻黃湯

治喘而無汗頭痛發熱惡

寒身體疼者

麻黃

二分

桂枝

八分

杏仁

二分

甘草

四分

右四味以水二盞四分煮取六分  
麻黄加朮湯 治本方証而小便不利者

麻黄七分半 桂枝五分 杏仁七分半

朮一分 甘草二分半

右五味以水二盞二分煮取六分

麻黄甘草湯 治喘急息迫或自汗或不汗者

甘草一分 麻黄二分

右二味以水二盞煮取六分

麻黄附子甘草湯 治前方証而惡寒或身微痛者

甘草 麻黄 附子七分半

右三味以水一盞四分煮取六分

麻黄杏仁甘草石膏湯 治麻黄甘草湯

証而咳煩渴者

麻黄 二分 杏仁 六分 甘草 六分

石膏 四分

右四味以水二盞煮取六分

麻黄附子細辛湯 治麻黄附子甘

艸湯証而不急迫有痰飲之變者

麻黄 細辛各一分 附子 七分

右三味以水二盞煮取六分

麻黄杏仁薏苡甘草湯 治麻黄杏

仁甘草石膏湯証而不煩渴有水氣

者

薏苡仁 二分 甘草 五分 麻黄 一分

杏仁 五分

右四味以水一盞半煮取六分

牡蠣湯 治麻黄甘草湯証而胸中

有動者

牡蠣 一分 甘草 五分 麻黄 一分

二十  
蜀漆

七分半

右四味以水二盞四分煮蜀漆麻黃  
得一盞八分內二味煮取六分

麻黃醇酒湯

治喘而發黃或自疼

者

麻黃

三

右一味以清酒一盞二分煮取六分

頓服

半夏麻黃丸

治喘而嘔者

半夏

麻黃

各等分

右二味末之蜜丸小豆大飲服三九

日三

大青龍湯

治喘及咳嗽渴飲水

上衝或身疼惡風寒者

麻黃

二錢

桂枝

甘草

各四分

杏仁

四分

石膏

六錢

生姜



大棗 各六分

右七味以水一盞八分煮取六分

小青龍湯 治咳喘上衝頭痛發熱

惡風或乾嘔者

麻黃 芍藥 甘草 乾姜

桂枝 細辛 各三分 半夏

五味子 各六分

右八味以水二盞煮取六分

文蛤湯 治煩渴而喘咳急者

文蛤 一枚 麻黃 甘草 生姜 各六分

石膏 一枚 杏仁 四分 大棗 六分

右七味以水一盞八分煮取六分

越婢湯 治大青龍湯証而不咳嗽

上衝者

麻黃 一分 石膏 六分 甘草 四分

生姜 六分 大棗 七分

右五味以水一盞二分ヲ煮取六分ヲ  
越婢加朮湯 治本方証而小便不利者ヲ

麻黃分九 石膏一分 大棗

朮各六分 甘草三分 生姜四分

右六味以水一盞二分ヲ煮取六分ヲ

越婢加半夏湯 治本方証而嘔逆者ヲ

麻黃分九 石膏一分 甘草三分

生姜四分 大棗六分 半夏七分

右煮法同前

葛根湯 治項背強急發熱惡風或

喘或身疼者ヲ

葛根分八 麻黃分六 桂枝 芍藥

甘草各四分 大棗 生姜各六分

右七味以水二盞ヲ煮取六分ヲ

葛根加半夏湯

治本方証而嘔者

葛根分六

麻黃

分四

桂枝

甘草

芍藥

分三

半夏分九

大棗

生姜

分各四

右八味以水二盞煮取六分

葛根黃連黃芩湯

治項背強急心

悸而不利者

葛根分六

甘草

黃芩分各四

黃連

分六

右四味以水二盞煮取六分

小柴胡湯

治胸脇苦滿或寒熱往

來或嘔者

柴胡

黃芩

人參

甘草

生姜

大棗

分各三

半夏

分六

右七味以水二盞四分煮取半

再煎取六分

柴胡加芒消湯

治小柴胡湯証而

苦滿難解者

於本方加芒硝六分

右煮法同前而內芒硝上微火令消

柴胡太半夏加栝蒌湯

治小柴胡

湯証而渴不嘔者

柴胡八分 栝蒌根四兩 人蔘

黃芩 甘草 大棗各三 生姜三

右七味以水二盞四分煮取半太滓

再煎取六分

柴胡加桂枝湯

治小柴胡湯與桂

枝湯二方証相合者

桂枝二分 芍藥三分 黃芩

人蔘各三 生姜 大棗各三

柴胡八分 半夏六分 甘草二分

右煮法同前

柴胡姜桂湯

治小柴胡湯証而不

嘔不痞上衝而渴腹中有動者

柴胡分八 桂枝 乾姜 牡蠣

黃芩各三 括蕪根分四 甘草分二

右煮法同前

柴胡加龍骨牡蠣湯

治小柴胡湯

証而從臍下至胸腹有動上逆心下

悸者

柴胡分八 半夏分五 大黃分四

大棗 生姜 人蔘 桂枝

茯苓 鈆丹 龍骨 牡蠣各三

右十一味以水二盞四分煮減半分六

滓內大黃再煎取分六

大柴胡湯

治小柴胡湯証而心下

不痞鞭腹滿拘攣或嘔者

柴胡分八 黃芩 芍藥 大棗各三

半夏分六 枳實分四 大黃分二

生姜分五

右八味以水二盞四分煮減半太滓再煎取分六

白虎湯 治大渴引飲煩燥者

石膏分二 知母分九 粳米分二

甘草分三 右四味以水二盞煮取一盞分二

滓內粳米煮取分六

白虎加人蔘湯 治本方証而心下痞鞭者

於本方加人蔘分四 半

右煮法同前

白虎加桂枝湯 治本方証而上衝者

知母分六 石膏分二 粳米分四

甘艸分二 桂枝分三

右煮法同前

小承氣湯 治腹滿而大便鞭者

大黃一分 厚朴分六 枳實分九

右三味以水二盞煮取六分

厚朴三物湯 治小承氣湯証而腹

滿劇者

厚朴一分 大黃分八 枳實分一

右三味以水二盞四分先煮二味取

一盞內大黃煮取六分

厚朴大黃湯 治厚朴三物湯証而

腹滿劇者

厚朴四分 大黃分九 枳實分六

右三味以水一盞半煮取六分

厚朴七物湯 治腹滿發熱上逆嘔

者

厚朴二分 甘草 大黄各四分

桂枝三分 枳實 生姜各七分

大棗四分

右七味以水一盞半煮取六分

大承氣湯 治腹堅滿若下利臭穢

若燥屎者凡有燥屎者臍下磊砢也

肌層枯燥

厚朴一分 枳實一分

芒硝一分

右四味以水三盞煮二物取一盞半

太滓內大黃煮取六分內芒硝令消

大黃黃連瀉心湯 治心煩心下痞

按之濡者

大黃一分 黃連一分

右以麻沸湯六分漬之須臾絞太滓

服



瀉心湯 治心氣不定心下痞按之

濡者

大黃一分 黃連 黃芩各六分

右以麻沸湯六分漬之須臾絞去滓

服

附子瀉心湯 治瀉心湯証而惡寒

者

大黃一分 黃連 黃芩各五分

附子七分

右以水九分先煮附子取六分去滓

令沸內諸藥漬之須臾絞去滓服

大黃附子湯 治腹絞痛惡寒者

大黃九分 附子一分 細辛六分

右三味以水一盞半煮取六分

大黃甘遂湯 治小腹滿如敦狀小

便微難或經水不調者

大黃一分 阿膠 甘遂各六分

右三味以水一盞八分煮取六分

私曰按如敦狀猶謂叔世如覆杯字

書曰敦盛黍稷之器可以知

抵當湯 治瘀血者凡有瘀血者二

焉少腹鞭滿小便快利者一也腹不

滿其人言我滿者二也急則以湯緩

則以丸

水蛭 蝱蟲各十箇 大黃二

桃仁七分

右四味為末以水一盞煮取六分

抵當丸

水蛭二十箇 蝱蟲二十箇 桃仁二十箇

私曰一兩也今大黃三兩九 桃仁二

也三 也一 也兩 也也 今大 黃三 兩九 桃二 仁十

右四味杵分為四丸以水九分煮

三十一  
丸取六分服ス

橘皮大黄朴硝湯

治心胸間有宿

滯而結者

橘皮分六 大黄 朴硝各一分

右三味以水一盞二分煮取六分

大黄硝石湯 治發黃腹中有結塊

者

大黄 黃蘗 硝石各八分 梔子四分

右四味以水一盞二分煮取六分

滓內硝石令消

大黄牡丹湯 治臍下有堅塊按之

即痛及便膿血者

大黄分八 牡丹皮分六 桃仁分四

瓜子二分 硝石分四

右五味以水三盞煮取六分

滓內硝石令消

三十一  
大黃甘艸湯

治秘閉急迫者

大黃貳

甘艸伍

右二味以水一盞八分煮取六分

謂胃承氣湯

治前方証而實者

大黃貳

甘艸伍

硝石貳

右三味以水一盞八分煮取六分內

硝石令消

桃核承氣湯

治血証小腹急結上

衡者一

桃仁

桂枝

甘艸

芒硝

各五分

大黃貳

右五味以水一盞七分煮取六分內

硝石令消

下瘀血湯

治臍下毒痛及經水不

利者

桃仁三十

蟅蟲二十

大黃

兩二

私曰今之  
六我弱

右三味末之煉蜜和為四丸以酒八分煮一九取六分頓服之

土瓜根散 治少腹拘急經水不利

或下白物者

芍藥 桂枝 土瓜根

麝蟲 今各三分五分私曰一分

右四味為末酒服方寸匕

甘州湯 治病逼迫及咽急痛者

甘州 表二

右一味以水一盞二分煮取六分

桔梗湯 治前方証而有膿或粘痰者

者

甘州 表二 桔梗 表一

右二味以水一盞八分煮取六分

排膿湯 治膿血及粘痰急迫者

三十四  
甘艸分八 桔梗二分 生姜分四

大棗一枚

右煮法同前

芍藥甘艸湯 治拘攣急迫者

芍藥 甘艸各一分

右二味以水一盞二分煮取六分

甘遂半夏湯 治前方証而心下鞭

滿者

甘遂分三 甘艸一分 芍藥一分

半夏分六

右四味以水一盞半煮取四分弱內

蜜四分弱煎取六分

甘麥大棗湯 治急迫而狂驚者

甘艸分六 小麥分四 大棗分五

右三味以水一盞二分煮取六分

芍藥甘艸附子湯 治芍藥甘艸湯

証而惡寒者

芍藥

甘艸各一分

附子六分

右三味以水二盞煮取六分

甘艸粉蜜湯

治吐涎吐蟲心痛發

作有時者

甘艸二分

粉一分

蜜四分

右三味以水九分先煮甘艸取六分

太澤內二味攪令相煎如薄粥私

曰平井氏分量考曰粉千金方為梁

米粉外臺秘要作黍米粉此經所謂

粉者粉錫也一名鉛粉即黑錫灰藥

舖稱鉛胡粉者是也

生薑甘艸湯

治咳唾涎沫不止心

下痞鞭急迫者

生薑一分

甘艸八分

大棗七分半

人蔘六分

右四味以水一盞四分煮取六分  
甘艸乾姜湯 治厥而煩燥多涎唾者

甘艸二 乾姜一

右二味以水一盞二分煮取六分  
四逆湯 治四肢逆厥身體疼痛下利清穀或小便清利者

甘艸一分 乾姜 附子各九分

右三味以水一盞半煮取六分  
通脉四逆湯 治前方証而劇者

甘艸一分 附子七分 乾姜一分

右煮法同前

四逆加人蔘湯 治四逆湯証而心

下痞者

甘艸一分 乾姜七分 附子七分

人蔘五



右煮法同前

茯苓四逆湯

治前方証而悸者

乾姜

附子各三

甘艸四

茯苓二

一分

人蔘三

右五味以水一盞煮取六分

通脉四逆加猪膽汁湯

治通脉四

逆湯証而急結者

於本方加膽汁一大蜺殼餘依本方

附子粳米湯

治腹中雷鳴切痛或

嘔吐者

附子三

半夏一

甘艸二

大棗五

一分

粳米二

右五味以水一盞六分煮取六分

薏苡附子散

治胸中痺惡寒者

薏苡仁

附子各等

右二味為散服方寸匕日三

薏苡附子敗漿散 治身甲錯腹皮

急按之濡如腫狀腹無積聚者

薏苡仁 十分七匙 五分

附子 二分一匙 五分

敗漿 五分七匙 五分

右三味為散取方寸匕以水一盞二

分煮減半頓服

大烏頭煎 治毒繞臍絞痛或自汗

出手足厥冷者

烏頭 四匙

右一味以水九分煮取三分太滓內

蜜六分再煎取六分

烏頭湯 治骨節疼痛不可屈伸若

自汗或盜汗若腹中絞痛者

麻黃 芍藥 黃耆 甘草 各六分

烏頭 一分五匙 煎法如

右以水九分煮四味取三分去滓内

蜜煎中更煎和服

赤丸

治心下悸有痰飲惡寒或微

厥者

茯苓 半夏 各四兩 今之十二 細辛 一兩 今

烏頭 之六兩 今 右四味末之之内真朱為煉蜜丸如麻

子大先食酒飲下三九日私曰

平井氏分量考曰内真朱為色以淡

紅色為度加一兩半可也貞庵曰今

之四匙五分弱也

真武湯 治心中躁身騫動振欲

擲地小便不利或嘔若下利若拘痛

者

茯苓 芍藥 生姜 各九分

附子四分半

木六分

右五味以水一盞六分煮取六分

附子湯

治身體痠痛小便不利心

下痞鞭若腹痛者

茯苓芍藥附子各六分

木八分人參四分

右煮法同前

天雄散

治小便不利上逆臍下有

動惡寒者

天雄四兩半私五曰三枚也

龍骨三兩九枚私曰今木八兩私之二

弱十四也桂枝六兩八枚私曰今

右四味為散酒服三錢匕日三

梔子豉湯

治心中懊憹者

梔子四分豉二

右二味以水一盞六分先煮梔子取

一盞本滓内豉煮取六分

梔子甘艸豉湯 治本方証而急迫

者一

於本方加甘艸一錢

右煮法同前一

梔子生姜豉湯 治本方証而嘔者

於本方加生姜二錢半

右煮法同前一

枳實梔子豉湯 治本方証而胸滿者

枳實分六 梔子分七 豉四分

右三味以水一盞六分先煮二味取

八分下豉煮取六分

梔子大黃湯 治前方証而閉者

梔子六分 枳實一分 大黃一分

豉四分

右四味以水一盞八分煮三味取

盞下レ鼓取ル六分ヲ

茵陳蒿湯

治ス一身發黃大便難者

茵陳蒿八分

一分

梔子七分

大黃六分

右三味以水二盞煮ラ茵陳蒿取ル一盞

二分ヲ內ニ二味煮取ル六分ヲ

梔子蘗皮湯

治ス身黃發熱心煩者

梔子一分

二分

甘艸六分

黃蘗一分

二分

右三味以水一盞六分ヲ煮取ル六分ヲ

梔子厚朴湯

治ス胸腹煩滿者

厚朴

枳實各一分

一分

梔子七分

右三味以水一盞四分ヲ煮取ル六分ヲ

梔子乾姜湯

治ス心中微煩者

梔子四分

一分

乾姜一分

一分

右二味以水一盞四分ヲ煮取ル六分ヲ

大陷胸湯

治ス結胸或從心下至少

腹鞭滿者

大黃九分 芫硝二分 甘遂七分 厘半

右以水一盞八分煮大黃取六分內

芫硝令沸內甘遂末服

大陷胸丸 治結胸或項背强者

大黃半斤 芫硝半斤 杏仁半斤 甘遂一分

之二 杏仁之半斤 甘遂一分 錢

芫藤今半升 杏仁之半斤 甘遂一分 錢

右五味上四味搗和取如彈丸一枚

以白蜜一分強水一盞二分煮取六

分內甘遂末服

小陷胸湯 治小結胸者

黃連四分 半夏四分 栝蒌實一分

右三味以水一盞八分煮栝蒌實取

九分內二味煮取六分

栝蒌薤白白酒湯 治胸背痛喘息

咳唾者

括萋實分六

薤白四分

白酒盞

右三味同煮取六分私曰平井氏

分量考曰白酒千金方作白截漿即

酢也今試用之氣味猛烈而難下于

咽嗌也故不采用按白酒之來尚矣

靈樞經曰足陽明之筋病以白酒和

挂以塗其緩者云

括萋薤白半夏湯

治前方証而嘔

者

括萋實分三

薤白分九

白酒半

半夏一分

右煮法同前

瓜蒂散

治欲溫吐者上

瓜蒂分五

赤小豆分五

右二味為散先以香豉二棗熱湯七

分煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服



之

文蛤散 治渴者

文蛤 之五兩 十兩 五錢 弱曰今

右一味為散以沸湯和一錢匕服意欲水反不渴者與之

大半夏湯 治嘔吐而心下痞鞭者

半夏 四分 錢 人蔘 三分 蜜 二分 五錢 七厘

右三味以水三盞弱煮取六分

小半夏湯 治吐而不渴者

半夏 四分 錢 生姜 一分 錢

右二味以水二盞八分煮取六分

生姜半夏湯 治似喘不喘似嘔不嘔

似嘔不嘔心中憤々然無奈何者

半夏 三分 生姜汁

右以水一盞二分煮半夏取八分內

生姜汁四分煮取六分

小半夏加茯苓湯

治本方証而眩

悸者

半夏

二分

生姜

一分

茯苓

一分

右三味以水二盞八分煮取六分

半夏苦酒湯

治咽中生瘡音啞者

半夏

五分

雞子

一枚 內苦酒於其上

右內半夏於雞子殼中安火上令三

沸七太滓少含嚥之私曰今以此

造法不成宜從原法試以半夏著苦

酒一夜為佳雞子乃可從東洞氏之

說唯不內苦酒已

半夏厚朴湯

治咽中如有炙臍或

嘔或心下悸者

厚朴

三分

半夏

一分

茯苓

四分

乾蘇葉

二分

生姜

五分

右五味以水一盞煮取六分

半夏 右 半 分 姜 乾 下 乾 半 右 子 鳴 半 夏 人 右 滓

候 出 付 日 一 也 添 行 料 儀  
段 所 来 難 付 難 の 器 車 絲 心

波 所 過 料 心 下 痞 鞭 腹 中 雷  
相 成 液 方 へ 出 候 十 兵 留  
品 不 不 埒

姜汁糊為丸如梧  
下痞鞭腹中雷  
黃芩  
甘艸各四分  
魚取一盞二分太

乾嘔吐逆涎沫者

寸七以水一盞三

治嘔吐不止心

甘艸瀉心湯

治前方証而心煩不

得安者

甘艸分六

半夏分九

黃連一分

黃芩

人蔞

大棗

乾姜各四分

右煮法同前

生姜瀉心湯

治半夏瀉心湯証而

嘔者

生姜分六

半夏分九

黃連一分

黃芩四分

乾姜一分

人蔞

甘艸

大棗各四分

右煮法同前

吳茱萸湯

治胸滿心下痞鞭嘔者

吳茱萸

五錢

人蔞

大棗各四分

生姜分九

右四味以水二盞一分煮取六分

厚朴生薑半夏甘艸人蔞湯

治胸

腹滿而嘔者

厚朴 生姜各一分 半夏九分

甘艸三分 人蔘一分

右五味以水二盞煮取六分

黃連湯 治心煩心下痞欲嘔吐上

衝者

黃連 甘艸 乾姜 桂枝各四分

人蔘三分 半夏九分 大棗四分

右七味以水二盞煮取一盞二分

乾姜黃連黃芩人蔘湯 治心煩心

下痞鞭吐下者

乾姜 黃連 黃芩 人蔘各七分

右四味以水一盞八分煮取六分

大建中湯 治腹大痛嘔不能食腹

皮起如魚頭足者

蜀椒六分 乾姜六分 人蔘八分

膠飴

五勺即十六分

右四味上三味以水一盞六分煮取八分去滓內飴煎取六分

黃連阿膠湯

治心中悸而煩不得

眠者上

黃連

二分

黃芩

三分

芍藥

六分

雞子黃

一枚之三分

阿膠

九分

右五味以水一盞半先煮三物取六分

分去滓內膠烺盡小冷內雞子黃攪

令相得溫服

黃芩湯

治下利腹拘急者

黃芩

大棗

各九分

甘艸

芍藥

各六分

右四味以水二盞煮取六分

黃芩加半夏生姜湯

治前方証而

嘔逆者

黃芩

大棗

各六分

甘艸

四分

芍藥

四分

半夏

一分

生姜

六分

右煮法同前

六物黃芩湯

治心下痞鞭乾嘔下

利上衝者

黃芩

大棗

人蔞

乾姜

各四分半

桂枝

一分半

半夏

九分

右六味

以水一盞四分煮取六分

三物黃芩湯

治心胸苦煩者

黃芩

四分

苦參

八分

乾地黄

六分

右三味

以水一盞八分煮取六分

白頭翁湯

治熱利下重而心悸者

白頭翁

五分

黃栢

黃連

秦皮

各七分半

右四味

以水二盞煮取六分

白頭翁加甘艸阿膠湯

治前方証

而有血証急迫者

白頭翁分四 黃連 黃栢

秦皮各六 甘艸 阿膠各四

右六味上五味以水一盞七分煮取

六分內膠令消

木防已湯 治心下痞鞭煩渴者

防已七分 石膏一分 桂枝五分

人蔘一分

右四味以水一盞八分煮取六分

木防已太石膏加茯苓芒硝湯 治

心下痞堅而悸者

防已分六 桂枝分四 人蔘分八

茯苓分八 芒硝一分

右五味上四味以水一盞八分煮取

六分內芒硝令消

防已茯苓湯 治四肢聶少動水氣



在<sub>二</sub>皮膚而上<sub>一</sub>衝者<sub>上</sub>

防已 黃耆 桂枝 各四分

茯苓 九分 甘艸 三分

右五味以<sub>二</sub>水一盞<sub>一</sub>煮取<sub>二</sub>六分<sub>一</sub>

防已黃耆湯 治水病身重汗出惡

風小便不利者<sub>上</sub>

防已 六分 甘艸 三分 黃耆 七分

朮 大棗 生姜 各四分

右六味以<sub>二</sub>水一盞<sub>一</sub>煮取<sub>二</sub>六分<sub>一</sub>

枳實芍藥散 治<sub>二</sub>腹滿拘攣或痛者<sub>一</sub>

枳實 芍藥 各等分

右二味為<sub>二</sub>末<sub>一</sub>服<sub>二</sub>方寸匕<sub>一</sub>日<sub>二</sub>三

枳朮湯 治<sub>二</sub>心下堅滿小便不利者<sub>一</sub>

枳實 二分 朮 六分

右二味以<sub>二</sub>水一盞<sub>一</sub>煮取<sub>二</sub>六分<sub>一</sub>

排膿散 治<sub>二</sub>瘡家胸腹拘滿若吐粘

痰或便膿血者

枳實六分芍藥六分桔梗二分

右三味為末取雞子黃三分以藥末

與雞子黃相等揉和令相得飲和之

日一服

桂枝枳實生薑湯 治胸滿上逆或

嘔者

桂枝九分枳實五分生薑九分

右三味以水一盞二分煮取六分

枳實薤白桂枝湯 治胸中痺滿痛

者

枳實八分薤白六分桂枝二分

枳實四分厚朴八分

右五味以水一盞八分先煮枳實厚

朴取八分太滓內諸藥煮取六分

橘皮枳實生薑湯 治胸中痺滿而

嘔者ラ

橘皮四分枳實四分生姜一分

右三味以水一盞半煮取六分ラ

茯苓飲 治心下痞鞭而悸小便不

利胸滿而自吐宿水者ラ

茯苓 人蔘 朮各六分 枳實四分

橘皮五分生姜八分

右六味以水二盞煮取六分ラ

橘皮竹茹湯 治胸中痺吃逆者ラ

橘皮三分竹茹八分大棗七分

生姜八分甘州五分人蔘一分

右煮法同前二

橘皮湯 治胸中痺嘔噦者ラ

橘皮二錢生姜四錢

右二味以水一盞四分煮取六分ラ

桂枝茯苓丸 治拘攣上衝心下悸

經水有變或胎動者

桂枝 茯苓 芍藥 桃仁

牡丹皮 各等分

右五味末之蜜丸大

芎歸膠艾湯 治漏下腹中痛者

芎藭 阿膠 甘艸各三 艾葉

當歸各四分 芍藥六分 乾地黄九分

右七味以水一盞清酒一盞合煮取二

六分內膠令消

蒺藜花代赭石湯 治心下痞鞭噎

氣不除者

蒺藜花 甘艸各六分 人蔘四分

半夏一分 生姜一分 代赭石二分

大棗五分

右七味以水二盞煮取一盞二分

滓再煎取六分

赤石脂禹餘糧湯

治毒在臍下而

利者上

赤石脂 禹餘糧各一分

右二味以水一盞八分煮取六分

桃花湯 治便膿血者

赤石脂一分 乾姜七分 粳米一分

右三味以水二盞煮取六分更內赤

赤石脂末方寸匕

酸棗仁湯 治煩燥不得眠者

酸棗仁四分 甘草一分 知母

芍藥 茯苓各二分

右五味以水一盞六分先煮酸棗仁

取一盞二分內諸藥煮取六分

葶歷大棗瀉肺湯 治浮腫咳逆喘

鳴迫塞胸滿強急者

葶歷一分 大棗八分

右二味先以水一盞八分煮取一盞  
二分去滓內葶藶煮取六分

蜜煎導

治肛中乾燥大便澁者

蜜之七合私曰今

右一味內銅器中微火煎之稍凝似  
飴狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻  
作挺令頭銳大如指長二寸許當熱  
時急作冷則硬以內穀道中以手急

抱欲大便時乃去之私曰二寸今  
之一寸四分強

麻仁丸 治平日大便秘者

麻子仁之二升私曰今芍藥之半斤私曰今

今之四之弱二十 大黃之一斤私曰今

厚朴之一尺私曰今枳實之半斤私曰今

之四之弱十 杏仁之一升私曰今

右六味為末煉蜜為丸梧子大飲服

十九日三

已椒薤黃丸

治腹滿口舌乾燥

便澁滯者

防已 椒目

葶藶

大黃

各一兩

今之三

右四味末之蜜和丸梧子大服一九

日三

蜀漆散

治寒熱發作有時臍下有

動者

蜀漆

雲母

龍骨

各等分

右三味為末發前以漿水服半錢匕

平井氏分量考曰地漿水一名土漿

造法詳于本州云々一方盛赤土於

器內入水造之亦可備急也經稱漿

水者即地漿水也

十棗湯

治病在胸腹掣痛者

六十  
芫花

甘遂

大戟

各等分  
為末

大棗

十枚

右以水一盞煮大棗取六分去滓內散一錢匕羸人半錢匕

桔梗白散

治毒在胸咽或吐下如

膿汁者

桔梗

貝母

各三分

私加

巴豆

一分五分  
私曰今之  
厘弱也

右三味為末以白飲服半錢匕羸者減之

走馬湯

治胸腹有毒若心痛若腹

痛者

杏仁

二枚

巴豆

二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯六分捻取白汁飲之

備急圓

治心腹急痛者



大黃 巴豆 乾姜 各一兩 之三 弱私曰

右為末蜜丸

礬石湯 治脚氣痿弱不仁及上入

搶心者

礬石 今之六 弱私曰

右一味以漿水一斗五升煎三五沸

浸脚良 私曰漿水說見蜀漆散方

後一斗五升乃今之一升五合弱也

消礬散 治一身悉黃腹脹如水狀

大便黑時澹者

礬石 消石 各等

右二味為散以大麥粥汁和服方寸

匕 一日三

礬石丸 治經水不利下白物者

礬石 三分 二私曰今之

杏仁 一分 五私曰今

右二味末之煉蜜和九棗核大サ以內ル

藏中

蛇床子散

治下白物陰中痒或有

小瘡者ラ

蛇床子

右一味末之ラ以白粉少許和令相得

如棗大綿裹內之自然温ク陰中坐

藥 平井氏分量考曰白粉即白堊

柳原積玉圃藏板醫書略目錄

古方便覽 六角重任筆記 二

吉益東洞先生ノ口授ニノ古方ヲアツメ各方ノ下ニ其方ヲ用ユベキ病症ヲシルス又一圈ヲ加テシタシク捷効ヲトリタル經驗ヲシルス医ハモトヨリ素人ニテモ此書ヲミレハ忽チ療治ノ働テキルヤウニ國字ニテカキタル療治本ナリ卷末ニ腹候ノ圖ヲ附録ス

古方翼 野間俊齋著 五

コノ書ハ病症ヲ部類シテ各療治ノ仕方ヲ片カナニテキコヘ易ク書トリ症ニアハセテ仲景ヨリ王燾孫思邈ニテノ古方ヲ付テスグニ医療ノナルヤウニシタル書ナリ

長沙證彙 田中榮信著 横本一

仲景全書ノ傷寒ナラヒニ雜病ノ方ヲ病門ヲ以テ部ヲ分チ探求スルニ便ナラシム

漫遊襟記 獨嘯菴著

二

先生自ラ医術ヲ以テ四方ニ漫遊シ其經歷セシ地ニテ急症ヲスクヒ沈痼ヲクダキ汗吐下ノ三方ニテ捷効ヲトリシヲ記ス并ニ医家ノ學問ヲメニナル又ハ妙方ナドヲ記ス医家ツ子ニコノ書ヲ以テ機ニ應スルノ標準變ニ處スルノ考證トナシ玉ハ其益大ナルベシ

吐方考

同著

一

吐方一切ノ口訣藥方ヲ記シ張子和ガ説ハ勿論紅夷人ノ傳レテテ吐方ニアツカルハ悉クアゲ論ス

癰瘡口訣

同著

一

濕毒治療ノ口訣土茯苓輕粉用法禁忌ノ食物温泉灸治等ノ可不可ヲ論シ囊中ノ秘方ヲ附録ス

病名彙解

江南桂洲先生著

六

凡ソ病ノ名ヲシラズノ治療ヲ施スベキヤウナシ故ニ医タル者其名實ヲ詳ニセスハ有ベカラズ仍テ此書ニハ病名ヲイロハ分ニノ其下ニ病因ヲ論ジ悉ク古書ヲ引キ片カナニシルス医者ツ子ニ叔メオキテ病者脗候ニテゾミ疑惑ヲトルナキ重宝ノ書ナリ

二神傳

阿州天羽氏著

三

此書ハ先生ノ筆記ニノ吾國神代ヨリコノカタ古ク傳ハリシ和方ノ諸名家ニ秘シ用ヒ大効ヲ得来リシ奇劑妙方ヲノコラス集メタル書ナレバ医家ハ言ニフヨバズ僻地遠土ノ民俗タリトモ病ニアリテコノ方ヲトリ用ヒナバ大ニ益アル書ナリ

鍼灸則

菅沼周圭著 小本

一

諸病ノ症ニヨリ鍼灸スベキ秘穴ヲシルス

德本十九方

三河長田德本翁著

此書ハ德本翁十九方ヲ以テ  
万病ヲ療セラレタルナリ其規  
則妙用仲景傷寒論ニ異ナ  
ナラス所謂一方ヲトリテ百  
病ヲ治スルノ賢ナルベシ日本  
ノ古方ノ開祖ナリ

方極

吉益先生著

一  
金匱傷寒等ノ方意ヲトキ  
モツハラ藥籠或ハ懷中ノ便  
利ニソナフルモノナリ

大同類聚方

出雲宿祢著

一  
此書ハ典藥頭安倍朝臣貞  
貞等勅ヲウケテ集ムル處  
ナリ日本神代ヨリノ医方ナ  
リ全書百卷アリ今亡ヒテ  
不傳ソノ遺本ヲ古家ヨリ  
得テコレニ刊ス

傷寒

藥方分量考 岡田先生著

一  
金匱 世医分量ノ一ニ昏クシテ遂ニ古  
方ノ本意ヲ失フヲ患ヒ岡田  
先生漢以來ノ諸說ヲ取捨メ  
藥劑ノ分量ヲ委細ニ正シク  
シタル書ナリ實ニ医家ノ龜鑑  
タルベシ

張氏醫通參要

鳥巢道人撰

五

張璐王先生ハ清朝ノ名家ヲ医通ノ書  
ヲアラシ補瀉寒溫和寒吐下ノ治法大  
ニソナハル且方法ノ淵源ヲ究ム其官刊  
ノ本既ニ日本ニ舶來スシカレトモソノ  
書卷帙浩博ニテ初學檢求シカク  
シ謙齋先生嘗テ其繁ヲ刪リ要ヲ  
纂メ數年ソノ治法實事ニ驗ミ病  
間コトニ効ヲ得ル方法ヲ附シ撰定  
メ一家ノ至宝トス初學ノ輩ト雖モ  
見ルニ簡ニ用ルニ備ヘリ又卷首ニ  
医通類方ヲ附シ幾百ノ藥方採リ求  
ルニ掌ニミルガ如シ實ニ濟世ノ奇書也

張氏醫通本艸

石頑道人璐王撰

五

是本草逢原ナリ藥品ヲ見ル便  
利ナラシメン目錄ヲイロハ分ニス并  
ニ近世物産家藥品ノ辨藥店ニ  
称スル藥ノ上品下品ノ名目和藥  
唐藥等今日藥ヲ用ルニ藥店  
ニ於テ求ルニ真偽好惡ヲ知リテ  
効驗アル藥ヲ知リテ偽藥ヲ  
モトメサルタメニ委シク記ス

千金要方

清周岐來先生著 二

コノ先生ハ享保年中ニ長崎へ清朝ヨリ來リ治療ヲ施シタル丁三年ナリソノウチニ活人起廢ノ効ヲトルモノ無慮數千人ニ及フ尤奇効著明ナリシ医按ヲ集テ治術ノ考證トス因ニ云大坂吉野五運製スル人參三臈圓ハ此先生ノ授ケ玉ヒシ方ナリコノ一事ヲ以テソノ神医ナルヲ知ベシ況ニヤ此書ハ自ラカヲ用ヒ玉フモノナラヤ

方函

淺野先生編輯 一

凡ノ医タル人古医方ノ規矩準繩ヲ正シ秦張ノ術ヲ明カニセント欲セバ傷寒論ニシクハナシ然レ其書後人ノ手ヲ經テ錯乱雜出ノ檢閱ニ便ナラス故ニ此書方證ノ部門ヲ分チテ人ヲシテ搜索シ易カラシム懷中ノ論衡トモイフベシ必ズ見玉フベシ

傷寒譯通

鈴木旭山著 一

古方規ノ一書深切ニ編集ノ初學医生ニハ裨益アレ氏明医ノ説ニヨリシレバ治療ニ的切ナラス因テ此書ハヒトニ金匱傷寒ノ二書ヲ以テ據トシカクハラ吉益先生ノ説ヲ折中シテ片カナニテ記シ初學ノ人ヲ書ヲミレハ傷寒一ト通りハ大抵療治ノ出来ルヤウニ迷タリ并ニ藥方ヲ彙ルニ和寒温汗吐下六經ヲ以テ區別ノ症ニヨツテ方ヲ施ニ便ナラシム

傷寒衆方規矩

一

此書ハ三陽三陰ノ論ヨリノ脉法治法等ニイタルマテ國字ヲ以テ詳カニ辨シ末ニ藥方ヲ伊呂波ヲ以テ分チ急求ニ便ナラシム医者ニ非ル人ニテモ常ニ玩味セバ治療自然ニ熟スベシ

氣疾症治

讚岐由良養的著 一

古昔ノ名医藥名ヲ用ヒズモ七情ヨリ發シタル氣疾ヲ智計工夫ニテ治セシ丁ラツタ医療ノ變ニ備フ

傷寒手引艸 烏巢道人講述

此書ハ傷寒論ト張氏医通ノ説ト合シテ今日療治ノハタラキニナルヤウニ括要シテ傷寒六經ノ症治モスムヤウニベラレシヲソノマニシルニタル書ナリ

産家達生編 兼葭堂主人校訂

清ノ西冷拙園先生ノ著述ニシテ胎前ヨリ臨産産前産後マデノ調護ノ法ヲアラハシ先賢ノ古方中ニ就テ尤モ平穩ニシテ奇効アリシ劑ヲエラミ記ス

痘瘡水鏡録 橋南溪先生著

序熱ヨリカセマデ善悪見分ケヤウ藥劑加減スベテ難痘妙藥ノ傳ヲ攀モツトモ痘瘡ノ書アマタアリト雖モ此書ノ如キ委シキハナシ医術第一ノ全本ナリ南溪先生医術二名アリ中モ痘瘡ハ其秀逸ナリ醫師ヨノ書ヲ信ジ玉ハ其功大ナリ

寛政五癸丑年四月初刻

安政七庚申年正月再刻

三都

書肆

京三條通御幸町

吉野屋仁兵衛

江戸日本橋通二丁目

須原屋茂兵衛

同二丁目

山城屋佐兵衛

同芝神明前

岡田屋嘉七

大坂心齋橋北久太郎町

河内屋喜兵衛

