



錦囊妙藥秘録
藥方全書

武 9
119



門 119

醫學研究玄玄論

藥方

全書

古方後世方經驗



錦囊妙藥祕錄例言

夫醫不執方貴因病發藥但

藥餌所不及或隨物以奏

功至治療所難痊又無意

而收效是能去病即良方

也。因輯其明簡經驗者。

用藥須辨病源。倘病源微差

即藥物不效。不得徒議於

方也。且藥有分而。有修製。

必須一一詳察。而其間藥

品。又有真偽。有形似人命

醫所關。尤不可。以從事。

醫以濟人。必不自任。已見。且

屢試屢驗之方。其中配合。必經細心斟酌。倘意為增



例言

減雖識力或過前人而偏見之誤亦不少矣養生者自慎焉。

一症之內必備數方者非一方不驗又試一方也或藥有未便此處得之易彼處得之難或症有殊途誓之其症而對誓之彼症而不對因是並載惟用所宜

是書專取藥品簡易便於窮村僻壤應手而得容有一二方藥較多者因立方奇驗不忍棄置且仁人君子製一料而能濟數十人蓄多品而能起數百命功孰

大焉因亦附錄於篇。

陶隱居修本艸以蠱蟲水蛭為藥功雖及人而害及物命以致淹留上昇是書雖有偶用者亦危疾中僅見之非得已也修製家慎勿多傷為幸。

病痊之後貴調養尤貴修省蓋始病之由必因六氣七情所傷以至若此今幸值方而愈則節飲食慎起居必矣而養心尤亟於養身修省可不猛乎。

是書始輯於丁酉成於乙巳俱屬初授經驗為多但字

內良方奇效者不少凡我同志更祈廣為惠傳嗣有續集悉當編入即諸君子之功德曷有既耶。

仁和醒菴主人王夢蘭敬識于寧壽堂

順治丁酉龜七月之既望

錦囊妙藥祕錄目錄

中風諸症	一	傷寒諸症	三
瘟疫諸症	七	傷風諸症	八
瘧疾諸症	九	吐瀉諸症	十一
霍亂諸症	十一	痢疾諸症	十二
痰嗽諸症	十六	勞瘵諸症	十三
虛損諸症	廿一	吐血諸症	廿一
衄血諸症	廿一	下血諸症	廿一
腫脹諸症	廿五	水腫諸症	同
脹滿諸症	同	黃疸諸症	廿六
痞積諸症	廿八	痿痺諸症	三十
諸風諸症	同	頭痛諸症	卅二
耳疾諸症	卅七	眼目諸症	卅八
鼻疾諸症	卅二	口舌諸症	卅四
齒牙諸症	卅六	咽喉諸症	卅八
心痛諸症	五十	腹痛諸症	五十

脾胃諸症	五十二	膈噎諸症	同
腰痛諸症	五十四	腸痛諸症	同
大便諸症	五十五	腸風諸症	五十五
脫肛諸症	五十七	痔瘡諸症	五十七
小便閉諸症	五十九	淋疾諸症	六十
遺精諸症	六十一	疝氣諸症	六十二
脚氣諸症	六十四	婦人諸症	六十七
妊娠諸症	六十八	產育諸症	七十
產後諸症	七十二	乳病諸症	七十六
婦人諸病補遺	七十九	小兒諸症初生通用	八十
急慢驚風	八十四	五疳諸症	八十四
小兒雜病	八十五	痘疹諸症	九十
折傷諸症	九十一	破傷風	九十五
中毒諸症	九十七	虫獸傷症	九十七
瘡毒諸症	九十九	餘方補遺	百

錦囊妙藥秘錄

大明王夢蘭蕙子父編輯

皇和藤井以求子見隆和解

○中風諸症

初中痰盛不省人事 其症卒二暈倒
 言語不能 此時急二獲合圓ヲ用ユ
 竹瀝生薑汁ニテ調ヘ口中へ灌ハ即醒
 隨テ用ル方

白朮 天麻 當歸 川芎 薄荷 桂枝
 天南星 陳皮 各等分 水一碗半 俗云一
 也後 入煎七分竹瀝小盞二 生薑汁二
 匙加ヘテ服スベシ ○如獲合圓無之時ハ
 急ニ星香湯ヲ用ユ 天南星 五錢
 木香 煎服ス

○又方 真牛黃一分研テ細ニシ湯ニテ

送下ス效アリ

○又方 細辛末鼻中へ吹入一壺レハ即醒

○又方 五月五日白鳳仙花ヲ取燒酒ニ浸シ能包置年月ニ拘ルヘカラス此症ニ遇ハ此燒酒ヲ温メテ一杯服スレハ其痰立處消

中風口噤不能開 白鹽梅ヲ齒ニ揩付

レハ即口ヲ開クモノナリ又齒ヲ傷ナシ

中風口噤不語 明礬ニ及研テ細末トシ

生薑汁ニテ調ヘ口ヲ開テ灌入ヘシ痰涎ヲ吐テ即醒

○又方 黑豆 馬料ニ用ユル 一升水ヲ入煮テ其汁ヲ煉飴ノ如クニシテコレヲ含スベシ即能言

因寒中風 其症身強直戰掉テ無汗者

ナリ用薑附湯温之 乾薑 附子 各

等分煎服ス或ハ麻黃少加

因虛中風 補中益氣湯或ハ六君子湯

ノ類ヲ用ユ人參白朮ニテ救ヲ取ベシ 諸

書ニ見タリ

中風口眼歪斜 生瓜薑搗テ汁ヲ絞リ

大麥麩ヲ和テ餅トナシ炙熟シテ心頭

ニアテ、熨ヘシ口眼ノ歪正クナラハ便チ止

ベシ度ニ過コトナカレ

中風半身冷 桑寄生ヲ酒ニテ煎シ服

スベシ緩ニ用ルニハ酒ニ浸シ置テ温メ服

ス 此物偽リ賣者多シ 正真ヲ選テ用ユヘシ

中風口噤及口歪半身不遂 其症邪經

絡ニ中ルトキハ口眼歪邪血脉ニ中ルトキハ

半身不遂 白附子 白僵蚕 全蝎

各等分細末シ毎服二錢酒ニテ送下ス

○牛黃散 中風痰厥不省人事及小兒

急慢驚風ヲ治ス 牛黃 一分 辰砂 五重

白牽牛子 二分 共ニ研テ末シ痰厥ニハ温

香油ニテ用ユ小兒ニハ右ノ半劑ヲ用ユ急

慢驚風ニハ好酒ニ蜜少許入右ノ藥ヲ

與フベシ

○史國公藥酒方 元臣史天澤ト云

人曰臣天子ノ聖恩ニ沐シ叨ニ官職

居リ節氣ノ宜ヲ謹ス遂ニ風疾ニ染テ

身偏枯手足拘攣行歩ニ堪ス療治ハ

ルト十年全ク才救ナシ官ヲ辞退シテ

里ニ歸リ廣ク名醫ヲ訪至元十七年三

月中驛道ニテ異人ニ逢面リ臣カ疾ヲ

見テ神方ヲ傳ヘ大ニ靈驗アリト云臣方

ニ依テ酒ニ浸シイニ夕服セザル先ハ人ニ扶ラ

レテ起ルコト能ズ此酒一升ヲ次第ニ飲テ

手ニテ自髮ヲ梳ニ升ヲ飲テ手足屈伸

ニカアリ三升ヲ飲テ言語舒暢ニ行歩故

ノ如シ四升ヲ飲テ肢體通煖百節遂ニ

和シ歩コト飛カ如シ其效如神乞天下ニ

頒行テ万民壽域ニ至ンコトヲト云

防風 去芦頭二十分治四肢

節疼痛痺身拘急

革薺 二十分酥炙治骨

節痛

牛膝 去芦頭二十分治手足麻痺膝

痛腰痛補精髓行血脈

驚甲 二十分治

癱瘓

秦朮 去芦頭二十分治四肢

拘急言語蹇澀

當歸 三十分補

血生血

虎胆膏 二十分酥炙是膏

節中毒壯筋骨

蒼耳子 四十分碎用去根

骨節頑麻

羌活 二十分治風濕

百節疼痛

油松節 二十分炮碎用

壯筋骨

乾茄根 六十分飯上ニテ蒸熱ス治諸毒氣

風濕在諸骨節不伸屈伸

杜仲 三丁及姜汁拌炒
去絲補腰膝

白朮 二十丁去芦去梓
炒補脾胃

右各對ミ布袋ニ入大ナル罈ノ内ニ置好酒
三十五介ヲ入罈ノ口ヲ封シ浸コト十四日満
テ罈共ニ大鍋ニ湯ヲ沸シ此中へ入テ煮
ルコト三時ニシテ罈ヲ取出シ土内ニ三日
埋メ火氣ヲ去ベシ 如地ニ埋メサレハ二月過テ
服スハ火氣亦出 毎日
清晨午後ニ右ノ酒ヲ五七杯應ニテ服
スベシ大ニ補益アリ他藥ヲ服スルニ愈レ
リト云

○傷寒諸症

傷寒六經辨

傷寒ノ書多シトイヘトモ
仲景ヨリ詳ナルハナシ但經ニ傳ルコト各時
アリ療治スルニ一法ヲ執ガタシ因テ脈法
ヲ尤ニ録ス閱者傳ル所ノ經ヲ知治ス
ル所ノ方ヲ知ハ服藥悞ナク病可愈

○脈浮紫無汗頭頂痛腰脊強者傷寒

ト云病太陽經ニアリ○脈浮長ニノ身

熱シ目疼鼻乾不得眠病陽明經ニアリ

○脈弦ニノ胸脇痛耳聾寒熱往來ノ

嘔アル者病少陽經ニアリ○脈沉細ニシテ

咽乾腹滿テ自利者ハ病太陰經ニアリ

○脈微緩ニノ口燥キ舌乾者ハ病少陰

經ニアリ○脈沉ニノ洪煩滿ニテ陰囊縮

ル者病厥陰經ニアリ

傷寒諸症

陰陽虛實ヲ論セス一切ノ

症ニ潔白ナル沙糖五錢目ヲ用ユ症ニ

隨テ湯ニテ服ス○陰症ニハ葱生姜ノ

湯ニテ服ス○陽症ニハ百滾湯ニテ用ユ

○暑症中熱ニハ新汲水ニテ服ス○虛

症ニハ米湯ニテ下ス○實症ニハ陳皮湯

ニテ下ス○傷食ニハ山査子ヲ煎シタル湯ニテ用ユ○結胸症ニハ鹽湯ニテ用ユ○蛔厥症ニハ烏梅ト花椒トヲ煎シタル湯ニテ用ユ○腹痛ニハ新汲水ニテ用ユ○婦人ノ血崩ニハ鍋臍煉ヲ湯ニ入拌テ此湯ニテ用ユヘシ

傷寒惡心 惡心トハ俗ニイフム子ワルキナリ不換金正氣散ニ白朮茯苓桔梗紫葳大腹皮ヲ加ヘ生姜入煎服ス方ハ諸書ニ出タリ故

解利兩感傷寒 經云兩感不治陰陽俱ニ受ルヲ兩感トス所稟有虛實所感有淺深若稟實感淺間亦可生治之而不救者有矣未有不治而生者 此方十中一二ヲ活スヘシ 羌活各五分 獨活

防己 黃芩 黃連 白朮 川芎 各二分
細辛 五分 生地黃 知母 各二分 水煎熟服

傷寒狂走 雞子殼湯ニテ服スハ即睡テ止ナリ

傷寒結胸停食 結胸トハ心下堅ク滿テ石ノ如クニメ痛心高ク起リ手ヲ近ルコトヲ得ズ頂強ルコト傷寒身熱ニテ醫コシラ下スコト早シテ熱氣虛ニ乘ジテ入

痞結ニテ散セサルヨリ致ス所ナリ停食トハ不食ト同シ 陳香糟古キ香物ノカスナリ六兩 生薑 四兩 石膏蒲根 四兩 鹽 二兩 共ニ

搗勻ヘ炒熱シ餅トナシ平テ胸ノ痛處ニアテ温慰ベシ内響テ即去ルモシ口渴ハ心ニ任セテ茶湯ヲ飲ベシ大便ニ惡物ヲ利下テ即愈

傷寒熱結不解 枳實五枚 大黃七枚

氏薑四枚 煎之服之

傷寒發黃 發黃トハ全身黃色ニナ

ルナリ傷寒五六日忽此症アラハ急ニ麻

油蓋ニ半分水分半分ト和シ雞子清一ツ

入攪ミセテ服ス神効アリ

傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷

陳皮 白ミツ去 生姜 一兩 水二碗八分ニ

煎シ徐々ト嚥下スベシ即愈

時疫傷寒舌黃狂言發熱 雞子一二

枚生ニテ吞ベシ即時ニ氣清ク爽ナリ

○又生藕ヲ搗絞リ汁ヲ取テ冷服ス效

アリ

傷寒喉管 此症喉ノ中癢忍難シ其

時茶酒湯水ノ類ヲ飲ベカラス若コレヲ

知スシテ茶酒湯水ヲ喫スレバ頃ニ嘔

塞テ救ベカラス 薄荷 二分 麝香 一分

極細末シ管ニ入喉中へ吹其氣通ズル

ヲ待涎ヲ一碗許吐出スベシ其後ニ陳

黄米湯ヲ茶碗ニ半分バカリ飲スベシ

即愈

傷寒發願 此症ハ原風寒ヲ受表邪

盡ス日久シテ身熱退ス頂ノ前後ニ腫

ヲ結痰痛初起ニ身熱シ口渴クモノ也

柴胡 天花粉 葛根 黄芩 桔梗

牛蒡子 連翹 石膏 各一枚 甘草 五分

升麻 三分 水煎シ時ニ不拘服スヘシ

○此症初起身熱ナク不渴上微熱アリテ腫ノ處不紅疼痛ニハ 牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉 黄連 川サヲ

赤芍藥 蘇木 其叶 各一匁 水煎服ス

○傷寒日久シテ汗不出者ニハ大ナル梨

一ツ生姜一塊同搗テ汁ヲ取童便一椀

ヲ入隔湯煮俗云湯煎熱メ服スレバ汗即出

○傷寒藥ヲ服スレバ吐出シテ不納ニハ

生姜汁ヲ半盞温メ服スベシ吐即止

○發散傷寒法 陰陽二証ヲ不問倉

卒ニ無藥時ハ生姜一兩葱白好酒大茶

碗ニ二杯一碗ニ煎シ熱服シ被ヲ蓋テ

周身汗透レハ即發散ス然レバ汗ヲ太

過スナカレ葷菜ヲ食スルコト五七日忌ベシ

春秋此方ヲ用ユ夏ハ生姜葱白半減メ

用ユ冬ハ黑豆炒テニ合加フ右煎服尤

效アリモシ旅次ニテ煎藥ナキ時ハ生姜

五片葱白四莖紫蘇葉モト無之時ニハ蘇葉ヲ代ニ用ユニ合

湯ニテフリ出シ熱服スベシ

○瘟疫諸症 赤名エヤミト云

瘟疫 丹溪曰衆人病一般者此天行時

疫治法ニアリ補ベク散ベク降ベシ

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗 蒼朮

防風 滑石 香附子 人中黃人ノ糞ナリ

右細末ニ神麴糊ニテ丸ニ每服五七丸

症ニ從テ煎湯ニテ用ユ○氣虛ニハ四君

子湯ニテ用ユ○血虛ニハ四物湯ニテ用ユ

○痰多ニハ二陳湯ニテ用ユ何レモ症ヲ

照シテ丸藥ヲ送下若熱甚者ニハ童

便ヲ加フ

○神仙百解散 山茵陳 柴胡 前胡

人參 羌活 杜活 蒼朮 甘州 葛根

升麻 防風 藁本 藿香 白芍藥

半夏 白朮 各二兩 立春已後不加減
立夏後柴胡赤茯苓當歸 各五兩 加立
秋已後八柴胡一分減之當歸赤茯苓
除辛葛根炮肉桂 各一分 麻黃 五兩 加立
冬已後八無加減右細末之每服三々ツ、
生姜三片棗ニツ水一碗半入一椀二煎
之此湯ニテ服スベシ如表散セント欲セバ
右ノ湯ニ葱白三寸加へ煎シ藥ヲ服シ
被シ覆テ汗ヲ出セハ愈

○時疫不傳方 蒼朮 三々三分三厘 粘連浸切片炒

其艸 一々六分 六厘 川芎 六分 葛根 一々三分六厘

生薑 三片 葱頭 鼠フツラ 子テニツ 右水二碗入八分ニ

煎シ空心ニ服ス已ニ病者ハ愈イニダ不病

者ハ不洩 ○又雄黃ヲ酒ニ浸シ一杯飲

ベシ時疫ノ病家ニ至レ凡決ノ傳一ナシ

○又疫大行時我家ノ水缸ノ内へ毎朝

黑豆一握ヲ入テ此缸ノ水ヲ家内用ユベシ

又寅刻ヒソカニ黑豆一握ヲ井ノ中へ

投入ベシ但人ニ見スベカラズ凡此水ヲ

飲家ニ時疫ヲ染ルコトナシ

○辟瘟丹 時疫ヲ不傳方 蒼朮紅

棗各等分共ニ研杵テ膏トシ彈子ノ

大サニ丸シ疫病時行ニ丸ヲ火ニ焼ベシ

○時疫方 半夏 川芎 茯苓 陳

皮 山查子 白朮 其艸 各等分 蒼

朮 為君 右水一碗半一碗ニ煎シ服ス

頭痛セハ酒製黃芩ヲ加フ口渴ハ葛

根ヲ加フ身痛ハ羌活薄芎防風若

藥ヲ加フ

蝦蟇瘟 其症頂腫頭大三或八頰ハシテ

薑ノ如シ 白僵蚕 二兩 姜黃 二兩五分

蟬蛻 六兩五分 大黃 四兩 各細末ミ細ミヲ

姜汁ミニテ煉ミ右ノ藥末ミヲ丸ミ之ミ重ミ一ミ兩トス

蜜水ニテ服スベシ 大人ニハ一丸ヲ用 小兒ニハ半丸ヲ用

○傷風諸症 俗ニ咳ミト云ハ感冒ノコト也 邪ノ侵ミキモ也 其ミハスミヲ傷風ト云

四時感冒風寒 初ミテ起ミルトキ葱白鬚

トモニ五根生ニテ搗酒ニ入温服ス

○一方 蒼朮 三兩 甘草 三分 生姜 大ニシテ

葱根鬚トモニ五根 春夏ハ荆芥 一兩五分

秋冬ハ防風 一兩五分 少加ハ水煎之服之被

少蓋ミテ汗ミヲ出ミニテ即愈ミ

傷風身熱有汗脉浮咳嗽痰多

陳皮 八分 紫蘇 杏仁 半夏 桑白皮

貝母 白朮 各二兩 五味子 七粒 甘草 六分

生姜 三片 棗 一枚 水煎之熱服ス

傷風頭痛發熱魚汗 水沙糖 五兩

生姜 五兩 煎湯熱服取汗

傷風發熱頭痛咳嗽 川芎 白芷

紫蘘 各八分 陳皮 七分 香附子 一兩

甘草 五分 生姜 三片 葱頭 二個 水二

碗入八分二煎之空心二服ス

傷風頭疼發熱潮熱 細辛 白芷

石膏 各一兩 川芎 二兩 水二碗入八分二

煎之空心二温服ス

傷風中寒重者 蒼朮 半夏 厚朴

各一兩 前胡 一兩 川芎 藿香 各八分

陳皮 七分 甘草 五分 水二碗入八分二

煎之温服ス汗出テ愈ミ

風熱發瘧起塊 防風 荆芥 黃芩 連翹 各一兩 甘草 五分 升麻 四分

木通 六分 枳壳 八分 桔梗 七分 水煎服

風疹 白雞冠花ヲ煎シ洗フベシ

○十神湯 時令不正瘟疫安行感冒發熱或疹ヲ出サント欲スルヲ治ス此藥陰陽兩感ヲ不問並ニ皆治之

○瘧疾諸症

瘧疾總論 王節齋曰瘧是風暑ノ

邪一日一發モノアリ二日一發モノアリ三

日一發モノアリ間一日二日連發モノアリ

日ト夜ト二度發モノアリ有汗モノアリ

無汗モノアリ上半日發モノアリ下半日

發モノアリ夜發モノアリ治法邪氣外

ヨリ入モノハ發散スベシ然レ胃氣ヲ

扶持ヲ為本又陽分陰分ヲ分別ノ

藥ヲ用ユ邪瘧及新發熱スル者發散

之或ハ截ベシ虛瘧及久者ハ氣血ヲ補

ベシ若截藥ヲ服シ過セハ脾胃ヲ傷

テ延綿テ不休

○瘧疾主方 柴胡 白朮 蒼朮 各一

已上三味瘧疾 陳皮 七分 甘草 各五分 葛

根 一兩二分 水煎服ス一日一發及午前

發者ハ邪在陽分枯黃芩 茯苓 半夏

各一兩加フ○熱甚頭痛再川芎 石膏

各一兩加フ○口渴ハ石膏 知母 麥門冬

各一兩加フ○間日或ハ三日ニ一發午後

或夜發者ハ邪在陰分當飯川芎 芍

藥 熟地黄 知母 紅花 黃柏

酒炒各 加ハ陽分へ提起テ可截之○間一

日アリテ二日連發或ハ日夜各發者ハ

○十

氣血俱二病也人參黃芪白茯苓各
 一各川芎當歸白芍藥熟地黃各一
 各加一以補氣血○陽瘧多汗者八
 黃芪人參白朮ヲ加ヘテ飲之無汗
 柴胡蒼朮白朮黃芪葛根ヲ加ヘテ
 發之○陰瘧多汗者八當歸白芍藥
 熟地黃黃芪黃柏ニテ飲汗無汗柴
 胡蒼朮本川芎紅花升麻ニテ發汗故曰
 有汗者要無汗正氣為主無汗者要
 有汗散邪為主○病人胃氣弱ク飲食
 少或ハ服截藥傷脾胃少食者人參
 五分芍藥酒製麥芽各一各加フ○食ヲ厭
 痞悶或ハ食積ル者ニハ神曲麥芽枳
 實炒各五分黃連炒五分加フ○痰盛者ニハ半
 夏南星枳實炒各一分黃芪黃連各一分加フ

若欲截之枳實黃芪青皮常山各一分
 烏梅三分加フ○日久虛瘧寒熱多或
 無寒但微熱者ハ邪氣無之只ハ物湯
方見諸書柴胡黃芪黃芪陳皮ヲ加ヘテ以氣
 血ヲ滋補スベシ

止瘧諸方

間日或ハ日々發虛瘧汗
 多者ニハ柴胡知母當歸各一分
 桂枝六分防風四分黃芪二分何首烏
 青皮各八分穿山甲土炒八分水二碗入一碗ニ
 煎之俗ニ星ノ影ヲ綴スト云フ發日ノ朝向北
 濕服

○又方陳皮澤瀉各八分當歸柴胡
各一分半夏茯苓黃芪各一分
 甘州七分人參八分但虛實ヲ考テ増減シテ用ユ水煎服
 ○又方貝母生半夏各末トシ端午ノ

日午時一處ニ合セ瘡イニダ發ズ又發ン
トスアタ際サシ飯ヲ喫間ホト前ニ右ノ藥末一
女生薑汁ニテ調服ス之止カニム

○又方 白沙糖四兩燒酒ノ内へ入レ温メ
服スベシ飲テ微醺ニ至レハ自止ラム

陳月坡治瘡方

陳皮 半夏 當歸各一

柴胡 黃芩 澤瀉 茯苓各八 耳艸各

升麻 乾葛各五 生薑二片棗一桃五

水二碗入煎シ熱服ス生冷ノ物魚類麪

類ヲ忌陳月坡云瘡方百種アリトイヘ凡

只此方穩當無悞二十劑ヲ服スベシ五六
劑服ノ後ハ人參ヲ加ヘ更易愈ニヤスレ

治陰瘡

午後ヨリ夜分ニ發ル瘡ナリ

茶碗ニ水半分入草葉一匁ヲ浸紙ヲ

蓋ニシ紙ノ上ニ人參三匁ヲ置一夜隔

次ノ日其人參ヲ飯鍋上ニテ蒸此人參

ヲ煎湯ニノ服スレハ即愈草葉ハ用ザル

ナリ如不愈再煎ノ如クニノ服ス治セス

ト云フナレ

○又方常山一兩黑豆一合ト同ク煮テ

常山ヲ去黑豆ヲ取テ食ス神效アリ

再發ルヲナレ

治久瘡

貝母一匁 當歸 川芎 柴

胡各三 水煎シ發ラサル前ニ服ス之效アリ

隔年瘡

乾姜五匁 白朮三匁 煎服ス

○又方 雄黃三匁 龜版去兩 火ノ上ニ

置雄黃末ヲ徐々ト龜版ノ上ニフリカ

ケ煨黒シ茶碗ヲ蓋テ存性取出シ研

テ細末シ酒ニテ服シ厚被ヲ蓋テ卧

ベシ立トコロニ愈

年久虚癰

人參

川芎

青皮

各二兩

當歸

白朮

炒黃

芫花仁

白茯苓

各二兩

驚風

醋二浸レタ名黄芩ニシ再レ酢ニテ
煮結ラニ槌碎キ末トスニ兩

右細末レ糊

三九梧桐子ノ大サニノ早晚日々百餘

丸白湯ニテ用ユ

疔瘡

山嵐ノ疔瘡氣ニ感レ瘡作ニ實

症ニハ藿香正氣散虚上症ニハ人參養胃

湯ヲ用ユベシ 方出諸書故畧之

吐瀉諸症

嘔吐

食スレハ即吐ハ為火食停久シテ

吐ハ為寒皆脾胃和セザルヨリ發ル

蒼朮

厚朴

各一

陳皮

八分

甘草

四分

半夏

茯苓

各一

寒症ニハ丁香乾姜

肉桂

各三

加フ熱アラバ姜製黄連五分

加ヘ右煎服ス

胃腹食納ス吐

人參

白朮

半夏

各一

其州

各五

茯苓

二分

陳皮

五分

丁子

三分

縮砂

五分

煎服ス

霍亂吐瀉

霍亂ハ揮霍撩乱スレ也外

感内傷陰陽乖隔リ上吐下利ス陽

偏ナルハ熱多ク陰偏ナルハ寒多ク此症

率然ニ發危ク風前ノ燭ノ如シ吐瀉者

ハ濕霍亂ト名ツク輕シ所傷物ヲ盡ク

出スユヘナリ吐セントノ吐セズ利セントノ利セ

ス乾霍亂ト名ツク所傷物ヲ出スヲ

得ズ死スル一甚速ナリ鹽湯ヲ用テ探

吐シムベシ吐ハ則寛五穀ノ食ヲ與ル

十カレ口ニ入ハ即死ス飢一甚ク吐瀉シタ

ル後二時三時過テ粥ヲ少ク食サス

○治方 吳茱萸 木瓜 鹽各五 各炒
焦先磁罐ニ水三碗盛煎能沸右藥
ヲ入煎ノ一碗半ニ病人ノ立息ニ隨ヒ冷
ニテモ熱シテモ服ス

○又方 生半夏燻之脐ノ内ニ貼ベシ
之止モ死ノ腹尚煖ナレ氣ヲ入ル鹽ヲ
脐中ニ入上ニ灸七壯ス立トコロニ生イ

○霍乱腹痛スルニ炒鹽一撮陰陽水一
杯ニ入調服ス腹痛稍止時服藿香正
氣散陰陽水トハ湯半碗ト水
一半碗ヲ和自ハタルヲ三ナリ

霍乱但一點胃氣存者 陳皮 藿香
各五錢煎服愈

傷暑霍乱吐瀉 其症暑伏熱ヲ胃ニ
煩悶シ氣不升降霍乱轉筋嘔吐泄瀉
寒熱交リ痰喘咳嗽胸痞頭目昏痛
肢體浮腫小便赤澀急愒即ラ好者

猪苓 澤浮各七 赤茯苓 乾葛各一 天花
粉ニ 香薷 黃連 白朮 甘草各五分

生姜三片水二碗入八分二煎之温服ス
泄極ニ八分麻七分 黃芩石膏各八分 加フ
○熱極ニ八石膏知母各一加フ○腹痛ニ八

芍藥炒五分 肉桂三分 加フ寒痛ニモ此加味
ヲ用ユ○右病症如藥ナキ時ハ絲瓜葉
一片白梅一枚并核中仁同研爛ニ新汲
水ニテ用ユベシ忽瘥

胃氣虛冷吐瀉 蒼朮二分 厚朴一分 陳
皮八分 甘草五分 水煎服ス

水瀉 艾三 水煎空心ニ服ス或ハ枯
礬炒 砂糖ニ和テ小丸ニ三粒ヲ
用ユ油膩ヲ忌ベシ

五更浮 又腎浮ト名ツク早朝寅刻ノ

比浮ナリ蓋陰感然脾ハ濕ヲ惡ム濕則

滯テ困ム困ムトキハ水ヲ制スルヲアタハズ

水性ハ下流則腎水不足五味子二兩

吳茱萸五々各炒細末ニ毎服二々陳

米飲ニテ用ユ

○又方四神丸 破故紙酒一夜浸 肉豆

蔻麩二包 五味子二兩 吳茱萸一兩 石為

末生姜八兩切片大棗百ト同ク煮爛シ

生姜ヲ去棗肉ニテ右藥ヲ子リ桐子大

二丸シ毎服一々五分生姜湯淡ノ用ベシ

此丸藥原脾胃虛弱小便不利飲食ヲ不思或ハ泄瀉腹痛等症兼テ腎泄瀉晨瀉泄者ニ次録キ

悉給之

脾瀉胃弱 沉香二々 茯苓 石斛 白

茯苓妙去刺 枳實麩炒 南星 厚朴姜炙

肉豆蔻 白朮絡五 山藥ハム 神麩ノ糊ニ

テ丸シ毎服二錢ツ、白湯ニテ用ユ寒熱

ニ不拘服之皆能順氣理脾

○痢疾諸症

痢疾總論 王節齋曰、痢是濕熱食積

ノ三者赤白青黃黑五色ヲ別テ五臟ニ

屬ス白者濕熱氣分ヲ傷ル赤者濕熱

血分ヲ傷ル赤白雜ル者ハ氣血トモニ傷ル

黃色ニ濁ル者ハ食積也治法腸胃ノ濕

熱ヲ深シ鬱結ノ氣ヲ開キ積滯ヲ消

化ス其初ハ下之下後イニダ愈サレハ調之

痢病久シキ者ハ下スベカラス胃虛スルニハ

ナリ痢ハ多ク熱ニ屬ス亦虛ト寒トア

リ虛スル者ハ補ベシ寒ナル者ハ温ムベシ

老人又虛弱ノ久ハ下スベカラス

○主方 黄連炒五分 黄芩炒五分 白芍炒五分
 木香 枳殼炒各五分 枳榔子五分 甘草三分
 煎服 ○腹痛ニハ當飯五分 宿砂一分 再木
 香芍藥各五分 加フ ○後重コウチヤク 小便澀シレニハ滑
 石炒五分 再枳殼 枳榔子 芍藥生 黄芩各五分
 加フ ○白痢ニハ白朮 白茯苓炒 滑石
 陳皮各一分 加フ 初ニ欲下クニ之加 大黃五分 ○
 食積ヲ兼ル者ハ山楂子 枳實各一分 ○紅
 痢ニハ當飯 川芎 桃仁各一分 加フ 初欲下クニ之
 再大黃五分 加フ ○赤白相雜シレニハ當歸
 川芎 桃仁各一分 加ヘ 理血 滑石 陳皮 蒼朮
各一分 加ヘ 理氣 食積ヲスバ又 山楂子 枳實
各一分 加フ ○白痢久シク 胃弱ク 氣虛シ或ハ
多下後愈ガルニハ 黄芩 黄連各七分
ツ、減シ 白朮一分 黄芩 茯苓 陳皮各一分

宿砂 乾姜各五分 加ヘ 枳榔 枳殼ヲ
 去ベシ ○紅痢久シク 胃弱ク 血虛シ或ハ
多下後愈ガルニハ 黄芩 黄連各五分 ツ、減
 シ 當飯 川芎 熟地黄 阿膠 陳皮各一分
 白朮一分 加フ ○赤白相雜シレニハ 濕勝多也
 小便澀シ少キニハ 木通 澤瀉 茯苓各一分
 山梔子一分 加ヘニ 介利之 ○血痢ニハ 當
 飯 川芎 生地 黃桃仁炒 槐花各一分 加フ 久
 シク不愈 黄芩 黄連各七分 減シ 枳榔子
 枳殼ヲ去 再阿膠 側柏葉炒各一分 黑炒乾
 姜一分 白朮一分 陳皮一分 加フ ○痢病ニ
 久シク後重 不去 此大腸墜下スルナリ 枳
 榔 枳殼ヲ去 加升麻一分 升提之 ○嘔吐
 食セサルニハ 石膏一分 陳皮一分 山梔子
 仁一分 加ヘ 生姜汁ヲ入テ 緩ニ 呷之以 瀉

胃口之熱

有一種氣血虛而痢者 四物湯二人參白

朮陳皮黃芩阿膠ノ類ヲ加ヘテ補之痢
自止氣下陷セハ加升麻

右一種寒痢 黃連木香酒炒芍藥當

飯炒乾姜宿砂厚朴肉桂之類ヲ用テ
温之

痢疾誤服温熱止法之藥 稍久レキモト

イハレ前法ヲ用テ下之 後可調之 又前

法ヲ用テ下シイニダ愈サレハ又前調理

法ヲ用テ治之 然レハ久シク愈サレ者ハ

此虚寒ニ属ス前ノ虚ヲ補方寒ヲ温

ムル方ノ中ヲ擇用テ更ニ竜骨赤石

脂罌粟殼烏梅等ヲ加ヘテ收法之

治紅白痢方 三月三日薺菜花ヲ根ヲ

連子揉テ風麩ニ掛テ陰乾ニシ瓦上

ニテ焙乾ノ灰トナシ砂糖湯ニテ服ス

○又方 陳細茶 生姜 水一

杯半ハ八分ニ煎シテ食ヨリ間アリテ服

ス痢疾近ニモ久シキニモ赤白共效アリ

噤口痢 男女共ニ痢ヲ病食物湯水

モ不下喉者ヲ云フ烏梅一升敲碎キ盆

中ニ置 水十餘碗煎シテ入レ

熱シテ病人ヲ其盆上ニ坐セシメ熱氣

ヲ肛門ニ冲上ルヤウニ温メ即此湯ニテ

病人ヲ洗ハハ腫出ル時扶テ寢床ヘテ

ラシ粥湯ヲ與ヘテヤウスヲ俟フベシ

食ヲ思ヒ氣アラハ又粥湯半碗ホト與ヘ

少頃シテ稀粥ヲ半碗與フ必一度ニ

多用ユベカラス小兒ニハ右方半減ノ可也

○又方 黃連三々 人參一々 水煎温服
藥入口即甦

○又方 木鱉子研テ麩ニ和餅トナシテ
脐中ニ貼ベシ亦效アリ

○又方 五倍子フツレ 車前子ヒキチヤ 細茶各二々
煎服ス

○又方 老蓮子ヲ末トシ陳米湯ニテ
調テ三々服ス或ハ秤錘ヲ燒紅クシテ
醋ヲ澆之病人ニ其烟ヲ嗅シムレハ即
胃口開テ飲食ス

痢赤白俱治 蘿蔔糖テ汁ヲ取 蜂蜜ト等分 三四匙服スレハ愈

○又方 白沙糖 茶葉 蓮肉 紫蘆
生姜各三 烏梅二個 水煎服ス但赤痢
ニハ煎ノ一夜露シ翌日温服ス白痢ニハ

其ニ煎服

下痢純血 生姜黒クナルホト炮末トシ

每服二々米飲ニテ用ユ

○同久不愈 阿膠蛤粉ニ炒 黃連酒洗

當飯洗兩各 烏梅肉ヲ焙燥 乾姜炒黒ス

右細末トシ阿膠ヲ解化麩糊ニ和桐子大
丸ニ空心清酒ニテ百丸用ユ

痢病三四月者 瓜蒂一個 子穰共二

黑燒ニシ為末好酒ニテ一服ニ用ユ

○久痢ニハ木香五々 耳朮多 黃連各三

訶子一兩半生 右為末芍藥白朮ニ煎湯
ニテ二々ツク服ス

疫痢 コレ一人痢ヲ病テ他人即傳染

者ナリ蒼朮一兩水 三天碗入二碗ニ煎
ニ蒼朮ヲ去 其煎湯ノ中 防風白朮

白芍藥羌活人中黃各一匁入煎之
一碗トシ温服スヘシ

○痰嗽諸症

痰嗽總論 丹溪曰熱痰濕痰食積
痰風痰老痰燥痰有大法降火清
肺火降トキハ痰自除也經曰咳ハ魚
肝痰有聲謂嗽魚聲耳痰アルラ云咳
ハ肺氣ヲ傷テ脾濕ヲ動ス也病本
六氣ト五臟ノ殊ヲ分トイヘ凡其要ハ
皆肺ヲ主トス肺ハ氣ヲ主リテ聲出
治法新久ト虚實トヲ分ツベシ新病
風寒者ハ發散之火熱ハ清之濕熱ナ
レハ瀉之久病ハ虚ト鬱トニ屬ス氣虚
ハ氣ヲ補血虚ハ血ヲ補一鬱トヲ兼ルハ
鬱ヲ開キ滋之潤之飲之降之コレ治

痰之法也 痰嗽諸症ノ藥ヲ服スルニハ
卧時ニ臨テ細々嚥下スヘシ能肺經ニ入也

○竹瀝達痰丸 此藥ヨク痰ヲ大腸ニ運
シ大便ヨリ出之氣ヲ不損達痰如神一
切痰火咳嗽無不治之

半夏 二兩湯ニテ泡スル七度洗生姜
汁ニ浸晒乾切片微火ニ炒熟用之 人參 去芦 一兩

白茯苓 二兩 陳皮 去白 二兩 耳朮 各一兩
白朮 三兩 微火 炒 大黃 三兩酒浸 黃芩 三兩酒浸 沉香 五匁

青礞石 一兩 煅クダキ煅硝 二兩 和合セ 銷銀罐ニ入レ
煨過シ蓋ニ蓋ニ鹽泥ニテ封シ固メ晒乾シ炭火ニテ
コトク黄ニテ取テ用ユ 右細末シテ竹瀝大碗ニ

一ツ半生姜汁ニ杯ト和勻ヘ鍋ニ入煎スル
一刻許ニ右ノ藥末ニ和搗テ醬ノ如クシ

磁器ニ入レ晒乾シ又竹瀝生姜汁ニ和搗
一前ノ如クシ再晒乾ス如此スル一三度其

後竹瀝ニテ煉合小豆ノ大サニ丸ニ食速一

度二百丸ツク白米湯ニテ服スヘシ 丹溪曰痰在四肢非

竹瀝不

痰火 真麻油 三兩 牛黄 五錢 明礬 一兩

研末ノ油ノ内ニ浸シ痰火發時一二匙服

スレバ痰自下ル

○又方 老足西瓜 乾熟之也 一個 青皮ヲ

削去孔ヲ一ツアケテ蜜一碗ヲ入シ繩ニテ

絡風處ニ掛テ冬ヲ過シ春ニテリテ取用

凡痰火嗽ニ鍾ニ半分ホト服スレバ立愈

○又方 天薤水 霜降テ後老タル天薤一株地ヲ

ハサミ汁ノ存スルヲ 瓜蒌仁 天花粉 羌活 紅花

生姜汁ヲ加ヘ煉テ膏トシ服スレバ即愈

遠年痰火 肉桂 甘草 款冬花 炒

旋覆花 炒各 貝母 二錢 共研末シ甘草ノ管ニ

入テ不時ニ咽喉内ヘ吹ヘシ肺穴敷用テ咳

嗽ノ妨ナシ但一度ニ多ク吹入ベカラス餘

々ト少吹入ルヲ妙トス

○又方 飴二兩 豆腐漿一碗煮テ化シ

頻ニ服ノ愈

老痰 男女久シク老痰ヲ積或失音或

發喘或ハ氣促湯藥不效者蜜陀僧一

二錢砂糖ニテ調ヘ白湯ニテ送下痰ト

藥ト大便ヨリ出テ無礙愈

風痰喘急逆呃欲吐眩暈欲倒 大九半夏

生ニテ 雄黄 三錢 細末シ姜汁ニテ蒸餅ヲ

煉糊ニシ胡椒ノ大サニ丸シ每服五十九生

姜湯ニテ用ユ

痰暈 痰ニテメヒスルナリ明礬名火ニ

煨研末シ生姜湯ニテ服シ吐逆シテ愈

○痰厥氣絶シ心温者ハ千百羊ノ石炭一

合 古塔旧城ナドノ堀ニ 水一大碗煎ノ去水再ヒ

清水ヲ入レ煎之澄清ヲ傾ケ出シ口中へ灌之痰下テ自愈

久咳嗽連四五十聲者 生姜汁半合蜜一匙加へ煎之温服ス

冷咳 咳トハ喉ニ痰ツマリセリツクナリ

咳吼 咳トハ喉ニ痰ツマリセリツクナリ

清晨ニ豆腐漿ヲ服ノ愈

○又方 茯苓 乾姜 各一 南星 石膏 各七 生半夏 杏仁 各五 研末之烏梅ト

燈心ノ煎湯ニテ一度ニ三々ツ服スベシ

咳嗽吐膿 此肺傷也 知母 貝母 白芷

枯礬 各等分研細ニテ每服三錢生姜三

片煎湯ニテ藥ヲ嚼服ス三五度ニノ愈

聲啞 音ノ出サルナリ椿樹皮五水煎服ス

○粟失音ニハ猪油一升入鍋煎シ渣ヲ

濾去白蜜一升入再煎之少頃ノ濾淨メ

磁器ノ内ニ入冷テ膏ト成時々二三匙ヲ

服ス六其音次第ニ清ク頓潤肺妙也

○勞損諸症 勞瘵虚損イラ註ス

傳屍勞 瘵瘵ノ中ノ一證ナリ三尸虫トテ

人ノ臟腑ヲ食虫ナリ瘵瘵ヲ一人病シヨ

リ一家ノ親類ニ傳染テ悉死スル症ナリ

癩肝又ハ癩瓜ヲ粉ニシ酒ニテ服スハ愈

虚怯 勞症ナリ鰻魚一條一升ノ重サ

アル者古キ壺ニ入鹽泥ニテ壺ノ口ヲ塗

封シ固メ火炙撃碎内ノ白キ處并鰻

灰ヲ取研末トメ米飲ニテ二匙ホドツク

用レハ自愈

骨蒸勞熱 地骨皮一兩 小青州三々 細五見

六月霜五ノ胡黃連一ノ紫胡二ノ蒼
苡仁三ノ鷄一隻四ノ洗淨五ノ右ノ
藥ヲ腹ノ内ヘレ線六ノニテ逢酒ト水ト等
分ニ合セ鷄ヲ丸ナカラ煮テヨク熟タル
時酒ニテ鷄ノ肉ヲ啖ヘシ其骨ハ炒七ノ
シ右ノ藥ト共ニ細末ニ煉蜜ニテ桐子
大サニ丸シ毎日巳ノ時申ノ時ニ三々ツク
白湯ニテ服ス

怔忡

△ナサワキ也其症心中ノ每ニ人ニ捕
ラレントスル狀ノ如ク思ナリ半夏茯苓
人參各等分煎シ服ス即愈

○又方

辰砂五分當歸五分猪心肉血
ニテ丸シ睡ントスル時酒ニテ一錢ツク
服ス亦效アリ

腎經虛損

俗ニ水ノ其症目眩耳鳴四

肢倦怠心腹脹滿足膝酸痛步履艱
難小便澆數或水道涸痛時有遺瀝

等此方治之

兔絲子五兩沙ヲ淘去白

茯苓二兩

蓮肉二兩

山藥二兩右為末

山藥ノ末二兩ヲ水ニ煮テ糊トシ餘ノ
藥末ヲ和桐子大ニ丸シ毎日清晨空心

ニ二三々ツク白湯ニテ用ユ

諸汗

黃芪 黑豆 煎湯飲之半月

ニソ全愈

自汗盜汗

當歸六黃湯ヲ用テ效アリ

不寐

夜寐ラレサル症也病後虛弱及

高一ノ人陽衰テ不寐者アリ大極補二ノ氣

安神

人參 乳香 硃砂各酸棗

仁炒四

蜜ニテ彈子大ニ丸シ睡時分ニ

竜眼肉ノ煎湯ニテ用ユ

○又痰膈^{タシヤク}經^{キョウ}ニ在テ神不^{シノ}飯^イ舎^カ不^シ寐^シ者
アリ温^ユ膽^{タン}湯ノ加減用^ユ之^ヲ 方ハ諸書ニ見タリ

見血諸症

此條下ニハ吐血衄血下血等
ヲ註ス

吐血總論

人身ノ血ハ水ノ地中ヲ行ガ如

シ百川^{モウカハ}皆理^ヲルトキハ水壅^{サカサカ}逆ノ患ナシ一

身ノ榮衛<sup>榮トハ陰血也
衛トハ陽氣也</sup>調^レヲ失シ七情四氣相

干^ラシ氣血逆^{サカサカ}乱^レヲ致^スシ變^レメ吐血^{トクヘツ}咳^{カキ}血ノ

諸症ヲ生ス夫血ノ妄行^{ミヤリニメ}ハ固積^{モト}熱ノ致

ス所ニ因^ヨ然^レレ其症多^ク端^ハ飲食ノ過

ルニヨリ又重^ク物ヲ負^フテ胃ヲ傷^フリ吐血ス

ル者アリ思^レ慮^ルニ心ヲ傷^ルリ并ニ熱ヲ積^ル

テ吐血^{トクヘツ}衄^ノ血出^ルル者アリ苦^ク勞^クシテ心肺

ヲ傷^ルリ又七情ノ為^ニ于^テサレ咳^キ血吐^ク血ス

ル者アリ心ハ血ヲ主^トトリ肝ハ血ヲ藏^ルコ

脾ハ血ヲ統^ルルナリ故ニ思^フ過^クノ脾ヲ

傷^ルル者モ能吐血^セシム治^ス之方其因^ト

コロヲ究^ムムベシ傷^ル胃^者ハ調^レ胃^安血^勞

心^者ハ補^シ益^ス心志積^ル熱^者ハ清^ク之^ヲ氣鬱

スルトキハ順^之傷^ル脾^トキハ安^之其脉ハ

宜^シ沉^シ細^シ不^レ喜^シ浮^シ數^シ血ヲ吐^テ不^レ咳^ハ易^ク

治^ス唾^中ニ紅^キ絲^ノ如^クナルヲ交^ルモノハ

難^ク治^ス損^スルトコロアルカ為^{ナリ}

○止血方 蒲^黄生^地黃^{各一}鐵^ヲ忌^ス

磁^器ニテ水ニ碗^{八分}ニ煎^シ藕^ハ節^{七枚}

七枚搗^テ汁ヲ取^リ煎^藥ニ入^レ食^後ニ

温^ク服^ス

○又方 葦^菜根洗^石白^ニ入^木杵^ニテ

搗^キ爛^童便^ヲ入^レ布^ニテ絞^テ渣^ヲ去^リ

汁ヲ茶碗^ニ入^レ火^邊ニ置^温メ濁^者ハ

碗ノ下ニ居ルヲ不用上ノ汁ヲ澄メ服ス

夜熱咳嗽口燥吐血初起 黄芩四兩

猪胆三個ニ拌勻飯鍋ノ上ニ蒸 軋

乾如此スルヲ三度ニシテ細末糊ニテ

丸ニ空心ニ白湯ニテ用ユ輕キモノハ四

兩ニシテ即愈重キモノハ一升ヲ服メ效

アラスト云フナシ

吐血咳嗽 阿膠 蛤粉ニ拌セ 天門冬 去心

貝母 水洗去 心五分 白茯苓 五分 杏仁 湯ニ泡シ度

炒テ黄色 共ニ細末ニ煉蜜ニテ竜眼肉

ノ核ノ大サニ丸ニ時々一丸ヲ嚙化服ス

或本州五々加フモ可也

又方 藕節汁 梨汁 茅根汁 和寬

蘿蔔汁 雞冠油 麻油 各四兩煎ニ煉テ

膏トシ服ス

又方 童便一椀ニ生姜汁一二匙入

緩ニ服メ自愈

血熱妄行 生荷葉 生艾葉 生栢葉

側柏葉 生地黃各等分搗爛ニ雞子

大サニ丸ニ一粒ヲ水ニ碗ハ八分ニ煎シ

渣ヲ去テ服ス

血噴成升汁者 花葉石多少ニ拘ス

煨存性細ニ研童便一盞ヲ温メ右ノ

藥ヲ三々食後ニ用ユ男子ハ酒ヲ童

便ニ和女子ハ醋ヲ和テ藥ヲ服シ後ニ

獨參湯ヲ用テ補之睡テ覺レハ即止

痰中見血 白朮 牡丹皮 各一分 當歸

芍藥 桃仁 去皮尖 研 貝母 各一分 黃芩 八分

桔梗 七分 青皮 五分 耳朮 三分 水煎服ス

凡吐血下血 其症皆内損ニ因或ハ酒ト

色ト過度或ハ心肺ノ膜破血氣妄行
血泉ノ湧如ク口鼻ヨリ出ル者ニハ

側柏葉焙乾 人參焙 細末毎服二々

ツ、用ニ再ヒ飛羅麩二々加ヘ井花水ニ

調ヘ糊ノ如クニノ服ス

○又方 荊芥一握ニキリ 黑燒ニシ火氣ヲ立シ

細末シ陳采ヲ煎シタル湯ニテ三々用ユ

二三服ニ不過自愈

鬱熱在內吐血及咯血吐血下血 枸杞子

柴胡 黃芩 地骨皮 天門冬去心 白芍

藥 黃芪各一 黃連八分 生地黃 熟地

黃各一 耳朮四分 水煎空心服ス 下血

ニハ地榆一々加フヘシ

鼻血不止 麥門冬去心 生地黃各一

煎服ス

○腫脹諸症 鼓脹水腫脹滿等ヲ詳ス

鼓脹 鼓脹ノ症ナリニ氣鼓。食鼓。熱

鼓。風鼓。勞鼓。濕鼓。蟲鼓。疝鼓。胸腹腫

脹。并ニ四肢腫者アリ病人ヲ見ルニ腹ヲ手

ニテ按テ窩ハ可治脉壯ナル者ハ易治

脉細ニノ臍腫出ル者掌上無紋米穀

不消陰囊魚鱗者ハ皆難治

雞裏金一貝ニハトリノエダク 沉香 砂仁各三

陳香圓去核五々陳ヲ用 右細末シ生姜湯ニ

テ五々ツ、用ユ

氣鼓 大麥鬚陳キ者ヨシ煎湯ニシ

服ス泄氣即消ス

鼓脹水腫 陳皮 木通 大腹皮鹽水洗

茯苓各一 車前子三々 茵陳五分 薏苡

仁三々 水煎服ス淡物ヲ食スヘシ

○又方 絲瓜乾毛 去皮剪碎 巴豆十四粒入共炒之 巴豆ノ色黄ニナルトキ 巴豆ヲ去リ 絲瓜バカリニメ其内へ陳倉米年ヲ経タルヒ子米ナリヲ等分ニ入炒テ黄ニシ 絲瓜ヲ去米バカリヲ研テ細末シ 清水ニテ梧桐子大サニ丸シ 一度百粒ツク湯ニテ用

腫脹不服藥自去水方 水銀真者者粉ニスニ

巴豆去皮研テ去油四兩 硫黄生一兩 右研テ餅トナシ 臍上ニ貼ベシ 黄水自下貼ル時先糸ヲ一上ニ糸餅ヲ貼其上ヲ帛ニテクリ人二里ホド道ヲ行間アルハ黄水自下ルニ五度下ラバ餅ヲ去テ病人ニ温粥ヲ與ヘテ補之ヘシクシキ病久ハ日ヲヘタテ右ノゴトク水ヲ取ナリ但一ノ糸餅一十度用テモ神效アリ

水腫腹脹及黄疽火丹發腫 香圓陳久者去

穰四 人中白陰煉三兩 共ニ為末 每服一匁白湯ニテ用ユ

火丹 丹毒ノ一種ナリ芥葉搗爛敷之

○又方 蚕沙 山栀子 黄連 黄芩 黄柏 大黃 寒水石 共ニ細末シ水ニテ調ヘ敷ヘシ立愈

○黄疽諸症 五疸 症有五トイヘ凡皆湿熱ヨリ發ルハ異ナルヲナシ蓋湿熱脾胃ノ中ニ積コト久クシテ不散故ニ其土色面ト肌膚トニ形ルナリ

穀疸 食シテ後頭眩心中怫鬱不安 饑飽所致胃氣蒸冲而黄ナリ

苦参 二兩 龍胆 一兩 牛膽汁 一兩 煉蜜少許入桐子ノ大サニ丸シ 一度ニ五十九丸空心ニ生姜湯或耳中湯ニテ服ス

酒疸 身目俱黄心中懊懣シ足脛滿尿赤久面黄赤斑ナリ酒後胃熱醉卧

○二十六

風水浸ニ當ルニ因テ此疾ヲ得

山梔子十五 大黄一兩 淡豆豉一兩 枳實五個

水煎シ服ス

女勞疸 額黒ク身黄少腹滿急小便不利房事ノ後水湿ノタメニ搏レテ

得之 硝石 礬石 各煨過シ等分細末シ大麥ノ粥ノ汁ニテ調毎日ニ々ツ、

日ニ三度服ノ取汗ヲ

黄汗 汗山梔子水ノ如ク衣服ヲ染

テ黄ナリ咽不渴是脾熱汗出テ入

氷浴スルニヨツテ致ス所也

黄蘗 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩

麥門冬志 豆豉各一兩 甘草炙五 右細末

之毎服五々淡姜湯ニテ食ヨリ遠ク

服スヘシ

黄疸 通身面目悉ク黄ニノ金ノ如シ

白朮 猪苓 澤瀉 茵陳各一兩 茯苓十五

細末シ白湯ニテ五々ツ、毎日三度

服シ多温湯ヲ飲テ汗ヲ出セバ愈

黄疸通治方 三白朮一把搗テ汁ヲ

茶碗ニツ取白酒ノ内へ入空心ニ服ス

冬ハ用根汁ヲ取酒ニ和テ服ス若貯

ント欲セハ根ヲ晒シ乾シ服スルトキ細

末シ三々ツ、酒ニテ用ユ

○又方 枸杞根搗テ汁ヲ取生白酒ニ

和熟シテ服ス

○又方 土牛膝四兩生白酒三碗煎シ

沸一六七度空心ニ連服ス三日ノ除根

○又方 純黑猪胆一個 陳黄芩炒テ粉

猪胆汁ヲ入テ為丸生白酒ニテ送下ス

○又方 白芥子ニハ五分 研碎 燒酒ニテ
解トキ白布ニ攤ヒラケ之ヲ臍ノ下少肚ノ上ニ貼ツクベシ
一時過スニテ貼ツクタルトコロ泡フケヲ起ラフスラ度ト
ノ藥ヲ去ル鹽又ハ甜物ヲ忌ヒベシ

陰黃虛黃二症 陰黃ハ四肢冷自汗

シ泄利小便清白脉沉遲ナル者也虛黃
ハ耳鳴口淡怔忡微熱アリ四肢無力急
惰嗜卧脚軟弱脉沉細ニシテ寒熱之
澁白者是ナリ至方理中湯ヲ用テ治
之空心ニ服スベシ 方諸書ニ出
タリ故畧ス

黃病 六味地黄丸加綠礬二兩 醋炒
紅

白湯ニテ朝夕服ス

瘀血發黃 其症發熱之小便自利之

大便黒ク脉芤濡ナルモノナリ

榔仁 大黃 芒硝 各一 甘草 六 桂枝 八

牡丹皮 一 枳殼 八分 右大黃芒硝ニ味

ヲ別ニノ餘藥ニ水ニ碗入一碗ニ煎シ大

黃ヲ入一二沸シテ再芒硝ヲ入一沸シテ

熱服ス大便ニ黒物ヲ下シテ愈但此方

泄利ナバ人ノ虛實ヲ量テ用之妄ミタリニ

投トウシテ悞アヒルヘカラス凡ツ此方一切瘀血脹滿

大實シ大痛手モ近ツクベカラサル者服

之立ドコロニ效アリ

○痞積諸症

諸痞積 丹溪ノ論ニ積聚癥瘕一症

ナラス積者停蓄トクハクルノ總名也在中在左

在右ト云フ分テ治スベシ凡塊ハ形アル

物ナリ氣ハ形ヲ成ナステアタハス痰ト食

積ト死血ト而已其積塊在中為痰飲

在右為食積在左為死血大法鹹ヲ

以テ軟之堅ヲ以テ削之ツクリ行氣用痰為ツクリ
至久痞及老人ハ大約妄動ベカラス虚
損ノ人亦乱治スベカラス孕婦ハ痞ヲ
治スベカラス恐クハ其胎ヲ傷ラシ慎之
枳殼 八分 大腹皮 一匁 藜蘆 八分 厚朴 一匁
青皮 一匁 莪朮 八分 山查子 二匁 烏藥 六分
香附子 一匁 宿砂 五分 木香 三分 水二碗入
八分ニ煎シ空心ニ服ス三四劑ニノ愈
○痞塊ヲ熨法 葱ヲ蜜ト搗合セ布
キレニ攤患處ニ貼テ熨斗ニ微火ヲ入
テ徐ニ熨之痞立トコロニ下ルナリ

○同貼藥 松脂 水煎乾シ 革麻子肉

搗爛 皮硝 五匁 共ニ搗テ膏トシ布ニ

攤痞ノ大小ヲ量テ貼ベシ或ハ貼ルトキ

麝香二厘加テ弥良此膏藥痞退バ

自落ル妙也

○又方 清油一介 蜜陀僧六兩 銀炒底

細末 先油ヲ煎スルヲ數刻次ニ蜜陀僧ヲ

入羌活末一兩餘入レ煉テ膏ト成ント

スル時阿魏五匁麝香二匁ヲ入レ煉テ

水ニ一滴落シ見テ珠ノ如クナリキニ粘

カルヲ為度止藥ヲ熬法春冬ハ軟ニ

秋夏ハ硬クスベシ痞ノ大小ニ隨テ布ニ

攤貼ベシ立トコロニ消セスト云フナシ

諸物食積作痛 白朮 茯苓 半夏

各一兩 蘿蔔子 二匁 山查子 十五匁 陳皮 五匁

細末ニ煉蜜ニテ丸彈子大サニノ空心

ニ米湯ニテ一丸ツ、服ス

食積血痞 木賊モクソクヲ粉ニシ三四分空

心ニ白湯ニテ服スレハ痞自消ス年久シ

牛者王二服ニ不過ニテ愈

諸蟲積

苦棟根

東ニ向ヒ上ニ出サレ者佳シ
皮ト滑トヲ去リ四兩

史君子

穀ヲ去
二兩

生姜

切片
三兩

右一服トシ水

五碗入三碗ニ煎シ渣ヲ去再煎ノ一

碗トシ白蜜四兩加ヘ又煎ノ一碗トシ

星月ノ下ニ一夜露次朝空心ニ服ス但

一度ニ八服シガタシ三五度ニ用ユ凡此

藥ハ朔日ニ服シテ佳不吐不瀉喪大

便ノ中ヨリ團成テ出虫少キハ一服多

ハ二服ニシテ除根

諸虫作痛 口中必涎流出湯水ヲモ

飲一アタハズ命危者ニハ

烏梅 花椒 生姜 煎湯ニシテ服フ

○又方 蘆薈 二兩 史君子 去殼 雷丸

各四 苦棟根 東向者 蒸黃仁 炒 鶴虱 卅

楮椰子 各五 研ニテ細末シ砂糖ニテ一丸
重サニ及ニ九ニ五更ニ一丸服ス 或ハ猪肉ヲ
煮タル湯ニテ

服シテ
如ニ愈

追蟲去積方 大黃 楮榔 木香 黃

連 夏月ハ
倍ス 各等分細末シ毎服三及白湯

三テ用ユ治痢尤效アリ

貪食茶葉壁泥椽炭石炭生米等 此症

皆虫ニ屬ス 芝麻 炒一碟
胡麻也 雄黃末三分

二拌セ始白湯ニテ用下ス三日ノ後夕、

芝麻ヲ炒テ喫ベシ半月ニ自愈

○又方 生樞一升 每日砂糖ニ蘸數十

粒喫ベシ一升ヲ食シ盡スラ度トス或ハ

史君子肉四五枚半生半熟ノ芝麻ト

同食シテ更ニ效アリ

○貪食茶葉面黃腹有蟲每日空心

川椒百粒白湯ニテ吞下ス自愈
川椒ヲ用ルモノ

痞滿 心下堅如盤者ニハ 枳實 蘇枳

白朮 三々 水一杯七分ニ煎シ温服ス

○消痞法 独頭蒜 穿山甲 艾 卷上

各等分先穿山甲ヲ洗ヒ淨メ瓦上ニテ

煨炭ト成研テ細ニシ又艾ヲ揉碎拌セ

春ニ入蒜ト共ニ搗合セ薄キ餅トナシ

痞ノ大小ニ隨テハリ付線香一炷ノ間

置テ解ラ去ル痞忽消ス

○痿痺諸症 附諸風

痿症 痿症ヲ皆風ト作テ治シ候テ

熱燥ノ劑攻風藥ヲ用ユベカラス凡不痛

者ヲ為痿屬虛痛者ヲ為痺屬實

症各有別蓋痿病ハ肺熱ヨリ生ス血氣

少ク虛火盛ニシテ金ヲ制ス肺葉焦枯宗

筋不潤金既ニ水ヲ生シ以テ肝木ニ

乘シ旺スルヲアタハス脾土受傷トキ骨

痿軟ニシテ筋弛四肢拳ガタク伸縮動

スノ不能狀若癱瘓者久此劑ヲ服

スベシ 當歸 白芍 杜仲 牛膝 黃

芪 白朮 熟地黄 知母 黃柏

各ハ 水煎空心ニ服ス

軟癱 椶皮燒テ灰トシ毎服ニ酒

ニテ服ス久用テ效アリ

筋骨疼痛手足痿不行 白朮 羌活

赤芍藥 當歸 甘草 海桐皮 白芷

鬱金 烏藥 香附 各等分水煎

空心ニ服ス

風氣痛

老薑 鳳仙葉 香油

川椒 末大 共二搗テ痛ム處ニ擦ル或鳳仙
花ノ子ヲ煎シタル湯ニテ洗フヘシ皆效

鷺掌風 テラキ 掌ニハタケ瘡生スルヲ云

槐花 花椒 大麥 地骨皮 艾葉
鶴糞 白芷 煎湯ニ先薰後ニ洗フ
1 毎日敷度ノ愈

○又方 雄黃 穿山甲 火ニ燒テ熏之
敷度ニノ自愈乃品祖法也

鶴膝風 三陰ノ氣不足ニ風邪乘之

兩膝痛ヲナシクニキトキハ膝大ニノ腿細
ナル因テ鶴膝風ト名ク敗症ナリ

人參 防風 白朮 附子 當歸 白

芍藥 川芎 杜仲 黃芪 羌活 牛膝

其艸 熟地黄 各一 生姜三片 水二碗 八八

分ニ煎シ食前ニ服ス 此方兼テ附骨疽及

或ハ腿膝ノ腫痛等ノ症悉治ス

○又方 酒糟 皂角 皮硝 五

味子 各各 砂糖 姜汁 各 右搗調

和膠ノ上ニ付包置テ十日餘モシ燥バ

燒酒ヲ敷度上ニヌリテ潤ベシ年久キ

者モ亦效アリ

○又方 艾半斤好醋ヲ入シ鍋ノ中ニテ

炒熱シ痛トコロニ敷冷レハ取換ベシ敷

度ニノヨク包内ニ服ス方 硃砂 雄黃

乳香 沒藥 川烏頭 草烏頭 各

一錢 碾細末シ每服五分古酒ニテ用

白癩風 硫黃 蜜陀僧末トシ姜

汁ニ調テスリ付ル

○又方 白癩紫癩ニ 雄黃 硃砂

等分細末シ茄蒂ノ切口ニ藥ヲツケ癩

ノ上ニ擦ベシ三日ヲ経ズノ愈神效アリ
又白癩ニハ右ノ藥ノ内ハ蛇蛻ヲ粉ニシ
加ヘテ右ノ如ク擦ベシ永ク痕ナク治ス

紫雲風 紫癩ノ如ク遍身ニフクシ出

ルナリ 甘草 一兩 川烏頭 姜汁浸 草烏

頭 黑豆ト同ク炒リ黑豆ノ熟シタルトキ豆ヲ去テ烏頭ヲ用ユ 防己 各五錢

牛膝 炒乾 羌活 上部ニ用ニ 獨活 下部ニ用ニ 川芎

白芷 馬兜鈴 炒各 共ニ細末シ一度ニ

七分ツ、好酒ニテ服ス外蛇床子夏枯

艸二味ヲ煎湯ニシ風塊アル処ヲ數度

洗ハ即退

汗斑 汗出タル後ナニツノ如ク斑ニナル

ヲ云 硫黃 蛇床子 蜜陀僧各研テ

生姜汁ニテ解 茄蒂ニ藥ヲ蘸シテ

細々擦之ベシ甚效アリ

○頭疾諸症

頭疾總論 頭ハ乃諸陽ノ會ナリ其

症一端ニアラス大約頭痛ハ十二經ヲ

分テ治之ベシ丹溪曰頭痛多ク痰ヲ

主トス甚シキ者ハ火多也吐者アリ

可下者アリ又眉眶痛ハ風熱ト痰ト

ニ屬ス肝虛痛モノアリ 纒ニ光明ヲ見

レバ眶痛甚眉稜脊痛眼用ガタキモ

ノアリ晝ハ輕ク夜ハ重モノハ屬痰

頭風ハ經ニ云首風之狀頭面多汗惡

寒スト云云其人素ヨリ痰火アツテ風

寒之腦髓ニ入テ然リ婦人多クコレヲ

患ハ頭ニ中積ノ風寒ヲ禦クナキ

故也偏痛アリ正中痛アリ熱アリ風

アリ血虛アリ痛尤ニアルハ風ト血虛ト

二屬ス右ニアルハ痰ト熱トニ屬ス頭眩
 トハ目ニ花チリ黑暗ナリ旋倒ナリ頭
 眩ノ狀目閉身轉耳聾舟車ノ上ニ立
 如ク起ントスレハ倒ント欲ス虚極リ寒
 ニ乘ノ得之故ニ風ナレハ有汗寒ナレハ
 製痛暑ナレハ煩悶ニ濕ナレハ重滯ル
 此四氣虚ニ乘ノ眩暈スル也或ハ七情
 鬱ニテ痰ヲ生シ火ヲ動シ氣ニ随テ上
 厥コレ七情虚ヲ致シテ眩暈スルナリ
 酒ト名トヲ過シ腎虚ノ氣ヲ納メテ
 元ニ帰スルヲアタハズ氣逆奔テヒルコ
 シ氣虚ノ眩暈スルナリ吐血衄血崩漏
 或ハ産後失血脾虚ノ營氣ヲ收攝
 一アタハズ諸血ヲシテ失道妄行此血
 虚ノ眩暈スルナリ症各候アリ治各方
 アリ聊其經驗者數種ヲ録ト云

十二經頭痛主方

川芎 羌活 白芷

柴胡 蒼朮 蔓荆子 石膏 防風 半

夏 細辛 藜蘆 南星 天麻 各等分

其仲 少 生姜三片葱白二枚煎服ス

○又方 太陽症 川芎 羌活 藜蘆

麻黄煎服 ○少陽症 小柴胡湯ヲ

用ユ ○陽明症 升麻葛根湯ヲ用ユ

○太陰症 蒼朮 半夏 南星 川芎

蔓荆子等分煎服ス ○少陰症 麻黄

細辛 附子 煨各 煎服ス ○厥陰症

麻黄 去節 羌活 去節 吳茱萸 四分 藜蘆

本 升麻 黄芩 蔓荆子 細辛 柴

胡 紅花 半夏 炮 黄连 炒各 黄芩

當歸 酒洗 黄柏 炒 蒼朮 未泔水浸一日一夜

川芎 各一 水煎シ服ス

諸頭痛 生蘿蔔汁 蜆殼ニツ仰臥テ

鼻ノ中ニ注クヘシ 龍頭痛セバ 龍ノ鼻孔右
頭痛セバ 右ノ鼻孔ニ注テ即愈

諸虛痛 血虛作痛 川芎 當歸 各三

水煎シ食ヨリ遠ク服ス ○氣虛作痛

四君子湯煎服ス ○氣血兩虛作痛ニ

黃芪 蜜炒一 人參 一 陳皮 蒼朮 川

芎 蔓荊子 細辛 各五 黃柏 木香

柴胡 升麻 耳竹 各三 生薑棗入煎シ

服ス 巔頂痛必ス藁朮 柴胡防風ヲ

用 風熱痛 川芎 白芷 石膏 煨 荆芥

各等分細末シ一タツ湯ニテ用ユ ○寒

濕痛ニハ紫蘇川芎花椒茶葱頭水

煎シ頭ヲ蒸フ一刻多ク衣服ヲ蓋行出

テ愈 半片頭痛 頭偏痛也 石膏 熟 牛旁子

各三 細末シ酒ニテ調微醉ホトニ用テ汗ヲ

出ス ○又方 白芷 天南星 各一 川烏頭 半

夏 各ハ 細末シ毎服一タ水ニテ服ス 婦人

甘草一タ 加フヘシ 頭痛週身癢 コレ風火也 雄黃 三 輕

粉 一 白礬 黃柏 川椒 各二 醋ニ碗入

煎シ半分ニシテ渣ヲ去週身ノ痒トコロヘ

刷擦ツクヘシ 頭風 偏痛正痛遠近ニ拘ズ此方ヲ用

ヘシ 白芷 川芎 各三 細末シ黃牛腦ヲ和

合磁器ノ内ニ入シ酒ヲ加ヘ能煮テ食ス

へし盡く食之其煮タル酒ヲ飲醉テ睡
子フリテ後酒醒レハ其痛ヲ失フ

○主方 葛根一分 柴胡 黄芩 黄芩

羌活 川芎 白芍 蔓荆子 甘菊花

各一分 黄連 甘州一分 甘州一分 藁本一分

蒼朮一分 升麻三分 葱白二分 水煎之服ス

○又方 皂莢子七粒 薏苡仁三分 奇良一分

四兩 水六碗入三碗ニ煎之次ニ水四碗入テ

二碗ニ煎之服之

偏正頭風 男女筋ヲ連痛極テ甚者ニ

ハ荻神ヲ細末ニシテツ、湯或ハ酒ニテ

用ユ数服ニシテ愈

○又方 雄黄 細辛 細末ニシテ少許鼻ノ

中へ吹入ル龙痛ニハ右ノ鼻孔右痛ニハ左

ノ鼻孔ニ吹入ルヘシ○頭風左ニアルハ風ト

血虚トニ属ス風者荆芥薄荷芎ノ類ヲ用

○風熱者荆芥白芷麻黄各一分 陳皮一分

蒼朮一分 甘州一分 水煎服ス○血虚者

川芎當歸各三分 荆芥防風白芷黄芩酒

薄荷芎蔓荆子各一分 煎之服ス○頭風在右

痰ニ属ス蒼朮半夏ノ類○湿痰頭風

ニハ酒製黄芩三分 蒼朮四分 川芎細辛

各一分 甘州一分 為末生姜ト茶一ト 服ス

ヘシ○頭風属火酒製黄芩ヲ主トシ陳

皮半夏白茯苓甘州薄荷川芎細辛

ヲ依トシ煎服ス○年久頭風ニハ天麻白

芷半夏川烏頭南星各一分 甘州三分 生姜

五片水煎服ス或末トシ生姜湯ニテ服ス

諸頭眩 凡眩暈諸症アリ類ヲ分テ療

治スヘシ○風熱虚眩薄荷川芎各一分 荆

芥六分羌活 耳焙 白芷各五分 细辛焙

○風寒上厥眩暈各三分 附子生 白朮 川芎

各一分 肉桂 耳各五分 生姜三片煎服ス

○暑火眩暈各二分 陳皮 半夏 白茯苓

耳各一分 人參 白朮 山梔子 黃連 川芎

煎服ス

○傷濕眩暈各二分 白茯苓 白朮各二分 耳

乾姜各一分 水煎空心服ス

○氣虛眩暈各一分 宿砂 木香各七分 白朮

陳皮 半夏 白茯苓各一分 丁子十四粒

耳各一分 生姜三片水煎食ヨリ遠服ス

○血虛眩暈各一分 右ノ氣虛方ニ當飯川

芎肉桂ヲ加ヘ用ユ

○痰火眩暈各一分 大黃ヲ酒ニ浸シ九蒸各一分

九晒細末シ水ニテ煎取豆大ニ丸シ一鹿

二百粒食後又臨卧清茶ニテ送下ス治

スルノ神效アリ

○耳疾諸症

精氣調和スルトキハ腎臟ツヨク

盛ニ五音ヲ聞モシ血氣ヲ勞傷カスニ兼

ルニ風邪ヲ受シハ腎臟ヲ損シ精脫カスノ

耳聾トナルナリ 上好新鉄小キヲ三塊

ヲ口中ニ含咬好磁石ニツニテ兩ノ耳

ヲ塞靜ニ坐スレバ其耳忽鳴テ通ズ

頃刻ニノ通スル者アリ右ノ法ヲ數日

用テ通スル者アリ

○通耳丸 辛葷二八分及腎虛耳内風水鐘

鼓ノ声ヲ作者ヲ治ス 穿山甲大者一片 麝香少 細末

赤ク粉ヲ去テ 蝟七個 麝香少 細末

穿山甲ヲ用ユ 全蝟七個 麝香少 細末

之麻油ヲ入テ子リ丸ニ綿ニ裹テ耳ノ孔
ヲ塞ヘシ

氣閉耳聾 耳聾 耳逐 各五分 麝香 分

研テ細末シ葱ヲ管ニノ藥ヲ入耳中ヲ
塞ハ八愈

鼻塞耳聾 柿餅 其法糯米洗一斗ニ大ナル
乾柿五十八持テ粉ニシ蒸

テ餅トス 切テ細シ漉米三合ノ内ヘ入レ粥ニ煮
テ空心ニ食之

耳虛鳴 薄苛生葉十四枚ニ全蝎十四

麝香少 裹之瓦上ニテ焙乾シ共ニ研テ細
末シ水滴ヲ入テツク子耳ノ内ヲ塞クヘシ

極テ效アリ

耳内腫痛出膿及黃水 大人小兒トモニ

此方ヲ用ユ 枯礬 五分 胭脂 紅花ヲ用
麝香 五重 陳皮 雙皮 共ニ細末シ先綿

棍ニテ膿ヲ取テ此藥ヲ耳中ヘ吹コム
ベシ

○又方 銅鐵ノ香炉ノ蓋ノ上ニアル香

烟ノ塊ヲ取輕粉ニ和研為末ヨレノクダ管ニ
テ藥ヲ吹入ヘシ

○又方 金絲キンニサダノ葉搗テ汁ヲ絞滴
ヲ耳ノ内ヘ入即傾出スヘシ日ニ三度ニ
シテ愈

耳爛 陳皮 燒灰 輕粉 三分 麝香 五
共ニ研テ耳ノ内ヘ吹入レハ即乾クナリ

耳痛生瘡 昆布 蘘朮 甘草 生

蒲黃 竜胆 各二分 連翹 牛蒡子 黃
連 黃芩 當歸尾 甘草 炙 生地黃

各三分 柴胡 黃芪 各四分 桔梗 一分 紅花 少
桃仁 三去皮去尖 另研 右水二碗入一
碗ニ煎シ食

後ニ服ス寒藥大便ヲ稀藥ヲ忌ヘシ
耳中出血 竜骨ノ末ヲ耳ノ内ヘ吹入
レハ即止

○眼疾諸症

目疾總論 其症七十二種アリ治之
法其源ヲ究ヘシ大約紅ヲ為熱白
ヲ為冷癢ヲ為風淚ヲ為毒氣ノ作
トス風ナレバ散之熱ナレバ清涼之冷ナ
レハ温補之氣結ハ調順之刀針ヲ用
ユルヲナカレ偶愈モ僥倖ナレモ倘不然
身ヲ終ルニテノ患トナル又涼藥ヲ多
ク用ユルヲナカレ怒ハ其血凝テ不流亦
痛疾トナル 俗ニ云ニ凡人ノ老少氣體ノ
虛實ヲ量テ藥ヲ用ユベシ又腎虛者
アリ眼目光ヲ失フ或冷翳ヲ生ズ下部

ヲ補ヒ燻メ其腎水ヲ益ベシ自愈又
北方ノ人ヲ治スルハ南方ノ人ト異ナリ北
方ノ人ハ眼ヲ患者最多シは皆日々ニ
風沙ヲ冒寒國ニ夜火ノ邊ニ眠ル
故ニ二氣交蒸テ眼ヲ疾治之寒藥
ヲ多ク用ユ北方ノ人ハ稟受原南方ノ
人ト不同也婦人ヲ治スルニ又男子ト異
ナリ蓋其藥中ニ胎ス傷産ヲ墜モノ
アリ懷妊尤モコレヲ除去ベシ當飯ヲ主
藥トシ血ヲ活ヘシ其餘ノ藥症ニ對シ
用ユ小兒ノ眼疾ハ又大人ト異ナリ胎
毒多シト知ベシ其母孕タル時熱物過
食スレハ其兒眼ヲ患フ生テ百日一週
ヲ過タリ胎毒トシ療治スベシ一二歳
ノ後眼ヲ患者ハ是煎炒熱物ヲ好

食テ五臟ニ毒ヲ受攻沖テ眼ニ發ス
凡孩童ノ眼疾ハ有實症無虛症熱
多ク冷ハナシ若眼ヲ疾稚子ニハ吹點ノ
藥ヲ用ユベカラス 俗云カケスリ哉
クニリサレクスリヤ 恐ラクハ血
氣イニダ定ラズ其目ヲ傷テ致ス夕
敗毒散ヲ用テ治之ベシ又痘瘡疹瘡
ノ後毒氣心肝ノ二經ニ鬱結シテ其
毒氣池ルアタハズ眼ニ攻テ腫子ヲ
傷モノハ素ヨリ無治法

○眼疾通治方 荆芥 羌活 甘艸 耳
菊 防風 蔓荊 黃芩 當歸 山梔子
赤芍藥 白芷 乳香 沒藥 各一匁
全蝎 三個 水二碗入一椀ニ煎シ空心ニ
服ス凡眼疾初テ起十日餘ニ至ルニ急
ニ一二劑ヲ服スレハ五三トコロニ愈スト云

コトナシ藥味ヲ意ニ隨テ加減スレハ却
テ不驗

眼痛

鶏肝 ニハトリノキモ
水ニ落サシ
用一個 蓮葉 乾燥シ研テ
粉ニス一匁
竜膽 七分 肉豆蔻 五分 已上三味ヲ粉ニテ
右ノ鶏肝ノ肉ニ入レ飯鍋ノ上ニテ蒸熟
シテ食之初テ晴タル者モ多ク服スレハ
能爾ク也

目珠至晚疼甚

夏枯艸 香附子 各二
兩
共ニ細末シ一度ニ一匁五分ツ、茶清ニテ
服ス三四日ニノ頓ニ愈

虚眼

氣惱怒ニ因テ肝經ヲ傷リ或
思想苦勞ノ氣血兩ナカラ虚ノ眼ヲ疾
ナリ則 當歸 生地黃 赤芍藥 各四
匁
川芎 甘艸 各一 水二碗入八分ニ煎シ空
心ニ連服ス三四劑ニノ自愈

欠眼 當飯 黄芩 連翹 菊花 山梔

子 生地黃各一 赤芍藥 柴胡 青皮

川芎 防風 竜胆各八 桔梗 羌活各七

黄連五分 甘草五分 燈心二十 石水煎服

風爛眼 白梅一個 核一枚 去綠槲名少許

山椒三十粒入古錢二文ニテ白梅ヲ夾八ニ

亭麻ヲ以テ紮住無根水ニ浸テ此水

ニテ洗フベシ魚根水トハ井ノ水ツルヨリ傾ケテ

若瘡瘡出ル時此症アラハ右ノ方ニ小キ黒

豆ヲ小兒ノ歳ノ數ホト水中ヘ加ヘ浸置テ

眼ヲ洗フベシ患接スルニ丸爛眼ノ洗クスリハニキフタ

眼流冷涙 菊花 蜜蒙花 石決明 白

芍藥 草叶 木賊去節 白蒺藜去刺 各

等分細末ニ毎服一々二分ヨリニ々ニ至テ

此茶ニテ用ユヘシ

○凡眼昏暗或冷淚ヲ流スニハ夜半ヨ

リ後目覺タル時口ヲ開キ言サル唾ヲ

眼ニ捺ツズベシ是ヲ久シク用ユルハ自愈

眼中起星 葶藶名少許 槌碎水ヲ入紙

ニテ漉タル汁ヲ取晒シ粉ニシテ乾タルト

キ少許眼中ニ點ヘシ

洗眼方 自身ノ小便熱ヲソクニ眼ヲ

洗い拭テ少頃目ヲ閉ベシ自愈

○雪水ヲ貯六月六日鹽ニ淋過シテ

置一切眼病腫痛時泡湯ニ頻ニ洗

ハ即效アリ常ノ鹽湯ニテ洗ノモ亦好

冷水ニテ洗フヲ忌

○又方 黄連 當飯 朴硝各一 明礬各

三分 杏仁七粒去尖 郁李仁四十九粒去尖 銅

青三分 水二碗入一碗二煎之外人乳一
小盞ヲ加へ先薰之テ後洗フへシ數度ニ
シテ神效アリ

每月洗眼法

朴硝六分 淨水一碗入七

分ニ煎シ澄テ眼ヲ洗スベシ年久シク眼

不明者モ能治スルナリ洗日身ヲツシミ

奇疾ノ心ヲ清シ思慮寡クスヘシ其驗

如神 每月洗眼日 正月朔日 二月朔日

五月五日 六月朔日 七月五日 八月朔日

九月十日 十月二日 十一月二日 十二月朔日 右日

ヲ選テ朴硝湯ニテ洗スベシ

明目補腎兼治筋骨疼痛 小紅棗十二

冷水ニテ洗淨蒂ヲ去リ枸杞子三分 小馬

大豆四分 水二碗入一碗二煎シ早晨空

心ニ藥味ト煎湯ト共ニ食スヘシ

○又明目方 枸杞子三分 菊花去蒂

每朝白湯ニテ用ユ久服スレハ青盲目毛翳

明ニナルヘシ

赤眼暴發腫痛 先藍染ノ布一切水ニ

浸シ洗テ乾シ白礬ノ末ヲ生薑汁ニテ

解右ノ布ニ蘸コレヲ眼胞ノ上ニ搭目ヲ

閉テ少頃スレハ淚出痛即止也

○凡赤目ヲ疾人ハ熱湯ニテ足ヲ濯テ

佳若身ヲ浴スレハ必明ヲ失フヘシ犬雞

魚鴨蛋ヲ食スルト大ニ忌ヘシ

雀目治方 菊花乾 黃連各三 夜明

砂七分 右細末シ水ニテ胡椒ノ大サ三丸シ

鹽湯ニテ七粒ヲ用ユ

寒羊毛倒睫 サカミツゲノ也木鱉子一ツ

殼ヲ去粉ニノ綿ニ裹テ眼ナレハ右ノ鼻

孔ヲ塞キ右ノ眼ナレハ左ノ鼻ノ孔ヲ塞ヘシ

一二夜ニノ睫毛自上下ニ分レテ愈

點眼方 カケ藥サシ藥也 羊胆一ツ割

用蜂蜜ヒトツカシ一入線ニテ繋ツケ而手ニテ揉水

ニテ一滾煮テ即取出シ冷水ニ半日

浸シ水ヲ去胆ノ内ノ汁ヲ傾出シ眼ニ

點ヘシ七十二種ノ眼疾ヲ治スル一妙也

○又方 凡目ノ中弩肉赤筋及腫障

蔽アルニ白丁香ヲ用テ初産男子吞

乳ニテ解點之ヘシ障蔽ヲ去テ明ナリ

又此方ヲ用テ面ノ雀子班ニ傳テ即愈

雜物入目 東牆上ノ馬齒莧ヲ取テ灰ニ

燒背頭ニ少許點スヘシ即出ル一妙也

○**鼻疾諸症** 鼻塞

凡鼻フサカハ外感ニ因又ハ内火

熾ニ因此方何ノ症ニテモ鼻塞リ香臭

ヲ聞ガルニ用テ效アリ 通竹 附子湯

細辛各一 細末ニ蜜ニテ丸ニ綿ニ裹ニ

鼻孔ヲ塞ベシ立トコロニ通ス

鼻淵 腦漏トモ云風寒凝テ頭腦ニ

入太陽經ト濕熱交蒸テ此症トナル

鼻ニ清涕ヲ流之或ハ黄水ヲ流之滴

落テ濕ト乾トナキ也 白芷 一兩 蒼耳

子炒 辛夷仁各ニム 薄荷 五分 細末ニ

葱茶清ニテ調ヘ食後ニ服ス

○又方 鷓鴣兒不食石胡荽 鼻孔ヲ

塞ハ涕自止

○又方 藿香末一兩猪胆一個共ニ熬

テ膏トシ丸ス一度ニ二錢食後ニ百

滾湯白湯ナリニテ服ス如日久シクニテ

頭眩虚暈不已ニハ補中益氣湯ヲ用

テ源ヲ滋バ愈ベシ

鼻紅 好古酒ヲ熱ノ足ヨリ浸シ洗テ

臍蹠ニ至テ洗ヒ汗出ルヲ度トス

○又清蒿ヲ搗絞汁ヲ服シ其渣ニテ

鼻孔ヲ塞グヘシ

○又方 孩児菊 檉菊 搗爛之汁ヲ取

酒ニ和テ服ス渣ニテ鼻ヲ塞グヘシ

○又鷄子清ヲ多ク食スレバ皆效アリ

○乱髮燒テ性ヲ存シ火毒ヲ去井ノ

水ニテ一々五分服シ再髪ノ灰少許ニ

麝香少入鼻中へ吹コシ外ニ紙一張

ハツニ摺冷水ニ浸湿シコレヲ頂心ニア

テ熨斗ヲ其上ニアテ一二重ノ紙カハ

カハ即止

○又方 麥門冬 白芍藥 荆芥

山梔子 連翹 甘草 生地

黄 右煎服ス止血後調理ニハ此方

ニ黄芩 知母ヲ加フ

鼻瘡 百州霜研細ニシ三々冷水ニ

テ服ス

○又杏仁 乳汁ニ和テ鼻瘡ニス

リツケヘシ

鼻痔 瓜蒂 耳遂 枯

礬 松香 右粉ニノ香油ニテ

硬ク丸シ松香ヲ衣トシ一粒ワ、鼻ノ

中へ入痔ニ點スレハ臭水ト化ノ一日ニ

度ツ、自爛下テ愈

酒齋鼻 サクロハナ也血熱入肺此症ト

ナル苦參 當歸 酒糊ニテ桐子

大サニ丸シ食後ニ熱茶ニテ八十粒ツ、

吞ベシ一劑ヲ用盡セバ即愈

○又方 穀樹脂ヲ採テ鼻ニ度々搽塗
ベシ能散カキキノアミ紅ラ

○口舌諸症

口瘡 口瘡ニ涼藥ヲ服ノ愈サル者ハ

中焦ノ土虚ニ屬ス土ハ脾且相火衝上ツキム

テ無制理中湯ヲ用ユベシ人參白朮

甘草ハ土ノ虚ヲ補ヒ乾姜ハ火ノ標ヲ

散ス甚シキトキハ附子ヲ加フ或ハ肉桂

ヲ嚙モ亦妙也

○又方 黃連乾姜等分細末シ口瘡

ニ搽塗ベシ涎流テ自愈

口疳瘡 紅棗十黑燒ニシ二竜腦二分梅ニ花上ニ用

右研和吹ヘシ水ニテ漱テ瘡ハ滑石一辰

砂三竜腦ニ分 右研細末ノ塗ヘシ又牙

疾ハ鷲口ニ傳テ妙也

口唇燥裂 橄欖ヲ湯ニ漬テ服之同

核中仁ヲ研爛燥裂タル處ニ敷ヘシ或

ハ臘脂ヲ敷モ立トコロニ效アリ

口中生蕁草 用醋ヲ漱ス茄ス黑ス鹽

即愈

口臭 狐腋體氣 丁子 藿香 麝香

香附子 其松 零陵香 白芷 當歸

桂心 白豆蔻 栝柳 益智仁各等

煉蜜ニテ桐子大サニ丸シ毎日五丸ツ

嚙化ス一日ニメ口香二日ニメ身香三日ニ

メ衣香シ

舌出血 烏賊骨 蒲黃炒 研末ノ傳

○又槐花炒黃色ニシ粉ニノフリカクシ
舌平長大 竜腦ヲ研テ敷ヘシ即収

舌腫満口 蒲黃末ヲ舌ニフリカクヘシ

○又鍋臍煤ヲ研テ細末シ白酒ニテ
調塗ベシ立トコロニ腫消ス

重舌木舌紫舌 大人小兒共ニ皆心火

妄ニ動ヨリ起リ結成重舌木舌紫舌
腫硬ノ語言不利者ニ此方ヲ用ユ黃

連山梔子荊芥黃芩連翹木通薄
荷牛蒡子 各一分 甘草五分 燈心廿根 水二

碗入八分ニ煎シ食後ニ服ス

○又方 醋ニテ薄荷ノ末ヲ解口ニ含
テ涎ヲ出ス一敷度ニノ愈煎炒ヲ十

日餘忌ベシ又治單蛾双蛾
舌腫出不能入 草麻子油紙ニ蘸シ燃

○齒牙諸症

齒牙痛 丹溪曰牙疼者乃陽明胃

經ニ属スルナリ風熱上侵トキハ感スル
所アリテ拳之有熱有風有寒有蟲

有濕熱皆能痛ヲナス

齒痛 石膏 生地黃 升麻 各二分
黃連 牡丹皮 當歸 右水煎

之服ス

○又方 燒酒半盞馬牙三個燒紅シ
酒ノ内ヘ入テ淬酒ノ冷タルトキ馬牙ヲ

去テ此酒ニテ疼処ヲ漱キ吐出セハ之
トコロニ痛止ル咽ヘ吞ヘカラス

○又方 荔枝一個殼ニ孔ヲアケ鹽ヲ
入テ填黒燧ニノ細末シ齒ニスリツケ片

時ホト含^フニ再^ニ防風山椒耳^ノ浮麥ヲ煎^レ之口漱^バ即愈

○又方 黃連生姜共ニ杵爛^シ之牙縫ニ付^レバ痛亦止

○又方 橄欖一個磁器^ニ入黑燒^ニ之胡椒七粒入共ニ研^テ粉^ニ綿^ニツ^ク之痛処ヲ塞^グヘ^シ一飯ノ頃^ニ即愈但多用^ユヘカラス

○又方 蟲牙痛ニモ妙也雄黃草^ノ揉^各ニ麝香^ニ三分共ニ細末^ニ磁罐^ニ入置^テ疼時中指^ニテ藥ヲヒ子^リツ^ク之

○又方 滑石^六分耳^ノ聾^一分研末^ニスリツ^ケテ愈

與^レ牙痛 竜腦^五分白茯苓^一分粉

ニシテスリツ^ケヘ^シ

○又方 松脂烘軟^ケ虫牙ノ孔^ヲ塞^ムクヘ^シ少頃^ニ虫出^テ脂ノ上^ニアリ即愈

齒縫出血 薄荷 天花粉 連翹 桔

梗 玄參 木通 葛根 各^一分 耳^ノ聾^五分

水煎^レ之服^ス

胃經實火上攻齒縫或牙根作腫血出不

止 黃芩 黃連 生地黃 牡丹皮

升麻 石膏 各^一分 水煎^レ之食後^ニ服^ス

胃中虛火動牙銀腐爛以致淡血滲流

不止 甘薈 柴胡 胡黃連 黃

連 牛蒡子 玄參 桔梗 山梔子

石膏 羚羊角 薄荷 各^一分 升

麻 各^五分 淡竹葉^十枚 水煎^レ之食後^ニ服^ス

牙痛一切主方 石膏^生八分 荆芥 防風

牡丹皮^各一分 生地黃^二分 青皮^六分 甘州^五分

水煎之食ヨリ遠ク温服不加味法○上ノ
 正中齒痛ハ心火ニ属ス黄連八分麥門
 冬一々二分加○下ノ正中齒痛ハ腎火ニ属
 ス知母鹽炒黄柏各加○上ノ兩邊牙痛
 ハ胃火ニ属ス白芷八分川芎一分加○下
 兩邊牙疼ハ脾火ニ属ス白朮一分白芍
 二分加○上ノ左邊牙疼ハ膽火ニ属ス羌
 活一分龍胆一分加○下ノ左邊牙疼ハ
 肝火ニ属ス柴胡山梔子各加○上
 右邊牙疼ハ大腸火ニ属ス大黃酒製
 枳殼各加○下ノ右邊牙疼ハ肺火ニ属
 ス黃芩桔梗各加○右ノ症ニ隨テ加味
 之煎服之徐々ト漱下ス三帖ニ即愈
 油煎イリキ炒鴨蛋タマゴ糟醋酒ノ類火ヲ全
 スル物ヲ忌ヘシ

牙齦爛

生姜黃連搗爛シテ貼ヘシ

齒疎陷物

齒ノ間スキテ食物夾ナリ

芦苳石煨寒水石生細研テ少ツ、擦ソ
 ケベシクシクシテ齒自ラ密クナルナリ此藥
 ヲ用テ牙ヲ刷齒ヲ漱一ハ忌ヘシ

取痛齒法

白馬尾ヲ燒テ灰トシ齒ニ

點スヘシ即脫ナリ但シ輕々シク點スヘカラス
 好齒ニ看バ亦落ル也新シキ筆尖サキニ此藥
 ヲ一二重塗テ點スヘシ或ハ痛或ハ動ク齒
 ノ上ニ用ユ先ニ助ニテ上下ノ唇ヲサ、へ用
 テ藥ヲ點スルナリ

咽喉諸症

咽喉通治

其症十八ニ分ツ皆火熱内ニ

結スルニ因テナル也

○主方 喉初テ腫痛ヲ治ス荆芥防風

牛蒡子 射干 黄芩 枳殼 独活 金銀花
牡丹皮 生地 黄天 花粉 各等分 燈心 竹筒
入水煎之服ス

○同粉藥方 蜈蚣 頭ト脚ヲ去切米ト同ク炒末ヨク熟スレハ止

辰砂 研テ細ニシ水飛ス各五分 乳香 沒藥 俱ニ赤 雄黄

各一 麝香 二分 右細末之和勻 大人ニハ七八

分 小兒ニハ三四分ツ、前ノ煎藥ニテ用ユ

或ハ酒ニテ送下ス

○同吹藥 薄荷 三兩極テ細ニ末トス別ニス 硼砂 二分五分

雄黄 三分 孩兒茶 一分 竜腦 三分 共ニ研テ

極細末之薄荷末ヲ入和勻 確ニ貯テ

藥氣ヲ泄スヘカラス 芦管ニ此粉藥ヲ

少許入テ喉ニ吹入ナリ 或ハ茶匙ニテ舌ノ

上ニ挑ケ火シ噙テ嚥下スヘ一日ニ八九度

用ユ 鎖喉風 コソヒノニカニ染ヒテ 口ノ内乾モノニハ

井水ニテ此藥ヲ調ヘ灌ヘシ即閉ラ開テ
津ヲ生ス 若脾胃弱泄者ニハ多用ユヘカ
ラス其外ニ忌ムナシ

○同含藥 薄荷 三兩研テ極ホ 硼砂 雄

黄 各五分 孩兒茶 三分 竜腦 五分 青黛 一分

共ニ細末シ薄荷末ヲ入生蜜ニテ子リ合

セ 確ニ貯テ氣ヲ泄スヘカラス 用時黄豆

大サニ丸シ臨卧ニ一丸 夜半ニ一丸 甚者ニ

ハ三丸 口ノ内ニ噤藥自化ルヲ待テ嚥下

スナリ 湯水ニテ用ユルヲナカレ脾胃弱者

ニハ多用ルヲ忌ム 小兒ニハ半粒

喉閉 喉腫ヲサカル也 石膏 燒紅シ火ニ垂ラ

菊花 杏仁 各五分 麥門冬 一兩 苦參 四分

水三碗入一 碗半ニ煎シ蜜一小盞加ヘテ

緩々ト服スレバ喉即開ク 若急ニ藥無

之時ハ紮髮及繩ヲ以テ手ノ大指ヲ紮
針ニテ甲邊ヲ刺血ヲ滴リ出セハ喉即開

喉腫痛 耳竹 貝母 黄芩 黄連

薄荷 川芎 各一 桔梗 三合 茯苓 二合

水煎服

○又方 扁柏葉 雪裏青 山豆根

皆搗テ汁ヲ絞服之效アリ

○喉腫ハ風ト火トノ分アリ風ニハ鶴虱仲

ヲ含ヘシ火ニハ玄參ヲ服スヘシ其苦水ヲ

舌下セハ即愈

双蛾單蛾 喉ノ間ニ瘡小キ如ナル者腫

テ両方ニ生スルヲ双蛾ト云一方ニ生スルヲ

單蛾ト云 平地木 木蓮蓬 雪裏青

各根ト葉ヲ取搗テ汁ヲ絞リ醋ヲ煎ジ

サシ右ノ汁ヲ入鴨卵ニ蒸シ喉中ヲ掃又

此汁ヲ少許含ミ漱テ吐出ハ即愈

○又方 醋バカリニテ漱クフ三五次スヘシ又

天薤水ヲ吞ヘシ皆效アリ 天薤水方痰 嗽門見多

○又方 荔枝叶 蔓菁 搗爛ニ醋ヲ加ヘ

テ綿ニ裹ミ上ヲ縛喉中へ入ルヲ救次ニ愈

喉癰腫脹不進水穀 胆礬者三厘口内ニ含

涎ヲ吐出セハ愈 百叶霜 枯礬 研細末ニ喉ノ内

喉痺 竜腦 五分 明礬者 三分 麝香 五

石膏 一合 細末ニ吹入テ涼スレハ即愈

右通治ノ外ニ伏氣病アリ腎傷寒ト名

ク暴ニ寒ニ中テ其毒少陰腎經ニ伏シ

始ハ衰テ不病日ヲ重テ乃チ至ル脉微

弱ニ咽痛次ニ必ス下痢ス此症ニハ辛

熱ノ藥ヲ用テ其本病ヲ攻其陰陽ヲ
順セバ水升火降テ咽ノ痛自ラ已又少陰
傷寒々々邪太陽ニ傳ヘズ抑鬱シテ
内陽氣ヲ格熱上リテ咽門經會ノ
処ニ行寒熱相搏テ喉痺トナルコノ
症ニ辛温甘苦ノ藥ヲ以テ其標病
ヲ制スレバ咽自ラ通ス此ニ症ニハ悞テ
前ニ出タル寒涼ノ劑ヲ用ユレハ救レズ
治療者慎テワキニヒルベキナリ

○心腹諸症

心痛 丹溪曰心痛者即胃脘痛
ナリ新久ノ殊ナルヲ分ツヘシ身ニ寒
氣ヲ受口ニ寒物ヲ食ノ病初メ発
ル時ハ温散温利ノ劑ヲ用ユヘシモシ
病稍久レクレテ鬱ヲ成テ耐スルトキハ
蒸熱ス熟久シケレハ必火ヲ生ス此

症ニハ温劑ヲ用レハ火ヲ助テ病ヲ
添ナリ山梔子大ナルモノ七ツ或八九ツ
炒焦黃ニノ水一盞入七分ニ煎シ生
薑汁一二匙加ヘ熱ノ飲之ニトコロ
ニ痛止此病日殺多ク不食ストモ不
死若痛方ニ止ハ便物ヲ喫ヘシ病安
クシテ後ニ恣ニ飲食スレハ再發シテ
難レ治

○治心痛方 乳香 雄黃 各二分 砂

糖 三分 好酒ニテ調下ス

○又方 蚌子殼七次煨醋ノ内へ入テ
滓研テ細末シ痛發ル時少許舌ノ
上ニ置酒ニテ送下ス

○又方 屋上猫糞炙乾シ末トシ三分

酒ニテ下ス

○又方 胡椒七粒菜豆九粒研テ末トシセウチウ燒酒ニテ下ス不止再服スヘシ即止

田鼠腹痛 良薑酒洗七次 香附子醋洗七次

焙研 寒ニ因ッテ登ルハ良薑末ヲ香附ノ末ス

一倍ニス怒ニ因ッテ登ルハ香附末ヲ良薑ノ一倍ニス寒ト怒ト兼ッテ登ルハ各

等分ニス清米飲ニ姜汁少許入テ右ノ藥ヲ服スヘシ

○又方 雄黄末一匁烏梅肉三匁小豆大サニ丸シ酒ニテ服ス輕者ハ二九重者ハ三九

心氣痛 胡麻生チカラ 銅鑄ニ入炒黑クシ細末シ好酒ニテ送下ス一服ニシテ除根痛時取末テ炒用ユヘシ

冷心氣痛 乳香三分火多 明礬火ニ燒 共ニ末トシ好酒ニテ下ス

○又方 良香 甘竹 川烏頭 肉桂香附子 芍藥煨 木香 各等分鹽少許入水煎シ温服ス

熱心氣痛 錫脐煤ナハスミ 三匁童便トウビン 熱ニテ服スヘシ即愈

蛔厥心痛 虫ノボリテ心痛也 烏梅二個 川椒十四粒煎湯服ス

真心痛 芭蕉葉ハセラン 搗テ汁ヲ取白醋ニテ服ス

急心痛 陳皮 香附 吳茱萸 良香

石菖蒲各等分 水一碗入七分ニ煎シ茶碗ニ入香油三五滴入小盞サカキ 蓋ニシテ藥ヲ淋下シ熱服スヘシ即愈

腹痛 腹痛ハ皆寒ニ由テ發ル惟大

便閉ノ一種熱ニ屬ス陰症ニハ急ニ理中

湯ヲ用テ治之 方ハ諸書ニ見タリ故更之

心疼腹痛 五倍子生ニテ研細末シニ

鉄杓ノ内ニ入炒テ烟ヲ起シ黒色ニナル

時好酒一鍾ヲ入傾ケ出シテ服之立処ニ

止ム臍下大ニ痛ミ人中黒色ナル者ハ多

ハ死ス

冷氣腹痛 吳茱萸ニ女搗爛シ酒一

鍾ニテ調ヘ香油一小盞鍋ニ入煎シ熱シ

其内ヘ右ノ吳茱萸酒ヲ入テ一滾煎シテ

服スヘシ立トコロニ止ム

○脾胃諸症

胃強脾弱 其症男女飲食運化スル

アタハズ胸膈脹悶シテ不舒 愛亂嘔吐

酸ヲ作口苦舌燥痰アツテ頭眩スルニ此

方ヲ用ユ 蒼朮 二竹去芦米泔水ニ浸シ洗ヒ黒皮ヲ去切片晒乾シ炒黄ニシテ磨

粉一升ヲ用ユ 白茯苓 刺ヲ去炒黄ニシテ細末ス十兩 黃連 酒

炒細末 山查子 飯上ニテ蒸フ三火細末ス五兩 右煉蜜一和

桐子大サニ丸シ毎日食後巳申時白湯ニテ

七八丸ヲ服シ百九餘ニ至テ自愈

病後胃弱 蓮肉 炒末 各四兩 白茯苓

二兩 細末シ砂糖二兩加ヘ一度ニ五六匙

時ニ拘ス白湯ニテ服ス飲食スルアタハガ

ル者ニ用ユヘシ

胃脘嘈雜吐清水 陳皮 上々白ヲ去細末 清晨

寢所ヲ起坐ノ陳皮末五分ヲ手ノ内ニ

安 男ハ丸女ハ右ノ手 越テ喉ニ下ス又卧フナカレ三四

次如此シテ即愈 飲食不佳口易饑 菜豆 糯米 黃麥

各一升共トモニ炒磨ウスニテ粉ニシ酒杯一ツ湯ニ
テ服ス三五日ニテ效アリ

心膈飽脹腹中又饑又痛 胡椒七粒研末

トシ好酒ニ入テ服ス立処ニ愈

胸膈飽脹虛腫等症 蒼朮制法如前 陳

皮 厚朴各五兩 川椒少許 猪肚一具脂ヲ

去大蒜ヲ入線ニテ口ヲ縫ス冷水ト熱湯

ト各七碗入猪肚ヲ煮テ水乾カクヲ度トス

取出シ搗爛シ右ノ藥ヲ細末シコレニ和

テ丸シ毎日空心ニ湯ニテニムツ、用ユ

胃脘不清將漸成噎膈 茯苓 陳皮

白朮陳法ニ拌 枳實麥粉ニ 半夏製法各

黃連酒浸 沉香五々 厚朴十五々 白茯苓

一兩 白豆仁四々 白芍藥 一兩 人參 一兩 各

細末シ水糊ニテ桐子大サニ丸シ粥ヲ喫

後白湯ニテ百丸余服スヘシ

膈噎嘔吐 芎根五兩切碎水二碗入煎

一碗空心ニ服ノ即止

膈氣 沉香一々細末シ泉水ノ煎湯

ニテ徐元々ニ下ス

膈氣吐食 大ナル鯽魚一尾 腸ヲ去鱗ヲトメ

紙三テ十重ニ包ミニテ平胃散一兩ニ和大蒜ヲ切鯽魚ノ腹ノ中ニ

ニテ桐子大サニ丸シ三十粒ツ、米湯ニテ用ユ

翻胃吐食 樹上黃香圓ヲ採テ糞内ニ

七日浸シ再童便ニ七日浸シ風ニアテ、乾

シ煎湯ニテ服ス

○又方 仙人杖退行也此ハ省竹トシトキ立死スル

煎シ汁ヲ服スヘシ

○又方 其蔗汁一升ニ生姜汁ニ合入温

熱シ五次ニ服ノ效アリ

噎膈翻胃鼓脹

沉香 紫葳子 陳

皮各二肉桂一木香三蘿蔔子三

俱トモ末ト之毎服三分狗宝一分加好泉

水ニテ通州ヲ煎シタル湯ニテ空心ニ服

老年翻胃噎膈 辛香ノ氣ヲ散スル

等ノ藥ヲ服シ過シ米粒喉ニ不下病

危キニ至ル者ニハ 狗宝 牛黃

人參 沉香 右細末シ時ニ拘ス

少許舌ノ上ニ置テ噲徐ニ嚥下ス一日

二四五分服スヘシ尤効アリ

○腰脇諸症

腰痛 杜仲 骨碎補 青鹽 共二細

末シ猪腰子ノ内ニ入濕草紙ニ包煨シ

熟シ好酒ニテ連服ス即愈猪腰子ハ猪

腰痛曲而難伸 山查子末ニ入酒又

鹽湯ニテ服ス

腰痛并或時閃挫 杜仲 破故紙 桃

肉各等分酒ニテ煎シ服ス

○又方 糯米一二升炒極テ熟シ囊

ニ入痛処ニアテ縛置ベシ大茴香三分

細末シ鹽酒ニテ時ニ隨服スヘシ皆効アリ

脇痛 草豆蔻 枳殼 赤芍藥

砂仁 香附子 烏藥 各等分水二碗

入一碗二煎シ温服

○又方 小茴香兩 枳殼五 共二細末

之二分ツ鹽湯ニテ服ス

腰閃 枳殼 桔梗 甘草 紅花

各五分 防風 烏藥 當歸 杏仁炒

半夏製 才通各 右水煎シ服ス

○又方 凡打傷閃腰并手足ヲ傷

損血ヲ出サズ只青紫色色ニ内傷者
ニハ先葱子フカシレミ白ヲ搗爛シ炒テ熟シ之痛
処へ遍ク擦ツケ次ニ生大黃ヲ粉ニ
シ姜汁ニテ調ヘ傳ツテ其人少シ醉エラホト
好酒ヲ飲シムヘシ三箇月或ハ半年
ニテ不愈者ニモ用此法神驗アリ

腿痛

生地黄 大ナル者ニ兩 酒ニ浸シ 何首烏 十兩
當歸身 酒洗 白朮 炒 金銀花 胡
麻 各二兩 牛膝 十五兩 右好酒ヲ
用テ蒸熟シ毎日空心ニ服ス半劑ヲ
以テ度トス

○大便諸症

大便閉

皂莢サヤカシクサヤヲ末トシ蜜ヲ煉水ニ
落シ珠トナル時皂莢ノ末ヲ入棗ノ大
サニ丸シ肛門ノ内ヲ塞ハ即通ス

○又方 田螺ヲ搗碎キ麝香三四重入
臍内ニ傳ヘシ

○又方 苦練子六煎湯ニノ服スミナ
シルニアリ

腸風下血

清血ヲ下メ色鮮ヤサカナルハ腸風
ナリ血濁ニヨリテ色黯クモノハ臟毒ナリマ腸
風下血ハ必ス糞前ニアリ近血ト名ツク
臟毒下血ハ必ス糞後ニアリ遠血ト名
○主方 生地黄 牡丹皮 赤芍藥
升麻 各二水二碗入八分ニ煎シ空心ニ
服ス

○又方 當歸 生地黄 熟地黄 各五
小薊根 一兩 酒ト水ト等分ニ入煎服
ス愈テ後十全大補湯十劑服スヘシ

方ハ諸書ニ
出タリ要之

○又方 茅根^{ハクコ}多少^{カハラ}三拘^{カハラ}ス水煎^{カス}之渣^{カス}ヲ去テ温服ス即止

○又方 豆腐^{トウフ}ノイニ夕袋^{トク}ニ入テ漉^{コレ}出サルヲ渣^{カス}トモニ取鍋^{ナベ}ノ内ニテ炒^{カス}黄色ニ燥^{カハテ}タルヲ研末^{カス}シ紫色^{カス}色ノ血塊^{カス}ヲ下ス者ニハ白砂糖湯^{カス}ニテ清晨^{アサ}ニ三々^{カス}ツク服ス紅色^{カス}ノ血塊^{カス}ヲ下ス者ニモ同^{カス}之遠^{カス}年^{カス}下^{カス}血面色^{カス}黄瘦^{カス}危者^{カス}モ服之^{カス}神效^{カス}アリト毎日三次^{カス}用ユ

腸風臌毒^{カス}下血痔漏^{カス} 黃連^{カス} 槐花^{カス} 各

酒ニ浸シ炒^{カス}四兩共ニ細末^{カス}シ猪大腸^{カス}一具ニ藥末^{カス}ヲ入テ紫韭^{カス}菜^{カス}ニ竹^{カス}ト同ク水ニテ煮^{カス}テ爛^{カス}シ韭^{カス}ヲ去テ猪腸^{カス}ト藥ヲ搗^{カス}テ桐子^{カス}ノ大サニ丸^{カス}シ毎服^{カス}八十九空^{カス}心ニ米湯^{カス}ニテ用ユ

糞後下血^{カス} 霜^{カス}下^{カス}ル時^{カス}ニ冬^{カス}青^{カス}ノ子^{カス}ヲ取

蜜^{カス}ニ浸シ晒^{カス}乾^{カス}ス一三次^{カス}ニ空^{カス}心^{カス}ニ二三^{カス}粒湯^{カス}ニテ吞^{カス}ヘシ

脱肛^{カス} 此症^{カス}多^{カス}氣虛^{カス}ヲ主^{カス}ル 人參^{カス} 黃

芪^{カス} 川芎^{カス} 當歸^{カス} 升麻^{カス} 水ニ碗^{カス}入^{カス}八分ニ煎^{カス}シ食前^{カス}ニ服^{カス}ス血虛^{カス}者^{カス}ニハ芍藥^{カス}地黄^{カス}ヲ加^{カス}フ血熱^{カス}者^{カス}ニハ黃柏^{カス}炒^{カス}加^{カス}フ虛寒^{カス}者^{カス}ニハ黑炒^{カス}乾姜^{カス}ヲ加^{カス}フ外^{カス}ニハ五倍^{カス}子^{カス}末^{カス}ヲ以^{カス}テ托^{カス}テ上^{カス}之^{カス}

○又方 蟬蛻^{カス}ヲ焙^{カス}黃^{カス}ニテ細末^{カス}シ脱肛^{カス}ニ點^{カス}スレハ即^{カス}收^{カス}ル

○脱肛^{カス}ノ人^{カス}ハ杖^{カス}後^{カス}ノ代^{カス}ニ桑葉^{カス}ニ枚^{カス}ツ、常^{カス}ニ用^{カス}ユヘシ治^{カス}スル^{カス}ノ效^{カス}アリ

虚人脱肛^{カス} 補中益氣湯^{カス}ニ黃柏^{カス}知

母^{カス}蒼朮^{カス}黃芩^{カス}テヲ加^{カス}フ肛^{カス}門^{カス}痒^{カス}ニハ同方^{カス}ニ

秦芫桃仁ヲ加フ大便閉ニハ皂莢ヲ加フ
痔瘡 苦參一斤 當歸四兩 雄黃三錢
白礬四錢 共ニ細末シ猪大腸一具ニ藥
末ヲ入線ニテ兩頭ヲ紫テ罐中ノ中ハ入
水ニテ煮腸ノ爛タルヲ度トシ搗テ桐
子大サニ丸シ五十九ツ、酒ニテ毎日三
タヒ服ス

○又方 牡蛎二兩煨過シ地ニ坑ヲホ
リテ埋之火氣ヲ去、研テ細末シ痔濕
アラハ糝ケヘシ痔乾ハ津液ニテ調ヘ
スリツケヘシ

痔漏

胡黃連 二兩 穿山甲麻油ノ内ニ煮
石決明煨 槐花微炒 各五錢 共ニ細末シ蜜ニ
テ煉麻子ノ大サニ丸シ一々ツ、空心ニ米
湯ニテ服ス早晚ニ度用ユ重者ハ四十

日服ノ愈此方針刀掛線等ヲ用ル
テ苦ニ楚ヲ受スメ誠ニ痼疾ヲ治ス
ル良方ナリモシ漏四邊ニ硬肉突起ル者
ニハ蚕繭ニ十ヲ炒シ研テ右ノ藥ノ内ヘ加フ
ヘシ遍身ノ漏ヲ治スルニ皆效アリ

○丹溪先生漏瘡ヲ治スルニ先補藥ヲ
用テ氣血ヲ生ス人參黃芪當歸白朮
ヲ主トシ大劑ニテ服之外ニ附子ヲ細末
シ津液ニテ解丸ク平メ錢ノ厚ニシテ
漏ノ上ニ傅テ艾ニテ灸シ微熱シ甚痛シ
ムヘカラス藥乾ハ取易ヘシ困倦ハ即止テ
明日再ヒ灸セヨ肉平ニナラハ止ヘシ前ノ
補劑ヲ服シ漏ニハ生肌長肉ノ藥ヲフ
リカケテヨシ

○生肌散 五倍子黃名ニ炒 沒藥 乳香

孩兒茶 絡一 白礬飛過 共二細末五々 管ヲ用テ漏シタ瘡ノ口ニ吹入ヘシ

痔瘡便血 凡痔新久ニ拘ス肛門墜カハラ

重シ大便ニ血ヲ下シ痔ヲナス者ニハ

防風 秦艽 當歸 川芎 生地黄 白

芍藥 連翹 赤茯苓 各 栝榔子

甘草 山梔子 地榆 枳殼 槐角 白

芷 蒼朮 各六 水ニ碗入八分ニ煎シ食

前ニ服ス大便秘結スル者ニハ大黃ヲ加

牛奶痔イボ 孰種殼ヒサツタ子ノカラ 灰ニ燒研細

末シ龜腦痔也 共ニ入シクヘシ

洗痔方 五倍子 皮硝 煎スル一 數

十沸シテ 渣ヲ去熱キ ヲ木盆モクボン 中ニ入シ

板フタヲ蓋ニシ板ノ中ニ一孔ツラ ヲアケ痔ヲ

蒸ヤ 一良久シクテ後其湯ヲ手ニ掬タビ

テ痔ヲ洗ヘシ湯冷レハ佳 甚效アリ

○又方 枳殼一味煎湯前ノ如クニシテ

蒸洗モ亦效アリ

○痔イニタ不破者ニハ茄蒂オセヒノタ 或ハ根ヲ

晒乾シ煎湯ニシテ投度洗ハ愈

點痔方 龜腦 五厘 熊胆 一分 蝟牛

大ナル者一ツ殼 ヲ去リ研ス 共ニ研テ膏トナシ水ニ滴ホ

ト入テ痔ニヌルベシ酒又ハ風ヲ動ス物ノ

類食スル一 ヲ忌

○痔翻出ニハ大ナル田螺タニシ 一個ヒトツ 漆盒ノ内

ニ置シ龜腦五厘ヲ田螺ノ壳フタ 内ヘ入シ水

滴ノ下ルヲ鳥ノ毛ニテ痔ノ上ニ塗シ 甚效

○小便諸症 小便閉 麥麩ムギコ ヲ子リテ脐ノ外ニ圍ニル

ヲ作り麩フナ 莫麟腸ウロコ 共ニ搗爛シ麝香ニ

分入し生蜜四兩ニノ和勻ミドトシ脐ノ孔ヲ填ウツ圈ノ内ニ滿シメ其上ニ碗ノ覆テ睡ネムレハ立トコロニ通ズ

○或ハ冬ノ莢子亦茯苓各ニニ水煎之食前クハ

○又方 小通 生地黄 各ニニ甘草 八分 水煎之服ス皆效アリ

小便不通上脹垂危者 琥珀ウツ研テ末トシ葱ヲ濃煎シタル湯ニテニ度ニ用ユ漸々ニ通シテ自愈

小便閉腹痛難忍 木通 滑石各ニ研末

黑牽牛五錢磨テ頭末ヲ用ユ 共ニ和ニ一ニツニ燈心葱白ノ湯ニテ食前ニ服ス

○又方 車前草生ニテ搗ツキ汁ヲ半盞取ハ蜜一匙入テ温服ス

小便不通肚腹脹悶 明礬生細末ニ腸

ノ内ニ入レ指ニ水ヲ蘸シ滴シヲ具上ニ入レ良久ニテ即通ス

○小便澀痛ニハ牛膝ヲ濃煎シ酒ニ入テ服スヘシ

五色淋病 韭菜ヲ搗ツキ汁ヲ取リ生白濁ニ和シ空心ニ服ス其渣カヲ煎湯ニ陰ニ洗フヘシ

熱淋有血 小便澀痛腰酸足軟ニ面ノ色黄ニノ無力精神倦怠久不止者ニハ

地榆 陳皮 白茯苓 側柏葉 桑白皮炒テ 艾葉 生地黄 黃柏塩水浸 阿膠蜜ニ炙

蒲黃炒 沙參 蓮房殼各等分 生姜一片 加ヘ水煎之食ヨリ遠ク服ス

○又方 生地黄汁 一升 生姜汁 一合 和シ

服スルモ亦愈一切酒糟麴類炙炒山椒
生薑炙タル物海物ヲ忌ヘシ

○又方 乱髮ヲ黒燒ニテ麝香少許入

白湯ニ醋ヲ加ヘテ調服スヘシ

○乾柿ツルカキ一升ハタサキ蒂核共ニ切碎キ砂鍋ニ入

水ニテ煮只湯ヲ用テ時ニシタカヒ服ス一

日ニ服シ尽スヘシ枋救介ヲ用テ自愈

肉淋

小便ニ濃血ノ塊リ
肉ヲトクナルヲ下ス

銀杏一年ニ一粒ツク

取咬用キ明礬一三厘入無灰酒ニテ煮

熱シ酒共ニ服スヘシ二三服ニメ愈

小便血

地骨皮新シキヲ洗淨メ搗テ汁

ヲ取若汁ナクハ水ニテ濃煎シタル汁ニ薑

ニ酒少許加ヘ食前ニ温服ス心腎ヲ清シ

樽封シテ用キ以テ分利スル治法也若專

濕補スレハ及テ濕熱ヲ生シ害ヲナス一多ク

白濁

小便ナリ
ニシルナリ 薤子一兩炒テ為末空心ニ

酒ニテ一々分ツ服ス

○又方 淡竹葉 地骨皮 桑白皮 蜜

各等分煎湯ニテ服スレハ即止

○又方 薤薈アサギ多少ニ拘ス蜜ニ拌飯上

ニテ蒸連服ス三四次ニメ愈

○又方 車前叶四兩搗爛シ生白酒三升

ヲ攪キセ鹽少許入空心ニ熱服ス一二次ニ

テ愈小便道疼者ニ更ニ佳

○白濁淋疾痛忍ヘカラサル者ニハ羊角

ヲ燒テ灰トナレシニ好酒ニテ服ス

遺精白濁

ノ莖ノ汁ニ浸
煨乾カシ 研テ細末シ每服三々空心ニ燈

治遺精

白朮六兩 苦參 牡蛎各三兩

共ニ末トシ猪肚一具水ニテ煮爛シ藥末ヲ入レ搗テ桐子ノ大サニ丸シ四十粒ツク一日ニ三次酒ニテ服ス

○又方 蓮子心 硃砂一分 共ニ末トシ空心ニ服シ愈

精滑不禁如油

牡蛎 竜骨 白朮

炒ニ 青鹽 五兩 益智仁 一兩 蓮子 各二兩 茯苓

枸杞 各二兩 香椿皮 四兩 共ニ細末シ黄芩ノ

嫩カナル者ト金櫻子刺ト核トヲ去リ一升

煎シ膏トナシ右ノ藥末ヲ丸シ毎日空心

ニ鹽少シタル湯ニテ二三々ツク用ユ

夢遺膏藥

川練子 三兩 竜骨 一兩 牡蛎

二兩 細末シ冬瘡ノ膏藥ニミセテ貼下二寸

三分ニ貼ヘシ

○乳香指ノ大サナルヲ一塊卧時ハ山ハハハ

自體テ香之教度ニメ自愈

○疝氣諸症

七疝總論

七疝ノ症各不同治モ亦有別

○寒疝ハ陰囊冷結硬如石陰莖不舉或ハ

昇丸ニ控テ痛ム湿地ニ坐卧シ凉水ヲ得

之濕ヲ去ノ初ヲ用テ下之○水疝ハ陰囊腫

テ水晶ノ如ク陰汗痒シテ搔ハ黄水ヲ出ス

或ハ小腹ヲ按ハ水ノ声ヲナス 酒ニエテ

房事ヲ行ヒ汗出テ遇風寒濕陰囊ノ中

ニ結スルヨリ得之逐水劑ヲ用テ下之○筋

疝ハ陰莖脹或ハ潰或ハ膿或ハ痛裏急

ノ筋縮リ或ハ陰莖ノ中痛ム痛極ルトキ

ハ痒シ或ハ挺出テ不收精ノ如キ白物濁ニ

隨テ出是房事ヲ行フ邪術ヲ使所ニ

因テ得之心火ヲ降劑ヲ用テ下之○血疝ハ

狀黃瓜ホカニ如ホカニ小脈ノ兩傍橫骨ノ兩端ニアリ
俗ニ便癰ト名ツク今ノニビダリ是春夏ノ大燠
ニ重感シ内ヲ勞シ其氣流溢シ膨脹ニ滲
入結テ腫ラテス血ヲ和スル藥ヲ以テ下之○
氣疝ハ上骨ニ連リ下陰囊ニ及ヒ或ハ塊カク突
念怒ニ氣鬱シノ脹氣ヲ散スル藥ヲ以テ
下之○狐疝ハ狀カク死カク如ク卧時ハ脈ニ入リ行
時ハ出上下無定狐ノ惑力如シ故ニ名ツク
逐氣流注利ヲ用テ下之○癩疝ハ陰囊
大ニ腫不癢不痛是濕氣ヲ受ルニ因テ
生ス去濕利ヲ用テ下之

疝氣初起

風仙花陰乾 烏芋乾 等分

燒酒ニ浸シ日ニ二三鐘服ス

○又橘核去殼炒カラクテ末トシテ母日空心ニ温
酒三ノ一ニ入服ス效アリ

○又方 山查子 蒼朮各五 好酒一碗半
入八分ニ煎シ熟服ノ被フヲ蓋卧テ汗ヲ出ス
數服ニノ愈

諸疝發痛不可忍

荔枝核炒脆 細末ニテ

空心ニ白湯ニテ下ス或ハ青皮山梔子各茶
黃各等分ニテ炒末ニテ加ヘテ白湯ニ調服ス
○又方 茄蒂去根ヲ晒乾シ切片好酒ニ蒸
テ服スハ自愈志疝ニハ砂仁五分 加ヘ蒸テ
服スハ愈ハ効アリ

本疝

即本腎也凡人心火下降スルトキハ

腎水其濕メサルヲ不患真陽下降スルトキ
ハ腎氣其不和ヲ不患濕ニテ且和セハ安イソ
本強ト云者有ニヤ本強ハ則傷腎ナリ故
ニ純モヲ燥カ藥ヲ用ニハカラス濕和散利ノ
其邪ヲ逐トキハ邪自消シ榮衛流轉シ

愈枸杞子丸ヲ服スヘシ 枸杞子 昆布

吳茱萸各四 南星 半夏 白芷 山查子

神曲炒各二兩 滑石炒 蒼朮鹽炒 黃柏酒炒各三兩

共二細末シ酒糊ニテ桐子大サニ丸シ之ニ母服

七十九空心ニ鹽湯ニテ下之

寒疝攻痛及偏墜

偏墜ハ墜丸カ多ク本丸ヲ云 老少ヲ不

論病在左ニ荔枝核一歳一粒取タルヲ慢

吹ニテ煨テ存性研末ノ空心ニ好酒ニテ

服スヘシ 荔枝核年ヲ經タルモ好キニ一歳ニ一粒ヲ取ルルヲ教服トシ一日ニ服ス 病在右ニ小

茴香鹽水ニ浸シ炒研細末ニ空心ニ三々

ツ、燒酒ニテ服ス

○偏墜ニハ雞子一ツ尖ノ上ニ孔ヲ開硫黃

末三々入火ニ煨テ炭トナシ研テ細末シ白

湯ニテ用ユ

囊癰 凡ノ小腹癰ヲナシ陰莖ニ引集クシ

熱少ク好テ熱湯ヲ飲スナハ子ニ氣ナリ

如陰囊紅腫及熱ニ小便赤澁内熱口

乾キ墜重ノ作痛囊癰ノ候テリ疝ヲ

治スル熱藥ヲ用ユヘカラス

○主方 川芎 竜胆 天花粉 當歸

生地黃 柴胡 山柎 黃芩 各一ノム

澤瀉 木通 甘草 各五分 燈心ヲ加ヘ水

煎シ食前ニ服ス

○囊癰潰後移藥 蚌殼 黃連 青

黛 各等分 研末ノ糝ヘシ

陰囊癢 燥者ハ油核桃油ニテ潤之

濕者ハ五加皮千里光明葉劉寄奴各等分

稀荑煎湯ニシテ洗之

○脚氣諸症 脚氣總論 脚氣ハ始濕ヲ受復風寒

暑熱ノ邪ヲ挾テ成故ニ先腿足ヨリ起
 テ必ス脚屈弱ク拳體痿筋之肢即疼
 テ足漸腫小便不仁シ心中悸動シ胸滿
 小便澀ル但桑熱頭痛身疼ノ候絶々
 傷寒ニ似タリ人多ク得リ冷ス仲景脚
 氣ヲ以テ類傷寒ノ症トシ別ニ篇目ヲ
 立テ以テ別之蓋為此也羅謙甫云南
 北ノ脚氣受病不同南方ハ卑濕ノ地
 濕每ニ襲虚病下ヨリ起ル此脚氣ハ外
 ヲリ受ル也北方ハ地高クシテ無濕其俗
 澆乳酒麪ヲ多ク飲快ク食ヲ為能或
 ハ奉養太過シ其濕ヲ滋水性潤下氣
 拘ルアタハス故ニ下テ足ニ注テ腫痛ヲ
 ナス此脚氣ハ内ヨリ受ルナリ所因ヲ推キ
 ハメテ可治之

濕脚氣

足痛腫腫ニハ防己飲ヲ

スヘシ 白朮炒 犀角 蒼朮炒 生地黄酒炒

黃栢酒炒各 本通 防己 栴榔 川芎

各分ハ 甘竹稍七分 水煎熟服ス有熱加

黃芩熟甚 天冷 熱セハ 加石膏疼三

加竹瀝姜汁 或南星大便秘 結セハ

加桃仁小便澀 ハ加牛膝

○又方 蒼朮米泔水ニ浸 黃栢酒炒 牛

膝酒炒 水煎空心ニ服ス或ハ 為丸亦

可

○又方 萊菔根葉共ニ煎シタル湯ニ

テ洗フ生ナル無 之時ハ晒乾シタル者

モ亦可用

○又方 明礬各二兩ヲ地漿水十大碗入

テ六七沸煎シ半分ヲ汲テ脚ヲ浸シ

半分ノ湯ヲ徐々ト添入テ洗ヒ上ニ云ヲ
重テ身ヲ圍微汗出ルハ愈薄粥ヲ喫
テ飲シムヘシ此方ヲ用テ如不愈前方
ノ内ハ硫黄三ニ加ヘ如前洗フヘシ效アリ
地漿水トハ地ヲ二三尺深ク掘直内ハ水ヲ
傾入テカキミセ其水ノ澄タルヲ待テ取用ユ

風寒暑濕脚氣

鳳仙花葉ヲ晒シ乾シ

煎湯ニテ脚ヲ洗ヒ葉ヲ搗爛レテイタ
ムトコロヘシクヘシ

食積流注成脚氣

蒼朮炒 防己 黃

栝酒炒 白芷 犀角各一兩 栝柳 南星

姜各 川芎五錢 肥人各 貝母各 陳

皮各 加フ右細末シ酒糊ニテ桐子ノ大サ

ニ丸シ毎服七十九空心ニ白湯ニテ下ス

脚氣癰腫 馬鞭竹ノ煎湯ニテ二三
洗フヘシ即愈

又方 白朱飯ト陳好酒糟ト同ク

爛シ患処ヲコレニテ裹只脚指頭ヲ露

シ出ス

○虛腫ニハ槐花山梔子藍酒炒 為末空

心ニ米湯ニテ下ス又脚瘡ヲ治メ效アリ

治脚轉筋

コムラ 轉筋ハ皆血熱ニ屬

ス急ニ大蒜ヲ取テ脚心ヲ磨テ徧ク

熱セシメ即四物湯ニ酒芥紅花ヲ加ヘ

煎服ス筋足ノ大指ノ上ニ動キ至腰

住者ハ風寒濕ニ因テ作又蒼朮天南

星ヲ加フヘシ

脚之癰

脚ノ皮膚ノ間ニモコレ 土大黃ノ末ヲ

津唾ニテツクヘシ自能疼ヲ止メ腫ヲ消

○脚裂 黃蠟二兩 降真香二兩 研テ

細末シ猪油半斤入熬テ傅之

脚城 勃脬半箇患処ニ貼テ一夜過
次晩再貼五、六夜如此スルハ其城連根
脱出

○又方 葱根 勃脬 共ニ搗テ汁一碗
取テ煎シ再松香四兩ニ麻油ヲ入シ煎シ
水ニ滴ヲ落シ見テ珠トナル時右ノ汁ヲ
入煉テ膏藥トシ貼ヘ即落

○暑氣ノ時脚ヲ振破テ爛瘡トナル
ニハ茶葉ヲ口ニ嚼爛シテシクヘシ

○婦人諸症

婦女總論

經曰女子七歲腎氣盛
齒更髮長二七而天癸至任脈通太
衝脈盛月事以時下天トハ天真ノ氣
降ヲ云癸トハ壬癸ノ水ノ名故ニ天癸
ト云ナリ然モ衝ハ為血海任ハ主胞胎
腎氣金ク盛ナルハ二脈 流通ニ經血

漸盈テ應時下ルコシ月事ト云ハ平和
ノ氣常ニ三十日ヲ以テ一見ル月盈ハ則

チ虧ニ象ナリ若經脈行時ニ遇ハ調理
ヲ謹ムヘシ 調理トハ俗云
身持養生也 調理宜ヲ失スレハ

産後ニ受病ニ似タリ輕ハ宿疾ト成
重ハ喪生蓋驚ヲ被トキハ氣血錯乱

ニ經脈漸然トノ不行身ニ逆トキハ血
分癆瘵等ノ疾ヲナス若其時カシ方

スレハ虛熱ヲ生シ變シテ疼痛ノ根トナ
ル若恙怒スルトキハ氣逆スル氣逆スル

トキハ血逆ス腰腿ニ逆ルトキハ經水行
時ニ遇テ腰腿痛重ニ期ヲ過レハ安

シ頭眩心肺背脇手足ノ間ニ逆レハ經
水行時ニ遇テ其症亦然リ若怒極ル

○六十七

トキハ傷肝眼暈脇痛嘔血瘰癧瘰癧ノ病アリ加乏淫血其間ニ滲漏テ遂ニ穴ヨリ血淋瀝レテ己一丁レ九淫水行時風ニ中ハ病風冷ニ感スレハ病冷久レテ不愈變症百出可不慎哉

○滋陰百補丸 專治女人ノ勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛之飲食ヲ不思羸瘦力乏者治之

香附子 一斤炒去毛四十分テ製ス酒ニ浸四兩鹽水ニ浸四兩醋ニ浸四兩童便浸四兩俱炒焙乾用

益母草 半斤湯十日候 當歸 二兩 川芎 白朮

熟地黄 各四兩 芍藥 二兩 人參 茯苓 延

胡索 二兩 耳朮 二兩 右細末レ煉蜜ニテ

桐子大サニ丸ニ空心ノ時五六十九ツノ白湯

或ハ宿砂湯或ハ醋湯或ハ酒ニテ服ス

○調經順乳方 當歸 酒洗 生地黃 酒蒸

白朮 炒各四兩 茯苓 川芎 鹽湯洗 陳皮

湯 黃芩 水ニ沉合者 牡丹皮 去骨 玄胡索

二兩 白芍藥 兩炒 人參 一兩 沉香 五分

右細末レ煉蜜ニテ丸ニ每服三々空心

鹽湯ニテ用ユ

○治骨蒸調經方 當歸 一々 白芍藥

地骨皮 各八分 黃芩 兩炒 耳朮 各四

陳皮 白茯苓 各七分 枳殼 五分 半夏 兩製

澤蘭葉 二々 棗 二水二碗入煎服ス

經脈不調漸成癥瘕乳塊 香附子 一斤炒

艾葉 八兩醋煮 右細末レ醋ニテ桐子大サニ

丸ニ母服六十九淡醋湯ニテ送下ス一日二

服生油積等ノ物ヲ忌ム

月水久閉 蚕砂四兩炒テ半黃色ニテ

魚灰酒一壺ノ内ハ入砂鍋ニ湯ヲ沸レ其

内へ酒ヲ壺ナカラ入テ沸過シ取出シ磁器ニ盛蚕砂ヲ去テ酒ヲ温メ飲了後蓋ニシ即通ス

調經種子方

經水ヲ調ヘ子ヲ求ル方

艾葉 香附子

當歸身四裂ス 各八兩 生地黃兩洗 兩浸 熟地黃

杜仲兩炒 各系 續斷藍兩 炒 山藥炒黃連 各二兩 芍藥

茯苓人乳三拌 各五々 川芎二兩 甘草炙八分

右為細末醋糊ニテ粟大二丸ニ每服二丸空心ニ淡塩湯ニテ用ユ

○又方 益母葉七兩 生地黃 當歸 芍藥 香附四裂 熟地黃各三兩 川芎二兩

右細末シ蜜ニテ桐子大サニ丸シ毎服三々ツ、空心好酒ニテ下ス

○妊娠

妊娠心腹痛不可忍 鹽少許炒赤クシテ

一樽酒中へ入洋服之即止

安胎方

茯苓二兩色白堅重 赤者佳去皮 條芩即黃芩

堅者也枳殻ヲ用ユス大カラ不用酒ニ炒 白朮黃土炒 香附子童便浸

玄胡索醋炒 益母草槌不 紅花各二兩

沒藥真者ニ入 去油 各研テ細末シ煉蜜ニテ

桐子大サニ丸シ毎日空心ニ白湯ニテ七丸ヲ

服ス多用ニカラス如胎不安一日間四五次

可用一度ニ多服スルナカレ胎安キトキハ

又一日ニ一服ス或ハ日ヲ間テ用ルモ亦可

七丸ヲ為極凡腹痛腰酸脹ヲ作ハ即

服スヘシ如胎三五月ニノ常ニ墮者ハ三ツ

一月ヨリ製成シ服スヘシ恚怒勞力煎炒

氣ヲ殺スル物ヲ食スルヲ戒ム并ニ

冷水冷物房事ヲ忌ヘシ此方紅ヲ見胎墜ントスルニ至テ服之往々ニヨク保テ

月三足ニ産スニコトニ神方アリ

胎動不安腹痛下黄水 糯米一合黄芪

川芎各五々水一升八八合ニ煎シ二次ニ

温服ス

○胎重作痛不可忍鯉魚ヲ酒ニテ煮

食之

○胎漏不安糯米ニ合燉ニ煮生地黃

ヲ搗汁ヲ一合取粥熟シタル時ニ入シテ

調空心ニ服ス但煮ル時鉄器ヲ忌破

鍋ヲ用ユヘシ

○孕婦磕閃跌撲半産シ或ハ胎ヲ墜

ト欲シ安ニ毒藥ヲ服シ諸ノ惡症ヲ

見ス者ニ胎已ニ下イニタ下ヲ不論

此方ヲ用ユ 當飯 酒洗 川芎 三々 益母

仲 紫花者五々 水煎シ濃ク飲シムモシ口

嚔者ハ開テ灌之胎可安即愈不可寒

即下也産後ノ諸症モ亦治フ古酒童

便各一小杯ヲ入テ用ユ 名之如

妊娠卒倒

頃刻ニテ變者兒暈ト名

ツク葛根 麻黃 連節各 桂枝 芍藥 兩炒

其州 二々 姜枣煎服微汗ヲ出ノ愈

束胎散 益母州 當飯 各二 川芎 茯苓

各一々 枳殼 八分 陳皮 其州 各五 人參 一々

煎服ス 或々益母子四十九粒

ハナル者ハ不用可也八九箇月ノ間一日一服

用ユ臨産後他患ナシ

○産云月 催生丹 早ク用ユハカラスニ産後日ニシテ

遲ク胞破ノ時服之 益母州 一介 當飯 八箇

其州 四箇 乳香 六兩 麝香 三々 右細末シ

端午日調合ス鷄犬不淨婦女近ツクヲ
忌煉蜜ニテ竜眼肉大ニ丸シ臨産ノ時
乳香五分煎湯ニテ送下ス或ハ前ノ時
手散ヲ濃煎ノ飲之一服不生再服ス
又不生ニ服スレハ即生ス其益州藥調氣
氣血不致偏雜イマク正産ニ當サレハ
即能止胎止痛已ニ正産ニ當ハ即ヨク
催生痛苦ヲ免ル既ニ産ノ後服之ヨク
去舊血生新血中ヲ行シ補フ孕婦ノ
家ニ預メ救帖ヲ贖買ヘシ輕忽ニオモ
フコトナカレ

治難産

破水已ニ下時ヲ過ノ不産

滑利ノ藥ヲ服スヘシ 車前子 一兩微炒

水煎服ス 催生ノクスリヲ煎ス
ニ大向順流水ヲ用ユ 或ハ車前子

免糸子等分細末ニ温酒ニテ三五々服
ス亦效アリ

○又方 千里馬鼻 五個路上一三格タレ
舊草雜ノ糞也 蝉蛻

五個去首足 麝香 五厘 雄黄 五分燒灰 共ニ細末

ノ每服三分好酒ニテ下ス被ヲ擁テ微

汗ヲ出セハ立処ニ生ス

夏月熱心難産 滑石 六分 甘草 一分細

末ニ新汲水ニ蜜少シ加ヘテ用ユ但酷

暑大熱ノ時ニ非ハ輕シク服スヘカラス

冬月為寒氣所逼難産 五積散生薑

葱白八煎シ熱服スヘシ 方ハ諸書ニ
出タリ

産門閉 前胡 二兩 川芎 三兩 酒ニテ

煎シ服ス 姪有兩子一死一活 即妙手散 在前丹

參五錢加ハ煎服ス

盤腸産 子宮先出テ後子ヲ産テ其

腸才サシラサルナリ 枳實 三々 肉桂 五分
水煎シ急ニ服ス

○腸已ニ出テ再入者ハ驚シウコカス
ナカレ鉄銹水ヲ温テ灌之磁石真ナ
ル者ヲ煎湯ニテ飲シムヘシ即入也

臨産交骨不用

龜殼 一個 男子ヲ生

タル婦人ノ髮一把俱ニ燒テ灰トシ存性
一度ニ三々ツ當飯二両 川芎 五々 濃煎
シタル湯ニテ服ス人一里ヲ行間ホトアリ
テ交骨即開クタトヘ子死タリトモ俱ニ
下ルナリ

橫生倒産

艾麥粒ホトニノ婦人ノ右

脚小指ノ尖ニ三壯灸ス即順ニ生ス

○又方 蛇蛻一條 蟬蛻 十四全キ 頭髮 モヲ用
共ニ黑燒ニシ未シニ服ニ分温酒ニテ調

下シ仰臥行時ニ順ニ生ル

○竈下ノ釜ニ對スル處ノ紅焦土研テ細

ニシ酒ニテ一々服シ産母ノ臍ノ内ヘ塗ヘシ

生子ノ頭ニシテ帶テ出

子死腹中不下 黃牛糞乾者白湯ニテ

服ス即下

○又方 苦葫蘆黑燒之每服一々空心ニ

熱酒ニテ下ス

月數未足胎死不出

大豆ヲ醋ニテ煮テ

服之立処ニ下ル未下ラサレハ再ヒ服

○子死腹中連日不出 巴豆 三粒 去壳 車麻

子 七粒 去壳 麝香 少許 研餅ノ如ニ臍ノ上

ニ貼ヘシ即産ス産スレハ速ニソノモチヲ去

ヘシ然サレハ子腸亦出 凡ノ産婦舌クロキハ子

胎衣不下 荷葉剉水煎シ濃ノ服スレハ

即下

○又雞子清ヲ一ツ吞ヘシ即下

○又産婦自髮ノ稍ヲ將テ口中ニ置キ一
夕ニ惡心スレハ即下

○産後

産下保生錠

蒲黄 五靈脂 各十
兩

胡索 五兩 醋炒 甘竹 二兩 炙 青皮 二兩 醋炒 麩糊 二

テ錠子ニシテ産シテ後一飯ノ間アリテ薑湯ニテ化シ服ス此藥端午ノ日

修合ス鶏犬不淨ノ女人ヲ近シルヲ忌

定暈寧心散

澤蘭 荆芥 各一
當

飯 八兩 川芎 十兩 甘竹 四兩 極細末トシ産

シテ後三々ツ、清米湯ニテ調服ス童便
半盞加ヘテイヨクヨシ

産後養暈

當歸 尾大川芎 山查子

益母草 五灵脂 水煎服スル時童便

一盞加ヘテ用ユ

○又方 荆芥 炒黑 研末 童便半盞白湯ニ

テ調服ス效アリ

産後血暈

惡心冲心人事ヲ不知者ハ之

兩手ニテ産婦ノ頭髮ヲ提起シテ放倒

ニスヘカラス放ハ血攻心テ不救急ニ醋ヲ燒

テ嗅セ醋少許燒熟シ口中ニ灌ハ自定

時ニ髮ヲ提ケタル手ヲ放テ坐シ正ク記

ヘシ大抵サウ飯湯ニテ荆芥黑燒ヲ調下

ス熱童便ニテ調灌下セハ即甦ル

血衝上昏暈欲絶

紅花一撮 好酒一

鍾數沸煎シ童便二盞入熱ヲ灌下

ス立トコロニ驗アリ

産後惡血下不盡上奔衝心煩向腹痛

藕ヲ搗テ汁ヲ取温服ス

或惡露不盡腹痛及兒枕疼 山查子

百十 打碎煎湯ニ砂糖少許入空心温服

產後發熱 大劑ノ當飯炮姜治之如

風寒ニ冒ハ加減ノ治之愈此症多クハ

血虛ニ由故ナリ

產後遍身疼痛 此症產ノ血氣ヲ走

動スユニ升降異常ヲ失之関節ニ流

滯リ筋脈引急是以ニ遍身疼痛甚

トキハ腰背強硬俛仰スルヲアタハス手

足屈伸シカタク或ハ身熱ニ頭痛ス他

病トナシテ治スハカラス 牛膝 酒浸 當飯

去尾 肉桂 火息 白朮 黃芪 独活 生

姜 白僵蚕 桑寄生 甘竹 各等分

細末ニ毎服四錢滾湯ニテ調服神效アリ

產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附子 赤芍藥 川芎 當飯 熟地黄

陳皮 紫葳 牡丹皮 紅花 牛膝 枳

殼 各一 甘竹節 獨活 各五 水二碗入

八分ニ煎シ酒一小盃入食前ニ服ス

產後舌出不收 丹砂ヲ舌ニ敷ヘシ或ハ

盞蓋ヲ擲テ地ニ墮シ声ヲ作ス產婦

驚之舌即收ル

產後大便閉 當飯 生地黄 茜竹根

桃仁 延胡索 赤芍藥 紅花 水煎ス

如寒痛ニ木香ヲ加フ有汗木香ヲ去

人參 甘竹 酸棗仁ヲ加フ惡心ヲ作ニハ砂

仁三分加フ 產前產後痢疾 敗龜甲ヲ醋ニ浸シ

炙為末服スヘシ

○胎前產後通治

○回生丹 胎前產後三十六症及崩漏

淋瀝ノ諸疾不治云フナシ此誠ニ神驗ノ

妙方也 大黃 錦紋者一 蘘木 三四劉河水

三碗トシ渣ヲ 紅花 三四黃色ニ炒好酒一大壺ニ入煎

去汁ヲ用ユ 黑豆 三升煮熟シ汁三碗ヲ取テ豆ヲ去リ

末ヲ好醋三碗ニ入攪一セ始文火後武火ニ

テ煎シ煉テ膏トス 煮テ三遍ニテ 次ニ紅花

酒ニ煮タル汁ト蘘木ノ汁ト黑豆ノ汁トヲ

合セ大黃膏ノ内へ入又熬テ膏トナシ取

出シ後ノ藥ヲ入ル 當飯 白ク丸 川芎 茶

地黄 好酒浸九 白茯苓 烏藥 酒炒 蒼朮

米汁 香附子 便製表 延胡索 醋炒 蒲黃 火炒

牛膝 去芦 桃仁 皮去ヲ去別ニ 甘草 陳皮

木香 三棧 醋炒 羌活 五靈脂 酒ニテ飛シ

地榆 生用 山茱萸 酒蒸 白芍藥 酒炒各

良姜 壁土炒 人參 白朮 炒 木瓜 青皮

醋炒各 乳香 沒藥 各一 以上廿七味為細

末大黃膏ニテ彈子大サニ丸シ一丸ヲ陳

好酒ナリニテ化シ服スヘシ諸症治方丸ニ

録ス○産期未至惡露先下リ乾燥テ

難生俗ニ之漿ト云○横生逆産傷損テ

産盤腸産暑氣ノ産寒氣ノ産悶亂

之日ヲ連テ生シ難ニ○子腹中ニ死シ唇

青ク腹冷ハ命須臾ニアリ已上ノ症ニ當

飯川芎益母州各三 水茶碗ニ一ツ入七分ニ

煎シ好酒三分加右ノ丸藥ヲ調服スヘシ

○胎衣不下脹胸昏迷スルニ○惡露上ニ

攻昏暈ノ不醒○産後無力特々暈下

厥之或ハ喘促シ汗出或ハ頭旋眼黑○

已上並ニ當飯川芎各三分水茶碗ニ一ツ入
七分ニ煎シ酒三分加ヘ丸藥ヲ服ス再ヒ
童便半盞入テ用ユ○産後惡露不盡
或ハ不行以腹脹疼痛ス○産後寒熱
往来シ瘧疾ニ似テ飲食不進日久ニテ
骨蒸トナルニ○産後飲食ニ傷レ浮腫肢
痛ニ○産後胸脹滿嘔吐不止○産後
四肢浮腫ニ○産後勢ヲ食スルヲ太早ク
血結在心心口壅悶ニ○産後狂乱シ鬼
神ヲ見ルカ如キニ○産後敗血フルチ經絡ニ流入
百節酸疼ニ○産後血心孔ニ入テ失音
不語○産後怒ニ因ッテ肝ヲ傷リ小便ニ血
ヲ下シ雞肝ノ如クナルニ○産後敗血肺ニ
入テ喉蟬ノ鳴カ如クナルニ○産後體法イハレ腰
痛身及張ニ○産後養食生ノ宜カラス下

血崩漏ニ似タルニ○産後面黃舌乾キ或
ハ鼻血出遍身紅點アルニ○産後小便淋
瀝シ大便不通或ハ乍チ寒ク乍チ熱ク
醉タル如ク癡ナル如ニ○産後虚損身エヒ瘦
面黃飲食減少シ癆熱盜汗漸シテ勞瘵
トナルニ○婦人經水閉或ハ不調崩漏帶
下及臟冷テ孕ス或ハ胎漏半産等ノ症
○已上並ニ當飯川芎各少許水一茶碗
入七分ニ煎シ酒三分加ヘ丸藥ヲ調ヘ服ス
○産後傷寒頭痛身熱魚汗麻黃末
三分加ヘ葱姜ノ煎湯ニテ丸藥ヲ調下ス
○如頭痛身熱自汗セハ冬ハ桂枝ノ末
三分春夏ハ防風白朮ノ末各三分加ヘ葱
姜ノ煎湯ニテ調下ス○産後乳ナキニハ
黃連天花粉當飯尾穿山甲ノ末各三分

加へ酒ノ内へ入化し服スへし其乳湧カ如し
初産数日ノ内氣血定ルヲ俟テ服セヨ○
凡ソ症深ク重キ者ハ多ク服メ自愈初
産ノ危急ノ際日ニ二三度用テ最效アリ

○乳病

乳汁不通 老絲瓜子ヲ連テ黒燒ニシ
細末シ酒ニテ服シ被ヲ蓋汗ヲ出セハ
即通スへし

○又方 胡麻ヲ炒搗爛ニ少タル鹽少
許入テ服ス

○産婦無兒乳ヲ喫サレハ乳腫堅痛忍
カタキニ 川芎 當飯 白芍藥 熟地
黄 各ニ 炒テ粉ニス 水ニ碗入八分ニ
煎シ食ヨリ遠ク服シ脚布ヲ用テ兩ノ

乳ヲ緊束手ニテ揉按ハ其腫消散ス甚
者ハ再ヒ一服用ユ

内吹外吹

懐胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹

ト云ヒ兒ノ乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云フ
寒熱作甚シキ者ハ惡心嘔吐ス此方ヲ
服スへし 柴胡 陳皮 川芎 山梔子

青皮 石膏 黄芩 連翹 各ニ 橘葉 枚
茸 卅 五分 水ニ碗入八分ニ煎シ食ヨリ遠
ク服ス葱心白ヲ切碎キ炒熟シ搗爛シテ
乳ノ上ニ敷帛ニテ包ヘシ冷ルトキハ易ヘシ
自愈

○乳結核アリテ腫痛忍カタキニハ陳皮
白ヲ去晒シ乾シ麪ヲ微黃色ニ炒共ニ
細末シ麝香少許入再ヒ研和一度ニニ
女熱酒ニテ調服シ乳ヲ揉ハ即散也

乳癰乳癌

丹溪曰乳房ハ陽明胃經ニ

屬スル所乳頭ハ厥陰肝經ニ屬スル所也
兒ニ乳ヲ飲スル母或ハ忿怒肝ヲ傷リ或
ハ厚味ヲ食シ熱ヲ積以テ氣流行サル
コトヲ得ス結テ腫ヲナシ痛ヲナス陽明ノ
經ノ血熱スルトキハ化ノ膿ヲ為又兒ノ口
ノ氣吹テ嫩熱ニ次ニ結メ核ヲナス初起
時ハ痛ヲ忍テ揉散シ軟ナラシムルハ血脉通
シテ自然ニ消散ス此ヲ失スハ不治メ癰
疽トナル紅腫發熱ニ疼痛者ハ是乳癰
ナリ堅クニテ潰爛者ハ乳疽ト名ツ初起時
ハ癰散シ流氣藥ヲ用ユ若己ニ膿ヲ成者
ハ又内托排膿ノ養血順氣ヘシ安ニ刀針
ヲ用テ処コヲ取ヲナカレ又婦人憂ヲ積テ乳
房ノ内ニ核子ノ大サニ核ヲ生シ其硬ト石
ノ如シ不痛不潰或ハ一年二年或五三年

ニシ始テ癰ニ瘡トナリ破陥リタルヲ乳癰
ト名ツ多其深凹ト出穴ニ似タルニ也此症
多ハ難治此瘡ヲ得者ハ天命也トイヘトモ
若ヨク心ヲ清クシ思慮スナク暴怒ヲ戒
メ厚味ヲ不食メ内托ノ利活血順氣ノ
藥ヲ服セハ可生ノ理アリ

乳癰初起

藕根切片無灰酒ニテ煎

之服其人ノ酒ヲ飲ホトラ量テ用ユレハ
即消散ス

○又方 五味子 ニ々陳壁泥
ニ拌セ炒 阿膠 ニ々麩ニ
拌炒

各研テ末ニ陳好酒ヲ熱クシテ服之被ヲ
蓋汗ヲ出セハ即愈

○又方 蒲公英 七々 金銀花 二両 穿山

甲 三片灰拌黃色ニ
炒テ槌碎ク 橘葉 七枚 白酒一碗水一
碗ハ八分ニ煎シ半ハ飽時ニ服ス外ハ橘葉

ノ煎湯ニテ洗ヒ其渣ヲ腫ルル処ニ敷カシ腫
ハ汗出テ即散也

○又方 鹿角尖シカクノトカリ三寸煨紅シ碾末シ三々
熱酒調服ス重者ハ二服ニ必ス消ス

結核作痛未成膿 酒ニテ白蠟ヲ化テ
一錢服ス

乳癰乳腫 ハセラノハ芭蕉葉搗テ汁ヲ取白酒ニ
テ服シ渣ヲ腫ルル処ニ敷

乳癰治方 先ツ甘草水ヲ以テ洗ヒ白蠟
三々好酒ニテ化服ス五七次タビニテ亦愈

○又方 圓蛤ハニシカカラ殼ヲ研極細末シ之皂莢ノ
末少許加ヘ醋ヲ煎シ右ノ粉藥ヲ調ヘ
敷ヘシ即愈

○同穿爛ル者ニハ貝母 知母 各二々
香ニ々 細末シ雞子白ニテ調敷ヘシ 麝

○凡諸瘡潰後ニハ皂角穿山甲ヲ服ス
ヘカラス

乳癰 松脂 色白者 川椒 花粒 研テ細末
シ先槐枝ノ煎湯ニテ洗ヒ猪油ニテ蒸末
ヲ調擦ツケヘシ

○婦人諸病補遺

血疲 婦人經水閉結ノ血疲上ル腹

腸脹痛欲死者ニハ 冰蒸花 スイコウクハ 馬鞭竹イヌクサ

各一竹 煎シ煉テ膏トシ 當歸 生地黃
川芎 白芍藥 各二 紅花 沒藥 各二兩

延胡索 五灵脂 各二 烏藥 木香 各一

右細末シ前ノ膏少シニ米糊ヲ加ヘ丸ノ
毎服空心ニ紅花酒ニテ百丸ツ、送下ス
崩漏不止赤白帶下 烏梅黑燧ニメ

細末シ白湯ニテ服ス止リテ後ニ蓮肉ヲ

黑燒ニシテ香附子炒共ニ細末ニ毎服ニ
女湯ニ醋ヲ少シ加ヘテ服スヘシ按スルニ
此方男子小便ニ血出ルニ用テモ效アリ

血淋

淋疾血出
ルニ症アリ

青蒿子

八九月ニ取リ
レハモトメカタシ

一味研末ニ冬米飲ニテ搗テ丸トシ清
晨ニ好酒ニテニ々ツ、送下ス輕者ハ半
月重者ハ二十日ニ自效アリ但此藥ヲ
服ノ後ハ永ク孕イナシ子ヲ求メント欲
スル者ハ此方ヲ用ユヘカラス医家功ヲ奏
ノ易クハ貧イナカレ上、帝好生、徳ヲ絶ハ
速ニ天ノ譴ヲ受シ如シ病危ト者ハ服之
母ノ命ヲ扶ルル亦重シ何ソ服スルコトヲ
妨ケンヤ

白帶

蕎麥麩雞子清ニテ丸シ大サ
菘菜豆ノ如クニ清晨湯ニテニ々ツ服ス

○又方 破故紙炒テ細末シ雞子ニツ
ノ孔ヲ用破故紙ノ末ハ分入攪ニセ紙ニ封
シ固メ飯上ニテムシ空心ニ酒ニテ服ス重
者モ十次ニ不遇ノ即愈

小便不通

鯽魚一尾搗爛シサ許ヲ

麻ノ内ヘ入ヘシ即通ス

○又方 墙上蜒螺ノ内ヘ麝香ニ厘入

即蜒螺水滴出ルヲ取テ麻ノ内ヘ入ヘシ
即通ス

婦人顛狂失心

明礬

煨過

麝香 七々

共ニ末トシ糊ニテ桐子ノ大サニ丸シ毎服
五十九丸白湯ニテ送下ス數服ニ即愈

鷄爪風

婦人不時ニ癢ス手足拘攣

拳束テ鷄爪ノ如クニナリ疼痛急ニ左
右ノ膝ノ骨ノ兩傍ニ小キ窟アル処ニ

四穴ニ各三壯ツ、灸スレハ立効ニ愈俗ニ鬼眼穴也

鬼胎 婦人月ヲ過シテ不産一セカ産難ヲ抱ク

如ク丸者ヲ云是ニコトノ懐胎ニテス也 吳茱萸 川烏

頭 秦芫 柴胡 白姜蚕各等分 細末シ

煉蜜ニテ桐子大サニ丸シ一度ニ七粒ツ、

蜜酒ニテ服ス惡物ヲ下ノ自消ス○此症

詳審ニ辨知テ藥ヲ與ヘシ古人多ク月

ヲ過テ生スル者アリ率ホニ下スナカレ

鬼胎ノ説ヲ以テ却テ害ヲナスナリ

可慎々々

○小兒諸症初生通用

○小兒初生先黃連其汁ヲ濃煎ヨラ急

ニ軟ナル絹或ハ綿ニテ指ヲ包ニ藥ヲ

蘸シ兒ノ口ニ入口中ノ惡血ヲ搦出スヘシ

倘如此トリカタキ時ハ右ノ煎湯ヲ少シ

ツ、口ニ灌クヘシ惡沫ヲ吐出スヲ待テ後

ニ乳ヲ飲シム是胎毒ヲ去ホウソクニ瘡瘡稀也

○兒生シテ七八十歳ノ老人ノ舊裙フルギヲ縫

改メテ小兒ノ衣服トスヘシ壽命長シ福

貴ノ家ナリアツタニコレス衣服綾羅ノ類

ヲ用ユヘカラス小兒ニコレヲ着スレハ病ヲ

却ルスアタムフ不能壽シツサ柳テ福ナシ

馬牙 初テ生シタル小兒ノ口中牙ハタキ銀ニ白

點ヲ生ス馬牙ト名ツク乳ヲ飲カタシ此

胎熱ノワザナリシタシトキ口ト不同此症ハ療治

ヲ以テ緩ニスレハ救スツフアタハス急ニ針ニテ

白點ヲ挑破血ヲ出スヘシ症凶キトキハ

毎日如此ス緩ナレハ日ヲ間テ挑破ルナリ

挑テ後青絹ヲ用テ涎ヲ取絞出シテ好

京墨ヲ薄苛ノ煎湯ニテ磨兒ノ口ニ遍

搦乳ヲ飲スヘカラス片時睡出ルヲ待テ後
乳ヲ飲スヘシ立処ニ效アリ若小兒ノ為ニ
痛ヲ護者ハ多ハ死ス

初生小兒面赤眼閉 大便不通不能進

乳者ハ多胎中ノ熱毒ニ由テナリ急ニ糞

清ヲ以テ解之 糞清ノ製法
本綱五十二詳

小兒生下遍身無皮 急ニ早米粉ヲ遍

身ニフリカケテ即皮生スル時止ムヘシ

臍風撮口 此症ハ風濕ニ傷レ臍帶ヲ

断テ後イニ夕乾ス頻ニ浴サセ風濕臍ノ

中ニ入或ハ衣服ヲ換ル時臍ノ内ヘ風ヲ

受テ遂ニ臍風トナル面赤ク喘急ニ啼

色不出撮口ト名ツク 蜈蚣 赤脚金頭者

蝎梢 四尾全蝎ノ
尾ナリ 白姜蚕 七 瞿麥 五分 共ニ

研テ細末シ烏羽ノ殼ヲ管ニシテ藥ヲ臍ノ

内ヘ吹入噴嚏啼出セハ療治ノ活ヘシ即

薄荷ノ煎湯ニテ右ノ藥末ヲ服スヘシ

○又牙銀ヲ見テ小泡ノ如キモノアラハ急

ニ淨綿ヲ温湯ニヒタシ手ノ指ヲ裹ニ輕

々ト牙銀ニ出タル物ヲ擦破ハ即口ヲ開

ク也或ハ小兒ノ頭頂ニ五七壯灸ノ即愈

又小兒ノ臍帶ヲ煎シ服サセテ效アリ

○又方 多啼テ乳ヲ飲ス口ニ白沫ヲ吐

ニハ全蝎 二十一頭尾全者去毒
好酒ヲ塗アリ未トス 麝香 女許
別研

共ニ調合シ金銀ノ器ニテ湯ヲ煎シ藥

末ヲ服スヘシ

臍風主月筋 小兒初生七日ノ間若臍風

症發リ腹下ヨリ青筋助引發リ一ツ道ノ

如ク兩方筋ノ如クニナリ上テ心ニ至レハ不

治此症ヲ見ハ其主月筋ノ初テ發ヲ詳

ニ視テ青筋ノ頭ニ灸ヲ三壯スヘシ或ハ兩
齒ノ如クナル頭ラ尽ルル処ニモ兩方各ニ壯灸ス
ヘシ青筋自消メ必ス活

○又方 独蒜ヲ切片臍ノ上ニ安其上ニ
灸之口中蒜ノ氣アラハ即灸ヲ止ヘシ

臍腫出汁 栝朮ノ末ヲツクヘシ或ハ黄柏
ノ末ヲツクル皆效アリ

臍瘡不乾 綿子燒灰フリカケテ即愈

兒臍出血 小兒初生イマ夕月ニ滿ス多

ク啼叫トキハ臍ノ中ヨリ血出ルコトアリ
白石脂ヲ末シ貼ヘシ愈若不愈トキハ

白石脂ヲ微炒テ貼冷ハ再ヒ貼ヘシ初
ツケタル薬ヲ剥取ナカレ

臍久不乾 當飯焙乾之末トシ臍ノ中ニ
シクヘシ頻ニ用テ愈

○凡臍帶ヲ斷時ニ明礬生ニテ細末シ臍
ニ多ク糝ヘシ總テ臍ノ病ナシ

止夜啼方 蟬蛻二十七
全者 頭ト足トヲ去辰
砂少許入細末シ蜜ニテ丸シ兒ニ吮シム
ヘシ自止

顛門腫 黄栢末ヲ水ニテ調足心ニ塗
ヘシ或ハ顛門陷ニハ半夏ノ末ヲ水ニテ調

足心ニ塗ヘシ

疔瘡 凡小兒生シテ百日ノ内ニ生瘡疔
瘡ト名ツク胎毒ノワザナリ又毒瘡ト名ツ

ク身ニ出テ次第ニ頭ニ至ル者ハ愈ヘシ
若初頭ニ出テ次第ニ腹ニ至ル者ハ難治

犀角丸ヲ服スヘシ 牛黄 犀角 羚羊
角 全蝎 酒洗 白僵蚕 炒 防风 羌活

天麻 麻黄 牛胆南星 天竺黄 黄连

京墨煨テ微烟 以上各三分 細末之 蒸餅ヲ
 糊ニ 打テ丸ニ 艾實大ニ テ辰砂金箔 ヲ
 衣トシ一丸 ヲ薄奇 ノ煎湯ニ 送下外ニ 六
 付藥等 ヲ用ユヘ カラス毒内ニ 入テ及 テ他ノ
 疾ヲ 生ス藥煮 ノ衣服ヲ 着スヘ 其法
 大黃八兩 甘州四兩 當歸二兩 朴硝二兩 以上四
 味青布 木綿ヲ 兒ノ衣服ニ ツニ 右ノ藥ト
 同ク 鍋ニ 水ヲ 入煮テ取出シ 陰ニ 乾ノ 早晚
 トリカテ 兒ニ 着スヘ 一度 着タルハ又右ノ如ク
 煮テ陰乾シ 着スルナリ愈ニ テニ 毎日用之
 又乳母ニ 煎藥十 劑用ユヘ 其方
 苦參二分 羌活八分 甘州四分 連翹 防風
 荆芥 牛蒡子 研 金銀花各一分 水煎之 服ス
 鷄鶩油膿物 薤葱蒜等ヲ 忌酒ハ少シ 飲
 テヨシ

○急慢驚風

○小兒癩俗 驚風ト名ツク 陰陽ノ症
 アリ身熱シ 面赤ク 搐搦上 視牙 緊タル ハ
 陽症也吐浮 或ハ只吐シ テ不浮日漸 面
 色白ク 脾虛シ 或ハ冷テ 癆驚搐搦 甚シ
 カラス微ツ 目上視手足 スコ 動者ハ陰症
 也陽症ニ ハ用涼藥陰症ニ ハ用温藥一
 緊ニ 驚風ト作テ 治スヘ カラス又痘疹癆 癆セ
 ントテ先身熱シ 驚跳或ハ 搐搦ス 此驚風
 ニ非ス癆散ノ 藥ヲ 服用スヘ
 ○癆驚散 半夏生一分 皂角五分 為末少許
 鼻中ヘ 吹入レ 八即甦
 ○又方 牛胆南星一兩 辰砂二分 研テ 細末
 之ニ 每服五分ヨリ一分 至ル 午前ニ 一服午後 二
 一服燈心生姜ノ 煎湯ニ 送下ス

急慢驚風灸 眉心中ニ灸五七壯スヘシ即

喉ヨリ志出テ人息

○又尾尻脊下某豆大ホトニ艾ヲ圓一壯各スレハ即志ヲ出スニ壯ニノ之処ニ愈

○又鼻梁ノ両旁突突ニ窟アル処ニ點ヲ付

兩方ニ三五壯ツ、灸スレハ立トコロニ愈

諸書曰ニ多ク故ニ累各之

○五疳

疳症不同病ニ對シ藥ヲ用ユヘシ

心疳 小便不通口乾舌爛牙臭ク是心

臟ニ受積ナリ 羊肝散ヲ用ユ 穀精炒 五分

胡黃連 五分 柴胡 五分 甘草 五分 地骨皮 五分

盧菴 三分 共ニ細末シ羊肝一具竹刀ニテ割

開キ右ノ藥末五分ヲ入肝内線ニテ肝ノ開

キタル処ヲ縫テ砂鍋ニ入テ煮熟シタル時ニ服スルヲ七日ニ即愈

肝疳

熱ヲ積テ目ヲ損ス又雞眼ト

名ツク是肝臟受積ナリ 雞肝散ヲ用ユ

夜明砂 水洗淨 雄黃 上 威灵仙 蛤粉 穀

精炒 各一 共ニ末トシ雞肝一具藥末五分上

共ニ砂鍋ノ内ニ入雞肝煮テ熟シタルトキニ止テ服スヘシ

脾疳

夜盜汗ヲ出シ泄瀉口乾ク是脾

臟受積ナリ 白朮散ヲ用ユ 白茯苓 白

朮 土炒 澤厚 各二 山查子 五 胡黃連 一

神麴 五炒黃 陳皮 一 共ニ末トシ毎日清米

飲ニテ一々送下

肺疳

龜胸咳嗽痰熱夜啼ス是肺臟

受積ナリ 二冬膏 天门冬 麥門冬 苦

棟皮 桑白皮 陳皮 生地黄 各三 河水

十碗入一椀ニ煎シ白蜜八兩入共ニ膏トナ
シ再山藥末一兩ヲ膏内ヘ加ヘ和勻ヘ毎日
三次服スレハ愈

腎疝 肌體極ニ瘦遍身之瘡疥癩之

齒齦腫甚ニキトキハ牙齦潰脱ル俗ニ

走馬牙疝ト云寒熱之頭熱之脚冷己

上五疝也 腎痛ノ治方ヲ不載者ハ走馬牙疝ノ
方別ニ一條アリ下ニ見タリ可參考也

五疝奇方 凡小兒五疝潮熱面黃肌瘦

煩渴吐浮肚大ニ心助主日手足如柴精神驚

悸等之疝ヲ治ス 白朮 蜜水浸炒 白茯苓

史君子 切碎炒各
七各五分 蓮肉 隔紙 麥芽 炒 金

櫻子 畧炒 陳皮 山查子 各五 麥門冬 去心

芡實 二分 甘州 一分 青皮 二分 以上細末シ

藥末一兩ニ蜜四兩入煉調テ日中ト晚ト
温湯ニテ口ヲ漱テ此藥散匙服スヘシ

○身熱之咳嗽スルニハ地骨皮百部根各

五分加○稟氣弱ニハ人參一分五分加○

腹脹大便稀腸鳴テ色ヲ作或ハ虫吐テ

不和枳椇子二分五分木香五分加

疝病欲絶 黑牽牛子 雷丸 史君子

各一 共研テ末トシ小兒一歳ナラハ藥末一

厘二歳ナラハ二厘ヲ雞子黃一ツ分ニミセ

合セ紙ニ包ミ飯上ニテ蒸熟シテ用ユ三

四ツ分ヲ服ノ即愈

疝積諸病 雄黃 二分 鷄肝 不落水者

磁碗ニ入共ニ搗和好酒ニ盞入肝内飯上

ニテ蒸熟シ空心ニ服ス三四次ニノ愈

○瘦損ニ 神曲 十兩陳
者佳 山查子 八兩 馬子

城 四兩醋浸シ
飯上三次 右細末シテ砂糖ニ調テ服
ス小兒常ニ服ノ能生肌肉

○小兒雜病

○五福化毒丹 小兒胎熱大小便不通丹
毒瘡瘍赤疹赤目重舌木舌口瘡等
ノ症ヲ治ス 玄參 二兩 人參 七錢 茯苓
十五 馬牙硝 五錢 青黛 一兩 麝香 一分但夏
甘州 七錢 一方黃連一兩加以上細末蜜
ニテ丸トシ辰砂ヲ衣トス毎服一丸薄荷ノ
煎湯ニテ服ス瘡疹ノ後餘毒上ラ攻ヒ
齒臭ニ生地黃ノ煎湯ニテ服スヘシ

赤遊丹

此症胎内ニテ毒ヲ受生テ
後ニ発スルナリ身胎内ニアルトキ父母媾
慾ヲツ、ニミス淫火熾ニメ又厚味ヲ食ス
ルヲ戒ス又炭火ノツヨキニ烘又兒生テ
熱湯ニ洗ヒ衣類ヲツヨク烘テ着セ内ノ
毒ヲ觸動シテ此症ヲ発ス身熱ニ啼叫

驚キ搐搦次ニ紅腫ヲ生シ発熱ニ
息間ニ紅腫身ヲ遊走ノ定レルトコロナシ
先頭額ヨリ起ル者天奪丹ト名ツク餘
ハ皆腹背ヨリ起リテ四肢ニ入者ハ輕シ
四肢ヨリ起テ胸腹ニ入者ハ重シ先生姜
汁葱汁燒鹽ノ煎湯ニテ腫ノ処ヲ洗ヘシ
洗時湯ヲ目ニ入ルヲナカレ若目ニ入レハ損
傷スルナリ洗テ急ニ服スル方

白芍藥 陳皮 各五分 麥門冬 一錢 甘州 五分
藿香 木通 各四分 黃芩 五分 水一小碗入煎
ニテ用ユ一ニ服ニメ愈乳母ニハ藥ヲ一倍
ニメ用ユ○赤遊腫痛ニ破草鞋ノ亂髮共
ニ黑燒ニメ醋ニテ調ヘ敷ヘシ○平常ノ紅
腫ニ蒜頭 半個 葶藶 二個 煮熟ニ搗爛シ
白酒ヲ温テ服スヘシ自消ス

走馬牙疳

此症患迅速ナルヲ以テ走馬

ト名ツク治方遅ルヘカラス是多ク痘疹ノ餘毒ニ中ラレ又雜病ノ熱甚シクシテ成モノ也
牙銀爛腫次第ニ黒ク腐臭シ不治者五種アリ口臭ク涎穢ルハ不治黒腐不脫不治齒落テ血不流穿腮破唇ハ不治
藥ヲ用テモ不效ナリ○初テ起ルニ用ル方
人中白煨テ紅シ 孩兒茶一兩 黃柏 薄荷
青黛各六分 竜腦五分 右極テ細末シ先温湯ニテ口漱淨メ藥末ヲ爛タル処ヘ吹ヘ
シ一日ニ六七次用ユ藥ヲ吹テ後涎外ハ流ルヲ吉トス涎毒内ニ收ルハ凶ニ内藥ノ方
芦薈 柴胡 黃連 胡黃連 牛蒡子 玄參 桔梗 山梔子 石膏 薄荷 羚羊角各五分 耳聾 升麻各三分 淡竹

葉十枚 水ニ盞入六分ニ煎シ食後ニ服ス

此方穿腮破唇者ナリ在服ノ效アリ或ハ黃連乾姜等分ニ細末シ吹入ヘシ即效アリ

小兒嘔吐 温中止吐湯凡清凉ノ物ヲ吐

ノ順ニ易出者ハ為寒此方主之

白豆蔻 白茯苓各一分 半夏五分 生姜五片

水煎シ沉香四分磨テ入熱服ス○酸物ヲ

吐ノ通ニ難出者ハ為熱和申清熱飲主

之 黃連姜炒一分 半夏姜製一分 陳皮 藿香

砂仁各七分 白茯苓一分 水煎徐ニ服ス

同吐瀉 脾虛スルトキハ浮シ胃虚スルト

キハ吐ス脾胃不和陰陽不順清濁相干

トキハ吐瀉兼作ル安胃醒脾湯ヲ用ユ

白朮 茯苓各一分 滑石水飛 砂仁炒各七分 木香

煨ス 姜枣入水煎シ服ス○不食ニハ枳實

山查子ヲ加○驚ヲ決ムニ天麻南星ヲ加
○風ニ防風葛根ヲ加○暑ニ香薷白扁
豆ヲ加○虚スル者ニ人參ヲ加○内熱アル
ニ黄連ヲ加○口渴ニ烏梅ヲ加○吐逆
不止ニ藿香ヲ加○浮不止ニ升麻ヲ加
○吐不止ニ砂仁ニ童便ニ拌炒一三四
次ニ末トシ丁香藿香各ニ細ニ
粉ニシテ毎服一匙ツ、生姜湯ニテ用ユ○吐乳
乳ヲア本香蛇蚶共ニ研テ米湯ニテ調ヘ
服スヘシ即安シ

小兒泄瀉 山藥 半生 半炒 細末ニ砂糖水ニ
テ調服ス即愈

二痢病奇方 鷄子一個湯ニテ二三沸煮
テ殼ヲ破白ヲ去テ黄ヲ取研テ生姜汁
ニ和勻ヘ小兒ニ與ヘ服スヘシ茶ヲ飲フアルヘ
カラス其效如神

小兒浮痢肚疼 宿砂 川椒 各五分 炒テ研
生姜汁少許ニ和唾津ニテ丸ニ臍ノ内ニ安
外ニ膏藥ヲ蓋ニ貼ヘシ

小兒瘧疾 小兒ノ瘧ハ大約食積ノ痰
飲ヲ以テ治スヘシ 檳榔子 草菓 半夏
貝母 柴胡 黃芩 各等分 甘草少 水煎シ
服ス○陰瘧至晚即棄月ヲ累テ不已ニ
ハ人參 白芍藥 炒 川芎 柴胡 各一甘草

紅花 各三分 水煎シ服ス即愈

小兒尿血 滑石 六分 甘草一分 細末ニ甘
州ノ煎湯ニテ服ス一方ニ升麻 三分 加ヘテ
同煎ス更效アリ

小便不通者 木通 茄兒蒂 煎服シテ
立トコロニ通ス

外腎腫大

木通 五分

甘州 三分

黃連 四分

當歸 六分

黃芩 七分

水一碗入五分煎之

空心二服ス

遺尿

紅紙ニテ馬ヲ四匹剪コレヲ小兒ノ

穴腹下ニ安ヘシ毎夜如此ニノ自止

脫毒表瘡

小兒陰囊ニ瘡ヲ生シ潰爛

テ皮脫テ欲墮ヲ云也此濕熱ノ致ス

コロナリ紫菀葉ヲ細末シ瘡濕ニハ上

ニ糝乾ハ清油ニテ調テ傳ヘシ又墻上ノ

蝸牛殼白者碾末メツクルモ效アリ

小兒卒死吐利不解何病 狗屎一丸汁

ヲ絞テ灌之濕ナキ者ハ乾者ヲ水ニ煮

テ汁ヲ取ヘシ

○又方 葱ヒトキニ下部ト鼻中へ納ヘシ之処

小兒喉中痰壅喘甚

巴豆一粒搗爛之

一丸トシ綿ニ包シ男ハ左女ハ右ノ鼻中

ヲ塞クヘシ痰即墮下ル

白禿瘡

松脂研細ニシ一尺餘ノ青布

ニ裏線ニテ縫蠟燭ノ形ノ如シノ香油ノ

燈ノ上ニテ燒其滴ノ下ル油ヲ器ニ取テ

白禿ニ搽ツケヘシ即愈

○痘疹

痘瘡不快

絲氏枯タル者ヲ黑燒ニシ

辰砂少許加ヘ研末シ蜜水ニ調ヘ服ス

甚妙ナリ

癩瘡時作深

白朮 土炒一分

人參 五分

山藥

焙蓮肉 各一分 茯苓 各一分 宿砂 五分 藿香 五分

木香 三分 肉桂 五分 蒼朮 三分 肉豆蔻 麩包

訶子 三分 右細末シ飯湯ニ調一ニ服ス

治痘瘡不起 荔枝殼共二ツ搗攪

共二ツ搗碎キ煎服ス ○又方 紫草茸四五分砂鍋ニテ煎服

スレハ痘即起脹也再ヒ人參三四分ヲ加ヘ

テ更ニ炒ナリ 痘陷不起 其色黒ク氣欲絶者ニハ

穿山甲洗淨ノ黃色ニ炒末トシ紫葳

ノ煎湯ニ酒少シ加ヘ右ノ藥末五分ツ、

調服ス 倒陷色黒唇冰冷 狗蠅七ツ狗ノ身上夏ハ

カクルケヌキヲ焙乾シ末トシ酒ニテ服ス冬ハ耳中ニ

移シテ即紅潤出ツ 痘疹濕爛不結痂 菜豆粉ヲ敷クヘシ

○痘ノ後頭上ヲ破アスシ痂ヲ結サルニハ黑豆ヲ

炒細末シ香油ニテ解ツクヘシ 痘後頭面抓破膿水淋漓 屋草羊夕

ニキ枯爛タル者ヲ炙乾シ末トメフリカク

ヘシ痘後膿不收者ニモ可用内ニハ保元

湯ヲ服スヘシ 人參一匁 黃芪二匁 甘草五分

生姜入水一椀半ヲ五六分ニ煎シ時ニ不

痘後餘毒

初発紅腫ニ赤豆アツキ菜豆フシトマヲ

好醋ニ浸シ爛シ搗テ汁ヲ取鳥ノ羽ニテ常

ニ患処ヲ刷ヘシ自消ス凡疔瘡瘡ノ後ニハ

豆腐腥魚肥肉ヲ忌ヘシ食之脾氣ヲ泄

シテ後ニ必ス多病ヲ生ス

痘毒出膿之後脾胃虛弱膿清不斂

人參 黃芪 白朮各一匁 甘草三分 姜一片

寒ニツ水ニ碗入八分ニ煎シ食ヨリ遠ク

痘瘡入目

凡痘初テ起ル時膜脂ヲ

眼眶ニ揩スルヘシ痘目ニ入ルコトナシ

○又痘初テ出ル時牛旁子ヲ其母カミ

クタキ見ノ顛門ニツクヘシ痘不入自障防

妙法ナリ

○痘瘡入目ニハ黑狗ノ耳ノ上ノ血ヲ取リ

滴眼ノ内ニ入ヘシ即除ク

○一方 蟬蛻洗淨ノ白菊花各等分ニ

研テ為散藥一度ニニム白湯ニ蜜一匙入

テ食ヨリ遠ク服ス一日ニ兩度用ユヘシ此方

或ハ病後ニ障翳ヲ生スル者ニモ用效

○又方 兔糞焙乾シ或ハ散藥又ハ丸ノ

モ茶ホノウハズニニテ用ユ

痘後痘眼

菊花 蛤粉 兔糞 草決

眼 穀精炒

各一 蟬蛻 胡足ヲ去 右細末シテ

雞肝一具 者 不洗水 竹刀ニテ開キ藥末一ム

ヲ入箸ニテ裏蒸熟ノ食之

折傷諸症

打身 金瘡 湯火傷 竹刺

跌打損傷

氣絶不能言急ニ韭汁ヲ

童便ニ和テ一盞服ス

渾身打傷

小麥葉 薤菖葉 青松毛

各一大把共ニ搗爛シ打タル上ニ攤ヘシ皮ヤ

フシタルニモ肉ニ貼其上ヲ被ニ裏テ酒ヲ醉

ホトニ飲睡醒レハ即愈

○同傷處瀰大ニ血出テ不止麩ヲ上ニ

敷風ニアタルナカレ七日ニノ愈或ハ麩ヲ

姜汁ニ和傷處ニ貼ヘシ亦能止血疼ヲ去

○跌打遍身腫疼拘頭骨ヲ灰ニ燒陳

香糟ト同ク和疼處ニ貼ヘシ

○同青腫ニ豆腐ヲ指ノ厚ニ切片錫ニテ

灸熱腫如ニ貼冷レハ又易ヘシ面ヲ打青
腫ニモ敷次貼レハ舊ノ如クニナル

打頭腦破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻ヘ
厚ク付ヘシ立トコロニ敷アリ

肩破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻テ厚
付再ニ蟹ヲ瓦上ニテ灰ニ燒研末シ酒ニ

テ服シ碎テ睡ル其骨自入ロテ止アリ
○又方 白茯苓炒テ末トシ毎服一合熱

酒ニテ調服シ破ヲ蓋汗ヲ出セハ愈
從高墮下瘀血沖心欲死 倉卒ニ無藥

口ヲ開テ熱小便ヲ灌クヘシ
○同瘀血積痛難忍 當歸尾 五錢 大黃

酒ニテ煎シ酒ニテ煎シ鷄鳴ノ時服ノ
至曉瘀血ヲ下シテ即愈

好酒ニテ服スルノ日ニ二次即愈
延胡索末ヲニ入

金瘡 急ニ已カ小便ヲ淋ニ淋ヘシ口渴
水ヲ飲ヘカラス但肥臍タル物ヲ食ニ渴

ヲ止ヘシ若薄粥ヲ食スレハ血沸出テ必ス
死ス慎テ勿犯之傳藥ニハ花葉石ヲ研末

シ敷或ハ荔枝核ヲ細末シ敷ヘシ或ハ竜眼
肉核殼ニ燒テ細末シ敷ヘシ皆效アリ

○若血出ル多ク寒熱シ口渴ハ補中益
氣湯ニ麥門冬五味子ヲ加ヘテ姜枣入

水煎シ空心ニ服スヘシ
金瘡磕損折傷 血出テ疼痛不止葱白

砂糖等分ニ研和テ傳ヘシ痛止トコロニ
止リ更ニ敷

○生半夏研テ細末シ血ヲ帶テ上ニシクヘ
シ立処ニ終ヲ止且結痂ノ口ヲ収メ生肌

○止血方 石灰凡化 大黃切片 鎬四兩ノ内ニテ
共ニ炒桃花色ニ成ヲ取テ研末ニ細篩
收藏置テ金瘡折傷ニ敷ヘシ即時ニ止血
妙ナリ

箭鏃傷

海蝶蛸ヲ研末シ付ヘシ血オノ

ツカラ凝テ愈

○毒箭ニ遇タルハ終ニ皮肉ヲ傷トイヘ
便膿沸爛テ死ス急ニ人尿汁ヲ飲又傷
ノ処ニ塗ヘシ救命ヲ急臭穢ヲ嫌ナカ

杖傷

杖ニ打レテ後童便一碗ヲ飲ヘシ

血攻心一ヲ免ル熱豆腐ヲ打レタルトコロニ
鋪テ其乳蒸カ如クニシ其豆腐紫色色ニ
ナル時ニ取易々スヘシ紫色散シテ淡紅色
ナルトキ止ルナリ

○ソヨク打レテ晝夜無眠種々ノ症出ルニ

木耳四兩砂鍋ニテ炒焦存性細末シ一
ニ五錢ツ好酒ニテ服ノ後少時坐スヘシ藥
カ杖瘡ノ上ニ至レハ肉裏ヨリ外ニ透リ針
ニテ刺如ク瘡ニ甚シク不時血水流ル也
上ニ膏ヲ貼レハ次日自消ス

○杖瘡腫痛ニ雄黃二分 蜜陀僧一分 研
テ細ニシ水ニ調テ敷ヘシ極テ妙也

○又大黃末ヲ醋ニ調テ敷ク或ハ童便ニ
調テ敷ヘシ

○又方杖ニ打レテ後毎日白芨末ヲ米飲
ニテ下スヘシ神效アリ如潰爛ニハ乳香ヲ
香油ニ煎シ瘡ノ口ニ塗ヘシ

湯火傷

冷水ニ浸スヘカラス即時痛ス

トイヘ後ニ必ス爛テ骨ニ至リ難愈先
去妙飲ヲ服スヘシ 天花粉 玄參各二

陳皮 桔梗 山梔子 各一各五分 淡竹葉 二十片
水煎服ス如急ニ藥ヲ求メカタキ時ハ蘿
蔔絞汁ニ碗ヲ服ス或ハ童便ヲ服メ其
心ヲ護^{モリ}火毒内ヲ攻^ズル^ヲアタハサ^ラシム外ニ
ハ大黃末ヲ桐油ニ調ヘ付ヘシ即危者七
此方ヲ用レハ皆愈^ス恙

湯火傷皮紅未破爛者 大寒ノ藥ヲ
付ル^ヲヲ忌^ム酒ヲ以テ洗^ヒ其熱ヲ捺^トキ
ハ毒外ニ出テ不爛^ス

同爛去肌肉或見骨者 百中霜 ニ及輕
粉 一各五分 共ニ末トシ香油ニ調テ塗ヘシ

○又金箔ヲ貼テ其上ニ桐油ヲ塗ヘシ
金箔ハムラナク
厚ク貼ヘシ

○又方青黛ヲ敷ヘシ或ハ白芨末ヲ香油
ニテ付ル或ハ天薤皮晒乾シ細末レ香油
ニテ敷或ハ地榆滑石 各一 研細末ニ敷ヘ
シ皆能止痛無痕

湯火傷毒入裏 或ハ冷水ニ浸シ火毒
内ヲ攻煩燥之内熱口乾大便秘結ス
ルニ連翹 赤芍藥 羌活 防風 當歸
山梔子 甘州 各一 大黃 炒ニ 水ニ碗燈心
二十根入八分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス

畏被鳥銜所傷 蜂蜜八兩煎シ燒酒
上^ニ入量ニ隨テ熱服シ汗ヲ取テ安卧
ス次日鐵子自被ノ上ニ粘ス

火藥沖眼瞎 即地ニ卧テ人ノ熱キ小
便ヲ眼ニ澆ハ痛即止徐ニ已カ小便ニ
テ常ニ洗ハ明ニナルナリ

○火藥ニテ傷爛ニ蜂殼 鹽糶中者
煨テ研 茶ノ
葉ト同ク搗爛ニ搽ヘシ

人口咬傷

生栗ヲ搗テ付ヘシ毎日一

換痛ヲ止紅ヲ消ス

抓破面皮

輕粉ヲ生姜汁ニテ調付

ヘシ無_レ痕愈

竹木刺入肉不出

鹿角ヲ燒末トノ水

ニ調付ヘシ立処ニ出

久者モ一タラ
不_レ過出

○又方 栗子生ニテ嚼敷ヘシ即出

○又象牙刮テ水ニ調敷ヘシ

○破傷風

破傷風

皮肉損傷後外風邪ヲ受

襲テ経絡ニ入漸傳テ裏ニ入其患寒

熱交作口噤咬牙之角_ノ口ニ沫ヲ吐ク

陰ニ入トキハ身涼ク自汗_ノ傷_ル及テ平

二陷如_レ故者其毒即内ニ收ルナリ萬_レ靈

丹ヲ用テ汗ヲ發シ風邪ヲ外ヘ出サレメ

次ニ玉真散ヲ用テ貼之膿ヲ出シテ毒

殺如汗ノ後前症不退傷_ル如不高漸醒

漸昏時ニ發シ時ニ止口噤不用語多

不出者ハ終ニ死ス

○萬靈丹 蒼朮_ハ全蝎 石斛

天麻 當歸 甘竹_ハ川芎 荆芥

細辛 防風 麻黃 川烏頭_{湯炮} 草烏

頭_{湯炮去} 何首烏_{各一} 雄黃_{六分} 右細末

煉蜜ニテ丸シ或ハ一兩ヲ分テ四丸トシ或

ハ一兩ヲ分テ六丸トシ或ハ一兩ヲ分テ

九丸トス右三等ニコシラユルハ病人ノ老

ト壯ト又病ノ緩ト急ナルトニ用ユルタメ

ナリ辰砂ヲ衣トシ磁罐ニ收貯用ユル

時ハ葱白鬚トモニ九莖煎湯ニシ茶

碗ニ一ツニテ右ノ丸藥一粒ヲ口ニ含化シ

熱服之被^フ蓋^フ汗^ヲ出^メ愈^ス如^シ服^ノ後^ハ汗^ヲ出^ル遲^クハ再^ヒ葱^湯ヲ用^テ催^スヘシ汗^必ス淋^カ如^シ少^頃ニ被^テ去^レハ汗^自飲^ル
此方凡^レ一切腫毒風氣瘰癧スヘキ者ハ皆可服^之如^シ諸病表^症ノ相^兼ル^ル者^ハ只^一熱^酒ニテ服^シ後^ハ風^ヲ避^テ稀^粥ヲ食^スベシ冷^{タル}物^ハ忌^ムル^事也^此茶^乃婦^ハ服^スル^事也

○玉真散 南星 防風 白芷 天麻

羌活 白附子 各等分 研細末^シ傷^處敷^ヘシ

此藥打傷欲死心頭微温ナル者ニ熱酒童便ニテニ及^ル口ニ灌^下シニ服^テ可^レ回^生如^シ破^傷風^ニテ牙^ヲク^ロツ^メ腰^背日^及張^是キ^トキ^ハ咬^テ舌^ヲ縮^ルニ右^ノ散^茶三^分童^便ニテ服^スヘシ内^ニ癩^血アリ^トイ^ハル^亦ハ患^者犬^ニ咬^レタル^ハ急^ニ水^ニテ^口ヲス^キ吐^出シ^且水^ニテ^洗淨^ス此^藥ヲ喫^{タル}ト^コロ^スリ^ヌル^ハ效^{アリ}

○一方 蕪木末^ヲ酒^ニテ^ニ及^服ス^{ヘシ}又^蓮房^灰ニ^燒研^細ニ^テ敷^之再^ヒ酒^ニテ^服ス^比皆^效アリ

○又方 蟬蛻四兩^灰ニ^燒存^性魚^灰酒^ニテ^服シ^蓋被^出汗^愈
フイ^スス^ニテ^服ス^クキ^サケ

○中毒 并虫獸傷

解諸毒 腹中不快^覺ハ生^豆ヲ^合嚼^テ

テ腥^氣ナ^キハ^此中^毒ナ^リ急^ニ升^麻一^味濃^煎之^連飲^手ニ^テ喉^ヲ探^リ吐^逆ス^レハ^即愈

服藥過多^生出^毒病^頭腫^如斗^唇裂

流血^或ハ^心中^飽悶^之或^ハ脇^腹痛^者ニ^ハ黑豆^小者^各五^合煮^テ濃^汁ヲ^服シ^其豆^ヲ食^スヘ^シ即^愈

○百藥ノ毒ヲ解^ニハ^甘竹^煎湯^ヲ飲^{ヘシ}

解附子^川烏^頭斑^猫等^毒 黑^小豆^ヲ煮^{タル}汁^ヲ飲^{ヘシ}

解砒霜^毒 凡^レ此^毒ニ^中ル^者ハ^煩燥^如

狂^心腹^痛頭^眩吐^セント^ノ吐^セ入^面色^青黑^四肢^逆冷^シ命^在須^臾急^ニ甘^竹湯^ヲ

飲へし或ハ菘豆湯或ハ冷水数碗ヲ飲へ
之或ハ夏枯州ヲ濃煎シ飲或ハ鷄子ヲ
五六打碎和勻テ灌下ス總テ吐逆ノ毒
ヲ解シツルヲ度トス醒テ後不言者ハ
毎日常菜豆水ヲ飲ヘシ毒盡テ自愈

解巴豆毒

芭蕉根葉ヲ搗汁ヲ取テ

飲之或ハ黃連一匁煎服ス或ハ冷水ヲ
ノムヘシ

鹽滷毒

豆腐漿ヲ口ニ灌下ス如無之

時ハ黃豆ヲ水ニ浸シ浸シ搗爛ノ灌下ス

酒毒至死

黑大豆二升煎シ汁ヲ飲ハ

愈○燒酒ノ毒ニハ鍋蓋ノ上ノ氣水ヲ羊蓋
灌クヘシ即醒

野菌毒

滑石 六匁 甘草 一匁 研末ニ毎

服ニ水調ヘ服ス效アリ

解菓毒

麝香一分煎湯ニノ服ス

河豚魚毒

香油一碗灌之吐出ノ愈或ハ

蘆根ヲ煎服ス

解蟹毒

藕根ヲ搗汁ヲ服ス或ハ冬瓜ノ

汁或ハ紫蘇汁ヲ服ノ解ス

諸骨哽喉

白飴ヲ棗ノ大サニシ

飲ヘシ立処ニ下ル或ハ鹿角ヲ剉ミ津ニ含ミ
燻之如七日ヲ經テ不出ニハ鯉魚鱗皮ヲ

燒テ水ニテ服スヘシ

○悞テ吞鉄物粟ヲ燒炭ニシ紅ヲ其ニ
一研テ粉ニシ砂糖ニ調ヘテ二三匁服スヘシ
立トコロニ愈

稻芒入喉

白飴糖ヲ食スヘシ妙ナリ

○麥芒入目大麥ヲ煮タル汁ヲ以テ目
ヲ洗ヘシ即出

狗咬

百州霜 山野人家者用 香油二調之
へ之或ハホロ仁ヲ嚼テツクへ之或ハ牛糞蚯蚓屎
ヲ敷へ之皆能救急

馬咬及踏傷

傷處ニ灸ノ人糞馬糞氣
糞此内何ニテモ一味ヲ燒細末シ猪脂ニ和
テ敷へ之内ニハ獲木湯ヲ一碗服ニテ即
止痛

蛇咬

針ニテ傷處ヲ刺血ヲ出シ雄黃
五ノ五五亞脂一兩共ニ為末ト毎服ニ好
酒ニテ服之傷處ニモ敷之瘡口ヲ留
出スへ之燥ハ油ヲ塗兩頭ヲ縛毒氣ヲ内
ニ攻入一ヲ防クへ之

蜈蚣咬

吳茱萸搗爛之付へ之或ハ
頭垢ヲ搔テ掩之

蜂螫

小便ニテ洗拭乾之香油ヲ塗へ
之或ハ温湯ニ漬之教易

○諸瘡毒

鐵箍散

一切腫毒初テ起ルニ圍之即散
已ニ成ニ圍之毒氣攻走ルニ不至無膿圍
之有膿イニ夕潰サルニ圍之即潰已ニ潰ルニ
圍之膿ヲ追出ス 荷葉 九月九日三取 薑黃
白欽 五倍子 白芨 各五 大黃 二兩 蠟殼 五
陳小粉 兩 右細末之醋ヲ温メ方々調テ
腫物ヲ圍貼ル

○又方 貝母 南星 各七 連翹 五倍子

荷葉 經霜者 共ニ末シ水ニ調テ腫處ニ敷
中ニ孔ヲ留テ毒氣ヲ出ス效アリ

治癰疽方

一切癰疽諸毒母膿已ニ成テ
不穿破者ニ黃芪 四 穿山甲 研末 川
芎 三 嵩田飯 二 皂角刺 一 水ニ碗入一

碗二煎之隨病前後服入酒一杯入テ服ス
レハ毒即出

疔瘡 煩燥之作渴惡毒攻心ニハ 清

散二兩四者ニハ 雄黃五々 麝香サ許 蒼耳

燧名アツリ檀ニ 右細末シニ々ツ、蜜水ニテ調下ス心ヲ

護ルヘシ

○疔瘡ニ針ヲ刺テ後餘毒走散シ腫ヲ

ナスニハ 鬱金蟬肝 白芨 白蔞 大黃

白芷各四 黃柏二兩 輕粉五々 菴豆粉一兩

共ニ末トシ醋ニ調テ腫ノ四邊ヲ圍ヘシ夏

月熱甚時ハ蜜水ニ調テ貼ル

嘴唇上疔瘡 而ノ腿腕ノ中紫黑筋ア

ルヲ針ニテ刺惡血ヲ出セハ之処ニ消ス

疔瘡初起 白芷一々 生姜一兩 共ニ搗テ

温酒一盞ニテ服シ汗ヲ取テ即散ス

○疔腫欲死菊花一握汁ヲ搗テ一升入

口即洗冬ハ根ヲ采テ用ユ神驗ノ方也

火珠瘡 其瘡珠ノ如ク始ハ髮ノ中ニ發

シ相染テ不已亦命ヲ傷者アリ生薑ナニタイコン

ヲ搗爛シ滴ヲ取テ醋ニ浸シ患處ニ貼

ヘシ即愈

金絲瘡 形線ノ如ク大小不一上下心一

至レハ即死ス治法ハ瘡ノ頭ヲ截住針ヲ

刺テ血ヲ出シ浮萍ソキクサヲ嚼テ塗ヘシ即愈

疥瘡 今俗ニ云ヒヤシ 大風子油五々 水銀

樟腦 油核桃 輕粉 各一 川椒五分 共ニ

研テ搗ヌルヘシ自愈

○又方 鷄子五六者テ黃ヲ取炒テ油

ヲ出シ此油ニテ栝椰子一ツ硫黃少 研

末ニタルヲ調ヘ毎日三四次擦ヌルヘシ十日

ヲ不_レ過_レニテ愈

○又方 松香一兩 雄黄一兩 共ニ細末シ紙ニ捲テ條子トシ菜油ニ一夜浸シ取出シ倒ニノ燒之滴下油ヲ瘡ニ塗ヘ之即愈

腫瘡

俗ニ云ハバ 杏仁皮実ヲ去テ紙ニ包テ 輕粉五

共ニ和勻猪脂ニテ子リ先黄栢ヲ水ニ浸シテ瘡ヲ洗ヒ拭乾ノ此藥ヲ敷箱ニ包ヘ之投日ニノ自愈

癬瘡

俗ニ云クモシ也 癬ハセニガサ ト云風癬乾今ハハ多クカサト云フ 斑猫ヲ糯米

ト同ク炒米ヲ去テ斑猫ヲ研末シ煉蜜ニテ解テ付ヘシ黄水出ルヲ拭去ニ四次ニノ愈

○又方

頭上身上ニ風癬出テ癢ク抓破

テ疼ヲ作時ニ愈時ニ癢ニハ 巴豆殼 二分

明礬一分 研末シ生薑ヲ切片其藥ヲツケテ痒トキ上ニ擦ツケヘシニ三次ニノ愈

○又方 芦薈一兩 甘草多 研末シ先湯

ニテ瘡ヲ洗ヒ拭乾ノ此藥ヲ付ヘシ

楊梅瘡

牛黄如上身ニ在ハ五分 丁香二分

天竺黄三分 羚羊角一分 木蓮蓬十個 黄麻

花一分 苜蓿花二分 生地黄兩 皂角刺一兩

奇良四兩 以上細末シ煉蜜ニテ桐子大ニ丸シ

毎日清晨ニ白湯ニテ四五十九服ス

○同法テ輕粉ヲ服シ遍身疼痛及爛

破者ニ土茯苓三斤 爛起ヲ去淨細末ヲ取用 乳香 沒藥

各二 川椒一兩 牛黄一分 白蜜

一介十兩藥ヲ和勻一 槍一 千餘下ニノ麻油ヲ

手ニ擦テ丸トス大彈子ノ如シ毎日清晨ニ

四粒服シ晚ニ三粒服ス土茯苓一 濃煎シ

タル湯ニテ用ユ藥一劑ヲ用盡セハ立トコロニ愈ニ永ク無癢セス凡姜諸腥物ヲ食スルヲ

止へし

下疳瘡

洗藥方 荆芥 黃柏 馬鞭

仲 甘州 葱 右煎湯ニテ洗之 訶子ヲ

灰ニ燒テ麝香少シ入洗タル跡ニ糝アキラカへシ

便毒

大黃 二兩 五靈脂 四分 穿山甲 四分

白芷 四分 乳香 沒藥 各五分 共ニ為末每服

六分空心ニ好酒ニテ送下ス

陰頭生瘡

白蜜ニテ甘州ノ末ヲ調塗へシ

并一諸惡瘡ヲ愈ハシス
又白蜜ハカリヲ用ルモ效アリ

努肉

瘡癬諸毒新ニ愈チ努肉脹出ル

ニ烏梅肉搗爛シ蜜少入紙ニ攤貼之惡

肉即収リテ永無後患

熱癬

菊花根搗テ汁ヲ取魚ノ火酒

ヲ調へ服ス上身ニアルニハ空心 服ス下身

諸瘡不收口

白檀花黑燒ニソフリカケヘシ

瘡ノ口碗ノ大サノ如キモノモ神效アリ

癩癧

并 馬刀瘡已ニ潰ルニモ未潰ニモ或

ハ日久シク不愈者ニ夏枯州六兩水ニ碗入

七分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス虚甚シキ者

ハ濃煎シ膏ノ如クニテ服シ腫処ニモ塗之

へシ多ク服ノ益善兼テ十全大補湯ニ

香附子貝母遠志ヲ加ヘテ煎服シ效アリ

同傳藥

白玉簪花ノ葉ノ嫩ヲ取テ醋

ニ一夜浸シ飯鍋ノ上ニテ蒸爛シスリテ膏

藥ノ如クニ患処ニ貼へシ即愈

手指天蛇毒

白粉 陳者 雄黃末 一匁

搗爛シテ貼へシ

○又方 蜈蚣 一條 雄黃 三分 研末ノ鷄足虫

清ニテ調へ患処ニ付へシ即愈按此方俗ニ

云指べウソニ用テ效アリ

黒子疝目 續隨子熟スル時塗之自落

肺癰 口ニ臭キ膿ヲ吐ハ即肺碎テ難

治者服之神效アリ 第一四劑服スル方

薏苡仁 絲瓜 大甘竹俱ニ 牡丹皮 赤芍

藥 貝母 桔梗 瓜蒌仁 陳皮 升麻俱ニ

生姜一片束二個水二碗入八分煎之食

後ニ温尿ス如大便不通加麻仁始メニ此

方ヲ四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第二

服スル方 赤芍藥 天花粉 甘竹 瓜

蒌仁 桔梗 知母 貝母 百合 獨活

杏仁 連翹各等分 水二碗燈心十根 白果去殼七

個 八分煎之食後ニ温服ス此方ヲ

四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第三服ス

ル方 貝母 獨活 百合 甘竹 桔梗 麥

門冬 赤芍藥 知母 天花粉 瓜蒌仁

各等分 燈心十根 白果去殼七 水二碗入八分煎

之食後ニ温服ス此方四劑用テ即愈

後白養紅苜蓿葡萄鴨蛋身ヲ終ルニテ食

ヘカラス若食之再発ノ不治

○又方 白花百合洗淨搗テ汁ヲ取毎

日一碗時ニ不拘服ス七日ニシテ愈

肺痿 肺癰ハ先風寒ニ感シ受ルニ因

テイニタ癸シ越ルヲ經ス肺中ニ停リ示

七情饑飽勞役ニ因テ脾肺ヲ損ノ生ス

ル者アリ其症初ハ毛聳テ惡風咳嗽声

重ク胸痛頂強轉スルノ不能其候ナリ

久之キトキハ飲食減少之咳嗽傷ニ至

リ痰血ヲ吐寒熱往來ニ膿ヲ咯声不出

咽痛其候轉ノ肺痿トナル如此者ハ百死

一生ノ病也 大ナル瓜蒌一個 孔ヲ彫内ノ子
ノ殺ホト杏仁去皮ヲ入孔ヲ封シ黄泥ニテ
包シ煨テ烟ノ止時ニ取出メ冷シ土ヲ去又
杏仁ノ殺ホト貝母ヲ加ヘ共ニ研テ細末シ
蜜ニテ調ヘ卧時ニ吞ツ燈心湯ニテ服ス
腸癰 小腹堅ク掌ノ如ク熱シ按之痛
肉色ハ故ノコトニ或ハ嫩赤ク微腫モアリ
小便頻ニシダク汗出憎寒脈緊實ニ
ノ有力服此神效アリ 大黄炒 朴硝炒
牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖 水二碗入八
分ニ煎シ食前或ハ空心ニ温服ス
○又方 明礬四兩 肥皂十五個燈 雄黃一兩
右性 共ニ為末空心ニ金銀花五錢
酒ニテ煎シ此酒ニテ三々ツ服ス有膿
大便ヨリ出無膿即消シテ不也

○其脉洪救者ハ有膿可下其脉
緊ナル者ハイニ夕膿アラス不可下

肚内無名腫毒 鼈甲ヲ煨テ存性為末
酒ニテ服スヘシ

○餘方補遺

早起辟穢方 凡人蚤起テ或ハ冷煖不
時或ハ油膩ヲ食シ或ハ穢氣ヲ聞多ク
嘔吐シ腹痛浮泄等ノ症アリ用此方ニ
之 蒼朮未泔水三度ス一宿 白朮壁土拌 陳皮
厚朴姜炒各三四 甘草 白茯苓炒去 丹參各一兩
右細末シ蜜ニテ竜眼肉ノ大サニ丸シ口ニ
嚙化服ス或ハ淡薑湯ニテ服スヘシ感冒
風邪寒暑者瘧疾並ニ皆治之

許真君七寶如意仙丹 服之百疾悉瘳

川烏頭泡去皮尖 黃連去苦 人參去芦 茯苓

去乾姜慢火三テ 桔梗去芦 肉桂去粗皮 石菖蒲日三燉

蒲洗淨 厚朴去皮 吳茱萸去核 柴胡去根

紫花洗淨 川椒去子炒 皂角去皮 當歸洗淨

木香去皮 大附子一個童便泡 巴豆去殼紙色壓

以上十八味各一兩外二枚椰子一兩去油加土地土

選清淨二五月五日午時或八月七日庚申

甲子福生日天德日等ノ吉日ヲ頌擇雞

犬ノ舌ヲ不聞處ヲ丹ヲ煉室トス人事ヲ屏

除テ先許真君ノ神位ヲ奉安置供物ヲ

臭ヘ拜テ合藥救入ノ旨ヲ陳ノ如法

炮製共三極細末トシ桐ノ中ニ入杵

三千ハカリヲ煉蜜或ハ麩糊ニテ梧桐子

大サニ丸トシ上好ノ辰砂ヲ衣トシ際ノ收貯ヘ

病人ニ遇ハ症ニ隨テ五更ノ時服スヘシ立

効ニ效アリ葶藶物生カノ物ヲ一日忌ム

へシ用藥法○瘟疫熱病ニ三井水ニテ用ユ

傷寒傷風ニ三薄苛湯ニテ下ス○陰症

傷寒ニ九生姜湯ニテ下ス○鬼祟邪氣ニ六

丸○嵐瘴不服水上傳尸癘症五疳疔疔

六丸○頭狂ニ五已上俱ニ寒ノ煎湯ニテ

下ス○大麻風成塊遍身麻木面虫ノ行カ

如ク或ハ口眼歪斜眉脫肉爛左癱右痿

偏正頭風ニ七○鶴膝風紫白ノ癩風

痰風癰二俱ニ荆芥ヲ煎之タル酒ニテ

下ス○誤テ毒藥ヲ吞タルニ酒○消渴池

浮ニ○刺疾大小便閉ニ七○酒毒ニ三

喉閉ニ七○腮腫丹瘤癰疽疔瘰癧

二八已上俱ニ温酒ニテ下ス○赤痢ニ八

黃連煎湯ニテ下ス○白痢ニ八甘竹煎湯

ニテ下ス○食積心腹膨脹心氣疼痛ニ七

○喘息咳嗽二九俱二九生姜湯二テ下ス
 ○及胃吐食二六五九五九華澄茄湯二テ下ス○
 腸中氣塊二九煨二九シタル生姜湯二テ下ス○
 腹中成塊痛二九不止二九七九七九皂角煎酒二テ下ス○
 下ス○ツカハ積二八五九五九莪朮生姜煎湯二テ下ス○
 腰背痛二八五九五九鹽湯二テ下ス○十種
 水氣二八九茯苓湯二テ下ス○コトク黃疸二九
 茵陳湯二テ下ス○ツコリ瘧疾二八三九三九桃枝湯二テ下ス○
 下ス○ツコリ瘧疾二八三九三九桃枝湯二テ下ス○
 五淋二九燈心煎湯二テ下ス○ツコリ虫積二八三九三九
 史君子湯二テ下ス○ツコリ腸風臟毒二九下血二九
 陳米湯二テ下ス○ツコリ心氣腫痛二八三九三九薤菖
 子ヲ研二テ下ス○ツコリ婦人血山崩二八五九五九百世霜
 淡欒湯二テ下ス○ツコリ婦人血山崩二八五九五九百世霜
 酒二テ下ス○ツコリ血暈頭痛二八三九三九生姜湯

下ス○ツコリ血勞咳嗽二八三九三九荊芥湯二テ下ス
 ○血氣刺痛二八九牛膝湯二テ下ス○ツコリ月水
 不調二九子宮冷二九孕二九テ二九或二九突二九症二九
 五艾醋湯二テ下ス○ツコリ赤白帶二九下二九絲綿二九
 沃二九燒酒二テ下ス○ツコリ產後腹痛二九下血二九
 五阿膠酒二テ下ス○ツコリ死胎二七苧麻二九煎
 シタル酒二テ下ス○ツコリ鬼胎二八九紙二九鍾二九植二九
 二字二九書二九燒二九テ二九水二九入二九テ二九同二九ク二九吞二九下二九ス○ツコリ小兒
 急慢驚風二八九一歲二八九金銀花薄荷二九
 煎湯二テ下ス○ツコリ氣痛二八九一歲二八九生姜湯
 二テ下ス○ツコリ疳蟲二八九一歲二八九史君子湯二テ
 下ス○ツコリ睡涎咬牙二八九一歲二八九俱二九淡鹽湯二テ
 下ス二九九此藥二九備二九吞二九汁二九ノ湯二九急二九ニ用二九カ二九タ二九キ
 時二九ハ何二九モ白湯二テ送二九下二九スヘ二九シ二九孕二九婦二九ハ忌二九服
 幼孩二九此藥二九ヲ服二九スル二九ヲ不能二九者二九又常二九ノ人二九モ

病家へ出入スル者ハ絳紗囊ニ三粒入テ身
ニ佩ヘシ最ヨク邪氣ヲ除ク高人仕官ノ
人旅ニ行ニ携ヘ之ヘシ亦人ヲ濟ニ便アリ○
凡此藥一劑ヲ合シ千人ヲ濟總テ奇哉
沐浴シ慎テ修製スルハ沈疴奇恙トイ
ヘ凡起死回生ノ功アリ予因テ為好善
樂施者勸焉

七情交感丹

一切公私佛情名利二失
志抑鬱煩悩一七情ニ傷レシ飲食不
進面黃形羸胸痞悶疼痛スル等ノ
症ヲ治ス 香附子 一升長流水ニ浸ス
神 各細末シ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ丸
之清晨ニ一丸細嚼白湯ニテ下ス或ハ
陳皮湯モ可也

脫類

俗ニ云フトウイカケ
カ子ハツルナリ 此症腎肺ノ虚損元神

ノ不足ヨリ起ル或ハ高ク矣談倦ヲ忘シ
元氣接續スルヲ不能ニテ此患ヲ致ス也
先身ヲ平カニ正ク坐シ人ノ兩ノ手ニテ
下頰ヲ托住メ腦後ヨリ頂竅ヲ送リ上テ
絹一條ニテ頰ヲ頂上ヘ包括リ風ヲ避
テ急ニ煎藥ヲ服スヘシ不然風邪ヲ外
ニ受テ必ス痰涎壅盛シ口眼歪斜ニテ
風臟腑ニ中十二無一生活方

附子 炮皮臍ヲ去六分 白姜 蚕 當皈 各二人參
半夏 白朮 茯苓 各一五分 天麻 煨 陳皮 各二
甘草 三分 川芎 八分 燈心 根 生薑 三片 煎服

木癡成瘡

南方多雨地ニ有物木癡
ト云大概鼻涕ニ似タリ陰氣積テ古
木ノ上ニ生ス人氣ヲ聞ハ閃々トノ動ク人
其下ヲ過シハ其體ノ間ニ墮テ即成瘡久

之テ其肌ニ遍ク桑ス辰砂麝香ヲ塗ヘ
シ即愈

烏鬚里髮方 茄樹ニ茄子ヲ一ツ留孔ヲ

一ツ用上々ノ京墨ヲ内ニ入紙ニテ塞封シテ

樹ノ上ニ留茄ノ老タル時取テ黒燒ニシ水

ニテ調ヘ指ニ蘸ノ鬚髮ニ搽塗ヘシ即黒

クナナリ是ヲ糊椶溜樹方ト云ナリ

雀子斑 皂角 三棗 蜜陀僧 各二
泊

丁香 者 直 連翹 各三 白附子 白芷 白姜 蚕
各四 右細末シ先皂角ヲ以テ面ノ垢ヲ洗イ
去生蜜少許ニテ藥末ヲ調ヘ面ニ塗一夜
過シ早辰ニ洗去ヘシ

玉肌散 一切風濕雀斑白屑皮膚作痒
モノヲ治ス 菘菜豆 五合 滑石 白芷 白附子
各二 共ニ細末シ一度ニ三匙ホト湯ニテ調

早晚面洗テ塗ヘシ

呂祖一枝梅 男女大人小兒新久ノ諸病

生死定カタキ時此藥ヲ豆ノ大ホト印堂

ノ中ニ貼印堂トハ額ノ中ヲ云 線香一本ヲ炷間置テ

藥ヲ去後一時許ニノ藥ヲ貼タル處紅斑

色ニ暈ヲナシテ腫起リ散スコレヲ紅霞

棒日ト謂其病危シトイヘ凡不死如藥ヲ
貼處一時ノ後紅色ナク腫起ス皮肉常
ノ如ニノ不變者ハ白雲漫野ト謂其病
輕シトイヘ凡必ス死ス小兒急慢驚風一
切老少ノ痢病ニ貼之紅腫者ハ即愈
此方預生死ヲ知スト云フナシ

辰砂 三々 銀珠 一々五分光明 五靈脂 三々

麝香 三分 革麻子 五分 雄黃 巴豆 各五分

各研細ニノ端午ノ午ノ時靜ナル室ノ中ニテ

共二能研油燕脂ヲ加ヘ膏トナシ磁盒ニ
入收置女人ノ手ニ觸ルナカレ用ル時豆ノ
大一圓印堂ノ中ニ貼其功立処ニアラハ
ル用テ後其貼タル藥ヲ河ノ中ニ
送ルヘシ

此書明王夢蘭先生輯選而病論詳治法
明附以經驗神妙劑至難治病症發返魂
之術揭速効之方濟世之要軌未有如此
之深切者因請國手藤井先生以諺文和
解速黃楊登實與王氏外臺葛氏射後鼎
峙之祕錄神方也杏林橘井苟資此書以
治療施起死回生之功可隨手而得焉享

錦囊妙藥祕錄跋

夫祕者止取其驗之復
何取乎祕而世人始因
祕求驗。繼因驗及祕之。
醒菴蕙子文有茲編也。
即出而公世者最。不祕
焉。嘗自述是言。余細閱
之。見其探治疾之源。裁
試驗之方。可謂濟生之
功大矣。僭乎本邦不
遍行。於是余忘編陋。衆
而解之。綴以和語。遂為
自濟規格耳。題是書者。

如何。試、驗、切、一、要、秘、方、是、也。

明治十九年

五月十日購求之

伊澤 德

石頑道人

植科部 平九區
松代伊勢町
市川義市

諸家ノ秘書ヨリ効驗ノ方ヲエラミ出メ板行ス

小兒醫療手引草

全一冊

五疳、驚風、痘疹、其外諸病、極秘ノ秘方ヲアツク
脈ノ見様、治療ノイタレ方悉ク記ス

張氏医通本草

石頑道人 聯玉撰 全部五冊

是本州逢原也。茶品ヲ見ルニ便利ナラシメンタ目録
ヲイロハ分ニス并ニ近世物産家茶品ノ并茶店ニ
稱号茶ノ上品下品ノ名目和茶唐茶等今日茶ヲ
用ルニ茶店ニ於テ求ルニ則真偽好惡ヲ知リテ功驗
アル茶ヲ知リテ偽茶不能ノ茶ヲ求ガルタム要ク記ス

本草弁明

全部一冊

茶ノ能毒真偽等近年行ル國手古法家見識ノ
發明ノ說ニ糾シ校正シテコレヲノス

藥品手引草

いんげん 全部二冊

茶名異名和名漢名和茶唐茶ノ真偽等旭山
先生松岡先生其外物産ノ諸名家ニテテテ求
テコレヲ聞知シ是マデ知レカクキ茶名悉クモコレ
コレヲノス

明治十九年辰年録之

心齋橋南四丁目

大坂書肆

吉文字屋市兵衛

