


本草醫方合編

二

武 9
124
2



門 中武 9
編 124
卷 2

經 辛溫散風邪故諸風痺 醫方集解卷二

痛欬嗽上氣頭痛脊强者宜

治少陰頭 辛散浮熱故

痛獨活為使 鼻淵齒齩者

宜之 辛益肝胆故胆虛

驚癇風眼淚下者宜之水停

心下則腎燥細辛之辛能行

水氣以潤之 腎燥者心亦躁

也 和腎若燥燥燥 雖手少陰引

經心乃足少陰本藥 腎 能通

發表之劑 發者升之汗者散之也表

者對裡而言也三陽為表

三陰為裡而大陽為表之表陽明為

表之裡少陽為半表半裡也邪之傷

人先中于表以漸而入于裡始自太

陽以及陽明少陽乃入陰經由太陰

少陰以及厥陰六經乃盡也治病者

當及其在表而汗之散之使不至干

傳經入裡則病易已矣若表邪未盡

而遽下之則表邪乘虛入裡或誤補

之則內邪壅閉不出變成壞症者多

矣經曰善治者治皮手其次治肌膚

其次治筋脈其次治六府其次

麻黃湯 仲 治傷寒太陽症邪氣在表發熱

頭痛身痛腰痛骨節痛項背強惡寒惡

麻黃湯 景

一 土二



精氣利九竅故耳聾鼻窒

鼻寒不聞香臭也風寒入腦故氣不宜通寒宜表執宜情有愿肉者倒時便瀉者宜之為未吹鼻

散結溫經破瘀下乳行血發

干能發少陰之汗仰景沛少汗陰症反發熱麻黃附子細辛湯乃治利然味厚性烈不在裡之表劑

可過用不可過一錢多則氣不通悶絕而死雖死無傷可驗開平獄味極辛產

華陰者真杜衡宛耆垂徐棟去雙葉者用惡黃芪山茱萸

硝石滑石友菴

柴胡 苦平微寒味薄氣升為

陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之邪

心包三焦相火時珍曰行少陽黃芩為佐行厥陰黃連為佐

宣暢氣血散結調經婦科知柴胡能發表而不知柴胡最能和裡故勞桑血藥往往

用為足少陽經表藥胆為清無出無入其經在半表半裡注當和舒小柴胡湯之屬是也若病在大陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服

二百五十五

風但有一毫頭痛無汗而喘脈浮而緊

寒邪外屬陽不得越故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先表即足太陽寒水之經大陽為諸陽主氣乃一身絛維本經之脈起自背脊上腦下項循肩揆春抵腰行于身後故所遇之處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而始惡之故惡寒必熱惡風惡寒有陰陽之分惡風唯屬陽經故

三陰無惡風之症風為陽邪寒為陰邪也原病或曰身熱惡寒熱在表也熱在表而淺邪畏正故病熱而反惡寒或言為寒在表及按在皮膚寒在骨髓者誤也凡人之傷風暑濕皆有汗惟傷寒無汗不出寒能瀉血又表寒也氣上逆故喘邪在表故脈浮傷寒脈緊而傷風脈緩者寒動急而風緩散也喻嘉言曰冬傷寒春傷溫夏傷暑傷濕此四時正病也然夏秋亦有傷寒冬春亦有傷暑

傷濕乃四時之客病所託真氣也冬春正病有汗為傷風無汗為傷寒即夏秋濕無汗仍為傷寒亦治太傷陽明合清表邪壅盛陽氣不得宣發故逆而作喘若心下滿腹痛為宜下之此胸中滿胸中去表猶近非裡寒雖有陽明然與太陽合病為在表宜汗不宜下經曰陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯又曰陽明病應發汗反下之此為大逆或問兩經合病當用兩經之藥何以偏用麻黃湯耶蓋邪自太陽而來仍當提出太陽不欲其陷

亦治哮喘哮喘人陽明故不用葛根也

麻黃去節桂枝二兩杏仁七十枚甘草兩用先煮麻黃數沸去沫內諸藥煎熟

二百五十六

二百五十七

柴胡則重虛其治傷寒邪熱

表最宜詳慎

仲景有大小

柴胡等湯

厥熱結是虛勞

凡為寇宗頤曰柴胡本經並

用藥無一字治勞藥性論曰

華子皆言補勞傷醫家執而

用之即誤無窮時珍曰勞有

五若勞在肝阻心心包有熱

則柴胡乃手足厥陰少陽必

用之藥勞在脾胃有熱或陽

氣下陷則柴胡為升清退熱

必用之藥惟勞在肺腎者不

可用耳寇氏一槩攬斤殊非

通論昂按楊氏秦九扶壽湯

治肺痿成勞咳聲嗚休虛

自汗用柴胡為君則區土心

肺勞亦有有用之者矣

煩則多嘔吐諸瘧寒熱東

曰諸瘧以柴胡為君佐以月

經之藥李士材曰瘧非少陽

寒有熱益外邪伏于半表半

服藥取微汗中病即止不必盡劑無汗

再服凡用麻黃去節醋湯罌泡晒乾備

始干太陽故以發汗為先汗出則愈活

人云凡發汗病仍在者三日內可二

三汗之令隨以下周徧為度王海截曰

表症當汗脈浮急汗之脈沉緩汗之裡

症當下脈浮緩下之脈沉急下之三陽

汗當急而下當緩三陰汗當緩而下當

急後汗有大汗解表微汗解肌之

殊下有急下少與微和慘和之別

此是太陽藥也麻黃中空辛溫氣薄肺

家崇藥而走太陽能開腠散寒之所王

寒從此入桂枝辛溫能引營分之邪達

仍從此出桂枝辛溫能引營分之邪達

之肌表

管衛和始能作汗杏仁苦甘散

寒而降氣甘草其平發散而和中經曰

寒淫于內治以甘熱佐以苦辛是已

言曰麻黃發汗其力最猛故以桂枝監

之甘草和之用杏仁潤下以止咳逆正

如馭馬防其放逸耳李士材曰古云冬

不用麻黃夏不可桂枝益以冬主閉藏

不應疎泄夏合炎熱不宜辛溫經所謂

必先歲氣毋伐天和是也又云夏月不

用麻黃兩說相反何也或舍時從症或

舍症從時臨時變通存乎其人耳李時

珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用

桂枝未有究其精微者津液為汗汗即

血也在營則為血在衛則為汗寒傷營

營血內瀆不能外通于衛衛氣閉固津

液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛

氣外泄不能內護于營營氣虛弱津液

不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由

皮毛而入皮毛肺之合也証雖屬太陽

卷三

醫方集解表卷三麻黃湯

三

上二

加以剛劑氣血愈虧熱有在皮
 膚在藏府在骨髓在骨髓者
 非柴胡不可若得銀柴胡只
 須一服南方者力減故二服
 乃効也時珍曰觀此則得用
 葉之妙矣昂按據孫氏之
 說是柴胡亦頭眩目赤胸痞
 能退骨蒸也頭眩目赤胸痞
 筋痛凡筋痛多是肝木是有
 筋痛餘宜小柴胡湯加青皮
 川芎白芍又左脇痛宜活血
 行氣右脇痛宜消食行痰
 口苦耳聾皆肝即婦人熱入
 血室衝為血海即血室也男
 女皆有之柴胡在藏主
 血在經胎前產後俱熱小兒
 痘疹五疳癰熱散十二經瘡

痘血凝氣聚功同連翹連翹

執柴胡治氣陰虛火炎氣升執為少異

者禁爾 銀州者根長尺餘

微白治勞瘵良北產者如前

胡而軟並良南產者強硬不

堪用外感生用內傷升氣酒

炒用根中及下降用稍有汗

欬者蜜水炒前胡生夏為使

惡草角

前胡 辛以暢肺解風寒甘以

本草綱目要前胡

卷三

醫方考卷三

四

上三

然而赤肺鬱咳有痰喘而胸滿非肺
 病乎蓋皮毛外閉則邪熱肉攻故用麻
 黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌
 表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱
 而喘者加石膏泄肺火之藥是麻黃湯
 知母是皆泄肺火之藥是麻黃湯
 陽發汗重劑是散肺經火鬱之藥
 不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其
 母故用桂枝同甘草外散風邪以救表
 內伐肺木以防脾佐以白芍泄木而因
 脾使以姜棗行脾之津液而和營衛下
 後微喘者加厚朴杏仁以和肺氣也活人
 書加黃芩為陽且湯以泄肺熱也是桂
 枝湯也太陽陽解肌輕劑是為理脾救肺
 之藥也玉履白傷寒即病者謂之傷寒
 不即病者謂之溫暑其原不殊故一辨
 為傷寒其類則殊施治不得相混仲景
 之書專為即病之傷寒設不兼為不即
 病之溫暑設也今人或以傷寒法治溫

暑不過借用耳三陰傷寒寒症十居七
 八皆溫暑但一于熱目後人誤為通治
 遂疑諸熱劑不敢用早未悞仲景立麻
 黃桂枝之有所主有其時矣苟非治
 溫暑之劑則群疑水釋矣又曰傷寒即
 發于冬寒之時寒邪在表開其腠理非
 辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以
 必用也溫病熱病發于晴熱之時鬱熱
 目內達外無寒在表故非辛涼苦寒苦
 酸之劑不能解之此桂枝麻黃等所以
 不可用而後人所處水解散犬黃湯干
 金湯防風通聖散之類兼治內外者之
 所以可用也夫即病之傷寒有惡風惡
 寒之症者風寒在表表氣受傷也後發
 之溫熱病有惡風惡寒之症者必重風
 風寒而表氣亦受傷也若無新重之風
 寒則無惡風惡寒之症故仲景曰太陽
 病發熱而渴不惡寒者為溫病溫病如
 此則知執病亦如此而不渴惡寒者非
 溫熱病矣或有不因新中風寒亦見惡

悅脾理胸腹苦泄厥陰肝之
寒熱散大陽勝之邪微寒一
性陰而降功益下氣氣下則
火降而痰消氣有餘便是
陰寒熱治痰執哮喘咳嗽嘔
逆痞膈霍亂小兒疳氣有推
陳致新之續明目安胎無外
感者息用按柴胡前胡均是
前胡性降為不同肝胆性升
經風痰非前胡不能除皮
白肉黑味甘氣香者良半夏

風惡寒之症者蓋因表虛熱達于表而
傷表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒
耳非傷風惡風傷寒惡寒也溫病熱病
亦有先見表症而後傳裡者蓋鬱熱自
丙達外外不得泄還復人裡而成可攻
之症非如傷寒從表而始也每見世人
治溫熱病誤攻其裡亦無大害誤發其
表亦不可言此足明其熱之自內達外
矣間有誤攻致害者乃春夏暴寒所中
之疫症邪純在表未入于裡不可與溫
病熱病同論夫秋冬傷寒真傷寒也春
夏傷寒寒疫也與溫病熱病自是兩途
豈可同治况傷寒直中陰經與太陽雖
傷不及變熱即傳陰經為寒症而當溫
者又與溫病熱病大不同其可混治乎
二揚子曰傷寒傳足不傳手非窮理之
言也草窓劉子指足經所屬水土木水
遇寒而潤水土遇寒而折裂木遇寒而
凋枯故寒喜傷之手經所屬金與火金
遇寒而愈堅火休極熱寒不能襲故寒

為便惡臭死心火

麻黃 辛溫微苦俗雜洪云中

冬不順雪性挑入足太陽勝

兼走手少陰陽明心大而為

肺家最要發汗解肌去管中

寒邪衛中風熱調血脉通九

竅開毛孔治中風傷寒中猶

頭痛溫瘧欬逆上氣風入

七日諸氣積痰哮喘喘宜泄

入皆屬于肺赤黑斑毒

不出乎本草未載

卷二

身方長厚表赤二麻黃湯

五

上二

不能傷脈者奇之將入身營衛絡上
下截斷不相聯絡夫血氣同流持息同
間之旨矣夫麻黃入必先皮毛之熱
鼻寒息粗肺主皮毛是手太陽肺辛金
先受病矣海藏有傷寒自皮毛人之語
先師有桂麻羌芎之設虽太陽表之表
之劑然汗法舍皮毛何自而解更交悖
裳結閉澹泄手陽明大腸庚金病矣先
師有硝黃枳實之用虽兼三陽三陰裡
之裡之劑然下法舍大腸何自而通劉
子謂金遇寒而愈堅信乎陽氣佛鬱舌
胎言妄乎少陰心丁火病矣先師有瀉
心散法亢極動血上下煩蒸手厥陰心
包入于少陽三焦火病矣治有三黃柴
芩數條小便癃秘手太陽小腸內火病
矣治有五苓導赤之例劉子謂火執寒
不能傷信乎經又云入之傷寒則為病
熱既云病熱則無水冰土折木枯之說
而有金燥火亢之徵矣劉子何人敢持
管見感世誣人哉机要云有厥陰經下

胃熱一日斑症表虛不得再汗非便閉亦不可下只宜清解其毒風癩痺皮肉不仁目赤腫痛水腫風腫過劑則汗

多亡陽夏月禁用汗者心之液過汗則

心虛為之動搖乃澆悍之劑丹溪以人去麻黃同用亦攻補法也東垣曰十劑曰輕可去實葛根麻黃之屬是也邪客皮毛腠理閉拒管衛不行

之時珍曰麻黃太陽症藥兼入肺經肺玉皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛寔桂枝

昔衛藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之別枝枝為手少陰心之別時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗其傷營營血內清不能外通于衛衛氣閉固津液不行致無汗發熱而惡寒傷衛衛氣虛外泄不能內護下營營氣虛弱性液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加石膏皆世人書夏至後加石膏知母皆泄肺火之藥是麻黃湯雖

利不止脈沉而遲手足厥逆無涕膿血此難治宜麻黃湯小續命湯汗之比有表邪縮于內當泄表而愈張子和曰殮泄以風為根風非汗不出有病此者腹中雷鳴水谷不分小便滯澀服瀉藥濕藥不功灸中脘脐下數十燥熱轉甚汗液枯竭延金視之脈浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯加姜葱煎遲進三大劑汗出終日至且而愈次以胃風湯和其癖府食進而安經曰春傷于風夏必殮泄故可汗而愈按風屬木脾屬土木剋土故滯也○附大黃湯夫黃兩半芒硝大腹皮木通甘草各一兩桂心七錢半桃仁廿一枚治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂破棺于金湯各參一兩酒煮取汁治天行熱毒垂死小解散防風通聖散見

本方除桂枝加石膏名麻

黃杏仁甘草石膏湯仲治汗下後不可

更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

後不可更行桂枝湯桂枝既不可行麻黃可行而無大熱者亦可行耶喻嘉言曰治傷寒先分營衛桂枝二湯斷無混用之理此症太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以熱雖少正喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘草緩肺急石膏清肺熱即治足太陽之藥通治手太陰經也倘誤行桂枝寧不護塞肺氣而亦治溫瘧先熱後寒本方加吐瀉膿手

白朮名麻黃加朮湯

治濕家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子名麻黃附子湯治脈沉虛脹者為氣水

屬少陰發其汗即止本方除桂枝杏仁

大陽發汗重劑是散肺經火
 鬱之藥疎理不密則津液外
 泄而肺氣虛虛則補其母故
 用桂枝同甘草外散風邪以
 救表內伐肝木以防脾佐以
 白芍泄本而固脾使以姜枣
 行脾之津液而和營衛下後
 微喘者加原朴杏仁以利肺
 氣也汗後脈沉遲者加入參
 以益肺氣也活人書加黃芩
 為陽旦湯以瀉肺熱也是桂
 枝湯雖太陽解肌劑是為
 理脾救肺
 之藥也
 發汗用芫去節
 煮半餘沸掠去浮沫或用醋
 湯略炮晒乾備用亦有用蜜
 炒者庶免大發止汗用根節無汗

名甘草麻黃湯金匱治裏水一身面目黃腫脈沉小便不利
 重藥取汗本方云桂用麻黃節杏
 仁不去甘草用生名三拗湯治感冒風
 寒咳嗽鼻塞麻黃留節發中有收杏仁
 甘草生用補留尖取其發連皮取其清
 中有發也仲景曰陽盛
 愈汗之則死陰盛湯虛汗之則愈下之
 則死脈浮緊者當身痛宜汗之假令
 尺脈遲者不可發汗以營弱血少故也
 咽燥喉乾者不可發汗津液不足也
 咳而小便利若夫小便者不可發汗
 發汗則四肢厥冷肺腎虛冷也下利
 雖有表症不可發汗發汗必便血亡耗
 津液反增客熱也衄家亡血家小可
 發汗發汗則陰陽俱虛針經曰奪血者
 無汗奪汗者無血土海藏曰仲景言

為目汗屬陽虛夢中出汗為
 盜汗屬陰虛用麻黃根蛤粉
 粟米等分為末袋盛撲之佳
 時珍曰麻黃發汗騁不能禦
 根節止汗効如影隨物理不
 可測如此自汗有風濕傷風
 風濕氣虛血虛脾虛陰虛胃
 熱痰飲中暑亡陽乘虛症
 皆可加用蓋其性能行周身
 肌表引諸藥至衛分而固腠
 理○汗雖為心液然五臟亦
 各有汗經曰飲食飽甚汗出
 于胃驚而奪精汗出于心持
 重遠行汗出于腎疾走恐懼
 汗出于肝搖體厚朴白微為
 勞苦汗出于脾使惡辛夷石羔

家不可發汗蓋為脈微也若浮緊者麻
 黃湯浮緩者桂枝湯活人云脈微者黃
 芩芍藥湯犀角地黃湯瘡家雖傷寒
 身痛不可發汗發汗則瘡表虛熱聚故
 生瘡汗之則表益虛熱愈甚而生風故
 變瘡少陰病脈沉細數病為在裏不
 可發汗少陰病但脈無汗而強發之
 必動其血或從口鼻或從目出是各下
 厥上渴難治脈動數微弱者不可發
 汗脈沉遲為在裏反發其汗則津液
 越出大便難表虛裡實必謬語汗家
 重發汗必恍惚心亂注者心之液心亡
 血液故亂腹中上下左
 右有動氣者不可發汗

傷寒傷風辨傷寒鬱而後能發熱傷寒
 有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒手足微
 厥傷風手足皆溫傷寒脈緊傷風脈緩
 陰陽表裏辨陽症之表發熱惡寒頭痛
 陰陽表裏辨答強便清不渴手足溫

荆芥一名蘇辛若而溫芳香而散

傷寒傷風辨傷寒鬱而後能發熱傷寒
 有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒手足微
 厥傷風手足皆溫傷寒脈緊傷風脈緩
 陰陽表裏辨陽症之表發熱惡寒頭痛
 陰陽表裏辨答強便清不渴手足溫

入肝經氣分兼行血分其性

升浮能發汗又云止冷散風

濕清頭目利咽喉治傷寒頭

痛中風口噤身強項直口面

喎邪目中黑花其氣溫散能

助脾胃消食氣香通利血脉治

吐衄腸風崩中血痢產風血

運產後血去過多腹內空虛

患不待外風襲之也荆芥最

能散血中之風華佗愈風散

荆芥三錢微焙為末豆淋酒

瘰癧瘡腫清熱散瘀破結

毒結散熱清則為風病血病

瘡家聖藥荆芥功本治風又

風水之藏則是藏血之地也

李士材曰風在皮裡膜外荆

芥主之非若坊連穗用

風能入骨肉也于巖

故善治血炒黑用凡血藥用

升發地榆樛櫚五灵脂等皆

應炒黑者以黑勝紅也反煎

蟹河豚驢肉

連翹 微寒升浮形似心實似

有苦入心故入手少陰厥陰

陰症之表無熱惡寒面慘息冷手足厥
逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴衣揭手
擲足大便便秘結小便赤澀瓜用紅活身
輕易于轉側脈浮洪數陰症之裏不渴
倦卧引衣白益唇紫舌捲大便滑泄小
便清白瓜甲青黑身重難于轉側脈沉
細數性腹痛與嘔陰陽裏症皆有之三
陽經又有陰陽表裏之分太陽以熱在
皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝
湯九味羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱
在府為裏五苓散陽明以熱在肌肉目
痛不眠在經為表葛根解肌湯以口渴
皆寒為熱漸入裏白虎加參湯若自汗
狂譫熱已入胃府為全入裏調胃承氣
湯少陽以胸脇之間為半表半裏表多
小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以土皆
發熱太陽惡寒陽明自汗少嘔多嘔皆
三陽症也入極陽症多得之風寒暑濕
邪生于太陽也陰症多得之飲食起居
七情邪生于少陰也故曰傷寒內傷者

十居八
九也

桂枝湯治太陽中風陽浮而陰弱發熱

頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾嘔開前為

陽陽以候衛衛後為陰管亦陰陰以候

營陽脈浮者衛中風也陰脈弱者營氣

弱也傷于風者頭先受之故頭痛經自

陽浮者熱自發陰弱者汗自出風傷于

衛管弱衛強故發熱自汗也衛虛則惡

風管虛則惡寒目汗則皮腠疎故惡風

復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛寒之分

無汗惡寒為表寒且發汗汗出惡寒為

表虛宜解肌鼻鳴乾嘔者風寒氣逆故

息有音而作嘔也喻嘉言曰風寒並舉

義重惡風惡風未有不惡寒者所以傷

寒亦互云惡風後人謂傷寒惡寒傷風

惡風及陽明病脈遲汗出多微惡寒者

本草備要 卷二 醫方集解 卷二 桂枝湯 上二

包心氣分而兼泄火兼除手

足少陽胆三焦手陽明經大腸氣

分濕熱散諸經血凝氣聚

壅遏衛氣鬱利水通經殺虫

止痛消腫排膿皆結者散之

為是邪腫而不痛者為虛邪

腫而赤者為結熱腫而不赤

為留氣為十二經癰家聖藥

紫蘇味辛入氣分色紫入血

益腫人脾發汗解肌和血下

氣寬中消痰祛風定喘止痛

安胎利大小腸解魚蟹毒多

服泄人真氣時珍曰同陳皮

同藿香烏葉溫中止痛同香

附麻黃發汗解肌同芍藥當

和血散而用桂梗只壳利

脹寬腸同前子杏仁竹痰定

解身治霍亂脚氣氣香者

良宜橘皮忌鯉魚蘇子與

葉同功潤心肺尤能下氣定

喘止咳消痰和膈寬腸溫中

本古用安草連翹紫蘇

表未解也可發汗以微惡寒尚兼太陽

仍當從外解肌斷桂枝芍藥生

薑兩甘草二兩大棗十二熱服須臾

啜稀熱粥以助藥力濕熱取微似汗不

可令如水淋漓汗出病差停後服服一

劑盡病症猶在者更作服此足太陽

藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風

不可大汗汗過則反動營血雖有表邪

只可解風故以桂枝湯少和之也經曰

風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘暖

之以酸收之桂枝辛甘發散為陽臣以

芍藥之酸收佐以甘草之甘平不令走

泄陰氣也姜辛溫能散散寒甘溫能

和此不啻于發散又以行脾之津液而

和榮衛者也麻黃湯當于發散故不用

姜亟而津液得通矣就安時曰若無汗

身冷不惡寒反惡熱者慎不可用又目

汗小便數者不可服自汗為陽虛小便

數為下焦虛寒初病表裏俱虛病不在

表服此重汗湯其津液是虛也經曰

脈浮緊發熱汗不出者不可與脈緊為

傷寒與之則表益寒而汗愈難出矣傷

寒例曰桂枝下咽陽盛則難承氣入胃

開鬱降氣湯梗下氣稍緩虛者宜之

研用

薄荷

辛能散涼能清

治頭痛頭風中風失音痰嗽口氣語澀舌胎眼耳咽喉

口齒諸病

驚悸瘧疾

虛人不宜多服

蘇蔞氣芳

者長

雞蘇

頭風口眩肺痿血痢吐血崩

本草

疎不能內護于營而汗白出矣汗者血之液也苟非用血藥以桂枝和營散邪以芍藥護營固裏則不但外邪不出且人而為裏患矣然後知和營則外邪出邪出則衛自密更不必用固表之藥而汗自止矣仲景曰病當自汗出者此為營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脈中衛行脈外復發其汗營衛和則宜桂枝湯王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必奏之故用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之謂和營衛則邪從汗出而汗可止非桂枝能閉汗孔也李東垣曰仲景治表虛製此湯用桂枝為君桂

枝辛挑發散休輕助陽芍藥甘草佐之若腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君芍藥酸寒主收補中桂枝甘草佐之桂治感寒腹痛之神藥如中熱腹痛去桂加黃芩許叔微曰仲景一百一十二方桂枝獨冠其首今人全不用何也昂按仲景治傷寒用麻黃桂枝而全不用羌活防風是古人亦有所未備此故潔古製羌活湯黃芪湯川芎湯海藏製神木散白木湯皆用羌活防風治之黃芪川芎湯附補門神木白木湯見後本方加白木川芎羌活防風糖名疏邪是表湯節同陶氏製此以白木為言曰坐令外感內傷混同論治矣昂按節菴之君白木亦倣節菴所著傷寒藏之白木湯而來又按節菴所著傷寒六書盡易仲景原方秦合後賢治法以

沐喉腥口臭邪執諸病局方

腦難方莖中虛似蘇葉而

微長密齒面皺氣甚辛烈

木賊 溫微甘苦中空輕與

麻黃同形性亦能發汗解肌

升散火鬱風濕入足厥陰少

陽血分益肝胆治目疾退翳

膜翳乃肝邪鬱遏及翹痛脫

肛腸風痔瘻赤痢崩中血病

膚能發揚邪汗丹與曰浮萍

止癢消渴揭汁生于水

又能下水利小便治一切風

濕癩浮萍一味密丸酒服

疥癩遍身治三十六種風濕紫

蒼耳子一名泉耳甘苦性溫

善發汗散風濕上通腦頂下

行足膝外達皮膚治頭痛目

暗齒痛鼻淵眩暈痺痛癩癧

本草註用更草浮萍蒼耳

代桂枝麻黃葛根青龍等劑在後人誠

為使用故世之嗜節菴者勝于仲景以

節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書

行而仲景之書晦如節菴者可謂潔古

海藏皆之功臣而在長沙是為操莽也

本集採節菴方論頗多然不能無遺議

者以節菴之功罪不妨互見于世也本方去芍藥生薑名

桂枝甘草湯仲景治發汗過多及手冒心

心下悸欲得按者汗多則亡陽而耗血

胃也桂枝益氣固故心虛悸而又手白

表甘草補中助陽本方加附子名桂枝

加附子湯仲景治太陽病發汗遂漏不止

惡風小便難四肢微急汗多亡陽無以

多則使自少兼勝脫無陽不能化氣故

便難汗多則無液以養筋兼有風人而

增其勁故四肢微急桂枝湯本方去

芍藥加附子名桂枝附子湯仲景治傷寒

八九日風濕相搏身體痛煩不能轉側

不嘔不渴脈浮虛而澗八九日傳經之

復身體痛煩者風濕相搏也煩風也痛

濕也不嘔不渴裏無邪也故知為風濕

相搏脈浮風也澗澗也浮而澗知寒濕

但在經與桂枝湯以解表風加附子以

散寒

本方加芍藥生薑各二兩人參三

兩名桂枝新加湯仲景治傷寒汗後身痛

脈來沉遲沉遲汗後血虛也正氣虛矣

解未盡之邪加芍藥本方減甘草半

人參

本方減甘草半

本方減甘草半

本方減甘草半

本方減甘草半

瘡疥疥根葉熱遍身瘙痒作

名萬應羔去刺酒拌蒸忌猪肉聖

佳方葉搗汁云
治產後痢

天麻 辛溫入肝經氣分益氣

強氣通血脈強筋力疎痰氣

治諸風眩掉頭旋眼黑語言

不遂風濕痛頑痺小兒驚癇

諸風眩掉皆屬肝木肝病不
能管筋故見前症天麻入厥
陰而治諸疾肝氣

和乎諸疾自瘳血液衰少

及類中風者忌用風藥能燥
血故也

按風藥中須兼養血藥制其
燥也養血藥或兼搜風藥且
其湯也古云治風先

治血血行風自滅根類黃

瓜莖名赤筋有風不動無風

及搖一名是風草明亮堅寔

者佳濕紙包煨熟切片酒浸

一宿焙用

秦艽 苦燥溫辛散風去腸胃

之熱益肝胆之氣養血榮筋

風藥中潤劑治風寒濕痺經

散藥中補劑治風寒濕痺日

濕三氣雜至合而為痺風勝
為行痺寒勝為痛痺濕勝為

加芍藥一倍名桂枝加芍藥湯仲治太

陽誤下腹痛屬太陰症表症未罷陽誤
下表邪乘虛而

入裏當作結胸則仍屬太陽經然今不胸
滿而腹滿是邪已入太陰經然但腹滿
時痛尚非大寒之痛故但用桂本方加

枝以安太陽倍芍藥以入太陰

大黃名桂枝加大黃湯仲治表症誤下

大寒煩者別見表本方去桂加茯苓白

朮名桂枝去桂加茯苓白朮湯仲治服

桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱無汗

心滿微痛小便不利表症未退復增滿
痛便秘邪已內陷

故去桂枝表藥不用而用芍藥甘草以
除痛生柔以散滿祛寒白朮茯苓以生

津導水合姜葱以和胃
安內即所以接外也本方加厚朴杏

仁名桂枝加厚朴杏仁湯治太陽病

下之微喘表未解也桂枝湯以解表
杏利以下逆氣本

方去芍藥生姜加茯苓名茯苓桂枝甘

草大棗湯甘爛水煎治汗後臍下悸

欲作奔豚汗後臍下悸者心虛而腎氣
欲上凌心故用茯苓伐腎利桂枝治奔

豚甘草大棗助脾而平腎益土以制水
甘爛水者用瓢揚萬遍水性鹹而重本

方合麻黃湯名桂枝各半湯仲治太陽

症如瘧狀熱多寒少寒多為病進熱多
為病退陽勝陰也

皆以表名表 桂枝湯 二 上三

着痺匕在干骨則体重在脉
則血清在筋則拘痺在肉則

不仁在通身空急榮筋虛勞
皮則寒

骨蒸時珍曰手足陽明經藥
煎人肝胆陽明有濕則

手足酸痛寒熱有熱則日晡
潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩

熱素丸柴胡各一兩甘草五
錢為末每服三錢治小兒骨

蒸潮熱食減瘦弱秦芫芩甘
草各一兩每服一二錢匕乙

加薄荷 疽黃酒毒腸風瀉血
五石

口噤牙痛 齒下颯屬手陽明
入腸經張潔古目

秦芫能去下牙 濕勝風淫之
痛及本經風熱

疔疔大小便 牛乳點服兼治
疔疔大小便

形作羅紋相交長大黃白左
紋者長鼻痛為使畏牛乳

稀蒼草 苦辛生寒熟溫治肝
腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛

腰膝無力風濕癢瘍若痺痛
由脚腎兩虛陰血不足不由

風濕而得者忌服 風葉能
江

東人呼猪為猪其草似猪蒼
臭故名 唐成訥有進猪蒼表

宋張詠進猪蒼表云
比草金稜銀線素莖紫葉對

節而生頗同蒼耳臣喚百服
本草綱目

本方二分合麻黃湯二分各桂枝三麻
黃一湯 仲景治太陽病已大汗形如瘧日

再發 再發者 本方二分合越婢一分各
桂枝二越婢湯 仲景治太陽病發熱惡寒

熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發
汗 喻嘉言曰此風多寒少之症無湯二

汗字仲景言之不一後人置為闕疑不
知乃亡津液之通爾也故以發汗為戒

然非汗風寒終不解故取桂枝之二以
治風越婢之一以治寒方為台法方時

珍曰此即桂枝麻黃之合劑乃大青龍
以芍藥易杏 本方倍芍藥加飴糖名小

建中湯 仲景再加黃芪名黃芪建中湯 金
匱

並見除飴糖各桂枝加黃芪湯 金匱
寒門除飴糖為君除飴糖則不名建中

矣今人用建中者絕不用飴糖何欬治
黃汗發熱而脛自冷身痛身重腰上有

汗腰下無汗小便不利 此陽通而陰不
通上下痞隔故

用黃芪以固陽桂枝以通陰陰陽通營
衛和則正汗出小便利而諸症悉愈矣

小建中加當歸名當歸建中湯 金匱婦
人產後虛羸不足腹中痛引腰背小腹

拘急 寒傷若筋傷不止加地黃阿膠本
方除甘草加黃芪二兩各桂枝五物湯

全 治血痺 身體不仁 本方加栝蒌根各
匱 治血痺 如風痺狀

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

本方集解表 卷之二十三 桂枝湯

眼目清明及至干服髮髮以烏黑筋力輕健効驗多端以

五月五日六月七月七月

九月九日採菟兔去粗葉留

枝葉化實酒拌蒸晒九次蜜

尤甚益元氣補發辛苦氣寒

加以酒蜜則苦寒之陰濁盡

去而清香之美味見矣數不

至九陰燭未盡則不能搗汁

透骨搜風而却病也搗汁

熬膏以甘草生地煎膏煉蜜

三味收之酒調服尤妙

甘氣溫屬木其性善走能宣

疎五臟通行十二經絡治中

風頭風痛風頑痺濕熱流干

腫屬濕痛屬熱汗多屬風麻

痺木亦是胃中有濕痰死血

久新痛屬寒宜辛溫藥久痛

屬熱宜清涼藥河間所謂暴

病非執久病非寒是也大法

宜順氣清痰搜風散濕養血

去瘀為要威靈伯傳曰一人

手足不遂數十年遇新羅僧

曰得一藥可治入山求之

乃威靈仙也服之而愈癩

瘕積聚痰水宿膿黃疽浮腫

栝藿桂枝湯治太陽症備身強凡

脈反沉遲此為瘧厥安時曰栝藿根不

肺熱不令移于腎也加于桂枝湯中則

可以徹熱榮筋調和營衛矣凡字無鈞

音殊羽短本方加龍骨牡蠣各桂枝加

龍骨牡蠣湯治男子失精女子夢交

桂枝生姜之辛以潤之甘草大棗之甘

以補之芍藥之酸以收之訖骨牡蠣之

固之本方加葛根麻黃名葛根湯後

大青龍湯治太陽中風脈浮緊身疼痛

發熱惡寒不出而煩躁成氏曰此中

浮為風風傷衛氣為寒寒傷營營衛不

和故為風寒身痛也

為陰為寒風寒而傷營衛俱寒故不汗

出而煩躁也仲景又曰若脈微弱汗出

惡風不可服此服之則厥逆筋惕肉

跳此為逆也按此即少陰過汗亡陽之症

故仲景更立直

武湯以救其誤又治傷寒脈浮數身不

痛但重者有輕時無少陰症者成氏曰

見風脈也傷寒者身痛此風勝故不痛

中風者身重此兼寒故有輕時風寒外

甚故不吐利厥逆無少陰裡症也昂按

成註非也此湯必脈浮緊浮數煩躁無

汗方可服之仲景恐少陰煩躁而誤服

大小腸秘風濕痰氣一切冷

痛性極快利積疴不痊者服

之有捷効然疎泄真氣弱者

慎用和砂仁砂糖醋煎治諸

骨哽 根叢數百條長者

二尺餘色深黑俗名鉄脚威

靈仙忌茗麵湯

鈎藤鈎 甘微苦寒除心熱平

肝風治大人頭旋目眩小兒

俗謂之搖擲是也 客忤胎

風發斑疹主肝風相火之病

風靜火息則諸瘡自除相火散行

于胆三焦心包 有刺類鈎鈎藤細

多鈎者良純用鈎功 公前則

無勞

茵芋 辛苦微温有小毒治風

濕拘攣痺痛時珍曰古方治

治風痺有茵芋酒治產後風

有茵芋膏風濕諸症多用之

茵芋石南菴草皆治風妙品

近世罕知菴草辛温有毒治

黃去沫內諸藥煎一服汗者止後服

此足太陽藥也成氏曰桂枝主中風麻

黃主傷寒今風寒兩傷欲以桂枝解肌

驅風而不能已其寒欲以麻黃發汗散

寒而不能去其風仲景所以處青龍而

兩解也麻黃甘温桂枝辛熱寒傷營以

甘緩之風傷衛以辛散之故以麻黃為

君桂枝為臣甘草甘平杏仁甘苦佐麻

黃以發表大棗甘温生薑辛温佐桂枝

以解肌姜棗又能行解之 營衛陰陽俱

傷則非輕劑所能獨解須重輕之劑

同散之乃得陰陽之邪俱營衛俱和

至苦辛甘微寒質重而又專達肌表為

使也風寒外盛人身之陽必鬱而為熱

石羔体重泄熱氣輕解肌故云重

輕之劑足太陽膀胱經表病也而表有

營衛之不同病有風寒之各異仲景治

分三症桂枝解肌驅風麻黃發汗散寒

青龍風寒兩解各分疆界此足三大綱

也按大青龍為發汗之重劑陶節菴曰

此湯險峻須風寒俱盛又加煩燥乃可

曲之喻嘉言曰解肌兼發汗義取青龍

者危以而雲升雨降鬱熱頓除煩躁乃

夜間行集方表卷一六青龍湯

上三

頭風癰腫乳癆痲瘋蘇頌曰古方風濕諸酒多用之今人取葉煎湯熱飲治牙疳喉痺甚効甄別曰不入湯

莖赤葉如石榴而短厚莖葉

芡角

當歸 甘溫和血辛溫散內寒

苦溫助心散寒 諸血屬心凡通脈者必先

補心當日入心肝脾心主血苦溫助心入心肝脾肝藏血

脚統為血中氣藥治虛勞寒

熱欬逆上氣血和則濕癰厥

諸痛散寒 風痲無汗 痲音擊

強項直角弓反張曰痲無汗為剛痲有汗為柔痲當且辛散風濕和血產後亦有死痲者以脫血無以養筋也宜十全大

神湯痲痺癢痲筋骨緩縱足

風寒濕客于肌肉血脉曰痲血凝氣聚按之堅硬曰痲雖

日痲尚未至癢也癰疽瘡瘍

衝脈為病氣逆裏急帶脈為

病腹痛腰溶溶如坐水中

起于腎下出于氣衝俠臍上行至胸中上項類滲諸陽滲諸精下行入足滲三陰滲諸絡為十二經脈之海主血帶

本草綱目卷之三

別下後之煩躁與未下之煩躁亦殊若少陰煩躁而慎服此則有亡陽之變矣又曰石膏一物入甘溫隊中則為青之從清涼同氣則為白虎夫風寒皆傷宜從辛甘發散矣而表裏又俱熱則溫熱不可用欲併風寒表裏之熱而俱解之故立白虎一法以輔青龍之不逮也按煩躁有在表者此症不汗出而煩躁是也有在裏者不大便而煩躁是也有陽虛者汗下後病不去而煩躁是也有陰盛者少陰病吐利厥逆煩躁欲死是也內熱曰煩為有根之火外熱曰躁為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治

小青龙湯 治傷寒表不解心下水氣

乾嘔發熱而咳或噎或喘或渴或利或

小便不利少腹滿短氣不得臥

身痛屬太陽表症仲景書中凡有裏症兼表症者則以表不解三字該之內有水飲則水寒相搏水留胃中故乾嘔而噎水寒射肺故咳而喘水停則氣不化津不生故渴水漬腸間故下利水畜下

焦故小便不利而少腹滿短氣者氣促不能相續曲喘不同有實有虛有表有裏此為水停心下亦令短氣水氣內漬

所傳不一故有或為之症○金匱云平人無寒熱短氣不足以息者實也又云

膈上有留飲其人短氣而渴丹溪治許

白雲脾疼膈痛而短氣大吐下之二十

日叶膠痰 麻黃 桂枝 芍藥 細

辛 甘草 乾姜 半夏 五味子

渴去半夏加花粉 苦寒去熱生津喘去

麻黃加杏仁 喘為氣逆麻黃形腫亦去

本草綱目卷之三 小青龙湯

脈橫圍于腰如束帶約諸脈及婦人諸不足一切血症陰虛而陽無所

附者潤腸胃澤皮膚養血生肌

然滑大腸瀉者忌用

為臣地黃為佐芎藭為使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃芪血熱佐以芩苓

其養則血自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽旺生陰血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者

使氣血各

有所歸故名

血滯能通血虛能補血枯能潤

分使氣調而血和也東垣曰頭生血而上行身食血而中守尾破血而下流全活血而不走雷岐海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全

用一定之理也

川產力剛善攻秦產力柔善補以秦產

頭圓尾多肥潤氣香者良名

馬尾當歸尾粗堅枯者名鏡

頭當歸只宜發散用治血酒

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

製有痰姜製

麻黃喘逆形腫水氣標噎去麻黃加附

子噎附子溫經散寒小便秘去麻黃加

茯苓汗宜滲利此足太陽藥也表不

解故以麻黃發汗為君桂枝甘草佐之

解表為佐咳喘肺氣逆也故用芍藥酸

寒五味酸溫以收之

散邪水收斂水停心下則腎躁細辛干

姜辛溫能潤腎而行水

飲為使也外發汗內行水則表裏邪

散矣

金匱曰病溢飲者當發其汗大小青龍

湯並主之程郊倩曰水氣之渴與白虎

湯中之渴不特寒熱有殊亦且燥溫各

異金匱云先渴後嘔者水停心下小青

龍湯主之不治渴而渴治水去而渴

未解心下有水而咳乾嘔發熱或喘或

利小青龍湯王之表已解有時頭痛惡

寒心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或咳

十束湯主之益青龍散表邪使水從外

出內經所謂開鬼門也十垂逐裏邪使

水從二便出內經所謂潔淨府法陳莖

也本方加石羔名小青龍加石羔湯

全治肺脹欬而上氣煩躁而喘心下有

水脈浮此去水飲散

風寒之車劑

散

散

本草綱目

散

...

...

耳新異蒼蒲海藻生姜慈濕麵

芎藭 辛温升浮為少陽引經

胆入手足厥陰氣分心包乃

血中氣藥助清陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自降

為通陰陽氣血之使 潤肝

燥治肺虛用以散之辛以補

之上行頭目下行血海

風散瘀止痛調經治風濕在

頭血虛頭痛能引血下行頭

各引經藥太陽羌活陽明自

注少陽柴胡太陰蒼木少陰

細辛厥陰吳茱萸黃野蜜腹痛

曰諸經氣鬱亦能頭痛

脇風氣鬱血鬱濕瀉血痢寒

痺筋掣目淚多涕熱風木為

病皆屬肝木及癰疽瘡瘍

六府生症從五藏生皆陰陽

相滯而成氣為陽血為陰血

行脈中氣行脈外相並周流

寒濕搏之則凝滯而行遲為

不及火抗搏之則沸騰而行

速為大過氣鬱邪入血中為

陰滯于陽血鬱邪入氣中為

葛根湯治太陽病項背几几無汗惡

風鳥之短羽者動則引勁几几然狀病

人項背難舒之貌也無汗惡風中風

而表寒也陽明脈上頸而合于太陽

將傳陽明故加葛根以斷之此症又名

剛厚乃風寒傷筋故拘急而強直也全

剛治之亦主此湯剛症無汗柔症有汗

仲景又曰太陽發汗不之煩躁短氣者

亦宜此湯更發其汗經曰何以知汗出

不微以脈濇故也按傷寒失汗下而

短氣為是汗下後短氣者為虛表寒宜

發汗表虛亦治太陽陽明合病下利

宜解肌有併病有合病本經未解傳人他經有

催併之義為併病二經二經同受邪者

為合病合病者邪氣甚也太陽陽明合

病其症頭痛腰痛肌熱鼻乾目痛脈浮

大而長頭腰大陽也肌目鼻陽明也浮

大太陽也脈長陽明也陽經合病必自

下利邪併于陽則陽是而陰虛陽外寒

而不主裏則裏虛故下利吳鶴早曰瀉

醫便謂傷寒瀉底不治與此湯以散經

中表邪則陽不寒而陰氣平利不治而

自止矣較葛根能引胃中清陽上行故

凡下利多用之趙嗣真曰合病者二陽

經或三陽經同病不傳者也併病者一

經先受病又過一經病之傳者也如太

陽陽明若併而未盡是傳未過仲景所

謂太陽症不能面赤陽氣拂立任表不

得越原躁短氣是也用當汗之以各半

湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太

陽症罷朝執手足汗出太便秘而語

是也法當下之以承氣湯是知傳則入

府不傳則不入府併病傳變有如此仲

景治太陽陽明合病主葛根湯太陽少

陽合病主黃芩湯少陽以明合病主承

氣湯三陰有兩感而無合病此事難

知云足太陽為諸陽之首故多傳變太

陽傳陽明水傳土也謂之微邪又謂巡

行長年表三萬根湯

八

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

十二

真氣單服久服令人暴亡

則藏有偏勝久服則過劑生邪故有此失若有配合節制則不至此矣昂按芍地酸寒為陰芎且辛溫為陽故四物取其相濟以行血兼之滯其用芎辛散豈能生血者乎治法云驗胎法婦人過經三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是經閉胎不動者是經閉

蜀產為川芎秦產為西芎江南為撫芎以川產大塊裡曰不油辛甘者勝曰正為使畏黃連硝石滑石惡實芪山茱萸

白芍 苦酸微寒入肝脾血分

為手足太陰行經藥

火 酸斂肝以斂安脾肺固

脾里肺主皮毛脾主肌肉肝能生金則肺安脾和血脉收

陰氣斂逆氣收斂散惡血利

小便 斂陰生津小便自緩中

止痛 東垣曰經曰損其肝也益

氣除煩欬汗安胎補勞退熱

治泄痢後重 能除胃脾虛腹

經得度傳太陽傳少陽謂之越經傳太陽傳太陰謂之誤下傳太陽傳少陰謂之表裡傳水勝火火勝水此南北二方之交噴刻害人辨之不早必成不救太陽傳厥陰謂之首尾傳三陰不至首唯厥陰與督脉上行與太陽相接又名巡經得度傳災疫至重不為不多矣

葛根 兩麻黃 生姜 兩桂枝 芍藥

甘草 二兩 大棗 十二枚 此足太陽藥也

成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也

此以中風表實故加二物于桂枝湯中

仲景以有汗無汗定傷風傷寒之別有汗為傷風用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗為傷寒用此湯張元素曰二湯加葛根所以斷太陽入陽明之路非太陽

藥也若太陽初病便服升葛是反引邪氣入陽明也周陽發曰不去麻黃復加葛根大開肌肉之葉不慮大汗無制乎

故以桂枝監之且以芍藥收之喻嘉言曰仲景于太陽帶陽明症其風傷衛則

桂枝湯中加葛根寒傷營則麻黃湯中加葛根太陽帶少陽症其風傷衛則桂

枝湯中加柴胡寒傷營則麻黃湯中加柴胡合併之病亦然則陽明以葛根為

主藥少陽以柴胡為主藥矣乃少陽經專用小柴胡湯而陽明經全不用葛根

湯何耶此有二義太陽而累兼陽明則以方來之陽明為重故加葛根陽明而

尚兼太陽則以未罷之太陽為重故不加葛根惡葛根大開肌肉則津液盡從

外泄耳小兒布痘見點之時亦忌之今人知忌升麻而恣用葛根兒命遭枉者

多矣又曰金匱論痙病于風木主事之時已中不可汗下之戒夫妄下損陰則

筋失所養而痙妄汗亡陽則脉失所養

痛

世病俱六陰病不可缺此
其泄冷痛忌用虞天民曰
白芍不惟治血虛大能行氣
古方治腹痛用白芍四錢甘
草二錢名為藥甘草湯益腹
痛因管氣不和逆於肉裡白
芍能行管氣甘草能飲逆氣
又痛為肝木剋脾土白芍能
伐肝心痞脇痛經往來之道
故也心痞脇痛經往來之道
其火上沖則胃院痛橫行則
兩脇痛白芍能理中泄肝
肺脹喘噫同癰腫疝瘕其收
降之体又能入血海衝脈為
女皆而至厥陰經治鼻動血
有之而自瀉肝血不足益陰
日脈音目瀉肝血不足益陰

自是婦人胎產及一切血病

又曰產後忌用

胎後忌用
之氣也必不得已酒炒用之
可耳時珍曰產後肝血已虛
不可更泄也寇氏曰減芍藥
以避中寒微寒如芍藥古人
猶諱諱告戒視大苦大寒可
驟行而莫之忌耶同白木
補脾同參芪補氣同白地補
血同芍藥世肝同甘草止腹
痛同黃連止泄痢同防風
發痘疹同姜朮溫經散濕

赤芍藥主治

火散惡血治腹痛堅積血痺

疝瘕和聚外腎為經閉腸風

本草綱目要旨

而拘急及遇無汗之剛痙又不得不用
葛根湯取其微汗至干下法全不示戒
且云可與大承氣湯見身內之陰為外
先所耗容有不得不下之症但十中不
得一二終非可訓之定法畧
本方除
麻黃名桂枝加葛根湯治前症汗出

惡風者本方加生夏名葛根加生夏湯

仲景治太陽陽明合病不利但嘔此又

不利辨傷寒傷風之不同也其為陰陰
性下行理氣不和故利而不嘔風為陽
陽性上行理氣逆而不下故嘔本方加黃

芩名葛根解肌湯治發熱惡寒頭痛項
強傷寒濕病

麻黃附子細辛湯

治傷寒少陰症始得

之反發熱脈沉者少陰症脈微細但欲

少陰腎相為表裡腎虛故太陽之和直
入而脈沉餘邪未盡入裡而表熱此症
謂之表裡傳

麻黃 細辛 附子 炮

先煮麻黃去沫內諸藥煎 此足少

陰藥也太陽症發熱脈當浮 反沉少

陰症脈沉當無熱今發熱故曰反也熱

為邪在表蓋汗脈沉屬陰又當溫故以
附子溫少陰之經以麻黃散太陽之寒
而發汗以細辛腎經表藥聯屬其間是

醫方集解表三 麻黃附子細辛湯

癰腫目赤皆散瀉之功白補而收

赤散而瀉白益脾能于土中

瀉水赤散能行血中之滯

產後俱忌用 赤白各隨花

色卑辨者入藥酒炒用制其寒

婦人血分醋炒下痢後重不

炒惡苦硝石斛畏醫雷小薊

藜蘆

生地黃 甘苦大寒入心腎瀉

丙火小腸為丙火心与小腸相表裡導赤救與木通

用清燥金湯火消瘀通經平

諸血逆治吐衄崩中唾血者

出咯血者隨痰咯出或帶血

絲出腎經及肺經自而脇逆

上吐出者屬肝經衄血者血

溢干腦從鼻而出咳血者咳

出痰內有血並屬肺經吐血

嘔出成盆成碗者屬胃經經

漏不止曰崩血熱則妄行宜

以此涼之虛人忌用用乾地

黃可 傷寒陽強痘症大熱症

也 用之甚多 本草未載 多服損胃 生掘

鮮者搗汁飲之或用酒製則 不傷胃生則寒乾則涼熟則

本草補要草黃

汗劑之重者趙嗣真曰仲景太陽篇云

疾脈當較其裡宜四逆湯少陰篇云少

陰病始得之反發沉脈沉者麻黃附子

細辛湯均是發沉脈沉以其沉痛故屬

大陽陽症脈當浮而反不能浮者以裡

久虛寒正氣衰微又身沐疼痛故宜救

裡使正氣內強逼邪外出而于姜附子

亦能出汗而散假令裡不虛寒而脈浮

則正屬大陽麻黃症矣均是脈沉發熱

以無頭痛故名少陰病陰病當無汗今

反熱寒邪在表未全傳裡但皮膚鬱閉

為熱故用麻黃細辛以發表熱附子以

溫少陰之經假使寒邪入裡外必無熱

當見吐利厥逆等症而正屬少陰四逆

湯症矣由此觀之表邪浮淺發熱之反

猶輕正氣衰微脈沉之反為重此四逆

湯不為不重干麻黃附子細辛湯矣又

可見說附配麻黃發中有補生附配干

姜補中有發仲景之旨微矣按傷寒傳

入三陰尚有在經表症如太陰有桂枝

加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥

陰有當歸四逆湯之類皆陰經表藥也

又按少陰雖有反熱而無頭痛厥陰雖

本方去細辛加甘草名麻黃

本方去細辛加甘草名麻黃

本方去細辛加甘草名麻黃

温故分為三條
以便施用

乾地黄 甘苦而寒沉陰而降

入手足少陰腎厥陰肝包及

手太陽經小腸滋陰退陽涼血

生血治血虛發熱生內熱

勞傷咳嗽咳喘陰虛者地黄

痰丹溪白久病陰火上升津

液生痰不生血宜補血以治

相火其痿痺驚悸有觸而心

驚而自動曰悸則怔忡也有

因心虛火動者有因肝虛胆

怯者有因水滯心下者火畏

水故悸也地黄能交心腎而

益肝胆亦能吐衄尿血痛為

行水故治之口血尿血痛為

不痛為尿血由心腎氣結或

憂思房勞所致多屬虛寒不

可端作 血運筋中 經曰陰虛

熱治 崩定下熱痛折跌絕崩

瓜姜糖一斤生姜四兩炒熟

煎傷折處冷則易之又生地

針三升酒升半煮 填骨髓長

肌肉利大小便調經安胎又

能殺虫治心腹急痛

瀉上方

麵作餅食能利出虫忌用

鹽本草灌曰丹溪云氣病補

血虽不中病亦無害也不知

血藥屬陰其性凝滯若胃虛

附子甘草湯治少陰病得之二三日

無證者當微發汗之為緩無症無吐利

厥逆裡症也用此湯微發汗以散之是

汗劑之輕者周揚俊曰言無裡症則亦

有及發熱之表在可知也二方皆治少

陰表症少陰無發汗之法汗之必至亡

陽惟此二症用之金匱用本方

治少陰水症少氣脈沉虛脹

身痛發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不

得卧及陽明發斑欲出不出寒暄不時

人多疾疫六經皆有頭痛故頭痛屬表

痛均急風寒在表故發熱惡寒寒外束

故無汗熱入裡故口渴渴陽明脈絡鼻俠

目故頭痛鼻乾陽明屬胃胃不和故卧

不安陽邪入胃裡寔表虛故發斑輕如

蚊點為疹重 升麻三錢葛根 芍藥二

甘草一錢 加姜煎如頭痛加川芎白芷

川芎為通陰陽血氣之 身痛背強加羌

活防風此兼太陽九 不退春加柴胡黃

芩防風少陽司令柴 夏加黃芩石羔降

熱頭面腫加防風荆芥連翹白芷川芎

牛蒡石羔升散 因痛加桔梗清肺利

出不透加紫葢茸 用茸者取其初得陽

氣觸類 脈弱加人參胃虛食少加白木

升發

本古直有厚草也

醫方三元表 卷之三 升麻葛根湯 三

上二

氣弱之人過服壯地等劑反致痞悶飲食減少交症百出至死不悟豈不惜哉大抵血虛固不可尚補其氣而氣虛亦不可徒補其血也凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛宜四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯 江浙生者南方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥田菊花心者良酒製則上行外行姜製則不泥膈惡貝母畏蕪荑忌蒸龍葱蒜銅鐵器得酒門冬丹皮當歸良

熟地黄 甘而微溫入手足少

陰厥陰經滋腎水補真陰填

骨髓生精血聰耳明目耳為腎竅

能視耳得血而能聽 黑髮烏

髭治勞傷風痺胎產百病為

補血之上劑丹溪曰產前當清熱養血為主

產後宜大補氣血為主且有雜症從未治之昂按丹溪產後大補氣血一語誠至當不易之論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡反施峻補反致大害者不可不察王碩云男子多陰虛宜熟地以好地女子多血熱宜生地以好

腹痛倍芍藥和之 此足陽明藥也陽明多氣多血寒邪傷人則血氣為之壅滯辛能達表輕可去實故以升葛辛輕之品發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故用芍藥斂陰和血又用甘草調其衛氣也雲岐子曰葛根為君升麻為佐甘草芍藥以安其中升麻甘草升陽解毒故又治時疫時疫感之必陽明斑疹已出者勿服恐重虛其表也胃藥斑疹已出者勿服恐重虛其表也麻症已見紅點則不可服陽明為表之裡升麻陽明正藥凡斑疹欲出未出之際宜服此湯以透其毒不可便服寒劑以攻其熱又不可發汗攻下虛其表裏

之氣如內熱甚加黃連連犀角青黛大青

知母石羔黃芩黃柏玄參之類若咳嗽

稍退潮熱語謔不大便乃可用傷寒未

大柴胡加芒硝調胃承氣下之

入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也

柴葛解肌湯代高根湯治太陽陽明合

病頭目眼痛鼻乾不眠惡寒無汗脉

微洪太陽脉起自內背上額交巔陽明

頭痛目痛眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻

乾不眠屬陽明脉洪將為熱也節菴曰

此陽明在經之邪若 柴胡 葛根

正府病另有治法 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗

甘草 加姜葱石羔一錢煎服無汗惡

酒拌砂仁未浸蒸晒九次用

地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則利氣且能引入丹田六味丸用之為君尺脈弱者加桂附所謂益火之原以消陰翳也尺脈旺者加知柏所謂壯水之主以制陽光也

何首烏 苦堅腎溫補肝甘益

血瀉收斂精氣添精益髓養

血祛風 治風先治血強筋骨

烏鬚髮 故名令人有子為滋

補長髮氣血太和則勞瘦風

虛崩帶瘡疔癰腫諸病

自巳 營血調則瘡腫消赤

惡瘡 益陰補肝瘡疾要藥而

不寒不燥功在地 有赤白二

種夜則籐交一名交籐有陰

陽交合之象赤雄入血分白

雌入氣分以大如拳五瓣者

長三百年者大如楮椹服之

成地仙凡使赤白各半泔浸

竹刀刮皮切片用黑豆與首

寒甚者去黃芩冬月加麻黃春月少加

夏月加蘇葉 此足太陽陽明藥也寒

邪在經毒清散太陽之邪 用此以

散陽明之邪柴胡散少陽之邪 此邪未

而節菴 寒將為熱故以黃芩石羔桔梗

清之二藥並 以芍藥甘草和之也 芍藥

微陰散 中有收

柴胡升麻湯 治少陽陽明合病傷風壯

熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽

瘧疾 劉宗厚口傷風一症伸身與傷寒

變之後亦未嘗悉分之也 諸家皆與感

胃四氣併中風條混治惟陳無擇別立

傷風一方在四經之首且依傷寒以太

陽為始分注六經可謂詳密但風本外

邪諸方例用解表發表然受病之原亦

有不同若表虛受風專用發表之藥必

致汗多亡陽之症若內挾痰熱而受風

亦宜內外交治不可偏于解表也或曰

此云表虛與傷寒中風表虛同欵予曰

不同也彼以太陽中風而于有汗無汗

分虛寔寔者加麻黃虛者加葛根俱解

表也此云表虛者當固守衛氣而散風

者 柴胡 前胡 黃芩 升麻 葛

根 桑白皮 不荊芥 赤芍 石膏

加姜三片豉二十粒煎 此足少陽陽

烏拌勻鋪柳甑入砂鍋九蒸九晒用茯苓為使忌諸血無

鱗魚萊菔蒜鐵器唐時有者祖名能嗣父名延秀能嗣五十八尚無妻子服此藥七日而思人道娶妻連生數子延秀服之壽百六十歲首烏又服之壽百三十歲髮猶烏黑李翱為立何首烏傳然流傳雖入服者尚少明嘉靖初方士邵應節進七宝美髯丹世宗那之連生皇子遂盛行于世方用赤白首烏各一斤

里豆拌九蒸晒茯苓半斤乳拌當歸枸杞兔絲各半斤俱酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

酒浸牛膝半斤酒浸同首烏

明藥也陽明而兼少陽則表裏俱不可攻只宜和解在經柴胡平少陽之熱升

葛散陽明之和二藥皆能升提清陽前胡治痰下

氣而解風寒桑皮泄肺和濕而止痰嗽

荆芥疎風熱而清頭目赤芍調營血而

散肝和黃芩清火于上中二焦石膏泄

熱于肺胃之部風寒為熱故以石羔辛寒為君加姜豉

者取其辛散而升發也

九味羌活湯即羌活神和治傷寒傷風憎

寒壯熱頭痛身痛煩痛吞強嘔吐口渴

太陽無汗及感冒四時不正之氣濕病

熱病有物有聲曰嘔氣逆則嘔有物無聲曰吐胃寒則吐胃熱亦吐邪熱在表則不渴得裏則渴四時不正之氣謂時當熱而反大涼時當寒而反大溫非時而有其氣也冬時傷寒不即病者至春而愈為溫病至夏而愈為熱病餘症解

羌活防風蒼朮不細辛五分

川芎白芷生地黃黃芩甘草

錢一加生薑葱白煎如風症自汗者去蒼

水發汗加白朮黃芩發表而即寔表聲言

滿去地黃加只壳桔梗喘加杏仁夏加

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

石羔知母汗下兼行加大黃此足太陽

四兩黑脂酥炒蜜丸並已鐵器昂按地黃句首烏皆君藥也故六味丸以地黃為君七宝丹以何首烏為君各有配合未可同類而共施也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏加入地黃丸中合兩方為一方是一藥二君安所適從乎則失製方之本義矣

草部

牡丹皮 辛苦微寒入手足少

陰心厥陰肝 泄血中伏火

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景賢氣丸

用和血涼血而生血血熱則枯涼則生

破積血積瘀不去則新血不生通經

脈為吐衄必用之藥血屬陰相火所逼故

治中風五勞驚

瘧疾筋脈伸縮抽掣為瘧

除煩熱瘰癧瘡

下胞胎退無汗之骨蒸張

素曰丹皮治無汗之骨蒸地

骨皮治有汗之骨蒸神不足

者手少陰志不足者足少陰

故心藏神單瓣花紅者入藥肉

厚者佳酒拌蒸用畏貝母免

絲大黃忌蒜胡愛伏砒時珍

白者補赤者利人所孕悟宜分別之

續斷苦溫補腎辛溫補肝能

宣通血脉而理筋骨主傷中

補不足經疏云味煖子宮縮

小便破瘀血治腰痛胎漏懷

瀝血崩帶遺精腸風血痢是病

方平

例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也

藥之辛者屬金子人為義故能匡正熱

邪羌防蒼細青芷皆辛藥也羌活入足

太陽為撥亂反正之主藥除關節痛痛

之蒼朮入足太陰辟惡而去濕能除濕

安太陽使邪氣不致傳足太陰脾

痛在額青筋入足厥陰治頭痛在腦細

辛入足少陰治本經頭痛皆能驅風散

寒行氣活血而又加黃芩入手太陰以

泄氣中之熱生地入手少陰以泄血中

之熱黃芩之苦寒生地寒滯二味苟用不妥

也防風為風藥卒徒隨所引而無不至

治一身盡痛為使有汗宜甘草甘平用

以協加諸藥也藥備六經治通四時用

者當隨症加減不可執一張元素曰有

黃無汗不得用桂枝若未瘥則其發不

可言故立此方便不犯三陽禁忌為解

表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫

秋可治濕是諸路之應兵代麻黃等誠

為穩當但陰虛氣弱之人在所禁耳

十神湯治時氣濕疫風寒而感頭痛發

熱惡寒無汗咳嗽鼻鼾聲重感冒四時

不正之氣

古法用巨黃等續斷

卷三十一等方集要表三十九味羌活湯

上三

胃散一兩川續斷二錢半每服二不米飲下治時痢亦脫

謂之時氣天災流行沿門闔境傳染相似謂之瘟疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞舌重風寒兩感故表寔而氣為之不利也按傷風寒而咳嗽者其感為輕

命止痛生肌外科外骨

麻黃 葛根 升麻 川芎

上劑 川產良狀如雞脚皮

白芷 紫蘇 甘草 陳皮 香附

黃皺節節斷者真去向裏硬

赤芍藥 等分加姜葱煎 此陽經

筋酒浸用地黃為使

外感之通劑也吳鶴皋曰古人治風寒必分六經見症用藥然亦有發熱頭痛惡寒鼻塞而六經之症不甚顯者前症亦陽維之亦總以疏表利氣之藥主之可辨者

骨碎補 苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必及腎虛久瀉研未入由腎虛及腎虛久瀉研未入執空心食之腎主二便久泄多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

是方也川芎麻黃升麻葛根白芷紫蘇

處 牙痛 炒黑為末擦

陳皮香附皆辛香利氣之品故可以解

陰心包 能破血止血

感冒氣寒之症 諸藥以散表邪而又加

折傷病和 未畏傷處 根似姜而履長

芍藥和陰氣平發汗之中加甘草和陽

去毛用或蜜拌蒸

氣干疏利之味也 吳綬曰此湯用升麻

益母草 一名 辛微苦寒入手足

疫時氣非正傷寒之藥若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發瘧矣

厥陰 心包 消水行血去瘀生

神水散 治內傷冷飲外感寒邪而無汗

新調經解毒 血去治血風

者內傷冷飲則寒濕停于中經曰形寒

血運血痛血淋胎漏產難崩

是傷寒亦有由內而得者不特外

中帶下 帶脈橫于腰間病生

剛症 太陽傷風後傷寒先傷風後傷濕及太

血白屬氣氣虛者補中益氣

陽過汗濕家過汗產後血虛破傷風皆

而兼升提血虛者養血滋陰

發汗其症頭搖口噤手足拘攣項背反

而兼調氣為經產良藥消疔腫乳

散之藥瞳子散大者忌服

益母子主治略同調經益精

明目血滯病口活血順氣逐

風氣行則血行行中有補治

心煩頭痛血虛面胎產帶筋

令人有子有補陰之功時珍

寔皆可同用若治瘡腫胎產

消水行血則宜並用若治血

分厥熱明目調經用子為良

中自補也產寶濟陰遊魂丹

小暑端午或六月六日採益

母莖葉花寔為未蜜凡治胎

產百病近効方搗汁熬膏亦

忌鉄子微炒用

澤蘭 苦泄熱甘和血辛散鬱

香舒脾入足太陰厥陰脾通

九竅利關節養血氣長肌肉

破宿血調月經消癥瘕散水

腫防已治產後血瀝腰痛行

未吐血鼻洪目痛頭風瘡毒

小損補而不滯行而不峻女

張無汗為剛痙有汗為柔痙亦有剛柔

不分者不可純作風治宜清熱化痰疎

風養血亦有加大承氣者凡陽痙不厥

逆其厥逆者皆陰痙也宜附子湯附子

防風散桂 蒼朮 防風二甘草

加生姜葱白煎如太陽症發熱惡寒脉

沉緊者加羌活浮緊帶洪者是兼陽明

加黃芩浮緊帶弦數者是兼少陽加柴

胡婦人加當歸 此足太陽藥也防風

辛温升浮除風勝濕為太陽主藥蒼朮

甘温辛烈散寒發汗辟惡升陽能引氣

如甘草者然中有緩也按神木白木二

以代桂枝麻黃二湯者也喻嘉言曰此

海藏得意之方益不欲無識者輕以麻

黃桂枝之執傷人也昌明仲 本方除

景不得不表揚海藏之功

蒼朮加白朮二兩姜三片不用葱名曰

水湯海藏治前症有汗者二木主治暑同

之亦治柔痙而有汗為柔痙風

大無神木散 蒼朮浸厚朴各一不

皮去白甘草炙藿香 石菖蒲各錢治

感山嵐瘴氣憎寒壯熱一身盡痛頭面

腫大瘡癰時毒温熱時毒感千口鼻傳

則憎寒湯勝則吐衄流千百節則一身

盡痛上行頭面則為腫大各頭瘡瘡

三

本草備要

科要藥占方澤蘭 時珍曰

蘭草澤蘭一類二種俱生卑

濕紫莖素枝赤節綠葉葉對

節生有細齒但以莖圓節長

葉光有岐者為蘭草莖微方

節短葉有毛者為澤蘭嫩時

並可按音那而佩之楚詞所謂

初秋蘭以為佩是也朱文公

離騷辨證云必花葉俱香燥濕不變

方可列佩今之蘭蕙花虽香

而葉無氣質弱異人呼為香

草俗名孩兒菊夏月采留髮

浸油塗髮去垢中則髮不腫

香澤故各澤蘭蘭草走氣分

故能利水道除痰癖殺蠱辟

惡而為消渴良藥經曰飲食

消渴治之以澤蘭走血分故

能消水腫塗瘡毒破癩除癬

而為婦人聖藥以為今之山

蘭者誤矣防已為使寇宗奭

並以蘭草為山蘭之葉李時

珍考眾說以訊之按別本云

蘭葉甘寒清肺開胃消痰利

水辛烈升陽辟惡燥濕解鬱厚朴苦溫

除濕散滿化食厚腸陳皮理氣通利三

焦甘草印中匡正脾土此即平胃散而

重用陳皮為君者也蓋人之一身以胃

氣為主胃氣強盛則容和不能入故治

外邪必以強胃為先也加藿香白芷蒲取

其辛香通竅亦能辟邪而益胃也吳鶴

臯曰大無此方但理脾胃而解瘴之妙

自在其中不愧 局方神木散 蒼朮

為丹溪之師矣

二川芎白芷羌活藁本細辛炙甘草

每服四錢加姜葱煎治傷風頭痛無

汗鼻塞聲重及風寒咳嗽時行泄瀉頭

汗鼻塞聲重及風寒咳嗽時行泄瀉頭

痛自寒咳嗽是傷風也傷風應有汗若無

汗是挾寒也衄泄下利者清陽不升木

邪冠上風兼溫也蒼朮辛羌芎芷各走

一經去風散汗而勝溫散三陽之邪而

能升清者也加甘

草者緩其中也 許學士神木散

蒼朮一斤 脂麻五錢 芎五枚取肉搗丸

治水飲結成滯囊水飲結成囊囊非蒼

之加脂麻者潤其燥也用 丸製蒼朮散

也肉者補土以制水也

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

士材云蘭葉稟金水之氣故入肺藏東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之言曰陳旸齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為荷蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者各幽蘭非真蘭也故陳旸齋著益蘭說以訊之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者恨名上續斷因花馥郁故得蘭名揚升菴云世以如蒲管者為蘭几啖之受証也久矣又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有枝有莖草之植者也今所

世遂多指為離騷之蘭冠氏本草謂干流俗反疑吳說為非夫醫經為是用豈可評哉今之蘭果可以利水殺虫而除瘴癘乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其上產而辨析若此世俗至今猶以菲蘭為蘭向其惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷初佩以為證竊謂初佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之露露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製芙蓉以為衣集芙蓉以為裳豈真芙蓉可衣芙蓉可裳乎儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經以言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬水經之澤蘭無疑也然離騷不常曰

散之免用麻黃湯者之多所顧忌用代麻黃者之所紛更也 本方去淡豉加生姜名連鬚葱白湯 活人治同

人參敗毒散 活人治傷寒頭痛憎寒壯熱項

強睛暗鼻塞聲重風痰咳嗽及時氣疫

癘嵐瘴鬼瘧或声如蛙鳴赤眼口瘡濕

毒流注脚腫腮腫喉痺毒痢諸瘡斑疹

風寒在表則惡寒發熱頭痛項強風寒

在肺則鼻寒声重痰多咳嗽声如蛙鳴

俗名蝦蟆瘟邪氣臭也風寒濕熱之氣

上于則目赤口瘡下流則足腫傷于腸

明則腮腫結下少陰則喉痺壅于

陽則則則則則則則則則則則則則則

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡

川芎 枳殼 桔梗 茯苓 甘草 五

每服一兩加姜三片薄荷少許煎口乾

舌燥加黃芩脚氣加大黃蒼朮膚痒加

蝉蛻 此足太陽少陽手太陰藥也羌

活入太陽而理遊風獨活入少陰而理

伏風兼能去濕除痛柴胡散熱升清協

川芎和血平肝以治頭痛目昏前胡枳

殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而

除濕消腫甘草和裏而發表人參輔正

春蘭分秋菊乎不又曰結幽蘭而延芳乎不又曰毓石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所云春蘭幽蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屬于孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品摘弄不錄何其不幸若斯之甚也本草殺重之藥最多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉力所優為者也蓋時珍陳方吳場輩皆泥定陳截器以澤蘭比草為一類二種遂併騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有川之者不思若以為一類則

以本經蘭草反列之上品而澤蘭止為中品乎况一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭者皆以為孩兒菊是不特二種一類且四種一類矣而以為九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也思謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也冠氏宋氏之論又安可全非乎姑附愚說以答多識之士

白微 苦鹹而寒陽明衝任之

以匡邪疏導經絡表散邪滯故曰敗毒喻嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一三氣合邪豈易當哉其氣五傳則為疫矣方中所用皆辛平更有人參大力者荷正以祛邪病者口服二三劑使疫邪不復留詎不快哉奈何俗醫減去人參曾與他方有別耶又曰傷寒宜用人參其辨不可不明蓋人受外感之邪必先汗以驅之惟元氣旺者外邪始乘葉勢以出若素弱之人葉雖外行氣從中餒輕者半出不出重者反隨元氣縮入發熱無休矣所以虛弱之體必用人參三五七分入表藥中少助元氣以為驅邪之主使邪氣得藥一湧而出全非補養衰弱之意也即和解藥中有人參之大力者居間外邪遇正自不爭而退舍否則邪氣之縱悍安肯聽命和解耶不知者謂傷寒無補法邪得補而彌熾即痘疹癘痢以及中風中痰中暑

以匡邪疏導經絡表散邪滯故曰敗毒

痘疽產後初時誤不敢用而虛人之遇重病可生之凡悉置不理矣古來表散用五積散參蘇飲敗毒散和解用小柴胡白虎湯竹葉石膏湯等方皆用人參領內邪外出乃得速愈奈何不察耶外感體虛之人汗之熱不退下之和之熱亦不退大熱呻吟津液灼身身如枯柴醫者投窮以為元氣已竭故藥不應手耳倘元氣未竭先用參三五七分領藥深入驅邪何至汗和不應耶東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一二味熱服以散外邪有功千古傷寒科從仲景至今明醫方書無不用參何為今日醫家單除不用全失相傳宗旨使體虛之人百無一活曾不悟其害之也蓋不當用參而殺人者是與芪朮桂姜附等藥同行溫補之候不謂與羌獨柴前芎牛枳桔苓等藥同行汗和之法所致也安得視等砒鴆耶嘉清已未江准大疫用收毒散倍人參去前胡獨活

藥利陰氣下水氣主中風身

熱支滿忽忽不知入陰虛火旺則內

熱生風火氣焚灼故身熱血

支滿痰隨火湧故不知人

厥汗出過多血少陽氣獨上

此症宜白微湯白微當歸各

一兩參五錢日草錢半每服

錢熱淋濕瘧洗洗寒熱酸痛

寒熱作則營氣不肅婦人傷中

能內營故酸痛

淋露血熱千金白微散治胎

微巧藥等分酒調服丹溪曰

此即河間所謂熱甚延孔鬱

結神無所依不能收禁之產

虛煩嘔仲景安中益氣竹皮

調經種子往往用之蓋不孕

緣于血熱血少而其源起于

直陰不足陽勝而內熱故營

血日枯也益陰清熱則血自

生旺而有子矣須佐以歸

地芍藥杜仲從容等藥

似牛膝而短小柔軟去蠶酒

洗用惡大黃大戟山茱萸

艾葉 苦辛生溫熱純陽之

性能回垂絕之元陽通十二

服者盡効萬曆已卯大疫用本方復効

崇禎辛巳壬午大飢大疫道饑相望汗

和藥中惟加入參者多活更有發硯一

症最毒惟加參于消斑藥中全活甚眾

凡飢饉兵荒之餘飲食起居 本方除

不節致患時氣者宜用此法

人參名敗毒散治同有風熱加荆芥防

風名荆防敗毒散亦治腸風下血清鮮

血鮮者為腸風隨感而見也 本方去人

血瘀者為癥毒積久而發也

參加連翹金銀花名連翹敗毒散治瘡

毒除人參加黃芩名敗毒加黃芩湯治

溫病不惡風寒而渴除人參加大黃芒

硝俗硝黃敗毒散治熱毒壅積敗毒散

合消風散名消風敗毒散見風治風毒

癩疹及風水皮水在表宜從汗解者本

方加陳廩米名倉廩散治噤口痢乃熱

心食入即吐卑陳廩米煎

湯治痢後大渴飲水不止

川芎茶調散治諸風上攻正偏頭痛惡

風有汗憎寒壯熱鼻塞痰盛頭暈目眩

正偏頭痛者風中于腦作止無時也中

風故有汗惡風風邪在表故憎寒壯熱

風兼傷于皮毛奏理密緻不得泄越氣

併于鼻故鼻塞人升故痰盛痰熱上攻

故頭暈

目眩

薄荷

荊芥

羌活

白芷

甘草

防風

細辛

每三

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

調經安胎

胎動腰痛下血膠艾湯良阿膠艾葉煎服亦治吐衄崩帶

治虛痢

治虛痢

痛冷痢霍亂

轉筋逐寒濕之

功殺尤治癩

醋煎外科有用

蓉二三錢洗瘡

然後敷藥者蓋人血氣冷必假艾力以佐陽而安性又

能殺虫也

以之灸九火能

透諸經而治百病血熱為病

者禁用

灸火則氣下行入藥則熱上衝不可過劑

○母田氣弱

膈腹冷者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此

陳省長揉搗

如綿謂之熟艾火用婦人

丸散醋煮搗餅再為末用

研則易細前服宜鮮者苦酒

也香附為使艾附丸調婦人

陰艾自明成化來則以新州

艾為勝云灸酒擗一灸便透

延胡索 辛苦而温入手足太

陰脾厥陰肝包經能行血中

氣滯氣中血滯通小便除風

痺治氣凝血結上下內外諸

本草備要 艾草 延胡索

卷三

錢食後茶調服

錢食後茶調服一方加菊花

名菊花茶調散治頭目風熱

痛川号治少陽頭痛細辛治少陰頭痛

防風為風藥卒徒皆能解表散寒以風

熱在上宜于升散也頭痛必用風藥者

以巔頂之上惟風可到也薄荷荆芥並

能消散風熱清利頭目故以為君

能入肝經氣分而搜風同諸藥上行以

升清陽而散鬱火

草者以緩中也用茶調者茶能上清頭

目也湯液云茶苦寒下行如何是清頭

凡頭痛用羌防芎芷辛温等藥由風木

虛土寡于畏寒塞而成痛故用此助肝

以升散之也若服辛散藥反甚

再造散治陽虛不能作汗

者為陽虛不能作汗名曰無陽症庸醫

藥助其汗誤人死者多矣

人參 黃芪 桂枝 甘草 附子 炮

細辛 羌活 防風 川芎 煨姜

枣二枚加炒芍藥一撮煎夏加黃芩石

錢食後茶調服

痛通則癥癖崩淋月候不調

氣血不和因而產後血運暴

疑滯不以時至血上衝折傷積血疝氣危急

為活血利氣第一藥然辛温

走而不守獨用力近宜通經

墮胎血熱氣虛者禁用根

如牛夏肉黃小而堅者良酒

炒行血醋炒止血生用破血

炒用調血

而破瘀血活血瘀行則血活

暴吐紫黑血者吐出為好吐

未及加桃仁紅花行之太抵

鮮血宜行潤燥消腫止痛凡

熱血瘀則治經閉便難血運

口噤胎死腹中非活血行疔

瘡血熱本草不喉痺不通又

能入心經生新血須兼補血

俗用染紅併作胭脂胭脂活

則行血過用能使血行不止

蒸 此足太陽藥也經曰陽之汗以天

之雨名之太陽病汗之無汗是邪盛而

真陽虛也故以參芪甘草姜桂附子大

補其陽而以羌防芎細發其表邪加芍

藥者于陽中斂陰散中有收也昂按汗

血利而後能汗故加芎芍亦以調營節

菴曰人第知參芪能止汗而不知其能

發汗以在表藥隊中則助表藥而解散

也東垣丹溪治虛人感冒多用補中益

氣加表藥

即同此意

大羌活湯治兩感傷寒

內經曰傷寒一

日少陽受之少陽主胆其脈循脇絡于

耳故陽脇痛而且聾四日太陽受之太

陰脈布胃中絡于膈故腹滿而噎乾五

日少陰受之少陰脈貫腎絡于肺繫舌

本故日燥舌乾而渴六日厥陰受之厥

陰脈循陰器絡于肝故煩滿而囊縮而

感者誦一日則太陽與少陰俱病有頭

痛項強而又口乾煩渴也二日則陽明

與太陽俱病有身熱譫語而又腹滿不

飲食也三日則少陽與厥陰俱病有胸

防已 黃芩 黃連 蒼朮 白朮

羌活 獨活 防風 細辛

花古各紅 辛苦甘温入肝經

陽經脈在腰脊絡頭頂故頭項痛腰脊

而斃血生千心包藏于肝屬

千衝任紅花汁與相類

故治血病有產婦血悶而死

名醫陸氏以紅花數十斤煮

湯寢婦于上而蒸之湯冷再

加半日而蘇金匱有紅藍花

酒云治婦人

六十二種風

茵草 色赤入營氣温行滯味

酸走肝而鹹走血木經入厥

陰血分心包能行血止血能

故能止消痰通經

又能止吐崩厥血

酒煎一兩治風痺黃疸五黃

通經甚効

疝谷疝疝瘡黃汗疝女勞疝

此益蓄血發黃不專于濕熱

者也女勞疝必屬腎虛亦不

可以濕坡例治當用四物知

伯壯其水參木培其氣崩運

隨症而用稍溫清執棄

撲損痔瘻瘡癩血少者忌用

根可染絳忌鉄

紫葢 甘鹹氣寒入厥陰血分

心包涼血活血利九竅通二

便性滑治心腹邪氣則熱也水

腫五疸癩癧惡瘡血熱及痘

瘡血熱毒盛二便閉澀者血

刺毒閉得紫葢涼之則血行

而毒出六便利者忌之活幼

甘草炙三 知母 川芎 生地黄兩

每服五錢熱飲 此陰陽兩解之藥也

氣薄則發泄故用羌獨蒼防芎細祛風

發表升散傳經之邪寒能勝熱故用芩

連知母生地防已清熱利濕滋培受傷

之陰又用白朮甘草以固中州而和表

裏之氣升不至峻寒不至凝間能回力

死于一生也仲景書而感無治法又云

兩感病俱作治有先後如

表症急當先救表裏症急者當先救裏

季挺曰表裏俱急者大羌活湯陽症休

痛而不下利者為表急先以葛根麻黃

解表後以調胃承氣湯攻裏陰症身痛

而下利不止者為裏急先用四逆救裏

後以桂枝救表陰陽未分者陶氏神和

湯探之古法一日太陽少陰五苓散主

之頭痛川羌活防風口渴加黃柏知母

二日陽明太陰大柴湯三日少陽厥陰

危甚大承氣加川芎柴胡救之劉宗厚

曰傷寒兼風兼暑不同表裏但真但虛

之異大抵但虛為多脈從陽者可治從

陰者難治

桂枝羌活湯要治瘧疾在處暑以前頭頂

痛脈浮有汗惡風

桂枝 羌活 防風 甘草等 每服

五錢迺其發而服之如吐加坐夏麩無

汗桂枝易麻黃各麻黃防風湯按三湯

機要

本草綱目卷之...

心書云紫草性寒小兒脾寒者可用脾虛者反能作泄古方惟用茸取其初得陽氣以類逐類用發痘瘡令人不達此理一極泄者忌用 去頭用之誤矣 鬚酒洗

之治應是發表通用之劑 此足太陽藥也瘧分六經故倣仲景芩寒例以防風羌活散太陽之邪而以桂枝麻黃分主有汗無汗也 朱丹溪曰凡治瘧無汗要有汗散邪為主芩補有汗要無汗扶正為主芩散邪可問曰瘧發寒熱大作此太陽陽明合病汗出不止知為熱也陽盛陰虛之症不治必傳入陰經桂枝芍藥湯主之桂枝三錢芍藥黃芩湯和之桂枝一兩如寒熱難離大者桂枝黃芩湯和之小柴胡加桂枝知母石羔外邪已罷內邪未已大柴胡大承氣等下之

凌霄花一名紫葳甘酸而寒入厥陰

血分肝心包能去血中伏火破

血去瘀生產乳餘疾崩帶微

瘕腸結便血閉淋悶風疔

血熱生風之症女科多用孕

婦忌之木經云養胎經疏云破血之藥非所宜也

○肺癰用之為君藥者痰香花為末和密陀僧垂調較

酒釀甚驗 簾生花開五斑黃赤

有豨不可近鼻聞傷腦

大小薊 甘温大胡皆能破血

醫方集解卷二

涌吐之劑邪在表宜汗在上焦宜吐

法也若邪在上焦而反下之則逆其性矣經曰其高者因而越之又曰在上者涌之是也先賢用此法者最多

今人惟知汗下而吐法絕不用遇當吐者而不行涌越使邪氣壅結而

不散輕病致重重病致死者多矣○失丹溪曰吐中就發散之義張子

和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故尋

曰吐法其汗以此夫

瓜蒂散仲景治卒中痰迷涎朝壅盛顛狂煩

亂人事昏沉五癇痰壅及火氣上衝喉

不得息食填太陰欲吐不出痰壅上膈火氣上衝

本草綱目卷之... 瓜蒂散... 大小薊... 醫方集解卷二... 三三

下氣行而帶補治吐衄腸瀉
女子赤白沃安胎之功小蘗
力微能破瘀生新葆養精血
退熱補虛不能如大蘗之消
癰腫丹溪曰小蘗治下焦結
氣入陰囊腫痛疼方一人冷
煎大蘗汁服立瘥 兩蘗木
似花如髻大蘗莖高而葉皺
小蘗莖低而葉不皺皆用根
三七一名甘苦微溫散血定痛
治吐血衄血血痢血崩目赤

食用上脫則傷寒如桂枝症頭不痛項
當用吐法 傷寒如桂枝症頭不痛項
不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝喉不
得息者胸有寒也當吐之 汗出惡風頭
枝病但為邪在表今無頭痛項強而脈
微浮胸痞鞭則不在表而未入裡為邪
在胸中胸中與 亦治諸黃急黃 卒然發
表相應故宜吐 氣喘命在須臾曰急黃或
服此散或搐鼻或加丁香
甜瓜蒂赤小豆 一為未熟水或酸薺
水調下量人虛實服之吐時須令閉目
緊束肚皮吐不止者忽白湯解之良久
不出者倉砂糖一塊即吐諸亡血虛家

瘰癧 醋磨塗即散已為金瘡
杖撻藥 杖時先服一二錢
敷之去瘀消腫易愈大抵陽
明厥陰血分之藥故治血病
此藥近時始出軍中恃之從
廣西山東來者略似白及地
黃有節味微甘頗似人參以
末摻豬血中血化為水者真
近出一種葉似菊艾而勁厚
而岐尖莖有赤稜夏秋開黃
花蓋如金絲盤紐可愛而氣
不香恨大如牛蒡味甘極易
繁衍云是三七治金瘡折傷
血病甚効與南中求者不同

老人產婦血虛脈微者俱不可服 若尺
者不宜使服此恐損胃氣若止胸中窒
塞悶亂以物探之得吐即止如探不出
方以此 如頭額兩太陽痛者令病人噉
湯吐之 水一口以此散一字吹入鼻中出黃水
即愈 此足太陽陽明藥也胸中痰食
與虛煩者不同越以瓜蒂之苦涌以赤
小豆之酸吐去上焦有形之物則不得
舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱
者故用參茸 十劑曰燥可去濕桑白皮
赤小豆之屬是也赤豆瓜
蒂並能行水溫痰涎頭痛胸滿寒熱脈
緊不大者並宜此散吐之或問何謂木

本草青芝草三七

本草青芝草三七

地榆 苦酸微寒性沉而瀉

本草未嘗言瀉然能收汗止血皆酸收之功也

除血熱治吐衄崩中

血虛腸風血熱者為陽風隨感而見也血熱者為藏毒積久而發也

風 蘇頌曰古方斷下多用之

宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌

似柳根外黑裏紅取上

截炒黑用稍反行血得髮良

惡麥

蒲黃 甘平厥陰血分藥

心包生則性滑行血消瘀通經脈

利小便祛心腹膀胱寒熱

夫脂治心腹血氣痛名失笑散

療打損傷

瘡癰諸腫

愈宋度宗舌脹滿口御醫用蒲黃于姜末等分捺之愈時珍曰現此則蒲黃之涼血活血可知矣蓋舌為心苗心包相火乃其臣使得手

瀉止一切血崩帶泄精

香

蒲花中蓋屑湯入藥

卷栢 生用辛平破血通經治

本草綱目

臣好一卷二

鬱曰厥陰少陽屬木于令為春乃人身生發之氣也食者陰物也脾胃者坤土也飲食填塞太陰則土盛而反侮水生

氣不得上升而木鬱矣吐去上焦有形之物則木得條達而

獨聖散治太陽中暈

暑也身重痛而脉微身外出之陽反中入內故身熱重痛

以瓜蒂搗去胸中之水則皮中之水自行

本方除赤豆加防

風藜芦名三聖散

和子本方除赤豆加鬱金非汁鵝翎探吐亦名三聖散治中風

風癩痰厥頭痛本方除赤豆加全蝎五

分吐風痰本方加淡豉治傷寒煩悶

瓜

危鼓皆吐劑要知瓜蒂吐痰食宿寒危鼓吐虛煩客熱如木經汗下邪鬱胸脇而痞滿者謂之寔宜瓜蒂散此重劑也

已經汗吐下邪乘虛客胸中而懊惱者為虛煩宜危鼓湯此輕劑也

瓜蒂危子苦參藜芦等劑累吐許白雲先生不透後以附子尖和漿水與之始得大吐也

參蘆散 治虛弱人痰涎壅盛

人參蘆 為末水調下一二錢或加竹

瀝和服

竹瀝此手太陰足太陽藥也

經曰在上者因而越之痰涎上壅法當

涌之病人虛羸故以參芦代藜芦瓜蒂

宜猶帶補不致耗傷元氣也

朱丹溪曰人參補陽

癥瘕淋結多用辛溫止血治

腸風脫肛生石上牽攀如

雞足俗呼萬年松凡使鹽水

煮半日并水煮半日焙用

閨茹 辛寒有小毒蝕惡肉排

膿血殺疥虫除熱痺破癥瘕

內經同烏鴉骨 根如菘菘

皮黃肉白葉長微潤折之有

汁結寔如豆一顆三粒甘草

為使

菴藷子 苦辛微寒 別錄入肝

經血分行小散血散中有補

治陽痿經澁腰膝骨節重痛

產後血氣作痛閃挫折傷

方名能引它見之 用之能引虫則爛 葉似菊

而薄莖似艾而粗苾仁為使

鬱金 辛苦氣寒純陰之品其

性輕揚上行入心及包絡兼

入肺經涼心熱散肝鬱下氣

破血行滯用亦不損正氣治

本草經 鬱金 卷二 首方集解 世 厄子 鼓湯

中之陰若反泄太陰之 陽亦猶麻黃根節不同

梔子 鼓湯 仲景治傷寒汗吐下後虛煩不眠

劇者反覆顛倒心下懊憹及大下後身

熱不退心下結痛或痰在膈中 汗吐下

不足邪氣乘虛結于胸中故煩熱懊憹

煩熱者熱而煩擾懊憹者懊憹悶也

屋動為陽夜臥主陰陽熱未散陰氣未

復故不得眠身熱去而心結痛者執只

入裡則為結胸熱不去而結痛者客

熱散漫為虛煩執仍在表故當越之

梔子 十四 淡豆 四 服令微吐 仲景曰

微澹者不 此足太陽陽明藥也煩為

熱勝梔子苦寒色赤入心故以為君淡

豉苦能發熱腐能勝焦 腎氣為熱心氣

成熱助梔子以吐虛煩故以為臣酸苦

涌泄為陰也此吐無形之虛煩若膈有

寒烈當用瓜蒂散 王海虞曰煩氣也燥

干腎故用梔子治肺煩香豉治腎燥亦

用作吐藥以和在上焦吐之則邪散經

所謂在上者因而越之也或問煩燥皆

心為之何謂煩出干肺燥出干腎曰熱

則煩熱甚則燥煩為陽燥為陰大抵皆

心火為病火旺則金燥而水虧惟火獨

炎故肺腎合而為負燥核大便硬者為

吐症大便秘者為下症若大便微澹者

不可服以裏虛寒在下且煩非蘊熱

也若宿食而煩燥者梔子大黃湯主之

本方加甘草名梔子甘草豉湯 仲景

前

上三

吐衄尿血婦人經血逆行經不

上為吐衄諸症用薑汁未加

非汁姜強重便服其血自淨

痰中帶血血氣諸痛產後敗

者加竹嘔血攻心顛狂失心

頭多善笑症屬不足狂多忿怒人莫能

制症屬有餘此病多因驚憂

痰血塞于心寂所致鬱金七

兩日礬三兩米泔丸服名白

金丸礬五入心散惡瘧毒入

血明礬化頑痰故也心鬱金一兩甘草二兩牛煮

乾磨研末水片五分每用

一不加猪血五七滴新汲水

下治疔痘始有日泡忽插入

腹下黑下蠱毒同升麻服

無膿不吐則下

出川廣体銳圓如蟬肚外黃

肉赤色鮮微香味苦帶甘者

直市人多以

薑黃本草大寒色黃

入脾兼入肝經理血中之氣

下氣破血除風消腫功力烈

干鬱金治氣脹血積產後敗

血攻心通月經療撲損片子

者能入手臂治風寒濕痺

虛臂痛者勿用時珍曰人臂骨

痛其兼埋血中之氣可知

症兼少氣者補之本方加生姜名梔子

生姜豉湯仲景治前症兼嘔者辛以本方

除淡豉加干姜名梔子干姜湯仲景治傷

寒誤下身熱不去微煩者梔子以解熱

誤本方除淡豉加厚朴枳實名梔子厚

朴湯仲景治傷寒下後心煩腹滿梔子通

朴世腹滿亦表本方加大黃枳實名梔

子大黃湯仲景治酒疸發黃心中懊懣或

熱痛亦治傷寒食復輕則消導本方加

枳實名枳實梔子豉湯仲景治傷寒勞復

傷寒新瘵氣血未平餘熱水尺作本方

勞動病者為勞復傷食者為食復

加薤白名薤蕪湯張文治傷寒下利如

爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱症危苦寒

能升能散薤白辛溫能本方加犀角大

青名犀角大青湯治斑毒熱甚頭痛

稀涎散 治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不

通先開其閉令微吐稀涎續進他藥可

令大吐醒後不可大拔藥亦治喉痺不

能進食 皂角四挺去白礬一為末

溫水調下五分或加藜蘆藜蘆能吐風

疾善通頂令

出川廣

陳藏器曰鬱金花其色赤姜黃辛温色黃

我蓮味苦色青三物不同所用各別經疏云姜黃主治介平三稜鬱金之間時珍曰姜黃鬱金我蓮形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血萎黃入脾兼治血中之氣我蓮入肝治氣中之血稍為不同今時以扁加干姜者為片子姜黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色我蓮形似鬱金而色不黃也

我蓮

辛苦氣温入肝經血

分破氣中之血能通肝消瘀

通經開胃化食解毒止痛治

心腹諸痛冷氣吐酸奔豚疝

辛酒醋磨服疝音賢小腹積疝疝癖多見于男子癥瘕多見于婦人我蓮香烈行氣通竅同三稜用治積聚諸氣良按五積心積口伏梁起脐上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息音在右脇脾積曰痞氣在胃腎右側腎積曰奔豚在小腹上至心下治之不宜需用下藥恐損直氣宜于破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰人積大聚其可犯也衰其大半而止過者死東垣五積方用三稜我蓮皆兼人參黃助成功按治積諸藥神曲麥芽化谷食蒸飯化楚食神砂阿魏山查化肉食紫

人 此足太陰厥陰藥也吳鶴臯曰清

陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆也若濁邪逆上則清陽失位而倒置矣故令人暴仆所以痰涎壅塞者風盛氣湧使然也經曰病發于不足標而本之先治其標後治其本故不與疏風補虛而先吐其痰涎白礬酸苦能湧泄鹹能軟頑痰故以為君皂角辛能通竅鹹能去垢專制風不故以為使固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疏通能進

湯藥便止若盡攻其痰則無液以養筋

令人驚急偏枯此其禁也痰不可盡

也宋曰溪曰胃氣亦賴痰以養不可盡攻攻則虛而愈劇

張子和加藜蘆常山甘草名常山散吐

瘧痰山必吐本方加雄黃藜蘆名如

聖散為末擗鼻治纏喉急痺牙關緊閉

乾霍亂吐方因治乾霍亂欲吐不得吐欲

泄不得泄腹中大痛者霍亂揮霍撩亂

有所傷陰陽乖隔邪正交爭故上吐下

泄而中絞痛也邪在上焦則吐在下焦

則泄在中焦則吐泄交作此濕霍亂症

輕易治若不能吐則邪不得出壅遏正

氣

蘇化魚蟹毒葛花枳椇消酒
積毒香消菜積集積壅牛先
芫大戟行水飲三稜莪菝蘇
甲消癥瘕木香枳櫛行氣滯
礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷
積大黃芒硝攻塊積雄黃膩
粉攻涎積重虫雖為泄劑亦
水蛭攻血積王好古曰故治氣短
能益氣不能接續大小七香
九集香丸諸湯根如生薑
散中多用之
莖生根下似卵不齊堅硬難
搗灰火煨透乘熱搗之分入氣
或醋磨酒磨或者熟用入血
荆三稜 苦平色白屬金皮黑

氣閉格陰陽其死甚速俗名攪腸
沙切勿與谷食即米湯下咽亦死
燒鹽 熱童便 三飲而三吐之
此足太陰陽明藥也吐瀉不得邪結中
焦鹹能軟堅可破頑痰宿食炒之則苦
故能涌吐童便本人身下降之氣引火
下行乃其舊路又鹹寒故降火甚速此
脾上鬱極而不得發以致鹽涌于上
火熱內擾陰陽不交而然鹽涌于上溺
泄于下則中通矣方極簡易而有回生
之功不可忽視准繩口監湖童便非獨
既不通血亦不行 本方單用燒鹽熟
須兼用行血藥也

入肝經血分破血中之氣亦通
肝經 兼入脾經散一切血瘀
氣結痞硬食停老塊堅積乃
者劑之從血藥則治血從氣
藥則治氣須輔以健脾補氣
藥良昔有人患癥瘕死遺言
開腹取之得病塊如石文理
五色劑成刀柄因刈三稜柄
消成水乃知此藥可瘕癥瘕
消腫止痛通乳墮胎功近香
附而力峻虛者慎用 色黃
体重若鯽魚而小者良醋浸
炒或麵裹煨

水調飲以指探吐名燒鹽探吐法治傷
食痛連胸膈痞悶不通手足逆冷尺脈
全無食填太陰即過肝胆之氣不得上
舒故手足逆冷下焦膈絕故尺脈不至
鹹潤下而軟堅能破積聚又能宣涌使
不化之食從上而出則塞者通矣亦水
鬱達之也昂按此即中食之症有忽然
厥逆口不能言肢不能舉者名曰食厥
若作中風中氣治之死可立待宜先以
鹽吐之再行消食導氣之藥經曰上部
有脈下部無脈其人當吐不吐者死或
曰食填太陰胸中痞亂兩寸脈當用事
今反尺脈不見其理安在曰獨陽不生
獨陰不長天之用在于地下則萬物生
長地之用在于天上則萬物收藏此乃
天地交而萬物通也故陽火之根本于
地下陰水之原本于天上五藏主有形

白茅根 甘寒入手少陰心足

太陰陽明胃補中益氣除伏

執消瘀血利小便解酒毒治

吐血諸血心肝火旺逼血上

引火下降故治之損瘀血

亦治鼻衄產後血閉寒熱

傷熱噦逆即呃逆說文曰噦

者未是肺熱喘急內熱煩渴

黃疸水腫清人行水時珍曰

而勿心之惟事苦寒之劑傷

中和之氣鳥足知此哉

針潰瘡病酒者服一針潰

蘆根 甘益胃寒降火治嘔噦

反胃胃熱火升則嘔逆食不

消渴客熱傷寒內熱止小便

女肺為水之上源脾氣散精

下輸膀胱腎為水藏而主二

便三經有熱則小便拔甚至

中氣故入心補清土焦熱熱

解助肺之氣化行而解魚蟹

河豚毒 取逆水肥厚者去

之物物者陰也陰者水也食寒于上足

絕五臟之源源絕則水不下流而尺之

其理也千金用此法三飲三吐通治霍

亂蠱毒宿食腹痛冷氣鬼氣且白此法

凡有此疾宜先用之

醫方集解卷上之四

攻裏之劑邪在表宜汗邪入裏宜下

空纖芥之邪防有滯得則壅塞經絡

隔滯陰陽而為病矣或寒或熱或氣

導之重必攻而下之使垢瘀盡去而

後正氣可復譬之寇盜不勦境內終

不得平安也然攻下之前須適事為

宜如邪盛而劑輕則邪不服邪輕而

劑重則傷元氣不可不審也其珍而

見消導門

大承氣湯治傷寒陽明症陽邪入裏

胃實不大便秘執譫語自汗出不惡寒

痞滿燥寔堅全見雜病三焦大熱脈沉

六經百病

鬚節用

芋根 甘寒而滑補陰破癆

熱潤燥治天行熱疾大渴大

狂胎助下血諸淋血淋搗貼

赤遊丹毒瘰癧發背金瘡傷

折止血雞魚骨硬鳩如就膠

汁能化血行水芋皮與產婦

作梳止血運安腹上止產後

腹痛散痲滙亭汁療消渴

薺薇根 苦澁而冷入胃六腸

經除風熱濕熱生肌殺虫治

泄痢消渴牙痛口糜煎汁

尿好眠瘰癧瘡癬 花有黃

白紅紫數色以黃心白色粉

紅者入藥子名實酸温主

治畧高于全日黃散眼角高

在多有開淡紅紫花角微管

長二寸許辛苦有小毒治惡

瘡有虫及

口齒瘡

芭蕉根 味甘大寒治天行熱

狂煩悶消渴後血脹並搗

汁服

寔者陽明外症身熱汗出不惡寒反惡

邪之人胃府痞滿燥是堅全見者為當

下宜則謬語亂言無次也虛則鄭一

語煩言也陽明多血多氣法多自汗過

汗亡液無水以制火胃有燥糞結而不

下故妄見妄言也燥糞注大腸不在手

胃傷寒傳胃不傳大腸然治病必求其

本且胃虛太陽同為陽明燥全也經曰

何緣得陽明病曰太陽病若下若汗若

利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬胃

明胃寔大便難也又白大陽初病發其

汗汗先出不徹因轉屬陽明陽明症能

食為中風風陽邪能消谷不能食為中

寒寒陰邪不能消谷以此為辨口胸悶

不食為痞胸腹膨脹為滿大便節少為

燥腹滿痛不大便為

亦治陽明剛症此

寔按之剛硬為堅

陽兼陽明症其症胸滿口噤臥不著席

寧足斷齒而無汗謂之剛症宜下之者

以陽明主潤宗筋風寒濕熱傷陽明胃

津液不行筋失所養故以此湯下濕熱

行津液喻嘉言曰傷寒腹滿可下胸滿

不可下謂熱邪尚在表也此症入裏之

熱極深極重陽熱既極陰血立至消亡

其

一

下

之

以

承

領

而

得

生

者

多

矣

既

有

下

救

陰

之

活

法

學

者

深

造

端

在

斯

矣

胃

已

人

胃

則

不

復

傳

也

經

知

太

陽

傳

人

胃

則

不

傳

三

陰

經

目

明

居

中

土

也

萬

物

所

且

無

所

復

傳

大

黃

酒

不

到

大

黃

若

用

生

者

則

遺

高

分

之

邪

熱

病

愈

後

變

生

日

赤

芒

硝

合

厚

朴

煎

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

五

先

煎

枳

實

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

五

先

煎

枳

實

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

五

先

煎

枳

實

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

五

先

煎

枳

實

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

五

先

煎

枳

實

將

熟

肉

大

黃

煮

斤

枳

實

本草備要

塗瘰腫結左為末油調敷

大黃 大苦大寒人足太陰脾

手足陽明厥陰大腸胃心包肝

其性浮而不沉其用走而不

守若酒浸亦能引致至高之

分仲景大腸門調胃承氣湯

大黃註曰酒浸陽明門大

承氣湯大黃註曰酒洗少陽

陽明小承氣湯大黃不用酒

製皆宜分別東垣曰邪氣在

土非酒不至若用生者則遺

至高之邪熱病愈後或目赤

喉痺頭腫膈土熱疾生也

用以湯滌腸胃下燥結而除

痲熱治傷寒時疾發熱諸語

大陽有燥糞故語

語宜下之諸音占溫熱瘰瘡

下痢赤白腹痛裏急黃疸水

腫癥瘕積聚積久成形謂之

常謂之聚屬陽積多是宿食心腹痞滿二便不通

血或食或痰聚多是氣留飲

之 吐血衄血血閉血枯損

傷積血一切實熱血中伏火

行水除痰餓腫消腫能推陳

本草備要 大黃

卷二

本草備要

二三沸傾碗內和芒硝服得利則止陶

菴曰去寒熱用大黃無積寔不通溫經

用附子無干姜不熱發表用麻黃無葱

白不發吐痰用瓜蒂無痰咳不涌竹瀝

無姜汁不能行經絡蜜導無皂莢不能

通秘此正陽陽明藥也東垣曰大九

淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱

盛者以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤

燥軟堅大黃之苦寒以泄熱去瘀下燥

結泄胃強忍實厚朴之苦降泄痞滿實

滿經所謂士鬱奪之也陽明屬土大黃

大燥大堅二味治有形血莖厚朴治

大滿燥寔治痞二味治無形氣藥然

非大寒大滿不可輕投恐有寒中結胸

痞氣之變此大小陷胸湯之所由作也

泄可去閉使塞者利而閉者通正氣得

舒故曰承氣仲景曰欲行大承氣先勻

小承氣君腹中轉失氣者有屎屎也可

以大承氣攻之若不轉失氣者此但初

鞭後痞不可攻之攻之則脹滿不能食

也又曰陽明病脈遲汗出多微惡寒者

去未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈

浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯此

斷其人陽明之路仍從外解則不內攻

四十四

亡若病在氣分胃虛血弱人

禁甯 病在氣分而用之是為... 陳致和如定禍亂以致太平... 所以有將軍之號時珍曰伸... 景瀉心湯治心氣不足吐衄... 血者用大黃黃連黃芩乃瀉... 心包肝脾胃四經血中之伏... 火也又治心下痞滿按之軟... 者用大黃黃連瀉心湯亦瀉... 脾胃之濕熱非瀉心也病發... 于陰而反下之則病滿乃寒... 傷腎血和結上焦胃之上脫... 當心故曰瀉心經曰太陰所... 至為痞滿又曰瀉氣在上則... 主腹脹是已病發于陽而反... 下之則結胸乃熱邪陷入血... 分亦在上脫故大陷胸湯亦... 皆用大黃亦瀉脾胃血分之...

邪而降其濁氣也若結胸在... 氣分只用小陷胸湯痞滿在... 氣分只用半夏瀉心湯或問... 心氣不足而吐衄何以不瀉... 心而反瀉心丹溪曰少陰不... 足亢陽無輔致陰血妄行故... 用大黃瀉其亢甚之火又心... 本不足肝肺各受火邪而病... 作故用黃芩救肺黃連救肝... 肺者陰之主肝者心之母血... 之合也補肝火退則血歸經... 而目安矣寇宗奭曰以苦泄... 其熱就以苦補其心蓋一舉... 而兩得之李士材曰古人用... 大黃治虛勞吐衄意甚深微... 益瀉陰不降則清湯不升瘀... 血不去則新... 血不生也 川產錦紋者... 夏有酒浸酒蒸生熟之不同

畧見一二即從少陽而不從陽時汗下... 兩不可用也惟風寒之邪已離太陽未... 接少陽恰在陽明界內極為攻下則不... 再傳他經津液元氣兩無虧損矣庸患... 無識必待七日傳經已盡方敢說下不... 知太陽有十餘日不解者若不辨經而... 但計日其誤下仍在太陽至陽明二三... 日內即顯下症反以計日當面錯過及... 陽明已入少陽又以計日妄行攻下輕... 者重而重者死矣仲景佳目數雖多但... 有表症而脈浮者猶宜發汗日數雖少... 若有裏症而脈沉者即宜下之●古人... 有治惡寒戰慄用大承氣下燥屎而愈... 者此陽邪入裏熱結于裏表虛無陽故... 惡寒戰慄此陽盛隔陰乃熱病非寒症... 誤投熱藥則死矣朱丹溪曰初下痢腹... 痛不可用參本然脾胃虛者可用初... 得之亦可用大承氣調胃瀉氣下之看... 是氣病血病然後加減用藥常治葉先... 生患滿下後甚逼迫方合承氣症沮氣

口虛形雖實而面黃曰此必平昔過食... 傷胃寧忍二三日辛苦遂與參朮陳芍... 藥十餘帖至三日後胃氣稍完與承氣... 二帖而安苟不先補完氣胃之傷而遽... 行承氣寧免後患乎此 本方加甘草等... 先補後下例之變者也 分名三一承氣湯治大承氣症腹滿實... 痛調胃症謔語下利小承氣症內熱不... 便一切傷寒雜病畜熱內甚燥實堅脹... 謂合三承氣為一方也成無已曰若大... 承氣症反用小承氣則邪不服若小承... 氣症反用大承氣則過傷元氣而腹備... 不食仲景所以分而治之後人以三... 藥合而為一云通治三藥之症及傷寒... 雜病內外一切所傷與仲景之方甚相... 違矣夫軒岐緩急之旨使 本方加柴胡... 病人暗受其弊將誰咎哉

本草綱目卷之... 醫方集腋卷之... 上四

生用更峻黃芩為使利者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷聖志湯火傷者搗生大黃酢調敷止痛無癢

黃芩 苦入心寒勝熱瀉中焦

實火除脾家濕熱治泄痢腹

痛便血曰澀寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰濕之不同寒宜溫熱宜清虛宜補宜直下食宜消導痰血宜行散痰濕宜化痰利濕痛時手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛按為虛痛 寒熱往來邪在黃

直五淋血閉實熱化氣逆難

疝瘕瘕及諸失血消痰白芍

苓除痰假其降火也按利水

解渴安胎胎孕宜清熱涼血

養陰退陽補膀胱水洒炒則

上行瀉肺火利胸中氣肺主

傷氣瀉熱治上焦之風熱濕

所以保肺治上焦之風熱濕

丸丹侯口黃芩火嗽喉腥五

目赤腫痛過服損胃血

虛寒中者蘇角得柴胡退寒

刺得厚朴黃連止腹痛得桑

本草備要 草黃芩

卷二

黃芩甘草入鐵繡水三匙墜熱開結名

六一順氣湯節菴謂合三承氣三一承

為一治潮熱自汗發渴譫語狂妄玃黃

腹滿便實正陽明府病本方加人參甘

草當歸桔梗薑棗煎名黃龍湯治熱邪

傳裏胃有燥屎心下硬痛身執口渴譫

語下利純清有燥屎何以又下清水

利乃日飲湯藥而下滲也名熱結利庸

醫家謂漏底傷寒以熱藥止之殺人多

矣年老氣血本方去芒硝加麻仁杏仁

芍藥蜜丸名麻仁丸神治跌陽脈浮而

濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏

大便則難其脾為約飲食人胃游溢精

氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調

水道下輸膀胱水精四布五經並行是

脾主為胃行其津液者也今胃火乘脾

約束津液但輸膀胱致小便數而大便

難故名脾約與此湯潤燥通腸此太陽

傳入陽明之證故仲景曰太陽陽明脾

約是也按成氏釋此症謂脾弱胃強然

本文但云脾約未嘗云脾弱也喻嘉言

曰脾弱即當補矣何為反用大黃朴實

乎此脾土過燥使腸胃津液枯槁致中

消使難使脾果弱非濇則瀉焉能反約

醫方集解 卷二 承氣湯

是

上

藥時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合症下利黃芩湯少陽症下後心滿瀉心湯病用之蓋黃芩苦寒人心瀉熱除脾家濕熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜若苦寒傷上損其母也少陽症雖在半表半裏而胸膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔熱不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也揚士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火燎煩躁引飲而盡盛者宜一味黃芩湯以瀉肺氣分之火黃芩一兩煎服本單方用

治崩中 暴下 黃明者良中虛者

名枯者即片芩瀉肺火清肌表之熱肉實者名條芩即子芩瀉腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱萸骨為使畏丹皮丹砂黃連 大苦大寒入心泄肺主

藏曰泄心實泄脾 寧肝涼血也其則泄其干 凡治血防風為上部之使黃連為中部之使地榆為下部之使燥濕開鬱解滑用能除使燥濕開鬱解滑用能除

即未丹溪曰此由久病大汗大下之後陰血枯槁內火潘灼熱傷元氣又傷于脾而成肺金受火氣無所攝脾為肺子肺耗則液虧金耗則木寡于畏土欲不傷其可得乎肺失傳送脾失轉輸故大便秘而小便數也理宜滋養陰血使火不熾而金化行木有利而脾土運津液乃能入胃腸潤而通矣此方施之熱盛而氣實者則安若熱盛而氣血不實者勿膠柱而鼓瑟也

當下諸症 發汗不解腹滿痛者急下之

下利三部脈皆平按之心下鞣者急下之 脈滑而數者有宿食也宜下之脈浮曰滑為食病仲景曰滑則穀氣實又曰寸脈浮大按之反濇尺中亦微而濇知有宿食宜下之 傷寒六七日日中不了了時時無表裏症大便難身微熱者此為實也急下之內經曰諸脈皆屬于目針經曰熱病目不明熱不已者此腎水將絕不能照物也

陽明病發熱汗多者急下之汗多則亡津液而內燥宜急下以存津液 少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之邪入未深便作口燥此腎水將乾宜急下以救欲絕之水 少陰症六七日腹脹不大便者急下之此少陰邪熱入胃腑也上勝則水乾宜急下以救腎水 少陰病自利清水色純青心中必痛口中燥者急下之青為肝色肝邪乘腎故下利陽邪上攻故口燥此亦少陰傳入陽明府症也 厥陰症舌卷囊縮宜急下之此症仲景無治法按舌卷囊縮有寒絀而絀者宜附子四逆加吳茱萸湯併灸關元氣海葱熨等法又有陽明之熱陷入厥陰經陽明主潤宗筋宗筋為熱所收弗榮而急引舌卷囊縮以上皆囊縮此為執也 當泄陽以救陰以上皆大承氣症也張兼善口胃為水谷之海四方有病皆能傳入胃土燥則腎水乾故陽明與少陰皆有急下之條症雖不

木青黃連黃芩 卷二 六經 四

煩益肝胆厚腸胃消心疾能

心厥止盜汗治湯瀉瀉痢

便血日瀉有瘕連九濕熱鬱
而為痢黃連治痢要藥噤口
者熱壅上焦同人參煎湯喝
之但得下咽便好喻嘉言曰
下痢必先汗解其外後調其
內百用辛涼以解表次用苦
寒以攻裏執要云後重宜下
腹痛宜和身重宜除濕脈弦
宜去風七邪內結宜汗身冷
自汗宜溫膿血稠枯宜重劑
以竭之下痢赤屬血分白屬
氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒
者非也通作濕熱也治瀉滿
但有積久虛實之分小瀉
燥濕開鬱仲景治九種心腹
下痞五苓散心湯皆用之

痛熱心痛伏梁自痛皆傷

人乳漬點或合且芍等
分煎易熱先散熱活血癰疽
瘡疥諸痛庠瘡酒毒胎毒小
初生合甘草為明目傳信方
未蜜調合熨之

其黃連一兩湯丸凡見定驚
日疾皆治名羊肝丸

鎮止汗解毒除甘同猪肚殺
虬虬得苦虛寒為病者禁用

久服黃連苦參反熱從火化
也昂按炎土作苦味苦必燥
燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺
伐傷生和之氣也韓想曰黃
連與肉桂同行能交心腎干
頃刻時珍曰治痢用杏連丸

本草黃連 卷二

同其入府之理則一故皆用大承氣有
病循衣摸床兩手撮空者此胃熱也錢
仲陽小兒古訣云此肝熱也亦承氣湯
主之委全善日嘗治循衣摸床故人皆
用大補氣血之劑惟一人兼振脈脈代
遂干補劑中加桂二分亦振止脈和而
愈按語亦有因氣虛陽脫
而然者皆當用參附補劑

忌下諸症太陽病外症未解不可下
惡寒不可下惡寒為邪在表嘔多
虽有陽明症不可下嘔為邪在上焦
陽明病不能食攻其熱必致胃中虛冷
故也瓜陽七明合病喘而胸滿不可下
宜麻黃湯肺氣清則胃邪自散少陰
病陽虛尺脈弱瀉者不可下脈數不
可下數為血虛為熱下之則熱邪入裏
血虛為亡陰惡水者不可下下之則
裏冷不嗜食完谷出頭痛目黃者不

下之痞鞭一諸四逆厥者不可下
小承氣湯中景一名三治傷寒陽明症
語便鞭潮熱而喘及雜病上焦痞滿不
通 大黃四厚朴二兩枳實三枚
此少陽陽明藥也邪在上焦則滿在中
焦則脹胃實則潮幸有時陽明燥金旺
干申酉故日晡潮熱傷寒潮熱為胃實無虛症
故語胃熱于肺則喘故以枳朴去上焦
之痞滿以大黃蕩胃中之寔熱此痞滿
燥寔寔未全者故除芒硝欲其無傷下

燥寔寔未全者故除芒硝欲其無傷下

姜連九用黃連干姜黃散
用黃連生薑左金丸用黃連
吳茱萸治口瘡用黃連細辛
止下血用黃連大蒜一陰一
陽寒因熱用熱因寒
用最得製方之妙

出宣

州者粗肥出四川者瘦小狀
類鷹爪連珠者良去毛治心
火生用虛火醋炒肝胆火猪
胆汁炒上焦火酒炒有吞酸
症亦有上酸者名醉心宜黃
連吳茱萸降火開入醉音醋
中焦火姜汁炒下焦火鹽水
或童便炒食積火黃土炒治

濕熱在氣分吳茱萸湯炒在

血分乾漆水炒點眼赤人乳

浸時珍曰諸法不獨為之引
導蓋辛熱制其苦寒燥寒
制其燥性黃芩龍骨為使惡

用者詳之

菊花玄參殭蚕白鮮皮畏欬

冬牛膝忌猪肉時珍曰方有
藏連丸黃連

豬肚九豈忌肉殺烏頭巴豆
而不忌藏府子

毒黃連泄心火佐以龍胆泄
肝胆火白芍泄脾火石羔
泄胃火知母泄腎火黃柏泄
膀胱火木通泄小腸火黃芩
泄肺火梔子佐之泄大腸火
黃連佐之泄三焦火黃芩佐

本草綱目 草黃連

卷二

醫方集解 卷二 調胃承氣湯

五

十四

焦真陰也

大承氣通治三焦小承氣不
按陽明定有正陽陽明有太陽陽明有
少陽陽明自陽明經傳入胃府不惡寒
腹滿便鞭者宜大承氣下之苦汗多發
熱微惡寒者為外未解其熱不潮未可
與承氣湯若瀉大滿不通者可與小承
氣微和胃氣勿令大泄下謂陽明有在
經者未全入府尤宜審慎陽明少陽病
多由太陽傳大成無已自太陽少陽
傳入者眾所共知自三陰傳入者鮮或
能識三陰有急下之症多矣豈非仲景
之微旨歟經曰傷寒時浮後手足溫者
緊在大陰當發黃若小便利者不能發
黃至七八日大便鞭者陽明病也程郊
倩曰此症謂之太陰陽明陽明為病本
之胃寔不特三陽受邪能轉屬陽明三
陰亦能轉屬陽明惟之少陰三大承氣
厥陰一小承氣何非
轉屬陽明之病哉

金匱用本方治

支飲胸滿更名厚朴大黃湯本方加羌

活名三化湯治中風邪氣作實二便
不通

三化者使三焦通利復其傳化之
常也加羌活者病本于風也然中
風多虛氣上逆無用承氣之
理非堅寔之体不可輕投

調胃承氣湯治傷寒陽明症不惡寒反
惡熱口渴便閉譫語腹滿中焦燥實及

傷寒吐後腹脹滿者邪在表則身熱汗
出而惡寒邪已入
裏則表症罷故不惡寒身熱汗出而反
惡熱也汗多亡津熱久入裏故口渴便
閉無水以制火內有燥屎故妄見妄言
而譫語吐後不解腹脹滿者邪入胃也
然滿而不痛不宜急
下少與調胃和之

陽明病不吐不下

陽明病不吐不下

陽明病不吐不下

陽明病不吐不下

陽明病不吐不下

之○鄂莫一也抗鬱惡心兀兀欲吐用黃連散分甚効

胡黃連 苦寒去心熱益肝胆

厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩

熱心膏手三消湯而多飲為上消肺熱也

心移熱干肺傳為腸消是也

多食善飢為中消胃熱也痺

成爲消中是也渴而小便數

自膏爲下消腎熱而水虧也

五痔牝痔牡痔脉痔腸痔血痔痔痔濕熱下流傷血分無所施洩則通肌濕瘧泄痢女

人胎蒸消菓子積爲小兒驚

疳良藥朱二九日解吃烟生毒台茶服之甚効小

味功用似黃連故名出波斯

國今秦隴南海亦有之心黑

外黃折之塵出如烟者真異

惡同黃連 苦參 苦燥濕寒勝熱沉陰主

腎補陰益精補肝胆安五藏

濕熱去則血氣和平而五藏自安 利九竅生

津止渴明目止淚淚為治溫肝熱

病血痢純下清血者風傷肝也宜散風涼血下如

也宜清熱滲濕 腸風瀉亦黃

本草綱目 草胡黃連 苦參 卷二 醫方集解 卷二 調胃承氣湯 上四

而心煩者吐後煩為內煩下後煩為虛煩不吐不下心煩者胃有鬱也亦治渴症中消善食而瘦

大黃酒浸芒硝而甘草炙五少少溫服

此足太陽陽明藥也東垣曰正陽陽明藥大黃苦

寒除熱蕩實芒硝鹹寒潤燥軟堅二物

下行甚速故用甘草甘平以緩之不致

傷胃故曰調胃承氣去枳朴者不欲其

犯上焦氣分也準繩曰陽明一病分爲大陽正陽少陽三等按

本草大黃酒浸入太陽經酒洗人陽明

經浸久干洗故能引干至高之分仲景

以調胃承氣收入太陽門而大黃註曰

酒浸湯後日少少溫服日當和胃氣又

本湯治不吐不下心煩者及發汗不鮮

蒸蒸發熱者吐後復脹滿者是太陽陽

明去表未遑其病在土不當攻下宜

緩劑調和之也至正陽陽明則曰急下

之而大承氣湯大黃下註曰酒洗既輕

下侵是微升其走下之性以治其中也

至少陽陽明則去正陽而逼太陰其分

爲下故小承氣湯大黃下酒製少陽

不宜下故去芒硝又日少與日微滯

之勿令大泄下此仲景之法也

本方加當歸芍藥煎名當歸承氣湯

治裏熱火鬱或皮膚枯燥或咽燥鼻乾

或便溺秘結或瘀血發狂加當歸人血營亦與桃仁承氣同

黃甘草湯金匱用治食已即吐外臺用

痘酒毒熱生風濕生虫又能
祛風逐水殺虫治大風疥癩
然大苦大寒肝腎虛而無熱
者勿服張從正曰凡藥皆毒不謂之毒久服必偏勝為患經曰五味入胃各凡其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也玉水註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴天筆談去久用苦參擦牙逐病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九谷肉果菜食養盡之无使過之傷

治吐水準繩曰伊景云欲吐者不可下也日欲吐者其病在上因而日之可也而逆之使下則必抑塞潰亂而益甚若已吐不止有升无降則當逆而折之引令下行无速于大黃者矣故不禁丹溪泥之而日凡嘔吐本方用大黃二兩半芒硝甘草各二兩又名破楮丹治多汗大渴便閉譫語陽結之症及諸瘡腫
桃仁承氣湯仲景凡血門
大陷胸湯仲景治傷寒下之早表邪入裏心下滿而鞭痛或重汗而腹下之不大便五六日舌上燥渴日晡潮熱從心至小

其正也按八參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆備 糯米
泔浸去腥氣蒸用玄參為使
惡貝母兔絲子漏盧反藜芦
苦參一兩或酒煎或醋煮能吐天行時毒
知母 辛苦寒滑上清肺金而瀉火泄胃熱膀胱邪下潤腎燥而滋陰入二經氣分黃相經血分故二藥必相須而行消痰定嗽止渴安胎莫非清火之用治傷寒煩熱

腹鞭滿痛不可近或無大熱但頭微汗出脉沉為水結胸按之鞭痛者為結胸不便不痛心下清悶為支結結胸最重痞次之支結又次之結胸由于下之大早裏之正氣為邪所損表邪乘虛入結下心胸之間故石韌而痛重汗復下內外皆亡津液邪熱內結故不大便而舌上燥渴邪入陽明則口晡潮熱或水飲結于胸脇但頭微汗餘處无汗水飲不得外泄非熱結也名水結胸亦有惡已入裏久不攻之失下而成結胸者又有心下硬痛無熱症者為寒凝結胸小陷胸及白朮散主之結胸固當下然脉浮大者下之則死猶帶表邪下之重虛結而及結故死喻嘉官曰太陽誤下之脉主病皆在陽在表即有沉緊沉滑之脉皆不得以裏陰名之按仲景曰病發于陽而反下之熱入因作結胸病發于陰而

蓐勞 勞骨蒸 退有汗 燥渴虛

煩入虛下痢 治嗽者清肺火

利二便消浮腫 火也退骨蒸也

小便利則腫消東坦曰熱在

上焦氣分便閉而渴乃肺中

伏熱不能生水膀胱絕其化

源宜用淡滲之藥泄火清金

滋水以化源熱在下焦血分

便閉而不渴乃真水不足膀胱

乾涸無陰則陽無以化宜

用黃柏知母大苦寒之藥滋

腎與膀胱之陰而陽自化小

便自通丹溪曰小便不通有

熱有濕有氣結于下宜清宜

燥宜升又有隔三隔三之治

如肺不燥但膀胱熱宜泄膀胱

此正治如因肺熱不能主

水則清肺此隔二之治如因

脾濕不運而精不上升故肺

不能生水則燥胃健脾此隔

三之治世膀胱黃相知母之

類清肺車前茯苓之類燥脾

二木之類昂按凡病皆有隔

二隔三之治

不獨便閉也

然苦寒傷胃而

滑腸多服令人瀉 李上材曰

反下之因作痞皆以下之太早故也成

元巳日發熱惡寒者發于陽也陽邪人

裏為結胸无熱惡寒者發于陰也陰邪

人裏為痞喻嘉言曰風為陽衛亦陽故

病起于陽寒為陰營亦陰故病起于陰

周陽後日發陽發陰二千年來未有知

其解者果如原註无熱惡寒則中寒矣

下之有不引斃者乎如嘉言以寒傷管

血為陰則仲景痞論中風傷寒每每

互言未嘗分屬也不知發于陰者洵是

陰症但是陽經傳入之邪非中陰之謂

也陽經傳入原為熱症至于陰經未有

不熱深于內者此所以去熱人二字而

成于載之疑也熱症由三陰傳于胃已

入府者為可下若在經而下則為誤下

與三陽在經无異故曰陽邪結于陽位

則結在胸陰邪結于陰位則在心下或

邊旁也陰經誤下何以止成痞以所結

只在陰位不若陽邪熱重也○六書云

胸膈滿者胸開氣塞滿悶也非心下滿

脇滿者脇助脹滿也非腹中滿蓋表邪

傳裏必先胸以至心腹入胃是以胸滿

多帶表症宜微汗脇滿多帶半表半裏

宜和胸中結寔者宜涌之如結寔燥渴

便秘宜以此湯下之附白散巴豆一分

去必皮炒黑研貝母楮梗各三分治寒

必吐病在膈下必利也

大黃 兩芒硝一斤甘遂二兩

先煮大黃去

滓內芒硝煮一二沸內甘遂未溫服

此足太陽藥也表邪入裏結于高位以

致三焦俱寔手不可近症為危急非常

藥所能平故以甘遂苦寒行水直達為

本

草

滿

要

草

滿

要

草

滿

要

草

滿

要

草

滿

要

草

滿

要

泄其邪熱即兼入膀胱腎經所以補之也
除下焦之濕熱與防已同功
酒浸亦能外行上行治骨間
寒熱腎主驚癇邪氣肝經時
氣溫熱熱痢疽黃寒濕脚氣
足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為溫脚氣宜清熱利濕搜風又有牽縮枯細痛而不腫者名乾脚氣宜養血潤燥
咽喉風熱赤睛努肉泄肝胆
日元素曰柴胡為主龍胆為使目疾要藥昂按若目疾初起宜發散
忘用寒涼

君芒硝鹹寒軟堅為臣大黃苦寒瀉滌為使三藥至峻而有起死之功
中處至高之分宜若何吐然邪氣與胸中陽氣相結不能分解壅于心下為鞭為痛非虛煩腦寔者所可同故須攻下也低者舉之高者陷之以平為正故曰陷胸也經又曰太陽症脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊憹陽氣內陷心下因硬而為痞胸大陷胸湯主之朱丹溪曰太陽病在表而攻裏可謂虛矣原文曰太陽病脈浮而動數今得誤下動數變遲矣又曰胃中空虛又曰短氣燥煩虛之甚矣借曰陽氣內陷心下因硬而可迅攻之乎豈陷胸之力反緩乎承氣一下再下寧不畏其虛

胃 甘草水浸一宿暴用小

豆胃象為使惡地黃

青黛 鹹寒色青泄肝散五臟

鬱火解中下焦蓄蘊風熱

日一婦患曉腹二陰遍生濕瘡熱痒而痛出黃汁二便澀用鱧鱘松脂黃丹之類塗之然痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩搗爛入青黛兩和塗熱痛乃去仍服入正散而愈此中下焦蓄蘊風熱毒氣若不當禁酒物果仍發痔治傷寒發斑吐咯痢血陰虛火炎

乎前文曰結胸脈浮大者下之死又曰煩燥大陷胸果可用乎若胃中空虛客氣動膈心中懊憹者當以梔子豉湯吐去胸中之邪陶節菴口結胸乃下早而成未曾經下者非結胸也乃表邪傳入胸中症雖滿悶尚為在表正屬少陽部以治未効則以小柴胡對小陷胸一服豁然若因下早而成者方用陷胸湯九分淺深徒緩治之不宜大峻上焦乃清道至高之分過下則傷元氣也崔行功曰傷寒結胸欲絕心膈高起于不可近用大陷胸湯不瘥者此下後虛逆氣已不理毒復上攻當用枳寔理中丸先理其氣次調其疾用之如神活人云悞下未成結胸者急頻理中湯自然解了蓋理中治中焦故也胃中雖和傷寒未退者宜俟日數足却以承氣再下之蓋前來之下未是也其水結胸者用小半夏加茯苓湯小柴胡去朮加牡蠣主之

寒發斑吐咯痢血 陰虛火炎 首忌用合

夏加茯苓湯小柴胡去朮加牡蠣主之

杏仁研置補餅中煨小兒驚食名聖餅子治咯血

癩疔熱丹熱傳瘡瘡蛇犬毒

即旋花取嬌碧者水飛淨

用內多石灰故須淘淨

大青 微苦鹹大寒解心胃熱

毒治傷寒時疾熱狂陽毒發

斑熱甚傷血裏寔表虛則發斑斑輕如疹子重如錦紋紫

黑者熱極而胃爛也多死活人治赤班煩痛有犀角大青

湯黃疸熱痢丹毒喉痺處

處有之高二三尺莖圓葉長

葉對節生八月開小紅花成

簇寔大如椒色赤用莖葉

壺牛 辛熱有毒屬火善走入

肺經泄氣分之濕熱肺主氣金而泄肺能達石腎命門走精隧

通下焦鬱遏及大腸風秘利

大小便逐水消痰殺虫墮胎

治水腫喘滿痞癖氣塊若濕

熱在血分胃弱氣虛人禁用

東垣曰壺牛苦寒誤矣其味辛辣入嚼猛烈雄吐所謂苦

卷二醫方集解政卷二大陷胸丸

又有血結胸症手不可近嗽水不欲嚥喜忘如狂大便黑小便利宜犀角地黃湯刈心山日結胸痞滿多由痰飲凝結心胸故陷胸泄心用甘遂半夏栝蒌根寔旋栗之類皆為痰飲而設也

下陷胸湯治傷寒誤下小結胸正在心

下按之則痛脉浮滑者及痰熱塞胸症

上下俱鞭此則正在心下前症痛不可近此則按之則痛結胸脉沉緊或寸浮

與此湯以除膈上結熱

黃連一斤栝蒌一枚此足少陽

藥也黃連之苦寒以泄熱栝蒌之寒潤

以滌垢半夏之辛温以散結結胸多由

痰熱結聚故用三物以除痰去熱也

藏日大陷胸湯大陽本藥也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸

湯治熱寔大陷胸丸兼喘小陷胸湯治痞

大陷胸丸仲景治傷寒結胸項強如柔瘕狀

有汗為柔瘕胸膈寔滿故項強而不能俯頂屬太陽部位

大黃八芒硝葶藶炒杏仁去皮尖合

研取如彈丸一枚別搗甘遂六錢白蜜

二合煮服 此足大陽陽明藥也大黃

之苦寒以泄熱芒硝之鹹寒以軟堅杏

仁之苦甘以降氣葶藶甘遂取其行水

卷二醫方集解政卷二大陷胸丸

寒安在哉乃泄氣之藥比諸
辛藥泄氣尤甚若濕從下受
下焦上血血中之濕宜苦寒
之味而反用辛熱之藥泄上
焦之氣是血病泄氣使氣血
俱損也王好古曰以氣藥引
則入氣以血藥引則入血時
珍曰一婦腸結年凡六十服
養血潤燥藥則泥膈服硝黃
藥若周知之如此三十餘年
其人体肥膏梁而多鬱口吐
酸痰乃寬此乃三焦氣滯有
升無降津液皆化為痰不能
下潤腸腑非血燥也潤劑留
滯硝黃入血不能入氣故尤
効用牽牛為末皂角膏丸纏
服便外甥素多酒色色病二
便不通脹痛呻吟七晝夜用
通利藥不効子思此乃濕熱
之邪在精道壅塞路病在二

而直達白蜜取其潤滑而甘緩
十束湯景治太陽中風下利嘔逆表解者
乃可攻之其人熱汗出頭痛心下痞
鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒表
解而裏未和邪熱內蓄有伏飲者下利
裏受邪也汗出不惡寒表已解也頭痛
痞鞭引脇下痛乾嘔短氣邪熱內蓄而
有伏飲也此為水氣上逆嘔逆頭痛與
表痛頭痛稍別周揚俊曰此症與結胸
頗同故湯亦與陷胸相倣表
解後攻與結胸之戒不殊也
芫花炒甘遂 大戟等 大棗十枚 先煮
束去滓內前藥末強人服一錢虛人五

陰之間故前阻小便後阻大
便病不在大腸膀胱也用棟
實茵香穿山甲諸藥倍牽牛
三服而平東垣補下焦陽虛
天真丹用牽牛鹽水炒黑佐
沉香杜仲肉桂破故紙諸藥
兼施之妙 有黑白二種黑
者力速黑丑取子淘去浮者
春去皮用得本香乾姜良藥
漢前未入本草故仲景方中
无此別錄始載之宋後多用
防已 大辛苦寒 別錄温 太陽
經藥 膀胱能行十二經通腠理
利九竅泄下焦血分濕熱為

分或空肉為疔疔不除者再服得快下
後麋粥自養 此足太陽藥也芫花大
戟之辛苦以逐水飲甘遂苦寒能直達
水氣所結之處以攻決為用三藥過峻
故用大棗之甘以緩之益土所以勝水
使邪從二便而出也 十棗湯小青芫湯
湯主太陽汗出乾嘔姜附湯主少陰下
利乾嘔吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔
王海藏曰表有水用小青芫裏有水用
十棗或間十棗湯桂枝去桂加茯苓白
朮湯皆屬飲家但有頭痛項強之症何
也張兼善曰大陽經多血少氣病入表
熱微渴恣飲水漿為水多氣弱不能施
化本經血氣因而凝滯致有頭痛項強

本草備要

卷三

防已

五十六

療風水之要藥治肺氣喘嗽

水熱氣諸癩降氣濕瘧脚氣

足傷寒濕為脚氣寒濕鬱而為熱濕則腫熱則痛防已為

主藥濕加苡仁蒼朮木瓜木通熱加芍藥風加羌活草薢

痰如竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃

仁紅花小便秘加牛膝澤泄痛連臂加桂枝威靈仙痛連

屬腎虛不典脚氣同論

腫風腫癩腫惡瘡或濕熱流

入十土經致一陰不通者非

此不可然性險而健陰虛及

濕熱在上焦氣分者禁用

日通可去滯通草防已之屬是也通草通草即木通是徐之才亦以行水者為氣分燥

烈無以別矣木通甘淡泄濕熱功已苦寒

而盧通心有花紋色黃名漢

防已黑點黃腥木强者名木

防已不佳陳器器曰治風用木防已治小用漢

防已酒洗用惡細辛畏草薢

葶藶 辛苦大寒屬火性急大

能下氣行膀胱水肺中小氣

之患不須攻表但宜逐飲匕尺則自安

杜氏曰裏未和者蓋痰典燥氣壅于中焦故頭痛乾嘔汗出短氣是痰膈也非

十束不能除但此湯不宜輕用恐損人于候

本方除大束加大黃黑丑輕粉

水丸名三花神佑丸河間治壯寔人風痰

鬱熱肢體麻痺走注疼痛濕熱腫滿氣血壅滯不得宣通及積痰翻胃服一丸

後轉加痛悶此痰涎壅塞頓攻不開再加二五快利則止

加牽牛大黃大泄氣不入以去痰積

本方各五錢加黃柏兩

酒炒大黃煨兩粥丸名小胃丹治胸膈

腸胃熱痰濕痰

三物備急丸于治食停腸胃冷熱不調腹

脹氣急痛滿欲死及中惡客忤卒暴諸病

食滯腸胃上焦不行下腕不通故痛脹欲死內守者法宜下之

巴豆霜 大黃 乾姜 等分蜜丸小

豆大每服二三丸中惡口噤者折齒灌

之霍氏乾姜易桂枝各備急散 此手

足陽明藥也大黃苦寒以下熱結巴霜

辛熱以下寒結加于姜辛散以宣通之

于姜辛溫開五藏六府通四支開節

三藥峻厲非急莫施

曠急者非此不能除破積聚

故曰備急

癥結伏留熱氣消腫除痰止

噉砂丸本治切積聚痰飲心脇引痛

嗽定喘火濕泛溢為腫通

噉砂巴豆三稜 干姜 白芷五

經利便久服令人虛十割日

木香 青皮 胡椒二錢 大黃 乾漆

閉葶藶夫黃之屬是也大黃

炒一板櫚 肉蓯蓉一為末醎醋二升

泄陰分血閉葶藶泄陽分氣

蒼色豆五七沸再下三稜大黃末同煎

閉氣味俱厚不減大黃然有

五七沸入噉砂熬成膏和諸藥杵丸菴

甜苦二種雄者性後若者性

豆大每五丸姜湯下 此治肉積氣積

急泄肺而傷胃宜大麥蘗之

血積通劑也噉砂化肉食噉砂性大塊

仲景有葶藶大麥泄肺湯治

草言其能化人心為血故能驅五金本

甘遂 苦寒有毒能泄腎經及

木香善皮行滯氣三稜破血而行氣肉

隧道水濕直達水氣所結之

蕞暖胃而和中白芷散風而除濕乾姜

處以攻決為用為下水之聖

胡椒除沉寒錮冷大黃巴豆能斬關奪

藥仲景方陷主十二種水大

門方內多辛熱有毒之品用之以破冷

腹腫滿名水蠱喻毒言曰胃

攻堅惟大黃苦寒假之以蕩熱去其蓋

病之源雖不能散胃之水精

積聚既深攻治不得不峻用醋者酸以

于肺而病于中肺不能通胃

收之也玉机微義曰方中因白芷散水

之水迫于膀胱而病于土腎

曰吐人無積虛人則有之皆由脾胃怯

不能司胃之開時其蓄世而

以礬攻去破結之藥治之疾似去而人已

病于下以致積水浸淫無所

衰矣于漆噉砂三稜大黃牽牛之類得

底止上好占曰木者脾肺腎

藥則斬其快藥過則依然氣愈消疾愈大

三經所主有五藏六腑十二

竟何益哉故善治者當先補虛使氣血

經之部分上頭面中四肢下

腰脚外皮膚中肌肉內筋骨

脈有尺寸之殊浮沉之別不

本有精專甘遂

可輕傷當知病在何徑何藏
 方可用之核水腫有痰畏食
 積廢血散清不升瀉不降而
 成者有濕熱相生遂道阻塞
 而成者有燥熱沖擊結不
 通而成者症屬有餘有服寒
 涼傷敗衰中氣虛衰而成者
 有大病後正氣衰憊而成者
 有小便不通水液妄行脾莫
 能制而成者症屬不足宜分
 別治之然其源多由中氣不
 足而起丹浮曰水病當以健
 脾為上使脾寬而氣運則水
 自行宜參苓為君視所劫症
 加減苟徒用利瘕疝積聚留
 水葦多致不救

飲宿食痰迷癩瘡虛者忌用
 皮赤肉白根作連珠重寔

聚積自消如滿座皆君子則小人自無
 容地也不問何藏先調其中使能飲食
 是其本也

木香檳榔丸子治胸腹積滯痞滿結痛大
 便不通或瀉泄下痢裏急後重食瘧寔
 積邪積痞滿世痼申于飲食留滯濕熱
 積鬱積而成二便不通由于熱結裏急
 後重由于氣滯按裏急後重有因火
 熱者火燥物而性急也有因氣滯者大
 腸氣壅不得宜通也有因積滯者腸胃
 有物結墜也有氣虛者中氣下陷不能
 升也有血虛者津枯腸燥虛坐努責是
 也當分症論治脈洪大而直宜重寔宜
 下若脈浮大
 慎不可下

陳皮去粗殼 枳殼炒 黃柏酒浸 黃連果實三稜

者良麵裹煨熟用或用以日草
 三日其水如墨以苦荬汁浸
 清為度再麵裹煨瓜蒂為使
 惡遠志及甘草仲景治心下
 同用取其相反以立功也有
 治水腫及腫毒者以汁逐未
 傳腫處濃煎甘草湯服之其
 腫立消二物相反感應如此

大戟 苦寒有毒能泄藏府水
 濕行血發汗利大小便治十
 二水腹積急痛積聚癥瘕頸
 腋瘰癧風毒脚腫通經墮胎
 誤服損真氣時珍曰痰涎為
 物隨氣升降無

醋煮我遊醋炒 五石 大黃酒浸 香附 豨薟草
 兩 芒硝水丸量入虛實服一方加薑歸
 酒洗張子和儒門事親無三稜枳殼只
 氣味甜味無三稜陳皮各木香導
 九 此手足陽明藥也濕熱在三焦氣
 分木香香附行氣之藥能通三焦解六
 鬱陳皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣
 水泄痢多由肝 枳殼寬腸而利氣而黑丑
 檳榔又下氣之最速者也氣行則無痞
 滿後重之患矣瘧痢由于濕熱鬱積氣
 血不和黃柏黃連燥濕清熱之藥三稜

處不到入心則迷成癩癩人
肺則寒厥為喘咳皆冷入肝
則筋痛乾嘔寒熱往來入經
絡則麻痺疼痛入筋骨則牽
引隱痛入皮肉則癩癧瘰癧
陳無擇以控涎丹主之殊
有奇效此乃治痰之本痰之
本水也濕也得氣與火則結
為痰大戟能泄藏府水濕甘
遂能行經絡水濕白芥子能
散皮裡膜外痰氣惟善用者
能收奇功也又曰不仲陽謂
腎為真水有補無泄復云短
症麥黑且腎者用百祥羔下
之非泄腎也泄其府則裁自
不寔府者膀胱也百祥惟大
戟一味能行膀胱之水故也
竊謂非獨泄府乃腎和寔而
泄肝也寔則泄其子大戟浸
水青綠肝胆之色也痘症毒

能破血中氣滯我輩能破氣中血滯大
黃芒硝血分之藥能除血中伏熱通行
積滯並為摧堅化痞之峻品為積滯
去則一便調而三焦通泰矣蓋宿垢不
淨清陽終不得升故必假此以推湯之
亦通因通用之意然非是積不可輕投
加當歸者潤以和其血也編目曰此戴
善治下虛上實抑火升水流濕潤燥推
陳致新散鬱破結活血通經及肺痿喘
嗽胸膈不利脾濕黃疸宿食不消婦人
調和氣血小兒驚積積熱皆可量輕重
用之滑伯仁曰腸胃陽明燥金也下焦
少陽相火也後重之用水香檳榔行燥

盛大熾則水溢涸風挾火勢
則上受虧故津液內竭不能
化膿而成黑陷之症泄其風
火之毒所以救腎扶脾也昂
按泄心乃所以補心泄腎即
所以救腎和熱退則更陰復
矣机要用大戟一兩車三枚
同煮焙乾去戟用車丸服名
車麥百祥丸
杭產紫者為上比
產白者傷人漿水煮去骨用
得大車則不損脾畏葛蒲反
甘草
商陸 苦寒有毒諸家辛酸沉
陰下行與大戟甘遂同功療
本苦辛用要草商陸

全之鬱也履秘之用知
母黃柏散用火之熾也
枳實導滯丸東垣治傷濕熱之物不得施化
痞悶不安腹內硬痛積滯泄瀉
大黃兩枳實炒黃芩炒黃連炒神麴炒
錢白朮炒茯苓錢澤泄錢蒸餅為丸
多食量服 此足太陰陽明藥也飲食
傷滯作痛成積非有以推蕩之則不行
積滯不盡病終不除故以大黃枳實攻
而下之而病泄反止經所謂通因通用
也傷由濕熱黃芩黃連佐之以清熱茯苓

本草用要草商陸

卷二 百方集年次 三 枳實導滯丸

水腫脹滿腫屬脾脹屬肝腫
脹而不腫者名蠱脹為木橫
尅土難治腫脹朝寬暮急為
血虛暮寬朝急為氣虛朝暮
俱急為氣血兩虛腫脹由心
腹而散四肢者吉由四肢而
人心腹者危男目下而女
自上而下
皆難治
瘰癧腫喉痺不
通薄切醋炒濕熱之病泄蠱
毒傳患瘡墮胎孕令人見鬼
神取花白者根赤者傷人
入鹽三分搗貼只堪貼胎
小便利則腫消**黑豆湯**浸蒸
用得甚良

苦花 苦温有毒去水飲痰癖

癩五水在五臟皮膚脹滿喘
急痛引胸脇咳嗽瘡瘻五水
水皮水正水石水黃汗也水
積包中堅滿如石名石水汗
如桶汁名黃汗久不愈必致
癩癧時珍曰仲景治傷寒六
陽症表未解心下有水而咳
乾嘔發熱或喘或利者小青
龍湯主之表已解有時頭痛
出汗惡寒心下有水乾嘔痛
引兩脇或喘或咳者十未湯
主之蓋青龍散表邪使水從
汗出內經所謂開鬼門也十
未逐裏邪使水從二便出內
經所謂潔淨府去陳莖法也
十未湯羌花甘遂大戟等分

其澤世佐之以利濕積由酒食神曲蒸
胃過舍之物化食解酒因其同類温而
消之其連大黃苦寒太甚恐其傷胃故
又以白朮之甘温補土而固中也
倒倉法丹黃牡牛肉肥嫩者二切碎洗
淨用長流水桑柴火煮糜爛濾去滓取
淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則
成矣擇一靜室明快不通風者令病人
先一夜不食坐其中每飲一鐘少時又
飲積數十鐘病在上者必吐病在下者

必利病在中者吐而且利視所出物可
盡病根乃止連進之急則逆上而吐多
為緩急吐利後必渴不得與湯其小便
必長取以飲之名輪迴酒非為止渴兼
滌餘垢行後倦卧覺飢先與米飲次與
稀粥三日後方與厚粥軟飯菜羹調養
半月一日精神煥發沉疴悉痊矣須戒
色慾半年一年戒牛肉數年
霞天膏節照前法每肉十二斤可熬膏
一斤磁確盛之夏月水浸可留三日寒

葉似柳二月開花紫

碧色葉生花落陳久者良醋

煮過水浸暴用根療疥疔毒

魚友甘草謂認者取葉擦皮

以証人

蕤花 辛散結苦洩熱行水捷

藥主治畧同芫花

澤漆 辛苦微寒消痰退熱止

嗽殺虫利大小腸治大腹水

腫益丈夫陰氣 生于澤葉

圓黃綠頗類貓睛一名貓鬼

眼睛草莖中有白汁粘人李時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類再

常山 辛苦而寒有毒能引吐

行水祛老痰積飲痰有六風痰挾痰食痰氣痰也飲有五

流于肺為支飲于肝為懸飲

于心為伏飲于經絡為溢飲

于腸胃為痰飲也常山力能

吐之謂治諸瘧然悍暴能損

真氣弱者慎用時珍曰常山瘧須在發散表邪及提出陽

本善竹更善除瘧常山

天久留生蘅音梅用重湯煮久煎劑調服

入丸劑每三分加麩一分煮糊或同蜜

煉 此足太陰手足陽明藥也朱丹溪

曰牛坤土也黃土之色也以順為德而

法健為功者壯之用也肉胃之藥也液

無形之物也積聚久而形質成依附腸

胃迴薄曲折之處以為巢白豈銖而之

丸散所能窺其藩牖乎肉液充滿流行

無處不到如洪水泛漲浮莖陳朽皆順

流而下不可停留凡屬滯碍一洗而空

澤枯潤稿補虛益損寧無精神煥發之

樂乎其方傳于西域異入中年後行一

一沃亦却疾養壽之一助也王綸云牛

泄下藥借補為泄以

泄為補亦奇方也

蜜煎導法仲景治陽明症自汗小便利大便

秘者胃實自汗小便復利此為律液內

矣雖大便硬不可攻

之宜用外導之法

蜂蜜 用銅器微火熬頻攪勿令焦候

凝如飴檢作挺于頭銳如指搽皂角末

少許乘熱納穀道中用手抱住欲大便

卷二十一 雜考 六一

風寒暑濕痰食瘴鬼之別須
分陰陽虛是不可藥論常山
蜀漆得甘草則吐得大黃則
利得烏梅穿山甲則入肝得
小麥竹葉則入心得秫米麻
黃則入肺得龍骨附子則入
腎得草葉楨榔則入脾蓋死
痰不化瘧一物之功亦在驅
逐痰水而已李士材曰常山
發吐唯生用多用為然與甘
草同用亦必吐若酒浸炒透
但用錢許每見奇功未見其
或吐也世人泥于雷斅老人
久疾忌服之說使良藥見疑
沉痾難起抑何愚耶○常山
吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖
吐濕痰萊菔子吐
氣痰藜芦吐風痰
良酒浸蒸或炒用栝蔓為使

時去之加鹽少許亦可
鹽能潤燥軟堅
此手陽明藥也蜜能潤腸熱能行氣皂
能通經經曰表解無症者胃雖貫息攻
故外導而通之不欲以苦寒傷胃也徐
可曰此為大便不行而別無所苦者設
也結胸痞滿臍結胃有燥屎皆有見症
今但自汗且小便利是
津耗熱鬱而乾燥也
猪胆導法仲景治症同前
猪胆一枚取汁八醋少許用竹管長三四
寸以一半納穀道中將胆汁灌入肛中
頃當大便

昆蟲老葉名蜀漆功用畧

同古方有蜀漆散取其苗
性輕揚宛散上焦和結甘

草水拌蒸

藜蘆 辛寒至苦有毒入口即

吐善通頂令人嘔風癩症多

用之張子和曰一婦病風癩
初一二日數作求死而已

本草用厚草藜蘆
甚昏困後遂輕健如常人以
所食麥訪人乃懸葱苗即藜
芳是也李時珍曰和王妃年
七十中風不語牙關緊閉先

此手陽明藥也便秘者屬燥屬熱自汗
者為亡津液當小便不利今反利是熱
猶未實故不可攻猪胆汁寒勝熱滑潤
燥苦能降醋酸善入故能引入大腸而
通之也津液枯者宜蜜導執和盛者宜
胆導如冷秘者削醬姜亦能導
之海藏法用蜜煎鹽相合或草烏末相
合亦可蓋鹹能軟堅潤燥草烏能祛寒
消結可隨症陰
陽所宜而用之

考太醫更日月池翁診視藥
不得八不獲已打去一齒濃
煎黎湯灌之少頃噫氣逆吐
痰而甦其不瞑眩厥疾不瘳
誠然取根去頭用黃連為使
反細辛芍藥諸參惡大黃具
葱白叶者服葱湯即止

木通古名通草甘淡輕虛上通心包

降心火清肺熱心火降則化

津液肺為水源肺熱清則化下通

大小腸膀胱導諸濕熱由小便出

故導赤散用之并利小便

水愈遊大便愈燥也木通利

九竅血脉關節治胸中煩熱

遍身拘痛傷仁齋云遍身冷

皆伏塊傷血屬于心宜木

通以通心竅則絡流也

大渴引飲中焦淋瀝不通下焦

醫方集解卷上之五

表裏之劑病在表者宜汗宜散病在

未除裏症又急者仲景復立大柴胡

葛根黃芩等法合表裏而兼治之後

人師其意則有防風通聖參蘇五積

諸劑姑采數方以繫其節善用者審

症而消息之可也

大柴胡湯仲景治傷寒發熱汗出不解陽邪

入裏熱結在裏裏非三陰之裏乃胃府

亦有轉入陽明者如大陰有桂枝加大

黃湯少陰有三大承氣歐陰一小承氣

皆兼陽明症也心下痞鞭嘔而下利或往來寒

熱煩渴譫妄腹滿便秘表症未除裏症

本草通串木通

醫方集解卷上之五

火心與小腸相表裏心水腫

移熱于小腸則淋秘

浮大便利小耳聾泄腎火目眩

口燥舌乾心苗喉痺咽痛炎

上焦鼻音塞熱擁清道失音

清脾疸好眠好眠心為脾母

心熱清則除煩退熱止痛排

膿破血催生行經下乳火又

內氣順血行故經于多者禁

用東垣曰肺受熱邪津液氣

化之源絕則寒水斷流膀胱

受溫熱壅閉約束則小便

不通宜此治之未二九曰火

在上則口燥眼赤鼻乾在中

則心煩嘔噦浮腫在下則淋

閉足腫必藉此甘和之性瀉

諸經之火火退則小便自利

便利則諸經火邪皆從小水

而下除矣○君火宜木通相

火宜澤世利水各有細孔而

虽同所用各別有細孔而

頭皆通故通

通草古名通脫木色白氣寒味

淡氣寒則降故入肺經引熱

下行而利小便味淡則升故

入胃經通氣上達而下乳汁

治五淋水腫目昏耳聾鼻塞

又急脉洪或沉實弦數者表症未除者

痛寒熱仍在也裏症又急者痞轉燥渴

澀狂便秘也脉沉寔為在裏弦數者邪

在少陽也洪者邪在陽明也其嘔而自

利者何亦用之張兼善曰裏虛者便難

難而勿改裏實者雖吐利而可下心煩

喜唱裏積已甚結于胃中故下之則愈

柴胡八兩半夏五斤黃芩二兩藥三兩生薑五兩

大棗十二枚枳實四枚大黃二兩酒浸一方

若不加大黃恐不為大柴胡湯也崔氏

去柴胡加前胡名大前胡湯胡治云亦

出仲景方治同此足少陽陽明藥也表症未

除故用柴胡以解表裏症燥實故用大

黃想實以攻裏葯安脾欬陰能泄肝

不尅黃芩退熱解渴半夏和胃止嘔姜

辛散而棗甘緩以調營衛而行津液此

表裏交治下劑之緩者也周揚俊曰仲

嘔膀胱府症則有五苓散少陽兼陽明府

症則有大柴胡湯皆表裏兩解之法也

昂按此乃少陽陽明故加減小柴胡小

承氣而為一方少陽固不可下然兼陽

明虛症則當不宜小承氣湯輕則大柴

胡湯或問大柴胡湯泄也桂枝人參湯

補也何為皆治下利心下痞鞭張兼善

曰下之早因作痞者裏虛協熱而利也

以表裏不解故用桂枝人參解表而裏

若傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐

○陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須看熱氣

淺深用藥三焦俱傷則痞滿燥寔堅全

見宜大承氣湯邪在中焦則有燥寔堅

上五

失音淡通竅寒降退熱催生

澤泄甘淡微寒入膀胱利小

便泄腎經之火邪功崇利濕

行水治消渴痰飲嘔吐泄痢

腫脹水痞脚氣痲痛淋瀝陰

汗陰間尿血洩青既利水而

何也此乃濕熱為病不為虛

滑者言也虛滑則當用補澁

藥濕熱之病濕熱既除則清

氣上行又能養五臟益氣力

起陰氣補虛損止頭旋有聰

耳明目之功脾胃有濕塊則

滲去其濕則執赤隨去土乃

得令而清氣上行故本經列

之上品云晚耳明目而六味

丸用之今人多以昏目疑之

多服昏目虛故也眼中有水

屬膀胱過利則水涸而火生

在景入味丸用澤泄冠宗爽

謂其接引附桂入腎經李時

珍曰非接引也乃取其泄勝

膀胱之邪氣也古人用補藥必

兼泄邪去則補藥得力一

闢一闢此乃之妙後人不知

本草綱目卷之五

三症宜調胃承氣湯加甘草和中去積

朴者恐傷上焦氤氳之氣也邪在上焦

則痞而寢宜小承氣湯去芒硝者恐傷

下焦真陰也若表症未除裏症又急不

得不下者則用大柴胡湯通表裏而緩

治之大承氣最緊小承氣次之調胃又

次之大柴胡又次之葢

恐硝性燥急故不輕用

柴胡加芒硝湯景治傷寒十三日不解胸

脇滿而嘔日晡潮熱熱而微利此本柴

胡症知醫圓藥下之非其治也潮熱者

實也先宜小柴胡湯以解外後以加芒

硝湯主之傷寒十三日為再傳經尺常

滿而日晡潮熱陽明也

邪氣犹在表裏之間

小柴胡湯見和加芒硝六兩

此少陽之明藥也表症誤下邪熱乘虛

入胃以致下利而滿嘔潮熱之症犹在

傷寒潮熱為

胃實故宜下故仍與柴胡以解少陽加

芒硝以蕩胃熱亦與大柴胡兩解同意

桂枝加大黃湯景治太陽誤下轉屬太陰

腹滿大實痛者腹脹虽屬太陰若裏症

之以桂枝加芍藥湯惟滿痛便秘

醫方集解卷之三

桂枝湯已見加大黃兩芍藥三

此足太陽太陰藥也誤下而作結胸則

六下 上五

脾虛腎旺故泄腎扶脾不知
腎之真水不可泄也其伏留
之邪耳易老云去脾中留垢
以其微鹹能泄伏水故也昂
按六味丸有熟地之溫丹皮
之涼山藥之瀉茯苓之滲山
朮之收澤泄之泄補腎而兼
補脾有補而以有泄相和相
濟以成乎補之功乃平淡之
神奇所以為古今不易之良
方也即有加減或加紫河車
一且或五味麥冬杜仲牛膝
之類不過一二味及三四味
而止今人或疑澤泄之泄而
減之多棟本草補藥恣意加
入有補无泄且客倍于主責
成不專而六味之功反退處
于虛位失製方配合之本旨
矣此近世庸醫之誤也

車忌鉄

車前草 甘寒涼血去熱止吐

切消癥瘕明目通淋凡利水之劑多

指手目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退而目清矣雷斅曰使葉勿子甘寒清肺肝風使空語

熱滲膀胱濕熱利小便而不

走氣與茯苓同功強陰益精

令人有子腎有二莖車前子能利小便而固精

八十一

邪在上仍屬太陽今腹滿而大實痛則
邪已入太陰經曰諸痛為實痛隨利減
故用桂枝以解未盡之表邪加大黃以
下內陷之邪凡經又曰大陰病脈弱其
黃芍藥若宜減之以胃氣弱易動故也
仲景之慎于用下也如是王海藏曰腹
痛桂枝加芍藥大實痛桂枝加大黃何
為而只用芍藥大黃而干桂枝內加之
要從太陽中來以太陽為本也趙嗣真
曰太陰腹脹痛有三有次第傳經之邪有
直入本經之邪有下後內陷之邪此腹
滿時痛為下後內陷之邪以桂枝加芍
藥湯大實痛者桂枝加大黃湯設遇本
經直入陰邪腹痛實痛脈沉細者用此
下之豈不貽結胸之悔耶周揚俊曰大
實痛者有宿食也非大黃不能除亦通

因通用之意

水解散後治天行一二日頭痛壯熱

麻黃四兩桂心 甘草炙 白芍二兩 大黃

黃芩三兩 此足太陽陽明藥也麻黃能

開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清

上中之熱大黃以泄中下之熱甘草白

芍能調胃而和中蓋天行溫疫鬱熱由

內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖

一二日之淺可以汗下兼行不必同于

傷寒之治法也

醫方集腋卷之三 水瀉散

上五

本草綱目

凡人服食須佐他藥如六味丸之用澤泄可也若用則

他治遺精五淋身濕瀉痢風文也馬下因既不能愈天

人云市有真三六一貼甚効

公不肯服天人難他藥進之一服而愈簡其方乃車前子

為未米飲下二錢且云此藥利水而不動氣道利則清濁

分告藏 癆目赤障 易能除 催 自止矣

生下胎 酒蒸搗餅焙研 蒸 搗餅入滋補藥炒

研入利水泄瀉藥

燈草 甘淡而寒降心火入心

情肺熱利小腸 心與小腸相 表裏心火清

則肺清小腸亦清 而熱從小便出矣 通氣止血

治五淋水腫燒灰吹喉腫塗 乳止夜啼擦癩最良 縛成把

痒時重從草出浮水 可見十餘次可斷根

瞿麥 苦寒降心火利小腸逐 膀胱邪熱為治淋要藥 故八

用之五淋天抵皆屬濕熱熱 淋首入正及山梔滑石之類

血淋宜小蘗牛膝骨腎虛淋 直補腎不可使泄老人氣虛

者宜參木帶木通山梔亦有 痰帶由焦作淋者宜行痰兼

通利藥最忌發 破血利竅決 汗汗之必便血

本草綱目卷之六十一 風濕痺散

防風通聖散 治一切風寒暑濕飢飽勞

役內外諸邪所傷氣血佛鬱表裏三焦

俱寔憎寒吐熱頭目昏暈目赤睛痛耳

鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠粘

咳嗽上氣大便閉結小便赤澀瘡瘍

腫毒損跌折傷瘀血便血腸風痔漏手

足癰癢驚狂譫妄丹斑癩疹 瘡寒壯熱

頭眩目赤風熱上攻也耳鳴口苦邪在 少陽也便秘痔漏結大腸也小便赤

澀熱面赤腕也瘡瘍癰腫氣血佛鬱也 丹斑癩疹風熱在胃也手足癰癢確在 諸妄肝風 胃火也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷

川芎 當歸 白芍 白朮 山梔

大黃 芒硝 石膏 石羔 桔梗

甘草 滑石 加生 芍藥 白前 白

去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加姜

製半夏 此足太陽陽明表裏血氣藥

也防風荆芥薄荷麻黃輕浮升散解表

散寒使風熱從汗出而散之于上大黃

芒硝破結通幽梔子滑石降火利水使

風熱從便出而泄之于下風淫于內肺

瘡消腫明目去翳通經墮胎

性利葶下虛者慎用心經

花大如錢紅白斑爛色甚斌

媚俗呼浴陽花用葶殼丹皮

為使惡蟬由產後淋當去血

扁蓄一名苦平殺虫疥利小便

治黃疸熱淋吐腹腹痛虫蝕

下部服葉細如竹弱葉引

促節有粉三月開細紅花

胃受邪枯梗石羔清肺泄胃風之為患

肝木受之川芎歸芍和血補肝黃芩清

中土之火連翹散氣聚血凝甘草緩峻

而和中重用甘草滑石亦仇白木健脾

而燥濕上下分消表裏交治而于散泄

之中猶寓溫養之意所以汗不傷表下

不傷裏也 本方再加人參補氣熟地

並血黃柏黃連除熱羌活獨活天麻細

辛全蝎祛風蜜丸彈子大每服一九茶

酒任下名祛風至寶丹喻嘉言曰此中

天仙籐 苦溫疏氣活血治風

勞腹痛妊娠水腫有天仙籐

腫葉似葛圓而小有白毛根

有鬚四時不凋一云即青木香籐

地膚子 甘苦氣寒益精強陰

入膀胱除虛熱利小便而通

淋時珍曰無陰則陽無以化

知伯滋腎之意王節齋曰小

便不禁或類數古方多以為

寒而用溫澁之藥殊不知屬

熱者多益膀胱火邪妄動水

不得寧故不能禁而類數也

故老人多類數是膀胱血少

本方除大黃芒硝名雙解散防風

荆芥薄荷川芎以解表黃芩梔子連翹

石羔滑石以瀉裏復有當歸芍藥以和

血倍梗甘草白木以調氣故曰雙解

葛根黃連黃芩湯治太陽病桂枝症

反下之利遂不止脉促者表未解也喘

而汗出者此湯主之發抗頭痛惡風自

此邪在表而反下之虛其腸胃表邪乘

虛入裏遂協熱而利不止也促為陽盛

而下利而脉促知表未解前症仍在也

汗出而喘為邪氣外甚所致喘而汗出

為裏熱氣逆所致與此湯散表

邪清裏熱脉數而止曰促

葛根斤甘草 黃芩兩黃連三 先煮

上五

本草備要

陽火偏旺也治法當補勝勝
陰血泄火和為主而佐以收
澁之劑如牡蛎山茱五味之
類不可獨用病本屬熱故宜
泄火因水不足故火動而致
便數小便既多水益虛矣故
宜補血補血與水治其本治
也收之澁之治其標也
癩癩散惡瘡煎湯洗
湯去皮膚風熱丹腫洗眼除
雀盲澁痛葉如蒿莖赤子類
蚕砂亞蟻蛸
石韋 苦甘微寒清肺金以滋
化源凡行水之藥必通旁光
皆能先清肺火通旁光

而利水道益精氣補五勞濕
清熱之功高陽負曰黃
帝治勞傷用石韋丸治淋
崩發皆炒米泔生石上柔勒
如皮皆有黃毛去毛微炙用
杏仁滑石射干為使得葛蒲
良生古瓦上者名瓦菴治淋
海金沙 甘寒淡滲除小腸勝
胱血分濕熱治腫滿五淋莖
痛得梔子牙硝蓬砂治傷寒
熱狂大熱利小便此莖細如
赤豆有明石上者名瓦菴

葛根內諸藥煎或加姜朮 此足太陽
陽明藥也表症尚在醫反誤下邪入陽
明之府其汗外越氣上奔則喘下陷則
利故舍桂枝而用葛根當至陽明之表
葛根煎升陽明清
氣又為治汗聖藥加芩連以清裏熱甘
草以調胃氣不治利而利自止不治喘
而喘自止矣又太陽表裏兩解之變法
三黃石羔湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂
叫欲走煩燥大渴面赤鼻乾而目如火
身形拘急而不得汗或已經汗下過經

不解三焦大熱譫狂鼻動身目俱黃六
脈洪數及陽毒發王陶節庵曰此因熱
在三焦閉塞絡
津液營衛不
通遂成此症 石羔兩黃芩 黃連
黃柏七梔子三十 麻黃 淡豉二 每
服二兩姜三片葱三枚細茶一撮煎熱
服 此足太陽手少陰藥也表裏之邪
俱盛欲治內則表未除欲發表則裏又
急故以黃芩泄上焦之火黃連泄中焦
之火黃柏泄下焦之火梔子通泄三焦
之火而以麻黃淡豉發表邪石羔體

線引竹木上葉紋皺處有砂

黃赤色忌火

因陳 苦燥濕寒勝熱入足太

陽經勝發汗利水以泄太陰

陽明之濕在脾為涼疸黃之

君藥脾胃有濕熱則發黃也

如禱色汗如柏汁亦有寒濕

死黃身黃黃而色暗大抵治

以茵陳為主陽黃加大黃厄

子陰黃加附子干姜各隨寒

熱治 又治傷寒時疾狂熱瘧

瘧頭痛頭旋女人瘕病為病

香薷 辛散皮膚之蒸熱濕解

心腹之凝結屬金水而主肺

為清暑之主藥肺氣清則水

行而執降暑必兼濕治暑必

為乾熱治濕若無濕但

非暑也治濕道水敷至服小

脚氣口氣合敷車服治霍亂

轉方時珍曰暑有乘涼飲冷

中入內遂病頭痛發熱惡寒

煩燥口渴吐泄霍亂宜用之

以發越陽氣散暑和脾則愈

若飲食不節勞投作喪之人

傷暑大熱大渴汗出如油煩

燥喘促或泄或吐者乃內傷

重泄火氣輕解肌亦表裏分消之藥也

五積散局 治少陰傷寒及外感風寒內

傷生冷身熱無汗頭痛身痛項背拘急

胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來脚氣腫

痛冷秘寒痛寒瘧惡寒無汗婦人經水

不調上症皆寒 白芷 陳皮 厚朴

六當歸 川芎 芍藥 茯苓 桔梗

八蒼朮 枳殼 半夏 麻黃 乾姜

肉桂 重表者甘草 加姜葱煎又

法除桂正枳殼陳皮餘藥慢火炒攤冷

入桂正同前名熟料五積散用炒者用

有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳殼加入參

白木腹痛挾氣加吳茱萸胃寒加煨姜

陰症傷寒肢冷虛汗加附子婦人調經

加醋艾 此陰陽表裏通用之劑也麻

黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以

和裏止痛蒼朮厚朴平胃土而散滿陳

皮半夏行逆氣而除痰苦歸姜正入血

分而祛寒濕枳殼桔梗利胸膈而清寒

熱茯苓泄熱利水寧心益脾所以為解

本草精要香薷

香薷

香薷

香薷

香薷

之症宜用清暑益氣湯人參
白虎湯之類以泄火益元可
也若用香薷是重虛其表而
增其熱矣蓋香薷乃夏月解
表之藥如冬月之用麻黃氣
虛者尤不宜多服今人謂能
解暑藥用代茶誤矣李士材
曰香薷為夏月發汗之藥其
性溫熱只宜于中暑之人若
中挾者誤服之反成大害世
所未知按潔古云中暑為陰
症為不足中挾為陽症為有
餘經曰氣盛身寒得之陰寒
氣虛身熱得之傷暑故中暑
宜溫散中挾者宜冷飲挾
挾宜清涼陳者宜服令人泄

表溫中除濕之劑去痰消痞調經之方
也一方統治多病惟活法者變而通之
本方能散寒積食積氣積血積痰積故
名五積王海藏曰桂枝麻黃芍藥甘草
即各半湯也蒼朮陳草即平胃也枳桔
陳茯苓即枳桔半夏等湯也加芍丹治
血又加干姜為草朴散此數藥相合為
解表溫中之劑消痞調經之方亦為內
寒外感表裏之分所製寔非仲景表裏
桂枝麻黃姜附之的方也惟在活法變
而通之陶節菴曰夫病不身熱頭痛初
起怕寒腹痛嘔吐瀉泄倦臥沉默不渴
脈沉遲無力人皆知為陰症矣至于發
熱面赤煩燥渴去衣被脈大人皆不識
認作陽症誤投寒藥死者多矣不知陰
症不分熱與不熱不論脈之浮沉大小
但指下無力重按全無便是浮陰急與
五積散一服通解表裏之寒若內有沉

分胆治骨蒸勞執童便搗葉取汁熬膏
芫芳虛丸凡苦寒之藥多傷人脾獨宜于血虛有熱之人以其不犯胃氣也風毒
熱黃久瘡久痢瘡疥惡瘡鬼
氣口疔時珍曰月令通纂言庭可辟邪冬至元日各服二名亦良則青蒿之治鬼疔益亦有所補中明目童便浸伏也
葉用熬膏亦良使子勿使葉
使根勿使莖

寒必須姜附溫之若作執治而用涼藥
則湯愈甚而躁愈急豈得生乎此取脈
不取症也按陽寒有含症取脈者又有含脈取症者
參敗毒散名五積交加散治寒濕身體
重痛腰脚酸疼
麻黃白水湯東垣治大便不通小便赤澀身面俱腫色黃麻木身重如山喘促無勞吐痰唾沫發熱時躁躁已振寒項額如水目中溜火鼻不聞香膈有動氣少腹急痛
東垣曰此因有濕熱伏于柴血之
中水火乘于陽道為上盛短氣喘
促為陰火傷氣四肢痿弱為腎水不足
冬時寒水得令乘其肝木逼火凌木大

附子 辛甘有毒大熱純陽其

本方止百病...

性浮而不沉其用走而不守

通行十二經無所不至能引

補氣藥以復散失之元陽引

補血藥以滋不足之真陰引

發散藥開腠理以逐在表之

風寒同干姜桂枝溫經散寒發汗引溫煖

藥達下焦以祛在裏之寒濕

能引火下行亦有治三陰傷

津調貼足心者吳緩曰附子陰症要藥凡寒傷寒傳變三陰中寒夾陰身迫大抵而脈沉細者或厥

今腹痛甚則唇青囊縮者急

須用之若待陰極陽竭而用

之已遲矣東垣治陰盛格陽

傷寒而赤目赤煩渴引飲脈

七八至但按之則散用姜附

湯加人參投半斤得汗而愈此神聖之妙也中寒

中風卒中白中漸傷曰傷輕為感冒重則為傷又重

則為氣厥痰厥虛寒而厥者

陽盛格陰身冷脈伏熱厥似

寒者誤投立斃宜承氣白虎

湯咳逆風嘔噦胃膈噎多由

氣血虛胃冷胃稿而成飲可

下而食不可下稿在嘔門喉

間之厭會也食下胃脘痛須

也吐上焦名噎食下良久吐

勝必有大復故見諸症

青皮 陳皮 黃連酒炒

黃柏酒炒甘草炙升麻二分柴胡 桂枝

人參 黃耆 蒼朮州浸白朮土炒厚朴

猪苓三分茯苓 澤泄 吳茱萸四分白豆

蔻壳炒麩五分麻黃六分杏仁四分

分二服 此足三陽三陰通治之劑也

前症蓋因表裏俱傷陽氣抑不得升故

風火濕熱鬱而為病也桂枝麻黃解表

祛風升麻柴胡升陽散火黃連黃柏燥

濕清熱而黃柏又能補腎滋陰寇朴青

陳利氣散滿而青柴又能平肝蔻朴又

能溫胃杏仁利肺下氣神曲化滯調中

吳萸煖腎溫肝參芪甘草蒼白二朮補

脾益氣二苓澤泄通利小便使濕去而

熱亦行方內未嘗有通大便之藥蓋清

陽升則濁陰自降矣昂按此方益合四

麻黃吳萸解毒而為一方者也治症既

多故所用表裏寒熱補泄之藥俱備俱

皆氣藥而無血藥與五積不同然乃東

垣之方錄之以見治療之中又有此一

也種

參蘇飲元治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳

也

醫方集略卷之二 參蘇飲 七三 上五

中焦名膈朝食暮吐稿在關
門大小腸下口也此下焦各
反胃又有痰飲食積痰血壅
塞胃口者如寒痰胃冷則宜
姜附參未胃稿者滋潤宜
四物牛羊乳血虧者加桂汁
脾泄命火**冷痢寒瀉霍亂轉**
筋脾虛寒客中焦為霍亂寒
筋客下焦肝腎為轉筋熱霍
亂者**拘挛風痺癥瘕積聚督**
脈為病脊強而厥小兒慢驚
痘瘡灰白痘疔不斂一切沉
寒痼冷之症經曰陰盛生內寒陽虛生外寒
助陽退陰殺邪辟鬼本草通

嗽痰寒中焦眩運嘈煩傷風泄瀉及傷
寒已汗發熱不止發熱頭痛外感也咳
傷也傷也已汗而熱傷也已汗而熱
不止陰虛也
前胡 半夏姜汁 茯苓七七 陳皮白
甘草 枳壳炒 桔梗 木香二 每五
錢如姜煮煎愈多者去末加葱白肺中
有火去人參加杏仁桑白皮瀉瀉加
白朮扁豆蓮肉健脾 此手足太陰
藥也風寒宜解表故用蘇葛前胡勞傷
宜補中故用參冬甘草橘半除痰止嘔

經陰胎凡陰症用姜附藥宜
陰寒在下虛陽上浮治之以
寒則陰益甚治之以熱則拒
格不納用熱藥冷飲下噎之
後於體既消熱性便發情且
不違而致大益此反治之妙
也又有寒痰熱飲治熱症者
此寒因熱用義亦相同也經
曰正者正治反者反治如用
寒治熱用熱治寒此正治也
或以寒治寒以熱治熱此反
治也經所謂必伏其所主而
先其所因蓋借寒藥熱藥為
反佐以作向導也亦曰從治
王好古曰用附子以補火必
防涸水如陰虛之人久服補
陽之藥則虛陽益熾直陰愈
耗精血日枯而氣无所附為
附麗遂成不救者多矣**母為**

枳桔利膈寬腸木香行氣破滯使內外
俱和則別散矣溢飲身重注痛者亦宜
此出少陽柴胡例藥治感冒異氣挾痰
飲之病木方云前胡葛根白能解肌
壳橋社輩自能見中快膈毋以性涼為
疑愚現藥性非涼亦是辛平之劑元戎
謂參蘇飲治一切發熱甚効謂有風藥
解表有氣藥和中則外感風寒內積痰
飲並可用也合四物名茯苓補心湯尤
能治虛熱及吐衄便血乃虛寒表裏兼
治之劑然不可逆
本方去人參前胡加川芎
柴胡姜棗煎名芎蘇飲治傷風寒外
有發熱頭痛惡寒內有咳嗽吐痰氣湧
此或肺有寔熱故去人參加
川芎為通陰陽氣血之使

烏頭附生者為附子連生者為側子細長者為天雄兩岐者為烏喙五物同出異名附子以西川彰明赤水產者為最皮黑体圓平底八角重一兩以上者良或云一兩首更勝然難得生用發散熟用峻補趙嗣真曰附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四逆湯生附配于姜補中有發其旨微矣丹溪曰烏頭行經仲景八味凡用為少陰附道後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其健

香蘇飲局方治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噎氣惡食內經曰卑下之地春氣常在故東南卑濕之區風氣柔弱易傷風寒俗稱感冒受和膚淺之名也由鼻而入在于上則客于皮膚故無六經形症惟發熱頭痛而已胸膈噎氣惡食則兼內傷也一輕為感冒重者為傷又重者為中
 香附炒 紫蘇不炒 陳皮去白 甘草七分 加姜葱煎傷食加消導稟咳嗽加杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風自汗加桂枝傷寒無汗加麻黃于姜傷風鼻塞頭昏加羌活荆芥心中卒痛加

即走下以行地黃之滯且相習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸湯多用之其有功于生民甚大况古人日用常方用之最多本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而云用作補劑多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每言陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附益四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子性燥本不可輕用但當病重暑熱時月亦可用也

延胡索酒一杯
 此手太陰藥也紫蘇疏表氣而散寒香附行裏氣而消內壅橘紅能兼行表裏以佐之橘紅利氣兼能發表散寒蓋氣行則寒散而食消矣甘草和中亦能解表為使也
 茵陳外治 治時氣瘴氣黃疸瘰癧赤白痢等症
 茵陳 梔子 鱉甲炙 芒硝二兩 大黃五兩
 常山 杏仁炒三兩 巴豆一兩去皮 淡豆豉五合

片炒黃去火毒用又法甘草

二名鹽水姜汁童便各半煮熟

用畏人參黃芪甘草防風犀

角豕豆童便反貝母半夏栝

藎白及白欬中其毒者黃連

犀角甘草煎湯解之黃土水

亦可解 烏頭功同附子而

稍緩附子性重峻溫脾逐寒

烏頭性輕疎溫脾逐風寒疾

宜附子風疾宜烏頭 烏附

犬吐風痰治癩癩取其鋒銳

直達病所丹溪治許白雲屢

效苦等劑吐之不透後用附

干火印漿水與之始得六吐

膠痰 天雄補下焦命門陽

虛寇宗奭張元素皆云補上

時珍曰其失皆向下生故下

行然補下乃所以益上也若

上焦傷虛則屬心肺之分治

風寒濕痺為風家主藥發汗

又能止陰汗 側子散側旁

生宜干發散四肢充達皮毛

本草備要

醫方集解

三五

蜜丸栝子大母服一丸或吐或利或汁
如不應更服一丸不應則以熱湯投之
老幼以意加減

此足太陽太陰陽明厥陰藥也梔子淡
豉梔豉湯也合常山可以涌吐合杏仁
可以解肌大黃芒硝承氣湯也可以蕩
熱去實合茵陳可以利濕退黃三藥各
治黃加巴豆大熱以祛臟腑積寒加鱉
甲滋陰以退血分寒熱此方備汗吐下
三法故能統治諸病居平當預合之以

備緩急雖云劫劑實佳方也

治手足風濕諸痺

草烏頭 辛苦大熱搜風勝濕

醫方集解卷二

開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗

和解之劑

邪在表宜汗在土宜吐在

勝川烏然至毒無所釀制不

從中治宜和解故仲景于少陽症而

可輕投野生狀類川烏亦名

以汗吐下三者為戒也昔賢云或按

烏喙姜汁炒或豆腐煮用熬

病脈燥盛而不得汗者陽脈之極也

膏名射罔傳箭射獸見血

死然有當和解之症汗之不得汗和

白附子 辛甘有毒大熱純陽

小柴胡湯 治傷寒中風少陽症寒熱往

陽明經藥能引藥勢上行治

來胸脇痞滿默默不欲食心煩喜嘔或

面上百病

腹中痛或脇下痛或渴或欬或利或悸

風作而脂補肝虛祛風痰治

小便不利口苦耳聾脈弦或汗後餘熱

本草綱目 草烏 白附子

醫方集解 卷二 小柴胡湯 上六

心痛血痺諸風冷氣中風失

音陰下濕痒根如草鳥之小

者長十許皺紋有節炮用陶

景曰此藥久絕無復
重者今惟涼州生

破故紙一名補骨脂辛苦大温人心

包命門補相火以通君火煖

丹田壯元陽縮小便治遺尿

五勞七傷五藏之勞傷腰膝冷

痛腎冷精流腎虛泄瀉則命

門火衰不能薰蒸脾胃脾胃
虛寒不能運化致飲食減少

腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如鼎金

之下無火物終不熱故補命

門相火即所以補脾破故紙

四兩五味三兩肉苁蓉二兩吳

茱一兩芫荽煮丸名婦人血

氣婦人之血脫氣陷亦隨胎

出南番者色赤嶺南者色綠

酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽

水炒煮得胡桃胡麻良薑并

草唐郭相國方破故紙十兩

兩去皮爛研蜜和每日酒調
一匙或水調服白飛霞曰故
紙為大堅固元陽胡桃屬木
潤燥養血有木火相生之妙

不解及春月時嗽瘧發寒熱婦人傷寒

熱人血室陽邪客于半表半裏陰出與

陽爭陰勝則寒陽入與陰爭陽勝則熱

陽不足則先寒陰不足則先熱又曰大

陽行身之後屬膀胱寒水為表陽明行

身之前屬胃燥金為表之裏邪在于中

近後膀胱水則寒近前陽明燥則熱也

寒熱有定時者為瘧無定時者為往來

已復熱此邪未併于表裏故寒熱微而

無定時也半表半裏屬足少陽胆脈行

于兩脇手少陽三焦之脈絡心包風邪

于之心氣不得宣暢故煩滿或攻胸脇

故又胸脇痛也邪在表則呻吟不安在

裏則煩而悶亂邪自表而安傳裏故默

默靜也經曰陽入之陰則靜邪在表則

能食人裏則不能食今在表裏之間故

但不欲食未至于不能食也邪在表則

不煩不嘔在裏則煩嘔表方傳裏故心

煩喜嘔由裏虛腸熱故或渴或利或胸

中痛裏有停飲故悸而小便不利少陽

胆脈絡于耳故耳聾胆氣上溢故目苦

胆與肝皆屬木故脈弦春月時嗽少陽

當令之時也血室衝脈也男女皆有之

婦人傷寒七八日邪當傳裏值經水適

來則邪不入府乘虛而入血室或經水

適斷表邪乘虛亦入血室熱與血搏結

而不行致有寒熱如瘧暮則譫語如見

鬼狀在男子則下血謔語皆為熱入血

室婦人傷寒與男子無異惟熱入血室

在藏主血故更能入血室經曰傷寒中

亦治傷

本草集要 卷之七

已心去苦口羊血加
杜仲名青娥丸

肉蓯蓉 甘酸鹹温入腎經血

分補髓相火滋潤五藏益

髓強筋治五勞七傷絕陽不

興絕陰不產腰膝冷痛崩帶

遺精峻補精血時珍曰補而
不峻故有後

蓉之驟用恐妨心滑大便長

大如臂重至斤許有松子鱗

甲者良酒浸一宿刷去浮甲

劈破除內筋膜酒蒸半日又

酥炙用忌鉄蘇恭曰今用草
菴蓉功力稍劣

瑣陽 甘温補陰益精與陽潤

燥養筋強筋故
能與陽治痿弱滑大

腸使燥者啖之可代
從蓉煮粥弥佳鱗用

櫛比狀類男陽酥炙

巴戟天 甘辛微温入腎經血

分強陰益精治五勞七傷辛

温散風濕治風氣脚氣水腫

根如連珠擊破中紫而鮮潔

者偽也中雖紫微有白粉粉

本草集要 卷之七 巴戟天

醫方集要 卷之七

寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下

滿不欲食大便鞅脉細者為陽微結

曰汗出為陽微假令純陰結不得復有
外症脉虽沉緊不得為少陰病所以然

者陰不得有汗今頭有汗故知非少陰
也按三陰脉皆至頭而不上循

頭程交情曰熱虽結而不甚輕以有微
惡寒之半表在至于脉沉虽似裏陰則

又有頭汗出之症以別之凡脉細脉沉
脉緊皆陽熱鬱結之症无問少陰也可

見陽氣一結不但陽症
似陰陽脉亦似陰矣

柴胡 半夏 人參 甘草 黄芩

生姜 大枣 十二 嘔逆加生姜陳皮

散逆陳煩而不嘔去半夏人參加栝藹

以蕩熱渴者去半夏加花粉生津若不渴外
機熱

有微執去人參加桂枝取微汗解肌咳

嗽去麥冬生姜加五味子乾姜逆肺寒
咳為氣

五味欬肺干姜散寒乾元祀曰少陽有
嗽無喘有喘非少陽也陽明有喘無嗽

有嗽非正
陽明也虛煩加竹葉粳米竹葉凉心
梗米和胃

茵陳無津加石膏茵陳屬陽明火
石善清胃止渴痰多

加瓜薑負母熱痰
熱痰腹痛去黄芩加芍藥

黄芩寒中芍藥
合甘草和裏脇下痞鞅去大枣加牡

蛎牡蛎寒能軟堅
脇為肝胆之却痛心下悸小便不利去

醫方集要 卷之七 小柴胡湯

七九

上六

色而裡小暗者真也蜀產佳

山樺根似巴戟但色白人或醋煎以亂之去心酒

浸焙用覆盆子為使惡丹參

胡蘆巴 苦温純陽入右腎命

門煖丹田壯元陽治腎臟虛

冷陽氣不能歸元同附子痲

疝冷氣同茴香巴戟川寒温

脚氣 出嶺南者船者良云

是番菜服子酒浸或蒸或炒

仙茅 辛熱有小毒助命火益

陽道明耳目補虛勞治失溺

無子心腹冷氣不能食温腰

脚冷痺不能行煖筋相火盛

者已服 葉如茅而畧潤根

如小指黃白多涎竹刀去皮

切糯米泔浸去赤汁出毒用

忌鉄唐密羅國始進此方當

制陰乾密丸酒服禁食牛乳

牛內許直君書云甘能養肉

辛能養脈苦能養氣鹹能養

本真用要草仙茅望望霍葉

藜麥加茯苓經曰太陽症飲水多心下

不行故小便不利黃芩苦本經頭痛加

川芎入肝活血發黃加茵陳利

此足少陽藥也胆為清淨之府無出無

入其經在半表半裏不可汗吐下法宜

和解仲景曰少陽中風耳聾目赤胸滿

日和在半表半裏以吐除煩吐則傷氣

氣虛皆悸以下除滿下則亡血血虛者

藜又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少

陽不可汗汗之則譫語釋曰汗之亡津

液少陽之利因和入本經乃由表而將

至裏當微熱發表迎而奪之勿令傳太

陰柴胡味苦微寒少陽主藥以升陽達

表為君黃芩苦寒以養陰退熱為臣陽

足則陰疾之故發寒用黃芩降陰氣使

不陷人陽中則不寒陰不足則陽疾之

故發熱用柴胡升陽氣使不陷人陰中

則不熱又曰柴胡黃芩之苦寒以退熱

半夏生姜之辛温以退寒人參

大棗甘草之甘温以助正氣半夏辛

温能健脾和胃以散逆氣而止嘔人參

甘草以輔正氣而和中使邪不得復傳

入裏為佐二藥固大陰使木邪不致

在牛表半裏則營衛爭表屬衛故用姜

枣之辛甘以和營衛為使也李時珍曰

醫方集解和卷一小柴胡湯

上六

經羊藿 辛香甘温入肝腎補

命門時珍曰手足陽益精氣

堅筋骨利小便治絕陽不與

絕產冷風勞氣四肢不仁

手足一名仙靈脾北部有

羊一日百合食此靈所致故

名去枝羊脂拌炒山藥為使

蛇床子 辛苦而温強陽益陰

補腎散寒祛風燥温治陰痿

囊濕女子陰痛陰癢温生虫

洗子臟虛寒產門不開慰之

腎命之病及腰酸体癱帶下

脫肛喉痺齒痛濕癬惡瘡殺

止風濕諸病煎湯浴去風辛

時珍曰腎命三焦氣分之藥

不独補助男子而且有益婦

人世人舍此而求補藥于

遠域豈非貴耳賤目乎

似小茴而細微炒殺毒則不

兔絲子 甘辛和平疑正陽之

氣入足三陰脾肝強陰益精

在半表半裏而胸膈痞滿寬兼心肺上

焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾

胃中焦之症故用黃芩以治手足少陽

相火黃芩亦少陽藥也昂按半夏止嘔

和胃健脾亦通治嘔煩不欲食寒熱間

作脾亦有之不独少陽也小柴胡之用

半夏以和在半表半裏則陰陽爭用半

夏和胃而通陰陽也靈樞經用怡不眠

亦同此意而仲景治喉痺咽痛及大小

便秘皆用半夏取其辛能潤燥又能散

也丹溪謂半夏能使大便潤而小便長

今人專以半夏為除痰之藥惜濕燥症

輒不敢用而半夏之功用不復見知干

世矣徐忠可曰小柴胡能引清氣而行

陽道能引胃氣上行而行春令能散諸

經血凝氣聚故凡邪之表裏混雜者俱

藉之以提出少陽俾循經而散以柴甘

生薑為定藥餘則加減隨症耳陶節菴

曰本經症心下飽悶未經下者非結胸

也乃表邪傳至胸中未入于府倘為在

表只須小柴胡加枳實不効就以本方

對小陷胸加枳實一服豁然其効如神

喻嘉言曰傷寒分表裏中三治表裏之

和俱盛則從中而和之故有小柴胡之

和法干人參甘草半夏生薑大棗助脾

裏飲人胃中聽胃氣之升者帶柴胡出

表胃氣之降者帶黃芩入裏一和而表

裏之和平服未及者加工治之不和平

格矣又曰虛勞發寒熱者乃衛虛則惡

寒營虛則發熱耳溪調管衛不充我

寒熱自止管設用小柴胡俾汗多而衛

傷于外便瀉而管營于內虛熱轉加病

益甚矣吳綬曰小柴胡為半表半裏之

劑大陽經之表熱陽明經之標熱皆不

東以地黃汁拌

辛蒸三次佳

惡丹皮

貝母

巴豆

強陰益精

強陰益精

強陰益精

強陰益精

強陰益精

温而不燥不助相火治五勞

七傷精寒淋瀝口苦燥渴

腎燥而生內熱祛風明目補

衛氣助筋脉苗氣力肥健人

補肝腎之功毛髮筆記予

族弟少服五絲子凡數年飲

食倍常血氣充盛忽因浴見

皆腫隨視隨長乃大疽也適

值金銀花開飲至數斤腫遂

消兒孫遇服向能痊疽以此

知金石藥 無根曼延草上

之黃如黍粒得酒良淘去泥

沙酒浸宿暴乾搗末

覆盆子 甘酸微温益腎藏而

固精補肝虛而明目起陽痿

縮小便寇氏曰服之當澤肌

膚烏髮按注金女子多孕

同蜜為膏治肺氣虛寒李士

如夷盆故名去蒂淘淨搗餅

用時酒拌蒸葉絞汁滴目中

出目弦重除膚赤收温止淚

疾瘵子 青温補腎辛温泄肺

本方在男妻草類

不獨峻劑也。李東垣曰若血安病亦先調氣謂氣不調則血不行氣夫血婦也如婦人經病先柴胡以行經之表欠四物以行經之裏亦先氣而後血也

本方以前胡易柴胡名小前胡湯崔氏治

同胡治云亦本方加陳皮芍藥名柴胡

雙角散治同本方加苦硝名柴胡加

芒硝湯仲景見本方加桂枝名柴胡加

桂枝湯景治傷寒六七日發熱微惡寒

支節煩痛微嘔心下支結外症未去者

傷寒六七日和常傳裏支結者胸中支

擇而結也喻嘉言曰調結于心之邊旁

也嘔而支結為將傳裏發熱惡寒骨節

煩痛為外症未除宜和解昂按能兼六

湯故加桂枝脉經曰發汗多下陽語謂

不可下宜此湯和其苦衛以通津液日

本方除黃芩甘草加茯苓桂枝龍骨

牡蛎鉛丹太黃名柴胡加龍骨牡蛎湯

治傷寒八九日下之胸滿煩驚小便

不利譫語身重不可轉側傷寒八九日

之可謂慎矣孰知外利未盡乘虛入裏

煩滿者陽熱入胸也驚者心惡熱而神

不守也煩驚雖係乎心亦因胆虛為將

重之官失榮而多畏也小便不利裏虛

而津液不行也譫語胃熱也身重不可

轉側陽氣不皆于表也與柴胡湯以除

煩消加茯苓龍骨牡蛎鉛丹收斂神氣

而鎮驚而茯苓牡蛎又能行津液利小

便如大黃以逐胃熱止譫語加桂枝以

行陽氣合藥所以散表邪而解身重也

本方在男妻草類

本方在男妻草類

本方在男妻草類

本方在男妻草類

氣而散肝風益精明目散所以

補肝補肝藥皆能明目治虛勞腰痠遺

精帶下咳逆肺癆乳閉癥瘕

痔漏陰瘡肺肝腎三經之

病催生墮胎故能破癥下胎

少死葵藜綠色似腎故補少

用亦可刺痰癥三角有刺去

刺酒拌蒸風家宜刺痰癥補

餘功夏高瑞竹堂方齒打動

使君子 甘温健脾胃除虛熱

殺穢虫治五疳便濁泄痢瘡

癬為小兒諸病要藥五疳便

濁瀉痢腹重皆由脾胃虛弱

因而乳停食滯濕熱痰蕪而

成脾胃健則積滯消濕熱散

水道利而前症尽除矣時珍

曰凡殺虫之藥多是苦辛獨

使君子性味甘而殺虫每月

上旬虫頭而上中旬頭橫下

虫頭向上比有虫病者每日

上旬空心食荔枝虫皆死而

也 出閩蜀五瓣有核肉仁

如樞亦可煨食久則油黑不

可用忌飲熱茶犯之作瀉

本草補五草使君子益腎

補故去甘草按傷寒傳足不傳手其症

原无界限此症和執于心神明內乱故

致煩驚語語仲景加入心藥數

種不專以足指之治治之也 不方去

半夏人參姜朮加桂枝干姜花分牡蛎

名柴胡桂枝干姜湯治傷寒江下後

胸脇滿微結小便不和渴而不嘔但頭

汗出往來寒熱心煩者

知政除人參半夏而加桂枝以解太湯

干姜以散滿花粉以生津壯朝以與堅

以此和而解復亦治瘧疾寒多熱少或但

津液而助陽

寒不熱之方可從寒熱以為進退此方

加姜桂則進而從陽其加姜連以退而

從陰可以類推李延曰傷寒餘劫未足

重感六淫之氣變而為瘧治法與雜病

不同寒多熱少或單寒者太陽和變也

柴胡桂枝湯治多寒少或單熱骨節煩

痛者陽明和變也小柴胡湯渴者去半

夏加花粉知母寒熱大作戰慄汗出不

散者太陽陽明合病也桂枝石蓋湯服

此後瘧愈甚者三陽合病也恐傳入陰

經急用桂枝黃芩湯如傳入陰經從卯

至午發而嘔吐大便閉者大柴胡湯下

之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣

湯下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑

者桃仁承氣湯微利之不敢下者梔子

升麻湯若快痰食瘴氣治法與雜病畧

同附桂枝石蓋湯桂枝一不黃芩二不

知母石蓋各三不桂枝黃芩湯即小柴

胡加石蓋二不知母二不桂枝五分李

樞曰二方以桂枝治太陽白虎治陽明

柴胡治少陽意甚明顯快痰合二陳食

積合平胃瀉瀝合五苓便閉合大柴胡

無汗加葛根蒼木汗加黃芪白朮夜

上六

上六

益智子 辛熱本脾藥兼入心

腎主君相二火補心氣命門

三焦之不足心為脾母補火故能生土能

瀉精固氣本草未載又能開發鬱

結使氣宣通味辛能散溫中進食

撮涎唾胃冷則湧縮小便腎與膀胱

相表裏益智子溫固腎鹽水炒同烏藥等分酒煮山藥糊

九鹽湯下名縮泉丸治嘔吐泄瀉寒

犯胃冷氣腹痛崩帶泄精固氣因熱而出嶺南形如束

核用仁

砂仁即縮砂蜜辛溫香鼠補肺益

腎和胃醒脾快氣調中通行

結滯治腹痛痞脹痞滿有傷寒下早裏

虛邪入而病者有食滯痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者

須分虛實治之不宜需用利氣藥恐變為鼓脹鼓脹內脹

而外有形痞脹惟費滯壅膈門而已皆太陰受病也

嘔吐上氣咳嗽赤白泄痢積滯客于大腸砂仁亦入大小腸經

霍亂轉筋奔豚崩帶逐痰逐冷消食醒

益智子 辛熱本脾藥兼入心

腎主君相二火補心氣命門

三焦之不足心為脾母補火故能生土能

瀉精固氣本草未載又能開發鬱

結使氣宣通味辛能散溫中進食

撮涎唾胃冷則湧縮小便腎與膀胱

相表裏益智子溫固腎鹽水炒同烏藥等分酒煮山藥糊

九鹽湯下名縮泉丸治嘔吐泄瀉寒

犯胃冷氣腹痛崩帶泄精固氣因熱而出嶺南形如束

治肌熱蒸熱積熱汗後餘熱脈洪實

女表為肌執裏為表亦治瘧疾喻嘉言曰

活湯治濕疫少陽症本方加桔梗名柴

胡桔梗湯治春嗽本方合平胃散名柴

平湯治濕瘧身痛身重本方加青黛姜

汁糊升名清鎖丸古治嘔吐脈弦頭痛

及熱嗽本方一分加四物二分名柴胡

四物湯治婦人日久虛勞微有寒熱本

方與四物各半名調經湯

酒止痛安胎氣行則痛止散

咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽

王好古曰得檀香豆蔻入肺
得人參益智入脾得黃柏茯苓
岑人腎得赤石脂入大小腸
醫通曰辛能潤腎燥引諸藥
清宿丹田地黃用之拌蒸亦
取其能達下也經疏曰腎虛
氣不熅元用為向導出嶺南
研用

白薑寇 辛熱流行三焦溫煖

脾胃三焦利脾胃而為肺家

轉諸症自平本藥肺王故滯氣消酒積除

寒燥濕化食寬腸治脾虛瘧

疾感寒腹痛吐逆反胃肺胃火盛

及氣虛者禁用白睛膜白睛屬肺能散肺滯

太陽經目背紅筋太陽脈起內背

番州者良研用

肉薑寇一名肉果辛溫氣香理脾

煖胃下氣調中逐冷祛痰消

食解酒治積冷心腹脹痛痰

扶合者宜之中惡吐沫小兒吐逆

乳食不下又能瀉大腸止虛

黃連湯仲景治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中

有寒而腹痛成氏曰濕家下後舌上如

寒是邪氣入裏而為下寒上熱也此傷
寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有
邪氣使陰不得升而獨治于下為下寒
腹中痛腸不得降而獨治于上為肺中
熱欲嘔吐與此
湯以升降陰陽

黃連剉 乾姜剉 桂枝 甘草二人參而

半夏升 大棗十二枚 此足陽明藥也黃

連苦寒泄熱以降陽姜桂辛溫除寒以

升陰人參助正祛邪半夏和胃止嘔甘

草大棗調中止痛上中二焦寒熱交戰

以此和解之喻加言曰濕家下之舌上

寒也仲景亦用此湯何即益傷寒分表

裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和

之故有小柴胡之和法至下丹田胸中

之邪在上下而不在表裏則變柴胡為

黃連湯以性微代柴胡以黃連代黃芩

以干姜代半夏飲人胃中曉胃氣之士

下煖有故不問下寒上熱上寒下熱皆

可治之也夫表裏之和則用柴芩用生

姜之辛以散之上下之邪則用桂連用

干姜之辣以開之仲景聖法灼然矣昂

按上下未有不分表裏者大藥上焦屬

表中下屬裏胸中與太陽為近故用桂

枝加言着跟昂高而
而立言尚有未盡

黃芩湯仲景治太陽少陰合病自下利者合

者謂有太陽症之身熱頭痛脊強又有
少陽症之耳聾脇痛嘔而口苦寒熱往

泄冷痢初起忌用 出嶺南以草

蕞外有皺紋內有斑紋糯米

粉裹煨熟用忌鐵

草薺一名草果 辛熱香散煖胃健

脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰

化食消瘴癘寒佐常山能

知母同用取其一陰一陽治

寒熱瘧疾益草藥治太陰獨

勝之寒知母治寒客胃痛滯

腸反胃痞滿吐酸痰飲積聚

解口臭氣酒毒魚肉毒故食

之過劑助脾熱耗氣損目

闔庭名草薺如龍眼而微長

皮黃白薄而稍峭仁如砂仁

而辛香氣和遠廣所產名草

菓如訶子皮黑厚而核窳子

粗而辛臭雖是一物微有不

同麪裏煨熟散仁用忌鐵

香附一名荜 性平氣香味辛能

散微苦能降微甘能和乃血

來也自利者不因攻下而泄瀉也自利固多可溫然腸胃有積結與下焦客熱又非溫劑所能止或分利之或攻泄之可也成氏曰太陽陽明合病下利為在表與葛根湯以汗之少陽也明合病下利為陽和人裏與承氣湯以下之此太陽少陽合病下利為在半表半裏與黃芩湯以和解之

莫琴二芍藥 甘草二大棗 枝十二

此足太陽少陽藥也成氏曰虛而不實

者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦

酸以堅歛腸胃之氣弱而不定者甘以

補之甘草大棗之甘以補腸胃之弱昂

二經合病何以不用二經之藥蓋合病而兼下利是陽邪入裏則所重者在裏

故用黃芩以徹其熱而以甘草大棗和

其太陰使裏氣和則外症自解和解之法非一端也○仲景之善一守不守此

症單言下利故此方亦單治下利初要

用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯治

古因之加木香檳榔大黃黃連歸尾官

桂更名為藥湯治下痢時景

此方遂為萬世治痢之祖矣

本方加半夏升生薑二名黃芩加半夏

生薑湯治前症兼嘔者 加半夏生薑

以助逆氣千金曰生薑嘔家聖藥足散

其逆氣也金匱曰嘔家用半夏以去其

水水去則嘔止亦治胆府發欬嘔苦水

如胆汁胃氣逆則嘔苦 本方除大棗名

黃芩芍藥湯治火升鼻衄及熱痢台黃

本草綱目卷之五

本草綱目卷之五

本草綱目卷之五

中氣樂道行十二經八脈氣

分三一切氣人身以氣為

哀順則平逆則病絕則死矣

經曰怒則氣上恐則氣下喜

則氣緩悲則氣消驚則氣亂

思則氣結勞則氣耗此七情

之氣也以香附為君隨利三

症而加升降消補之藥

焦解六鬱痰火鬱氣入

諸痛通則治多怒多憂痰飲

痞滿付腫脹飲食積聚霍

亂吐泄腎氣脚氣瘰癧瘡瘍

血疑氣滯所致香附一味水

服名能勝九治瘰癧疽由人怒

此陰陽

和肝木乘脾而然心腹痛有寒有熱有

虛有寔有食積有濕痰有死血有由寒

痛者痛無增減或兼吐利熱痛者時痛

時止腹滿堅結是痛者痛甚脹滿手不

可按虛痛者按之即止食痛者痛甚則

利利後痛減死血痛者痛有常處濕痰

痛者兩滑痰氣阻不得升降中痛者

時作時止面白唇紅大抵胃脘下大腹

痛者多屬食積外邪透膈痛者屬痰火

積熱勝下少腹痛者屬寒或瘀血或癆

虛仲景用治誤表發厥脚攣吐逆與乾

姜甘草湯以復其陽厥愈是溫者更此

湯以和其陰其脚即伸酸甘相合用和

陰血王海藏曰

得者如瘡初作以此代茶潰

後亦宜服之大元瘡疽毒服

香藥行氣通血最忌吳穢不

潔觸之康祖左乳病疽又臆

間生核痛楚生毒禱張王夢

授以方姜汁製香附為末每

服二三次

飲下遂愈吐血便血崩中帶

下月候不調氣行結成塊者

氣之凝將行而痛氣之滯行

後作痛氣血俱虛也色淡亦

虛也色紫氣之熱色黑則熱

之甚也錯經者氣之亂肥人

痰多而結阻氣不運也香附

陰中快氣之藥氣順則血和

腸然須輔以涼血補氣之藥

丹溪曰能引血藥至氣分而

生血此正陽胎產百病能推

生陰長之義

稼積作甘甘者已也曲直作酸酸

者甲也甲已化土此仲景妙方也

白芍藥 甘草各 脈緩傷水加桂

枝生姜脈洪傷金加黃芪大芩脈瀆傷

血加當歸脈弦傷氣加芍藥脈遲傷火

加于姜 此足太陰陽明藥也氣血不

和故腹痛白芍酸收而苦泄能行營氣

炙草溫散而甘緩能和逆氣又痛為木

盛尅土諸痛皆 白芍能泄肝甘草能緩

肝而和脾也虞天民曰白芍不惟治血

不和逆于肉裏得白芍行其營氣又以

甘草之甘緩和其逆氣此不治之治乃

陳致新故諸書皆云益氣中

所以深 本方去芍藥加于姜二兩名

有補丹溪曰天行健運不息

甘草于姜湯 見寒門 金匱用此治肺痿

所以生生無窮即此理耳時

肺冷吐涎沫小便 女以此本方加附子

珍曰凡人病則氣滯而餒香

名芍藥甘草附子湯 見寒門 本方加黃

附為氣分君藥臣以參芪佐

芩名黃芩芍藥湯 治熱痢腹痛身重

以甘草治虛 去毛用生則上

身熱膿血稠粘及鼻衄不止脉洪數此

法甚速也 行胸膈外達皮膚熟則下走

湯除大寒 本方加白朮名白朮芍藥

肝腎旁徹腰膝重便浸炒則

或暴下者皆太陰受病故不可離芍藥

入血分而補虛鹽水浸炒則

于白芍白朮內春加防風夏加黃芩秋

入血分而潤燥 或蜜炒青鹽炒

加厚朴冬加桂附更詳外症治之如身

則補腎氣酒浸炒則行經絡

醋浸炒則消積聚 且欬姜汁

炒則化痰飲炒黑又能止血

困倦加白朮自汗逆冷氣息微加桂附

忌失時珍曰得參朮則補氣

以溫之如妻等後重膿血稠粘在盛

則散滯和中得檀香則理氣

冬于溫藥內 亦加大黃

醒脾得沉香則升降諸氣得

栝蒌薤白白酒湯 治胸痺喘息咳唾胸

苒蕭蒼朮則燥解諸鬱得梔

背痛短氣 胸中者心肺之分故喘息而

子黃連則清降火熱得茯苓

于皆氣痺不行故 胸背為痛而短氣

則交濟心腎得茴香破故紙

栝蒌核薤白白酒 此上焦膈中

則引氣滯元得厚朴半夏則

藥也 膈中兩乳中間經曰膈中 喻嘉言

決壅消脹得紫蘇葱白則發

曰胸中陽氣如離昭當空曠然無外設

汗散和得二稜菝葜則消積

地氣一上則窒塞有加故知胸痺者陰

磨埋得艾葉則治血氣痿子

氣上逆之候也仲景微則用薤白白酒

宮乃氣病之總司女科之仙

乃始標之則惟氣寔血未大

藥也 大抵婦人多鬱氣行則

血愈致其疾矣世俗泥于女

人不宜于男子也李士材曰

虛者直之不然恐損氣而燥

乃始標之則惟氣寔血未大

血愈致其疾矣世俗泥于女

血愈致其疾矣世俗泥于女

血愈致其疾矣世俗泥于女

本草備要卷之五

科仙藥之一語惜
未有發明及此者

水香 辛苦而温三焦氣分之

藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣然則肝氣上肺氣

肝平水不冠治一切氣痛九

種心痛痛屬胃脘曰寒痛熱

痛吐痛悸痛益君心不易受

朝發嘔逆反胃霍亂瀉痢後

重同折柳用劉河間曰痢疾

後重除癰閉痰壅氣結症瘕

塊腫毒蠱毒衝脈為病氣逆

裏急殺鬼物禦瘴霧去腋臭

實大腸消食安胎胎不安過

服泄真氣丹溪曰味辛氣升

助火刑金用黃極知母少以

木香佐之王好古曰本草主

氣劣氣不足補也通導道氣

疲也安胎健脾胃補也除痰

癖癥塊破也不同如此証机

曰與補藥為佐則補與泄藥

為君則泄時珍曰諸氣憤鬱

皆屬于肺上焦氣滯用之者

全鬱泄之也中氣不運皆屬

于脾中焦氣滯用之者脾胃

以益其陽甚則用附子于姜以消其陰

世醫不知胸痺為何病習用葶芫木香

訶子三稜神曲麥芽等藥坐耗其胸中

之陽亦相懸矣葶芫尤滑露亦難守故

氣滯故胸痺本方加半夏名枯薑庭

白半夏湯金匱治胸痺不得卧心痛徹背

以不得卧本方除白酒加枳實厚朴桂

枝名枳實薤白桂枝湯金匱治胸痺氣結

在胸胸滿脇下逆愴心

温膽湯集驗治膽虛痰熱不眠虛煩驚悸口

苦嘔涎胆以温為候虛則寒寒則不眠

口苦嘔吐多屬半表半裏少陽胆經之

和胆虛氣入政強生痰涎而煩嘔傷寒

病後多有此症 陳皮去 白半夏製 枳實神 乳末

甘草 枳實 枳殼 竹茹 加姜或加束局

方無茯苓如心虛加人參棗仁心內煩

熱加黃連麥冬口燥舌乾去半夏行水

耗加麥冬五味花粉表熱未清加柴胡

內虛大便自利去枳實加白朮內實心

煩加黑梔仁

此足少陽陽明藥也橘半生姜之辛温

此方集解和六一温病

八十九 上六

五音備要

則為虛弱下焦氣滯 用之者琴音通之也 番舶

上來形如枯骨味苦粘舌者

良名青木香 今所用皆皆廣木香木香

磨汁用東垣用黃連製亦有

蒸用麩裹煨用 畏用實腸止泄 畏火

霍香 辛甘微温入手足太陰

肺快氣和中開胃止嘔胃弱而嘔者思用 去惡氣進飲食治霍

亂吐泄心腹絞痛肺虛有寒

上焦雍執 能理脾胃之氣古方有藿香正氣散

正氣通陽則 出竅廣方莖

有節葉微似茄葉古唯用葉

今枝梗亦用之因葉多偽也

茴香 古作懷香 大茴辛熱入腎膀胱

煖丹田補命門開胃下食調

中止嘔療小腸冷氣願痛陰

重亦有七種氣血寒水筋脈厥陰肝脈絡陰器也多因寒未下温散藥中乾温脚氣多食損自

發瘡 小茴辛平理氣開胃

醫方集解 卷二

以之道痰止嘔即以之温胆 戴氏曰痰在胆經神

不痛舍亦令人下麻想是破滯茯苓渗温甘草和

中竹茹開胃士之鬱清肺金之燥凉肺

金節所以平甲木也 胆為甲木如是則

不寒不燥而胆常温矣經又曰胃不和

則卧不安又曰陽氣滿不得入于陰陰

氣虛故目不得瞑半夏能和胃而通陰

陽故內經用治不眠二陳非特温胆亦

以和胃也 温胆湯即二陳加枳實竹茹

泡與氣搏發生諸症解事易驚或夢寐不解或短氣悸乏或目眩並温胆湯

之嘔則以人參代竹茹內經半夏湯治

痰盛不眠半夏夏五合糯米一升用清小

湯萬遍煮取汁出即已半夏除痰而利

小便糯米益陰而利人腸使上下通則

陰陽和矣經又曰諸水病者故不得卧

則則驚七則軟甚卒繩云內經半夏湯

皆去飲之則無飲者勿服全匱治虛勞

虛煩不眠用酸枣仁湯枣仁二升甘草

一兩知母茯苓各二兩深師加生

姜二兩此補用之則經曰卧則血歸于

肝昂按本草去枣仁炒用治胆虛不眠

生用治胆熱好眠竊謂胆熱必有心煩

口苦之症何以反能好眠乎温胆湯治

不眠用二陳加竹茹枳實一味皆凉藥

乃以凉肺結之熱非以温胆經之寒也

其以温胆名湯者以胆欲不寒不燥當

温為侯耳胆熱好眠一本方加人參遠

四字不能無也

志乘仁熟地黃各十味温胆湯治霍亂

亦治寒痲具料宜之大如麥

粒輕而有細稜者名大苟出

宜夏他處小者名小苟自香

舶來是八瓣者名八角茴香

炒黃用得酒良得鹽則入腎

發腎和故治陰疝受病于肝見症于腎

大小苟各一兩為未猪脬一箇連尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香 甘溫芳香理諸氣開

脾鬱治腹中滿痛風疝齒齲脚膝氣浮煎湯林洗 出涼

州及黔蜀葉如茅根極秘寒

山柰 辛溫煖中辟惡治心腹

冷痛寒濕霍亂風重牙痛

生廣中根葉皆如生姜台諸香用

良薑 辛熱煖胃散寒消食醒

酒治胃脘冷痛凡心口一點點痛非也乃胃脘有滯或有重

及因怒因寒而起以良姜酒洗七次香附醋洗七次焙研

因寒者姜二錢附一不因怒者附二錢姜一錢寒怒兼者

每錢半米飲加姜汁一匙鹽少許服初梁總患心脾痛要

本草備要 山柰 良姜 薑

驚惕

道遙散治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮

熱往來寒熱口乾便瀉月經不調潮熱

肝血虛也肝火乘肺故咳嗽和在少陽

故往來寒熱火盛燥金不能生水故口

渴便秘肝藏血肝病故經水不調

柴胡 當歸 白芍 木土炒茯苓不

甘草炙五分 加煨姜薄荷少許煎

此足少陽厥陰藥也肝虛則血病當歸

白芍養血而斂陰木盛則土衰甘草白

芍和中而補土補土生金柴胡升陽散

熱合白芍以平肝而使木得條達木喜條達

故以泄為補 茯苓清熱利濕助甘木以

取疏通之義 益土而令心氣安寧茯苓能通心胃生薑煖胃

祛痰調中解鬱薄荷搜肝瀉肺理血消

風疏逆和中諸症自巳所以有逍遙之

名 有乾咳嗽者用溪曰極為准治此係

遙散以開之不用補陰之劑可愈

昂按此即後條醫貫所言之旨也

本方加丹皮梔子名八味道遙已治怒

氣傷肝血少目暗目為肝竅經曰目得血而能視肝傷血少

則目昏丹皮能泄血中伏火梔子能泄

三焦鬱火故薛氏加之以柳肝氣兼以

醫方集解 卷二 逍遙散

九

各州霍亂瀉痢吐惡噎膈瘴
瘧冷痺肺胃熱者忌之出

嶺南高州子名紅葦葦溫肺

散寒醒脾燥濕消食解酒

脾胃藥中常用之宜陳壁土炒用

葦艾一作辛熱除胃冷濕中下

氣消食祛痰治小泄氣痢

蒸服虛冷腸鳴亦人大冷痰惡

心嘔吐酸水疔瘰陰疽辛散

陽明之浮熱治頭痛偏頭痛者口舍

偏頭痛者口舍溫水噴左

右以未吹一字入鼻効牙

痛寒痛宜干姜艾細辛

角溫在蜂房二鳥鼻淵多服

泄真氣動脾肺之穴損自

出南番嶺南亦有類椹子而

長青色去挺用頭醋浸刮淨

皮粟免傷人肺

烟草新辛溫有毒治風寒濕

痺瘧氣停痰山嵐瘴霧其氣人

口不循常度頃刻而周一身

本草綱目卷之九

醫方集解和卷一

九二

調經也醫賈白古方逍遙散柴胡薄荷
當歸芍藥陳皮甘草白木扶神其加味
者則丹皮厄子余以山厄屈曲下行池
水改用吳茱炒連其論五鬱曰東方先
生木水者生生之氣即火氣也火附木
中木鬱則火亦鬱矣火鬱則土自鬱土
鬱則金鬱金鬱則水鬱五行相因自然
之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆愈
逍遙散是也方中柴胡薄荷辛味最妙
蓋以甲木少陽之氣其氣未嫩象草
穿地而未伸此時若被寒風一鬱即軟
萎道抑不能上伸不上伸則下菹脾土
而金水併病矣惟得品風一吹鬱氣始
得暢達也蓋木喜風搖寒即摧萎溫則
發生柴胡薄荷辛能發鬱溫能人少陽
占人立方之妙如此其甚者方中加吳
茱炒連即左金丸黃連清心火吳茱氣
厥肝氣亦厥同氣抑求以平肝木木平
則不生心火火不刑金金能制木木直
伐木而佐金以制木此左金所以得名

也此法之巧者然猶未也繼用六味地
黃加柴胡芍藥以滋腎水脾能生木道
遙散風以散之也地黃飲雨以潤之也
木有不得其天者乎此法一立木火之
鬱既得木不下克土土亦得滋潤無燥
痛之患金水自能相生余謂一法可通
五法若如此推而廣之凡寒熱往來惡
寒惡熱嘔吐吞酸嗜雜胸膈痛小腹痛
膨脹頭運盜汗黃疸溫疫疝氣瘧泄等
症皆對症之方推而傷寒傷風傷溫除
直中外凡外感者皆作鬱看以逍遙散
加減出入無不獲効如小柴胡湯四逆
散羌活湯大同小異然不若此方之响
應也倘一服即愈少頃復發或頻發而
愈甚此必下寒上熱之假症此湯不可
復投當改用溫補之劑如陽虛以四君
子湯加溫熱藥陰虛以六味湯加溫熱
藥玄枳之士不須余贅矣又曰余于冬
月止傷寒麻黃桂枝症作寒鬱治不惡
寒者作火鬱治此余創論也既曰寒邪

令人通体俱快醒能使醉醉
 能使醒飢能使飽飽能使飢
 人以代酒代茶終身不厭
名相思草然火氣薰灼耗血損年
 人自不覺耳閩產者佳烟筒
金銀花 甘寒入肺散熱解毒
清熱即補虛凡味甘療風養
 是解毒補虛者皆補
血止渴 丹溪曰瘰疬安後發
冬丸切當忍冬養血治瘰疬
 黃芪補氣渴何由作
疥癬楊梅惡瘡腸痔血痢五

何故人內而反為熱不知即是本身之
 火為寒所鬱一步返歸一步久則純熱
 矣三黃解毒解其火也葛根升麻火鬱
 發之也三承氣土鬱奪之也小柴胡水
 鬱達之也此理甚簡易守直謂用麻
 黃桂枝必加涼藥子和六神通解加石
 羔干麻黃蒼木中陶氏謂九味羌活可
 代三方皆非也不若追遙散重可一方
 代三方也火為寒鬱煎煎腎水至木旺
 時無生發滋潤之本故發熱而渴非外
 感也余以六味湯滋其水
 以柴胡舒其木活人多矣
六和湯 治夏月飲食不調內傷生冷外
 傷暑氣寒熱交作霍亂吐泄及伏暑煩
 悶倦怠嗜臥口渴便赤傷酒等症風寒暑濕
 之邪傷脾則泄傷胃則吐傷肺則渴傷
 膀胱則溺赤陰陽相爭則寒熱交作或

種戶挂 經冬不凋 名忍
又名左 花葉同功花香尤
佳釀酒代茶熬膏並
瘰疬疔疔一切惡毒初起便
 服奇効乾者亦可不及生者
 力速忍冬五兩甘草一兩水
 二碗煎至一碗再入酒一碗
 零煎分三服一日一夜吃
 重者日二劑服至大小腸通
 利則藥力到忍冬丸照前分
 兩酒煎脂乾同甘草為末以
 所煮餘酒打糊為丸陳藏器
 云熱毒血痢濃煎服之為末
 糖調常服
 能稀痘
蒲公英 一名黃
 花也丁甘平花黃屬土
 本草綱目要藥卷二
 卷二

霍亂轉筋脾土四肢傷則
 倦急傷酒亦以溫散為治
砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏
扁豆 木瓜 人參 白朮 赤茯苓
甘草 加姜朮煎傷暑加香薷傷冷
 加紫蘇一方無白朮一方有蒼朮
 此足太陰陽明藥也藿香砂仁厚朴杏仁
 香薷脾辛能行氣而砂仁厚朴兼能化
食木瓜 酸能平肝舒筋肝木乘脾土故
 飲肺助肺金以平肝轉筋本瓜酸能
 和故治霍亂轉筋 **扁豆** 赤茯苓能滲
 濕清熱而扁豆又能散暑和脾半夏辛
 醫方集詳和卷二六和湯
 卷二 十六

入太陰陽明脾胃化熱毒解食

毒消腫核治乳癰乳頭屬房屬陽明同忍冬煎

為通淋妙品諸家不言治淋試之甚驗

牙烏髻髮瑞竹堂有還少丹

白汁塗惡刺丹蟬

葉如高白花如單瓣

菊花四時有花七罷飛絮斷

其功

出盛夏孕古游諸物上必遺

清汁乾久則有毒人手解之

成疾名孤尿刺慘痛不眠百

療確効取汁厚塗即愈千金

方極言

之莖中有白汁斲方升口一

許掘下數尺根大如拳旁有

人形拱抱搗汁酒服治隔噎

紫花地丁 辛苦而寒治瘰疽

發背疔腫癰無名腫毒

葉如柳而細夏開紫花結角

生平地者起莖

生溝壑者起莖

杜牛膝一名天冬精

能破血一婦產後口渴氣喘

使秘用行血利水莖不効用

溫散逆而止嘔參朮甘溫輔正以匡利

甘草補中協和諸藥姜枣發散而調營

衛皆所以和之也或加香薷者用以祛

暑加紫蘇者用以發表散寒也吳崔皇

者和六府也脾胃為六府之總司先調

脾胃則水精四布五經並行百骸九竅

皆大和矣昂按六和者和六氣也若云

和六府則五藏又不當和乎蓋風寒暑

濕燥火之氣夏月感之為多故用諸

藥匡正脾胃以拒諸邪而平調之也

霍香正氣散方治外感風寒內傷飲食憎

寒吐熱頭痛嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣喘

及傷冷傷濕瘧疾中暑霍亂吐瀉凡感

嵐瘴不正之氣者並宜增減用之凡氣

人慎

茯苓 白朮 陳皮 半夏 厚

朴 枳椇 甘草 每服五錢加姜

枣煎一方加水瓜氣脫能收

加消食藥 此手太陰足陽明藥也藿

香辛溫理氣和中辟惡止嘔兼治表裏

為君蘇芷枳椇散寒利膈佐之以發表

邪厚朴大腹行水消滿橘皮半夏散逆

除痰佐之以疏裏滯苓朮甘草益脾去

心直壯山更草紫花地丁杜牛膝

本草註山更草紫花地丁杜牛膝 卷二 霍香正氣散

殺虫治乳蛾喉痺砂淋血淋

良方云濃煎加乳麩少許神効小兒牙關緊

閉急慢驚風不省人事者絞

服之亦取嗽汁止牙痛搗之

傳虫蛇螫毒根白如短牛

膝地黃為使煎湯洗痔瘡

鶴虱苦辛有小毒殺五臟虫

治蚘蝨腹痛面白唇紅時發

肥肉汁調未服沈存中筆記云是

三鮮湯治時行瘧之通劑也此三陽經瘧

杜牛膝子或曰非也最粘人

云有狐氣炒熟則香

山豈根 葇蕤瀉心火以保金

氣去肺大腸之風熱心火降

腫止痛治喉癢喉風腫齒

痛含之喘滿熱咳腹痛下痢

五痔諸瘡解諸藥毒傳赤瘡

蛇狗蜘蛛傷瘡人馬驚黃熱

致極所葛蔓如豈經冬不凋

本草綱目

山豈根生男子

醫方集解和卷之三解湯

九五 上六

溫以輔正氣為臣使也正氣通暢則邪

逆自除矣吳受曰若太陽傷寒頭痛發

如妄用之虽汗出亦不解或成痞症皆

多矣凡傷寒發熱脉沉元氣虛人併天

陰傷寒發熱者皆不可用戴元礼曰肥

人多中以氣盛于外而軟于内也肺為

氣出入之道人肥者必氣急氣急必肺

邪盛肺金尅肝木胆為肝之府故痰涎

壅盛治之必先理氣中後氣未盡順痰

未尽降調理之劑當以藿香正氣散和

星香散服此藥非特治中風

之症中氣中濕霍乱尤宜

本方合三味香藿飲香芋扁名藿需湯

治伏暑吐瀉轉筋

三鮮湯 治時行瘧之通劑也此三陽經瘧

有中三陽者有中三陰者其症各殊同

傷寒也在太陽謂之寒瘧治多汗之在

陽明謂之熱瘧治多下之在少陽謂之

風瘧宜和之此三陽受病謂之暴瘧發

在夏至後處暑前此傷之淺者也三

陰從總謂之濕瘧當從大陰經論之發

在處暑後冬至前此傷之重者遠而為

瘧者老也居西方宜毒藥療之李誕

曰凡瘧須分陰陽氣虛屬陽血虛屬陰

發于春夏屬陽發于秋冬屬陰自子至

巳屬陽自午至亥屬陰邪淺在府為陽

與營衛並行故一日發邪深在藏為陰

橫連膜原不能與衛氣並行故間日發

或三四日一發衛虛則外寒營虛則先

熱喻嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪

伏于半表半裏適在少陽所主之界出

與陽爭陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱

即純熱無寒為瘧瘧溫瘧純寒無熱為

牝瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救

弊亦必返返少陽之界使陰陽協和而

牛蒡子 一名黑栝子 辛平潤肺

解熱散結除風利咽膈理痰

嗽消斑疹利二便行十二經

散諸腫瘡癩毒利腰膝滯

之氣 性冷而滑利痘症 實

如葡萄而褐色酒拌蒸待有

霜拭去用根苦寒竹刀刮淨

絞汁蜜和服治中風汗出乃

愈搗和猪脂貼瘡腫及反花

瘡肉反出

山慈菘 甘微辛有小毒功端

清熱散結治癰瘡疔腫癩癧

結核 醋磨 解諸毒蟲毒蛇

狂犬傷一根與慈菘小蒜相

類去毛殼用 玉樞丹中用之

州遂昌山無毛

瀉盧 鹹軟堅苦下泄寒勝熱

入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌

殺虫治遺精尿血癰疽發背

後全也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脈緩屢起而弦之一字寔貫徹之也昂按瘧之不離少陽猶咳之不離于肺故經曰五臟六府皆令人咳然必傳以與肺也

柴胡 麻黃節澤泄 各三 此足少陽

藥也吳鶴皋曰病有三在在表在裏及

在半表半裏也瘧邪藏于分肉之間邪

正分爭併于表則在表併于裏則在裏

未有所併則在半表半裏麻黃之辛能

散表邪由汗而泄澤瀉之鹹能引裏邪

由溺而出柴胡升陽發熱居表裏之間

而和解之此但可以治實瘧虛者當辨

其氣血而加補劑 晝發屬陽夜發屬陰

清脾飲 嚴用 治瘧疾熱多寒少口苦噤乾

小便赤澀脈來弦數 熱多陽勝也口苦盛故便赤虛邪居于半表半裏屬少陽肝胆之分肝胆屬木故脈弦

青皮 厚朴 醋炒 柴胡 黃芩 炒 半夏 製

茯苓 白朮 土炒 甘草 炙 藜蘆 加姜煎

一方加板柳大渴加麥冬知母瘧不止

加酒炒常山 一箇常山劫炭截

此足少陽太陰藥也瘧為肝胆之邪然

瘧烏梅欬陰清熱

古方以瀉盧及預解時行痘

湯為稱首 疹毒取其寒勝熱也 出關

中華如油麻枯黑如漆者真

甘草按蒸通翹為使

貫眾 味苦微寒有毒而能解

邪熱之毒治崩中帶下產後

血氣脹痛破癥瘕發斑痘海

藏快班 散用之 化骨噴能軟 殺三虫

根似狗脊而大汁能制三黃

化五金伏鍾乳結砂制承解

毒軟堅以此浸水缸中日

射干 苦寒有毒能泄是火火

降則血散腫消而痰結自解

故能消心脾老血行大陰厥

陰之積痰肺脾 治喉痺咽痛

為要藥搗汁醋和喻之引涎

膏消結核瘰癧便毒瘡母

煎丸治瘡再入之皆通經閉

取其降厥陰相火也 通經閉

利大腸鎮肝明目 扁竹花

根也葉橫鋪如鳥羽及扇

多因脾胃受傷而起脾屬濕土重感于

濕濕生熱熱生痰故見前症也脾既受

病木又尅之故用青皮柴胡以破滯而

代干柴胡疏上焦肝氣 半夏厚朴以行

痰而平胃厚朴平胃半夏燥痰 茯苓用

以滲濕黃芩用以清熱草菓辛熱能散

太陰之積寒除痰而截瘧能清膏 益先

去其害脾者而以白木甘草調而補之

也此即小柴胡湯加減從濕脾諸方而

清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之一

未達嚴用和氏之清矣張子和曰世醫

以瘧為脾寒甚苦歸之崇怪良可笑也

劉宗厚曰暑盛陽極伏陰在內人或納

涼燥塔寒杏肌肉之間或飢飽勞役內

傷而病作肌肉屬脾是則惡寒戰慄乃

謂之脾寒耳寔由風寒濕暍和入腠理

夏時毛竅疎通而不為病至秋氣收

之際表邪不能發越故進退不已往來

寒熱勢如凌虐人之狀所以名瘧即四

時之傷寒也十二經皆能為病古方多

取理內傷取劫由脾胃和精氣通陰陽

和解諸症悉散是脾病也世用發表

劫劑也昂按脾虛惡寒胃虛惡熱熱

間作脾亦有之不独少陽也虽十二經

藏皆能為瘧而脾胃受傷者寔多故仲

景小柴胡湯人參甘草半夏夏姜末皆脾

胃藥其治少陽仲柴胡一味而已嚴氏

宗之故以小柴胡加減而立清脾飲是

明從脾胃論治矣劉氏之論亦主脾胃

明從脾胃論治矣劉氏之論亦主脾胃

水浸一日葉初葉者半日用

續隨子一名千金子辛溫有毒行水

破血治癥瘕飲冷氣脹滿

蠱毒鬼疰利大小腸下惡滯

物塗疥癬瘡玉樞丹用之治百病多効經疏

日乃以毒始毒之功去殼取色白者

壓去油用時珍曰續隨子大

黑藺子一名甘平治寒痰喉痺

癰腫瘡癤婦人血氣煩悶血

運筋帶利大小腸久服令人

世叢生葉似蕪而長厚結角

治痢用醋拌

蓖麻子 辛甘有毒性善收亦

善走能開通諸竅經絡治偏

風不遂喎邪搗碎左貼右

禁鼻塞耳聾搗碎綿裹喉痺

舌脹油作紙能利水氣治水

癰浮腫研服當下青黃水能

出有形滯物治針刺入肉搗

內傷乃不敢翻子和之案以為非脾病
恐不然也又古方用薛利丹雄珠丸治
鬼瘧益雜病多有挾鬼症
者何此于瘧必云無此也

痛瀉夢方劉草治痛瀉不止脾虛故泄肝

臯曰此與傷食不同傷食腹痛得泄便

戒今泄而痛不止故責之土敗木賊也

戴氏曰水泄腹不痛者濕也痛甚而

世泄而痛者食積也泄水腹脹腸鳴

痛一陣泄一陣火也或泄或不泄或

多或少者痰也完谷不化者氣虛也

白木土炒白芍炒陳皮炒防風兩

或煎或丸久瀉加升麻

此足大陰厥陰藥也白木苦燥濕甘補

脾濕和中芍藥寒泄肝火酸斂逆氣緩

中止痛防風辛能散肝香能舒脾風能

勝濕為理脾引經要藥東垣曰苦補脾

能陳皮辛能利氣炒香尤能燥濕醒脾

使氣行則痛止數者皆以瀉木益土也

黃連阿膠方局治冷熱不調下痢赤白裏

急後重臍腹痠痛口燥煩渴小便不利

濕熱入于腸胃故

腹痛口渴而便秘

黃連兩茯苓兩阿膠兩為末水煎阿

膠為丸空心米湯下延年除茯苓加于

姜當歸名駐車丸治同 此手足陽明

本草備要

卷之三

九七

王瓜瓜根苦寒泄熱利水治天

行熱疾黃疸消渴湯汁便數

帶下月閉瘀血利大小腸排

膿消腫下乳通乳藥多用噎

胎根如栝蒌之小者味如

山藥根子通用經疏曰主治

寒癈斑用王瓜湯和伏龍肝未服甚効

王不留行 甘苦而平其性行

而不住能走血分通血脉乃

陽明衝任之藥陽明多陰風

去痺止血定痛通經利便下

乳催生浴云穿山甲王不留

治金瘡止血散出竹木刺

孕婦忌之 花如鈴鐺寔如

灯籠子殼五稜取苗子蒸藥

水浸用

冬葵子 甘寒淡滑潤燥利竅

通營衛滋氣脈行津液利二

便消水腫用喻皮肝通關格

下乳滑胎 秋葵復種經冬

忽之也 本方除生姜加陳白梅蜜水

煎名梅蜜飲治熱痢密最能本方去茶

加木香肉蔻治冷痢

蘆根湯治傷寒病後嘔噦不下食

此由時熱盛多服冷藥飲冷水執執既退冷

氣便發故脾胃虛寒而不即噴成食臭

腹內雷鳴而泄利也

蘆根升一竹茹升一生姜二粳米一

此足太陰陽明藥也苦根甘寒降伏火

利小水竹茹甘寒除胃熱清燥金生姜

和則嘔止加粳米者亦藉以調中州也

陰陽水 治霍亂吐瀉有神功按藥中治

多共有寒熱二症而本草王治未嘗分

別言之萬一誤用立死不救倉卒患此

脈候未審切勿輕投瀉塊偏寒之劑也

飲陰陽水為最驗○張子和曰霍亂吐

泄乃風濕喘三氣言邪也濕土為風水

所鬱則生熱心火上炎故吐七苦喘

也脾濕下注故泄七者濕也風急甚則

轉筋轉筋者風也又邪在上則吐在

下則泄泄在中沸湯并水 各半鍾和服故又名

此中焦分理陰陽之藥也陰陽不和而

交爭故上吐下泄而霍亂飲此輒定者

本草綱目卷之九 醫方集解卷之九 上六

本草備要

本草備要

至春作子者夏葵子根葉

同功春葵子亦滑不堪入藥

蜀葵花赤者治赤帶白者治

白帶赤者治血燥白者治氣

燥亦治血淋閉格皆取其寒

潤滑利之功也

醫方集解

分其陰陽使和平也

甘草黑豆湯

鮮百藥毒兼治筋疝

筋疝者

中擊病延脹不堪此由用春方邪

衍而得之用此方者亦取其解毒

甘草黑豆

和中以鮮毒黑豆散熱以解毒

蘇頌曰

豆解百藥毒試之不然

又那甘中其驗乃奇

若治筋疝當用

甘草稍以稍能徑達莖中也

本方加大黃名大黃甘草湯治上中下

三焦消渴

