本草鑒方合編

三

ヤ武9
124
3

帥門 124 卷 3

白鮮皮　氣寒善行味苦性燥行水故燥入脾胃除濕熱兼入膀胱小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥一味白鮮皮湯治產後風時珍曰世之止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中腫痛濕熱乘虛客腎與膀胱所致根黃白而心寬取皮用惡桑螵蛸桔梗茯苓

蒲黃　甘苦性平入足陽明厥

休寧汪　昂訂著輯　男汪　端其
弟汪　桓殿武參閱　姪汪惟寵子錫訂

理氣之劑經曰諸氣賁人皆屬于脾又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同百病多生于氣也六人身之所恃以生者此氣耳原出中焦絡于肺外護于表內行于裏周流一身頃刻無間出入升降晝夜有常易常炳于人哉及至七情交攻五志妄發乖戾失常清者化而為濁行者阻而不通表失護衛而不和裏失營運而不順氣本屬陽及勝則為火矣河間所謂五志過極皆為火丹溪所謂氣有餘便是火也人身有宗氣營氣

唫胃去風去濕以固下焦陽明肝不風去濕厥陰主肉屬濕厥補肝虛祛堅筋陰主筋屬風補肝虛風去堅筋骨風濕去則筋骨堅益精明目治風寒濕痺腰痛久冷關節老血補中益氣湯東垣治頭痛火熾傍光宿水唫痿失溺壅痛遺濁痔瘡惡瘡諸病皆陽明濕熱流入下焦蓐辭能除濁分清古方有蓐辭分清飲史國信云若欲興陽先滋筋刀若欲便清先分肝火萬金護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因六府秘熱不通水液只就小腸六府愈加乾竭甚則身熱心燥思水即重症也此

衛氣中氣元氣胃氣冲和之氣上升之氣而宗氣尤為主及其為病則為唫氣滿氣上氣逆氣虛諸變症矣無病之時宜保之養之和之順之病作之時當審其何經何症寒熱虛實而補泄之

痛無寒懶言惡食脉洪大而虛或喘或渴或陽虛胃汗宜本湯加麻黃根浮小麥升柴俱宜蜜水炒過

欲其引參芪至表故又不可缺或氣虛不能攝血或瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之症中者脾胃也臟腑肢体皆稟氣于脾胃脾胃則衆体無以稟氣而皆病矣陽氣下陷唫火則上乘故熱而煩非寒熱也頭

疾本因食酒色或過食辛熱葷膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與淋症澁而痛不同宜用蓐蘚一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗谷道令氣得通則便數及痛自減也

有黃白二種黃長蘚陳白虛軟軟者良政仁為使畏大黃柴胡前胡忌茗苦腎日蓐蘚接英土茯苓形不同而主治不甚相遠宜一類數種平蓐蘚根細長淺白拔葜根作塊赤黃

土茯苓　甘淡而平陽明主藥

者諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作或止非如外感頭痛不休也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則火上于肺故喘金受火剋不能生水故渴脾虛不能統血則血妄行而吐下清陽下陷則為泄痢氣血兩虛則瘧不止名虐瘧虐老也○李東垣內傷外感辨傷于飲食勞役七情六慾為內傷傷于風寒暑濕為外感內傷發熱時熱止外感發熱熱甚不休內傷惡寒得煖便解外感惡寒雖厚衣烈火不除內傷惡風不畏甚風反異隙風外感惡風見風便惡內傷頭痛連痛無休直待表邪傳裏方罷內傷有溫或不作渴或心火乘肺亦作燥渴外感須二三日外表熱傳裏口方作渴內傷則熱傷氣四肢沉困無力倦怠嗜卧外感則風傷筋寒傷骨一身筋骨疼痛內傷則喘逆氣盛有餘內氣不足以息外感則喘逆氣盛有餘內

胃大腸俠肝建理胃祛風濕脾胃健則營衛從風溫除余則筋骨利

利小便止瀉泄治筋骨拘攣

楊梅瘡毒楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表其症多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也医用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯涸筋失所養変為拘攣瘡遍竟致廢廃土茯苓能解輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君以仁金銀花防風木通本瓜白解皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加

傷則手心熱外感則手背熱天氣通于肺鼻者肺之外侯外感傷寒則鼻塞傷風則流涕然既能飲食口知味腹中和二便如常地氣通于脾口者脾之外侯內傷則願言惡食口不知味小便黃赤大便或秘或瀉左人迎脈主表外感則人迎大于氣口右氣口脈主裏內傷則氣口大于人迎內傷証屬不足宜温宣補宜和外感証屬有餘宜汗宜吐宜下若內傷之症悞作外感妄發其表重虛元氣禍如反掌故立補中益氣湯主之又有內傷外感兼病者若內傷重者宜補養為先外感重者宜發散為急此湯惟上焦痰嗽中焦溫熱傷食膈滿者不宜服

黃耆蜜炙錢半 **人參** **甘草**炙一錢 **白朮**土炒 **陳皮**留白日當量五分 **升麻**三分 **柴胡**三分 **姜三片**

當歸七分名補陰湯搜風解毒湯**瘰癧瘡腫**溫鬱熱營衛不和則生瘡腫經云溫氣害人皮肉筋脉是也土茯苓淡能滲甘能補患膿疥者煎湯代茶甚妙 **大如鴨子連殼而生俗名冷飯團看赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶**

白歛 苦能泄辛能散甘能緩寒能除濕殺火毒散結聚生肌止痛治瘡瘍腫面上疱瘡金瘡撲損箭鏃不出者同皮或生夏為

枣二枚前如血不足加當歸精神短少加人參五味肺熱咳嗽去人參嗌乾加**葛根**風藥多燥葛根独能止渴者以其能升胃中清氣入脾而生水耳 **頭痛加藁本**前子痛甚加川芎腦痛加藁本細辛風濕相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生姜煩滿寒氣滯加青皮蔻仁木香益智腹張加枳實厚朴木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃連能食而心下痞加黃連嗯痛加桔梗有寒加肉桂濕勝加蒼朮陰虛加黃柏知母

未酒飲痰方多用之故名每服 血白及 根經須搽 凍耳同黃柏 未酒調 蔓荊枝有五棱根如卵而長三五枚同黨度黑豉白一種赤歛功用皆同卿黃一日能治溫瘧血痢腸風痔瘡赤白帶

預知子 蓽撥補五勞七傷瘀痃癖氣塊天行溫疾蛇虫咬毒殺虫療蠱蠱緻衣領中凡遇而預知之故名 皂莢禦色光潤出蜀中云亦難得

旱蓮草一名鯉腸又名金陵草 甘鹹汁黑補腎止血黑髭鬚烏髭子金云多收其効甚速經疏云性凉不益脾胃故千金方金陵煎丸用姜汁和劑 苗如旋覆莖似蓮房斷之有汁須臾而黑熬膏良

劉寄奴草 苦溫破血通經除癥消脹止金瘡血多服令人吐利 一莖直上葉尖長糙澁花白蓴黃如小菊花有白絮如苦蕒子細長亦似苦

本草蒲黃旱蓮草寄奴馬鞭草卷三

升麻以升陽明清氣白升而復其本位 柴胡

升則陰濁降加陳皮以利其氣陳皮同補藥則補独用生薑辛溫大棗甘溫用以和營衛開腠理致精液諸虛不足先建其中者何脾胃也李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火乘脾而人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而固腠理不令自汗上喘短氣散以人參補之心火乘脾亦久草甘溫以泄火熱而補脾元石膏生用泄脾胃急痛併大虛腹中急痛宜多用之中滿者減之白朮若甘溫除胃中之熱利腰膀間血胃中清氣在下必加升麻柴

陰虛去升柴加乾地山茱山藥大便秘加酒煨大黃咳嗽春加旋覆款冬夏加麥冬五味秋加炒黃芩冬加不去根節麻黃天寒加乾姜泄瀉去當歸加茯苓著未益智 此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃芪補肺固表為君脾者肺之本土能生金脾胃一虛肺氣先絕人參甘草補脾益氣和中泄火為臣東垣曰參芪甘草泄火之聖藥益煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦謂之泄白朮燥濕強脾當歸和血養陰為佐補陽必兼和陰不然則已九

夏枯草　辛溫輕浮上行陽明

胃兼入厥陰肝明目退翳之功在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱　收後莖田中生葉似嫩秧花如白星小

雀盲者羯羊肝一具不洗竹刀刮開入谷精煮熟食之或作丸茶下

青箱子　一名草決明　味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳疳瘡瞳子散大

馬鞭草　味苦微寒破血通經殺虫消脹治氣血癥瘕痰癖瘧

陰腫搗塗　虛煩甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫花穗如車前草類蓬高而細根白亦用葉

神朮湯加羌活麻黃治柔痓自朮湯加芪木桂心治中臟脈脇細芤渴者用黃芪湯此皆仲景所謂辛苦之人觸胃之病傷寒是也明醫筆著云陰熱有數種治各不同仲景論傷寒傷風此外感也故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也感于寒令之月即特發病故用辛熱以勝寒如春溫之月則當變以辛涼之藥夏暑之月則當變以甘苦寒之劑又有冬溫熱此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有寒疫即在溫熱之時此陰氣反逆明藥不可寒涼又有廬疫沿門合境相似者此天地之癘氣當隨時令泰氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而堤其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火是謂陰虛火旺勞瘵之

胡以升之引參芪甘草甘溫之氣味上升以補胃氣之散而定其表又緩帶脈之緩急氣乱于中清濁相干用去白陳皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛為陰火傷其生發之氣營血大虧血瘀則心無所養致令心滿而煩病名曰懊故加甘辛微溫之劑生陽氣卻景之法血虛以入參補之陽旺則能生陰血更以甘草和之少加黃柏以救腎水泄陰中伏火如煩犹不止少加生地黃補腎水水旺則心火自降李士材曰虛人感胃不可發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服此湯一二服得微汗則已非止發汗乃陰陽氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒迥宜補散故冊侯治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四物湯加發散藥血虛者四物湯加羌活防風升麻葛木蒼朮海藏治風溫用補中益氣加無汗用神朮湯有汗用白朮湯治風溫痙

者忌服能助陽火 類雞冠聽尖 決明子 甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決明之名又曰益腎精瞳子神光屬腎日華日明目甚干黑豆作枕治頭風 狀如馬蹄 俗呼馬蹄決明搗碎煎惡麻仁藜實 辛溫溫中明目耐風寒下水氣時珍曰古人種藜爲蔬收子入藥今惟酒麵用其汁耳以香藜青藜青藜紫藜爲良有香藜青藜黎藜赤藜禾藜水藜馬藜

馬勃 辛平歸肺經清肺解熱東垣普濟消毒飲中用之散血止嗽療咽痛吹喉中良或加白礬或硝搐喉取吐痰愈鼻衄失音外用傳諸瘡良 生濕地柿木上朕如柿肝紫色虛軟彈之粉出取粉用 禾螫子 苦溫微甘有小毒利大腸治濕痺痼積瘕癥瘧痔乳癰蛊毒消腫追毒墜肌除玉音皁黑斑 薏入小科 核扁如

疆之利此東垣持發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今人一見發熱則曰傷寒須用發散發而斃則曰傷寒之法已窮余嘗于陰虛發熱首見其大熱面赤口渴煩燥與六味地黃丸一大劑即愈如下部惡寒足冷上部渴甚燥極或飲而反吐即加肉桂五味甚則加附子冷飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡之旨也 本方除當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯東垣治氣虛多汗脾胃不調胸滿肢倦食少短氣已不知味心柿則舌知味及食入反出本方加白芍五味子亦名調中益氣湯東垣治氣虛多汗餘治同前補中湯純用甘溫所謂勞者溫之損者溫之此加白芍五

驚綠色揀去油者能毒狗

木部 卷三

茯苓 甘温益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下通旁光能通心氣于腎使熱月月從小便出然必其上行入肺能清化源而後能下降利水也 寧心益氣調營理衛定魄安魂管主氣肺藏魄肝藏魂治憂愁驚悸心肝不足心下結痛異熱煩滿口焦苦乾口為脾竅舌為心苗火下除則熱除口通火

嘔咳胃膈中痰火 脾虛水腫 林淋澀歷世瀉滲 遺精 白濁濕遺精寒遺滑泄情者又當用温熱之劑峻補小其下忌用茯苓淡滲之藥 便結者能通多者能止 温除則便自生津止渴 温熱去則津生 退熱安胎 松根靈氣結成以大塊堅白者良去皮乳拌蒸白者入肺肺光氣分赤者入心小腸氣分 時珍曰白入補心脾白勝利濕熱赤勝惡目欲異

實充勝理使衛外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘温熱之劑及味之薄者諸風藥是也此助春夏之升浮者也此便是泄秋收冬藏之藥也在人之身乃肝心也但言泄之以酸苦寒凉之劑 併淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也在人之身是肺腎也 本方加炒苓神麴名曾胃升陽湯 東垣治婦人經水不調或脫血後食少永泄 東垣曰脫血益氣古聖之法也故宜補陽氣以助生發之氣 本方加黃柏生地名補中益氣加黃柏生地湯治陰火乘陽發熱盡甚自汗短氣口渴無味 本方加白芍細辛川芎蔓荊名順氣和中湯 寶鑑

味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎 本方加蒼朮益胃湯 東垣治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃 本方去白朮加參倍分生夏黃芪益智各三分名參朮益胃湯 東垣治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃 本方加蒼朮白朮名升陽順氣湯 東垣治飲食勞倦所傷滿悶短氣不思食不知味口苦寒 吳鵬皐曰升柴辛甘升其苦寒降其濁濁降則陰氣順矣參芪甘温補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順矣東垣口升曲消其食食消則穀氣順矣東垣口升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行于陽道以滋春氣之和又引參芪甘草上行

地榆秦艽龜甲雄黃烏梅醋
皮專能行水治水腫膚脹以皮行皮之義五皮散用之凡腫而煩渴便祕溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便溏小便數不赤澁屬陰水宜宛胛飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯神　主治善忘茯苓但茯苓入脾腎之用多茯神入心之用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘志　即茯苓抱根生者取其抱心故能補心也

治濇陽不升頭痛惡風脈弦微細本方加羌活防風細辛川芎名調榮養衛湯

節治勞力傷寒頭痛身熱惡寒微渴汗出身痛脈浮無力

烏藥順氣散嚴用治中風遍身頭痛骨節疼痛若履艱難語言蹇澁口眼喎邪喉中氣急有痰風勝則氣壅壅于皮膚則頑麻壅于骨節則煩痛壅于經絡則語澁行難壅于口面則喎邪壅于胸喉則痰喘

烏藥　橘紅二錢去川芎　白芷　桔梗　枳殼炒二錢麩炒　殭蠶去絲嘴炒　炮姜　甘草炙五分　加姜煎盡汗者去麻黃加黃芪手足不能舉動加防風續斷威靈仙拘攣加木瓜脚氣加牛膝五加皮獨活

喎邪心掣健忘心木一兩乳香一小石器炒研名松節散每服二小木瓜湯下治一切筋攣疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

琥珀　甘平以脂入土而成寶故能通塞以寧心定魂魄療癲邪從鎮墜藥則安心神色赤入手少陰足厥陰血分心肝故能消瘀血破癥瘕生肌肉合金瘡從辛本草蒲黃木琥珀

此表氣逆也麻黃桔梗肺家之藥發汗而祛寒川芎白芷頭面之藥散風而活血血活則風散　枳橘利氣行痰順氣正以行痰橘紅兼能發畢蚕清化攻吉蚕遇風則先得清化表乃畢蚕之氣故固以治風能有痰必衝逆而上此裏氣逆也然中風必由外感風寒而發內虛而外邪乘之

温葉則破血生肌 其味甘淡上行能使肺氣下降而通肺竅 經曰入胃游溢精氣上輸于脾脾欲食氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱凡滲藥皆上行而後下降故能治五淋利小便燥脾土 從淡滲藥水然石葉經燥若血少而小便不利者反致燥急之苦 又能明目驚翳 松脂入土年久結成或云楓脂結成以摩熟拾芥者真 市人多煮雜子及青魚枕僞之摩阿亦能拾芥宜辨 用柏子仁未瓦鍋同煮半日搗末用 松節 松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間之風濕 用依日能燥血中之濕 杵碎浸酒良 史國公藥酒中用之 松脂苦甘性燥祛風去濕化毒殺虫生肌止病養生家鍊之服食今麩膏多用之 麩齒有仁松脂綿絮虫即從之出 松毛釀酒 煮汁代亦治風痺脚氣

蘇子降氣湯 局方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽呕吐或大便不利 肺為氣上肺虛火甚故氣高痰湧或喘或嗽甚則呕血盛火炎津枯有升

白芷為陽明藥所不用前方似指麻黃羌活風藥正先治氣後治風之妙旨後人或謂不當雖大日光不如白芷香而不燥正和营衛之善藥也局方合兩方用人參白木陳皮甘草茯苓半夏厚朴桔梗蘇子當歸白芷名加葛根治感風頭痛鼻塞聲重尚為合宜王氏徹義日嚴氏此論通出前人其用藥則未也何也但君子散相火逆急之痰 黑姜溫經通陽甘草和中泄

柏子仁　辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾用脾藥炙熟此潤藥而香能舒脾藥中兼用最良養心氣潤腎燥助脾滋肝經氣分藥益智寧神養魂耳明目甘益血香通竅益血止汗心生血汗心液除風濕益驚癇澤皮膚辟鬼魅炒研去油油透者勿用畏菊花

側柏葉　苦澁微寒木草兼金微温養陰滋肺而燥土最清血分爲補血病一切血症去冷風濕痺歷節風痛肢節大痛書靜夜剛名白虎歷節風亦風寒濕所致治湯火傷湯燬水調塗生肌殺蟲多福凍瘡汁烏髭髮取側者叶溪曰多得月令之氣隨月建方取或炒或生肉桂土鴈爲使惡菊花宜酒萬木皆向陽柏獨西指受金之正氣堅勁不凋多受之木故元日飲椒柏酒以辟邪

肉桂　辛甘大熱氣厚純陽入陰藥止吐衄崩淋陽風尿血病血一切血症去冷風濕痺歷節風痛肢節大痛書靜夜剛名白虎歷節風亦風寒濕所致治湯火傷湯燬水調塗生肌殺蟲多福凍瘡汁烏髭髮取側者叶溪曰多得月令之氣隨月建方取或炒或生肉桂土鴈爲使惡菊花宜酒萬木皆向陽柏獨西指受金之正氣堅勁不凋多受之木故元日飲椒柏酒以辟邪

木香　草蔻仁炒益智　蓽茇三分厚朴四分青皮　陳皮　半夏　吳茱萸湯泡去汁

也王机微義曰此散鬱抑中之別準繩日甘草出血皆由上盛下虛有升無降血隨氣升治當先順其氣氣降則血歸經矣宜蘇子降氣湯加人參阿膠各一錢下養正丹昂按方內多破氣發表之藥又有半夏肉桂血症亦當審用養脾門金石宜煉而成尤覺非宜

木香順氣散表虛治陰陽壅滯氣不宣通胸膈痞悶腹脇脹滿大便不利胸膈痞悶腹脇脹滿大便不利胸膈痞悶皆脾胃受傷中氣不運不能升隨痰氣在上則生膜脹也膜脇脹滿皆升大盛也大便秘者清陽不升故濁陰不降也

木香　草蔻仁炒益智　蓽茇三分厚朴四分青皮　陳皮　半夏　吳茱萸湯泡去汁

肝腎血分平肝補腎不問相火之不足兩腎即問先天祖氣乃真火也人非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃衰敗氣盡而亡矣益陽消陰治痼冷沉寒能發汗疏通血脈宣導百藥辛則善散熱則通行去營衛風寒表盧自汗陽虛腹中冷痛欲遊結氣散道亦田氣不歸元木桂能引火歸宿丹田得桂而枯制桂釘木根其木即死又能抑肝風而扶脾土用木盛則剋土辛散甘從治目赤腫痛以熱攻熱名曰從治又脾虛惡食命火不足濕盛泄瀉主為水剋不能防水古五苓散滋補勞明目通經墮胎辛熱能動血故也出嶺南桂州首長州因桂名色紫肉厚味辛甘者為肉桂入肝腎命門去粗皮用其毒在皮去裏外皮當中心者為桂心入肺肺肺及手得人參甘草麥冬良

于姜茯苓澤泄二分升麻柴胡二分當歸五分此足太陰陽明藥也木香厚朴青皮陳皮辛能行氣兼能平肝益智香能舒脾若木半夏燥能勝濕干益香葉溫能散寒升柴之輕以升其陽苓澤之滲以泄其陰蓋脾為中樞中樞四運轉則清升濁降上下宣通而陰陽得以流貫氣藥聚貫過煉故重用當歸

食怒厥怒則氣上思則氣結憂愁不已氣多妨食

名五磨飲子治暴怒卒死名曰氣厥

此手太陰藥也氣上宜降之故用檳榔

沉香檳榔性如鐵石沉香入水独沉故能開下氣氣逆宜順之故用烏藥加入參者降中有升泄中帶補邪傷其氣也大實者仍宜枳殼

越鞠丸丹溪統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐

忌生葱石脂本草有蒲桂筒桂之殊今用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

桂心 苦入心辛走血能引化汗化膿內托瘡疽瘍瘡同丁香治虛寒嘔噦磨灰塗 益精明目消瘀生肌補勞傷煖腰膝續筋骨治風瘡瘕瘕喘膈腹滿腹內冷痛九種心痛一兩二壯三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘于手少陰之絡邪正相激故心痛桂枝 辛甘而溫氣薄升浮入

飲食不消六鬱氣鬱血鬱痰鬱火鬱食鬱也六者之中以氣為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由于痰火飲食不消由氣不運行丹溪曰氣升則食自降六鬱不言風寒者風寒鬱則為熱矣滑伯仁曰鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化所以傳化失常而病見矣氣鬱者胸膈痞悶鬱者周身痛或閉節痛遇陰寒則發痰鬱者昏瞀便赤脈沉鬱血鬱者四肢熱鬱者口緊盛以經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之無力能食食鬱者咳酸腹飽不能食寸

香附醋炒 米泔浸炒 撫芎 神曲炒 烏梅 青葙燒灰存性 加南星薑汁炒 枯薤海

太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌能利肺氣經曰辛甘發散為陽

治傷風頭痛無汗能發中風自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為君芍藥甘草為佐加姜棗名桂枝湯能和營衛表

調和營衛邪從汗出而汗自止

亦治手足痛風腸風風痛風有濕濕痰痰血氣虛血虛之異桂枝用作引經胸風屬肝桂能平肝東垣曰桂枝橫行手臂以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表則發熱肉桂下行而補腎王好古

石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁梗寒加吳茱萸痰鬱加蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子

又或春加防風夏加黃芩冬加吳茱萸經所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則

逆之也 此手足太陰手少陽藥也吳

石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁梗寒加吳茱萸痰鬱加蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子

又或春加防風夏加黃芩冬加吳茱萸經所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則

逆之也 此手足太陰手少陽藥也吳

枸杞子 甘平 本草 苦寒 潤肺清肝 滋腎益氣生精助陽補虛勞 強筋骨 肝主筋 腎主骨 去風明目 為肝腎陰虛內熱血少之要藥 肝腎陰虛瞳子屬腎 利大小腸泻鹽乾消渴 昂按古諺有云去家千里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽益氣味甘寒而性潤乃是補水之藥所以能滋腎益肝明目而治消渴也 南方樹高數尺北方葉是大樹以甘州所產紅潤小粒者良酒浸搗用根名地骨皮視葉名天精草

七氣湯 三因方亦治七情氣鬱痰涎結聚 咯不出嚥不下 胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛 七氣者寒熱憂怒悲恚也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有底滿喘咳衝痛等症

半夏 姜汁炒 厚朴 姜汁炒 茯苓 四錢 紫蘇五錢 厚朴三錢 紫蘇二錢 加姜棗煎 此手足太陰藥也氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先半夏辛溫除痰開鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓甘淡滲濕益脾通心交腎痰去氣行則

曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景太陽病病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪无所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有汗者宜之若傷無汗則當以發汗為主而不独調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡

欬多在中焦中焦脾胃也水谷之海五藏六府之主四氣亦有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之多者桂枝甘草湯此又能閉塞水幸烈雄吐困胃強押能徑入諸經疎泄陽明之濕通行欬痛香附溫經夫氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫芎兄欬陰寒直達三焦上行頭目下行血海為通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行氣于三陽脾主行氣于三陰脾胃既布水谷之氣得行則陰陽痛府不受燥金之鬱皆由胃氣而得通利矣○或問丹溪曰脈訣云熱則生氣冷則生氣吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸欬悉吐吞酸反胃諸病將無塞症也曰五藏各有火五志激之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口食寒物非若諸火病自內作所以氣病寒者十無一二

苦甘而涼清上焦心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥

地骨皮　甘淡而寒降肺中伏火泄肝腎虛熱能涼血而補正氣故內治五內邪熱凡熱淫于內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下吐血尿血搗鮮汁服咳嗽消渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息中平胸脇痛清肝下痢大小腸瀉腎火療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李東垣曰地為陰骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火牡丹皮泄包絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母泄腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人寔不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者時珍曰枸杞地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連降上焦知柏降下焦致傷元氣惜哉予嘗以青蒿佐地骨退熱累有殊功

結散鬱解而諸症平矣　本方加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯三因治七情鬱結陰陽反戾吐利交作寒熱眩運痰滿噎塞

四七湯局方亦名七氣湯　治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨脹喘急鍼經云胃絡不和喘出于陽明之上逆真元耗散喘出于腎氣之上奔

人參　官桂　半夏一錢五分　甘草五分加薑煎

心腹痛加延胡索能行血中氣滯氣中血滯

此手太陰藥也李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠丸主之而此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖膨而不用木香枳殼用人參以壯主氣之藏肺官桂以制謀慮之官肝者將軍之官謀慮出焉鬱久肝火必盛桂能平肝鬱久生痰半夏為之驅逐鬱故不和國老為之調停甘草况桂性溫疏氣甚捷鬱結還為和暢矣湯名四七者以四味治七情也玉機微義曰經云寒則氣收宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱藥也

代赭旋覆湯仲景　治傷寒發汗若吐若下解

甘草水浸一宿用（陽滑者忌枸杞子中實者忌地骨皮搦鮮者同鮮小劑煎濃汁浸下猶甚效）

葉勇　辛溫酸澁補腎溫肝（入二經氣分）固精秘氣斂陰助陽安五藏通九竅（發聖濟云如何腎經疏云精氣充則九竅通利昂按山菜通九竅古今疑之得經疏一言而意旨豁然始嘆前人識見深遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之實可與醫人之慧悟也）燎膠滕縮小便治風寒溫痺（溫肝故能逐風）羸瘦自黃（肝虛邪客則目睛黃）耳鳴耳聾（腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰澁則氣脫益劑所以收之仲景八味丸用之為君其性味可知矣昂按別錄甄權皆云能發汗恐屬誤文酸劑斂汗何以反發仲景亦安取發汗之藥以為君乎李士材曰酸屬東方而功多在比方者乙癸同源也）去核用（核能澁精）惡瘡楗（防風防己）

酸棗仁　甘酸而潤（凡仁皆潤）專補肝胆（炒熟酸溫而香亦能醒脾故歸脾湯用之）助陰氣堅筋骨（余

後心下痞噫氣不除（汗吐下後其邪不和虛氣上逆故痞鞕噫氣即俗所謂噯氣也）旋覆花（即金沸代赭石（一兩）人參（二兩）甘草（三兩）半夏（半升）生姜（五兩）大棗（十二枚）

此足陽明藥也成氏曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟痞怯則氣浮代赭之重以鎮逆（代赭色赤体重又能養陰血止反胃）辛者散也生姜之辛以散虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱（綱目云病解後痞鞕湯下不利者生姜瀉心湯活人云有旋覆代赭症或嗳逆氣虛者先服四逆湯胃

寒者先服理中湯後服此湯為良周揚俊曰子每借之以治反胃噎食良氣逆不降者

神效

丁香柿蒂湯（成氏）治久病呃逆因于寒者（按方書無呃字或作噦逆或作噦氣仲景書由亦作噦說文曰噦氣悟也海藏東垣皆以噦為乾嘔人多非之今從俗作呃逆此病有因痰咀氣滯者有因血瘀者有因火鬱者有因胃熱失下者此皆屬有因火土衝者此皆屬虛寒熱虛寒治法不一古方以此湯治寒呃虛病木乘寒然亦有火也〇呃在中焦谷氣不運其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足其聲長大不

丁香　柿蒂二錢　人參一錢　生姜五片　一方加陳皮牛夏炙甘草良

煩止渴飲陰火汗經疏曰凡而汗不止者用棗仁炒研同生地白芍五味麥冬竹葉龍眼肉煎服多効為心夜故也寧心心君易動皆由胆性所致經曰凡十一官皆取決于胆也療胆虛不眠溫胆湯中或加用之肝虛則胆亦虛肝不藏魂故不寐血不歸脾卧亦不安金匱治虛勞虛煩不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩炙知母茯苓川芎各二兩深師加生姜二兩此補肝之劑經曰卧則血歸于肝煩須曰一方加桂一兩二方棗仁並生用治不得眠皆以煮過便為熟後人以酸收滿生用乎

曾痼久世醫以杏舒脾生用

姜　此足陽明少陰藥也丁香泄肺温胃而煖腎生姜祛痰開鬱而散寒柿蒂苦澁而降氣人參所以輔元氣使得展布也火昵亦可用者益從治之法也以熱攻熱名曰從治朱丹溪曰人之陰氣因胃為養上傷則木被相火直沖滿道而上作昵逆古人以為胃寒不能清痰利小便助火而已李時珍曰朱氏但執以寒治熱矯枉之過矣按古人治陰昵每用桂附于姜炙紫丁香茴香諸辛熱藥多有救効者治陽昵橘皮竹茹湯主机氣義曰昵逆本由陰氣已虛陽火暴甚而上出十門人于肺而作声東垣生用治不得眠皆以煮過便為熟後人以酸收滿生用乎

曾痼久世醫以杏舒脾生用

酸平療胆熱好眠時珍曰今心家棗殊味此理昭按胆熱必有心煩口苦之症何以反能好眠乎温胆湯治不眠用二陳加竹茹枳實二味皆寒藥乃以凉肺胃之熱非以温胆經之寒也且以温胆名湯者以胆欲不寒不燥常温為佳耳胆熱好眠四字不能無疑也

炒研用惡防已

杜仲　甘温能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強能使

留其陽氣胃氣一抑陽生則陰白長之說也或問治陽昵者何以不用知栢安鵲皇曰此少陽虛邪非邪也故用柿蒂竹茹之味薄者主若知栢味厚則亦戕其中氣栢寒不益盛　本方除人參古人益深慳之矣

生姜半夏亦名丁香柿蒂湯　治同本方除人參加竹茹橘紅名丁香柿蒂湯

茹湯又名橘紅竹茹湯實鑑去人參加青皮陳皮三因去人參加良姜甘草名丁香散治同

橘皮竹茹湯　治久病虛羸嘔逆不已胃寒則嘔胃熱亦嘔有停痰有積飲皆作嘔此為久病虛火上逆而乾嘔亦治

筋骨自有皮中有經有筋自
筋骨不着骨相着之象
腰脊酸痛牡曰腰者腎之府
腰脊酸痛轉移不能腎將傳
矣膝若筋之府屈伸不能筋
將傳矣一少年新娶得腳軟
病且痛甚作腳氣治不効孫
琳曰此腎虛也用杜仲一兩
牛酒牛水煎服六日全愈按
腰痛不已者屬腎虛痛有定
處屬死血往來走痛屬挾腰
冷身重遇寒便發屬寒濕或
痛或止屬濕挾而其原多本
于腎虛以腰者腎之府也
陰平濕瘧小便短赤腹滿嘔吐利後胃虛吐利後胃虛嘔逆
瘧白虎湯證而渴欲飲水小便短赤者此濕熱在裏
也加蒼朮以燥濕利小便
白虎湯 治陰虛感寒氣逆隔熱而作哮喘
隆冬不凋益肝腎安五藏強
腰脊明目烏髭補風虛
陰白病女貞酒蒸曬乾二十兩桑椹乾十兩早蓮草十兩酒煮半治虛損百病如四月熟時採桑椹汁七月新摘早蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞之品妙藥古方罕用

肉為先米飲下二藥大補腎氣托化胎元則胎不墮

出瘴癘原濕者良去粗皮剉或酥炙酒炙鹽炙酒炒姜汁炒斷絲用
女貞子 甘苦而平少陰之精定嘔逆
隆冬不凋益肝腎安五藏強腰脊明目烏髭補風虛
陰白病女貞酒蒸曬乾二十兩桑椹乾十兩早蓮草十兩酒煮半治虛損百病如四月熟時採桑椹汁七月新摘早蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞之品妙藥古方罕用

吐利後胃虛呃逆
橘皮 竹茹 人參 甘草 半夏
橘皮竹茹湯 治呃逆
參冬 赤茯苓 桃杷葉 加姜煎
胃虛者去竹茹參冬加丁香實火去人參 此足陽明藥也胃火上衝肝膽之
火助之肺金之氣不得下降故嘔竹茹
桃杷葉參門冬皆能清肺而和胃肺金
清則肝氣亦平矣肝木挾相火而土衝故作呃金能平木
二陳所以故逆陳皮半夏 赤茯所以降火
生姜嘔家之聖藥久病虛羸故以人參

何以女貞冬青木草作二種哉女貞一物也冬至採作酒滑甚近人放蠟屯于此樹

楮實 甘寒助陽起陰痿補虛勞壯筋骨明目充肌時珍曰別録大明皆云楮實大補益而修真秘書又云久服令人骨痿濟生秘録治骨哽用楮實煎湯豈非軟骨之徵乎本草發明甚言其功而云今補藥中罕用惜未之察耳 取子漫雲浮者酒蒸用皮善行水治水腫氣滿皮可為紙楮汁和白及灰麵調糊棱紙永不斛脫

桑皮 甘辛而寒泄肺火羅謙甫曰是泄肺中火邪非泄肺氣也火與元氣不兩立火去則氣得安矣故本經又云益氣束垣曰甘因元氣之不足而補虛辛泄肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜多用不乙泄肺散桑皮地骨各一兩甘草五不每服二不人梗米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能泄火從小便出甘草泄火緩中梗米清肺養血乃泄火諸方之準繩也一妊鼻久不聞香臭後因他疾修仲醇為處方每服桑皮至七八不服久而鼻利二便散瘀血下氣行水止嗽滿痰發明曰肺中有水則

醫方集解 卷中之三

理血之劑

人身之中氣為衛血為營經曰營者水谷之精也謂和五藏灑陳于六府乃能入于脈也生化于脾總統于心藏受于肝宣布于肺施于腎流行一身目得之而能攝耳得之而能聽足得之而能步藏得之而能視手得之而能握故曰氣為血之帥血為氣之母氣行則血行氣止則血止氣傷則血虛血傷則氣病氣血俱傷則諸病生焉

當歸 甘辛溫養血和血補血之藥也血虛則補之以當歸猶水涸則灌之以雨也凡血病皆用之當歸辛能散能行能潤能和其味甘重而濁入陰養血其氣輕而清入陽補氣其用有三全用則和血養血破用則破血行血酒洗則治上焦頭目之病酒炒則治中焦心腹之病土炒則治下焦腰腿之病

川芎 辛溫上行頭目下行血海中行四肢為風藥之先能散鬱滯之血為補血調血之要藥

芍藥 酸苦微寒收陰斂營和血補血緩中泻肝止痛除煩退熱利小便通經脈治腹痛

生地黃 甘寒涼血補血清熱生津除煩止渴利小便

熟地黃 甘微溫補血滋陰填精益髓黑髭發烏須

阿膠 甘平養陰潤肺補血滋陰止嗽化痰和血安胎治吐衄便血崩中帶下

艾葉 苦辛溫純陽能回垂絕之陽暖氣血調經安胎止吐衄下血崩帶下

蒲黃 甘平行血消瘀止血通經利小便

五靈脂 甘溫行血消瘀止血止痛治心腹胸脇諸痛

三七 甘溫止血散血定痛

茜草 苦寒涼血止血通經

紫草 甘寒涼血活血利竅通便

丹參 苦微寒入心包絡入手厥陰經活血通經安神定志生新血除舊血止血生血

牛膝 甘酸平補肝腎強筋骨活血通經利小便引血下行

益母草 辛苦微寒活血調經利水消腫

瞿麥 苦寒破血通經利小便

劉寄奴 苦溫破血通經消食化積

大黃 苦寒下瘀血蕩腸胃積滯推陳致新通利水穀調中化食安和五藏

桃仁 苦甘平破血潤燥通經潤腸

紅花 辛溫活血通經

蘇木 辛甘平破血通經

虻蟲 苦微寒破血逐瘀通經

水蛭 鹹苦平破血逐瘀通經

蠐螬 鹹寒破血逐瘀通經

蜣螂 鹹寒破血逐瘀通經

䗪蟲 鹹寒破血逐瘀通經

乾漆 辛溫破血通經

血竭 甘鹹平破血通經止血定痛

自然銅 辛平散血消腫續筋接骨

骨碎補 苦溫破血續筋接骨

土鱉蟲 鹹寒破血逐瘀通經

馬鞭草 苦平破血通經

凌霄花 辛寒破血通經

鬼箭羽 苦寒破血通經

卷柏 辛溫破血通經

貫衆 苦微寒破血通經

地榆 苦酸寒涼血止血

槐花 苦寒涼血止血

側柏葉 苦寒涼血止血

荷葉 苦平涼血止血

藕節 甘平涼血止血

茅根 甘寒涼血止血

茅花 甘寒涼血止血

白茅根 甘寒涼血止血

小薊 甘涼涼血止血

大薊 甘涼涼血止血

蒲黃 甘平涼血止血

三七 甘溫止血散血定痛

血竭 甘鹹平止血定痛

降香 辛溫止血定痛

白及 苦甘平止血生肌

仙鶴草 苦平止血

棕櫚 苦平止血

烏賊骨 鹹平止血

百草霜 苦平止血

京墨 苦平止血

血餘 苦平止血

發灰 苦平止血

人中白 鹹寒止血

人中黃 鹹寒止血

童便 鹹寒止血

人乳 甘平止血

牛乳 甘平止血

羊乳 甘平止血

驢乳 甘平止血

馬乳 甘平止血

鹿乳 甘平止血

犀角 苦寒止血

羚羊角 鹹寒止血

牛角 鹹寒止血

鹿角 鹹溫止血

鹿角膠 甘平止血

鹿角霜 甘平止血

龜甲 甘平止血

龜甲膠 甘平止血

鱉甲 鹹平止血

鱉甲膠 鹹平止血

海螵蛸 鹹平止血

烏賊骨 鹹平止血

百草霜 苦平止血

京墨 苦平止血

血餘 苦平止血

發灰 苦平止血

人中白 鹹寒止血

人中黃 鹹寒止血

童便 鹹寒止血

人乳 甘平止血

牛乳 甘平止血

羊乳 甘平止血

驢乳 甘平止血

馬乳 甘平止血

鹿乳 甘平止血

犀角 苦寒止血

羚羊角 鹹寒止血

牛角 鹹寒止血

鹿角 鹹溫止血

鹿角膠 甘平止血

鹿角霜 甘平止血

龜甲 甘平止血

龜甲膠 甘平止血

鱉甲 鹹平止血

鱉甲膠 鹹平止血

海螵蛸 鹹平止血

生痰而作嗽除水氣正所以泄火邪實則泄其子也大退氣寧則補益在其中矣十劑曰燥可去溫桑白皮赤小豆之屬治肺熱喘滿唾血熱渴水腫肥脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用為線可縫金瘡

刮去外皮取白用（如恐其泄氣用蜜炙之）續斷桂心為使忌鉄　桑乃箕星之精其木利關節養津液行水（録驗方枝皮細去到酸酒服食）祛風（桑枝一升細剉妙香水三升煮至二升一日服見名桑枝煎治風氣脚氣日渴）其火拔引毒氣去風（凡瘡疽不起于內）祛寒濕痛（凡痛不屬痰瘀流注腫硬惡疮不瘥用桑木片扎成小把燃火吹息久患処內服補托煎補藥最宜用桑諸膏宜用桑柴內亦宜桑枝攪　桑葉甘涼色黑入腎而補水利五藏閉節安魂鎮魄聰耳明目生津止渴（陳藏器本草拾遺）利水消腫解酒毒艷顏乾鬚髮令黑（故知非寒也）

當歸（酒洗）生地黃（各等分）芍藥（各半）　凡血症通宜四物湯如涼血心加黃連肝熱加梔子大腸寒加黃連腎膀胱黃柏肺生地胃大黃三焦地骨皮心胞絡丹皮小腸山扉未通知清氣心與包絡加麥門肺只亮肝柴胡青皮脾白芍胃乾葛石羔大腸三焦連翹小腸灸炙甘草膀胱滑石琥珀血虛加龜板血燥加人乳瘀血加桃仁紅花非汗童便行之

色黑热勝干陰発為瘡瘍温滞于血則為瘕瘀疑滞于皮膚則為冷痺畜血在上則善忘畜血在下則如狂蛛作損傷則非惡肉發此皆失于攝養変為諸病也

四物湯　治一切血虛及婦人經病（月經先期為熱後期為寒為虛為鬱為痰朱丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅上應于月其行有常故名月經為氣之配因氣而行成塊者氣之疑滯行而痛者氣之滯行後作痛者氣血俱虛也色淡亦虛也錯経宜行者氣之亂紫者氣之熱黑則熱之甚也今人見紫黑作痛成塊率指為風冷乘之而用温熱之劑禍不旋踵矣経曰亢則害承乃制熱甚則兼水化所以熱則紫甚則黑也若曰風冷必須外得設或有之千不一二也玉机微義曰寒則凝而不行既行而紫

煉稠點湯和酒並妙入燒酒
經年愈崔 每日湯點眼亦治
瘭瘡名文武蓋以
楸名文
武實也 桑葉甘寒手足陽
明之藥大腸 涼血 刀斧傷者
為末乾下
亦宜 抹經霜者
妙燥濕去風明目 煎湯洗眼
去風淚洗手足去風痺桑葉
黑脂麻等分蜜丸名快桑丸
除溫去風烏鬚明目以五月
五日六月六日立冬日採者
佳一老人年八十四夜能細
書詢之云得一奇方每年九
月二十三日桑葉洗
日一次永絕昏暗 赤眼止
盜汗炭炒有糟每就枕汗出
遍身比旦衣被皆透二

暴血加薄荷玄參散之血不止加炒蒲
黃黑灰不止加升麻引血歸經入經 桑
黑腸數為熱加芩連血淡脈遲為寒加
桂附入肥有痰加半夏南星橘紅入瘦
有火加黑梔知母黃柏鬱者加木香砂
仁蒼朮神曲瘀滯加桃仁紅花延胡肉
桂氣虛加參芪氣實加枳朴
此手少陰足太陰厥陰藥也 心生血脾
統血肝藏
血當歸辛苦甘溫入心脾生血為君生
地甘寒入心腎滋血為臣芍藥酸寒入

十年不能瘳監寺教採帶露
桑葉焙乾為末空心米飲下
二錢數日而愈 伐桑止消渴
桑寄生 苦堅腎助筋骨而固
齒長髮 髮白者骨之餘髮者血之餘 甘益血
去崩漏而下乳安胎 三症皆由血虛
外科散瘡瘍追風濕 他樹
多寄生以桑上採者為貴雜
樹恐反有害並葉用尤佳
梔子 苦寒輕飄象肺色赤入
心泄心肺之邪熱使之屈曲

肝脾欲陰虛作鬱辛溫通上下而行
血中之氣為使也 川芎入厥陰心包肝
經性味辛溫分三治全用活血各歸其經也
芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和
血活血虛腹痛物此特血病而求血藥
之屬若也若氣虛血弱又當從長沙血
虛以人參補之陽旺即能生陰血也輔
佐之屬若桃仁紅花蘇木丹皮血竭若
血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚
灰若血崩所宜縐蓉蒲陽牛夕枸杞龜
板夏枯草益母草若血虛所宜乳香沒
藥五靈脂凌霄花若血痛所宜乳酪血
液之物血燥所宜姜汁血寒所宜苦參
生地汁血熱所宜荀能觸類而長可應

下行從小便出 海藏曰或用淡利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也

而三焦之鬱火以解 淡滲厥有寒熱二症

心痛以平 丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當温散久則入而成熱若用温劑不助痛添病乎古方多用扈子為君熱藥為之向導則邪易伏此病虽日久不丧不死苦痛止忽食病必再作也

吐血淋血痢之病以息 最清胃腑之血炒黑末服吹鼻治衄本草滙曰治室火之血順氣為先氣行則血自歸經治虛火之血養正為先氣壯則無窮之變矣丹溪治陰虛發熱于血藥四物湯亦分陰陽血之動者為陽芎歸主之血之靜者為陰地芍主之血之陰不足虽芎歸辛温亦不用血之陽不足虽姜桂辛热亦用之典瀉火之法正治從治相同吳鶴皐曰天地之道陽常有餘陰常不足人身亦然故血者難成而易虧夫草木無情安能生血以地芍能養五藏之陰芎歸能調營中之氣陰陽調和而血自生耳若夫失血太多氣息幾微之際慎勿與之益四物陰類非所以生物者也當重用參朮以固欲絶之氣故曰脱血者先益其氣吾則川芎香窜反能耗氣七血獲亡而死矣故凡虛崩胃虛氣弱之人皆不宜多服或問四物湯是女門崩藥干內亦有脾胃藥乎一陽子曰四物湯隐潜脾胃治法入味久矣脾經少血三氣當歸地黄生血滋灌脾經上畏熱和本來剋土芍藥能泄木補脾肝欲散用川芎之辛以散之非自能攝血丹溪曰治血不可單行血止亦不可純用寒藥

治心煩少睡懊憹不已 丹溪曰新産血氣未平貼芍藥酸收作痛耳芍藥兼治血虛氣痛新産正血虛氣痛之時醇酒微炒用之何害又血塊凝滞作禍不可泥于産後大補氣血放胆下之用王燭散無效惟陳致新亦是補法只因産後大補氣血一語致積血而殞者多矣○附子卽五燭散歸尾生地川芎赤芍大黄甘草治經閉腹痛休養飢取停惟四時加氣謂之玉燭之義也

五黄 古方多用扈子茜陳

五淋亡血津枯口渴目赤紫癜白癜皰瘡瘡 皮膚肺所主故也

生用瀉火炒黑止血姜汁炒止煩嘔內熱用仁表熱用皮

本方加黄栢知母名知栢四物湯再加玄參名滋陰降火湯治陰虛有火知栢四物蜜丸名坎離丸治陰虛嗽血 丹溪謝氏療主乎陰虛益自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前猶屬湯藥屬陰陰虛則氣汗從寐時出升屬陽降屬陰陰虛則氣

豬苓　苦泄滯淡利竅甘助陽入膀胱腎經升而能降開腠發汗利便行水與茯苓同而不補治傷寒溫疫大熱經曰大熱利小便亦利之意　懷慢消湯腫長肌消腫湯淋濁泄痢瘧瘧多由暑暑必兼濕經曰夏傷千暑秋為痎瘧然耗津液多服損腎腎目腎水不足則目昏神景五苓散猪苓茯苓澤泄白木桂為治水之總劑昂按經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除桂名四苓散資生經曰五苓散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散白茯苓安心神澤泄道小便小腸利而心氣平木得桂而佈能伸肝而風自止可謂善用五苓者矣　多生楓樹下塊如猪屎故名　馬屎曰通俗屎曰苓苓即屎也古字通用　肉白而實者良去皮用

黃蘗　苦寒微辛沉陰下降泄膀胱相火足太陽引經藥補腎水不足堅腎潤燥發明曰非真能補腎也腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之也相火退而腎固不降痰涎上逆吐出不絕脉浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大沉之空虛宜用四物竹瀝加炒柏龜板補陰降火之利又須遠嗜欲薄滋味靜心調養以助之進經云丹溪論勞專主乎陰虛用四物加知柏主之世醫遵用百無一効何哉慈陰虛火必上炎肯歸辛溫非滋陰降火之藥川芎上竄非虛炎短乏者所宜知地黃泥膈非胃弱痰多食少者所宜知柏辛苦太寒虛曰滋陰其寔燥血虛曰降火久而增氣反能助火至其敗胃所不待言不若用茯仁百合天冬麥冬桑皮地骨丹皮酸棗五味子桃杷葉之類佐以生地汁藕汁人乳童便等如嗽則多用桑皮桃杷葉有痰咽貝母有血增茯仁百合阿膠熱盛增地骨食少增茯仁至七八不而麥冬常為之主以保肺金而滋化源無不輒効又曰虛勞之疾百脉空虛非粘滯之物填之不能窒也猶血粘涸非滿濕之物滋之不能潤也當用參茂地黃二冬五味枸杞之屬各前胃另用青蒿以童便熬膏合前諸汁和藥角膠霞天膏化服大抵茯仁百合之為治肺虛參茂地黃膏之屬治腎虛甚心肝屬陽肺腎屬陰故補肺腎即是補陰非知柏四物之謂也

本方加黃連胡黃連名三連四物湯元戎治虛勞血虛五心煩熱幸大血室夜分發熱血室衝脉也衝為血海晝靜夜熱陽陷陰中名熱入血室本方加黃柏黃芩甘草名三黃四物湯治陰虛潮熱本方用生熟二地加黃芪丹皮升麻柴胡名三黃補血湯治亡血血虛六脉俱大按之空虛二地補血丹皮涼血黃芪補氣升麻

則无狂蕩之患矣按腎本屬水虛則热矣心本屬火虛則寒矣**徐灵胎清熱療下焦虛骨蒸勞熱陰虛生内熱** 諸痿癉瘧熱勝則熱血血不榮筋則與短而爲拘攣熱勝則傷筋筋不束骨則弛長而爲痿合著水名二妙散清熱利濕爲治痿要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛濕痰死血之不一當隨症加治**目赤耳鳴腎火消渴便閉黃疸水重**王善夫病便閉腹脹如石月餘裂出水數盆不下治滿利小便藥遍服不効東垣曰此左脚大過骨梁積热一塊傷腎水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而爲嘔逆雖經而

升陽氣旺則能生血陽生則陰自長也 **本方加桃仁紅花名元戎四物湯治臟結便秘撲損瘀血** 本方加羌活防風一用泰艽**名治風六合湯治風虛眩運風秘便難蜜丸名補肝丸** 肝以散爲補也 **本方加木香檳榔名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣上衝本方加羌活天麻蜜丸名神應養真丹治足厥陰經受風寒暑濕痺痛不遂語言蹇澁及血虛腳氣本方加桃仁紅花竹瀝姜汁治半身不遂在左者屬瘀血** 瘀血不去則新血不

調陽則不得小便格則吐逆者内經所謂無陰則陽無以化也遂迎以北方大苦寒之柵黃柏知母各一兩洒洗焙研蛙一不為引名滋腎丸每服二百丸少烏前陰如刀刺火燒溺出赤下**小便熱痢痔成流脾胞瀉消小便熱痢痔血腸風漏下赤白** 皆溫熱為病 **諸瘡瘍頭瘡** 研末傳之**口瘡** 蜜炒研敷口瘡用凉藥不効者乃中氣不足虛火上炎宜用反治之法參朮甘草補上之虛干姜散火之標甚者加附子或喉官桂引火歸元 **私毒蛇犬服傷胃尺赤日弱者禁用** 若虛火上炎服此苦

生故用桃仁紅花活血去瘀加竹瀝姜汁者以痰無分左右也**本方去** 白芍加防風名防風當歸散治發汗過多而成痙症宜去風養血本方去地黃加干姜名四神湯治婦人血虛心腹痛痛勿音陽又音絞急痛也 **本方加阿膠艾葉甘草名膠艾湯治衝任虛損經水淋瀝皮血虛寒痢** 別見痢門 **本方加艾葉四製香附** 童便硫水酒黃酒醋各浸三日酉丸名艾附煖宮丸治子宮虛冷再加阿膠名婦寶丹治虛寒月水不調本方加丹皮地骨治婦人骨蒸

寒之前有寒中之變時珍曰知母佐黃柏滋陰降火有金水相生之義古云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源丹溪曰君火者人火也心火也可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水濕制之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之按火有虛火實火燥火濕火鬱火相火之異虛火宜補實火宜泄燥火宜滋潤鬱火宜升發濕火由濕鬱為熱多病附腫經所謂諸腹脹大皆屬于熱諸病附腫皆屬于火是也宜利濕清熱而兼補脾相火寄于脾腎乃龍雷之火非苦

本方除芍藥地黃名芎歸湯為未名佛手散又名一奇散又名君臣散治產後血虛頭痛胎動下血服之即安子死腹中服此即下催生神効本方合四君子名八珍湯治心肺虛損氣血兩虛四君補氣四物補血再加黃芪肉桂名十全大補湯兼力助陽固衛也加黃芪即黃芪建中也參朮甘草四君也芎歸芍地四物也以氣血俱衰陰陽並弱法天地之成數故曰十全十全湯去白芍加山茱五味防風散

蓉入姜棗部名大補黃芪湯鑑治氣

寒所能勝宜滋陰養血此水之主以制陽光又按諸病之中火症為多有木經自病者如忿怒生肝火憔思生心火之類是也有子母相剋者如心火剋肺金肝火剋脾土之類是也有藏府相傳者如肺火咳嗽久則移熱于大腸而瀉泄心火煩熱久則移熱于小腸而為淋閉之類是也又有別經相移者有數經合病者當從其重者而治之

川產內厚色深者良生用降實火蜜炙則不傷胃炒黑能止崩帶漏製治上蜜炙治中

鹽製治下炙未乳調塗臍下能塗痛搽

枳實積殼　苦酸微寒其功皆能破氣氣行則痰行喘止痞脹消（脚無積血心下不痞濁中四逆菜羹承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用）痛定息枳殼治上而主氣　痛定息枳實治下而主血（東垣治傷於勞役肌熱苗亦頑痛補血湯）

後重除台胸痺結胸食積五膈痰癖癥結噫逆咳嗽水腫脇脹（肝鬱痛）痛閉痔重易風脇脹（肝鬱痛）痛閉痔重易風除風痙（辛散風）開胃健脾所主略同但枳實利胸膈枳殼發大腸胃枳實發猛（大小承氣湯皆用之）

丹溪曰枳殼泄痰能衝墻倒壁枳殼力緩爲少異孕婦及氣虛人忌用（按本草元寔皆曰明目思之不得其解然日疾方中多用之豈以其破濁氣即能升清氣乎本經又言枳實益氣想亦同此理也故厚朴條中亦有益氣明目之文王左古日山寔左以參犬干姜則益氣佐以硝黃牽牛則破氣此本經所以言益氣而復言消痰也張元素曰枳殼泄肺走大腸多用損胸中至高之氣苦瀉陽公主雍痿方上進瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩五月後日服一不瀉古故以枳木名東胎先寬宗爽明其不然益孕婦全賴血氣以養胎血氣

之血者生地黃連湯主之二者俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石羔湯相表裏是皆三焦包絡虛火之病也病既危急只得以此降血中之伏火耳

綱目曰四物即桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆菜羹承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用

東垣補血湯

治傷於勞役肌熱苗亦頑痛

當歸補血湯

治飲食勞倦脈大而虛血寔則身熱此以飢飽勞役傷其明血虛陽獨勝故肌熱煩渴與陽明白虎症無異但白虎症得之外感寔熱內盛故脈大而長按之有力此症得之內傷血虛發熱脈洪大而無力（內經所謂脈虛血虛是也誤服白虎湯必斃）

黃芪（炙）二兩　當歸（酒洗）一錢　空心服

此足太陰厥陰藥也當歸氣味俱厚爲陰中之陰故能滋陰養血黃芪乃補氣之藥何以五倍于當歸而又云補血湯乎蓋有形之血生于無形之氣又曰當歸引則從之而生血矣經曰陽生則陰長此其義耳詳蓋曰病本于勞役不傷血而亦傷氣故以二藥兼補之也

婦人陰虛火動經水不調或過期或前後不定或閉或崩或帶或漏或胎前產後或瘡瘍或內熱或作渴或潮熱或盜汗或驚悸或怔忡或健忘或不能攝血致血妄行及婦人經藏心

充寔肺乃易生彼公主泰養太過氣寔有餘故可服之若槩施則誤矣時珍曰八九月胎氣盛壅滯用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也氣弱者大非所宜矣

皮厚而小爲枳實殼薄虛大爲枳殼陳者良炙用 時珍曰殼寔上世未分魏晉始分用藩古東恒始分殼治上寔治下海藏始分殼主氣寔主血然仲景治上焦胸痺痞滿用枳寔諸方治下血病痔腸閉後重用枳殼則寔不獨治下而殼不崇治上也益自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已

厚朴 苦降能瀉實滿辛濕能散濕滿 王好古曰別錄言厚朴温中益氣消痰下氣果泄氣乎益氣乎益與枳寔大黃同用則泄寔滿所謂消痰下氣是也與橘皮蒼朮同用則除濕滿所謂温中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸胃大抵味用辛温用苦則泄用濕則補昌按脹滿症多不同清補貴得甘宜氣虛宜緩氣血虛宜補血食積宜清消導痰滿宜行痰挾熱宜清熱温盛宜利温寒入者散寒怒入者行氣畜血者消痰不宜專用行散藥亦有服參蔻而脹反甚者以挾食挾血挾熱挾寒不可槩作服虛氣弱心氣心者脾之母也當歸滋陰而益血木神而生血心傷則不能生血而血少故征忡健忘驚悸盜汗汗者心之液也脾主思而藏血脾傷則血不歸脾故不眠脾主肌肉故肌熱脾主四肢故体倦脾不健運故食少脾不能統血則妄行而有此咽腸風崩漏等症○有獨而心動曰驚無驚而自動曰悸卽怔忡也上氣不足下氣有餘腸胃寔而心氣虛故善

助參芪而補氣行氣而舒脾既以行血中之滯又以除氣壯則能攝血自歸經而諸症悉 治寔火之血順氣爲先氣行則血自歸經治虛火之血養正爲先氣壯則能攝血血脾統血肝藏血凡治血症須按三經用藥遠志上參芪甘草補脾以固肝氣木香七先入脾總欲使血歸經耳

茯苓陳皮入蓮肉姜煎名酸棗仁湯治虛煩不眠 民間酸棗仁湯亦治不眠與此不同見卽解門

治也入足太陰陽明脾胃平胃調養心湯 治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主血而藏神經曰靜則神藏燥則消亡心血虛則易動故怔忡驚悸不得安寧也 黃芪蜜炙 茯神 當歸酒洗 川芎 半夏麴一兩 甘草炙一錢 栢子仁去油 酸棗仁炒遠志去心炒 五味子 人參 肉桂二錢半 每服五錢 此手少陰藥也 人參黃芪以補心氣川芎當歸以養心血二茯遠志栢仁酸棗以泄心熱而寧心神五味收神氣之散越半夏去穢心之痰涎甘草補土以培心于肉桂引藥

胸中至高之氣使之下行性如鉄石能墜諸藥至于極下攻堅去脹消食行痰下水除風殺蟲醒酒消痰辟瘴癘瘧痢水腫腳氣腳氣沖心尤須用之蘆便姜汁溫酒調服 大小便氣秘薏苡仁重 同木香用木香利氣過服損真氣嶺南多瘴以祛御代茶其功有四誰能使醉若能使醒飢能使飽亡能使飢然泄痢藏氣無瘴之地忌用 矣心火長破之作錦紋者良 雖星海曰

以入心經潤以滋之溫以補之酸以收之香以舒之則心得其養矣

人參養營湯 治脾肺氣虛營血不足驚悸健忘寢汗發熱食少無味身倦肌瘦色黯氣短毛髮脫落小便赤澁經曰脾上輸于肺此地氣上升也肺主治節通調水道下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則上下不交而為痞營血無所藉以生肺虛故氣短脾虛故食少心主脈脈屬營營虛血少則心失其養故驚悸健忘寢汗發熱肺主皮毛脾主肌肉血虛火盛故肌瘦色枯毛髮脫落也 亦治發汗過多身振脈搐筋惕肉瞤汗為心液汗即血也發汗過多則血液枯涸筋肉无

陰毒生風世醫良方以烏梅煎水洗即除或用心紅縫良

大腹皮 辛溫肺溫和脾下氣行水通大小腸治水腫脚氣痞脹痰膈癖癥癨亂氣虛著毒用 子似檳榔腹大形扁故與檳榔同功取皮酒洗黑豆湯再洗焙用 鳩鳥多棲其巢故宜先治

檳實即檳榔角 苦澁純陰入肝經氣分疏風熱潤肝燥涼大腸治癇風臨產血腸風 蠹前有血泊外痔蠹後有血名內痔谷道努肉名舉痔頭上有孔名痔病疮內有虫名虫痔大法用檳角地榧生地涼血芩連知柏清热防風秦艽祛風溫苦丸人參和血生血枳壳寬腸升麻升提治腸風畧同不宜專用寒涼須兼補劑收功 陰會癥溫痒明目止淚清肝淚為肝热 固齒烏髭十月上巳採清羊胆一枚明日補腦髮白還皮黑腸風痔血尤宜服之 殺虫根皮皆能洗痔瘡胎 去蛆子及蚤子者銅銚七碎牛乳共蒸槐乃虛星之精 槐花苦涼入肝大腸

以荼養故有旋
接膽陽之症

人參 白朱 黃芪蜜炙甘草炙 陳皮桂心 當歸酒洗熟地黃 五味子 炒梓茯苓七分遠志五分白芍一錢半 加姜棗煎此手少陰手足太陰藥也熟地歸芍養血之品參芪苓术甘草陳皮補氣之品血不足則補其氣此陽生則陰長之義

參芪五味所以補肺主氣氣能生血 甘陳 术所以健脾脾統血 歸芍所以養肝肝藏血相生 遠志能通

腎氣上達于心桂心能導諸藥入營生血五藏交養五益故能統治諸病而其要則歸于養營也 薛立齋曰氣血兩虛而變現諸症莫能名狀勿論其病勿論其脈但用此湯諸症悉退喻嘉言曰方內皆心脾之藥而註脈虛誤也養營原不及肺局按肺主氣氣能生血即此便是養營補心補脾理實一貫古方補血湯黃芪五倍倍于当归而云補血豈非明証乎況五藏五相灌溉傳精布化專賴輔相之功為得謂養營不及丁肺也哉又按生脈散保肺

血分而涼血血涼則陰自足治風熱
目赤赤白泄痢五痔腸風吐
崩諸血舌上無故出血如線
者名舌衄炒研摻之
陳者良
苦楝子一名鈴子黃糞有小毒能入
肝舒筋能導小腸膀胱之熱
因引心包相火下行通利小
便為疝氣要藥亦治傷寒熱
狂熱厥腹痛心痛殺三蟲疥
癬表堅志消渴症有虫蝕
其津液者取根皮濃煎

加少醋服下其虫而渴自止　脾胃虛寒者
忌之　川產長流蒸寒用煨用去
皮取肉去核用用核則犯砒
礜水煮一伏時去肉用鬲香為使
蔓荊子　辛苦微寒輕浮升散
入足太陽陽明厥陰經膀胱肝
膽風涼血通利九竅治濕痺疼
拘攣頭痛腦鳴絡于腦曰赤
齒痛齒虽屬腎為骨之餘而
上連屬足陽明下齒屬
于陽明陽明風熱頁
上攻則動搖腫痛曰面風虛

泄肺搜肝散熱理血故以為君生地黃
涼血炒黑止血以瀉諸血柴胡平肝
解肌熱不通利水降心火麥冬阿膠潤
燥清肺參芪甘草滋火和脾此亦為熱
而洩虛者設故少佐參芪也喻嘉言曰
此九兩解氣分血分之熱宜備服之

咳血方丹溪治咳嗽痰血咳者有聲無物嗽
者有物無聲咳嗽有物無聲肺有痰火故咳嗽甚則逼血上行故吐
血肺移熱于大腸則下血肺熱則膀胱絕其化源故淋閉肺熱則渴而多飲為
上消脾胃有熱則口臭肝肺有熱則口
苦能蒸一名旱蓮草一兩六不炒黑　生地黃六不炒黑
四不蒲黃炒　阿膠炒珠　木通　銀柴胡二不　甘
草不炙黃　人參一不　先將木通柴胡
浸二日熬汁地黃浸汁熬膏用童二
兩煉過和九梧子大每服二十九細嚼
湯下一方有蓮　此手足太陰少陽
藥也肺本清肅受心之邪熱受肝
之火害故見諸症潤荷葉涼輕揚升發

之症明白固齒長髮澤肌
去膜打碎用亦有酒蒸炒用
者惡石燕烏頭
石南葉 辛散風苦堅骨補內
傷陰衰利筋骨皮毛爲治腎
虛腳弱風痺之要藥婦人不
可久服令思男 時珍曰今人
絕不知用蓋
爲藥性論有令人陰痿之說
也不知此藥能令腎强人或
藉此縱慾以致疲弱且咎于
葉良可慨也昂按石南補陰
祛風則有之然味辛不熱不
助相火亦未聞邪淫方中用

石南者別錄思男
之說殆不可信 閉中佳
辛夷 即水
筆花 辛溫輕浮入肺胃氣
分能助胃中清陳上行通于
頭腦溫中解肌通九竅利閉
節主治鼻淵鼻塞肺主鼻胆
移挽于腦
則鼻多濁涕而淵風寒客于
腦則鼻窒經曰腦漉爲淵王
水則胆液不澄則爲濁及頭
淵加泉不已故曰鼻淵及頭
痛面黯音早黑斑
可作面皯 目眩齒痛獨聖散 治多作咳嗽肺痿咯血紅痰
九竅風熱之病然性走氣氣
虛火盛者忌服時珍曰肺開
竅于鼻陽明
此手太陰藥也人之五藏惟肺葉嬌爛

胃脘環鼻上行腦爲元神之府鼻爲命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭爲之傾先聖爲之不利吾鄉金正希先生嘗語余曰人之記性皆在腦中小兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留于腦中昂思今人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即疑神于腦之意也不經先生道破人皆習焉而不察矣李時珍云腦爲元神之府其于此義殆有暗符故

去夕皮毛 毛骨肺也 令人咳微炒用黃為使惡石脂畏黃芪 葛洪百法

者可以復生白芨苦辛收濇得秋金之令行補肺止血故治肺損紅痰又能生肌爲去腐生新之聖藥古州獄囚因感之云吾七犯死罪遭刑傷肺皆拍傷得一方用白芨末米飲日服其効如神後因陵遲部其胸見肺間竅穴數十皆白芨塡補色猶不變也

清咽太平丸 治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉不清 肺屬金肅清之藏也火炎灼肺金受刑故咯血早間寅卯木旺生火之時兩頰肺肝之部也十二經脉惟足太陽在表不歷膈咽餘皆上循喉嚨尽能作病而君相二火爲九竅諸火上逆故咽喉不清

薄荷十 川芎 防風 屬 柿霜 甘草二 桔梗兩 冤

此手太陰藥也薄荷辛香升浮消風散熱清肺定咳方風盛世肺火散肝火川芎血藥之使 川芎為上部血藥之使 川芎為血藥之使 柿霜甘涼入脾肺腎三經固精秘氣消痰滅渴遺精 仰天實為九石水泄痢便數丹溪曰經陸丹 泄痢便數 治膈也 隧道以分性降下氣行水破血潤燥治水腫膨急大腸氣滯閉格不通用酒能入胆治怔忪眞張不眠一婦因大恐而病煩渴後目日張不眠不乙日日系乃連肝胆恐則氣結胆橫不下郁李潤能散結隔胆入胆結去胆平共治標之劑多服而日暗矣

渗入津液 去痰寧神

釜櫻子 酸澁入脾肺腎三經

還元水 飲自己溺名輪迴酒 治膨血吐血及虛後血

運陰虛久咳人蒸如原血生于心統于脾藏于肝宣布

通暢為和乎而昧首取喬佳為快胷前食之日作不靖咎將誰執時珍曰無故而食以恣慾則不可若精氣不同者服之何害

似橘而小黃赤有刺取生黃者熟則純甘去刺核用胷滿亦良筆談云胷滿胃則甘全失濁味

詞予苦以泄氣消痰酸以斂肺降火東垣曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之詞子苦重泄氣酸輕濁不能補肺故嗽藥中不用濁以收脫止瀉溫以開胃調中治冷氣腹脹胷痺逆痰嗽

嗽急肺被痰水或被火灼傷故宜苦酸斂之汁痢脫肛腸風崩帶皆取其閉音酸澁閉音止瀉肺欲則音開火降則渴止古方有詞子清音湯

然苦多酸少雖澁腸而泄氣氣虛及氣痢初起者忌服同烏梅詞子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳皮砂仁治冷氣腹脹佐白术蓮子治虛寒久泄佐穉皮治腸癖便血同蛇床五味山茱萸治肺虛寒帶下從苗舶來苗名詞黎勒領南亦有六稜黑色肉厚者良酒

麻黃去節 黃芪蜜炙 甘草炙 桂枝去皮 白芍 人參 乾薑 附子炮去皮臍 細辛 五味子 半夏洗 大棗擘 生薑切 杏仁去皮尖 麥門冬去心 阿膠 馬通汁

治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者

方中麻黃發汗而走血故治血病當熱飲熱則直氣向前存其行自速冷則滯有礙寒之性而已李士材曰痰成於氣氣漸失不及童便遠矣

麻黃六湯 麻黃去節 甘草炙 桂枝去皮 芍藥 生薑切 大棗擘

治汗出而喘無大熱者

方中麻黃發汗而走血故治血病當熱飲熱則直氣向前存其行自速冷則滯有礙寒之性而已李士材曰痰成於氣氣漸失不及童便遠矣

麻黃升麻湯 麻黃去節 升麻 當歸 知母 黃芩 萎蕤 石膏碎 白芍 天門冬去心 桔梗 白朮 茯苓 甘草炙 石膏碎 乾薑 各一錢 五味子 半夏洗 各二十粒

治陽毒下血者

方中麻黃發汗而走血故治血病當熱飲熱則直氣向前存其行自速冷則滯有礙寒之性而已李士材曰痰成於氣氣漸失不及童便遠矣

蒸一伏時去核取肉用用肉則去核生用滿金行氣煨熟溫胃開腸海魚放涎凝滑船不能行投訶子湯涎化為水其化痰可知

烏藥 辛溫香竄上入脾肺下通腎經能疏肉腹邪逆之氣一切病之屬氣者皆可治氣順則風散故用以治中氣風厥逆痰壅口噤脉伏身溫為中風身冷為中氣久有痰為中風無痰為中氣同方治此亦用烏藥順氣散許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可及旁治乃用附冷氣小作中風治便頻數反胃吐食宿食不消泄痢霍亂女人血凝氣滯小兒尤甚小如瘡癤疥病皆成于血遊理氣亦可治之療猫犬百病氣虛氣熱者禁用時珍曰四磨湯治七氣鬱結上氣喘者降中兼收泄中兼補也方用人參烏藥沉香檳榔各濃磨汁七分合前縮泉丸用同益智子等分為丸治虛寒便數者取其通陽明少陰也

氣谷五味子五粒去核肉和熟三分五味子斂肺氣當歸五分和血養血辛散

此足太陽手足太陰藥也綱目云觀此一方足以為萬世模範孟詵取伸景麻黃湯服補劑各半服之但凡虛當服伸景方者宜以此為則

犀角地黃湯 濟生 治傷寒胃火熱盛吐血衄血便血畜血如狂嘔水不欲嚥及陽毒發狂口血目鼻血目衄吐行漏同也經者循行之血走而不守喘氣而行火氣急逼故隨經直犯清道上騰而出書云鼻為衄其從肺竅而出于咽者則為咳血路血其行胃中者為守舍之血守而不走胃虛不能攝血或為火逼故嘔吐從喉而出也吐血之熱在府衄血之熱在經雜病衄血為裏熱傷寒衄血為表熱經曰心移熱于肺則咳嘔出血便血有寒熱之症傷寒便血為傳經熱邪瘀血在上焦則善忘在下焦則如狂嘔水不欲嚥熱在經未入裏也畜血發燥而內不渴故雖嘔水而不欲嚥海藏曰大凡血症皆不飲水雖氣症則飲水經曰陽明病口燥嘔水不欲嚥者必衄傷寒當發汗而不發汗邪熱入裏逼血妄行故見諸症斑疹者熱甚傷血襄虛表虛發于皮膚而為斑疹傷寒下早熱毒乘虛入胃則發斑下遲熱留胃中亦發斑或服熱藥多亦發斑見紅點者為疹如錦紋者是斑疹輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛也多死凡斑疹慎不可汗汗之重令開泄更增斑爛亦不可遽下恐斑毒內陷也

根有車轂紋形如連珠者良
酒浸一宿用亦有煅研用者
五加皮 辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝濕逐肌膚之瘀血療筋骨之拘攣腎得其養則亥水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋强治五緩虛羸五藏筋脉緩縱九月九日採根合爲末治五月五日採莖七月七日採葉干金方補云五加葉熱生亦陰癢囊濕女子陰癢濕生亦
小兒脚弱明目愈瘡癢釀酒尤良
生地黃兩半 白芍一兩 丹皮 犀角二个半 角尖尤良鹿取首犀取尖其精氣盡在是也作器物者多破蒸者不堪入藥 每加五錢熱甚如狂者加黃芩一兩因怒而血者加梔子柴胡黃芩泄上中二焦之火屁子泄三焦之火柴胡平少陽厥陰之火 飴者加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁者加味犀角地黃湯治吐衄因寒解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血之火柴胡者心包之母 丹皮苦寒泄血中之伏火生地大寒涼血而滋水以其不礙經之僭逆也海藏曰血分三部藥有重輕犀角地黃湯治上血如血畜小腹不裏血越而上行宜者犀角地黃湯用芍藥主之故知太陰藥也医貫曰犀角地黃湯乃衄血之的方益犀水獸也可以分水可以通天鼻衄之血從任督而至巔頂人鼻中推犀角能下入腎水而泄肝火 丹者心之母

良生輸曰風病飲酒能生瘵火惟五加浸酒益人
椿樗白皮 苦燥濕寒勝熱澁收斂入血分而澁血去腸胃之陳痰治濕熱爲病瀉泄久痢崩帶腸風瘡瘻便數有斷下之功 痢疾帶氣未盡者忽遽用勉强固澁必變他症去府醫雜記云良時珍曰椿皮入
青箭白花赤皮黃根黑上應五車之精芬香五葉者佳遠志爲使惡麥冬

血分而性滯椿皮入氣分而性利凡血分受病不足者宜椿皮氣分受病有入者宜椿皮乾坤生意治瘡腫下藥用椿皮水研服汁取利是其驗矣葛氏曰一婦年四十餘骯飲無度多食魚蟹積毒在藏日夜二三十泄便典濃血雜下大腸連肛門甚痛用止血痢藥不効用腸風藥益甚蓋腸風有血無膿也服熱藥腹愈痛血愈下服冷藥注泄食減服温平藥則苦不知年餘待斃或教服人參散椿皮入參各一兩為末空忘温酒或米飲下二不遂愈香者爲椿肌實而赤嫩其苗可茹臭者爲椿肌虛而白主治畧

同根東引者良去粗皮或醋

蠶多用皃溶麵

榆白皮 甘滑下降入大小腸

脫經子絡脉利諸竅通二便瀉濕潤腸產或胎死腹中服汁可下有形留着之物治五淋

腫清急方揭脩作揭脩食小便利若喘嗽不眠稽康養生論

瘡瘍癬疥

消赤腫石乳乳經汁不出內

消赤腫石乳乳經汁不出內外結成腫名石乳

和陳酢淳調日六七易効十

劑日漸可去若冬葵子榆白

性降用屋角止血乃借其下降之氣導心肝之火使血下行屋經耳倘誤用升脉血隨氣升不愈湧出不中乎故古方亦未可尽泥也

桃仁承氣湯 景岳治傷寒邪症不解熱結膀胱小腹脹滿大便黑小便利燥渴譫語

畜發狂如狂及血瘀留腹痛腸胃痛

瘧疾實熱後發痢疾畜血急痛 熱邪自太陽不解傳入膀胱之經分血相搏若血自下則熱隨血出而愈不下者血畜下焦故小腹急脹次見青紫筋大便黑者血痒也小便利者血病而氣不病也小便利而少腹仍急故知為畜血心主血邪熱上干心君不寧故燥煩譫語而如狂矣血聚于陽明則胃痛瘕在太陰則腹痛在厥陰則腸痛瘕後發者熱入血分也活

傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黃湯柔花湯治之反劇悶切其脉浮數而緊遂用麻黃湯汗出而愈此取脉不取症也可謂得仲景心法矣設脉不浮緊而數其可用乎經曰傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之又曰太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈風寒在經人而為熱不得汗解衄則熱隨血散洛名紅汗故愈若全未發汗致衄者仍須用麻黃發之成無已曰傷寒衄者為荊氣不得發散宣盛于經逼迫于血也荊氣被麻黃湯治衄者非治衄也即是發汗散經中邪氣耳血鬱于上而吐血者謂之畜血此由太陽隨經瘀熱在裏血為熱所拂結于下焦少腹鞕鞕小便自利朱肱活人書言瘀血人裏吐衄血者犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二葉性味相遠何以為代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也朱二允曰升麻柱升犀角

皮之屬是也 **有赤白二種去粗皮** 採皮為貧荒年當糗可食舂削以之調和粘僧勝于膠漆 **入腎用** 能除胃中胞胎落胎逐瘀血 **治婦人** 洗目赤退醫膜鬱瘤以其收濇之用以其濇而補下焦故能益腎以能平木 **桃仁** 五十枚去皮尖研 **大黃** 四兩苦硝 甘草 **桂枝** 二兩 此足太陽藥也大黃苦硝湯 **熱去實甘草和胃緩中此調胃承氣湯** 也熱甚搏血血聚則肝燥殺加桃仁之 **皮有白點漬水碧色書紙不** 脫着異哉鼠為使惡narcissus黃 **海桐皮** 苦溫經疏云應兼辛 **入血分** **祛風去濕殺虫能行經絡達** **病所治風濕頑痺腰膝疼痛** 傳信方海桐皮去仁各二兩半半水煎洗久用治疥癬地骨皮五加皮各一兩甘草五分生地十兩酒二斗浸此方不得增減早中晚飲常令醺醺 **亦驅疥癬目赤** 煎汁服或洗舍敕 **出廣南皮白** **堅韌作索不爛**

苦甘以潤燥而緩肝加桂枝之辛熱以 **調營而解少陽所以行之也** 準繩曰桂枝輕揚上行此當是桂非枝也喻嘉言曰用桃仁以達血所加桂枝以解外邪亦猶大柴胡湯用柴胡解外相似論見太陽隨經之邪非桂枝不解耳昇按傷寒與雜病不同仲景之旨前為傷寒而設故當用枝稍卻倘曰五苓散與桃仁承氣均為太陽犯府之藥一利前而王氣分一利後而主血分治各不同櫻寧生曰血瘀血脫諸當歸者其始也率以桃仁大黃行血破瘀之劑折其銳氣然後區別治之或問失血復下虛何以當蘇仍舉曰血既妄行迷失故道不去當利瘀則以妄為常何以禦之曰去者不去生者自生何虛之有

本方加青皮梨當歸芎藭蘇木汁柴

棗仁一名白棘甘温別錄微寒入心肝脾三經消風散熱益水生光三經皆血藏也血得其養則目疾平凡目病在表當疏風清熱在裏隔腎虛血少神勞宜補腎養益安神遠視為腎水虧近視為火不足治目赤腫痛

爛淚出亦治心腹邪熱結氣瘡痍今人惟用療眼陳藏器日生治足腫熟治不眠

叢生有刺實如五味圓扁有紋紫赤可食取仁浸去皮研用

蠻花甘而微寒入肝經血

抵當湯仲景治太陽病六七日表症仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利者必有蓄血令人善忘所以然者以太陽隨經瘀熱在裏散也表症仍在謂發熱惡寒頭痛項強未罷也太陽為經膀胱為府此太陽邪隨經入府熱與血搏故為蓄血脈沉為在裏表症仍在則邪氣猶淺不結于胸中而狂經曰熱結膀胱其人如狂又曰血併于下乱

血令自利屎黑小便利者為無血此為血結膀胱也

盲蠻蠶赤腫多音鳴眼脂淚小兒疳氣攻眼

蠶中蠶冬在桐其花繁密蒙茸故名搗淨漬浸一宿傾瓷密器蒸晒三次

芙蓉花辛平性滑凝粘清肺凉血散熱止痛消腫排膿治一切瘡瘤腫毒有殊功用芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研未窮調塗四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清凉痛止腫消已成者即膿出已潰

仁二十粒去皮尖研太黃四兩酒浸此足太陽藥也戚氏曰苦走血咸滲血蛊虫水蛭之咸以除蛊血甘緩結苦泄熱桃仁天蒜之甘苦以下結熱程知借曰表症仍在脉微而沉是有表症而無表脉熱在下焦可知非桂枝所能攻緑熱結膀胱

者即易欽湯科秘其名為清涼瀉熱在裏邪有淺深故桃仁承氣與抵當湯攻有緩急 李彣

山茶花 甘微苦寒色赤入血分治吐血腸風痲油調末塗湯火傷 用紅者為末人童便姜汁或酒調服代鬱金 木槿 苦涼活血潤燥治腸風泄血痢後熱渴作飲服冷人得睡川產者治癬疥瘡癰有用用槿皮肥皂水浸時時擦之或浸汁磨雄黃尤妙 用根皮 杉木 辛溫去瘟氣散風毒消腫氣腫滿心腹脹痛洗毒瘡

栁子原慕救死方云得腳氣夜半痛絕晡兒如石舂困且死五物煮杉木湯食頃入下塊散氣通用杉木節一升無葉以皮代大腹槐佛七枚連子椰碎童便二升者分服若一服得快利即停後服 石赤白二種赤如血野雞者作棺尤貴性直燒炭最殺人藥

烏臼木 苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟瘧疰腫牽此寿極能泄下先患腫毒中毒者不拘根皮枝葉搗汁

動之大黃必明粉苦寒 以推蕩之如川山甲引之以達于疾所也

槐花 苦平涼肺經本治腸風藏毒下血血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流脈中調和五行洒陳六府謂之營血陰者居于絡脈前守藏府謂之營神氣循經絡或居絡之陰血因留着之邪潰裂而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗率以腸風名之不知風乃六淫之一耳若腸胃受火熱二淫與寒燥濕佛鬱其氣及飲食勞力傷其陰絡之血者亦可謂之腸風乎針經曰陽絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺氏以隨感而見色一鮮者為腸風積久而發色瘀者為藏毒又云色燃為熱自大腸氣分來色瘀為寒自小腸血分來或曰腸風者風邪侵胃藏毒者濕邪淫胃○藏毒腸風之血出于腸藏之間

水蛭十箇蚤虫桃仁各減五箇分為四丸每水煮一丸名抵當丸治本病無蚤虫桃仁承氣與抵當湯攻有緩急 李彣

忘如狂之症者水蛭即馬蟥蚊蚋寒有毒乃食血之虫能通肝經聚血最難死虽炙為末得水便活若入腹中生子為患用泥和水飲下之虫即蚊虫因其食血故用以治血二藥俱峻世人罕用故更製代抵當湯治鶴膝風皇甫古人用虻虫水蛭治血積以其善吮血耳若天鼠矢乃食蚊而化者也當亦可以治血積本草俱失其下死胎則其能攻血塊也何疑 附代抵當丸大黃酒浸生地搗烏梅仁穿山甲炙桃仁湯浸去皮尖各一兩 本不寫 桃仁揚雄生地潤以通之桂心熱以

多飲得大利卽止忌之 子可作燭

水楊柳 苦寒瘡瘡陷腫滯不起者用楸煎湯浴之此因氣凝血滿或風寒外束而然得此煖氣透達腫隨痰而行再用助氣血藥更效 楸煎汁治胃癰

皂角 十減性燥氣浮而散入肺大腸經能勝木燥勝風故兼入肝攻風泄熱故之通上竅發汗吐痰延喉痺作噴嚏治中風口噤

肉痺麻木不仁人事昏聵中風不省人事痙厥口噤不能進藥急提頭髮半招入中用皂角末或生半夏末吹入鼻中有嚏者生無嚏者為肺氣已絕死或用稀涎散吐之皂角末一兩白湯五六碗調灌或加葱芦少麝鵝翎探吸令微吐稀涎再用藥治年老氣虛人勿用服之則除濕去垢刮去油膩除濕去垢刮去油膩消瘀破堅取中段湯煎服治老人風秘 殺虫下胎治風濕癲瘀喘腫滿堅癥叢吉脈陰肝脉絡陰器氣塗之則散腫消毒節膏貼一切

和則血得以歸肝故仲景治此血不止氣逆虛寒用柏葉湯柏葉干艾各三兩艾二把馬糞汁一升合煮服

馬屬于為雌假之以降心火

水升金主降升降相配夫婦之道

五味子 炒研或搗碎 側柏葉 炒黑 枳殼 炒 等分 為末每三錢米飲下 此手足陽明藥也側柏養陰燥濕清血分槐花疏肝

槐花 炒 側柏葉 炒黑 枳殼 炒 荊芥 等分 為末每三錢米飲下 此手足陽明藥

宜純用寒涼須兼溫補及升發藥大法血用槐角地榆側柏條芩炒連桃子生地和血用阿膠當歸川芎白芍風溫桃仁紅花蘇木能入血破血補氣加人參黃芪白朮甘草○葉生血補氣能制肝木朮升金主降升降相配夫婦之道

癰瘍含漱之劑瘍瘡濕氣一種小如猪牙一種長而枯燥一種肥厚多脂多膿者最去糙皮子弦或窠炙酥炙絞汁燒灰用想實爲使惡麥畏人參蔓參性能消鉄不結痰者作悶一孔入鉄封之則結痰矣鎚碾見之久則成孔故此木不能燒炭皂角刺辛溫搜風殺蟲功同皁莢但其鋒銳能直達患處潰膿瘡瘍濕腫

散瘰癧古治毒痢腹不痛不裏急後重宜用槐花荊芥炒黑爲末酒服亦治下血經久燥結痛不可忍手陽明大腸庚金也清足陽明胃土之化旺則生化萬物人或酔飽入房酒熱留有忍精不泄流注瘡間前陰之氣好于大腸木乘火勢而傷燥金火就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也爲病者胃濕也濕熱風燥四氣合邪法當泄火潤燥疏風和血止痛秦艽白朮當歸尾酒兆二去皮尖洗木仁研一兩

石乳風疥惡瘡疥乃营氣燔如乳風疥脈而不去經曰脈風成爲疥脈瞤營皆血也蒸晒爲末大黃湯治月衣不瘥瘡已潰者禁用名婦忌之皁角子通大便燥結煨存性用汪机曰其性得濕則滑李時珍曰亦辛以潤之之義非得濕則滑也肥皂莢辛溫除風濕去垢膩故浴身盥衣無名腫毒有奇功不拘前瘍惡毒每用生肥皂去子弦及筋搗爛酸醋和敷立愈不愈再敷奇驗此方方書未載若貧人僻地倉卒

秦艽得歸尾桃仁潤燥和血秦艽爲風藥中之潤劑皁莢歸尾以除風燥搜桷以破血止血當歸甘以緩之辛以潤之辛能散邪也甘能緩急辛能潤燥假燥實之寒也大便秘濇以大黃推之其津液益不足用當歸和血加油潤之劑自然軟利矣本方除白朮當地榆加蒼朮黃柏大黃秦艽防風名秦艽

無菓者用之甚便故特著之
集成云生肥皂火煅存性生
油臙粉調
敷諸惡瘡

櫰櫚 苦能泄熱澁可收脫
黑能止血 紅兒黑則止不可
燒過櫰櫚側柏卷
柏燒存性飯丸止遠治吐衄
年下血亦可煎服
下痢崩腸風失血過多者
初起未可遽用 年久敗
櫰皃與髮灰同
用更良
茶 苦甘微寒下氣消食去痰
熱除煩渴清頭目 待春初生
發之氣故

茗菜 湯治同李東垣曰腸頭成塊者濕
結者兼受大熱也足濕熱風燥四氣合
邪當去四者以破氣藥兼之治法全矣
本方除皂角枳實地榆加防風升麻柴
胡陳皮大黃甘紅花名茶芎防
風湯治痔漏大便時疼痛東垣曰如無
本方用秦艽一味加羌活防風麻黃
升麻柴胡蘇茉細辛黃芪當歸紅花名
秦艽羌活湯治痔漏成塊下垂不住其
痒本方除地榆加大黃紅花名秦艽當
歸湯治痔漏大便燥結疼痛以上皆東垣方

多服清上膈之功湯液曰茶
苦寒下行如何是清頭目蒙
答曰熱下降則上自清矣**醒昏睡**清解**酒**
食油膩燒炙之毒利大小便
多飲消膩最能去油**寒胃**故膿聚
千金療卒頭痛如破非中冷
中風由痰厥氣上冲所致名
厥頭痛單煮茶恣飲取吐卽
吐出肥汁乃已渴而卽瘥
酒後飲茶引入膀胱腎經患
痰痼水腫塞心亦忌之與薑等分
濃煎名薑茶飲治赤白痢茶
助陰薑助陽使寒熱平調並
能消暑解酒食毒
陳細者良粗損人

芍藥湯 澈古 治下痢膿血稠粘腹痛後重
下痢皆屬濕熱赤爲傷血白爲傷氣膿
血稠粘氣血兩傷也腹痛後重氣血皆
滯也劉河間曰行血則膿
血自愈調氣則後重自除
芍藥 一錢歸尾 黃芩 黃連五錢 大黃三錢
木香 檳榔 甘草炙二錢 桂錢半 每服
五錢痢不減加大黃 此足太陰手足
陽明藥也芍藥酸寒瀉肝火斂陰氣和
營衛故以爲君大黃歸尾破積血而行
血木香檳榔通滯而行氣黃芩黃連燥
濕而清熱益下痢由濕熱鬱積于腸胃

吳茱萸 辛苦大熱有小毒入足太陰血分脾少陰厥陰氣分肝其氣燥故當肝及脾腎潤肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去痰殺蟲開腠理逐風寒治厥陰頭痛仲景用吳茱萸湯 陰毒腹痛任少陰腹嘔逆吞酸俗名酷心亦有吐酸者宜降火清痰用吳茱作嗽道察中丞苦痰飲率十日一發頭痛皆寒嘔酸不食得一方茯苓吳茱萸湯炮七次等分蜜丸名吳仙丹前後痰飲無次此者不得宣通故大便重急小便赤澁也辛以散之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以爲反佐也 昂按此方

本方除桂甘草枳殼名導滯湯一作道氣湯治前症兼濕者此方今人多用大法治痛而以甘芍和中止腹痛加行血調氣之藥

食積濕痢血痢陰痛痔疾腸風脚氣水腫口舌生瘡爲末醋調貼足心移使便愈能引熱下行衝脉爲病氣逆裏結宜此生雖熱而能引熱下行段成式而椒性善下宗奭曰此物下氣甚速東垣曰濕陰不降厥氣上逆腸胃脹滿非吳茱不可治也昂按吳茱辛熱故性上氣味俱厚故利大腸竄氣故治腸下者降風痔痢

產後餘血故產後必用之然走氣動火昏目發瘡血虛有火者禁

暮木地榆湯潔古治脾經受濕痢疾下血

暮木浸炒一兩 地榆炒黑一兩 每一兩煎

此足太陰陽明藥也暮木燥濕强脾升陽而閉鬱地榆清熱凉血酸收能斷下爲治血痢腸風之平劑初起者勿用

本方加芍藥阿膠甘柏名芍藥地榆湯

河間治泄痢膿血乃至脫肛阿膠補血與要藥能治熱痢

小薊飲子 治下焦結熱而成血淋心主小腸其府也熱甚搏血流入胞中與便俱出爲血淋蓋小便必自小腸滲入膀胱

用陳者良泡去苦烈汁用（泡數次）止嘔黃連水炒治痢鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石川椒辛熱純陽入肺發汗散寒治風寒咳嗽入脾暖胃燥濕消食除脹治心腹冷痛吐泄痃癖痰飲水腫千金方有（人冷氣入陰囊腫滿生椒擇净帛裹若九裹厚半寸須臾熱氣入通日再易取消瘦梅飾用椎末塗亦良）八右腎命門補火治腎氣上逆（能下行道火歸

心熱者小腸必熱經所謂胞移熱于膀胱則癃溺血是也然熱必兼濕載氏曰血無者心小腸實熱血痔者腎膀胱虛便以為冷也○痛者為溺血血淋不痛者為

小薊（蒲黃炒黑藕節）滑石木通生地黃（炒）瀉竹葉當歸甘草（各五分）此手足太陽藥也小薊藕節草名五分滑石瀉熱而滑竅當歸

元胡（日各二十粒大能温酒下焦）暘景渡數陰汗渡病（虛寒）堅齒明目破血通經除癥安（虫見椒則厥烏梅九明之九虫喘腹痛者面白唇紅時發時止）殺鬼疰虫魚毒（最殺勞虫危氏陳稜九川椒炒出汗為末米飲下三不有人病傳尸勞遇棄人傳此方服至二斤吐出兩虫如蛇而安）（月胃）（素）（按）者（忌）服丹溪曰食椒既久則火月目水中生多被甘害毋也

秦產名秦椒（俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皺為川椒閉

元胡日各二十粒大能温酒下焦暘景渡數陰汗渡病虛寒堅齒明目破血通經除癥安虫見椒則厥烏梅九明之九虫喘腹痛者面白唇紅時發時止殺鬼疰虫魚毒最殺勞虫危氏陳稜九川椒炒出汗為末米飲下三不有人病傳尸勞遇棄人傳此方服至二斤吐出兩虫如蛇而安月胃素按者忌服丹溪曰食椒既久則火月目水中生多被甘害毋也

秦產名秦椒俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皺為川椒閉

養陰能引血歸經甘草益陽能調中和氣也

復元活血湯　治從高墜下惡血留于脇下疼痛不可忍者（不問傷在何經惡血必積脇下以肝主血故也）柴胡五當歸　栝蔞根　川山甲（炮二甘草　紅花　桃仁（五十粒去不）大黃（酒浸）一兩　每服二兩加酒煎以利為度（藥內無羌活而以名方何也）此足厥陰藥兼厥又曰肝胆之經行于脇下屬厥陰少陽故以柴胡引用為君以當歸活血脈以甘

只者殺人微妙去汗揚去裏
面毒殼又紅用名椒得鹽良
人腎使君仁畏款冬防風附子
雄黃麻仁涼水椒乃玉衡星之精辟瘧伏
卻故發日飲椒柏酒　子名椒目苦辛
滑行水道不行穀道能治水
蠱除脹定喘及腎虛耳鳴

胡椒　辛熱純陽痰留胸膈下
氣消痰治寒痰食積腸滑冷
痢陰毒腹痛胃寒吐水牙齒
浮熱作痛合蜂蔥散之　殺一切魚
肉鱉毒音鼈上聲毒食料宜之嗜
之者衆多食損肺走氣動火
發瘡瘍藏毒齒痛目昏　葷
澄茄一類二種主治畧同
蘇木　甘鹹辛涼入三陰血分
行血去瘀發散表裏風氣宜與

醫方集解卷中之三

祛風之劑　六淫風寒暑濕燥火也六者之中風淫為首故經曰

風者百病之長也至其變化乃為他病無常方然致自風氣也又曰風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則哀飲食其熱也則消肌肉益天地間惟風無所不入人受之者輕為感胃重則為傷又重則為中然必其人真氣先虛營衛空疎所謂邪之所湊其氣必虛是也故中風之症河間以為將息失宜心火暴甚丹溪以為木以為濕生痰痰生熱熱生風東垣以為氣自病苦以風為虛象者所以治之有清熱化痰養血順氣之不同而不品用祛風之藥也○按內經風論辰亥異卅溪常著論辨之然岐伯曰中風論痺論分為三篇病原不同治法亦論痺論分為三篇病原不同治法亦

防風同用治產後盪暈肘後方煮汁服無藁方加乳香酒服脹滿欲死血痛血痕經閉氣聾癮腫扑傷排膿止痛多破血少和血 出蘇方

國交趾亦有息鉄

沉香 辛苦性温諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而墜痰延怒則氣上能降亦能升平肝下氣 能降亦能升氣香入脾故能理諸氣而調中東垣曰上至天下至泉用為使最相宜 色黑

體陽故入右腎命門煖精止陽行氣不傷氣温中不助火治心腹疼痛噤口毒痢癥瘕癖邪惡冷風痺痺氣痢氣淋色黑沉水者良香甜者性平辛熱者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裹置懷中待燥碾之忌火陽鵲斑者名黃蠟沉雅得浮者名棧香半沉者名角沉咀之軟骨參虽沉而心管煎不堪用

木香止痛安木檀香紫檀降真香 卷三 醫方集解 小續命湯 四六 中三

小續命丹于治中風不省人事神氣潰亂半身不遂筋急拘攣口眼喎邪語言蹇澁風濕腰痛痰火併多六經中風及剛大法有四風痺其一也故治痺諸方亦次本門

柔二痙陰虛火旺痰壅火湧故不省人事血虛風中右体為右不遂風中筋脉則拘急風中口面則喎邪風中舌本則語澁風濕中腰則腰痛痙者頂背強迫手足反張也傷寒無汗為剛痙以寒能滅血也亦有血虛筋脉無所榮養而成痙者凡中風口開為心絕手散為脾絕眼合為肝絕吐沫直視髮有頭搖面赤如妝汗出如珠者皆不治或只見一二症尚有得生者 金匱

中風篇曰寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不泄或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪喎僻不遂邪在于絡肌膚采仁邪伏于經春重不仰邪入于府則不識人邪入于藏舌卽難言口吐涎沫釋曰中絡者邪方入衛尚在經絡之外故但肌膚不仁中經則入營脉之中骨肉皆失所養故身体重着至中府中藏則離外而內邪入深矣中府必歸于心者心為神明之主也風入胃中胃熱必盛蒸其津液結為痰涎胃之大絡入心痰涎壅盛堵其出入之竅故中府則不識人也諸藏受邪併入于心則神明無主故中藏者舌縱難言廉泉開而流涎沫也廉泉穴在舌下竅通于腎津液之所出也

防風一錢 桂枝二分 麻黃 杏仁去皮尖炒研

檀香　辛溫調脾肺病胸膈去邪惡能引胃氣上升進飲食爲理氣要藥（時珍曰檀塗身能除熱惱昏塗內典慾念亦稱熱惱蓋諸香能助潘火惟檀香不然故釋氏焚之道書又以檀爲治香不可以供上眞）

紫檀　咸寒血分之藥和營氣消腫毒傳金瘡止血定痛

降眞香（焚之能降眞之故名）辛溫辟惡氣怪異療傷折金瘡止血定痛消腫生肌（周崇逐賊被傷血出不止敷花蕊石）

苦蘆酒洗白芍酒炒人參　甘草炙　黃芩酒炒　防己八分　附子四分　每服三錢加姜棗煎

筋急語遲脈弦者倍人參加茯仁當歸去芍藥以避中寒煩燥不大便去桂附倍芍藥加竹瀝日止不大便胸中不快加大黃枳殼藏寒不利去防己黃芩倍附子加白朮嘔逆加半夏語言謇澁手足戰掉加石菖蒲竹瀝身痛發搐加羌活口渴加麥冬花粉煩渴加鷺加犀角

羚羊角汗多譫語加麻黃杏仁加白朮舌燥

散不効軍士李高用紫金錠散掩之血止痛定明日結痂無瘢胃救萬人紫金錠即降眞香之最高者也

丁香　辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖陰戶治胃冷聾長嗝噦吃心（丹溪曰人胃爲養上傷則木挾相火直沖清道而上作咳逆古人以爲胃寒用丁香柿蒂不能清痰利氣惟助火而已按嘔逆有痰阻氣滯食塞不得升降者有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者有陽明內挾蟲失下者有痢後太下胃虛而陰火上沖者時珍曰當視虛實陰陽或泄挾或挾氣

去蒂附加石燕　此六經中風之通劑也景鶴亭曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表症者所必用也人參甘草補氣川芎芍藥補血此中風寒氣血虛者所必用也風淫故主以防風濕淫佐以防己寒淫佐以附子熱淫佐以黃芩病來雜擾故藥亦兼該也（按中風有解表攻表行中道三法內外症俱有者失解表而後攻裏醫曰此治冬月直中風寒之的方亦寓黃桂枝之變法六經有餘之表症須從汗解加有便溺阻隔宜

或溫或補或吐或下可也古方單用柿蒂取其苦溫降氣濟生加丁香牛姜取其開鬱散瘀蓋從治之法亦常有收効者矣朱氏但執以寒治熱矯枉之過矣疫癖再發熱症屢用有雌雄二種雌即雞舌香乃大若用雄去丁蓋乳子畏鑿金火

乳香一名薰陸香 薰人心苦溫補

腎辛溫通十二經能去風伸筋筋不伸者敷藥加用活血調氣托裏護心香蔥搶乳能使毒氣外出不致內攻生肌止痛治心腹諸痛口噤耳聾瘧瘡癰腫產難折傷皆取其活血止痛亦治癲狂以能去風散瘀靈苑辰砂散辰砂一兩乳香亞仁各五錢酒下忽飲沉醉聽睡一二日勿動驚醒則不可治本事加人參一兩名寧志膏 出諸藥加乳頭明透者良市人多以楓香性黏難研水飛過用

寒本方倍桂枝為繁杏仁名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡風無浮身熱不惡寒本方加葛根倍桂加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無浮身熱不惡寒本方加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗不惡風本方倍附子加干姜名附子續命湯治太陰中風無浮身涼本方倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱本方加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中風六經混淆

三化湯麻仁丸通利之然邪之所湊其氣必虛世間因傷者多此方終不可幹用也昔按此方為治風套劑今人罕用然古今風方多從此方損益為治喻嘉言曰中風之脈必有所兼兼寒則浮緊兼風則浮緩兼挑則浮數兼痰則浮滑兼氣則浮濇兼火則盛大兼陽虛則脈微兼陰虛則脈數或細如絲虛滑為頭痛緩遲為營衛衰然虛浮遲數正氣不足尚可補救急大數疾邪不受制必死無疑若數大未至急疾尚有不死者○保命集曰厥陰泄痢不止脈沉遲手足厥逆膿血稠粘此為難治宜麻黃湯小續命汤之謂有表邪縮手則當散表邪則藏府自安矣又曰厥陰風泄以風治風小續命消風散主之

易老云經加減法本方倍麻黃名仁防風名麻黃續命湯治太陽中風無浮惡

坐熱水中研之或用燈心同研則易細

沒藥 苦平 經疏云應兼辛 入十二經 散結氣通滯血消腫定痛生肌定痛與乳香同功但乳香入氣分沒藥入血分氣血凝滯則腫痛並作二藥並用氣血兼治凡瘀未爽曰血滯則氣壅氣壅則經絡滿急故腫且痛補心脾虛肝血不足新能生好血治金瘡杖瘡血肉受傷故瘀而發熱作痛癰疽瘡瘍潰爛暈白赤血熱肝經

產後血氣痛破癥墮胎月活血沒藥散血皆能消腫止痛生肌故產後用之已潰者忌

繫之于少陽險陰或肢節掣急或麻木不仁 玉机微義曰此方無分經絡不辨寒熱虛實禹多亦冥以為易老治分六經痛法平活法 本方去防風防已附子白芍加當歸石膏即古今錄驗續命湯治中風痱肥身不自收口不能言脉不知痛處拘急不能轉側錄驗方去人參加于姜黃芩荊瀝即千金天續命湯通治五臟偏枯賊風

侯氏黑散 金匱治中風四肢煩重心中惡寒不足者 四肢煩重風中經絡熱而不渴溫也心中惡寒陽虛也名臺

肥膩多者勿敷 出南番色赤類琥珀者良治同乳香

楓脂香 即白膠香 苦平活血解毒止痛生肌治吐衄咯血齒痛風瘡瘡瘍金瘡外科要藥 色白微黃能劫乳香功頗相近

冰片 一名龍腦香 辛溫香竄善走能散先入肺傳于心脾而透骨通諸竅散鬱火治驚癇痰迷東垣曰風病在骨髓者宜之若在血脉肌肉反能引風入

用治風癲

菊花 四十分 防風 白朮 十分 桔梗 八分 人參 茯苓 當歸 川芎 于姜 桂枝 細辛 牡蠣 礬石 二分 右末用溫酒調方寸七服二十日日三再冷食服四十日共六十日止則藥積腹中不下熱食即下矣 此手太陰少陰足厥陰藥也菊花秋生得金水之精能制火而平木木平則風息火降則熱除故以為君防風細辛以祛風當歸川芎以養血

骨如油 **貝赤膚鬆** 乳調目点人痘 數次王節齋曰氷片大辛熱用之点眼取其蒸出火邪蓋火鬱發之從治法也世人誤以爲寒而常用之遂致積熱善目故云眼不点不瞎者此也 **耳聾鼻瘜** 肉点之自人皆通 **喉痺舌出** 火骨痛骸之功 **齒痛** 治心血作引酒 **骨痛咯** 豬或紫草湯服引 **人心經** 能發之 **產難三重五痔** 王綸曰世人誤以爲寒不知辛散性甚似乎涼耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒乎昂幼時會問家叔建侯公云姜性何如叔曰体熱而用涼茶味辛者多熱然風熱必藉辛以散之風熱散則涼矣此即本草所云氷片性寒之義向未有發明之者附記于此 **出南番云是老杉脂以白如氷作梅花片者良** 以杉木炭養之則不枯今人多以樟腦升打乱之 **樟腦** 辛熱香竄能十水中發火置水中燃益熾 **通關利滯除濕殺虫置鞋中去腳氣** 集要云柳鳥頭為末醋丸彈子大置足心微火炕之汗出乃効 **蠶砂** 辛甘温 **治蛀虫** 以樟木切片浸水煎成升打得法能亂水片

本草蒲黃木樟腦廉薑血竭 卷三 二

人參白术以補氣黃芩以清肺熱桔梗以利膈氣茯苓通心氣而行脾濕姜桂助陽分而達四肢牡蛎白礬酸斂濇收又能化頑痰加酒服者以行藥勢也 喻嘉言曰治風而驅風補虛誰不能之至驅而行堵截之法則非思議可到補之中而行堵截之法則非思議可到補礬石以固濇諸藥使積而不散以其空竅則舊風盡去新風不受矣其性得冷則止得熱則行故又嘱以宜冷食也中風人藏最防風邪乘虛進入心中故以菊花爲君伸景製方匠心獨剏乃中風症首引此散豈非心服其長乎後世惑用腦麝引風入心莫有知其非者故舉金匱黑散風引二湯以明其 **治** 附金匱風引湯大黃子姜龍骨各四

桂枝 三兩 甘草 牡蛎各二兩 **滑石末** 各六兩 **杵**

寒水石赤石脂白石脂等石英 各六兩 **杵篩取三脂撮煮三沸溫服治大人風引**

瘫瘓小兒驚癎癇癡痙日數十發棄民用治腳氣 按黑散風引二湯喻氏以為仲景聖方而程雲來金匱直解又云侯氏黑散風引湯防已地黃湯頭風摩膏藥是宋人軟正附入唐人之方遂尽刪之又云仲景石湯所主皆非中風歷節之症耶愚謂仲景多方豈無祖述而必剏自一人之手乎方若果佳邑出自唐宋其可刪耶但瘫瘓必氣血不足之人風引陽用大黃為君又石藥居其大半獨不知其果常以此治風而獲是脫乎抑亦

蘇合香　甘温走竄通竅闢穢辟一切不正之氣殺精鬼出諸番合衆香之汁煎成以飴搦起瓶絡不斷者眞

血竭　甘鹹色赤入血分補心包肝血不足專除血痛散瘀生新爲和血之聖藥治因傷血聚金瘡折跌瘡口不合止痛生肌性急不可多使引膿

血竭甲入血分乳香收藥兼入氣分皆木脂也　出

南番色赤以綿透指甲者爲眞假者是海母血味大鹹有腥氣　單服用同衆藥搗則作麤飛

阿魏　辛平一云温　入脾胃消肉積殺細虫去臭氣諺云苗芩無假阿魏無眞邪純云阿魏無眞邪有眞臭而止臭是爲眞　解薰菜自死牛馬肉毒治心腹冷痛癥瘕癥河多由情滯而起傳尸疰勞疰蠱　出西番木脂熬成極臭試取少許安銅器一宿

門勿之揣摩云頭也若黑散之吾菊花加氣血解表除痰之藥視此不同矣○昂按中風為危篤之症古方佳者頗少茲錄續命黑散風引諸劑要存其源

大秦艽湯　杭要治中風手足不能運掉舌强不能言語風邪散見不拘一經者　經曰掌受血而能握足受血而能步又脾主四肢脾虛血弱不能榮筋故手足不掉也舌為心苗腎脉連舌本心火盛而腎水衰故舌本木强也六經形症謂口開手撒眼合鼻鼾吐沫風瘤遺尿直視頭搖諸陽為中經絡中之稍輕者也此則外無六經形症內無便溏阻

秦艽　石斛兩　當歸洗酒　白朮土炒　茯苓　甘草炙　防風　羌活　獨活　白芷　生地酒洗　黃芩酒炒　細辛五錢　每服二兩兩煎加生姜棗加知母心下痞加枳殼　此六經中風輕者之通劑也以秦艽爲君者祛一身之風也以石斛爲臣者散胸中之火也羌活散太陽之風防風白芷散陽明之風細辛獨活散少陰之風當歸川芎散厥陰之風防風爲風藥之徒遍所引而無所不至者也大抵內傷必因外感而

沾處白如銀汞者真人多以胡荽白
磨之用鉢研細乾酒器上熗過
入藥

蘆薈　大苦大寒功尚清熱殺
虫涼肝明目鎮心除煩治小
兒驚癎五疳傳蠱齒濕癬甘草
未和　傳吹鼻殺腦消鼻痒小兒
脾胃虛寒作瀉者勿服　出
波斯國木脂也如黑鬱味苦
色綠者真

發諸藥雖云搜風亦兼發表風藥多燥
表藥多散故疏風必先養血而解表亦
必固裏當歸養血熟地滋陰川芎活血
白芍斂養和血血活則風散而舌本柔
矣又氣能生血故用白朮茯苓甘草補
氣以壯中樞脾運濕除則手足健矣脾主
四肢濕則筋痿又風能生熱故用黃芩清上石
羔泄中生地涼下以共平逆上之火也
劉宗厚曰秦艽湯愈風湯雖皆有補血
之藥而行經散風之劑居其大半將何
以養血而益筋骨也天麻丸養血壯筋
骨應手近理喻嘉言曰此方既云養血

胡桐淚　苦能殺虫鹹能入骨
軟堅大寒能除熱治咽喉熱
痛磨搽取涎齒蠹風痘瘡瘙結核
蘇頌曰古方稀用今口齒家多用為要藥　出涼
肅乃胡桐脂入土得斥鹵之
氣結成如小石片本淚狀如
膏油

蕪荑　辛散滿苦殺虫溫燥濕
化食諸虫皆因濕而生去五
臟久痛服節風濕心腹積冷
三生飲　治中風卒然昏憒不省人事痰
而筋自柔何得多用風燥藥既云靜以
養血何復用風藥以動之是言與方將
矣偶論三化湯愈風湯及大秦艽湯皆
似是而非者最宜此方用之頗衆獲効
亦多未可與愈風三化同日語也此蓋
初中之時外挾表邪故用風藥以解表
而用血藥氣藥以調裏并治于燥散者
也治風有解表攻裏行中道三法內刻
症俱有者先解表而後攻裏是也若愈
風解表而風葉太多三化攻裏而全用
承氣則非中症所宜矣

附子老天麻丸天麻社風
牛膝強筋壯水制火杜
仲七兩使筋骨相著　當歸十兩活血益羌
活十兩去獨骨節風　附子炮一兩有獨行經　蜜丸酒五兩
生飲　治中風卒然昏憒不省人事痰

癩痢癰疽直指方云嗜酒人癩痢癰疽血鬱于酒為酒鬱多氣人血鬱于氣為氣鬱蘊勞人吸血雜瘀為血鬱如臣之行上役人咽下飽人肛或脇皆或隱胸腹惟用蕪荑炒兼疾胃理氣益血之藥乃可殺之疥癩癘癬小兒驚疳冷痢得詞子豈歲良胃中有虫食飽作痛和麪炒黃為末米飲下

沒石子 苦溫入腎澁精固氣形類榆莢陳久氣力者良

收陰浮烏髭髮 出大食諸蕃顆小紋細堅者佳炒研用虫

延蔓盛語言蹇澁等症李東垣曰中風非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或憂喜忿怒傷其氣者多有此症壯歲之時無有也若肥盛者則間有之亦是形盛氣衰而如此耳昌按此即東垣主乎氣之說

生南星一兩生川烏去皮生附子去皮五錢木香二錢 每服一兩加入參一兩煎此足太陰陽明厥陰手少陽藥也南星辛烈散風除痰附子重峻溫脾逐寒烏頭輕疎溫脾逐風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力峻而行速也重加人參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也

衛矛 一名鬼箭 簡切

苦寒 時珍曰酸澁破陳血通經落胎殺虫祛祟 榦有三羽葉似野茶酥炙用

漆 辛溫有毒功前行血殺虫削年深堅結之積滯 丹溪曰漆性急而飛備用之中節積滯去皮後補性內行人不知也石日久凝結之瘀血能化瘀血為水續地黃飲子 河間治中風舌瘖不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰風痱音肥急筋骨絕傷損瘀血停滯治傷尸勞瘵寢疴蚘虫 炒令烟盡

當溫之風症如癱瘓是也加河間曰中風雍瘓非為肝木之風實甚亦

入藥或燒存性用牛夏為使
畏川椒紫蘇雞子鱉 濟得蟹而成水
巴豆 辛熱有大毒生猛而熟
少緩可升可降能止能行開
窒滯去藏府沉寒痼斷開
奪門之將破瘀癖血瘕氣痞
食積生冷硬物所傷大腹水
腫寫痢驚癎口喎耳聾牙痛
喉痺 經脈急痺緩治則死用
解毒丸雄黃一兩鬱金
一錢巴豆十四粒去皮油煮
九每服五分津嚥下雄黃破

結氣鬱金散惡血巴豆下痼
涎然係膚創不可輕用或用
紙燃醋巴豆油燃火刺喉或
搗巴豆綿裹隨左右納鼻中
吐出惡涎紫血即寬
鼻蟲少生瘡無碍 其毒性
又能解毒殺蟲療瘡蛇蝎
諸毒峻用大可劫病緩用亦
可和中通經補台巴豆票火
炒一泡兒腸胃即不可輕用
王好古曰去心皮膜細生用
為急治水谷道路之劑炒去
恐今紫黑用為緩治消堅磨
積之劑可以通腸可以止泄
世所不知也時珍曰一婦年
六十餘患世五載犯生冷油

之陰巴豉薤蓉官桂附子以返眞元之
炎石斛安肺而秘氣山茱溫肝而固精
蒲蓯蓉補心而通腎藏麥五
味保肺以滋水源使水火相交精氣漸
旺而風火自息矣 陳實曰兒初氏之論
則以風為未而以火為本殊不知火之有餘水之不足也劉
矣故治中風又當以眞陰虛為本但陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛
火虛者專以河間地黃飲子為主水虛辛
者當以六味地黃丸為主果是水虛辛
熱之藥與參芪之品俱不可加或曰風
所勝治以辛涼何故反用附桂附使火
盛制金不能平木而風木益甚耶曰此
是腎虛眞陰失守孤陽飛越若非桂附

大[illegible]

非外中于風良由將息失宜心火暴甚
腎水虛衰不能制之則陰虛陽亢而熱
氣沸人心神昏胃筋骨不用而卒倒無
知也亦有因毒怒思慮恐五志過極而
卒中者皆為熱甚俗云風者言未而忘
其本也治宜和藏府通經絡便是治風
昉板此即河間土乎火之說益西北風
氣剛勁虛人感之名眞中風可用風藥
下藥南方卑濕賢弱氣虛虽有中症
而實不同名類中風宜兼補養為治
熟地黃 巴戟去心山茱萸 肉蓯蓉酒浸
附子炮 官桂 石斛 茯苓 石菖蒲
遠志 麥冬 五味子 等分每服
五錢入薄荷少許煎服 此手足
少陰太陰足厥陰藥也熟地以滋根本

木萬備要木芭豆 卷三

腫肉良即作痛服升澁藥泄反甚脈沉而滑此乃脾胃久傷積冷宜溫法當以熱下之用蝎梢巴豆九五十粒服二日不利而愈自是每用一名順風勻氣散治中風半身不遂口眼喎斜治泄痢愈者近百人

附子雷敎曰緊小色黃者為剛子雷敎曰緊小色黃者為剛子巴三稜色黑者為豆小而兩頭尖者為剛子剛子殺人時珍曰此說殊無益緊小者為雌有稜及兩頭尖者是雄雌者更峻宜用之得宜皆有功力不去膜則傷胃不去心則作嘔或用殼用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴豆霜

花椒使畏大黃黃連涼水中共

毒者以此解之或以黑豆綠豆汁亦佳得火良油作紙燃燃火吹息或薑或蔥刺咳能出惡涎惡血治中風中惡痰厥氣厥咳痙不通一切急病大黃巴豆同為峻下之劑但大黃性寒府病多熱者宜之巴豆性熱藏府病多寒者宜之故仲景治傷寒痼冀多熱者多用大黃東垣治五積屬藏者多用巴豆與大黃同服反不泄人

大風子 辛熱有毒取油治癘癬疥癩有殺虫劫毒之功田洙

身不遂若強不正渾似中風當泄溫毒不可作風病治之而汗也衛義多簡言與此同

白朮二錢烏藥一錢半人參 天麻五分 炙甘草三分 加麥煎 此足厥陰陽明藥也邪之所湊其氣必虛偏枯喎僻或左或右蓋脈不周而氣不勻也天麻蘇芎以疏風氣烏藥青陳以行滯氣參朮炙草以補正氣疏之行之補之而氣勻氣勻則風滅矣用木瓜者能孚土由脾木調營衛而伸筋也

大風子 辛熱有毒取油治癘癬疥癩有殺虫劫毒之功田洙

曰祖工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病出南將愈而先失明者

茶子中有白色仁則油黃

荊瀝 甘平除風熱化痰凝開經絡行血氣宿中風失音驚癎癇痰迷暈風化痰妙藥氣虛食少者宜之 延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荊瀝母溪云虛痰用竹瀝宜痰用荊瀝並宜姜汁助送則不凝滯

稀薟草 以五月五日七月七日九月九日採者佳不拘多少陳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸

風痺久風痺走痛或十指麻木肝腎風氣濕熱流注骨痛風而兼溫也風痺腫痛稀薟辛苦氣寒其味

當順氣及其久也即當活血若不順氣遽用烏附若不活血遽用菟防天麻辈未見其能治也然順氣則可破氣甚則不可

張洁古風喝僻語言蹇濇肢緩骨痛

喝那語溢風中于經也故緩緩

牡荊葛黃荊截取尖餘藥搗上中間久炙兩頭承取汁用

竹瀝 甘寒而滑滑風降火潤燥行痰養血無陰竹之有癌猶人之有血也故能利竅開目治中風口禁痰迷大熱風癎癲狂煩悶產乳方妊娠若用名子炮竹瀝不限多少細服梅師加荻筍治渴血虛自汗發寒官滑腸胃寒濕者勿服中風要藥凡中風未有不因陰虛火旺痰熱壅結所至如果外來

蔗漿必蒸晒九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁尚在則不能透骨驅風而却病也

此足少陰厥陰

以酒蒸蜜丸氣味清和故能補肝潤腎

藥也稀薟能驅風散濕行大腸之氣

無氣骨筋溫去則筋弱

然風藥終燥若風痺由于脾腎而虛陰血不足不由風濕而得者亦忌服之 唐成訥行進稀薟表宋張詠進稀薟表云其草金穀銀線素華紫茗節葉相對頗類蒼耳臣嘗百服眼目清明卻至于服髭髮烏黑筋力輕健効驗多端昌按此藥不但搜風尤能勝濕濕去則脾胃健而筋骨強凡中風之人宜

風邪宜得汗復用此寒滑之藥治之哉丹溪曰痰在經絡四肢皮裏膜外者非此不能達行又曰味甘性緩能除隔虛之有大熱者宜而能補胎後不可虛肝前不損子世人用本草大寒二字棄而不用然人食魚至老未有因寒而病者瀝即痰之液也又假火而成何寒如此之甚也治法云竹瀝和米煮粥能治反胃竹類甚多淡竹

竹瀝 甘而微寒開胃上之鬱清肺金之燥涼血除熱治上焦煩熱之溫肌湯用之溫氣寒熱噎膈嘔噦胃吐血衄血清肺涼胃而血市散不止酷浸含之月痙驚癎肝火

竹茹 甘而微寒開胃上之鬱清肺金之燥涼血除熱治上焦煩熱之溫肌湯用之溫氣寒熱噎膈嘔噦胃吐血衄血清肺涼胃而血市散不止酷浸含之月痙驚癎肝火

刮取青皮竹瀝如取荊瀝法

姜汁 為使姜能除痰辛能發汗多治痰嗆本草未載昂按算蔽多食則腸鬲之名性同肉桂食皆能燥血故算有刮

竹茹 甘而微寒開胃上之鬱清肺金之燥涼血除熱治上焦煩熱之溫肌湯用之溫氣寒熱噎膈嘔噦胃吐血衄血

引之能入經而正口眼又曰白附辛可驅風內附去頭面之遊風蚕蝎咸鹵能軟痰癎化輕浮能上走頭面驅風散痰全蝎而走厥陰為治風要藥辛中有熱藥

月痙驚癎 幸者可使從風蚕蝎有毒可使破結藥必兼有用之以治月痙以蚕毒者大易所謂同氣相求內經所謂衰之以其屬也

附 咳咨膏藥膝子一兩冰片二分共搗為膏寒月加干姜附子各一錢左喝貼右右喝貼左即正或用鱔魚血或用蛇蛔搗傳亦良益三物皆追風拔毒之品也

沙竹葉 辛淡甘寒涼心緩脾
消痰止渴除上焦風邪煩熱
葉生竹上故治上焦仲景治
傷寒發熱大渴有竹葉石膏
湯乃假其辛寒以該散陽明之邪熱也喘逆帝促
嘔噦吐血中風失音小兒驚
癇 竹生一年以上者（嫩而有力）
天竹黃 甘而微寒涼心經去
風熱利驚瘈癎肝明目功
同竹瀝而性和緩無寒滑之
患凡中風不語小兒驚

如聖飲餘竝治剛柔二痙面赤項強頭搖口
噤角弓反張與痙癎音義同法（痙者大
緊者大緩也）
葉生竹上故治上焦仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯乃假其辛寒以該散陽明之邪熱也喘逆帝促嘔噦吐血中風失音小兒驚癇竹生一年以上者（嫩而有力）天竹黃甘而微寒涼心經去風熱利驚瘈癎肝明目功同竹瀝而性和緩無寒滑之患凡中風不語小兒驚

竹瀝滑冷出南海大竹之津氣續成（明竹內黃粉片如竹節者真）
竹瀝 苦寒有小毒入胃大腸經功能消積破血（楊仙得異疾每發語腹中有小虫魔之久漸聲大有道士曰此魔聲中也仙讀本草取不應者治之讀至雷化不應服之而愈）竹之餘氣得霹靂而生故名大小如粟竹刀刮去膚皮甘草水浸一宿酒拌蒸或炮用厚朴元花為使惡葛根

獨活湯治風虛癎瘈昏憒不覺或為冀

雞距棘葉 一名西河柳能使痧痘疹不出喘嗽悶亂沙糖調服治疹後痢

菓部

大棗 甘温脾經血分藥補中益氣潤脾土潤心肺調營衛緩陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥養胃及脾胃升騰之氣資食消穀（脾屬胃上栝木口滿意忘之甘令人滿大棗中滿心下痞者咸鹽炒與

風乘之入于血脈則瘧痙若在皮膚則為痺熱若移邪于肝肥則昏憒不覺也肝生心也木能生火

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白薇 當歸 川芎 生夏 人參 茯神 遠志 菖蒲五錢甘草炙二錢半 每服二兩加姜棗煎 此手少陰足厥陰藥也肝屬風木而主筋故癎瘛為肝邪肝欲散急辛以散之二活防風祛風細辛桂心温經辛夏除痰芎歸辛散風而温和血血活則風散辛以散之卽以

甘草同例成無已曰仲景治奔豚用大棗者滋脾土以平腎氣也治水飲脇痛有十棗湯益脾土以勝妄水也

北產肥潤者良 鼎按今金華南棗更勝于北滋寧所產亦有佳者 鴛附毒最遠

魚同食

桃仁 苦重于甘（思邈辛孟詵温）厥陰血分藥心包肝 苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血 成無已曰肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之 通大腸血秘治熱入血室衝脉血燥

以補之也（木喜條達故心為肝子母以故為補） 心為肝子母 熱乎心則昏憒故以人參補心氣當歸開心竅芎藭達鬱安心神白薇鹹寒退熱而治厥使風靜火息血活神寧而瘛瘲自已矣

活絡丹 治中風手足不仁日久不愈經絡中有瀝痰死血腿臂間忽有一點痠痛 川烏炮去皮 草烏炮去皮 胆南星六兩 地龍卽蚯蚓乾者 乳香去油 沒藥另研三錢 酒九酒下 此足大陰厥陰藥也吳鶴皐曰

血痞損傷積血血痢經閉欵
逆上氣血和則氣降皮膚血熱燥
痒蓋發熱狂仲景治膀胱蓄血有桃仁承氣湯卽調胃承氣湯加桃仁桂枝又抵當湯加桃仁大黃虻虫水蛭卽馬蟥蚊蝱食血之虫能通肝經聚血性最難死虽炙為末得水卽佔蛰入腹中生子為患田泥和水飲下之虫虫卽蚊虫因其食血故用以治血血不消風散治風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻齆重及皮膚瘙瘙瘡痒婦人血風血風者婦人衝任二經為風襲傷致生血病也
足者禁用如行血連皮尖生用潤燥去皮尖炒用俱研碎或燒存性用雙仁者有毒不

胆星辛烈所以燥濕痰二烏辛熱所以散寒濕虫蚘濕土所生欲其引烏星直達濕痰所結之處亦易所謂同氣相求也蚯蚓鹹寒清熱利水風寒注于肢節久則血脉凝滯不行故用乳香沒藥以消瘀血乳香活血能去風伸筋沒藥能散瘀血生新血二藥並能消腫止痛故每相須而行
風能活血香能溫血而利泄肺解肌能發汗除風散寒降氣行痰
杏仁辛苦甘溫而利泄肺降
風羌活藁香 殭蚕洗曬炒 蝉蛻 川芎 茯苓 人參二兩 為末每服三錢
茶湯下瘡癬酒下 此足太陽手太陰藥也羌防荆芎之辛浮以治頭目項背之風殭蚕蝉蛻之清揚以去皮膚之風藁香厚朴以去惡散滿參苓甘橘以輔正調中使風邪無留蓬也
清空膏東垣治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上蓬頭目及腦苦痛不止偏頭痛者少陽相火也丹溪曰有痰者多左屬風屬火多血虛右屬痰屬熱多氣虛準繩曰医書多

潤燥消積索麪豆粉近之則爛通大腸氣秘治時行頭痛上焦風燥欬逆上氣杏仁炒砂蜜煎熬和為膏含嚥火熬喘促有小毒能殺蟲治燥制狗毒可毒狗消積肉積錫毒肺虛而欬者禁用東垣曰杏仁下喘血但治大便秘當分氣血書便難屬陽氣夜便難屬陰血虛人便秘不可過泄脈浮屬氣用杏仁陳皮脈沉屬血用桃仁陳皮肺與大腸相表裏竇門上主往來絕門下主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之杏仁紫菀並能解肺

醫學集成

分頭角丿卷四

分頭角頭風為二門然一病也淺而近者名頭痛深而遠者為頭風當驗其來所從而治之

一兩紫胡七錢川芎五錢甘草炙兩牛為末每服三錢茶調如當白湯送下如少陰頭痛腦細辛太陰頭痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛服之

欬者禁用東垣曰杏仁下喘血但治大便秘當分氣血書便難屬陽氣夜便難屬陰血虛人便秘不可過泄脈浮屬氣用杏仁陳皮脈沉屬血用桃仁陳皮肺與大腸相表裏竇門上主往來絕門下主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之杏仁紫菀並能解肺

減羌活防風川芎一半加柴胡二錢少陽頭痛足衰而氣逆也大陰頭痛必有痰也少陰頭痛足衰而氣逆也大陰頭痛必有痰也少陰二經虛不上頭然衰脚氣墜于

薤利小便去皮尖炒研發散連皮尖研雙仁者殺人得火良

蕎麥萵苣葛根

烏梅酸澁而溫肺肺血分之藥欬肺肺欲收急食澁以收之澁腸痛瘀消腫清熱解毒生津止渴醒酒殺蟲治久瀉痢梁莊肅公蕭酷嗜酒血痢陳應之用烏梅胡黃連灶下土等分為末茶調服而愈曾曾公血痢百餘日國醫不能療應之用鹽梅肉研爛合蠟茶入醋少許服一啜而安瘡瘡諸症初起皆忌用

腸中頭上氣不得暢而為痛也此足太陽少陽藥也

頭痛為太陽之會其象為天乃清空之位也風寒濕熱之邪干之則濁陰上蒸而作實痛升祛風勝濕之藁川芎入厥陰為通陰陽血氣之使甘草入太陰散寒而緩痛辛甘發散為陽也苦連苦寒以羌防之屬升之則能去濕熱于高巔之上矣炒連用酒炒非獨制其寒欲其上升也毋溪曰東垣清空膏諸般頭痛皆治但血虛頭痛從魚尾相連痛者不治魚眼眼角也又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰

霍亂吐逆胃勞熱骨蒸 皆取其酸收 安蚘厥蚘虫上攻而眩仲景有蚘厥烏梅丸 去蟲癥蝕惡肉瘡後生惡肉燒研末傅之 多食損齒傷筋經曰酸走筋筋病毋多食酸 白梅功用畧同烏梅治痰厥僵仆牙關緊閉取肉揩擦牙齦涎出即開 益酸先入脩齒軟則易開若用鉄器撬開恐傷其齒 驚癎昏痙傅乳癰腫毒刺入肉中嚼爛之 烏梅 酸平 斂肺澁腸生津止渴蚘得酸則伏 治久瀉久痢脫肛便血崩帶 下血陽明胃脉入牙縫故牙縁脾主四肢故愈瘧胃主肌肉故肉瞤陽明之脉

者勿用蓋謂巔頂痛也〇頭痛用羌活防風柴胡川芎升麻細辛藁木之異者分各經也用黄芩黄連黄柏知母白羔生地之異者分各藏泄火也用茯苓澤泄者養血也王海藏曰熱在至高之分當以輕劑掷之從後治也若急服之上熱未除中寒生矣

胃風湯 治風冷乘虛客于腸胃飡泄注下完穀不化及腸風下血又治風虛能食牙閉緊閉手足瘛瘲目瞤面腫名曰胃風 胃受風氣木邪剋土故完穀不化謂之飡泄胃有風濕流入大腸故下血陽明胃脉入牙縫故牙緊脾主四肢故瘛瘲胃主肌肉故肉瞤陽明之脉

爲鬻稻灰汁淋蒸則不虧 孟詵云烏梅十顆湯煮去核納肛中通大便 薑漬爲白梅珍曰梅花千冬而實于夏得木之全氣故最酸胆為甲木肝為乙木八舌下有四竅而通胆液故食酸則津生〇食梅齒齲者嚼胡桃即解衣生薤點者梅葉煎湯洗之搗洗葛衣亦佳

栗 咸鹵温厚腸胃補腎氣寇宗奭曰小兒不可多食生則難化熟則滯氣能解羊瘧

陳皮 辛能散苦能燥能瀉温能補能和同補藥則補泄藥

人參 白朮土炒茯苓 當歸酒洗川芎 炒肉桂 等分加粟米百餘粒煎

此即黄芪地黄甘草 此足陽明厥陰藥也

胃風湯 治胃虛而風邪乘之也風屬肝木能剋脾土故用參朮茯苓以補脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調營白芍能和脾肉桂散風而能平木得水而能瀉肝而能和脾肉桂散風而能平木得桂則治削桂釘木根其木即死又辛能散風 故能住泄瀉而療風濕也又曰白朮茯苓能壯脾而除濕川芎肉桂能入血而驅風王執微義曰此方名

則泄，升藥則升，降藥則降，爲脾肺氣分之藥。脾爲氣母，肺爲氣籥，凡補藥澁藥必佐陳皮以利氣。調中快膈，導滯消痰，大法治痰以健脾順氣爲主。潔古曰：陳皮枳殼利其氣而痰自下。利水破癥，宣通五藏，統治百病，皆取其理氣燥濕之功。人身以氣爲主，氣順濕除，則百病散。金匱云：能解魚毒、食毒。多服久服，損人元氣。入補養藥則留白，入下氣消痰藥則去白。聖濟云：不去白反生痰。

治風而實非治風，乃補血和血益胃之藥，血和而挾濕若寔可倚伏

東垣胃風湯　升麻　白芷一錢三分　麻黃不去節　葛根各一錢　柴胡　羌活　藁本　蒼朮　蔓荊　草蔻　黃柏　當歸　炙草各五分　加薑棗煎，亦治胃風症。喻嘉言曰：風入胃中，何以反能食？益風能生熱，即內經癉成爲消中之理也。是方但去其風，不去其熱，以熱必隨風而解耳。又曰：必加竹瀝、花粉、石膏、萎蕤、生地、梨汁甘寒之藥，入升麻、葛根、甘草爲前始爲克當。或問：二藥補散不同，而所治共一症何歟？喻嘉言曰：按風成爲寒熱，乃風入胃中，而釀營衛之偏勝。此方乃驅胃風使從外解之藥；若夫久風爲食泄，則風已入裏，又當用人參爲君，桂枝、白朮爲臣，茯苓、甘草爲佐使，而驅風于內。此表裏之權衡，內經之要旨。

去白名橘紅，兼能除寒發表。皮能發散皮膚。核治疝痛，葉散乳癰。皆能入厥陰，行肝氣，消腫散毒。腰腎冷痛，橘核炒，酒服良。十劑曰：宣可去壅，生薑、橘皮之屬是也。泊宅篇曰：莫強中食已輒胸滿不下，百治不效。偶家人合橘皮湯，嘗之似有味，連日飲之。一日坐所，事覺胸中有物墜下，目瞪汗濡，大驚坎滿復疼痛，下數塊如鐵彈，臭不可聞，自此胸次廓然。蓋脾之冷積也。半年服藥不知，功乃在橘皮。方用橘皮一斤，甘草、鹽各四兩，煮乾點服，名二賢散。蒸餅丸，名潤下丸，治痰時有驗。世醫惟知半夏、南星、枳殼、茯苓之屬，何足語此。

也

上中下通用痛風方　丹溪　痛風有寒、有濕、有痰、有血之不同，此爲通治。按：此即內經所謂行痺、痛痺也。經曰：風寒濕三者雜合而爲痺也。蓋風痺痿厥病多雜合，故世俗每言風痺。有病風而不痛者，則爲不仁。此氣血兩虛，其症爲加重矣。

黃柏酒炒　蒼朮泔浸　南星薑制，二兩　神麴炒　川芎一兩　桃仁去皮尖，搗　龍膽草下行　防己下行　白芷一兩　羌活上行　威靈仙酒洗，下行　桂枝三錢，橫行　紅花二錢　麵糊丸。此治痛風之通劑也。黃柏清熱，蒼朮燥濕，此二妙散也，治痿正藥。龍膽瀉火，防

此哉丹溪曰治痰利藥湯多則脾虛痰易生而及多又日胃氣亦賴痰以養不可攻尽攻尽則虛而愈劇 廣中陳久者良故名陳皮陳則消無燥散之患半夏亦然故同名二陳湯治痰童便浸晒治痰積姜汁炒治下焦鹽水炒移去皮炒用 青皮 辛苦而溫色青氣烈大肝胆氣分疏肝瀉肺柴胡疏肝氣青皮平下焦肝氣比泄氣藥皆云泄肺石滯消堅除痰消瘀治肝氣鬱積脇痛黃栢桂枝能橫行手臂須南星蒼术諸藥至痛處

痛多怒久瘧結癖辛入肝散邪瘧家必用之品攻清痊飲以之為君 治痛乳腫史國公藥酒方 治中風語言蹇澁手足拘攣半身不遂瘡痛不仁語言蹇澁風中舌木也半身不遂邪并干虛也手足拘攣風燥其筋而血不潤也疼痛不仁風而兼濕頑麻疾蹙也 羌活 防風 白朮炒 當歸酒炒 川牛膝酒浸 川萆薢 杜仲姜汁炒 松節炒二兩 虎脛骨酥炙 鱉甲酥炙 晚蠶砂炒二兩 秦艽炒槌碎 蒼耳子炒 枸杞五兩 杞根八兩 茄根蒸熟 為粗末絹袋盛浸無灰酒三十斤煮熟退火毒服每日數次常令醺醺酒不斷

虛人禁用陳皮升俘入脾肺至高青皮沉降入肝胆至低炒之以酷所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也橘之青而未黃者醋炒用古方無用者宋以後始與陳皮分用

柿乾 甘平性澁生柿甲胄性寒肺血分之菓健脾澁腸潤肺寧嗽而滑宿血治肺痿吐咳咯血腎有人三世病反胃得一方柿乾飯乾飯日日食不飯水遂愈腸風痔漏肺與大腸相表裏藏病則府熱亦除滑宅編柿乾燒灰飲服二錢治下血柿霜乃其精液生津化痰清上焦心肺之熱為先佳治咽喉口舌瘡痛急蟹柿蒂止呃逆古方單用取其苦温降氣生加丁香生姜取其開入散痰亦從治之法産宝云産後呃逆煩乱柿餅一箇煮汁熟飲

木瓜 酸澁而温入脾肺血分斂肺和胃理脾伐肝化食酸能斂斂則化酸能生津氣脫能收氣滯能和調菅衛利筋骨與山查同止渴生津

蠲痺湯 散氏治中風身体頓痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難肩臂風也腰膝沉重温也菅衛虛而風温干之故或拘急或頑麻或重痛而舉動艱難也經曰三曰四曰風痺諸痺類風收也

羗活 防風 蔓荊子 差黃 酒炒 甘草 炙 加姜煎

此足太陽厥陰藥也辛能散寒風能勝濕防風羗活除濕而疏風氣通則血活則風散黃芪補氣而菅衛黃芪

片子姜黃 酒炒 甘草 炙 加姜煎

此足太陽厥陰藥也辛能散寒風能勝濕防風羗活除濕而疏風氣通則血活則風散黃芪補氣而菅衛黃芪

去濕熱消水腫治霍亂轉筋

夏月暑溫邪傷脾胃陽不升陰不降則揮霍撩亂上吐下泄甚則肝木乘脾而筋為之轉也食療云煮汁飲良時珍曰肝虫主筋而轉筋即因風寒溫熱暑傷脾胃所致轉筋必起于足腓腨及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋取其理脾以伐肝也土病則金衰而木盛故用酸温以收脾肺之耗故而藉其走筋以平肝邪乃土中池水以助金也陶弘景曰凡轉筋呼木瓜名寫木瓜字皆愈濕痺脾氣脾主四肢或寒濕傷于足絡或胃受濕熱之物上輸于脾下流至足則成脚氣惡寒發軟緩傷寒黃腫腫聲痛為異宜利濕清熱忌用補劑及淋洩者有患足痺者過冉見舟中一婦以足倚之及至登岸足已善步矣詢婦中何物乃木瓜也

黃理血中之氣能入手足而祛寒濕也

準繩曰凡風痺偏枯未有不因其氣不周而病者也治之不用黃芪為君人參為臣防風桂枝鈎籐荊瘧竹瀝薑汁非汁為汁之屬為佐而徒雜香辛烏附羌獨以涸營而耗衛如此死者寔医殺之也

三痺湯 治氣血凝滯手足拘攣風寒濕痺

三痺經曰風寒濕三者雜合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脈痺以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺痺在于骨則重在于脈則血凝而不流在于筋則屈不伸在于皮則寒痛者寒氣多也其不痛不仁者陽氣少也寒氣多也其熱者陽氣多也故為痺熱其多汗而濡者濕陰氣少也故為痺寒其人陰氣盛而陽氣虛陰氣盛故汗出而濡也

腰是無力多蒼損齒

骨病峰閉酸收大甚鄭奠一曰木瓜乃酸收之品世用治水腫腹脹誤矣有大棗丹通金陵愛其芬馥購數百粒置之舟中舉舟人皆病瀉不得出医用通利藥用効鄉予視之聞四面皆木瓜香矣謂諸人曰敢去此物瀉即出矣不必用藥也于是尽投江中項之瀉皆如舊

陳者貢香需飲中用之和胃去濕補脏生金忌鉄

山查 古字楂酸甘鹹溫健脾行氣

人參 川芎 當歸 川牛膝 川續斷 桂心 細辛 秦艽 羌活 防風 等分加羚羊角 薄荷葉 蔓荊子 白芷 川獨活 防風 等分加羌活 前胡 柴胡 此足三陰藥也喻嘉言曰此方用參蔑四物一派補藥內加防風秦艽以勝風桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡濕痺諸方大約因風勝濕泄執之藥多而養血補氣固本之藥少惟此方尚以

散瘀住痰消食磨積消油膩腥膻之積與麥芽消谷積者不同凡老雞酸肉投數枚則易爛其消肉積可知發小兒痘疹止兒枕作痛惡露積于大陰少腹作痛名兒枕痛砂猪調服多食令人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣破泄太過中氣受傷凡服人參不相宜者服山查即解一補氣一破氣也有大小二種小者入藥一名棠毬子去皮核用一云核亦有力化食磨積

梨 甘微酸寒潤肺涼心消痰降火止渴解酒利大小腸治傷寒發熱熱嗽痰喘中風失音楊汁頻服聖惠方梨汁煮藥治小兒心藏風熱昏燥不通三十日死極棄官歸途遇一醫令致北梨二枚食盡即瘥宦如其言食及五六十枚而病愈楊吉老會醫術甚著一士有疾厭厭不即往謁之楊曰汝症狀已極氣血全消當以疽死不可為也士不

斷加桑寄生

此足少陰厥陰藥也獨活因寄生辛入少陰通血脈僧秦艽防風疏經升陽以祛風桑寄生益氣血祛風濕僧杜仲牛膝能壯筋而固下肯婦為地所以益氣而以活血而補陰參苓草所以補陽辛溫以散之甘溫以補之便血氣足而風濕除則肝腎強而痺痛愈矣丹溪曰入腰痛必用官貴以補之方止腹脇痛亦然

本方除獨活寄生加羌活續斷名羌活續斷湯治

沉香天麻丸宝鑑治小兒因驚發搐疹多眼

補虛為主而以治三氣之藥從之散藥得補藥以行其勢輔正祛邪尤易干見功故喻氏取之

獨活寄生湯千金治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛痛無定處痛不便腎水藏也虛則寒溫之氣乘之故腰脇作痛而痛吟痺者陰邪勝也肝主筋腎主骨足厥陰而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨

獨活 桑寄生 如無桑者以續斷代之 秦艽 防風 細辛 當歸 酒洗 白芍 酒炒熟 地黃 牛膝 人參 茯苓 甘草 桂心 等分每服四錢 此即前湯除黃芪續

藥而退聞茅山一道士醫術通神但不肯以技自名乃衣倢傑之服道山拜之願執役席下道士喜留祇事左右歷兩月人覺其與常隸別扣所從來再拜謝遜姑以實告道士笑曰世間那有醫不得的病試診脉又笑曰吾亦無藥與汝便可下山買好梨日食一顆梨盡取乾者泡湯和滓食之疾自當平士人如戒徑一歲復見吉老顏視腴澤脉息和平驚曰君必遇異人士人以吉陽衣冠焚香望茅山設拜益自咎其學之未至也 揚子用慈膏亦良 加姜汁蜂蜜能清痰止嗽○與藜蘆相間收藏則不爛或削梨帶杆蒸蘆上

白癜瘋筋攣 小兒神氣尚弱驚則神思無依又動干肝風風火相扇故痰壅心痺而筋攣搐掣

羌活五錢獨活四錢 沉香 薑炒仁 川烏二錢 附子炮 天麻 防風 牛夏三錢 當歸酒洗 甘草 殭蠶 每服五錢姜三片煎

此足厥陰藥也寶鑑曰恐則氣下精怯而上蕉閉以羌活獨活苦溫引氣上行又入太陽為引故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草以補氣血之不足參薑扶氣故以為臣烏附薑夏辛

枇杷葉 苦平清肺和胃而降

氣不則火降痰消 氣有餘便是火火則治燥珍 哕逆口渴 時珍曰火生痰治燥珍 哕逆口渴 時珍曰火降痰順則逆者不逆哕者不哕渴者不渴矣一婦肺熱久嗽身如火炙肌瘦將成勞以枇杷葉炙冬花柴菀杏仁桑皮木通等分大黃減半蜜丸櫻桃大食後夜臥各含化一丸未經制而愈 葉燥重二兩

乾重三錢者為氣足拭淨毛 毛則肺令人眩 治胃病麥汁炙治肺病炙

通頂散 治初中風不知人事口噤不開

風熱火盛痰涎上壅故不省人事風冷之氣客于胸中滿而不能發故口噤不開

藜蘆 甘草生用細辛 人參 川

芎錢五 石羔五錢 為末用一字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治

此于太陰少陰藥也吳鶴皐曰中風不省人事病已垂矣非平藥可以開其壅

檢覽 甘藷而溫肺胃之藥清
因生津除煩醒酒解河豚毒
投入煮佳 及魚骨哽 如無傷證以
醋水作卅揩魚骨便着即浮
出物之相畏有如此者
核燒灰傳蛙瘡良
白薯一名銀杏 甘苦而溫性藷而收
熟食溫肺益氣色白屬金定
痰哮飲喘咳利小便止渴潤
生食降痰解酒消毒殺蟲花夜
間人不得見性陰有
小毒故能消毒殺蟲 多食則
壅故用黎蘆與人參細辛取其相反而
相用也黎蘆苦寒有毒人口即吐能通
腸頂冷人嚥與人參細辛相反
細辛驅風通而竅溫經破痰
重以墜之 氣即火也痰隨火湧故
用石羔辛寒入肺降火甘草
之平以緩之川芎之用取其書氣和竅
而已 川芎升清陽而開請鬱為通陰陽
血氣之使○乃諸辛中風陰鬱閉
皆當發表還魂湯用麻黃桂枝清魂湯
用荊芥及用皂角牛夏搐鼻取嚏黎蘆
吐石折齒取痰皆所以開發三焦俾表
邪流通也中暑忌用冷水沸表亦同此
意耳
烏梅 揩擦牙齦涎出即開
此足陽明厥陰藥也酸先入筋木能剋
土 酸屬木陽明胃屬土 使牙關酸軟則開矣若以
鉄器攪之恐傷其齒也

收令太過令人壅氣臚脹小
兒發驚動疳 食干枝者死 漿澤手
面洗油膩 時珍曰去痰濁
之功可以類推
石榴皮 酸澁而溫能澁腸止
泄痢下血 煨未服 崩帶脫肛泄
至干脫肛者以石榴皮陳壁
土加明礬少許濃煎熏洗再
用五倍干炒研勢托而上之 浸水汁黑鬚
黑鬚髮方録雲南中浸切勿
犯鉄器客座新聞云一人患
食如常并水腫虫脹乃溫熱
生虫之象也以石榴椿樹東

引根皮析衝谷五錢空心服
腹大痛泄虫長丈餘遂愈