本草鑒方合編

四

ヤ武9
124
4

武中門 124 4

補遺

檳子一名木蜜其止渴除煩潤髒乃集解卷四

五藏解酒毒檳根解酒而死散不如枳椇屋外有枳椇樹屋內釀酒多不生檳以德治酒毒房勞病熱者加葛根于補氣血藥中一服微汗反解息熱如故知氣血虛不禁葛根之散也必得枳椇乃可偶得乾者加人即愈東坡集云渴領臣病消渴日飲水數斗飯亦倍進小頭頹數服消渴藥曰甚妊娠胞軫之笑曰君誤死取檳背當門子以酒磨作十許丸枳椇子煎湯吞之遂愈問其故曰消渴消中皆脾弱腎敗十不制水而成今領臣脾脈極熱腎脈不衰皆由酒藥過度積熱在脾所以多食多飲

去寒之劑寒中于表宜汗寒中于裏宜溫蓋人之一身以陽氣為主經曰陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰寒者陰慘肅殺之氣也陰盛則陽衰迫至陽竭陰絕則死矣仲景著書先從傷寒以立論誠欲以寒病為綱而明其例也其在三陰者非假姜附桂莫之辛熱參朮甘草之甘溫則無以祛其陰冷之邪疹而復其若天與日之元陽也諸傷寒濕者皆視此為治矣

理中湯俠景治傷寒太陰病自利不渴寒多而腹痛嘔吐脈沉無力或厥冷拘急或結胸吐蚘及感寒霍亂大陰脾經也腹滿而吐食

飲多漫不得不多非消非渴也麝香壞酒棗枳椇能勝酒故假二物以去其酒棗之毒也雷敩曰凡使麝香用當門子九

妙　俗名雞距以實桑曲如雞距蜀呼爲鷄枸經霜黃赤昔其葉入酒酒化爲水

胡桃　味甘氣溫發濇皮斂肺定喘固腎畫精今藥中至用昌謂若用之當勝金櫻遺跡也以潤皮外盡黑肉白膜裏之在夲骨第七節兩腎中央系着于脊下通二腎上通心肺貫五藏生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆因此出內經所謂七節之旁中有小心是也雖經諛以右腎爲命門高陽生真謬撰脉訣至宋庞陳言戴起宗始闢之夫腎命相連藏精而愚煩劬桃顆須其狀什焉黑故

下焦胡桃屬本破故紙屬人有木火相生之妙古云黃柏無知母破故紙無胡桃猶水母之無鰕也昧珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之本原命門指所抵之用而言爲藏精系胞之物三焦指分治之部而名爲出納猶熱之司一爲体一爲用也其体非脂非肉白膜裏之在夲骨第七節兩腎中央系着于脊下通二腎上通心肺貫五藏生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆因此出內經所謂七節之旁中有小心是也雖經諛以右腎爲命門高陽生真謬撰脉訣至宋庞陳言戴起宗始闢之夫腎命相連藏精而愚煩劬桃顆須其狀什焉黑故

利多者宜术湯者宜术　白术益氣燥濕令能生津蹉即沉重利不止加附子　此非小便陰症　腹滿去甘草　甘令區吐人滿即吐去宜术加生姜

汁白术甘痺人滿即吐去宜术加生姜汁夏散逆脅下動氣去术加桂　白术痛氣桂泄季口痰冬　飲停則悸痰冬利水寧心陰黃加茵陳寒結胸加枳實本方善分蜜丸名理中丸　仲景曰大病協後喜睡久不了胃中有寒宜理中丸溫之

此足太陰藥也人參補氣益脾故以爲君白术健脾燥濕故以爲臣甘草和中補土故以爲佐干姜溫胃散寒故以爲

賢 連皮同燒酒細嚼三枚能久戰有痰火積熱者必服過有毒故殺虫治瘡殼外青皮壓過烏髭髮濁燥養益去皮用 欽謙連皮用

龍眼肉 甘溫歸脾益脾長智 一名益智養心保血 心為父歸脾母故歸脾湯用之治思慮勞傷心脾及腸風下血 心生血脾統血慮慮過多而心脾傷則血耗致有健忘怔仲驚悸諸病歸脾湯能引血歸脾而生補之腸風亦由血不歸脾而矣行

枳實 秋冬霜先名枳實理中九 崔行功 治寒實結胸欲絕胸膈高起手不可近用大陷胸不疾者 崔氏曰此是下後虛逆氣毒相搏結于胸者用此丸先理其氣上攻次療諸疾用之如神渴者加花粉自汁者加牡蛎 本方去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安蛔丸 陶仲文 治胃寒吐蛔 蛔得甘則動故去甘草得酸則止得辛則伏故加椒梅 本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯 仲景 治太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞硬表裏不解者 欲解表裏之和全藉中氣為敷布故用理中以和裏而加桂枝解表

入托方位破故紙慳燥而調血使榮氣內充血脈通利諸疾自愈 三焦通利故上而虛寒喘欬能溫肺化痰益腎存液門哮夜晚對上論以胡桃三枚姜三片卧時嚼服即飲湯復嚼桃姜如前數靜則必愈邁如言服且而痰俏欬止洪輯幼子病痰喘夢覩音令服人參胡桃湯服之而愈明日剔去皮喘復作仍連皮用信宿而瘳蓋皮能斂肺也胡桃葱白姜棗等分煎熟能斂寒發汗 土而脾虛痛腎 能調中利膏 內而心腹痛灸而瘡腫之毒能解 膏除也然動風發助

俠以脾土居中故曰理中 王海藏曰上吐下泄不止當温而反不温脈微細而弱者理中湯主之經又曰傷寒下之利不止医以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦亦石脂禹餘粮湯主之復利不止者當利其小便○宋嵓宗食水大過病脾疾國医不効召湯介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食水而請以水煎此藥是治愛病之源也果愈

本方三両加附子一枚名附子理中湯 亦可作丸即四逆湯加參术 **治中寒腹痛身痛四肢拘急** 嘔傷曰傷寒中曰中有中藏中府中經諸反肉筋脉之殊治之當分微甚微則不換金正氣散加附子附子五磔散甚者脇腹痛四肢厥附子理中湯去附湯入用加本厥入脇加桑白皮入脾加木人心加朕苓 **本方加**

荔枝核　甘濇而溫入肝腎散滯氣降寒邪治胃脘痛婦人血氣痛腰存性五錢香附一兩為末每服三錢鹽湯或米飲下名蠲痛散單服醋湯下亦効其實僊結核似睪丸睪音聿腎子也故治癭瘕痛卵腫有迸類象形之義煅存性酒調服加茴香青皮殼疾各炒為末酒服亦良　殼名癭癰　燒存性用荔枝連殼燒研止咳逆生荔枝多食則之此即食物不消還以本物解之之義

不名理中而名桂枝者到底先表之意也大抵陽蔡為邪則腹滿而咽乾陰寒為邪則腹滿而吐利也　本方加黃連茯苓名連理湯治傷暑泄而作渴若外感盛暑內傷生冷者非此不可本方加陳皮茯苓名補中湯治泄瀉不已者加附子噉食食不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川椒入姜煎名溫胃湯治霧愚鬱結脾虛氣凝脹滿上衝飲食不下本方加黃芪白芍陳皮藿香名黃芪湯海藏亦用此法理中用法本方加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼養

榧實　甘濇潤肺本草未嘗言故寇氏云久食潤腸蟲有虫積者宜多食潤腸蟲上旬日日食一斤之食一斤虫乃絕

海松子　甘溫潤肺溫胃散水除風治欬嗽松子一兩胡桃二兩鍊蜜和服治肺燥虛秘同桐子仁麻仁咳嗽　虛秘同桐子仁麻仁名三仁丸出遼東雲南松鱗五斤

落花生新增　能潤肺香能舒脾菓中佳品　出閩廣藤生落地而結實故名按落花生本草未收本無本草菊要菓部宋　海松子條生　卷四

積者

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再加乾姜二兩倒逼脈四逆溫治三陰傷冀四逆湯為少陰主藥然三陰通用之太陰症脈沉亦有用此者身痛腹痛下利清穀惡寒不渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩躁裏寒外熱或乾嘔或咽痛脈沉微細欲色腹痛自利陰自利居多身原脈靜者順身熱脈大者逆內寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脈疑滯陽氣不能敷布故一身盡痛而手足厥冷也反不惡寒面赤煩躁者陰盛格陽于外也寒留胸中故食入即吐腸有寒飲故逆而乾嘔虛火上炎故咽痛脈沉者寒則伏藏也按少陰脈有沉有緊有數而仲景統以微細

當于医藥之用然能益脾閉腸宜作医藥也因世人謗之者多附見于此明少食其有利無害也

蓮子 甘温而澁脾之菓也脾者營故能交水火而妨心腎安靖上下君相火邪古方治心腎不交勞傷曰濁有蓮子清心飲補心腎有蓮肉散蓮肉益十二經脈血氣澁精氣厚腸胃除寒熱治脾泄久痢曰濁夢遺女人崩帶及諸血病久服宜着勿服去心及蒸熟

附子 一枚生用 **乾姜** 二兩 **甘草** 二兩 **冷服** 面赤者格陽於上也加葱九莖以通陽喻嘉言曰陽虛之人邪有表症其汗仍出其手足必厥縱用表藥五至亡陽不用表藥外邪不服故用前湯加葱為治 **腹痛者**眞陰不足也加芍藥二兩以斂陰陷痛陰氣上結也加枯梗一兩以利咽利止脈不出卻入參二兩以助陽補氣血嘔吐加生姜二兩以散逆氣以上皆通脈四逆湯加減法也

此足少陰藥也寒淫於內治以甘熱故以姜附大热之剤伸發陽氣表救寒邪心除煩開胃進食常治咽痛淋濁諸症石蓮入水則沉入鹵則浮煎鹽入以之試鹵蓮浮至頂者乃可煎落田野中百年不坏人得食之髮黑不老腎中不蓮產中樹上其味大苦不宜人**蓮心為末米飲下療產後血竭**

蓮鬚髮 甘温而澁清心通腎**益血固精烏髮止夢洩**

藕節 澀平解熱毒消瘀血止
遺精吐崩諸血 畏與蓮子同助

吐衄淋痢 切血症和生地
服惠生甘寒涼血散瘀 宋大
良毒作
血諸證落藕皮血遂凝散不
疑一人病血淋痛脹欲死李
時珍以發灰二不藕汁調服
三日而愈梅師方產後餘血
上沖煮汁飲 止渴除煩 全惠方藕
治暍氣羊酒毒蟹毒 搗爛絞
煩渴 角酒毒蟹毒 搗爛絞汁
煮熟甘溫益胃補心 象心乳
泄能安止怒人服令人瘦益
大腸止怒人服令人瘦益

四肢痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯
主之按厥陰症四肢厥冷指甲青脈沉
疾按之有力者爲陽厥當下之宜大承
氣湯如脈沉遲按之無力者則爲陰厥
宜四逆湯更須速灸之凡傳經熱邪則
爲陽厥溺赤而四肢熱直中亦寒謂之
陰厥陰編而四肢冷程郊倩曰世言傷
經爲挨厥直中爲寒厥斯言甚謬三陽
之厥多得于失下此爲熱厥少陰之厥
乃屬於寒厥陰之熱厥仲景書僅曰傷
寒二三日至四五日而厥者必發熱也
條果如傳邪之說則在四五日固得矣
論中何云一二日不知何經之邪而神
遠若此其曰厥應下之者下其熱非下
其厥也遇發熱則百下皆厥則萬不可
下矣推原其故厥陰與少陽一府一藏
少陽在三陽爲尽陽尺則陰生故有寒
熱之往來厥陰在三陰爲尽陰尺則陽
接故有異熱之脈復凡遇此症不必論
其來自三陽起自厥陰只論熱與厥之

之功生搗汁金瘡傷折熟搗塗
折裂湯瘡 因後方卒中毒箭
善孟說也產後忌生冷獨
藕不忌爲能散瘀血也 燈
粉亦佳安神益胃

荷葉 苦平其色青其形仰其
中空其象震 震仰盂 感少陽甲
胆之氣燒飯合藥俾肝脾胃
而升發陽氣 凉古只宋元用
瘡瘡倒壓者用此發之 灑出
爲末調蓋湯下聞人能散瘀
視曰勝于人牙尾腊能散瘀

血留奸血治吐衄崩淋損傷
產瘀未敗一切血症洗腎藏
風寒濕腫痛煩寒壯熱狀如傷
寒病在三陽不可過用寒藥
重劑誅伐無過仍清震湯治
之荷葉一枚升麻葛木各五
錢煎服鄭重一日荷葉研末
酒服三錢治
遺精極驗

茨實一名雞頭子 甘濇固腎益精補
脾去濕治泄瀉帶濁小便不
禁遺濇精同金櫻爲丸先
名水陸二仙丹
腰膝痛痺子野曰人之食
肉必收吻而細嚼
之使津液流通轉相灌溉其
功勝干乳石也經驗後方煮
熟研並合粳米
煮粥食益精氣 蒺藜搗粉用
濇精藥或連殼用 李惟燃云
菱寒而茨
暖菱花苞日
芡花向日

甘蔗 甘寒和中助脾除煩潤
燥止渴治消消痰降火解酒毒利
二便 外台方蔗漿或搗汁
治發熱日乾便濇 治
嘔噦反胃 梅師方蔗汁
姜汁和服 大便
燥結 蔗汁熬之名石蜜即白
煉糸霜糖唐大歷間有剛和
尚始傳造法性味甘温補脾
緩肝潤肺和中消痰治嘔多

不發熱以此為異仲景于傷寒則詳之而巾寒未之及何也曰陽動陰靜陰寒
既入而成熱遂從乎陽傳變不一靡有
定方故極推其病不得不詳也不熱者
陰也一定而不移則
不必詳也 久久熱煩躁陰盛
格陽陰症身强口噤眩冒無汗或自汗
陽頭陽 姜附湯加當歸肉桂入蜜和
服名 姜附湯喻嘉言曰服姜附湯
專主回陽而卒中寒和先傷營血故加
歸桂逐當分之初始得藥病相當也
再加人參甘草名 去附歸桂參甘湯加
當服此兼補氣血 蔥煎喻氏曰服前湯後繼
加葱四莖名白通湯 復湯
通脈 再加人尿豬
蔥煎汁名白通加人尿湯胆汁湯 仲景
胆汁名 本
月汁

食助熱損齒生乖
紫砂糖功用畧同

蕳膞一名烏芋 一名地粟 **甘徵寒滑益氣安中開胃消食** 飯後宜食之 **除胸中實熱治五種噎膈憂膈恚熱膈寒膈噎亦五種氣消渴噎食噎勞噎憂噎思噎消渴黃疸血症蠱毒** 未服能發同胖蠱肖皇金汪机曰合銅錢食之則錢化可見為消堅消積之物故能開五膈消宿食 治誤吞銅也

菱 一名芰俗名菱角 **甘寒安中消暑止渴解酒有兩角三角四角**

老嫩之 宋武陵記以三角四角者為芰兩角者為菱兩角者為蔆花隨月而轉犹葵花之向日

西瓜 甘寒解暑除煩利便醒酒名天生白虎湯 西瓜胡瓜甜瓜皆屬生冷多食傷脾助濕動生瘡云瓜桃生冷宜少食免致秋來成瘧病瓜性寒腑之尤寒稽含賦云瓜瓠則寒油煎則冷物性之異也

穀菜部

粳米 粳硬也糯糯也 **甘涼得天地中和之氣和胃補中色白入肺除**

方加人參一兩名四逆加人參湯 仲景治惡寒脈微復利利止亡血 惡寒脈微復利利止亡血虛故也 **茯苓六兩名茯苓四逆湯** 仲景治汗下後惡寒表裏俱虛乃生煩躁故用茯苓人參本為衛虛若重補其陰則惡寒愈甚但同其陽則陰愈劫矣故用附子以回陽而加芍藥以斂陰此君衛而虛之救法李挺曰汗後亡陽惡寒者表虛也芍藥附子甘草湯下後惡寒者裏虛也四逆湯其有表和未尽者必換桂枝湯又有裏實熱伏于內陽微于外而惡寒脈緊者猶須下之傷寒百問曰汗後惡寒人必實是也 **本方除附子用甘草乾薑二兩名甘草干薑湯** 仲景治傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急用桂枝湯誤攻其表得之便厥咽中乾煩躁吐逆與此湯以復其陽 脈浮自汗便數惡寒陽不足也攻表重虛其陽便厥胃之津液傷也故與甘草益氣干姜助陽尤慮辛熱以傷其陰隨與芍藥甘草湯益其陰血復其津液故症虽隔于少陰

煩清熱煮汁止渴仲景曰虎湯桃花湯竹葉石羔湯並用之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昌按今人終日食粥不知其妙近病中食之覺與藏府相宜迥非他物之所能及也

粟乃稻之總名有旱中晚三收晚者得金氣多性涼尤能清熱北粳涼南粳溫新米食之動氣

養胃煮汁煎藥亦取其調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功集成云陳米飯漿作團火煨存性麻油膩粉調傅一切惡瘡百藥不効者

糯米本草名稻米拔苛黍穆稻典禾所以異乎甘溫補脾肺虛寒堅大便縮小便收自汗同麻骨粉能除癆熱骨蒸生古帶北汗名癆癖酵毒化膿多收粘滯病人及小兒忌之糯米釀酒則熱煞陽尤甚鬲郎飴糖閉肺和脾化痰止嗽伸景建中湯用之取其甘以補脾緩中多食發溫熱動痰火損齒

穀芽甘溫開胃快脾下氣和

而不敢用因逆也若厥愈足溫者更作芍藥湯和其陰甘附即伸芍藥甘草各四兩以和其陰甘附即伸芍藥甘草各四兩仲景別本方加吳茱萸名吳萸四逆湯治厥陰少陰腹痛本方加當歸本通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷脈細欲絕及男婦寒疝臍下冷引腰脅而痛寒傷營血故加當歸本通能通血脈仲景當歸四逆湯見後本方加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃本方加生脈故陳良佐名茵陽返本湯治陰盛格陽本方加官桂良姜名溫脾湯治虛寒水泄冷汗脈微甚者嘔吐此為急病

拔濁水者池利猪水澄澈清冷也又曰加猪水煎之

功集成云陳米飯漿作團火煨存性麻油膩粉調傅一切惡瘡百藥不効者

糯米本草名稻米拔苛黍穆稻典禾所以異乎甘溫補脾肺虛寒堅大便縮小便收自汗同麻骨粉能除癆熱骨蒸生古帶北汗名癆癖酵毒化膿多收粘滯病人及小兒忌之糯米釀酒則熱煞陽尤甚鬲郎飴糖閉肺和脾化痰止嗽伸景建中湯用之取其甘以補脾緩中多食發溫熱動痰火損齒

穀芽甘溫開胃快脾下氣和

當歸桂枝芍藥細辛三兩甘草炙二兩大棗二十五枚仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸二升生姜半斤酒六升和煮名曰逆加吳茱萸生姜湯此足厥陰藥也成無已曰脈有血之府

中消食化積　炒用

大麥芽　鹹溫能助胃氣上行而資健運補脾寬腸和中下氣消食除脹散結祛痰或能化一切米麵菓食積通乳下胎外台方麥芽一升蜜一升水服下胎神驗薛立齋治一婦人喪子乳脹欲成癰事用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣如此良方云補曲亦善下胎皆不可輕用

久服消腎氣于好古曰麥芽甘平能助胃虛人宜服之以代戊己腐熱水谷李時珍曰無積滯服之消人元氣與白朮諸藥消導補兼施則無害也炒用

砂仁烏梅木瓜蔻五味為使

小麥　味甘微寒養心除煩利四竅

斂止血時珍曰素問麥屬火心之谷也鄭玄屬木許慎屬金別錄云養肝助鄭說谷思邈云養心與素問合並以素問為準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地煖下溫不如北產之良伸景治婦人藏燥症悲傷欲哭狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升甘草一兩每服一兩亦補脾氣益惠方小麥面飲治煩熱少睡多涕

麥苗

溫補虛養氣助五藏虛腸胃

也諸血屬於心通脈者必先補心益血先入心當歸之苦以助心血心苦緩急酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急急食甘以緩之大棗甘草通草以緩陰血四逆之名多矣而自因寒因熱之不同此則因風寒中血脈而逆故以當歸辛溫血中之氣藥為君通脈散逆必先去血中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒為輔未有昔偏不和而脈能通者故以芍藥甘草大棗調和昔衡通草利九竅通血脈開其鬱滯之以破阻滯而厥寒散矣周揚俊曰四逆湯全從回陽起見四逆散全從和解表裏起見當以四逆全從養血通脈起見不欲入辛熱之味恐劫其陰也蓋少陰藏中重在

眞陽亡不回則邪不去厥陰藏中城司藏血不養血則脈不起即遇大寒之人亦不用于姜附子此用吳未之走肝者自上而下生姜之辛散者自內達外也

四逆散仲景此和解之寒劑名四逆明矣千此治傷寒少陰症陽邪入裏四逆不溫或嘔或小便不利或腹中痛或泄利下重陽邪傳裏熱結于裏故四肢逆而不溫氣逆抉痰故欬氣虛抉欲故悸裏有結熱故小便不利腹痛下利○傷寒邪在三陽則手足必挽至太陰則手足溫至少陰則熱邪漸深四肢逆而不溫至厥陰則手足逆冷經曰熱深厥亦深熱微厥亦微典此湯以散傳經之熱

柴胡　芍藥　炒甘草　炒枳實　趣炒甘草各等分為末水調飲欬加五味子干姜

然能蠶氣作渴助濕發熱陳
者良（蒸食日晒袋盛暴風處名寒食面年久不熱入藥尤佳）浮小麥（即水淘咸浮起者鹵涼止
良）虛汗盜汗勞熱骨蒸（汗為心液麥為心谷浮者無肉故能涼心麥去同功）麥門酢拌
蒸能散血止痛（腰脚折傷風濕痺痛寒溫腳氣互易至
汗出良（麥之涼全在皮故麥去皮即熱毒疙瘩瘡疽潰瘍不能着席着用麥去裝褥即性涼而軟誠妙法也）
穫）甘平益氣和中安脾利胃

薏苡拌主下利（五味收逆氣干麥散肺寒肺典大腸相表裏上咳下利治法季加桂枝引導小便不利加茯苓滲泄腫痛加附子以補虛泄利下重加薤白能通大腸以泄氣滯）此足少陰藥也傷寒以陽為主若陽邪傳裏而成四逆若陰進之象又不敢以苦寒下之恐損其陽經曰諸四逆不可下也故用椒薑泄結熱甘草調逆氣藥苟散陽邪芍藥收元陰用苦酸寒之藥以和解之則陽氣敷布於四肢與少陽之用小柴

陶弘景曰穅米人亦不識書記多云黍與穆相似又註黍米云除米與黍米相似而粒殊太食之不宜人發宿病詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此八穀也俗猶不能辨證況芝英乎按黍穆辨者頗多皆無確義時珍曰穆黍一類二種粘者為黍不粘者為穆昂謂詩人既云八穀何必取一類省強分二種是仍為七穀矣益除穆同音故世妄謂除為穆不知除乃黍類似粟而粒大疏散乃北方下谷南土尤無北人亦不知重宏能度越糜糜而高踞八谷之上也乎前氏所說因是除黍所以疑也若穆高麗高大如芦世之所謂芦穆者實既香美性復中相幹又高大所以能為五谷

胡薏尚有兼症者視加法為治（陶前菴曰病在一經有用熱藥又用寒藥者如少陰症有用白虎湯四逆散寒藥皆有用直武湯四逆湯提藥者庸医胶執能措手不知寒藥治少陰乃直中之寒症也熱藥治少陰乃傳經之熱症也熱藥症藥主和解亦有加干姜者其餘四經用姜附萸桂者不可勝數豈必一一皆直中之邪乎陽明少陽二經並無热劑豈直中者独不中此二經乎況仲景書中說傳經者有矣並無直中字面何所據而以寒熱分之故程郊倩以直中寒邪傳經熱邪二說是古來相傳之語要未可為定論也）

直武湯（仲景治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或

之長而先土以之名官也況
稌黍所生不偏而芦穫薄海
蒔滋本草乃指芦穫為蜀黍
其名義亦不倫突此實從來
之誤敢為正之以質明者又
芦穫最能和中前湯溫服治
霍乱吐泄如神昂嘗病腹中
吸唧經兩月有友人見招飲
以芦穫燒酒一酹而積病暢
暢洩洩性之中和又可見矣

粟 甘鹹微寒養腎益氣治胃
熱消渴止霍亂利二便千金方粟
米粉水凡栝子大煮七枚內
醋中細呑之治反胃吐食
白粱米 有青黃赤白黑諸色味香良
穬麥麵 甘寒除氣寬腸治易

胃況積 孟詵曰能鍊五藏垢
按本草治泄痢帶濁傳瘟瘴
瀉爛湯火灼傷脾胃虛寒多服
黑大豆 甘寒色黑屬水似腎
腎之穀也 豆有五色各入五藏古方不
腎鎮心 腎水足則心火寧 **明目** 腎水足則
目利**不水下氣** 古方治水腫每
明末用或加他藥
散熱祛風 炒熟洒沃飲其汁
治產後中風危篤
及妊娠腰痛兼能發表千金
云一以去風一以消血結
活血 產書云熬令烟絕酒半
淋服下產後餘血 **角**
毒 蘇頌曰古稱大豆解百藥
毒試之不然又加甘草其

欲擗地而入也稱新倩曰汗多亡陽去
人知之然有衛外之陽為周身營衛之
主此陽虛遂有汗漏不止惡寒身痛之
症有膻中之陽為上焦心肺之主此陽
虛遂有又手胃心及奔豚之症有腎中
之陽為下焦宜元之主此陽虛遂有發
熱眩悸瞤振擗地之症有胃中之陽為
中焦水谷生化之主此陽虛遂有腹脹
滿胃不和而成心下痞之症救誤者須
視脈症知犯何逆以法治之○腎之真
陽盛則水皆內附而無腎氣同其收藏
矣腎之陽虛不能制水則泛濫為病故
上凌心而為眩悸中侮土而致嘔
泄也方名直武盜取固腎為義

附子 一枚炮 **白朮** 三兩炒 **茯苓** **白芍** 炒 **生**
姜 三兩 水寒相搏咳者加五味子細辛乾
姜 五味斂肺氣細辛干姜散水寒 **小便利去茯苓** 茯苓滲水

驗乃奇 消腫止痛揚塗一切腫

毒煮食和痰治 緊小者良

小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水煮食補腎 畏豆

藥也茯苓白朮補土利水能伐腎邪而

下利去芍藥加干姜芍藥酸寒喎去附子加生姜一倍附子補氣生姜散逆 此足少陰

療心悸生姜附子同陽益衛能壯真火

參龍胆猪肉忌厚朴動氣得

前胡杏仁牡蛎石竈諸月貝汁

赤小豆 甘酸鹹冷色赤心之

穀也性下行通小腸利小便

心與小陽子氏散血消腫非

用表裏 行之散血消腫排

膿清熱治泄痢胆氣昔有患胸

氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之蓬愈同鯉魚煮食汁能

消水腫者 粥亦佳 傳一切瘡疽雞子白調

未箍之性極粘乾則准揭人

苧桱未則不粘宋仁宗患痔

腮道土瞢能取赤小豆四十

九粒咒之雞他藥傳之而愈

中貴任承亮親見後任自患

惡瘡傳示投以藥立愈問之

赤小豆也承亮始悟道士之

咒偽也後過豫章見医治腸

疽甚危任曰莫非赤小豆耶

医驚拜曰用此活三十餘口

願勿復疑 止渴牛膠酒通乳下胎然

滲津液久服令人枯瘦十劑

可去溫桑白皮赤小豆之屬

是也按二藥禾可言燥蓋取

其行水之功然以本通防已

為通前通燥二義似重故本

服不水客邪得深入而動其本氣緣胃

陽衰而堤防不及也故用真武湯温中

鎮水收攝其陰氣彼青龍主太陽表水

十疼主太陽裏水真武主少陰裏水喻

嘉言曰陽明少陷絶無用附子法惟太

陽經有不得不用之症蓋太陽膀胱為

腎之府腎中傷虚陰盛熱必傳出于府

以故纔見脉微惡寒漏汁惡風心悸頭

眩筋惕肉瞤躁擾等症縱有傳經熱邪

不得不用姜附以消陰而回陽也昂按

視嘉言此論亦謂傳經熱邪雖以

耕泥緣御景書中本無此說也

本方去生姜加人參二兩名附子湯伸景

治少陰病身体痛手足寒骨節痛脉沉

者腎主骨寒淫則痛此一身骨節尽痛

乃陽虚陰盛而生内寒所致非外感

也若以外感之痛治之則殺人矣故用

參附助陽而勝腎寒加芍藥斂陰以為

集改桃葉為燥劑
而以行水為通劑

綠豆 甘寒行十二經清熱解毒一切草木金石刀仆小便止做霜毒皆治之利小便止消渴治泄痢 連皮用其涼在皮粉扑瘡瘡潰爛良一市民謂親音經甚誠出行折一足哀叫菩薩菱僧授一方綠豆粉新銚炒紫色井水調厚敷紙貼杉木枇定其効如神

白扁豆 甘溫脾香色白微黃脾之穀也調脾養胃通利三焦蠲渴和中消暑除濕能消脾胃

之止渴止瀉專治中宮之病土强濕去正氣自旺角酒毒河豚毒備急方新汲水調末服能解此毒 多食壅氣子粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

淡豆豉 治泄痢寒熱陳藏器曰豆性生平炒熟挑淡干解肌煮食寒作豉冷 發汗解肌

調中下氣治傷寒頭痛煩燥清悶懊憹不眠發斑嘔逆几傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之淡豉合厄子名

陽之附也及少陰病得之二三日口中和背惡寒者背為胸中之府諸陽受氣于胸中轉行于背背為陽腹為陰陽氣不足陰寒內盛則皆為之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣昂按背為太陽部分然少陰腎脈亦貫脊與太陽相表裏又皆居北方與腎同位故寒傷少陰而背惡寒亦其義也又有陰氣不足陽氣乘虛內陷陰中表陽新虛背惡寒者經所謂傷寒無大熱口渴心煩背微惡寒是也白虎加人參湯主之一為陰寒內盛一為陽氣內陷何以明之蓋陰寒為病內無燥熱則口中和陽氣內陷則消燥津液口燥舌乾而渴也詳之一法看小便之清赤清者為寒赤者為熱也

白通加人尿豬胆汁湯 仲景治少陰病下利

脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔而煩服此湯後脈暴出者死微續者生 寒邪客之則不能禁固故下利也與白通湯復陽散寒服後利不止厥逆無脈乾嘔煩燥寒氣太甚內為格拒陽氣逆亂也服此湯後脈暴出者止氣因死而脫也故死脈微續者陽氣漸復也

忽白 西土甘敦姜一兩 附子一枚 人尿五合 猪胆汁一合

腹痛者虛陰不足也去忽加芍藥二兩以斂陰嘔者加生姜二兩以散逆咽痛者加桔梗二兩以利咽利止脈不出者加人參二兩以助陽

疸子豉湯 吐痢溫瘧 時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸曬故能升能散得葱則發汗得鹽則治能吐得酒則治風得麝則治痢得薤則止血炒熟又能止汗孟詵治盜汗炒香清酒服封後合葱白煎名葱豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治酒病 造淡豉法用黑大豆水浸一宿淘淨蒸爛攤匀蕎葉侯上黃衰取晒簸淨水拌乾溫得所安甕中築實蓼葉蓋泥封晒七日取出瀑一時又水拌入甕

此足少陰藥也葱白之辛以通陽氣姜附之熱以散陰寒此白通湯也服而不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達乎少陰故加人尿豬胆汁為引取其與陰同類苦入心而通脈寒補肝而和陰下咽之後冷体既消熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正治反者反治此之謂也 以熱治寒以寒治熱為正治以熱治熱以寒治寒為反治亦曰從治謂從其性而伏之也俟厥有陰陽二症陰厥者身涼不渴脈遲細而微陽厥者陽熱極而反厥雖厥而煩渴譫妄身

如此七次再蒸尖氣 甕收用

大豆 甘平溫中止咳 煅存性服 肝

干柿蒂

胡麻 即服麻一名巨勝子俚出大宛故曰胡麻 甘平補肺氣益肝腎潤五藏填精髓堅筋骨明耳目而飢渴可以 脾弱滑腸與白朮並用為膠 烏髭髮利大小腸逐風溫氣 刘河間曰麻乃肺之穀風先治血血活則風散胡麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭奠一用攘風胡麻佐苦參疾黎治大瘋炊癩

復時溫而脈數也若陽厥極深至于身冷脈微欲絕為熱極而將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生脈而令身暖也若以熱藥助其陽則陰氣亦將絕于此時而後下之則陰陽俱竭而不死矣陰厥用白通四逆亦須急救後則無及耳

附子 辛熱純陽大補元陽回垂絕之陽救將脫之陰 治陰毒手足厥冷腹痛暴絕服白通湯或四逆湯後用葱一大握以繩束切去兩頭留白寸許以綿裹牛分填臍中次灸艾數壯安臍上先將麝香半分填臍中次灸艾數壯併用附子末熱氣從臍入腹痛甚者連灸二三壯身溫有汗即癒否則

麥芽凉血解毒生肉傳小兒
飴名凉血解毒 止痢生肌 皮肉俱
頭瘡 麻油潤肌療瘡膠膏
多用之 凉血解毒
罌著良人留粟色者名罌粟殼
麻更奪九蒸九晒可以服食
陶宏景曰八谷之中惟此為良昂按名云自大宛來則非八谷之類明矣又按月令仲秋之月天子以大嘗麻則其為八谷之麻又可見矣大宛之說何以稱焉豈白者產中原黑者產大宛乎
大麻仁 即作布之麻 甘平滑利

不治或用茅蒐元氣海 腎下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元 各二三十壯內外協攻務
令一時之內陰散陽回得汗而解勿能
艾性溫熱射能開發助之以火故有同湯之功或曰用酸苦斜
麴皮炒熟發蓋蒸熟北前法九捻
柴葛黃湯 仲景治陽明症食穀欲嘔若得湯
反劇者則屬上焦食穀欲嘔胃寒也得湯反劇則為大陽熱
少陰症吐利手足厥冷煩躁欲死吐
利則脾陰敗冷者陰陽俱竭也煩躁者陽氣內爭厥陰症乾嘔
耗陽利則損陰敗冷者陽氣內爭厥陰症乾嘔
寒氣甚煩躁者陽氣內爭厥陰症乾嘔
吐涎頭痛厥陰之脈挾胃乾嘔吐涎裏寒內格也厥陰之脈上巔頭

脾胃大腸之藥緩脾潤燥治
陽明病胃熱汗多而便難三
皆燥也汗出愈多則津枯而
大便愈燥仲景治脾約有麻
仁丸成無己曰脾欲緩急食
甘以緩之麻仁之甘以緩脾
閼燥張子和曰破積血利小
諸燥皆三陽病胃積血利小
便通乳催生又木穀也不能
治風 極難去穀帛異置沸
湯待冷壓井中一夜晒乾就
新瓦上按去穀搗用異葉冬
白微杜蛸

痛寒氣上逆也○按三陽皆有頭痛大
陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛
温往太陰繞温在太陰而頭反痛是不
不可拘七皆季東垣曰太陰頭痛必有
痰也少陰頭痛足寒而氣逆也蓋太陰
陰二經虽不上頭然痰曲氣逆
壅于胸中頭氣不得陽而為痛也

吳茱萸 一升泡 人參 三兩 大棗 十二枚 生姜 六兩
此足厥陰少陰陽明藥也治陽明食
穀欲嘔者吳茱生姜之辛以温胃散寒
下氣人參大棗之甘以緩脾益氣和中
喻嘉言曰此明嘔有太陽亦有陽明若
食穀而嘔則屬胃寒與太陽之惡寒嘔

薏苡仁　甘淡微寒而屬土陽明藥也　甘益胃土勝水淡滲濕泄水所以益土故健脾治水腫濕痺腳氣痙痛筋急拘攣風熱濕痺諸證皆屬陽明經病土燥則風生故補脾清熱祛風勝濕舒筋利水除痺

白朮　甘苦溫入脾胃補氣燥濕和中生津止渴止汗消痰進食除熱安胎

茯苓　甘淡平入脾胃滲濕利水而不傷正補脾而不壅氣寧心益智

山藥　甘平入脾肺補脾養陰益腎固精澀腸止瀉

蓮肉　甘平入脾肺補脾養心固腎澀腸止瀉

芡實　甘平入脾腎固腎益精補脾止瀉除濕

扁豆　甘平入脾胃和中補脾清暑化濕

白扁豆花　甘平入脾胃和中補脾清暑化濕

白蔻仁　辛溫入肺胃化濕行氣溫中止嘔開胃進食

縮砂仁　辛溫入肺脾胃化濕行氣溫中止嘔開胃進食

砂仁殼　辛溫入肺脾胃化濕行氣溫中止嘔開胃進食

豆蔻　辛溫入肺脾胃化濕行氣溫中止嘔開胃進食

草果　辛溫入脾胃燥濕祛痰除瘴截瘧

檳榔　辛溫入胃大腸破滯行水殺蟲消食化痰

大腹皮　辛溫入脾胃大腸行氣寬中利水消腫

木瓜　酸溫入肝脾和胃舒筋活絡祛濕除痺

烏梅　酸平入肝脾肺斂肺澀腸生津止渴安蛔

五味子　酸溫入肺腎斂肺滋腎生津止渴澀精

訶子　苦酸平入肺大腸斂肺澀腸降火下氣

五倍子　酸鹹寒入肺腎斂肺降火澀腸止血斂汗

五加皮　辛溫入肝腎祛風濕壯筋骨利腰脚

金櫻子　酸澀平入腎膀胱固腎澀精縮尿

蓮鬚　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮房　苦平入肝脾散瘀血消瘀腫

蓮子　甘平入心脾養心益腎補脾止瀉

蓮藕　甘寒入心脾生津止渴消瘀血

荷葉　苦平入肝脾升清降濁消暑利濕

荷蒂　苦平入肝脾升清降濁消暑利濕

荷梗　苦平入肝脾升清降濁消暑利濕

芰實　甘平入脾胃補脾養胃益氣除煩

菱角　甘平入脾胃補脾養胃益氣除煩

慈菇　甘寒入肺胃清熱解毒消腫散結

茨菰　甘寒入肺胃清熱解毒消腫散結

芡葉　甘平入脾胃補脾養胃益氣除煩

藕節　甘平入肝脾收斂止血消瘀血

藕粉　甘寒入心脾生津止渴消瘀血

藕汁　甘寒入心脾生津止渴消瘀血

藕渣　甘寒入心脾生津止渴消瘀血

蓮須　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮心　苦寒入心腎清心瀉火堅腎澀精

蓮衣　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮蓬　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮梗　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮花　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮瓣　甘澀平入心腎固腎澀精止血

蓮蕊　甘澀平入心腎固腎澀精止血

脫江心腹篤諸痛東垣曰胃氣虛寒故痛宜此湯治之
氣能入腎故教痢初起者禁用本草要先除病根一名麗
春花紅黃紫白艷麗可愛凡使殺洗去蒂及筋膜服薄皮
膚嚴蜜炒用性熱忌火煎多令人吐逆
得醋烏梅陳皮韮中有朮極細其濁燥煮粥食治久瀉十
四味建中湯治氣血不足虛損勞瘵
加參
九良
神明
經一幸散氣補脾調中溫胃
化水穀治積滯匠餘云有傷飲乃柔治積滯匠餘云有傷
曲未小加木香塩湯下故日日中間酒香積逐散治
瘀逆癥結泄痢脹滿胃乳炒性熱忌火煎多令人吐逆
酒服二下台筆後血量亦治
錢日二月末服亦良亦治
目病陰微集元生用能發其
生氣熟用能斂其暴氣
造麴法以五月五日六月
六日丹白麵百斤赤豆末香
仁泥青蒿蒼耳紅藍汁各三
升以配青龍白虎朱雀玄武
蓂莢勾神六神通和作餅置
用生勾神六神通和作餅置
本草綱要谷部四紅曲　卷四
服原藥逐成陰症寒伏于下逼其無根
失守之火上独葱肺而發斑点其色於
紅隐匕見于肌表典湯症色呼色紫赤
者不同此胃氣極虛若服熱藥立見危
始吳鵠暈曰以參庶桂府可治斑
法之變若血匿不達权安足語此
黃芪蜜炙　人參　白朮土炒　茯苓　甘草蜜炙
牛夏姜製當歸酒洗白芍酒炒熟地　川芎
麥冬　肉蓯蓉　附子　肉桂　加姜
棗煎　此足三陰陽明氣血藥也薑棗
益衛壯氣補中宜藥四君補陽所以益
氣參朮甘草四物補陰所以養血芍地陰陽
調和則血氣各安其位冬半夏和胃健
本草綱要谷部四紅曲　卷四　醫方集洋寒卷中十四味建中湯　十八　中四

生黃衣晒將陳者良妙用
紅麴 甘溫色赤入營而破血
燥胃消食活血和血治產後
下痢失打損傷產後惡露不
盡李時珍曰人之水穀入胃
甲焦濕枕薑煮皆溫橘氣
化為營血此造化自然之妙
也紅曲以白米飯雜曲毋濕
搓蒸曾即變為真紅此人窺
造化之巧者也故治脾胃營
血得固氣紅入米心陳久者
良昂按紅曲溫燥能腐生物
使熟敗魚肉鮮用之不惜
取其色也

脾發清心潤脏薤白
不足桂附引矢守之火而歸元於十全
大補之中而有加味要以建中而戰小
也 本方除茯苓白朮參冬川芎熟地
薤白名八味大建中湯治同本方除川
芎熟地白朮附子薤白加柴胡細辛陳
皮名樂令建中湯治藏府虛損身体羸
瘦潮熱盜汗將成勞瘵大能退虛熱生

醋一名苦酒溫散瘀解毒下氣消
食食飲統則消矣開胃氣食久嗜食本草未載
散氷氣治心腹血氣痛磨木香服
產後血暈以火淬醋飲之須臾開其氣痙瘀
痙痘黃癮腫外科散藥多用
散瘀解毒昂按貝母生散而
斂瘍口蓋能散所以能斂醋
性酸收而散癮腫蓋消則內
散潰則外散收處即是散處
兩者一義也 口舌生瘡含漱損傷積
血和發塗
血能散之殺蟲肉菜蕈諸蟲
毒多食傷筋收縮太過酒醋
無所不入故製

者之虛以多本法乃後入超此之方也
善為哉酸宜又曰二方治藏氣素
血之而無腹痛少陽在半表半裏有胸脇痛
表無腹痛知氣入裏與正相搏則腹痛溫者
而無腹痛湯明腹滿急痛者裏實也宜
下之大柴胡湯小承氣湯三陰下利而
腹痛者裏寒也宜溫之四逆湯附子理
中湯陽虛寒也宜小建中陽溫中散寒
三日心悸而煩停者陽氣虛也煩者陰
湯先建其裏倍芍藥者酸以斂陰陰收
則陽扉附也加飴糖者甘以潤土土濕
則萬物生也仍不去姜棗以散邪也通治虛勞悸衄鼻衄

藥多用之　米造陳久者良寇宗奭曰食酸則齒軟者齒屬腎酸屬肝木氣强水氣弱故也

酒辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者熟而毒淡者利小便用為尚導可以通行一身之表引藥至極高之分

熱傷肌濕飲和中少飲則和血行氣壯神禦寒遣興消愁辟邪逐穢疾水藏行癰勢過飲則傷神耗血赤能亂血故飲之身面俱赤　損胃爍精動火生瘡發酲媒人　致生溫熱諸病

酒是色飲過則相火昌炎肺金受燥鈃生痰嗽脾因火而困怠胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒膽因火而忘惧腎因火而精枯以致吐血消渴勞傷鼈瘕疽失明為害無窮汪頌曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽就床熱蓬三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕動火因而致病者多矣朱子云以醉為飲可也　醇而無灰陳久者良

枳椇鼈花赤豆花綠豆粉臧

此足太陰陽明藥也雖曰脾居四藏之中生氣嘗衛通行津液一有不調則失所育所行矣必以此湯溫健中藏故名健脾飲緩急食甘以緩之故以飴糖為君甘草為臣桂枝辛熱辛散也濁也嘗衛不足濁而散之芍藥酸斂酸收也泄也津液不通收而行之故以桂芍為佐生姜辛溫大棗甘溫嘗衛之源脾者嘗之本臧經曰嘗出中焦衛出上焦是以衛為陽金之必以辛嘗為陰補

腰痛嘗遺矢精四肢酸痛掌足煩熱咽乾虛勞嘗瘧黃疸小便利而色白熱已乾虛勞嘗瘧黃疸者是無熱也不可除治當作虛寒治之喻嘉言曰虛勞症至于亡血失精精血枯槁難為力矣急宜建其中藏使飲食增而陰血旺故但用隊穌穌作甘之味生其精血而酸辛酸苦在所不用合是無良法也

桂枝　生姜各三兩芍藥六兩甘草一兩炙　大棗十二枚

入飴糖一升微火消服喫家不可用建中以甜故也○此即桂枝加芍藥湯但桂有厚薄耳昂按此湯以飴糖為君故不名桂枝芍藥而名建中今人用建中者絕不用飴糖失仲景遺意矣吳鶴皐曰桂枝當是桂桂枝味薄故用以解表桂味厚故用以建裏

鹵得鹹則解水制火也

韭 辛溫散酸斂肝之乘也入血分而行氣療心益胃助腎補陽一名上達乳言溫補也 除胃痺羌肺氣散瘀血逐停痰治吐衄損傷一切血病陽汁童尿和服吐膈反能消瘀血停痰在胃口致胃反胃及胃脘痛丹溪曰有食热物及入怒致死血留胃口作痛者宜加韭汁梔姨入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜韭汁和五令散為先空心尚香湯下治反胃宜用牛乳加韭汁姜汁和細溫

之必以甘辛甘相合脾胃健而營衛通故以韭菜為使李東垣曰傷寒論云陽急痛以芍藥甘草之酸土中瀉木為君餘糖炙甘草甘温補脾養胃為臣乘木挾木勢亦來侮土肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水姜枣甘而温發散陽氣行以經脉皮毛為使或調往枝湯解表而芍藥少建中湯温裏而芍藥多何也皮膚為近則制小其服心腹為遠則綱大其服所以不同也昇按此創表欲其散裏欲其收之義○小建中治腹痛者以木來剋土取于姜為君土中泄痛者以水來侮土取于姜為君土中泄水也平胃散治腹痛自利者取茶木為君泄土除濕也宜陰子曰建中為痛能補中焦之虛而不能補土焦下焦之虛

本方加黃

服益韭汁散疳羌汁下氣消痰和胃牛乳解热潤燥補虛也單方總錄門食不得入是有火也食入反出是無火也治法雖有寒热虛實之別要以安其胃氣為本使陰陽升降均平嘔逆自愈矣解藥毒食毒狂犬蛇虫毒蚤食昏迷 忌蜜

牛肉 昂按今人多以韭炒牛肉其味甚佳未見作害○經曰毒藥攻邪五谷為養五菓為益五菜為充五果為助氣味合而服之以補精益氣五菜韭薤葱兹藿也五果桃李枣栗也韭子辛甘而温補卄腎助命門疫腰膝治筋癆遺

蓼實 味辛温 主明目温中耐老除風邪補五臟益氣力 久服令人不飢

蓼實 味辛温 主明目温中耐老除風邪補五臟益氣力 久服令人不飢

尿洩青弱血白帶白淫 經曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及無白淫非子同旭骨桑螵蛸能治諸病以其入厥陰補肝腎命門命門者藏精之府也 菟絲子酒浸焙 蛇牀子 覆盆子 五味子 遠志去心 石菖蒲 巴戟去心 山藥 杜仲去粗皮 牛膝酒浸 肉蓯蓉酒浸 各等分 右爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

暴瘖 生辛散熟甘温 陶宏景曰白冷青熱傷寒湯中小實中空肺之菜不得用青夕實中空肺之菜也肺主皮毛其合陽明大腸故發汗解肌以通上下陽氣仲景自通湯通脉四逆湯並加之以通脉回陽散胃睛白睛利耳鳴通二便時珍曰蔥管吹

身痛自汗皆止虛勞不足可愈矣 桂枝附子湯近刻方 治風虛頭重眩若極食喻嘉言曰腎氣空虛外風入之風挾腎濁陰之氣厥逆上攻頭重眩極若不知食味此脾腎兩虛難耐兼以脾虛不知食味此脾腎兩虛白朮二兩 甘草一兩 附子一枚泡 每服五錢姜棗煎 此足太陰少陰藥也白朮附子湯 白朮二兩 附子一枚泡 甘草一兩 生薑三片 大棗四枚 水煎服 治風虛頭重眩苦極食白朮附子湯風已入臟方中全不用風藥祖用附子燔乾其水藏白朮燔乾其土痰水土一燔則濁陰之氣盡去頭重眩運自止御藥方 治風濕相博一身煩痛不可轉側或骨節疼痛或身微腫風則上先受之濕則下先受之始至兩相搏結注經絡流閉筋骨肌肉間也風勝則衛氣不固故汗出而惡風濕勝則水道不行故小便不利而微腫用白朮以益上燥濕桂枝以散風解表附子以驅陰助陽甘草以和中益氣也 白朮附子湯 白朮二兩 附子一枚炮 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 水煎服 治風濕相博骨節煩疼不可近者此湯發汗而不動搖身體不發腫但小便自利去桂加茯苓名茯苓白朮湯除濕湯治寒濕

鹽入五臟中治小便不通及轉脾危急者極效 治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛陰症脈遠用葱白安腎上尉之氣爲血帥故治吐血衄血便血痢血食氷心鎮葱煮粥食折傷血治赤白痢韭粥亦良 折傷血出 大燥研封上痛無窮手癎風痛 乳安胎 婦人姙娠傷寒葱白加生姜亦佳搦繁方合香豉阿膠治胎動 通氣散 能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒衛大毒諸物皆效 白芷 甘草 各等分 爲末每服二錢水煎熱服 治面赤身熱不煩而躁飲水不

伯父曰和事草取白連翹
亦有用青者同蜜食殺人同
柬食令人病百乙方患外痔者先用木鼈煎湯熏洗以青葱涎对蜜調傳其痔如水蝕行方水病足腫煮湯漬之日三五度住
大青張騫使西域始得種入中國故一名胡蘇辛溫
開胃健脾通五藏達諸竅反臭極香之物皆能通竅去濕解暑氣
辟瘟瘴消癌腫搗爛麻油調敷破癥積化肉食殺虫蠱毒治中
暑不醒搗和地酒頻溫服鼻衄不止貼
足心能引陽火下行開格不通搗納肝中能通幽
門敷臍能達下焦消水利大小便切片燃艾灸音九一切瘟瘧毒痢腫瘡獨頭者尤良李
時珍三瘧痢艾灸勝干用藥緩熱毒中腸上下不通必得毒氣發泄然後解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭頂以上切不可灸恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一斤初瘡肉不痛直灸到好肉方痛至夜火炊滿背高阜頭孔百數則毒外出否則

陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以折
泛上之火知母以滋在下之陰王海藏
千肺燥出干腎成無以淨其燥蓋陽無已已回煩陽也燥陰也以青蒿補其陽虛選
陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰
也麥冬五味補肺清心合人參以生其
脈加童便而冷服者熱固寒用也戴氏
月煩燥陰陽經皆有之陽明經胃有燥屎故煩當下之太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦有煩宜小柴胡湯發先賢治煩燥但有屬熱者有屬寒者治獨煩不燥多屬熱為陰而燥者為虛寒治獨燥不煩者多屬寒惟火邪者屬熱陰煩者少陰為多山陽氣傳入陰經陰得陽而煩白利而煩渴不眠者辰砂五苓散

內過五藏而危矣綱曰汗精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如椒栗壯宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦痛艾大如雨杉許灸至百壯始覺痛而痊由是推之頭毒若不痛者艾大壯多亦無妨也然

甚氣薑賁多食生瘀動火散氣耗血損目昏神五辛皆然而蒜尤甚楞嚴經云五辛熟食發淫生啖增志故婆羅門戒之釋家以大蒜小蒜興渠慈蔥茖蔥為五辛慈蔥冬蔥也蔥嶺山蔥也興渠西域菜云即中國之葵道家以非葱薤胡葵芸苔為五辛芸苔油菜也

忌蜜

若排足陽氣傳陰陽氣犯陰經吐利手足厥冷而頂經云陽虛陰乘之故煩又云陰虛發燥欲坐井中吳茱萸湯甚者四逆湯加葱白外有虛煩一症乃病念後陰陽未復時發煩熱竹葉石羔湯痰多睡不寧者溫胆湯嘔者橘皮湯

陽明

救急湯節菴白註云即四逆湯

治三陰中寒初病無身熱頭痛是無表症而蒜尤甚發淫生啖增志故婆羅門戒之釋家以大蒜小蒜興渠慈蔥茖蔥為五辛熟經云五辛熟食發淫生啖增志故婆羅門戒之釋家以大蒜小蒜興渠慈蔥茖蔥為五辛慈蔥冬蔥也蔥嶺山蔥也興渠西域菜云即中國之葵道家以非葱薤胡葵芸苔為五辛芸苔油菜也

忌蜜

病身不熱頭不痛惡寒戰慄四肢厥冷引衣自蓋蹉臥沉重腹痛吐瀉口中不渴或脂胆唇青口吐涎沫或無脈或脈沉遲無力初病無身熱頭痛是無表症而蒜尤甚發淫生啖增志故婆羅門戒之釋家以大蒜小蒜興渠慈蔥茖蔥為五辛慈蔥冬蔥也蔥嶺山蔥也興渠西域菜云即中國之葵道家以非葱薤胡葵芸苔為五辛芸苔油菜也

忌蜜

散血走肌泄下焦大腸氣澁治泄利下重五穀右氣滯也四逆散如此以洩滯拔後重亦有氣虛血虛火熱風燥之不同

胸痺刺痛仲景用括蔞薤白白酒湯

喘急胎利產塗湯火傷柳塗用肝後方中惡辛死者川薤汁灌鼻中拒汁亦可

葉似韭而中空根如蒜取白用忌牛肉其葉光滑露亦難貯故云薤露

胡荽辛溫香竄內通心脾外

雍一名蒿子音叫辛苦溫滑開中助陽

散血走肌泄下焦大腸氣澁治泄利下重五穀右氣滯也四逆散如此以洩滯拔後重亦有氣虛血虛火熱風燥之不同

胸痺刺痛仲景用括蔞薤白白酒湯

喘急胎利產塗湯火傷柳塗用肝後方中惡辛死者川薤汁灌鼻中拒汁亦可

葉似韭而中空根如蒜取白

用忌牛肉其葉光滑露亦難貯故云薤露

胡荽辛溫香竄內通心脾外

達四肢辟一切不正之氣痧
疹痘瘡不出煎酒噴之心主之氣得芳香而運行舍噴遍身勿噴頭面痘疹家忌之辟邪惡胡荽久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜

生薑　辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中陽胃口而開痰下食治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺通氣散寒咳逆嘔噦有聲有物痛嘔有聲無物叫爲噦有物無聲爲吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上沖而然生薑能散逆氣嘔家聖藥頭日辛葱生薑之類治嘔吐但治上焦氣重表宣之病若胃虛谷氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚谷氣而已勿作表宣用辛葉泄之丹溪曰陰分咳嗽者多爲陰虛盲用貝母勿用生薑以其辛散也昂按人特知陳皮生薑能止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升如胃熱者非所宜也霍香亦然肺經痰熱者忌之

濕泄消水氣行血痘痘後血上沖心及汚穢不盡前能亦良　通神明去穢惡救暴卒乃中風中氣中暑中惡暴卒等症姜汁和童便飲效姜汁開痰降火也　療狐臭姜汁

此足少陰藥也破故紙辛苦大溫能補相火以通君火火旺乃能生土故以爲

君固腎益元溫能行氣消食煖胃固腸五

味能補腎酸能澁精吳茱辛熱除濕

煖脾能入少陰厥陰氣分而補火生姜

賢命火衰不能專司脾胃故大補下焦

元陽使火旺土強則能制水而不復妄

行矣　本方單用破故紙肉蓯蓉名二

神丸治冏火乃土之毋破故紙補腎爲

可以生脈加麝香通其竅也

四神丸　治腎瀉脾瀉腎泄者五更時泄也經曰腎者胃之關也前陰利水穀陰利谷胃屬水水旺于子腎之陽虛不能鍵閉故將交陽分則泄也脾泄者脾之清陽下陷不能運化關門元氣不足不能外別水谷不痛而泄也兩病皆由腎命火衰不能上生脾土故也楊仁齋曰腎命之氣交通水

破故紙四兩酒浸炒　五味子三兩

肉蓯蓉二兩酒浸一兩蒸　吳茱萸一兩湯泡　用

大棗百枚生薑八兩切片同煮棗爛去

棗取薑肉搗丸每服二錢臨臥鹽湯下

若平旦服之至夜藥力以盡不能敵一夜之陰寒故也

頻嚼擦凍耳啟當殺半夏南星
菌蕈野禽毒飲有毒生姜能
辦辛露露山嵐瘴氣早行
之后露露山嵐瘴氣早行揚
之后露露山嵐瘴氣早行揚
久兼酒則愚昏發痔積瘀便然瘡
瘡人食之則生惡肉 姜皮
辛涼和脾行水治浮腫脹滿
以皮行皮五皮散用之成無
已曰姜枣辛甘能行脾肉之成無
已曰姜枣辛甘能行脾肉之成無
津液而和菅衛不專于發散
也東垣曰夜不食姜者夜上
合而姜主闢也秋不食姜者
秋上收而姜主散也難經多

戊癸化火同為補土毋之藥舒學士曰
有全不進食者服補脾藥皆不効予授
二神丸即能進食此蒲不可全作脾治
蓋腎氣虧損真元衰削是以不能化食
如鼎釜之下無
火物終不熟也 本方單用五味子吳
茱萸名五味子散治同本方除五味子
吳茱萸加茴香一兩木香五錢薰九亦
名神朮九治同
尚香亦煖胃之藥木
以疏肝和脾不使木盛刻土也○薛氏
玄案云脾胃虛寒下陷者補中益氣湯
加木香肉蔻破故紙脾氣虛寒不禁者
六君子湯加炮姜肉桂命門火衰脾土
虛寒者宜八味丸脾腎氣血俱虛者十
全大補湯送下神朮大便滑利小便秘
澁或肢体尽腫喘咳吐痰爲
腎病損宜金匱加減腎氣丸

食姜令兒岐指象形也 泰椒爲使薑黃咸
連莫冬夜明砂椒姜內入蜣
螂屎名無筋
乾薑薑薑 生用辛温逐寒邪
而發表炮則辛苦大熱除胃
冷而守中辛則散炮之稍苦
故止而不移非若
附子走而不守温經止血炮黑止吐
血皆黑則
止也 定喘消痰去臟府沉
寒痼冷能去惡生新使陽生
陰長故吐衄下血有陰無陽
者宜之亦能引血藥入氣分
藥也肉蔻逐冷消食下氣和中丁香煖

而生血故血虛發熱宜後大
熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也忌用泰藥寒藥于姜能入肺利氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因熱用從治之法故亦治目睛久赤
引以黑附能入腎而祛寒濕
能開脈絕無陽仲景四逆白通姜附湯皆用之同五味利肺氣而治寒嗽
肺惡寒煉脾濕而補脾脾惡濕通心助陽而補心氣心喜入開五
藏行通四肢閉節宣諸絡導氣湯　治寒病疼痛陰氣積于內復為寒邪所襲營衛不

脈沒痛寒痞反胃下痢多
用損陰耗氣孕婦忌之辛熱能動血王好古曰服干姜以治中者必潛上宜大棗輔之東垣曰宜甘草以緩之　母姜晒乾者為
乾姜炮黑者為黑姜
山藥古名薯蕷色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其
虛熱陰不足則內熱補陰故能清熱固腸胃
澀皮毛化痰延止瀉痢滲濕故化痰止泄百一方山藥生生半炒米飲下治禁口痢　肺

調則成痂痛實冷結硬如石或引睾丸而痛名寒痂痂有七種寒痂水痂筋痂血痂氣痂孤痂癩痂也症雖見于腎病宜本乎肝以致陰肝脈絡于陰器故也此方乃治痂之通劑以痂病多因寒濕所致也女子陰萬亦同此類○張子和曰凡遺尿癃閉陰痿胞痺精滑白淫皆男子之痂也但女子不名痂而名瘕
小腹內鬼前陰突出後陰痔核皆女子之痂也但女子不名痂而名瘕
川練子四錢木香三錢茴香二錢吳茱萸一錢湯泡
長流水煎　此足厥陰少陰藥也川練苦寒能入肝舒筋使無攣急之苦又能導小腸旁光之熱從小水下行為治痂之主藥木香升降諸氣通利三焦疏肝

爲腎母故又益腎强陰治虛損勞傷王履云八味丸但用之以强陰月爲心子又能益心氣子能令母實治健忘遺精昌按山藥性濇故家俱未言濇生揚敷瘡瘡消腫硬山藥能消熱腫益補其氣則邪滯目行丹溪云補陽氣生津能消腫硬是也色白而堅者入藥百合甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調中止涕淚涕淚肺病也紀曰肺爲涕肝爲淚心肝熱也為汗脾為涎腎為唾利二

而和脾商香能入腎與膀胱炁丹田而祛冷氣鼻藥黃入肝腎氣分燥濕而除寒三者皆辛温之品用以宣通其氣使小便下利則寒去而濕除也

天台烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛厥陰肝脉絡于陰器上入少腹疝病乃肝邪也肝主筋故牽引疼痛小腸經絡并于厥陰寒邪客于小腸少腹痛引睾丸結而不下病人胎腹甚則上沖心胸故俗亦名小腸氣古人治法往往相類

烏藥 木香 茴香鹽炒 良姜炒 青皮五錢 楝肉二十一 練子十箇 巴豆七十粒 先以巴豆微打破同川練麩炒黑去麩及巴豆同餘藥爲末酒下一錢

此足厥陰手太陽藥也烏藥散旁光冷氣能消腫止痛川楝導小腸邪熱引小便下行木香青皮行氣而平肝良姜茴香散寒而煖腎楝肉性如鉄石能下水濕堅巴豆斬關奪門破血瘕寒積皆行氣祛濕散寒之品也

疝氣方丹溪治疝氣疼痛

吳茱萸 枳殼 梔子 唐毬子即山茶俱

便治浮腫膿瘡滿寒熱瘡腫乳癰傷寒百合病行住坐卧如有鬼神狀蘇頌曰病名百合而用百合治之不識其義李士材曰亦清心安神之劾耳朱二允曰久嗽之人肺氣必虛虛則宜斂百合之甘斂勝于五味之酸收

白者入藥

蒸熟焙作維蔔辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散瘀消食丹溪曰氣升則食自降治吐血血吃嗽吞酸利二便解酒毒制

面毒豆腐精裹治有人病蒙紅
麥毒豆腐精裹女子引入宮
殿小姑歌云五灵樓閣綉玲
瓏天府由來是此中懊惱悶
懷言不盡一丸菜菔火五宮
一道土云此犯大麥毒也女
子心神小姑脾神医經菜菔
制麥毒遂以藥併菜菔治之
果愈腐漿見菜菔則催收生搗治噤口痢
止消渴塗跌打湯火傷多食
滲血故曰入多髮服何首烏
髮地黃若忌
之生姜能制其毒○夏月食
其菜數斤秋不患痢冬月以
菜葉椎屋尾上任霜雪打壓
至春收之煎湯飲治何得効
方人避稚入石洞中賊燒烟
熏之口舍菜菔一塊烟不能

炒用
荔枝核 燒存性 等分為末空心長流
水下二錢 此足厥陰藥也吳萊入厥
陰氣分温肝逐寒山梔泄三焦火熱由
膀胱出枳殼行氣而破癥山查散瘀而
磨積荔枝雙結形類睾丸能入肝腎辟
寒散滯故假之以為引也丹溪口痢病
皆以為寒証有寒而無痢者必有說以
通之可也因思此病始于温熱在經鬱
遏至久又感外寒湿熱被鬱而作痛只
作寒論恐有未盡古方以烏頭乾子等
分作湯其効亦速後因此方臨症加減
無有不應須分温熱多少而治之又有
狀虛而發者當以參水為君而佐以疎
導其脉沉緊而器大者按疎導藥即桃

毒噙汁飲之亦可王荊
公患偏頭痛楊菜能汁即
左痛注右鼻右痛注左鼻或
兩鼻齊注數十年患二注而
愈 菜菔子辛入肺甘走脾
長于利氣生能升熟能降升
則吐風痰散風寒寬胸膈發
痘疹降則定痰喘欬嘔調下
痢後重止內痛皆利氣之功
丹溪曰菜菔子治痰有衝墻倒壁之功食
医心鏡研湯煎服治氣嗽痰
喘吐膿血 炒用
白芥子 辛温入肺通行經絡

仁山查梨去黑桃仁練去殼去胡丁香
木香之類○山梔附子酒煎加塩服名
梔附湯丹溪曰烏頭治外
寒之寒梔子治內鬱之熱
橘核丸濟生治四種癭疝睾丸腫硬不
有引脇腹疼痛者四種腸癭卵
腫不痒為癭痛亦
屬水顧氣癖也皆寒湿為病
橘核 川練子 海藻 海帶 昆布
桃仁二兩 延胡索 厚朴 枳實 木
通 桂心 木香五錢 酒煮九或鹽湯
或酒下 此足厥陰藥也疝病由于寒
濕或在氣或在血症雖見乎腎癭是本
乎肝厥陰肝脉絡陰器 橘核木香能入厥陰氣

溫中開胃發汗散寒利氣治痰消腫止痛行則腫消氣行則腫止為不醋調敷治瘧腫治口噤反胃痺木脚氣筋骨諸痛痰阻氣滯久噤脚虛人禁用 丹溪曰痰在脇下及皮裏膜外非此不能達行古方控涎丹用之正此義蘇恭三子養親湯白芥子順氣定喘止嗽萊菔子消食開痞降氣各微炒研看病所主為看治老人痰嗽喘滿噫食北產者良煎湯不可過熟熟則力減 芥菜子 豁痰利氣主治畧同

分而行氣桃仁延胡能入厥陰盖分而活血川練木通能導小腸旁胱之熱由小便下行所以去濕官桂能平肝煖腎補腎命之火所以祛寒厚朴枳實盖能行結水而破宿血昆布藻帶鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱濕久亦為熱 同為散腫消堅之劑也 朱丹溪曰癭瘤不痛非痛斷房事與厚味不可若答木神曲山查白芷川芎枳實是半夏皆要藥又宜隨時月寒熱加減有挑加梔子堅硬加什硝秋夏加吳茱萸

蔓菁子 即無菁子 辛甘性熱辭毒利腸水明目 古方治目用之最多治黃疸 搗服腹脹 搗研濾汁飲或吐或利腹中口乾得汁愈疸瘕積聚小兒無痢 蜜和汁服一切瘡瘡 凡瘡疽搗敷皆良醋調敷亦療搗敷敷乳癌久取根用 傷蜘蛛毒 蔓菁菌中無蜘蛛李時珍曰蔓菁于可升可降能汗能吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世多用何哉 根搗敷除蠱脹大如斗 未服能遣毒和蜜吞 葉根俱用 搗汁雞子

清暑之劑 暑為陽邪心病離火故暑先入心從其類也已月六陽尽出于地上此氣之浮也經曰夏氣在經絡長夏氣在肌肉表實者裏必虛又熱則氣泄故經曰脉虛身熱得之傷暑亦症頭痛口乾面垢自汗嘔逆泄瀉少氣倦怠其大較也有餘症者皆後傳變也傷暑有兼傷風者有挾傷濕者有兼傷食者有冒暑欲酒引暑入內者有納涼臣室暑不得泄反中入內者有手足陰陽名暑風者有手足逆冷名暑厥者有昏不知人為中暑者潔古曰中暍為陽症為有餘中暑為陰症為不足益肺主氣夏月火盛灼金則肺受傷而氣虛故多不足凡中暑者不可作中風治

清調經者熱毒甲鹽搗不用
靈脂　辛溫散血消膿搗用乳香同功治產難
癌丹毒　即癍毒隨手即消其効如神
動疾發瘡　即油菜道家五葷之一
馬蘭覓　一名九頭獅子草　酸寒散血解
毒祛風殺蟲治諸木痔痢海上方搗汁合雞子白服治赤白痢血痢惡瘡多年惡瘡數十遍即痊燒灰敷生瘡禿瘡濕瘡
丹毒搗汁飲以利腸澄產

四味香薷飲　治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重胃汗肢倦或煩渴或吐瀉
香薷　辛溫散血消膿搗用乳香同功治產難
癌丹毒　即癍毒隨手即消其効如神
動疾發瘡　即油菜道家五葷之一
子與葉同功治產難
馬蘭覓　一名九頭獅子草　酸寒散血解
毒祛風殺蟲治諸木痔痢海上方搗汁合雞子白服治赤白痢血痢惡瘡多年惡瘡數十遍即痊燒灰敷生瘡禿瘡濕瘡
丹毒搗汁飲以利腸澄產

香薷　辛溫發汗解表利水消腫去濕和中發越陽氣以散陰邪治暑月感冒風寒頭痛發熱惡寒無汗身痛腹痛嘔吐泄瀉
厚朴　炒　苦溫除濕散滿以降濁而升清
黃連　姜炒　此手少陰手足太陰足陽明藥也香薷辛溫芳香散能入脾肺氣分發越陽氣以解心腹之凝結扁豆甘淡能清暑

葉如馬齒有大小二種小者入藥性至難燥去莖用　瓜蔞　甜瓜蒂　苦寒陽明　胃土風熱

痰涎上膈宿食　吐去七焦之痰涎宿食邪經所謂其高者因而越之在上者湧之木鬱達之是也越以瓜蒂浚之湧以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而方物通矣當吐而胃弱者代以參芦朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫鼎按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散尼跋湯並是吐藥子

暑濕降濁而升清黃連善寒能入心脾清熱解煩除煩也李時珍曰有處高堂大過飲冷水多陽氣為陰邪所遏反中入內故見頭痛惡寒之症用香薷以發越陽氣散水和脾則愈王履曰此非中暑症同冬月傷寒傳變為症不一乃為暑邪傷形此則暑熱傷氣皆元氣虛甚有一時不救者典傷寒陰毒頃刻害人實同啟是病例大開後人奪暗活人書有一實同啟是病例大開後人奪暗活人書云脈虛身熱謂之中暑乃不足之症頭痛惡寒形面拘急宜用溫散之劑脈盛身熱謂之中熱乃有餘之症頭痛肚熱大渴引飲宜清涼之劑薛氏曰中暑乃陰寒之症法當補陽氣為主少佐以解暑症之法也香薷飲乃散陽氣導真陰之劑若元氣虛犯房勞而用之者適所以

和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至四物四君以引吐成法具在今人惟知汗下和而吐法絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行漏越致結塞而成拘症輕病致重七病致死者多矣時醫皆弃古法仕人治風玄府自豆痛生命可痛也夫治風先治血血行風自滅

懊憹不眠癲癎頭痛目暈濕熱者宜瓜蒂散或合赤小豆煎或吹鼻中取出黃水濕熱諸病上部無實邪者

萫甫 能損胃耗氣語曰大吐亡陽大下亡陰先敗吐者須知氣清明巳午以前令病人隔夜勿食翌病者不拘

類編云一女子病鼽喘不止遇道人教取瓜蒂七枚為末調服其汁即吐痰如膠怙三進而病如失

冬瓜 一名白瓜 寒泄熱甘益脾利三便消水腫冬瓜任吃勿用吃勿 止消渴苗葉苦治文蛤煮湯消渴胸滿 解毒瘡腫切片傅之消渴胸滿煮冬瓜汁飲之冬瓜性急而走久病陰虛者忌之昂按冬瓜日食常物于諸瓜中尤覺宜人且味甘而不辛何以見其性急而走乎

子補肝明目止藥中所用瓜子也

絲瓜 甘平 燕頷涼血解毒殺風化痰通經絡行血脈老者

三物香薷飲治傷暑煩渴吐泄瀉再加茯苓甘草名五物香薷飲治中暑熱加黃連以泄心火濕盛則加茯苓木瓜以去脾濕 再加人參黃芪白朮陳皮名十味香薷治暑濕內傷頭重吐利身倦加昏加參芪白朮加茯苓木瓜陳草者所以助脾調中木瓜酸溫利濕收脫能于土中泄水平肝而和脾此外感而兼內傷之症故用香薷清暑解表而以諸藥專調中宮也 三物香薷飲加羌活防風治中暑兼中風僵仆痛

風三物香薷飲加乾葛名香薷葛根湯
治暑月傷風咳嗽按此方當名葛根湯治暑傷風咳嗽伯傷暑瀉泄本方加
痘瘡出不紅者蘇存性以引之消字重稀
可借其氣以引之消字用和
心本方用香薷扁豆厚朴木瓜甘草
茯神治痘症濕熱不寒白痒瘡當青之
風崩漏痘症痘瘡滑腸下乳
加香附陳皮蓽术紫蘇名二香散盆合香薷
飲香蘇飲治小感內傷身熱腹脹
為一方也治外感內傷身熱腹脹
茄根 散血消腫煮汁漬凍瘡
史國公藥酒用白茄根為君
外科以馬尿浸三日晒炒為
末點牙 茄子甘寒散血寬
即落
腸動風發病
清暑益氣湯 東垣治長夏濕熱蒸炎蒸而膈
倦精神減少胸滿氣促身熱心煩口渴
惡食自汗身重肢体疼痛小便赤澁大
便溏黃而脈虛者暑濕蒸炎脾土受傷
故肢倦便溏暑熱傷

金 辛平有毒生金屑服之殺人昂按金性堅剛重墜典血肉之体不相宜故服之至死非其性有毒也

入被金銀灼者血不潰瘍無毒可知宋瘍金粹玉世之寶器豈有毒氣哉 金制木重鎮怯故鎮心 千安魂魄雖云重墜亦藉其寶氣也古方有紅雪紫雪皆取其金銀煮汁亦假氣耳 治驚癎風熱肝胆之病肝經風熱則為驚癎失志魂魄飛揚肝屬木而畏金與心為子母之藏故其病同源一治 丸散用箔為衣鎮劑加入藥煮食鍚水銀 通靈則碎 瓦金皆畏水銀曰銀功用略同
病求即銅 酸平微毒治風癎涙鎖系十行

肺故氣促心煩口渴便赤瘡氣在上則生膿脹故胸滿惡食暑先入心汗為心液故自汗溫盛故身痛身重傷寒形表和外盛故脈大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脈虛而不足 黃芪炙 人參 白朮炒 蒼朮 神麴炒 青皮麩炒 陳皮留白 甘草炙 麥冬 五味 當歸酒洗炒 黃柏酒炒 澤泄 升麻 葛根煮煎 此手足太陰足陽明藥也熱傷氣參芪益氣而固表濕傷脾二朮燥濕而強脾火盛則金病而水衰故用麥冬五味以保肺而生津肺為水之上源火旺克金則金不能生水麥味合入參生脈生津 用黃柏以泄熱

眼惡瘡疳瘡婦人血氣心痛
止風痰合金瘡止血殺虫皆治
肝腫之病亦用醋制同刮用
金勝木之義用醋制鉛刮用
自然銅　辛平主折傷續筋骨
散瘀止痛折傷必有死血瘀
滯經絡必須磨虛
實佐以養血補氣溫經之藥
銅非煆不可用火毒金毒相
煽復投香藥熱毒內攻故有
接骨之功然多燥散之禍用
者慎之　產銅坑中火煆醋淬
七次細研甘草水飛用昔有
雁翅者雁飛
去故治折傷

鉛　甘寒屬腎墨至發之氣水
中之金金丹之母八石之祖
丹灶家
必用之安神解毒墜瘀殺虫
烏髭　劉禹錫傳曰　鉛丹即
金丹黃
丹用黑鉛加硝
黃鹽鍊成　咸寒沉重味
兼鹽鬱內用墜瘀去怯消積
殺虫治驚疳疹痢外用解熱
拔毒去瘀長肉斂瘡必用之
藥用水漂去鹽硝砂石微火
炒紫色性地上去火毒用
鉛粉主治胃高亦名胡粉錫
粉李時珍曰

而滋水清肺平肝而破滯當歸養血而
和陰補血化食而消積升葛解肌熱而
升清清氣上升能生津液又風能勝濕　澤泄泄瀉熱而
降濁陳皮理氣甘草和中合之以益氣
強脾除濕清熱也李東垣曰脾虛肺氣
先絕故用黃芪閉腠理止汗益氣脾胃既虛陰火傷其生發
之氣營衛大虧血虛以人參補之陽旺
自能生陰血也更加當歸和血又加黃
柏以救腎水蓋其寒泄火火減則心氣
得平而安也心火乘脾故用炙草泄火
而補脾少用恐滋滿也中滿者去之若
腹中急痛急縮者却宜多用咳者去人
參為清濁相干故以橘皮理之長夏濕
勝故加二术澤泄走下分消其濕熱也
濕勝則食不化沙曲辛甘寒皮辛溫消

食快氣五味麥冬人參甘微酸寒泄火
吐劇而益肺氣救庚金也陳藏器曰有傷暑
用寒涼以泄心宜清暑益氣加丹皮生
地犀角之類蓋暑傷心亦傷氣其脈必
虛以參芪補氣使能攝血斯無弊也

木方除青皮澤泄乾葛名黃芪人參湯
治暑傷元氣注夏倦怠胸滿目汗時
東垣
作頭痛時痛時止
為內傷症　本方除曰木青皮麥
冬五味加茯苓猪苓柴胡羌活防風連
翹知母名補肝湯東垣治陰汗如水陰冷
加炒柏名滋肝湯痿無力

生脈散千金治熱傷元氣氣短倦怠口渴多

鉛粉亦可代鉛丹煞羔炊米
絕鹽譬火煅又有豆粉蛤粉
維之只入氣分
不能入血分也

鐵 辛平重墜鎮心平肝走驚
療狂消癥解毒諸藥多忌之
李時珍曰補
腎藥九忌之 畏磁石皂莢
皂莢水作
薪則釜裂炭時砧上打落者
名鉄落治怒狂 如塵飛起者
名鉄精器物生衣者名鉄繡
鹽醋浸出者名鉄華時珍曰
六祇備
金氣以平木墜下十少消水
辟毒無他義也 針砂消水

人參 麥冬五味子七粒 此手太陰
少陰藥也肺主氣肺氣旺則四藏之氣
皆旺虛故脉細短氣也入參甘温大補
肺氣爲君麥冬甘寒潤肺滋水清心泄
肺氣爲臣五味酸温斂肺生津收耗之氣
爲佐蓋心主脉肺朝百脉皆歸肺朝

苦而甘者火也中有土也 **泄心經邪亦入心血分** 亦主藥 **鎮心清肝明目發汗** 為心經驚若風辛尿胡荽少卿胡王少卿胡荽多惡夢遺精胡臼昔衛悪此有通土教載云砂而驗遂解髮中絳囊墜年毒胎毒痘之即夕無憂角毒胎毒痘宜之 **止渴安胎博救方水煮一兩研** 月酒服能下死胎李時珍曰同遠志龍骨之類養心氣同丹參當歸之類養心血同地黃枸杞之類養腎同南星川烏之類祛風○多服反令人痴呆 **辰產明** 名前胡研水飛 **煩燥口渴小便不通濕痺熱瘧霍亂吐** 珍曰同遠志龍骨之類養心氣同丹參當歸之類養心血同地黃枸杞之類養腎同南星川烏之類祛風○多服反令人痴呆 **辰產明** 名前胡研水飛 **煩燥口渴小便不通濕痺熱瘧霍亂吐** 泄下乳滑胎產月酒食毒偏正石淋林暑熱邪在表則發熱在裏則滯痢霍亂發瘧在上則煩渴在下則便秘或熱泄火氣煎灼精結成石則為石淋 **滑石** 六甘草一兩 **為末冷水或燈心湯**

三次用 生用無毒火煉則有毒服餌常殺人 **惡磁石畏鹹水忌一切血** 鄭康成註周禮以丹砂石胆硝黃礬石為五毒古人用以攻邪今人痴呆 **水銀** 辛寒陰毒功能殺蟲消瘡疥蝕虱性滑重沮人肉頭瘡切不可用恐入經絡令人骨痛筋攣 **解金銀銅鉛錫毒殺** 五臟胎孕 **從丹砂燒煆而出畏磁石砒霜得鹽則凝** 調下丹溪曰泄瀉及嘔吐生姜湯下 **中寒者加硫黃少許** 此足太陽手太陰藥也滑石氣輕能解肌質重能清降寒能泄熱滑能通竅淡能行水使肺氣降而下通旁胱火退則肺氣下降故能祛暑住瀉止煩生水而利小便 **故能祛暑住瀉止煩渴而利小便也** 小便利則大便實而泄自止 **加甘草者和其中氣又以緩滑石之寒滑也加辰砂者以鎮心神而泄而下之邪熱也** 小腸為丙火心為丁火 **其數六一者取天一生水地六成之之義也** 故又名天水散劉河間同曰統治五下表裏

輕粉 辛冷 時珍曰燥有毒殺蟲治瘡
利水通便去痰消腫追涎逐水
功力與大戟芫花相似但大戟芫花
治水在腸間輕粉治水在經絡
能消痰積能消浚積十水湯
加大黃牽牛輕粉
名三花神祐丸 善入經絡驅痰藥多
用之不可過服常用 時珍曰
水飯丸
毒用火煅用砂而出再加鹽
礬煉為輕粉輕揚燥烈走而
不守今入用治瘍梅毒瘡虽
能劫風痰溫挾從牙齦出外
可暫解然毒氣深入經絡筋
骨血液相卞筋失所養變為
筋攣骨痛腿疼漏逐成瘻
瘡脏害死宜以上下前後扇
子足陽明陽胃經毒氣循經
上行至齒齦薄嫩之處而出
土茯苓 黃連 黑鉛 鉄粉 防風 薄
荷 甘草 金銀花 皂角刺 威靈仙
各等分為末每服三錢用
前煎湯調下日二服忌
茶葉魚腥發物

諸病益取其能通除上下三焦濕熱也
然惟体盛濕多之人宜服之以解暑利
水使濕熱從小便出若無濕之人而多
服此則反耗其津液而渴轉甚矣又宜
服生脈散 本方加辰砂少許清心名益元散
加薄荷少許清肺名雞蘇散加青黛少許清肝
名碧雪散治尚本方加紅麴五錢名清
六丸治赤痢赤屬挾濕傷血分紅曲能調六府之血加于姜
五錢名温六丸治白痢白屬挾濕傷氣分于姜能散濕挾
之氣本方加生柏葉生車前生藕節名三
生益元散治血淋本方加牛黃治虛煩
不得眠本方除甘草加吳茱萸一兩名
縮脾飲 清暑氣除煩渴止吐泄霍亂及
暑月酒食所傷
砂仁 草果 慎去皮 烏梅 甘草炙 各四兩
豆炒乾 葛乾二兩 此足太陰陽明藥也暑
必兼濕而濕屬脾土暑濕合邪脾胃病
矣故治暑必先去濕砂仁草果辛香温
亦有鍊服者雲母入火經時
不焦入土不腐

能制其毒
雲母 甘酸而冀益肝明目通
窮利水 產銅坑中大塊中
空有水者良
雲母 甘平屬金色白入肺下
氣補中堅肌續絕涼勞傷瘧
痢瘡腫癌痘 同黃丹熬黑貼
金瘡毒瘡之千金翼用傳
有雲母粉方能治百病 有五
色以色白光澤者為上古人
亦有鍊服者雲母入火經時
不焦入土不腐

故云服之長生 健澤泄惡羊肉

石羔 甘寒而滑體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺兼入三焦諸經氣分之藥寒能清熱降火甘能緩汗解肌甘能緩脾益氣生津止渴治傷寒發熱煩渴發斑頭痛脾胃不和中暑汗出惡風口乾舌燥胸滿大渴引飲中風狂言譫語無汗陽明頭痛發熱惡寒寒自脯潮熱肌肉壯熱陽盛生外熱小便赤澁大滑引飲

可救也按陰盛格陽七盛格陰二症至為難辨蓋陰盛極而格陽于外外熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也

堂于小便分之便清者外虛煩而內實煩也再看口中之燥潤及舌胎之深淺胎黃者為熱實白虎湯然亦有胎黑屬寒者舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則殆矣

水石寒

蔣珍曰古方所用寒水石是凝水石唐宋諸方用寒水石即石羔凝水石乃鹽精滲入土中年久結成清瑩有稜入水即化辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

陰內故治之多用煙劑加大順散香干欲之類大蒜辛熱通竅故亦治之然有陰陽二症寒熱不同治當審慎誤鶴皇曰此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳

五苓散

治暑毒入心發熱大渴小便不利及暑濕相搏自汗身重方見濕門

渴者去桂加黃連

朱丹溪滑伯仁海藏暑病不當發汗蓋暑傷心熱復氣汗為心液汗多必致亡陽惟用香干飲五苓散利水之藥使暑氣從小腸膀胱下降則病乃愈而元氣無損矣

人參白虎湯

治太陽中暍身熱汗出足冷惡寒脈微而渴方見火門

胃氣虛及病邪未入陽明者禁用

成無己曰大青龍湯曰風傷衛寒陰邪傷營乞衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重捏之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和石羔之乃重劑而又專達肌表也東垣曰石羔足陽明藥仲景用治傷寒陽明症身熱自痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣故有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱胍交額中故曰痛胍起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤投之不

吐泄藏府不調

乾姜 桂 杏仁去皮尖 甘草 等分先將甘草用白砂炒炒次入姜杏炒過去砂合桂為末每服二錢

此足太陽藥也

葛根過于飲冷食寒陽氣不得伸越故氣逆而霍亂吐泄也脾胃者喜燥而惡濕喜溫而惡寒于姜肉桂之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱胍交額中故曰痛胍起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤投之不

從仲景太陽劑藥變用

白者長細研真青水飛用近
入因其寒或用火煅則不傷
胃味淡難出若入煎劑須先
煮數十沸雞子為使 忌巴豆鉄

竹葉石膏湯 治傷暑發渴脉虛方見火門

滑石 滑利竅滲濕清氣

補脾胃寒泄熱降心火色白入肺上開膀理而發表肺主皮毛下走膀胱而行水通六府九竅津液為足太陽經本藥膀胱治中暑積熱悶吐煩渴黃疸水腫腳氣淋閉偏主石淋水泄熱痢六一散加紅曲治赤痢加干姜治白痢 吐血衄血諸瘡腫毒為蕩熱除濕之要劑消暑散結通乳滑胎

五苓散仲景治太陽病發汗後大汗出胃中

利濕之劑濕為陰邪經曰地之濕氣感則害皮肉筋脉又曰諸濕腫滿皆屬于脾濕者土之氣土者火之子故濕每能生热热亦能生濕如夏热則方物間潺也濕有自外感得者坐卧卑濕身受水雨也有自内傷得者生冷酒麵縱恣無度又脾虛腎虛不能防制也有傷風濕者有傷热濕者有傷寒濕者有傷暑濕者有中濕而祸邪不遂舌强語澁昏不知人狀類中風者濕在表在上宜発汗在裏在下宜滲泄裏證者宜实脾挾風而外感者宜解肌挾寒而在半表半裏者宜温散凡中濕者不可作中風治

時珍曰滑石利竅不獨小便也上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便溺而行水是除中下之濕熱熱去則三焦寧而表裏和濕去則關門通而陰陽利矣河間益元散通治上下表裏諸病益是此意益元散一名天元散一名六一散取天一生水地六成之之義滑石六錢甘草一錢或加辰砂〇滑石治渴非實止渴資其利竅滲去濕熱則脾胃中和而渴自止耳若無濕小便利而渴者內有燥熱宜滋閏或誤服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以為至燥之劑

白而潤者良石葦

走泄之劑宜甘草以和之

為優宜甘草 炙

乾煩躁不得眠欲飲水者少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者此湯主之 脈浮為表症仍在陝秘熱渴為府症已急用此兩解表裏

及中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐名曰水逆 表以外症未罷言裏以煩渴屬府言邪熱挾積飲上逆故外水格而不入

傷寒病滿服泄心湯不解渴而煩燥小便不利 功擅湯熱滋燥導飲生津故亦消痞良方程郊倩曰邪在上焦而治在下焦者使濁陰出下竅而清陽之在上焦者自能宣化矣心邪不從心泄而從小腸泄又一法也昂按此乃正治非又一法也乃藏實而泄其府也

小硝 芒硝即硝皮硝

辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱小硝醋製性急芒硝經煉稍緩能蕩滌三焦腸胃宣熱

推陳致新 后按致新則泄亦自氣不除則正氣不能復也

治陽強之病傷寒 經曰人之傷于寒也必病熱蓋寒變而為熱也疫痢亦多若留血停膿宜

通滯諸濕腫滿水飲水腫偏盛逆泄濁水寒邪 此或暑或濕中暑煩渴身熱頭痛膀胱積熱便秘而渴寒亂上焦疫癘身痛身重 此皆傷濕之見症也濕勝于皮膚則腫脹併于大腸則瀉泄水停心下則幅逆水寒射肺則喘咳暑先入心則煩渴五苓利小水降心火故兼治中暑煩渴疝病則金不能生水膀胱熱則陽不能化陰故便秘而渴陰陽不利則霍亂吐泄濕勝則身痛身重大抵下不通利則陰陽不能升降而變多矣

諸苓 茯苓 **白朮** 炒十八銖 **澤泄** 一兩六銖 **豬半** 兩按雜病當用桂傷寒症中表為桂夫解者乃當用桂枝兼取解表

灌之死子卽下後有一半亦用此法得活朮用治入治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之況藏府之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無堅不蕩者也病非熱邪深固閉結不通不可輕投热談伐下焦直陰故也成無已曰熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以鹹消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調味承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃朝須為使許玉卿曰芒硝消散破結敵堅大黃推蕩走而不守故二藥用須何為峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然雖傷寒可下者兼用大黃以開燥軟堅

泄热而毋子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂歟謂放謂藥自病當之故毋

黃胎似無患也 硝能柔五金化七十二種石為水生于鹵地刮鹽鍊在底者為朴硝在上有芒者為芒硝有牙者為馬牙硝置風日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝味主治略同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石為造炮煅硝上升屬火性温鹵按世人

入膀胱以化其氣使温熱之邪皆由小水而出也 若汗下之後內亡津液而便不利者不可用五苓也重亡津液亦有大热如狂小便不利而用此湯者欲使太陽經之邪直達膀胱由溺而出也大热利小便亦釜底抽薪之義陳來章曰治熱之道有三一曰肺燥不能化氣故用二苓澤泄之甘淡以泄肺而降氣一曰脾濕不能升精故用白朮之苦温以燥脾而升精一曰膀胱無陽不能化陰故用肉桂之辛热以温膀胱而化氣化陰使水道通利則上可以止渴中可以去濕下可以泄邪热也李東垣曰五苓散太陽裏之下藥也太陽高則汗而發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也小便利者不宜用然太陽病热而渴小便虽利亦宜五苓下之又曰邪在榮衛之間謂之半

玄明粉　辛甘而冷去胃中之實積蕩腸閉之宿垢潤燥破結消腫明目血塊去則腫消而目明昂按泄痢不止用大黃玄明粉以推蕩之而泄痢反止益宿垢不淨痰結不除經所謂通因通用也　朴硝煎化同蔥釀善同甘草煎入鑵火煅以去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩矣抵用代朴硝若胃虛無實熱者慎用

表牛裏五苓散分啗陰陽脫經之半表半裏也理中湯治吐泄上下之半表半裏也活人云脈浮大是表症當汗其人發熱煩渴小便赤澁當下此是表裏俱見五苓散主之　五苓利水何以能止渴生津益溫燒進于中焦則氣不得施化故津竭而小便不通也用五苓利其小水則溫熱下消津回而渴止矣亦內經通因通用之意李東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其溫陽食者有形之物也輕則消化或損穀重則方可吐下

本方去桂名四苓　汝李東垣曰無惡寒昔症不可用桂周楊俊曰五苓爲渴而小便不利者設若不渴則茯苓甘草湯足矣若但渴則四苓加石膏方可

本方加辰砂名辰砂五苓散　治小便不利本方加蒼朮名蒼朮五苓散　治寒濕本方加茵陳名茵陳五苓散　治濕熱發黃便秘煩渴本方加芫活名芫活五苓散　治上盛下虛痰陰助陽有拆危拯逆之功　正陽升用治陽寒壯熱來煩升用治伏暑拂鬱　出解地通泰積盛處咸鹵所結青皇澈　片皆六稜者長　今世用者多是經石

赤石脂　甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕　獨行方服治久傷中吐血不止　末傳小兒臍下赤腫止血而回下　俗名赤石脂

寒溫本方加茵陳名茵陳五苓散　治濕熱發黃便秘煩渴本方加芫活名芫活五苓散　治上盛下虛痰陰助陽有拆危拯逆之功　正陽升用治陽寒壯熱來煩升用治伏暑拂鬱　出解地通泰積盛處咸鹵所結青皇澈　片皆六稜者長　今世用者多是經石赤石脂　甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕　獨行方服治久傷中吐血不止　末傳小兒臍下赤腫止血而回下　俗名赤石脂

寒溫本方加茵陳名茵陳五苓散　治濕熱發黃便秘煩渴本方加芫活名芫活五苓散　治上盛下虛痰陰助陽有拆危拯逆之功　正陽升用治陽寒壯熱來煩升用治伏暑拂鬱　出解地通泰積盛處咸鹵所結青皇澈　片皆六稜者長　今世用者多是經石赤石脂　甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕　獨行方服治久傷中吐血不止　末傳小兒臍下赤腫止血而回下　俗名赤石脂

寒溫本方加茵陳名茵陳五苓散　治濕熱發黃便秘煩渴本方加芫活名芫活五苓散　治上盛下虛痰陰助陽有拆危拯逆之功　正陽升用治陽寒壯熱來煩升用治伏暑拂鬱　出解地通泰積盛處咸鹵所結青皇澈　片皆六稜者長　今世用者多是經石赤石脂　甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕　獨行方服治久傷中吐血不止　末傳小兒臍下赤腫止血而回下　俗名赤石脂

云大小腸下絕虛脫非澁劑無以固之其他澁藥輕浮不能達下惟赤石脂休重而澁直入下焦澁分故為久痢泄痢要藥冲景桃花湯明之加干姜粳米 療腸癖泄痢前帶遺精癎痙遺煬收口長肉催生下胞 經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣云胞胎不出澁劑可以下之又云固腸胃有收斂之能細辛粘下胎衣無推蕩之峻 粉水飛用 五色石脂研粉各入五臟 舌者畏赤入血分白入氣分黃者畏大黃

白朮湯治脾虛不能制水濕盛泄瀉再加茯苓仁入姜汁服名白茯苓湯治水腫本方加川楝子治水疝本方加入參澤湯名參澤湯再加甘草 合四君子亦名參澤湯治無病而渴與病產後渴者本方去桂加黍米甘草芍藥梔子黃蘗生地二味名四參湯通治表裏濕邪兼清暑熱本方倍桂加黃蘗名滑石梔子入食鹽燈草不止本方加甘草滑石梔子名竹葉湯 竹葉湯名節蔓荊子名勝胡使秘

禹餘糧 甘苦性澀手足陽明大腸用 血分重劑治欲逆下痢血閉癥瘕血崩能固下 麥子先知云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂 又能催生

石中黃粉生于池澤無砂者 良丹皮為使

浮石 一名海石鹹潤下冀降入色白体輕入肺清其上源 肺為水之上源止咳通淋軟堅除上焦痰熱消瘿瘕 痰熱所結故能軟堅瘿瘕吉凶頭頸間生瘤

而渴如中濕發黃加茵陳水結胸加禾通本方合益元散治諸濕淋澁再加琥珀名茯苓琥珀湯 謙而治小便數而欠 頻而知也本方合平胃散名胃苓湯一名對金飲子治中暑傷濕停飲食臌痛泄瀉及口渴便秘 此上下分消其濕也按機要論泄瀉有屬風屬濕屬寒屬火此因于外之感者也三因言七情感動藏氣不平亦致瀉泄此因于內傷者也亦當調六氣內則當調五藏又有因飲食所傷而泄者法當消導固風食泄者當解散因痰積上焦致大陽不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣俟泄自止 本方合黃連香薷

俞玠席上腐談云肝屬木。當浮而反沉何也肝實而肺虛也故石入水則沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉木之香。虛實之反如此。水味日久結成海帶。味鹹。性寒

瓊玖　甘微鹹涼。色白質輕。故除上焦胸膈之痰。熱生津止渴。散瘀腫。解毒去齒諸病。（初覺喉痛口腫痛）血閉（津神）能泄五金而去垢。（閉即大閉）瀉膈積。塊結核。努肉。（鹹能軟堅含之汁出）頭

猪苓湯　（仲景治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不通）成氏曰脈浮發熱上焦熱也渴欲飲水中焦熱也小便不利熱結下焦津液不通也集繩曰此浮字誤也當是脈字下脫一不字活人云脈浮有五苓散脈沉有豬苓湯按太陽篇五苓散乃豬苓湯澤瀉桂木陽明篇豬苓湯亦前三味加滑石阿膠仲景本辛甘為陽多主內

桂（半斤）**二苓澤瀉**（各四兩）**更名茯苓木散**

飲名蠹琴湯治傷暑泄瀉。本方合小柴胡湯名柴苓湯治泄瀉發熱口渴痰多寒少口燥心煩。以上三方並加姜棗煎。酌用本方治髮白及禿落。（一斤）

朮（一斤）**澤瀉**（各四兩）**更名茯苓朮散**

豬苓（件）（仲景治陽明病脈浮發熱渴欲飲水）

小便不通（成氏曰脈浮發熱上焦熱也渴欲飲水中焦熱也小便不利熱結下焦津液不通也集繩曰此浮字誤也當是脈字下脫一不字活人云脈浮有五苓散脈沉有豬苓湯按太陽篇五苓散乃豬苓湯澤瀉桂木陽明篇豬苓湯亦前三味加滑石阿膠仲景本辛甘為陽多主內

番者白如明礬出南番者黃

口桃膠能制汞噁（同蓬砂硇砂並可作金銀銕）

硇砂（硇者咸）**石銕**　鹹苦辛熱有毒消食破瘀。治噎膈癥瘕。去目翳。解肉煖子宮助陽道。（性大熱能爛五金木草稍其能化人心為血亦甚言不可多服耳凡煮硬肉及少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功難舉方云人之藏府多因觸犯成病而脾胃最易交觸飲食過多則停滯難化。於熱不調則嘔吐泄痢而膏粱者為尤甚曰腹不飢但陽明為表之裏不當言脈沉又詳少陰篇下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之。蓋不言脈沉。然陰陽之脈必沉也以此推之成氏隨文誤釋明矣昌按猪苓湯味淡氣寒雖三焦通利之藥其實太陽藥也成氏註釋深為當理仲景列之陽明篇亦用治少陰渴利取其降火行水則利自止煩渴自退乃瀉少陰之府以安少陰之經非正法少陰藥也若謂其治少陰病便為少陰藥太陽亦有用四逆者豈四逆便為太陽藥乎且以脈浮為不浮在書中無此文法）**少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠**（下利不渴者裏寒也渴者陽邪入裏心煩不眠知炎熱也欬而嘔渴有停飲也渴而不利則小便後不利是熱邪已入膀胱也宜利小便則熱降而便實）**通泊瀉熱黃疸口渴溺赤**

須用消化藥或言飲食既傷于前難以毒藥反攻其後不使砒砂巴豆等只用麴蘗之類不知古今立方用藥各有主對蓋藥上能消化米谷如傷肉食則非砒砂阿魏不能治也如傷魚蟹須用橘葉紫蘇生姜傷菜果須用丁香柱心傷水飲須用牽牛芫花必審所傷之因對用其藥則無不愈其間多少則隨患人氣血而增損之而已又有虛人沉積不可直取當其蛤賃以藥益蜡能久留腸胃又不傷氣能消磨至尽也又有脾虛飲食是化者正宜助養脾胃自能消磨页天須用乾化藥耳病久積聚成痰痩者須用三稜蓬朮之類寒冷成積者輕則附子原朮重則硇石硫

猪苓 茯苓 澤泄 滑石 阿膠 各一兩

此足太陽明藥也熱上壅則下不通下不通熱益上壅又濕鬱則爲熱熱蒸黃爲濕故心煩而嘔渴便秘而發黃也淡能滲濕寒能勝熱茯苓甘淡滲脾肺之濕猪苓甘淡澤泄鹹寒泄腎與胱胱之濕滑石甘淡而寒体重降火氣輕解肌通行上下表裏之濕阿膠甘平潤滑以療煩渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降而三焦俱清矣異

黃疸血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之

出

西戎乃鹵液結成狀如塩塊置冷濕處即化白淨者良水飛過醋煮乾如霜用畏酸忌羊血

慈石 辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱通耳明目耳爲腎竅腎水足則目明治蘢腎周痺骨節痠疼腎主骨

驚癎重鎮重鎮軟堅 膩柿誤呑針失下鉄服止金瘡血十刻目重可去去慈石鉄

鶴草曰以諸藥過燥故又加阿膠以存津液按徐之才曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也王好古曰滑石爲至燥之劑益皆以行水之藥爲燥而不以燥熱之藥爲燥也故陶隱居欲于十劑之外加寒熱三劑愚所著本草備要則以熱藥爲燥劑而以行水屬通劑矣五苓泄濕勝故用桂木猪苓泄熱勝故用滑石

茯苓甘草湯仲景治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水却治其厥不爾水漬入胃必作利也大陽症飲水過多水停心下必悸火畏水故心惕惕然動不自安也亦治傷寒汗出不渴者經曰傷寒汗出不渴者此工之汗而不渴爲邪熱未入裏故但解

粉之屬是也經疏曰石藥皆有毒独慈石中和無悍猛之氣又能補腎益精然体重潰酒傻千丸散時珍曰一十病日漸生翳珍以羌活勝濕湯加減而以磁朱丸佐之兩月而愈蓋磁石入肝鎮養眞陰使神水不外移硃砂入心鎮養心血使邪火不上浸佐以神曲消化滿氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰宝之理方見孫眞人千金方但云明目而未發出用藥微義也 **色黑能吸鉄者眞火煆醋淬礦汞水飛或醋煮三日夜用柴胡爲使殺鉄銷金眞牡丹**

表利水而兼利中 **亦治膀胱府欬欬而遺溺**

茯苓 **桂枝**二兩 **甘草**一兩 **生姜**三兩

此足太陽藥也淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲温能發汗解肌故用姜桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草按悸症有過汗而悸者有吐下而悸者有氣温而悸者惟飲之爲悸甚于他邪以水停心下無所不入侵于肺則咳傳于胃爲嘔溢于皮膚爲腫潰于腸間爲利故經曰先治其水後治其厥厥爲邪之深者狀先治水況病之淺者乎 **本方去生姜加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯**仲景 **治傷寒吐下**

礦石 甘鹹有毒体重沉墜色青入肝制以硝石能平肝下氣爲治驚利痰之聖藥吐痰水去以石未參之痰即隨下玉隱君有疎石化痰丸能治百病礦石炤硝各二兩煆研水飛淨一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩俱各五錢爲末水丸量虛実服時珍曰風水太過來制脾土氣不運化積滯生痰痰塞胸中二焦変生諸病礦石重墜硝性疎快使痰積通利諸症自下氣病腑虛者禁服 **堅細青黛甲有白星點硝石礦石等分打後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振搖者**逆滿氣衝寒邪伏飲上傳于膈也故令以茲況爲任裏且既經吐下復發其汗則陽益虛而津液振故振搖也與此湯導飲和中益陽固精 **金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩**

小半夏加茯苓湯金匱三因名小半夏湯 **治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸**水氣上逆則嘔水停腸間則痞上干于頭則眩逆于心則悸 **半夏**一斤 **生姜**半斤 **茯苓**三兩 **此足太陽明藥也半夏生姜行水氣而散逆氣能止嘔吐茯苓安心氣**

碎拌勻入先鍋煅至硝性盡
石色如金屑度如無金星者
不入藥研末水飛去硝毒用

代赭石 養養血氣平血熱
入肝與心包帶沼二經血分
之病吐衄崩漏胎動產難小
兒慢驚頑方半錢冬瓜仁湯調服金瘡長
肉仲景治傷寒汗吐下後心
下痞硬噫氣用代赭旋覆
湯取其重以鎮虛逆亦以養
陰血也今人用治膈噎甚効
煅紅醋淬水飛用乾薑為

而泄腎邪能利小便以因水而下行則
悸眩止而痞消矣 本方除茯苓名小
半夏湯金匱治亥欬嘔吐不渴亦治黃疸
金匱云嘔家本渴渴者為欲解今反不
渴心下有支飲故也小半夏湯主之○
嘔吐津液去必渴不可因渴而逐以為熱本方除茯苓生姜
加人參白蜜名大半夏湯金匱治反胃食
入即吐李東垣曰半夏生姜之類治嘔
入即吐但治上焦氣逆若真之病者
胃虛敗氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜
治胃進揚谷氣而已勿作表實用半夏
泄之故服小半夏湯不愈若服
大半夏湯立愈此仲景心法也
加味腎氣丸金匱腎氣丸即桂附八味丸
治婦人轉胞虛煩小腹

儲雄附

禹餘糧石 酸澁寒帶入肝經

血分能化瘀血為水止金瘡
出血刮木傳之即合仍不作
瘕同方治損傷部血胎
產惡血血運有花乳石散下死胎胞衣惡
化則胞胎無阻 出陝華伐池佟堅
色黃煆研水飛用

爐甘石 甘溫陽明胃經藥受

金銀之氣金勝木燥勝濕故
止血消腫收濕除爛退赤去
此足大陰少陰藥也土為萬物之母脾

諸方集解 卷四 加味腎氣丸 四八

硇砂 鹹寒入肝胃

治脾腎大虛肚腹大四肢浮腫噎急
痰盛小便不利大便濇黃色成塊赤
白消渴飲一溲一經曰腎者胃之關也
陽門不利故腫水而
從其類也上下溢于皮膚故為附腫腎
病者腎水衰竭龍雷之火不安其位上
炎于肺消渴引飲飲入于胃下無火化
直入膀胱故飲一溲一也用硇附辛熱
引真火歸元池黃純陰壯
真水歸腎為治下消之劑
熟地黃兩茯苓三兩山藥微炒丹皮酒洗山
萸肉酒潤澤泄酒浸川牛膝酒炒車前子微炒肉
桂一兩附子製熟去皮臍五錢 蜜丸
此足大陰少陰藥也土為萬物之母脾

翳爲目疾要藥　產金銀坑中金銀之苗也狀如羊腦髮似石脂能點赤銅爲黃（今之黃銅皆其所假火紅童便淬七次研粉水飛用

陽起石　鹹溫補右腎命門治陰痿精之子宮虛冷腰脊冷痺水腫癃瘕（寇宗奭曰凡石藥發癰疽皆有毒宜酌用按經曰石藥發癰芳草發征芳草之氣疾石藥之氣浮二者相遇恐內傷脾）出密州陽起山雪毋根也雖大雪遍境此山獨無以雲頭雨脚覺鶩毛色白滋潤者良（真者難得）火煆醋淬七次研粉水飛用亦有用燒酒煮膽升陳取粉者緊螵蛸爲使惡澤泄菟絲子鳥羊血

鍾乳　甘溫陽明氣分藥（胃本）石之精强陰益陽通百節利九竅補虛勞下乳汁服之令腎氣其閉始聞胃中稿水始下以陽土開故也閉開飢不用茯苓午夕車前而水亦下開閉則車前茯苓用至無算物莫之如何矣用方者將君附子乎抑君茯苓乎（何柏齋曰造化之机水火而已宜平不宜偏宜交不宜分火宜在下水宜在上則易交也交則爲既濟不交則爲未濟分而離則死矣消渴症不交而火偏盛也水氣症不交而水偏盛也乾始坤成至其交合變化之用則水火一氣也大旱物不生火偏盛也大澇物亦不生水偏盛也人之藏府以脾胃爲主然脾胃能化物與否實由于水火二氣非脾胃之能也火盛則脾胃燥水盛則脾胃濕皆不能化物乃生諸病水腫之病蓋水盛而火不能化也導水補火使二氣和平則病去矣經曰火爲陽陽之根水爲陰之源而水與火之總根兩腎之間動氣是也余于五行之中獨重水火而其生尅之妙用又與世論不同

虛則土不能制水而洋溢水爲萬物之源天一生水腎虛則水不安其位而妄行以致洩瀉脹胕之證不待言矣（經曰毋盛毋虛盛則人病虛則人病）味先滋真陰而能行水地黃茯苓澤瀉桂附皆能行水桂附補命門火火能補命火因以強脾（桂附補命門火火能生土土强則能防水腸能化陰陰化則便溲通）加車前利小便而不走氣加牛膝益肝腎藉以下行故使水道通暢肝已又無損于真元也（喻嘉言曰按此方治生以附子桂君此薛新甫重訂以茯苓爲君然腎之關門不開必以附子回陽溫動

人陽氣暴亡飲食倍進形体壯盛然其性慓悍須命門眞火衰者可偶用之若藉以慾慾多服久服不免淋渴癉疽之患 出洞穴中石液凝成下垂如冰柱通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲光明者眞煉合各如本方蛇床爲使惡牡丹畏紫石英忌參术羊血蔥蒜胡荽

白石英 甘辛微溫肺大腸氣分之藥潤以去燥利小便實大腸治肺痿吐膿咳逆上氣俱係石類祇可暫用十劑日濕可去枯白石英紫石英之屬是也坡潤藥頗多石藥終燥而途之才取二石英爲潤劑存其意可也 白若水晶如紫石英而差大

紫石英 甘平性溫而補重以去怯溫以去枯入心肝血分故心神不安肝血不足女子後天卦位艮土居坎水之次也堅者爲石最堅者爲金可見水生金先天一原也肺爲上之子先補其子使不食母之氣則母不哀亦見金生土之義矣至于不能納氣歸元必壯水之主或益火之原水向火中生矣混沌之初何嘗有牛生豈有反剋之理木乃生生之氣始于東方春升之氣也陽氣也元氣也胃氣也同出而異名也譬之種樹而以潤之風以散之日以暄之使得遂其生發長養之天而已矣及其生意將竭則又當斂其生生之氣于水上之中以爲來春生發之本焉有伐之之理乎此東垣脾胃論用升柴以疏木氣諄諄言之也但木及兩調氣散及归根復命之理耳余特由五行妙用尚以水火爲重也又曰人身水火原自均平偏者病也火漏多者補水配火不必去火水偏多者補火配水不必去水譬之天平此重則彼輕一邊重者只補足輕者之一邊決不鑒去法碼今之欲泄水降火者鑒法碼者

世人皆曰水尅火而余獨曰水養火世人皆曰金生水而余獨曰水生金世人皆曰土尅水而余獨于水中補土世人皆曰木尅土而余獨升木以培土若此之論誰則信之詎知君相二火以腎爲宮水則火者後天有形之水火水養火者先天無形之水火也今之言補腎者人參黃芪清肺者黃芩麥冬欲肺者五味訶子泄肺者蘆歷枳殼病之輕者尚無一効若本源虧損者毫不相干蓋肺金之氣夜卧則歸藏于腎水之中肺名嬌藏畏寒畏熱腎中有火則水冷金寒而不敢歸或爲喘脹爲咳嗽爲不食鼻上若竅家之狗性收斂之僅似有理然不得其門從何而入广齋曰肺出氣腎納氣肺爲氣之王腎爲氣之本腎虛不能納氣歸元必壯水之主或益火之原水向火中生矣混沌之初何嘗有牛生之而水之疑結處始爲土此

血海虛寒不孕者宜之（衝為血海任主胞胎經疏云女子係胞于腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕柴石莫走二經散風寒鎮下焦為溪干宮之要藥）色緑裳薑澈五棱火煅醋淬七次研末水飛用二兩　俱畏附子惡黃連五色石英各入五藏雄黃　辛温有毒得正陽之氣入肝經氣分搜肝強脾散百節大風殺百毒辟鬼魅治驚癎痰涎頭痛肢運暑瘧癖瘕

泄瀉積聚（廣雅公道中胃暑泄瀉積聚泄痢速月夢至仙居延之坐壁有詞云見毒在脾溫氣連脚不泄則痢不痢則瘧独康雄黃蒸餅和藥丸章作湯食之安樂別作治瘧醫家大錯如方服之遂愈）又能化血為水煥温殺虫治勞疳瘡疥蛇傷赤似雞冠明澈不見重三五兩者良（孕婦忌之醋浸入蒸熊汁煮乾用生山陰者名雌黃功用緊同劣者名雚黃燒之則見只堪雚疥殺虫亂）

越婢湯金匱治風水脈浮身重汗出惡風（辨見前）及諸風諸温（麻木身痛按東垣曰麻木為風三尺童子皆知之細核則有區別如久坐亦麻木繩縛之人亦麻木非有風和乃氣不行也當補肺氣麻木自去矣愚謂因其氣虛故風邪入而提之所以風為虛象氣虛其本也）

麻黃六兩　石羔八兩　生姜三兩　甘草二兩　大棗十二枚　惡風者加附子

此足太陽藥也風水在肌膚之間用麻黃之辛發以泄肺石羔之甘寒以清胃風水從毛孔出又以姜棗為使調和營衛不使汗漏積聚泄痢速月夢至仙居延之坐壁有詞云見毒在脾溫氣連脚不泄則痢不痢則瘧独康雄黃蒸餅和藥丸章作湯食之安樂別作治瘧醫家大錯如方服之遂愈）又能化血為水煥温殺虫治勞疳瘡疥蛇傷赤似雞冠明澈不見重三五兩者良（孕婦忌之醋浸入蒸熊汁煮乾用生山陰者名雌黃功用緊同劣者名雚黃燒之則見只堪雚疥殺虫亂）

越婢湯金匱治風水脈浮身重汗出惡風（辨見前）及諸風諸温（麻木身痛按東垣曰麻木為風三尺童子皆知之細核則有區別如久坐亦麻木繩縛之人亦麻木非有風和乃氣不行也當補肺氣麻木自去矣愚謂因其氣虛故風邪入而提之所以風為虛象氣虛其本也）

麻黃六兩　石羔八兩　生姜三兩　甘草二兩　大棗十二枚　惡風者加附子

此足太陽藥也風水在肌膚之間用麻黃之辛發以泄肺石羔之甘寒以清胃風水從毛

石硫黃　味酸有毒大熱純陽
硫黃陽精極熱典大黃極寒並號將軍　補命門
真火不足性雖熱而疏利大
腸與燥濕者不同　熱藥多秘
而能通寒藥多泄惟硫黃慶
黃連肥腸而止痢　若陽氣
暴絕陰毒傷冀久思寒瀉脾
胃虛冀命欲垂盡者用之亦
救危妙藥也治寒痺冷癖足
寒無力老人虛秘　局方用半硫丸婦
人陰蝕小兒慢驚煖精壯陽

痛加芍藥喘加麻黃有寒加細辛氣上
衝加桂枝熱痺加黃芩寒多製痛加姜
桂濕盛加茯苓暮來氣滿堅痛加陳皮
枳殼蘇葉　此足太陽太陰藥也防已
大辛苦寒通行十二經開發泄濕爲治
風腫水腫之主藥黃芪生用達表治風
注膚痛濕分肉實腠理白朮健脾燥濕
與黃芪並能止汗爲固防已性險而捷
故用甘草甘平以緩之又能補土制水
爲佐姜棗辛甘發散調和營衛爲使也

殺蟲療瘡辟鬼魅化五金能
乾汞　王好古曰大白丹水復
丹皆用硫黃佐以硝石
至陽佐以至陰與伸景自述
湯佐以入尿猪胆汁意同所
以治內傷生冷外冒暑濕霍
乱諸病能除行格之寒兼有
伏陽不得不再如無伏陽以
是陰虛更不必以陰藥佐之
表堅志云唐與正亦知醫能
以意治病與巡檢病不得瀉
卧則微通立則不能滑滴漏
用通藥不効更間其平日自
製黑錫丹常服回悟曰此必
結砂時硫飛去鉛不死鉛砂
入胸脘即偏重倘可瀉立
則正塞水道故不通取金液
丹三百粒分十服釀麥湯下
鉛得硫則化水道遂通家母

本方去白朮姜棗加茯苓　爲佳
防已茯苓湯　金匱治水在皮膚風肢聶聶
而動名皮水　黃芪走皮膚桂枝走肢節
按五水脈浮惡風骨節疼痛名風水脈
浮脈腫按之没指其腹如鼓不惡風不
渴名皮水當發其汗又云惡寒不渴名
風水不惡寒而渴名皮水假令皮水不
渴亦當發汗脈沉遲而喘名正水脈沉
腹滿不喘水積胞中堅滿如石名石水
脈沉遲發熱脚滿身
腫汗如柏汁名黃汗　本方加人參一兩生
姜二兩防已白朮各增三倍名防已湯　活
治風濕脈浮多汗身重　中風之脈陽浮
而滑陰濡而弱
風來乘虛變爲風濕忌發
汗誤汗者以此湯救之

幼童時亦病溺盆服通淋藥
罔効老医黃五聚視之曰此
乃外皮窻小故溺時艱难非
淋症也以牛骨作楔塞于皮
端竅漸展開勿藥而愈使重
服通利藥得不更変他症乎
乃知医理非一端也○硫能
化鉛為水修煉家尊之為金
液丹　番舶者良难得取色黃堅
如石者以醋煎空入硫合
定糠火煨熟去其臭氣以紫
背浮萍煮過消其火毒以皂
莢湯淘其黑漿一法絹袋盛
酒煮三日夜一法入猪大腸

腎

腎者胃之關也主蟄藏精與志
腎有寒熱虛實之分

腎氣湯　金匱一名甘
草乾薑湯　茯苓木湯　治傷濕身重腹痛腰
冷不渴小便自利飲食如故病屬下焦
腎主水濕性下流必合于其所合而歸
于坎勢也腰為腎之府冷濕之邪着而
不移故腰冷身重是着痺也此由宣明
身勞汗出衣裏冷濕久久得之　宣明
用治胞痺膀胱光熱痛澁干小便上為清
涕風寒濕邪客于脾中氣不能化故水
道不通足太陽經上額絡腦太陽經
氣不得下行上入膲而流于鼻則為清涕

乾姜炒　茯苓四兩　甘草炙　白朮炒二兩　有巢
者加附子　經驗加肉桂澤瀉杜仲
牛膝治同　肚足少陰太陽藥也干姜

爛煮三時用黃細辛諸藥醋
士瘀黃辛熱腥臭止可入
瘡藥不可服餌
石蟹　鹹冀治黃盲目翳天行
熱疾解一切金石藥毒醋磨
傅瘡腫　出南海身全是蟹
而質石也細研水飛用
無名異一鹹入血甘補血治金
瘡傷折瘡腫毒醋磨塗痛
生肌人受杖特須服三
五个不甚痛傷
生

川廣小鹽石子一包煅百枚
礬石 辛熱有大毒治堅癖痼
冷寒濕風痺（癍禁曰攻積冷之病最良別錄曰不錬服殺人此石生于山無雪入水不水時珍曰性氣典硇石相近博物志言鶴伏卵時取此石暖足謬也）
有蠶宮數穰火燒但解散不能脫其堅置水不凍者是惡
羊血
硇砂 辛苦而鹹大熱大毒硇霜光烈能爆疥疗作吐瀉

治腫脹暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛朝暮俱急爲氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下者皆難治腫脹唇黑則傷肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足心平則傷腎皆平則傷肺皆不可治腹脹身熱脉大者是逆也多死
黑牽牛 四兩炒 大黃二兩酒浸 甘遂麵裹煨 大戟麵裹煨 芫花醋炒 青皮炒 陳皮紅一兩 木香五錢 檳榔一兩 水一升煎一錢 此足太陽藥也牽牛大黃大戟芫花甘遂皆行水之屬劑也能通行十二經之水然腫屬于脾脹屬于肝水之不行由于脾之不運脾之不

瘡瘍疥在肉腸截瘧除哮外用鮓散肉殺蟲枯痔一出信州故名信石衡州次之鈆之苗也（故錫重亦云有毒）生者名砒黃
鍊者名砒霜異經云（冷水羊血）
石灰 辛溫性烈能堅物散血
定痛生肌止金瘡血（臘月用黃牛肥汁和納肥猪中陰乾用未瘡重生一瘡久遂成痛百藥不効白度必死一村人見之曰此蕴濁也以石灰溫泡煮洗却痒即是也洗不數次遂愈）
由于木盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香疏肝泄肺而健度與陳皮均爲導氣燥濕之品使氣行則水行脾運則腫消也輕粉無毒不入能去積滯故少加之然非實症不可輕投
本方減芫花大戟青皮陳皮木香加芒硝郁李仁名濟川散姜湯下五分治同
疏警飲子 治遍身水腫喘呼口渴大小便秘（上症爲溫熱其而氣尚實也此爲陽水見陽症脉必沉數陰水見陰症脉必沉遲）
羌活 秦艽 桔梗 商

肉減骸亞和藥解酒酸酒家多用之然有灰之酒傷人內用止泄痢崩帶收陰挼或產後玉門不閉煮菌黃水泡澄免玉治清煩洗　月消積聚結瘕風化者良壙灰毒巳出主頑癬膿水淋漓歛瘡口九妙蠶　酸鹹而寒性澀而收燥濕追涎化痰墜痛解毒生津除風殺蟲止血定痛通大小便醫鵝肉生好肉除瘡熱在

陸櫧　大腹皮　茯苓皮　木通　澤泄　赤小豆　等分加姜皮煎

此足太陽手足太陰藥也外而一身盡腫內而小溲便閉是上下表裏俱病也羌活秦艽解表疏風使濕以風勝邪由汗出而去之于上腹皮苓皮姜皮茯苓散滲所以行水于皮膚以皮行皮商陸椒目瓜蔞葶藶牆所以行水于腹裏通大小便以泄肺之水達于小腸瀉泄脾腎之水通于膀胱光三棄泄水月寬傷火也上下內外分消

骨碎補　續斷　所以補腎故骨癢而痛落　治齲齒痛而痛喉脾齒痛風腫鼻痔瘡肉崩帶脫肚陰蝕陰挺陰肉挺出宜用艾灸之火乃瘡瘍瘡疥癬虎犬蛇毒咬傷李時珍曰龍吐風熱疾證取其酸苦涌泄也治諸血痛陰挺脫肚疮瘍取其酸澁而收也治風眼瘡歛泄瘡前帶取其收而燥濕也治喉痺瘡蟲蛇傷取其解毒也多服損心肺骨髓寒宗爽曰却水故也書上水不能滿故知其性却水也李逑曰凡發背當服蠟紮丸以護膜防毒氣內其勢亦猶伸禹疏江鑿河之意也經自腎何以主水腎者至陰也至陰者盛水也脈者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也腎何以聚水而生病腎者胃之關也關則不利故本聚而從其類也故水病下爲附腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲涎不得臥喻嘉言曰胃爲水谷之海五藏六府之原脾不能散胃之水精于肺而病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能司胃之開時其輸泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古曰水者脾肺腎三經所主有五藏六府十二經之劑分上頭面中四肢下腰脚外皮膚中肌肉肉筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不可執泄當知病在何經何藏方可用之按水腫有痰阻食積血瘀致清不升濁不降而成者有濕熱相生遂道阻塞而成者

攻擊一兩黃蠟七錢溶化和丸每服十九漸加至二十九日服百丸則有力此藥護膜托裏解毒化膿之功甚大以白礬茶芽搗末冷水服解一切毒　取潔白光瑩者煉用又法以火煅地酒水干上取礬布地以盤盛之四面灰擁一日夜礬飛盤上掃收之爲礬精末盡者更如前法再以陳苦酒醋化之名礬華七日可用百日彌佳甘草爲使畏麻黃惡牡蠣　肝生用　蛤解毒

有燥渴沖激秘結不便而成者症屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰弱而成者有小便不利水液妄行脾莫能制而成者症屬不足宜分別治之然其源多因中氣不足而起醫者治腫滿先以脾土爲主宜補中益氣湯之君子湯或疑水脹渴滿而用純補之劑不益服滿乎曰肺氣既虛不可復行其氣腎水既衰不可復利其水純補之劑初覺不快過時藥力得行漸有條理矣昂按此即內經寒因寒用之意

實脾飲嚴氏治肢体浮腫色悴聲啞口中不渴二便通利脾胃虛寒土不能制水故水妄行而浮腫以無大熱故曰不渴而便不秘此爲陰水嚴氏曰治陰水發腫用此先實脾土

白朮土炒　茯苓　甘草　厚朴姜炒　大腹子

煅用
去肌

胆礬一名膽礬百胆酸澁辛寒入少陽胆經性斂而能上行涌吐風熱痰涎發散風木相火治喉痺醋調服吐痰涎立効款逆癇癎崩淋能殺蛊治牙虫瘡毒陰蝕　産銅坑中乃銅之精液故能入肝胆治風木磨鉄作銅色者眞形似空青鴝鵒色爲上　市人多以醋澡青礬僞之畏桂花辛寒白微

甘草煎　木香　木瓜　附子　黑姜　加姜棗煎　此足大陰藥也脾虛平胃然土之不足由于木之有餘木瓜酸温能于土中瀉木兼能行水與木香同爲平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣經曰濕勝則地泥泄水正所以實土也　朱丹溪曰治水腫宜清心火補脾土火退

皂礬一名絳礬酸涌滴收燥濕化痰解毒殺虫之功與白礬同而力差緩主治略同白礬利小便消食同健脾消食藥爲丸散療癇醋調噙汁時珍曰服滿黃腫瘧痢疳疾方往往用之其源則自仲景風礬右硝石治女勞黃疳方中亦化而來 深青堊淨者良煅赤用煅赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾濕張三羊治腫滿有伐木九若木二斤水泄浸苗酒丐曲四兩炒絳礬一斤醋拌晒乾入銃火煅爲末醋糊丸酒下或云皂礬乃鍛之精液用酸製以平肝粉于針鉄不必忌鹽後亦不發多服令人泄

青鹽即戎鹽甘鹹而寒入腎經助水藏平血熱治目病赤濇吐血溺血齒舌出血堅骨固齒察牙齒明目烏鬚餘同食鹽出西羌不假煎鍊方稜明瑩色青者良

食鹽鹹甘辛寒鹹潤下故逼大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤瘡腫血熱亡疾鹹補生姜一方五加皮易陳皮羅氏五加皮易桑白皮治病後脾肺氣虛而致腫滿此足太陽太陰藥也五加祛風勝濕地骨退熱補虛生姜辛散助陽水為陰邪大腹下氣行水茯苓滲濕健脾于散瀉之中猶寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

麥門冬湯治水溢高原肢体皆腫經曰三焦者決瀆之官水道出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中脘下焦不治水far胕胱脫○經曰三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留則為脹

則肺氣下降而水道通脾旺則運化行而清濁分其清者復回爲氣爲血爲津爲液濁者爲汁爲溺而分消矣又曰水病當以建脾爲上使脾實而氣通則水自行宜參苓爲君視所挾症加減苟徒用利水藥多致不救喻嘉言曰治水以實脾爲先不但陰水爲然○陰水者少陰腎中之直陽衰微不能封閉而汎溢無制耳方中不用桂而用厚朴附子尚有可取耳○按治水有三法實土者守也泄水者攻也兼之發汗爲三法三治備棄者庸醫以取勝也

五皮飲漾濱察治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫脾虛不能制水故傳化失常腎水泛溢反漬脾土壅塞經絡散溢皮膚半身以上宜汗半身以下宜利小便

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮

心故治心虛以水制火取既下焦少陽經氣当相火之化相火有其經無其府藏脈行于五者之間故曰少陽為將部其經脈上布膻中絡心包下出委陽絡膀胱豈非上佐天施下佐地生典手厥陰相表裏以行諸經者乎故腎經受邪則下焦之火氣鬱矣鬱則水精不得四布而水聚矣火鬱之久必發則典衝脈之屬火者同逆而上衝為十二經脈之梅其上者出項額診諸陽灌諸精其下者並少陽下足診三陰灌諸絡由是水從火溢上積于肺而為喘呼是之謂歟　水門冬五十枚去心　姜炒　糯米五十粒

此手太陰藥也吳鶴皐曰肺非無為也逆本經治喘逆惟哮症忌之鹹軟堅故治結核積聚又能通吐醒酒胰水火鮮毒火熱即毒也能散火凉血殺虫渐西將軍中蜘毒每夕蜘鳴于体一僧教以塩湯浸身数次而愈定痛止痒体如虫行風熱也塩湯浴三四次能亦治一切風氣比湯火傷急以塩水渗之護肉不坏再用藥傳多食傷肺走血滲津發渴經曰鹹走血血病毋多食鹹食鹹則口乾者為能滲胃中津液也凡血病咳喘水腫消渴入為尽忌塩品頗多江准南北塩生于海

飲食入胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱肺熱則失其下降之令以致水溢高原洗于皮膚而為水腫鬱畢明乎此宜脾導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源粳米益脾培乎生金之母此治病必求其本也或問此證何以辨之曰肢体皆腫少腹不急初起便有喘滿此其候也羌活勝濕湯方治濕氣在表頭痛重或

山西解州鹽生于池四川雲南鹽生于井伐塩生于土光明鹽或生于階底山崖或産于五原鹽池狀若水晶不假煎煉一名水晶塩石鹽生于石木塩生于樹蓬塩生于草造化之妙誠難窮矣

急流水 性速而趨下通二便

風痺之藥宜之 昔有病小便閉者衆不能療張子和易以急流水煎前藥須一飲而漫時珍曰天下之水激火濡沸則同至十性從地變質與物迁未嘗同也

逆流迴瀾水 性逆而倒上中

風卒厥昏吐瘀飲之藥宜之

甘瀾水 用流水以瓢揚方遍亦曰劳水 水性鹹

而重劳之則甘而輕伸景用煎傷冀劳傷劳藥取其不助

賢氣而益脾胃也

井泉水 將且首汲曰井華水

出鄽未放曰無根水無時初出曰新汲水 角抗陽煩渴煩燒病不可解者折汲水浸青衣五劑之妙心閉汗出新汲水釜和飲妙 **煎煮之藥宜之** 井以有地脈山泉者為上從江湖溪來者次之其城市近溝渠污穢

表六者辛温升散又皆解表之藥便温

從汗出則諸邪散矣 蒙本專治太陽寒風濕升脈故当發散為陽氣味甘平發中有補也 **若水濕在裏則當用行水滲泄之劑** 喻嘉言曰經曰濕鬱甚濕傷者二陳平胃之類主之濕盛濡弱濕者五苓六一之類主之水腫發黃者五皮茵陳之類主之今濕流關節非前藥所宜矣無竅不入惟風為能故凡関節之病非風藥不能到也三因用此湯加柴胡五分治邪而多驚悸多靨漫者在少陽脈陰也加淋加澤瀉五分經曰肝腎之病同一治此下焦風寒三經合病非風藥行經不可也

急流水 性速而趨下通二便

風痺之藥宜之 昔有病小便閉者衆不能療張子和易以急流水煎前藥須一飲而漫時珍曰天下之水激火濡沸則同至十性從地變質與物迁未嘗同也

逆流迴瀾水 性逆而倒上中

風卒厥昏吐瘀飲之藥宜之 風吹則乾

羌活 獨活一錢 川芎 蒙本 防風 蔓荊子三分 如身重腰中沉

甘草 五分炙

沉然中有寒濕也加酒洗漢防巳附子 如物之濕

此足太陽藥也經曰風能勝濕 風頭痛通用之方

羌獨蒼菁防蔓荊藁也濕氣在

者醎而有酸煮粥煎茶味各有異以之入藥其可無擇乎

百沸湯 助陽氣行經絡汪頌曰湯須百沸者佳寇宗奭曰患風冷氣痺火以湯淋脚至膝厚衾取汗然別有藥特假陽氣而行耳四時暴泄病四肢剤腹冷坐深湯中浸至膝上生陽之藥無速于此張從正曰此傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯或酸薑水探肚探吐汗出即已昌按感胃風寒吐汗出而以熱湯澡浴亦発散之一法故内経亦有可湯熨可浴及摩之浴之之義備急方治心腹卒脹痛欲死者熱湯以漬手足冷即易之

陰陽水 一名生熟水 治霍亂吐泄有

中陰陽和而変争故上**功**吐下泄而霍乱飲此輒定者分其陰陽使和平也按霍乱有寒熱二症藥中能治此者甚多然未嘗分別言之倉卒患此脉候未審慎勿軽投偏熱寒之剤會見有霍乱服姜湯而立斃着惟飲陰陽水為最穏霍乱邪在上焦則吐邪在下焦則泄邪在中焦則吐泄兼作此温霍乱症軽易治又有心腹絞痛不得吐泄者名乾霍乱俗名絞腸沙其死甚速古方用塩熬熱童便調飲極為得治勿與谷食飢水湯下咽亦死 **以**

沸湯半鐘井水半鐘和服 酸咸止痰飲宿食酸酉卤吐痰飲宿食

黄蘗水 治黄疸水陰陽俱黄極水漿漿黄 卷四

本方除獨活蔓荆川芎甘草加升麻蒼

木名羌活除濕湯治風濕相搏一身盡

痛本方除川芎加黄芪當歸蒼朮升麻

名升陽除濕湯治水腫大陰汗不絶

再加麥芽神麴猪苓澤泻除當歸黄芪

亦名升陽除濕湯 東垣治脾虚泄痢

中滿分消丸 東垣治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹諸病有声鼓之如鼓為鼓脹氣不通利為氣脹血不通利為血脹但氣分病発于上血分血結胞門病発于下氣血不通則水亦不通而尿少尿少則水積而為水脹濕熱相生則為熱脹○金匱曰病有血分水分何

厚朴炒一兩 **枳實**炒四枚 **黄連**炒 **黄芩**炒 **半夏**

砂仁 乾姜三錢 **姜黄** 人參 **白朮**炒

散滿二藥兼能破宿血 **黄連黄芩泄熱而消痞**

姜黄砂仁煖胃而快脾于姜益陽而燥

蒲泄爲陰也

露水 甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清凉百花上露令人好顏色霜殺物露滋物性隔時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必田干暑故治瘧藥露一宿服

臘雪水 甘寒治時行瘟疫宜煎陽鬱火陽音謁傷暑之藥良

水 甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒熱甚昏迷者以二

濕陳皮理氣而和中半夏行水而消痰知母治陽明獨勝之火潤腎滋陰茯澤泄脾腎妄行之水升清降濁少加參朮茶草以補脾胃使氣運則脹消矣按此方乃合六君四苓瀉心二陳平胃而為一方者但分兩有多寡則所治有主客之異矣朱丹溪曰脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心腸之陽降肝腎之陰升而成天地之泰是為平和者也七情內傷六淫外感飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職故湯升陰降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞而為脹滿經曰鼓脹是也以其外堅滿中空無物有似于鼓以其膠固難治又名曰蠱君重之侵蝕而有蠱之義焉宜補

塊置膻中良兩乳中間腑燒酒毒陳藏器曰盛夏食氷典氣疾相反冷熱相激却致諸疾宋徽宗食氷太過病腑疾固医不効召楊介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食氷臣請以氷煎此藥是治受病之源也果愈

地漿 甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒綫痛解一切魚肉菜菓藥物者即毒菌音部生上亦名蕈音尋上声及虫蚘入腹如誤食馬蝗蚘人腹生子為患用地漿下之中暑暑邪中人即昏憒不知寒生滿症此湯主之

中滿分消湯 東垣治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心下痞堅陰躁奔豚不收原文曰或多食寒及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或有藏寒生滿症此湯主之

川烏 乾姜 畢澄茄 生姜 黃連 人參 當歸 澤泄 青皮 麻黃 柴胡二錢 草蔻仁 厚朴

死者取道士熱土圍腑令人
尿腑中以熱土大蒜等
分搗水去滓 以新水飲黃
土攪濁再澄清用 凡跌打損傷取淨土
熬熱以布裹更互熨之勿大
熱恐破肉黑疔血凝積氣雖
欲死者亦活宋神宗皇子病
痘庭國醫不能治召錢乙進
黃土湯而愈帝問其故对曰
以土伏水水得其平厥自正矣

珍兒茶 苦澀高土腸熟化瘀
生津止血收濕定痛生肌鹽
金瘡口瘡 逢砌分 陰瘡痔腫
出南番云是細茶末綠竹筒
埋土中月久取出搗汁發成
塊小潤澤者上夫而佔次之

百草霜 辛溫止血 凡煎劑若加
見黑則止行積治諸血病傷
水克火也
寒陽毒發斑宜腸癰痔瘻
口舌白糸諸瘡 時珍曰皆兼
取火化從治
之義 灶突上因其
煙熏 辛溫止血生肌飛絲靡芦
八月濃磨點之點鼻止血豬
胆汁磨塗治癌重酷磨酒磨
胆汁磨塗治癌重酷磨酒磨亦可

黃芪 黃稻五錢 智仁 木香 半
夏 茯苓 升麻三分 龍膽 此足陽
明太陰藥也川烏二姜棗茄益智
草蔻除溫開入腎以祛其寒青
皮厚朴以破其滯升麻柴胡以升其清
茯苓澤泄以泄其濁入參黃芪以補其
中陳皮以調其氣當歸以和其血麻黃
以泄其汗半夏以燥其痰黃稻黃連以
去溫中之虐芩用寒用也 李東垣曰
當開鬼門潔淨府開鬼門者發汗也潔
府者利小便也中滿治法
脾胃有病令土下分消其濕下焦瀆
氣血自然行化如或大實大滿大小便
不利者從權以
寒熱藥下之

大橘皮湯 治溫熱內攻心腹脹滿小便
不利大便滑泄及水腫等症 小水併入
大腸故小
便不利而
大便滑泄 滑石六錢 甘草一錢 赤茯苓一錢
白朮土炒桂五厘 陳皮錢半 木
香 檳榔三分 加姜煎每服五錢

豬苓 澤泄 白朮 此足太陽藥也赤茯豬苓澤泄泄火行
水白朮補脾肉桂化氣此五苓散也滑
石清熱利濕甘草泄火調中此六一散

服治胞胎不
伏龍肝 辛溫調中止血吉溫
消腫治欬逆反胃吐衄崩帶
尿血遺精腸風瘡重酯調膏塗
瘡明月豬胆或
傳用毒腊月豬胆或雞子白調傳催生
下胎傾救方子死腹中水調
下胎三不服其生當兒頭上
熬出 釜心名竈中土一云灶額向火
鍋墨久結成如研細水飛用
一作
飴酉釀 辛苦溫温潤食磨積去
垢除痰治反胃噎膈黯癰癥

出濕熱黃疸
木香行氣之品使氣行則水行以通小
便而實大腸也
滿口渴二便不利濕熱發黃脈實者
用茵陳蒿湯仲景治傷寒陽明病但頭汗出腹
經曰陽明病發熱汗出此為熱越則不
發黃若但頭汗身無汗小便不利渴飲
水漿此為下熱在裏必發黃黃者脾胃
之色也熱甚者身如橘色汗如柏汁頭
為諸陽之會熱蒸于頭故但頭汗而身
無汗夫熱外越則不裏濕下滲則不內
存今便既不利身又無汗故入而為黃
內有實熱故渴熱甚則津液內竭故小
便不利此熱在裏熱入血室及水結
胸皆有頭汗之症乃傷寒傳變故與雞

病不同心濕在經則目黃發熱鼻塞在
閉飲則身痛在藏宿則需泄小便澄澈
腹或脹濕熱相搏則發黃統黃熱勝
色晦而便燥七黃濕勝色鮮而便唐又
黃病與濕病相似但濕病在表
一身盡痛黃病在裏一身不痛
茵陳六兩 大黃二兩酒浸 梔子十四枚炒

此足陽明藥也故無已曰小熱涼以和
之天熱寒以散之發黃者溫熱甚也非
大寒不能徹其熱故以茵陳為君茵陳發汗
利水以泄太陰陽明之濕熱故為治黃主藥 梔子為臣大黃
為佐分泄前後則腹得利而解矣茵陳梔子
能導濕熱由小便出大黃能導濕熱由大便出 本方大黃易黃

雞汁作糜米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也俗家每產後即食雞啖卵肚者幸無事弱者因而致疾矣雲林曰四五年老母雞取湯煮粥食能固胎

雞冠居清高之分其血乃精華所聚雄而丹者屬陽故乾姜治黃瘟陰黃前症為陽黃加身黃而色暗者為陰黃宜此陽火炁治以茵陳為主各隨寒熱用藥○諸疸小便黃赤不利為裏實宜利小便或下之無汁為表實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景云發黃小便白利當與虛勞宜小建中湯白利肝滿而喘不可除熱而除之必藏小生夏湯主之王海藏曰內感傷寒勞役形体欲食失節中用麥病生黃非外感而得只宜理中大小建中足矣不必用茵陳

八正散 局方治溫熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通或淋痛尿血或因熱為腫溫熱下注小腹急滿則小便當行矣而亦不行者熱極之也

車前子 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草稍 梔子炒黑 大黃 加燈草煎一方加木香取其辛能利氣也

此手足太陽手少陽藥也木通燈草清肺熱而降心火肺為氣化之源心為小腸之合也車前清肝熱而通胯脇肝脈絡于陰器膀胱津液之府也瞿麥扁蓄除火通淋此皆利溫而兼泄熱者也滑

雄雞矢体微寒下氣消積利大小便內經用治鼈脹（脇月即雄雞屎白收之醋和炙加蜘蛛蚱蜢改毒石米燒治米瘕）

烏骨雞　甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故能益肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢噤口（煮汁帶下崩中肝腎血分之病鬼交斃死者用其血塗心下即甦侯宏提得一小鬼問所持何物曰殺人以此矛戟中心腹者無不斃）

鴨　甘冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸止嗽利水治熱痢白毛烏骨者爲虛勞聖藥取金箱裹之煅出汗（鴨可久養老者良遇或童便煮熱血解金銀丹石砒霜百毒及中惡溺死者　卵甘鹹微寒

死安日治此有方否也曰以烏雞爲之即座

骨

肉俱黑者真舌黑者骨肉俱黑用雌女用雄（女科白烏雞丸治百病）

甘冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸止嗽利水治熱痢

白毛烏骨者爲虛勞聖藥

取金箱裹之煅出汗（鴨可久養老者良遇或童便煮熱）

血解金銀丹石砒霜百毒及中惡溺死者　卵甘鹹微寒

氣虛用參朮升麻等先服後吐或就參苓藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芎歸湯探吐之痰多二陳湯先服後吐或加香附木通實熱當利之或八正散益大便動則小便自通矣或問以吐法通小便其理安在曰取其氣而已經謂三焦者決瀆之官水道出焉豈獨下焦膀胱氣塞而已瑪瑙名州都之官津液藏焉氣化則出矣三焦之氣亦有不化則不能如此而出矣又曰營如漚水之器上竅閉則下竅無自以通必上竅開而下竅始出也

革解　石鼻涌　烏藥　益智仁　等分

則水道通而清濁不分或敗精滲入胞及服燒藥欲食炎積滲入皆成淋濁

川萆薢分清飲　治陽虛白濁小便頻數漩

白如油者名膏淋（本習氣虛則不能苞束中及服燒藥欲食炎積滲入皆成淋濁）

能滋陰除心腹脇熱鹽湯下
五靈脂　甘溫純陰氣味俱厚
入肝經血分通利血脈散血
和血閉能通生用經多能止
炒用治血痺血積血痢腸風崩
中一切血病（圖經云血暈者
半炒半生水服
一錢）心腹血氣一切諸痛又能
除風化痰殺蟲消積（諸痢者
屬于水
諸蟲皆
上下風）治驚癎瘧疝蛇蝎蜈
蚣傷盛虛無瘀者忌用（五次
脂一

甘草稍（減半）　入鹽煮前服一方加茯苓
此手足少陰足厥陰陽明藥也專解
能泄陽明厥陰濕熱去濁而分清（史國
公信曰
若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝
火草解能泄陽明之濕入厥陰清肝火
烏藥能疏邪逆諸氣逐寒而溫腎益
脾藥兼入心腎固腎氣而散結（烏藥益
山茱萸
丸名縮泉
丸鹽湯下治便數）石菖蒲開九竅而通
心甘草稍達塞中而止痛便濁去而心
腎通則氣化行而淋濁止矣此以疎泄
而澀禁止者也（外台便要曰腎水虛則
心肺俱熱使小便赤而

兩雄黃五錢酒調服滓傳患
處治毒蛇咬傷李仲南曰五
天胎治崩中非正治之藥乃
去風之劑衝任經虛夜風襲
傷背血以致崩中暴下與刑
外防風治崩我同方悟古人
識見深遠如此時珍曰此亦
一說但未及肝虛血滯亦自
生風之意按衝為血海任主
胞胎任脈通衝脈盛則月事
以時下無崩漏
之患且易有子

寒號蟲矢也（即鼯鼠夜鳴
五色名曰風氣不如我冬月
毛落忍寒而号曰得过且过
高士奇曰月令仲冬之月鼯
鼠不鳴似與寒号之名未協）

北地鳥名

滑石（二錢）**琥珀**　**木通**　**扁蓄**　**木香**
當歸（鬱金炒一錢）為末服

此手足少陰太陽藥也滑石滑可去竅
利竅行水扁蓄苦能下降利便通淋琥
珀能降肺氣通于膀胱木通能泄心火

眞研末酒飛去砂石用 行血宜生止血宜炒 惡人參

夜明砂 一名天鼠矢 辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳 加石決明猪肝煎名決明猪肝夜夜散治雀眼 癆疳 前小鬼蝙蝠及矢並治驚癇 鼈甲 蝟蝠及矢並治驚癇 鼈甲 和癆疳寒陰之病 血氣腹痛 經疏曰辛能散內外滿氣寒能除血熱氣窒明目之外餘皆可畧 吳普曰古人每用虻虫水蛭治水積以其苦吮血耳若天罡矢乃食蚊而化者也当亦可以攻血積木草砂其下死胎則其能攻血現也何疑

入于小腸 小腸為心之府主熱者也諸滲入膀胱經所謂胞後熱于膀胱則癃弱血是也 血淋由于血亂當歸能引血歸經氣淋由于氣滯木香能升降諸氣諸淋由心肝火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也 大法鬱金 琥珀開鬱 青皮木香行氣滿黃牛久破血黃柏生地滋陰東垣用藥凡例小腹痛用青皮疏肝黃柏滋腎蓋小腹小便乃肝腎部位

防己飲 治腳氣足脛腫痛憎寒壯熱 腳氣自外感得者山嵐雨水或履濕熱之地自內傷得者生冷茶酒油丐濕熱之毒自濕有熱濕又能生熱濕性下流故注于足濕熱分爭濕勝則憎寒熱勝則壯

同醫用燒烟辟蚊 蝠蝠矢也食蚊砂皆蚊眼故治目疾 淘淨焙用蝙蝠目微白歛

猪 水者鹹寒心血用作補心藥之導血之意 延壽丹書曰猪心絕氣且肝皆不可多食 尾血和龍腦冰片治瘡疹倒靨 靨能發之時診白心血 亦有用取其動而不息 月生藏血補血藥用之入肝明目 雄者良同夜明砂作光治雀目

協有兼頭痛諸症者吹鼻傷寒亦有六經傳變但胠腫掣痛為異宜此病忌用補劑及淋洗以濕熱得補增劇也亦不宜大泄治之喜通而惡塞若腳氣沖心喘急不止嘔吐不休皆死水凌火故也 先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脈弛長痛腫者名濕腳氣宜利濕疏風蹉縮枯細不腫而痛者名乾腳氣即熱也宜閉血清燥

防己 木通 桃仁 生地 酒炒川芎 白朮 炒 蒼朮 鹽炒 黃柏 酒炒 甘草稍 犀角

食前服熱加黃芩時令熱加石羔肥人有痰加竹瀝姜汁或南星大便秘加桃仁紅花小便赤澁加牛夕或木瓜苡

雀目者夜不能視市甫市肺治
濕痰及肝火盛也肝不補肺治
肺虛咳咳嗽吐血者醫止會
健脾仲景治消渴有黃連豬
肝丸用雄豬肝一枚入
黃連末五兩瓜蔞根白粱米
各四兩和丹三兩冬冬二兩
縛定煮挑先如梧子大每服
三十丸米飲下直指方治小
兒疳積黃連五兩人豬肚蒸
爛飯丸米飲下仍服調血清
心藥佐之且曰小兒之疳減
病非疳筋熱當須識此腎鹹
冷而通腎治腰痛耳聾日華
水藏痠腰膝亥目久食令人
少子孟詵曰久食令人腎虛
李時珍避之謂其飯冷能蕩
腎氣也予按狗杞立參知母
仁　此足太陽藥也防已行水療風泄
下焦之濕挑槐棚攻堅利水墜諸藥使
下行木通降心火由小腸出草梢泄脾
火徑達腎蕊黃柏生地滋腎陰而涼血
角熱著白二朮燥脾濕而運動中樞腫
由血鬱川芎行血中之氣痛由肝窒犀
角涼心而清肝合之以清熱利濕消腫
止痛也
當歸拈痛湯東垣治濕熱相搏肢節煩痛肩
背沉重或偏身疼痛或腳氣腫痛脇腳

生瘡膿水不絕及濕熱瘙癢黃脈沉實緊
數動滑者濕則腫熱則痛足脛瘡腫濕
熱下注也發黃濕熱蒸脾
胃也胸氣多主水濕亦有夾風夾寒之
異濕熱勝而為病或成小泡瘡或成赤
腫丹毒或如疝氣攻上引下均可用此
湯損益為治○凡手足前廉屬陽明後
廉屬太陽外廉屬少陽內廉屬厥陰內
前廉屬太陰內後廉屬少陰以臂貼身
垂下大指居前小指居後定之手足痛
者當分是何經絡用本經藥為引行其
血氣則愈太陽羌活防風陽明升麻白
芷葛根少陽柴胡厥陰吳朱臭川芎青
皮太陰蒼朮白芍
少陰獨活細辛
茵陳酒炒　防風　升麻　葛根
蒼朮　白朮　甘草炙　黃芩酒炒　苦參酒炒

苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加豬胆汁蓋陽氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬胆汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也昂按此創热因寒用之義浴初生小兒永無瘡疥豬脬胞亦作胞治遺溺疝氣用作引經豬脂甘寒凉潤燥行水散風解毒方千金中惡及牛肉毒百獸殺重故肝毒服豬脂一斤佳殺重瘡藏多小易能通大便用之未月退諸黃 瀉產前

產妊諸瘡猎月者佳古方用之最多治咳嗽亦治諸瘡用之猪肺通乳下加通用之猪蹄湯通乳汁草二兩佳洗敗瘡癬臨用治寒熱瘧

喘瘡瘡人目五痔腸瘡古人有用前用者有用後用者猪肉反黃連烏梅

桔梗犯之瀉痢時珍曰方有猪肚九豈忌肉而不忌藏府乎陽陰別錄云猪肉閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食陶宏景曰猪為用最多惟肉不可食陳思遠曰久食令人少子發宿病筋骨碎痛之氣孟詵曰久食秘藥動風發疾韓忘曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰南猪味厚汁濃其毒尤甚若夠為大禁者然然

導其留飲為痞上下分流其濕使邊滯得宣通也 王机激義曰此方東垣本為治鄉氣濕熱之劑後人用治諸瘡甚驗

勇功散和治寒濕水病陰囊腫脹大小便不利 襄如水晶陰汁不絕謂之水病蓋水病九豈忌肉而不忌藏府乎陽陰別錄云猪肉閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食陶宏景曰猪為用最多惟肉不可食陳思遠曰久食令人少子發宿病筋骨碎痛之氣孟詵曰久食秘藥動風發疾韓忘曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰南猪味厚汁濃其毒尤甚若夠為大禁者然然

豬胆汁一兩 為末每一錢姜汁調下或加木香二兩 此足少陰太陽也牽牛辛烈能達右腎命門走精隧行水泄濕兼通大腸風秘氣秘而香辛熱

今人終日食肉肉滋外腑子孫蕃衍未見為害若斯之甚也又云合黄豆爲害若斯之甚羌胡羣聚茹牛肉羊肝龜鱉鮒魚雞子食之皆有忌然館甸中合食者多未見錄亭作害也大抵肉能補肉其味爲未食之閨陽胃生精液盡肌体澤皮膚固其所也惟多食則生痰助熱動風作溫傷風寒及病初起人爲大忌耳先王教民畜牧養蠶爲生業故爲是以厉民邪○明太祖釋家之說稽之千古則無徵試之千人則不驗徒令食忌不足取信千後世而已○傷寒忌之者以其補助固表消瞲經粘風邪不能解散也病初愈忌之者以腸胃久粘滯虛味也又按猪肉生痰惟風痰溫痰寒痰忌之如者人燥痰乾咳更須肥濃以滋潤之不可執泥干猪肉生痰之說也

犬肉　酸而鹹温炙脾益胃脾胃爱則腰腎受蔭矣補虛寒助陽事兩腎陰至九竅黄者補脾黑者補腎良杏仁忌蒜道家以為地厭

黄犬血酒服二碗治腸癌

羣方集 辛温 升陽除湿防風湯 中六 卷四 七十

升陽除湿防風湯 中央 治大便閉塞或裏急後重數至圊而不能便或有白膿或血

後重 慎勿利之利之則必至重病反變結而不通矣以此湯升舉其陽則陰自降矣

蒼朮 泔浸炒 四錢 防風 二錢 茯苓 白朮 芍藥 各五分姜棗煎 此足太陰陽明藥也

羌活 獨活 各一錢 柴胡 一錢 升麻 各五分 加減智仁半夏 黄芩 甘草 各三分 加減 此足少陰陽明藥也

蔡辛温燥烈升清陽開諸鬱故以為君白朮甘温茯苓甘淡佐之以健脾利濕防風辛温勝濕而升陽白朮釀陰而和脾也 劉宗厚曰欲食人胃輸下降若脾胃有傷不能上升反下流肝腎而成泄利者法當補中氣升之舉之不可疎下此東垣先前人所未発也○此方見于玉机微義東垣十書不載

羊肉　甘熱屬火補虛勞益氣
血壯陽道開胃健力通氣發
瘡中景治虛氣虛勞有當歸
羊肉湯十劑曰補可去弱
人參羊肉之屬是也東垣曰
人參補氣羊肉補形北味同
羊肉者皆補血虛　青羊肝苦
陽生則陰長也　寒薄須
寒日進色青補肝而明目用
脏爲補羊肝九旦苦寒點風
泊日疾加黃連月苦寒點風
淚眼赤障白膠臘月八當照
燥退宍の素問曰燥乃陽明秋金之
潤能去燥使金托而水生則火平而
化經曰金水者生成之終始又曰木
位之下金氣承之盛物之化從干生
物之成從干殺造化之道生殺之氣
物則衡之不可輕重也生之重殺之

花也時珍曰肝竅開于目胆汁滅則目暗目者肝之外候肥之精華也故經曰骨入腎而諸胆皆治目疾骨入腎而

骨灰擦牙良時珍曰羊脛骨灰可以固齒羊蹄骨可以治鉄傷吞鍼飲者脛骨三錢米飲下

羊血解金銀丹石砒硫一切

諸毒乳甘温補肺腎虛潤胃腑大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫盒知味交傷有漆身做之瘡

肉肝青殼羔良胆青羯羔良乳白羝羊良骨煅用反

軽權氣痺散而不收殺之重生之輕則氣斂濇而不通飲濇則傷其分布之政不能生氣不得升而收氣亦不得降經曰逆從氣則太陰不收肺氣焦滿

瓊玉膏中先治乾咳啾有声無痰謂之乾生

治乾咳啾有声無痰謂之乾咳病不出于脾則無痰肺中有火則咳病本于肺火盛津枯故乾咳

地黄四斤 茯苓十二兩 人參六兩 白蜜二斤 先將地黄蒸汁去渣入蜜煉稠再將參苓爲末和入磁罐封水煮半日白湯化服

燈舌腫盒知味交傷有漆身做之瘡

用仙加琥白沉香各五錢白云奇妙琥珀

以降肺章心泻肝以升降諸氣

此手太陰藥也地黄

半夏詹滴忌銅器杜羊曰羝曰賜子曰羔羊五月曰羜

牛肉甘温屬土安中補脾益氣止渴

閉倉法用牡黄牛肉二十斤洗淨煮爛濾去渣搥成塊細色前一晚不食次日空腹生蜜室取汁每飲一鍾少時又飲積數十鍾身体自痛如病在上則吐在下則利在中則吐而利利後必渴即飲已滿飲碗以解除煩飢倦先與米粥或只與飲粥次與後漸軟飲將養一月而沉痾悉安矣須斷房事

牛年牛肉五年丹溪曰牛坤土黄中色肉胃藥液無形之物積聚既久同傷腸胃曲折

滋陰生水水能制火白蜜甘凉性潤潤能去燥氣爲水母土爲金母故用參苓補土生金益入參益肺氣而泄火茯苓清肺安神而生津也茯苓色白入肺能滲濕熱去則津生

炙甘草湯 治傷寒脉結代心動悸及肺痿咳唾多心中温温液液者脉動而中止能自還者曰結不能自還曰代血氣虛衰不能相續也心中動悸無氣內虛也按傷寒脉結代與雜病不同與此湯補氣血而復脉肺氣虛則成痿胃中津液之上供者悉從燥氣化爲濁沫故渴唾多

甘草炙四兩 生姜 桂枝二兩 人參 阿膠

之處豈鉄兩丸散所能頓復乎因夜充滿流行無處不到如洪水泛濫一切疵癘皆順流而去矣此方傳千西域異人中年受行一二次亦即疾愈尋之一助也王海日生肉補中非吐下藥借補為泄因泄為補亦奇方也丹溪治林德方咳而吐血謂肺癆非吐不可血既非補不可惟倒倉二法兼備服之而愈又治蔣伯善便燭脅痛精亦用倒倉法而能又治許文懿公病心痛用煉礬霞丹艾炙雜治數年不効白分為癈人丹溪先以防風通聖散下其積滯而病稍起思食然而足难移次年行到倉法節節應手復生子活十四年又歸海杯兄久嗽吐紅發執消瘦衆以為癆百

蛤蚧燥二兩 生地黃一斤 麥冬去心一斤 麻仁半斤研 大棗十二枚 水酒各半煎內阿膠烊化服

此手足太陰藥也人參麥冬甘草大棗益中氣而復脈生地阿膠助當歸而安心麻仁潤滑以後脾胃姜桂辛溫以散餘邪加清酒以助藥力也聖濟經云津液散為栝蔞藏癆弱薯蕷涸流燥劑所以潤之麻仁麥冬阿膠地黃之甘潤經益血復脈通心也 喻嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也千金翼用治虛勞外台用治肺癆宛若本方所治亦何止二病故外台所取治千

方不應肝淡脈之兩手弦數曰難夜重計無所出時冬月也以倒舍法而安次年生子 牛乳味甘微寒潤腸胃解毒補虛勞治反胃腸燥胃稿胃冷脾不磨反食氣血不足其本也曰按飲曰食積其標也胃稿者燥血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治在肺中而降氣中焦吐者出乎積治在行氣而消積下焦吐者由乎寒治在溫中而散寒毋論日反胃噎腸大便燥結宜牛羊乳時珍曰之兼服四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎腸不通服香燥藥取快

益腸氣之虛潤肺金之燥至于桂枝辛熱似有不宜不知桂枝能通營衛致津液則肺氣能轉輸涎沫以漸而下光屬要緊所以云治心中溫七液七也王机微義曰肺癆如咳入聲啞聲細咯血此屬陰虛火熱其也唾涎沫而不欬不渴必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必欬多涎唾用炙甘草于姜湯以溫之肺接涎唾多心中溫七液七者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故肺癆有寒熱之異甘草于姜湯炙甘草四兩于姜二兩

麥門冬湯金匱治火逆上氣咽喉不利論曰止逆下氣此生之 麥門冬七升半夏一升人參三兩 甘草二兩粳米三合大棗十二枚

此手太陰足陽明藥也喻嘉言曰此胃

肝膽之病經疏云牛食百草其精華凝結成黃犹人之有肉丹故能散火消痰解毒為世神物或云牛病乃生風者非也清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治中風入藏驚癎口禁心熱則火自生發肝熱則木自生風匕火相搏膠痰上壅逐致中風不語東垣曰中藏宜之風中府及血脉者用之反能引風入骨如油入麵拔中風中藏者重多滿九竅中府俱輕多者四肢若外無六經形症內無便溏里腑為中經絡為又輕初宜順氣開痰經宜養血活血不宜前用風藥大抵五藏皆下風而犯肝者為多肝屬風木

一時被氣而燥血是速其死也不如少服藥飲生乳加韭汁或姜汁或陳酒為佳江南臭司多公患禁口痢粒米不進勦莫一令服牛乳久之亦瘥白水牛喉治反胃吐食腸結不通除兩頭去脂膜醋煅火未每服不過二錢酒醋皆一不陳米飲下酒醋酒皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜于血燥糟燥之人牛胆內石灰于內懸掛風處百日治金瘡豆牛黃甘涼生有病在心肝胆之間凝結成黃故邊以涼活血潤燥生津液乾枯虛火上炎之症用寒涼藥血液少也火炎水乾故津液枯少

津液乾枯虛火上炎之症用寒涼藥血液少也火炎水乾故津液枯少

當歸白芍熟地黃二錢天冬麥冬桔梗二錢知母貝母二錢桃仁研五分紅花五分此手太陰足陰藥也歸芍養血潤燥兼能生津桃仁紅花活血潤以能行水故燥以味辛故潤也仲景治內燥津液枯少內燥而疑之則誤矣

清燥湯東垣治肺金受溫熱之邪痰聲喘促胸滿火炎口渴俱不治經曰肺也者將相之官也治節出焉火盛尤金則肺

而主筋肝病不能榮筋故有舌强口禁喎邪癱痪不遂不仁等症口開為心絶手撒為脾絶眼合為肝絶遺尿為腎絶吐沫鼻鼾為肺絶髮直面赤如妝汗綴如珠者皆不治若止見一二症犹有可治者 小兒百病皆肺毒燔熱所生兒初生時未食乳用三五厘合黄連甘草末蜜調塗唇口善通冷哂之良名寶瘡保嬰胎易產

午有黄必多乳哺以益水承之何其吐出飽喝即墮永名生黄如雞子大重盖可揭輕虚氣發者宜 觀此則非病殺乃生黄矣

熱葉焦氣無所主而失其治節故肢体或縱或縮而成痿躄也火上逆肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗温熱蘊于腠中故胸滿壅于陽明則食少上升于頭則頭痛注于身則体重流于関節則身痛肺受火傷天氣不能下降膀胱絶其化源故口渴而便赤

黄芪錢半炙 白朮炒 陳皮 澤瀉五分 人參 茯苓 升麻三分 當歸酒洗 生地 黄芩炒 甘草炙 神曲炒 黄柏酒炒 猪苓二分 柴胡 黄連炒一五味子九粒 每服五錢此手足陰陽明藥也肺屬手金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受濕熱之邪則寒水 傷先 生化之源絶源絶則腎水 虧金不能生水 而痿躄諸症作矣

金者水之母也氣者水之源也黄芪益元氣而實皮毛故以為君二木參苓甘草神麯健脾燥濕理氣化滯所以運動其土土者金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生地滋陰而養血黄柏黄連燥濕而清熱 黄柏合蒼朮名二妙散治痿症藥加牛膝名三妙散 升麻柴胡所以升清猪苓澤瀉所以降濁使濕熱從小便出則燥金肅清 肺為高清

死角中得者名角黄心中者名心黄肝胆中者名肝胆黄成塊成粒總不及生者但磨脂用上黄透用者為眞 驚眩 黄疸 聰耳明目 易得龍乱眞 得牡丹高蒲良 人參為使惡龍骨龍胆地黄當山

白馬溺 辛寒殺虫破癥積治反胃 祖台之志怪云晉有人與奴皆患心腹痛痢奴死剖之得一簪倘怙以諸藥投日中不死有人乘白馬觀

之馬溺墮鑑而鑿補遂以推之即化成水主那馬溺而愈

驢溺 辛寒殺虫治反胃噎膈須撓飲之張子仲備急方云昔愚反胃苦數調治竟不能療一衙士云服驢溺即効遂服二合只吐一半再服二合食粥便定宮中思反胃者五六人同服之一時俱瘥

阿膠 甘平清肺養肝滋腎益氣肺主氣和血補陰肝主血腎納氣和血屬陰除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽肺痿吐血吐血衄血血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成痢者必用之婦娠血痢尤宜腰痠骨痛血痛血枯經水不調崩帶胎力或婦娠下胎重血洶煎服瘡瘍腫毒及一切風病瀉者忌用大抵補血血虛液燥養菜湯治火燥肺金血虛外燥皮膚皺揭筋急爪枯或大便風秘肺主皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而金燥故外見皮毛枯揭肌膚燥癢內有筋急便利之症

當歸酒洗二錢 生地黃 熟地黃 芍藥炒 黃芩酒炒 秦艽一錢 防風 甘草五分

此手太陰足厥陰藥也前症為血虛而水涸當歸潤燥養血為君二地滋腎水

傷則四肢不為人用而諸疾之病作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有神北方則心火降而肺金不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿大法無過于此

滋燥養菜湯 治火燥肺金血虛外燥皮膚皺揭筋急爪枯或大便風秘肺主皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而金燥故外見皮毛枯揭肌膚燥癢內有筋急便利之症

當歸酒洗二錢 生地黃 熟地黃 芍藥炒 黃芩酒炒 秦艽一錢 防風 甘草五分

此手太陰足厥陰藥也前症為血虛而水涸當歸潤燥養血為君二地滋腎水

水煎成膏須日本產阿膠亦用牛皮膠俗作不堪用以黑光帶綠色夏月不軟着真到燥成珠或麵炒蛤粉炒去灰炒止血痛黃酒化水化童便和用得火良山藥爲使畏大黃

黃明膠即牛皮膠甘平功與阿膠相近亦可代用同葱白煮服通大便李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用之張仲景治補宜于虛熱之人性味皆平瘡痢牛膠與黃連黃

而補肝苓藥瀉肝火而益血爲臣黃芩清肺熱能養陰退陽充防散肝風爲風藥潤劑風能生燥充防味辛能潤又奏充能養血榮筋防風乃血藥之使吐血治崩皆用爲使甘草甘平瀉火入潤劑則補陰血爲佐使也

搜風順氣丸　治中風風秘氣秘便溺阻隔徧身虛痒脈來浮數亦治腸風下血

中風癱瘓風秘者風生燥也氣秘者氣滯也故大便不通燥則血澁津液不行故徧身虛痒脈浮爲風脈數爲熱風熱流入大腸無所施瀉則下血

大黃九蒸九晒五兩大麻仁　郁李仁去皮　山藥

蝮蛇用陳藏器曰諸膠皆能療風補虛止泄驅皮主風爲最經驗方云癮疹初起酒化黃明膠四兩服盡毒不內攻黃氏方加川山甲四片燒存性用最謂此方若驗勝下敗蠟蠣充也

虎骨　味辛微苦虎屬金而制木故嘯則風生追風健骨定痛辟邪治風痺拘攣疼痛驚悸癲癎大咳骨哽爲末水服火胺傳遞處以頭骨脛骨良虎雖死優立不仆其氣力皆在前脛時珍曰凡辟邪症治驚癎溫虐頭風當用

酒蒸山茱萸　車前子　牛膝酒蒸各用二兩菟絲子酒洗　獨活　防風　蒺藜炒去刺　杜仲炒去絲　枳殼麩炒二兩

蜜丸　此手足陽明藥也大黃苦寒峻猛能下燥結而祛瘀熱加以蒸晒則性稍和緩故以爲君麻仁滑利李仁甘潤並能入大腸而潤燥通幽車前利水牛膝下行又能益肝腎而不走元氣牛膝引藥下行車前子利小便而不走氣燥木干風獨活防風之辛以潤腎而搜風滯田干氣枳殼蒺藜之苦以破滯而順氣數藥未免攻散故

頭骨治手足風當用脛骨治腰脊風當用脊骨各從其類也

虎骨 治反胃取生者存滓瘞勿洗新瓦固收存性爲末入平胃散一兩每服三錢効昂按虎肚丸宜于食隔苦寒隔氣隔血隔痰隔恐難具功 **虎睛** 爲散治瘧下治小兒驚搐夜啼

犀角 苦酸鹹寒涼心泄肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃發斑傷寒下早熱乘虛入胃則發斑下遲熱留胃中亦發斑 **吐血下血** 齒血諸狂瘟瘧黑陷

又用山藥益氣固脾山茱溫肝補腎蒐絲益陽澀陰以補助之也本方云久服百病皆除喻嘉言云藥有偏峻可暫用以應風潤燥順氣不可久服

潤腸丸 東垣治腸胃有伏火大便秘澁全不思食風結血結風結卽風秘由風薄腠藏傳于大腸或素有風病者亦多秘氣秘由氣不升降血秘有亡血血虛津液不足熱秘由熱結大腸冷秘由冷氣橫于腸胃疑陰固結津液不通非燥盡也仲景曰脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結脈沉而遲不能食身体重大便反轉名曰陰結李東垣曰實秘熱秘卽陽結也宜散之虛秘冷秘卽陰結也宜溫之

大黃 歸尾 姜活 桃仁 研 大麻仁 去殼 一兩 **蜜丸** 一方有防風風燥加麝

皂角子 燒存性 此手足陽明藥也歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通閉麻仁滑腸利竅血和風疎腸胃得潤則自然通利矣朱丹溪曰古方通劑蓋肺氣不降則難得送用枳殼沉香詞子杏仁等是也又名人虛人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻麻人阿膠等是也如妄以峻藥逐之則津液走氣血耗虽暫通而卽秘以必變生他症 **本方加防風皂角仁蜜丸名活血潤燥丸治同**皂角得濕則燥結自除 **本方去羌活加升麻紅花生熟**

藥入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裹納懷中待熱搗之立

卒崩田線云石人氣粉屑升麻為使忌鹽羚羊角 苦鹹微寒羊屬火而羚羊屬木入足厥陰肝手太陰少陰經肺心目為肝竅此能清肝故明目去障肝主風其合在筋此能祛風舒筋故治驚癎搐搦骨痛筋攣肝藏魂心主神明此能泄心肝邪熱故治狂越譫妄魘驚為肝主血此能散血故治瘀滯惡血血痢腫毒相火寄于肝胆在志為怒經曰大怒則形氣絕而血菀于上此能止氣降火故志傷寒伏熱煩懣氣逆食噎不通羚之性靈而粉在角故又辟邪而解諸毒鼻鼽按瘟科多用以清肺火而本草不言治瘟出西地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與獨骨獨者麥能食鉄宜宿防忌以角掛樹而要角有掛枝者真一邊有節而節而疎乃山驢山羊非

二地名潤燥湯倶東垣湯治同加升麻者能升始能降也又方大黃煨熟當歸酒浸枳實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥澁通幽湯東垣治幽門不通上衝吸門噎塞不開氣不得下大便艱難名曰下脘不通治在幽門下脘即幽門胃之下口也人身上下有七門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門即會厭氣喉上掩腎為陰下降而大腸乾燥不行胃之濕與陰火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通和泄其陰火潤其燥血生其生血則幽門通吸門亦不受邪腸噎得門滿俱去矣是濁陰得下歸地也

當歸身 升麻 桃仁 研紅花 甘草 各一錢 生地黃 熟地黃 五分或加柴胡末本方加大黃麻仁名當歸潤腸湯 此手足陽明藥也當歸一地滋陰養血桃仁紅花潤燥而行血柴胡下墜而破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁陰不降經所謂地氣上為雲天氣下為雨也李東垣開竅于二陰經曰大便難者取足少陰夫腎主五液津液是則大便如常若飢飽勞役頓傷胃氣及食辛熱脉厚之物而助火邪火伏血中耗散真陰

於也多而角一角勝劑研極細或磨用

麝　甘溫一云苦辛入肺脾肝經通竅活血辟惡開郁散結消腫定痛

治中風口噤中惡心腹暴痛痰厥昏迷驚癇瘛瘲小兒急慢驚風痘疹不出或出而內陷或灰白不起或血熱毒盛發斑發疹及瘡瘍腫毒痰核疔腫蛇蟲咬傷

用法　入丸散用一分至三分

鹿茸　甘溫入腎肝經補腎陽益精血強筋骨調衝任治虛損

用法　入丸散用一分至三分

鹿角　咸溫入腎肝經補督脈益陽氣強筋骨消癰腫散瘀血

用法　入丸散用一分至三分

鹿角膠　甘平入肺肝腎經補陰血潤燥止嗽

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿角霜　咸溫入腎肝經補陽氣益精血

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿筋　甘溫入肝腎經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿鞭　甘溫入腎經補陽氣益精血

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿腎　甘溫入腎經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿乳　甘溫入肺肝腎經補陰血潤燥止嗽

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿蹄　甘溫入肝腎經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿胎　甘溫入肝腎經補陰血安胎

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿肉　甘溫入脾胃經補陰血益氣力

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿血　甘溫入肝腎經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿尾　甘溫入腎經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿心　甘溫入心經補陰血益心氣

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿肝　甘溫入肝經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿腦　甘溫入腦經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨膠　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨髓　甘溫入腎肝經補陰血益精髓

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨灰　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨炭　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨油　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨粉　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨膏　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨酒　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨醋　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨湯　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨丸　甘溫入腎肝經補陰血強筋骨

用法　入丸散用一錢至二錢

鹿骨散

云鹿茸麋腰勝于鹿時珍曰鹿補白腎精氣麋補左腎血

液鹿角鹹温生用則行血消重舖磨塗腫毒為末酒服治折傷医家曰有兼瘡赤腫而痛用黄柏凉藥久不愈者却當用温藥加鹿角灰髮灰乳香之類此辛陰陽異暑往來之理也后邪治夢與覺乏酒服二撮鬼精即出能逐陰中邪氣惡血鍊霜整膏則專于滋補時珍曰鹿乃仙獸純陽多壽能通督脉又食長草故其角肉食之有益無損鹿一名斑龍西蜀道士當化斑龍丸歌曰尾間不禁滄海竭九轉求丹都慮說惟有斑龍頂上珠

能補五臟之不足益氣力強志意耐寒暑久服輕身延年

禁用香燥藥所言補血益陰潤燥和胃調中都無甘方可以竒効會○治隔噎諸藥非汁飲疫竹瀝麥汁消痰童便降火人乳牛乳潤燥補血苦根汁止渴亭根汁凉血甘蔗汁和胃蜜和諸汁頓服佳或加燒酒米醋白蜜和諸汁頓服佳

食養 熟地黄 芍藥 五味子 麥冬 三兩 天冬 人參 甘草 三錢 茯苓 一兩

治虛勞陰虧內熱骨蒸盜汗遺精白濁或小便淋瀝或大便燥結或婦人經候不調或胎前產後諸病

鹿茸羹湯 本治心腹煩躁不生津液不思飲食

鹿茸 熟地黄 芍藥 五味子 麥冬 三兩 天冬 人參 甘草 三錢 茯苓 一兩

每服三錢加烏梅姜棗煎此手足大陰藥也黄芪人參補氣熟地芍藥補血烏梅五味斂耗生津天冬麥冬泄火補水伏苓淡以利濕甘草甘以和中温以

能補五臟之不足益氣力強志意耐寒暑久服輕身延年

用鹿茸與膠霜也

造膠 鹿鹹温相交之精也故法取之大補虛勞

霜法取新角寸截河水浸七日刮净桑公煮七日入醋少許取角揚成霜用其汁加無灰酒熬成膏用畏大黄

鹿睿 辛温香竄開經絡通諸竅透骨骨煖水藏治寒中諸風諸氣諸血諸痛瘡瘍驚癎

嚴用和云中風不醒者以麝香清油灌之先通其閉東垣

水伏苓淡以利濕甘草甘以和中温以氣通則脾和而思食津生而燥退矣

消湯方 治渴善胃熱善消水穀飲渴而多消肺熱也多食善飢胃中消胃熱也渴而小便數有骨為下消腎熱也皆火盛而水竭也經曰二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則口乾是津不足也足陽明胃主血热消則口乾是津不足也足陽明胃主血热消穀善飢是血中伏火血不足也未傳消穀善飢是血中伏火血不足也未傳能食者必發脳疽瘡疥不能食良者必傳中滿鼓脹皆不治之症氣分病者喜飲冷水宜寒凉參劑以清其熱血分病者喜飲冷水宜寒凉參劑以滋其陰上輕中重下危如上中平則不傳下腎消小便頻甜者為重水生于甘而死于鹹小便本餓而反甘是生氣泄脾氣下脘入腎中為土剋水也

曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引風入骨如油入麪時珍曰嚴氏言風病必先用東垣謂必不可用皆非通論若經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開通之耶但不可過耳昂按據李氏之言似仍以嚴說為長麝香一錢醋和灌之癲癎癇癎癎癎耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺虫噎胎壞胎墮胎敗酒治惡積酒積東垣曰麝香入脾筋氷片入腎治骨 研用凡使麝香用當門子尤妙蝕不可近鼻

黃連 天花粉 生地汁 藕汁 牛乳 將黃連花粉為末調服或加姜汁蜂蜜為丸噙化 此手足太陰陽明藥也經曰心移熱于肺傳為膈消火盛爍金不能生水故令燥渴黃連苦寒以泄心火生地大寒以生腎水花粉藕汁降火生津牛乳補血潤燥火退燥除津生血旺則渴自止矣黃連花粉止渴生津渴症要藥單用亦可治之

地黃飲子 陽治消渴煩燥咽乾鼻塞咽乾腎火上炎也而赤陽明鬱熱也煩屬于心燥屬于腎 人參 黃芪 甘草炙 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 北梗葉各石斛 澤泻 枳殼 麻炒 等分每服三錢 此手足太陰陽明藥也喻嘉言曰此方生精補血潤燥止渴佐以澤泻枳殼疎導二府 澤泻泻腎經之火枳殼寬使小腸清利則心火下降心火降與大腸之氣小腸相表裏 六府流暢則肺經潤澤肺與大腸相表裏 宿熱既除其渴自止矣 處言又曰人參白虎湯治渴症氣分燥熱此湯治血分燥熱竹葉黃芪湯兼治氣血燥熱宜辨症而

防風入肝治風見人捕之則自脫出其香為生香尤難得其香聚處草木皆黃市人或搥荔枝以偽之

膽 苦寒涼心平肝明目殺虫治鼈瘕五痔金之通明者佳性善辟塵攪塵水上投胆少許則豁然而開

象皮 象肉難腫以刀刺之半日即合治金瘡不合者用其皮灰亦可慈膏入散 象胆能辟塵血能胆同功

獺肝　甘鹹而溫益陰補虛殺虫止嗽治傳尸鬼疰有神功

尸疰鬼疰乃五疰之一變動有三十三種乃至九十九種其症使人寒熱流注默默不知痛之所在而無處不惡死後傳人乃至滅門古方有獺肝九烘乾炙爲末水服二分日二以癆瘵爲度　諸肝皆有葉數惟獺肝一月一葉其間久有退葉須手獺身取下不爾多偽

吳鶴皐曰獺陰物晝伏夜出故治鬼疰昂謂不然緣其肝獨異下他獸也

獺皮　苦平治腸風泄血五痔燒末油調傅水服亦佳　陰腫脂滴耳中治聾腫點痘後風眼　似鼠而圓大褐色樝手外刺如栗房煅黑存性用

鬼屎　土名望月砂　殺虫明目治勞瘵五痔瘡後生翳　兎肝泄肝熱故能明目兎肉治消渴海仁方澄汁陶冷飲　小兒食之稀痘瘡景日孕婦食之令兒缺唇保壽堂兎血丸令小兒永不出疹

茯苓降心火而交腎黃連清脾火而瀉心石斛平胃熱而濟腎能托筋骨療風痺腳弱　熟地玄參生腎水丹盆蛇床固腎精入參補氣花粉生津草解清熱利濕胜腔雞子白滋陰潤燥通小腸膀胱而止便之脾也能消水穀通小腸膀胱而止便

警善治腸消磁石色黑入腎補腎益精故假之爲使也　喻嘉言曰女人病消渴後渴少止反加煩急足膝痠弱乎主是先加屐角有毋曰腎痿而以黃連屐角治心再乃倒乎口腎者胃之關也胃熱下傳于腎則關門大開心之陽火得以直降于腎心火灼腎躁不能滿乎用屐角黃連對治其下降之陽光安爲倒乎服之果効再服六味

用之附竹葉黃芪湯淡竹葉生地黃各二錢當歸川芎乃藥麥冬黃芩炒人參黃芪甘草半夏石羔蛤各一錢治消渴氣血兩處胃火盛而作渴

白茯苓　治腎消而腿酸脚要痿脚無力此因中消之後胃熱入腎消燥腎腦令腎枯燥故致此疾按腎滿即下消乃土消中消之傳變飲一溲二溲如膏油下註曰肺主氣肺無病則氣能管束津液其精微者則養筋骨血脈餘者爲溲脬病則津液無氣管攝而精微皆亦隨溲下如膏油也　茯苓　黃連　花粉　草蘚熟地黃　萸盆子　人參　玄參　石斛　蛇床子七錢半至三十具音皮角斗　五分　鹿角月鵬即雞脾皮微炒　蜜丸磁石湯下　此足少陰藥也

瘡虽出亦痛臘八日取生兎
刺血利蕎麥麪加雄黃四五
分和丸棗豆大初生小兒乳
汁送下二三丸遍身發出紅
点此其
驗也

僵蠶矢　甘而微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人傷寒初愈即與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易若人有鼠矢湯　雨頭尖者爲雄鼠矢　鼠胆明目汁滴耳中治三十年老聾陶云景曰鼠胆隨死輒消不易得也鼠肉治兒疳鼠瘻何問

龍骨　甘濇微寒入手足少陰心腎手陽明大腸足厥陰肝能收斂浮越之正氣濇腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治多夢紛紜驚癎瘧痫吐衄崩帶遺精脫肛大小腸利固精止汗定喘氣不歸飲癊皆濇以止脫之義十劑曰濇可去脫牡蠣龍骨之屬是也

鱗介魚蟲類

白魚　甘濇微寒入手足少陰肺腎手陽明大腸足厥陰肝能收斂浮越之正氣濇腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治多夢紛紜驚癎瘧痫吐衄崩帶遺精脫肛大小腸利固精止汗定喘氣不歸飲癊皆濇以止脫之義十劑曰濇可去脫牡蠣龍骨之屬是也

龜甲　甘鹹微寒入手足厥陰肝腎陰分能補陰除陰虛之有大功皆取其介以潛陽也

鱉甲　甘鹹微寒入手足厥陰肝腎陰分能補陰除陰虛之有大功皆取其介以潛陽也

鯉魚　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯽魚　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚頭　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚膽　苦寒入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚腸　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚脂　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚目　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚鱗　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚尾　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚骨　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚血　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚腦　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚髓　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚肉　甘平入手太陰肺足太陽膀胱能下水消腫利小便治黃疸通乳汁

鯉魚皮

白色錦紋甚者良或以古瓶灰僞之酒浸一宿水飛三度用或酒煮醋炙火煅亦有生用者又云水飛晒乾黑豆蒸過用各則着人腸胃晚年作熱忌魚及鉄畏石羔川椒得人參牛黃良

龍齒　漕原鎮心安魂治大人癇癲狂熱小兒五驚十二癎衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也治高龍骨

許洨云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏也

鱖魚　甘平下水氣利小便治欬逆上氣腳氣黃疸婦孩水腫有鱖魚湯鯉腫古方治水腫有鱖魚湯鯉腫用鱖炙鷄河間曰鯉之治水鴨之利水所謂因其氣相感也骨燒灰療魚骨硬

鯽魚　甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實腸行水之功作鱠食治嘔氣及上氣忌麥冬苏蒸沙糖猪肝

立筋要不能束骨也

猪脂　姜汁各二升煎取酒五此足陰陽藥也津竭筋枯非草木之此足陰陽藥也津竭筋枯非草木之藥能治猪膏潤能養筋姜汁辛能潤燥酒和血而性喜行取易達于四肢本方除姜汁加亂髮消藥成猪膏髮煎治者髮亦諸陰之病從小便出也本方除姜汁加亂髮消藥成猪膏髮煎治者黃土病從小便出也本方除姜汁加金銀花者酒飲治瘡疥

猪骨酒　治過勞四肢筋液耗竭数數轉筋屈伸不利

筋爪甲皆痛不能久立名曰筋極肝主柔則養神極六極之一也經曰陽氣者精則養神柔則養筋筋骨過勞耗其津液不能榮養故筋急而筋數轉也爪甲者筋之餘筋屬木猶木枯則枝葉皆並也不能久

麻仁蘇子粉　水事治產後大便不通許叔微曰

石首魚　甘平開胃消食治暴痢腹長蚊園雜記白痢疾最忌油膩生冷惟白魚相宜以其無脂不膩而即乾能消宿食理腸胃也　白乾

白鱎魚首中有石故名石治昂按个人多以石首魚鰾合破故紙等藥為丸名魚鰾丸云煖精種子而本草全未之及何也

黃魚腊　苦寒色青入肝胆治目疾點眼消赤腫噎翳瞖澤吐唉痰涎塗火熱瘡瘡魚骨硬　臘月收陰乾　學

好人產後之三利疾入胃則多汗汗多則冗便秘故难于用藥及老人風秘　大麻仁　紫蘇子　等分洗淨合研再用水研取汁煮餬啜　此手陽明藥也麻仁陽明正藥滑腸潤燥利便除風蘇子兼走太陰潤肺通腸和血下氣行而不峻緩而能通故老人產婦氣血不足者所宜用也　許叔微曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不食医皆訳補脾治風倩利頭目服藥虽愈全不進食其家憂惶予診前藥皆誤此是老人風秘藏府壅滞聚于胸中則腹脹惡心不思飲食上至于巔則頭痛不泄今作此藥而氣泄下結糞如橄十餘枚斷得通利不藥而愈矣