


本草醫方合編

五

中武9
124
5



門武9
編 124
卷 5

昔濟消毒 李東 芩連氣玄參甘

棗藍根傷升柴馬勃連翹陳疆

香薄荷為末咀 黃芩酒炒各五

不玄參甘草生用桔梗柴胡

陳皮去白各二錢鼠粘子核

藍根馬勃連翹薄荷各一錢

蠶蚕升麻各七分末服或蜜

丸噙 或加人參或大黃 加人

參便秘 大頭天行力能禦頭

加大黃 天行親戚不相訪問染者多

不救 原文曰芩連泄心肺

之熱為君 玄參陳皮甘草瀉

火補氣為臣 連翹薄荷鼠粘

藍根蠶蚕馬勃散 腫消毒

喘為佐 升麻柴胡散 陽明少

醫方集解卷之六

明目之劑 目之在人特五官之一耳

竅各主一藏或兼二藏 目昂為肝竅

而五藏六府之精氣皆上注于目而

為之精精之窠為眼骨之精為瞳子

筋之精為黑眼血之精為絡氣之精

為白眼肉之精為約束巽巒筋骨氣

血之精而與脈并為系上屬于腦後

出于項中此謂眼且五藏六府也故

其症多而方亦廣茲集限于篇章故

畧錄專治目疾者數方以備採用其

疏風燥濕瀉火養血之劑可以通用

者則散見于各門 目有五輪曰眼

為氣輪屬肺金故 獨堅青睛為風輪

屬肝木內包膏汁 涵養瞳神目角入

小眦為血輪大眦屬心 君火大眦赤

者為實火小眦屬心 包相火小眦赤



陽二經之陽桔梗為丹楫不
令下行為載乎東垣曰此邪
熱客心肺之間上攻頭面為
腫以蒸氣瀉之是為誅伐無
過遂處此方
全活甚眾

桔梗湯 生中用防已桑皮貝母

栝蒌子甘枳當歸杏仁黃

芩百合姜煎此 栝蒌防已瓜

枳殼杏仁桑皮各五分黃芩
七分杏仁百合甘草各三分

姜煎肺癆吐膿或咽乾便秘大

黃可加使 一方有人參無使

杏仁薏仁桑皮百合保肺清
火瓜蒌貝母潤肺除痰首桔

開提氣血利膈散邪防已散
腫除風瀉濕清熱當歸以和
其血枳殼
以利其氣

清咽太平丸 薄荷苧柿霜首精

及防風犀角蜜丸以治聲聞

咯血頰帶紅 兩頰肺肝之部

之時木盛生火來尅肺金薄
荷十兩川芎栝蒌霜甘草防風

犀角各二兩栝蒌三兩蜜丸
○川芎血中氣藥散瘀升清

防風血藥之使接肝瀉肺薄
荷理血散熱清咽除蒸犀角

涼心清肝柿霜生津潤肺甘
草緩炎上之知勢栝蒌載諸

藥而上浮

易曰火云火

萬物故包四輪開動為陽為應用閉
靜為陰則腫矣目中有神膏此由胆
中滋潤精汁積而成者能潤養瞳神
有神水先天直氣所化潤澤之水也
有神光原干命門通于胆發于心是
火之用也有真血肝中升運滋目經
絡之血也有真氣目之經絡中往來
生用之氣先天之元陽也有真精先
後天元氣所化精汁起于腎施于胆
而及瞳神也目有堅殼數重真血滋
神水神水包神膏膏中一點青瑩乃
胆腎所聚之精華惟此一點鑒照萬
物空濶無窮為水輪屬腎小人之邪
正壽夭貴賤皆可驗目而得之豈非
人身之
至寶乎

滋陰地黃丸 一名熟地 治血弱氣虛不能

養心火旺盛肝木自實瞳子散大視

物不清 肝為心母子能入母實故心火

瞳子散大風火搖動之徵也小不能制

火則清和之氣乖亂而精液隨之走散

矣精液走則光華失故視物不清也○

綱目曰心脈挾目系肝脈連目系手足

少陽之脈終于目外小背風熱從此道

上攻頭目致偏頭痛腫瞳子散大視物

昏花血虛陰弱故也宜涼血

養血收光散火而除風熱

熟地黃 兩生地黃 一方兩半 柴胡 八

黃芩 炒當歸 五錢 天門冬 地骨皮

五味子 黃連 三錢 人參 甘草 炙

殼 二錢 寧羌茶清 下日二服 忌食辛

熱之物 助火寒冷之物 損胃使藥不上

醫方集解 目卷 滋陰地黃丸

二

下六

消斑青黛飲陶節菴連犀知母玄

參生地齊石羔柴胡人參

草便實參去大黃去人參

姜葱煎加一匙醋陽邪裏實

此方稽發斑經之火有以助之青

黛黃連清肝火梔子清心肺

之火玄參知母生地清腎火

犀角石羔清胃火引以柴胡

使達肌表使以姜葱以和營

衛熱毒入裏亦由胃虛故以

人參甘草益胃加醋者酸以

收之也

辛夷散歲裏防風白芷并

麻與木通青細甘草茶

調服鼻生瘰內此方功肺經

上蒸于腦人鼻而生瘰肉猶

濕地得熱而生芝茵也諸藥

等分未服三錢○辛夷升麻

白芷能引胃中清陽上行頭

腦防風藁本能入竅頂燥濕

祛風細辛散熱通竅川芎散

鬱疏肝木通茶清瀉火下

行甘草甘平緩其辛散也

蒼耳散陳無中用薄荷辛夷白

芷四般和葱茶調服疏肝肺

清升濁降鼻淵瘡蒼耳子炒

荷辛夷各五錢白芷一兩末

服○凡頭面之疾皆由清陽

行

此手足少陰足厥陰少陽藥也熟地當

歸養血生地地骨涼血黃芩瀉肺火黃

連瀉肝火天冬清肺而滋腎柴胡散肝

而升陽五味收耗而斂散人參甘草以

益氣補中枳殼以利氣行滯也本草云

去皆能明目故

加減易治肝腎氣虛而目昏暗為

肝腎虛則目昏暗也

枸杞子 五味子 車前子炒二楮實

川椒炒一熟地黃 當歸五菟絲子

八兩 蜜丸酒下本方除當歸五味楮實

川椒名馬景丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋

腎菟絲楮實益精強陰五味斂耗散而

助金水五味子酸鹹居多能斂肺當歸

和氣血而益肝脾肝藏血脾統血川椒

補火以逐下焦虛寒車前利水而瀉肝

腎邪熱也車前子清肝明目利小便而

為得力張子和曰目赤腫是厥陰

肝經風熱利小便能去肝經風熱

設重方集并自云云 加減此丸安忘九三

下六

不計濁陰逆上所致濁氣上
藥于腦則鼻流濁涕為淵敷
藥升陽通竅除濕
散風故治之也

妙香散王山藥與參芪甘桔二

扶遠志隨少佐辰砂木香麝

驚悸鬱結夢中遺山藥二兩
姜汁炒人

參黃芪蜜炙茯苓茯神遠志
炒各一兩桔梗甘草各三錢
辰砂二錢木香二錢半麝香
一錢為末每服二錢酒下

山藥固精參芪補氣遠志二
扶清心寧神結梗木香疏肝
清肺丹麝鎮心散鬱解邪甘
草補中協和諸藥使精氣神
相法邪火自退不用固瀉之
藥為遺置良劑以其安神利

驚悸鬱結

除痰之劑十首附方五

二陳湯方用半夏陳益以茯苓

甘草臣半夏製二錢陳皮
去白茯苓各一錢甘

草五分加姜煎利氣調中兼去濕一

切痰飲此為珍陳皮利氣甘
草和中半夏

除濕氣順濕導痰湯內加星

枳頑痰膠固力能加胆星
以助牛

夏加枳實以成若加竹茹與

衝墻倒壁之功枳實湯名温胆可寧神湯加

定志丸方治目不能遠視能近視者王海
藏曰

目能近視責其有水不能遠視責其無火法宜補心常服益心強

志能療健忘

遠志 菖蒲二人參 茯苓一 蜜丸

硃砂為衣張子和方無菖蒲加茯神柏

子仁酸枣仁亦名定志丸酒糊丸姜湯

下安魂定驚

此手少陰藥也人參補心氣菖蒲開心

竅茯苓能交心氣于腎遠志能通腎氣

于心朱砂色赤清肝鎮心心屬離火火

旺則光能及遠也

地芝丸東垣治目能遠視不能近視王海藏
曰目能

遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

生地黄焙天冬四兩枳殼炒甘菊花去皮

蜜丸茶清下或酒下用茶者欲火熱之
下降用酒者欲藥

力之

此足少陰藥也生地涼血生血天冬潤

肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降火除風

人參益胃湯 治勞役飲食不節內障目

病內障者睛裏昏暗與不病之眼無異
惟瞳人內有隱隱青白者李東垣曰

竹茹枳實各温胆 潤下丸丹

湯治胆虛不眠 僅陳皮草利氣祛痰妙絕倫

陳皮去白八兩鹽五錢水浸洗甘草二兩蜜炙蒸餅糊凡姜湯下或將陳皮蜜水煮晒同甘草為末各二賢散不可多服恐損元氣

滌痰湯嚴用半夏星甘草橘紅

參茯苓竹茹葛蒲兼枳實痰

迷舌強服之醒 治中風痰迷能言半夏姜製胆星各三錢半橘紅只實茯苓各二錢人參葛蒲各一錢竹茹七分甘

加入參扶正當蒲開竅竹茹清金

青洲白朮星夏并白附川烏俱

用生晒露糊丸姜薄引風痰

癱瘓小兒驚 子各三兩川烏去皮腦五錢四味俱生用為末袋盛水攪出粉再搗再攪以尺為度盛盆盛則日晒夜露春五夏二秋七冬十日糯米糊丸姜湯下

下癱瘓酒下驚風薄荷湯下○生也由于風寒温星夏辛温法痰燥湿烏附辛熱散寒逐風浸而暴之殺其毒也

清氣化痰 星夏橘杏仁枳實

易真次舌痰

五藏六府之精氣皆稟受于脾胃而上貫于目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五藏六府之精氣皆失所司不能歸明于目矣心者君火也主神宜靜而安相火伐行其令相火者胞絡也主百脉皆榮于目既勞役運動勢乃妄行及因和氣所併而損其血脉故諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神治標不治水不明正理也

黃芪 人參 甘草 白芍藥 黃

柏 酒炒四錢 蔓荊子 每四錢日二服

本方加升麻葛根各益氣聰明湯 補門

此足太陰陽明藥也參芪甘草大補中氣以強脾胃蔓荊升清陽而通九竅白

芍入厥陰而和營血 日得血黃柏除濕

熱而滋腎水 腎水足則目明使精氣足而清陽

升則藏府和而障翳退矣 黃全善言曰治而未脫可于參芪中微加連柏若氣已脫連柏等涼劑不可施矣

清風養血湯 治目赤腫痛 風熱傷血則則腫風熱攻注則痛○日外向面者為外翳在內逆鼻首為內翳上為外皆下為內皆目痛赤脈從上下者為太陽症宜温之散之從下上者為陽明症宜寒之下之從外走內者為少陽症宜和解之

荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁 紅花 川芎 當

醫方集解 目赤、清風養血湯

五 下六

栝藟實去核姜汁為糊丸氣

順火消痰自失牛夏姜製肝

紅枳實筵炒杏仁去皮尖栝藟仁去油黃芩酒炒茯苓各一兩姜汁糊丸淡姜湯下氣能發火火能生痰陳杏降逆氣枳實破滯氣芩栝平熱氣星夏燥溫氣茯苓行水氣水濕火熱皆生痰之本也故化痰必先清氣為先

順氣消食化痰丸瑞竹青陳星

夏服子蘇攪麩麥山查葛杏

附蒸餅為糊姜汁搏牛夏姜製世星

炒神理山查葛根杏仁去皮火炒香附醋炒各一兩姜汁和蒸餅為糊丸痰由濕生星夏燥濕痰因氣升蘇小杏仁降氣痰因氣滯青陳香附導滯痰生于酒食曲葛解酒查來消食虛去食消則痰不生氣順則喘滿自止矣

滾痰丸王隱用青礬石大黃黃

芩沉水香百病多因痰作祟

頑痰怪疔能匡青礬石一兩

一兩同入瓦罐鹽泥固略煨至石色如金為度大黃酒蒸黃芩酒洗各入兩沉水香五錢為未水丸姜湯下量虛實服

且可百病占庚八

掃洗白芍酒炒草決明 石決明 甘草

錢一 水煎服

此足太陽厥陰藥也荆芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮上升並能消風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養血去瘀而決明皆除肝徑風熱端治目疾瘀去血活則腫消風散熱除則痛止又目為肝竅搜風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云日表當除風散熱在臟則為裏管裏血安神暴發者為表易療久病者為裏難治

洗肝散 治風毒上攻暴作赤腫目痛難

開隱瀉膠淚非日赤腫或大府秘脈實

之瀉青丸洗肝散之類是也

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎

梔子 大黃 炙甘草 等分為末每

服一錢無要症者除

此足厥陰陽明藥也肝屬木而主目木喜條達風熱鬱于內故用薄荷羌防以升之散之肝藏血故用當歸川芎以和之養之大黃瀉胃火而通燥結梔子降

受身之長年日公、洗肝散補肝散

下六

之治黃芩涼心肺以平土倍
之火沉香能升降諸氣以導
諸藥為便然非
實休不可輕投

金沸草散治前胡辛半夏荆甘

赤茯苓前胡姜棗除痰嗽肺

感風寒頭目響旋覆花前胡

半夏五分荆芥錢半甘草錢
三分赤茯苓六分○風熱上
壅故生痰作嗽荆芥發汗散
風前胡旋覆花消痰降氣半夏
燥痰散逆甘草發散緩中細
辛溫經茯苓利濕用赤者入
血分而泄
丙丁也
局另金沸不用細
辛茯苓加入麻黃赤芍均治

牛夏天麻白朮湯治參芪橘柏

及于姜苓瀉麥芽蒼朮麩太

陰痰厥頭痛半夏麥芽各錢

各一錢人參黃芪陳皮各水
茯苓澤瀉天麻各五分于姜
五分黃柏酒洗二分○痰厥
非半夏不能除風虛非天麻
不能定二朮燥濕益氣參芪
瀉火補中陳皮調氣升陽苓
瀉導熱導水麩麥化滯助脾
于姜以滌中寒黃柏以瀉在
泉少
火也

常山飲局中知貝取烏梅草菓

檳榔聚姜棗酒水煎露之劫

易百飲古痰

心火而利小便一便利則快甘草緩
肝氣而和中州

補肝散治肝虛目痛筋脈疼痛淚不

止羞明怕日及夜則痛甚點苦寒之藥

反劇者自白珠屬陽白珠痛者則晝盛

夏枯草錢香附兩每服五錢脈茶下

丹溪方夏枯草香附各二兩加甘草五

錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏至陰生則

益而繩陽之氣有補養厥陰血脉之

功夜痛及用苦寒藥反盛者夜與寒皆

陰也夏枯草能治之者陽勝陰也香附

行氣散肝和中解鬱推陳致新故用以

為佐

撥雲退翳丸皇統間醫官治風熱障翳

有氣血虛實或挾痰挾濕陰

虛火動七情六淫種種不同

當歸兩川芎兩地骨皮兩白蒺藜兩蜜

蒙化兩甘菊花兩羌活兩荆芥兩木賊兩

兩天花粉兩蔓荊子兩薄荷兩枳實兩

甘草錢川椒錢黃連錢蛇蛻錢蟬蛻錢

及百方集方中目卷二、卷三、卷四、卷五、卷六、卷七、卷八、卷九、卷十、卷十一、卷十二、卷十三、卷十四、卷十五、卷十六、卷十七、卷十八、卷十九、卷二十、卷二十一、卷二十二、卷二十三、卷二十四、卷二十五、卷二十六、卷二十七、卷二十八、卷二十九、卷三十、卷三十一、卷三十二、卷三十三、卷三十四、卷三十五、卷三十六、卷三十七、卷三十八、卷三十九、卷四十、卷四十一、卷四十二、卷四十三、卷四十四、卷四十五、卷四十六、卷四十七、卷四十八、卷四十九、卷五十、卷五十一、卷五十二、卷五十三、卷五十四、卷五十五、卷五十六、卷五十七、卷五十八、卷五十九、卷六十、卷六十一、卷六十二、卷六十三、卷六十四、卷六十五、卷六十六、卷六十七、卷六十八、卷六十九、卷七十、卷七十一、卷七十二、卷七十三、卷七十四、卷七十五、卷七十六、卷七十七、卷七十八、卷七十九、卷八十、卷八十一、卷八十二、卷八十三、卷八十四、卷八十五、卷八十六、卷八十七、卷八十八、卷八十九、卷九十、卷九十一、卷九十二、卷九十三、卷九十四、卷九十五、卷九十六、卷九十七、卷九十八、卷九十九、卷一百

痰截瘴功堪詡常山燒酒炒

母草果煨極細各一錢烏梅二箇一方加川山甲甘草癩未發時面東溫服○知母治陽明獨勝之熱草菓治太陰獨勝之寒二經和則陰陽不至交爭矣常山吐痰行水樨柳下氣破積貝母清火散痰烏梅斂陰退熱須用在發散表邪及提出陽分之後為宜

截瘴七寶飲易常山菓樨柳朴

草青陳夥水酒合煎露一宵

陽經實熱服之效常山酒炒

椰厚山青皮陳皮甘草等分水酒各半煎之發日早晨服破積陳皮利氣青皮伐肝厚朴平胃草菓消膏梁之痰加甘草入胃任常山以引吐也

收瘴之劑九首附方二

金鎖固精丸 芡蓮鬚龍骨痰藜

牡蛎靈蓮粉 糊左指酒下

瘴精秘氣瘴遺無芡實蒸蓮

茯苓炒各二兩龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日夜煨粉各一兩蓮子粉為糊丸鹽湯或酒下○芡實固精補脾牡蠣瀉精清熱蓮子交通心腎痰藜補腎益精龍骨蓮鬚皆固精收脫之品

易頭欬舌瘴

蜜丸每兩作十丸每服一九日三服者

米泔下疔暗當歸湯下内障木香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荆薄

荷以升陽散風當歸川芎以和肝養血

黃連地骨花粉清火熱枳實破滯氣川

椒溫下焦木賊蛇蛻蟬蛻以退翳蜜蒙

蒺藜甘菊目家藥以潤肝補腎瀉火

清金灸草補中以和諸藥也

石膏羌活散明治久患獲目不明遠年近

日內外氣障風昏拳毛倒睫一切眼疾

羌活 荆芥 白芷 藜蘆 細辛

川芎 蒼朮 甘菊 蜜蒙花 萊子

麻子 木賊 黃芩 石羔 甘草

等分為末每服一二錢食後臨臥蜜

水調下或茶清米泔亦可

此足太陽陽明厥陰藥也原文曰羌活

治腦熱頭風蒙朮治偏頭痛白芷清頭

目川芎療頭風荆芥治目中生瘡蜜蒙

治羞明怕日蒼朮明目煖水藏木賊退

障蒙麻子起拳毛細辛萊子起倒睫黃

石羔羌活湯

茯苓丹崩療精滑脫芩五味

石蓮末酒煮山藥為糊丸亦

治強中及消渴性中者下消

盛不交精出也菟絲子十兩酒浸五味子八兩白茯苓石蓮各三兩山藥六兩酒煮為糊丸漏精湯下赤濁灯心湯下白濁茯苓湯下消滑米飲下○黃芩強陰抑陽五味渣精生水石蓮清心止濁山藥利濕固脾茯苓甘淡而滲于補正中能瀉腎利也

治濁固本 蓮蓬鬚砂仁連柏

二苓值益腎半夏同甘草清

熱利濕直兼馬利濕熱蓮蓬鬚黃連炒各二兩砂仁黃柏益智仁半夏姜制茯苓各二兩猪苓二兩甘草炙三錢○精濁多由濕熱與痰連相清熱二苓利濕半夏除痰濕熱多由人滯砂益智利氣兼能固腎強彈日草補土和中蓮蓬鬚則清以止脫也

訶子散東垣用治寒泄炮姜粟壳

橘紅也訶子煨七分炮姜六分

橘紅各五分未服○粟壳固腎瀉腸訶子肢脫住泄炮姜逐冷補腸氣河間散木香訶草連仍用木芍煎湯下訶子

易頁次古清

苓石羌清心退熱甘菊降火除風甘草

調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛倒睫拳毛由目

蓋伏熱內攻陰氣外行當去其內熱併火邪使眼皮緩則眼毛立出黃連炒甘草參錢當歸半葛根防風五細辛二葛荆子分食後服退風寒濕熱

此足太陰陽明藥也參甘以補其氣痛身以濡其血黃連以清其火防葛以散其風熱細辛入少陰而開竅葛荆走頭

面而升陽

木方除人參當歸黃連加黃芪各神效明目湯東垣治前症兼赤爛昏痛冷淚多眵 又法摘去拳毛以風血點數次即愈

羊肝丸類 治目疾內障俛仲賢曰經曰心

者其竅也又為肝竅腎主骨骨之精為神水故肝木不平內核心火為勢妄行火炎不制神水受傷上為內障此五葷病也諸脈皆屬于目相火者心包絡也主百脈土榮于目火盛則百脈沸騰土為肉障此虛陽疾也膀胱小腸三焦胆筋俱備于目其精氣亦上注為目之精四府一衰則精氣尺敗邪火乘之上為

醫方集解 卷之六 防風飲子 九

一兩半生半煨木香五錢黃連三錢甘草二錢為末煎白木芍湯調服久泄以此二止之不止加厚朴二錢。

方藥異治畧同亦主脫肛便血者。

桑螵蛸散 寇宗 治便數參龍

骨同龜殼 葛蒲遠志及當歸

補腎寧心健忘覺 桑螵蛸鹽

茯苓一用茯神龍骨煨龜板
碎炙葛蒲鹽炒遠志當歸等
分為未臨臥服二錢人參湯
下治小便數而欠補心安神
○虛則便數故以人參螵蛸

之當歸潤之葛蒲扶冬遠志
並能清心煖而通心腎使心
藏清則小腸
之府自寧也

真人養藏 湯羅 詞粟殼肉蓯蓉

歸桂木香木芍參甘為濟劑

脫肛久痢 煎嘗詞子麵

錢瞿粟壳去蒂蜜炙三兩六
錢肉豆蔻麩裹煨五錢當歸
白木炒白芍酒炒八錢各六
錢木香二兩四錢桂八錢生
甘草一兩八錢每服四錢藏
寒盛加附子一方無當歸一
方有手姜二片脫由干虛寒
參木甘草以補其虛官桂豆
蔻以溫其寒木香調氣當歸
和血芍藥酸以收斂詞子粟

內障此六府病也神水黑眼皆法于陰
白眼赤障皆法于陽陰齊陽作故能為
視陰微不立陽盛即注經曰壯火食氣
壯火散氣上為內障此弱陰病也四者
皆為陰弱不
能配陽也

夜明砂 陶單蛻 木賊 節當歸 酒洗羊

肝四兩者
或生用 以羊肝去筋膜水煮搗爛

和丸

此足厥陰藥也 蚊食血之虫夜明砂皆

蚊眼也 故能散目中惡血而明目蚊蟻

而眼不化其木賊輕揚而善磨木故能
醫為夜明砂

平肝散熱而去障蟬性善脫故能退翳

當歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者

羊性屬火 取其氣血之屬能補氣血引

諸藥入肝以成功也 羊肝凡之方頗多
葶量錄其一二。

濟生羊肝 并黃連一兩 羯羊肝一具 去

筋膜 佳用搗爛 和丸 本事方煮爛搗用

治肝經有熱目赤睛痛及內障青盲 綱

云但是目疾及障醫者皆治忌猪肉
冷水○麥全善曰誠哉河間之言目盲
耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運
用者皆由玄府閉塞而神氣出入升降
之道路不通利也故先賢治目昏花如
羊肝凡用羊肝引黃連等藥入肝解肝
中諸入益肝主目肝入解則目之玄府
通利而明矣黃連之類解熱入也取目

壳適以止脫

當歸六黃湯治汗出

日自汗寐而汗出

黃柏黃連黃芩二瀉火固表

地等分黃芪加倍

復滋陰汗由陰虛

其陰汗由火擾黃芩

柏連以瀉其火汗由表

虛倍用黃芪以固其表

黃根功更異根走表能引諸

藥至衛分或云此藥大苦寒

而固腠理

胃弱氣虛在所忌

白子二凡人參朮麥

牡朮杜

黃根再加半夏五味子陰虛

盜汗丸吞

柏子仁炒研去油二兩人參白

朮牡朮麻黃根半夏五味

各一兩麥麩五錢肉丸米

飲下○心血虛則臥而汗出

柏仁養心寧神牡朮麥麩涼

心收脫五味歛汗半夏燥濕

麻黃根而走肌表引參朮以

固衛

陽虛自汗牡蠣散黃芪浮麥麻

黃根

牡蠣煨研黃芪麻黃根

各一錢浮麥涼心止汗黃

芪麻黃根走肌表而固衛一

扑法芎藭牡蠣米朮

本川

易百頁五

之類解濕鬱也羌附之類解氣入也

扁之類解血鬱也不賦之類解積鬱也

羌活之類解經鬱也破有之類解頭目

鬱隆和氣使下降也蔓青下氣通中理

亦同也凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏

之法河間之言信不誣矣至于東垣丹

溪用參芪補氣血亦能明者蓋目土氣

血盛則玄府得利出入升降而明虛則

玄府無以出人升降而昏此則必用

參芪四物等劑助氣血運行而明也

兔矢湯治瘡疹入眼及昏暗障翳

兔矢錢

茶清調下或吞服須待瘡疹

瘡後服之

此足厥陰陽明藥也兔者明月之精得

金之氣其矢名望月砂能解毒殺虫故

能明目又可兼治勞瘡也

二百味草花膏治目赤流淚或痛或痒

晝不能視夜惡燈光則多淚熱微則痒

熱甚則痛亦腫昏眵故晝不能視陽盛故夜惡燈光

羯羊胆入蜜胆中蒸熟候乾

細研為膏每含少許或點目中又法臘

月入蜜胆中紙籠套住懸屋簷下待霜

出掃取點眼

此足少陽厥陰藥也羊胆苦寒益胆瀉

熱蜂蜜甘潤補中緩肝曰二百味草花

芎各二錢半糯米粉兩或將
半為未袋盛週身扑之
龍骨牡蛎 龍骨牡蛎為未
亦可
扑汗

殺蟲之劑 二首

烏梅 凡用細辛桂人參附子

椒姜 繼黃連黃柏及當歸溫

藏安 毗寒厥劑 烏梅三百箇
醋浸蒸細辛

桂枝附子炮人參黃柏各六
兩黃連一斤干姜十兩川椒
去汗當歸各四兩治傷寒厥
陰症寒厥吐蛇虫得酸則
伏故用烏梅得苦則安故用

辛發腎邪桂枝散表風痺刻
情曰名曰安蛇實是安

化蟲 鶴虱及使君板榔蕪蕪

苦楝 群白礬胡粉糊丸服腸

胃諸 虫永絕氣 鶴虱板榔苦

胡粉炒各一兩使君子蕪蕪
各五錢枯礬二錢半麵糊丸
亦可未服○數藥皆殺虫之
品單服尚可治之彙萃為丸
而重焉有一
不死者乎

癰瘍之劑 六首附方二

真入活命 飲 金銀花防芷煨陳

易真飲占虫

膏者 以美食百草蜂採百花也 李時珍

穀干目胆汁減則目暗目昏肝之外候
胆之精華也故諸胆皆治目疾点服說
云病有內外治各不同內疾既發非服
不除外疾既成非点不退內疾始盛清
源不如塞流伐枝不如去根不服藥而
除者未之見也外障既成如物汚須濯
鏡垢須磨不点而去者未之見也若內
障不眼而外点及激其火動其血氣無
益反損苦外障既成虽服藥不斃不長
而所結不除當內外夾攻方尽其妙

點眼方 丹溪治目中百病 屬陽

黃連 人乳 浸點或煎點或加朴硝

此足厥陰藥也衍義曰人心主血肝藏
血目受血而能視蓋水入于經其血乃

成矣曰上則為乳汁下則為月水故知

乳汁即血也用以點目豈有不相宜者

哉昂按加黃連者以清心肝之火也

百點膏 東垣治翳遮瞳人如雲氣障隔

黃連 一錢以水一盞煎黃連 甘草 六

防風 八生 去皮尖 同熬滴水不散

去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心

點之點至目微痛為度日五七點使藥

相續故曰百點臨卧點尤妙

此足厥陰藥也黃連瀉火防風散風甘

醫方集解 目卷六 百點膏圖則善 十一 下六

草節加貝母天花兼乳沒穿

山角刺酒煎嘉八上銀花二錢

皮去白各錢半防風七分白芷甘草節貝母天花粉乳香各一錢沒藥五分二味另研俟煎熟下皂角刺五分穿山甲三大片對蛤粉炒去粉用如酒煎服恣飲忍冬甘草散熱解毒瘡瘡聖藥花粉貝母清痰降火防風白芷燥濕排膿當歸和血陳皮行氣乳香托裏護心沒藥散癩消腫山甲角刺透經絡而一潰堅加酒以行藥勢也

切瘡疔能潰散已成者潰

後忌服用母差大黃便實可

加使鐵器酸物勿沾牙

金銀花酒加甘草奇癩惡毒皆

能保金銀花五兩生者更佳

一衣甘草一兩水酒煎一日

服只護膜須用蠟

日礬一兩密化為丸酒服十

丸加至百丸則有力使毒不

攻心一方加雄黃名雄

礬丸蛇咬者宜服之

均是湯科寶

草和中當歸養血麩仁消風散熱益水

生光

圓明膏東治內障生翳及瞳子散大因勞

心過度飲食失節

柴胡 麻黃 黃連 生地五錢 煇身三錢

甘草 訶子皮溫紙裹 以水二碗先

煮麻黃至一碗去沫入後藥同熬至滴

水不散去渣入蜜少許再熬點之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散

別當歸生地和肝養血黃連清肝火甘

草和中州瞳子散大故加訶子以收之

也

飛絲苦塵入目方

陳墨 濃磨點之

托裏十補散

醫方集解

桂白芷及防風甘桔厚朴酒

調服瘧瘍脈弱賴之丸

當歸各二錢川芎桂心白芷
防風甘草桔梗厚朴各一錢
熱酒調服○參芪補氣當歸
和血甘草解毒防風羌活厚
朴散滿桂芷桔梗排膿表裏
氣血交治其成內托之功

托裏溫中湯

沉共四香陳皮益智兼甘草

寒癆內陷嘔瀉良

活名三錢木香錢半茴香丁
香沉香益智仁陳皮甘草各
易酒飲舌癆

癰瘍之劑

未丹侯口瘡疔皆因陰陽
也而血脈中氣行脈外相並周流寒
與濕搏之則凝滯而行遲為不及熱
與火搏之則沸騰而行速為太過氣
得邪而鬱津液稠結為痰為飲積久
滲入脈中血為之濁此陰滯于陽也
血得邪而鬱隧道阻滯或溢或結積
久滲出脈外氣為之亂此陽滯于陰
也百病皆由于此不止瘰癧而已也
內滲白榮氣不從逆于肉裡乃生瘰
癧又曰諸痛痒痞皆屬心火外科方
症至為繁多茲取可通用者量錄數
方以備緩急其餘各症各有專方不
能多錄若夫泄熱解毒活血托裏之
劑多散見于諸門唯在用者之圓神
而已

一錢加姜五片煎治瘡瘍多變

寒內陷心痞便澀嘔呃昏噴

○上場寒內陷故用姜附溫中

助陽羌活通關節炙草益脾

元益智丁沉以止呃進食荷

木陳皮以散滿除痞此孫彥

和治主伯麻臂癆盛夏用

此亦捨時從症之變法也

培裏疔痛湯四物兼川芎白芍

乳香沒藥桂心添再加蜜炒

瞿粟殼滑瘍虛痛去如枯粟

壳收滿能止諸痛桂心四物

活血托裏充肌乳香能引毒

氣外出不致內攻與

沒藥並能消腫止痛

救種實堅湯東和栢連花粉黃

芝龍胆宜升柴翹葛兼甘桔

婦芳稜莪昆布全黃芩八錢

生用知母黃柏酒炒花柳粉

草酒炒桔梗昆布各五錢柴

胡四錢升麻連翹甘草炙三

稜酒炒莪莖酒洗炒各三錢

葛根煨尾酒洗白芍酒炒各

二錢黃連二錢每服五六錢

先浸後煎○連翹升葛解毒

升陽甘桔花粉排膿利膈痛

芍活血昆布散痰移述破血

行氣龍胆知栢苓連大泄諸

火也

經產之劑十二首附方二

病與男子同惟行經奸姦

不可例治故立經產一門

易百八舌瘍

真黃散治一切癰疽腫毒初起未

消者

金銀花錢陳皮去當歸酒洗防風分七

芷甘草節貝母天花粉乳香

一錢沒藥二味另研皂角刺分五穿山甲大三

片剉蛤粉用好酒煎毒在上飽服在

下饑服善飲者多飲酒以行藥勢忌酸

物鐵器酸多忌飲

此足陽明厥陰藥也金銀花散熱解毒

瘡瘡聖藥故以為君花粉清痰降火白

芷除濕祛風並能排膿消腫當歸和陰

而活血陳皮燥濕而行氣防風瀉肺疏

肝貝母利痰散結甘草化毒和中故以

為臣乳香調氣托裏護心能使毒氣外

沒藥散瘀消腫定痛故以為佐穿山甲

善走能散皂角刺辛散剝銳皆厥陰陽

明正藥能貫穿經絡直達病所而潰進

破堅故以為使加酒者欲其通行週身

使無和不散也此藥當服于未潰之先

已潰後不可服未成者散已成者潰若

醫方集解卷之

金銀花酒

十五

海藏妊娠六合湯四物為君妙

義長當歸地黃川芎白芍傷寒表虛地

骨桂表虛自汗發熱惡寒頭

實細辛兼麻黃頭身熱無汗脈緊四物

少陽柴胡黃芩心煩喜嘔

湯目苦脈弦為少陽症加柴胡

湯解表黃芩清裏名柴胡六合

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

湯而長為陽明症加白虎湯小

金銀花酒 治一切瘡疽惡瘡不問發在

何處或肺癰腸癰初起便服奇効之生

始于喜怒憂樂之不時飲食居處之不

節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不

調致陰陽不平而蘊結營衛凝滯而腐

潰輕者起于六府浮達而為癰重者發

于五藏沉滯而為疽淺者為癰官者為

癰深則為疽矣發于外者為皆疽腦

疔眉鬚等疽發于內者為肝癰肺癰腸

疔等癰外症易識內症難明太陽陽明

經皆而出少陽經虛從鬚而出陽明

經虛從鬚而出腎脈經虛從腦而出

通利則藥力到外以生者搗爛調敷毒

四圍

此足太陰陽明藥也金銀花寒能清熱

解毒甘能養血補虛為瘡癰聖藥甘草

亦扶胃解毒之上劑也

本方用金銀花兩甘草兩加黃芪兩酒

一升重湯煮服各回毒金銀花湯治痛

瘍色變紫者

附忍冬膏金銀花化一四月採鮮花搗汁

熬膏茶酒任點服養陰退陽補虛療風

易百款活症

易百款活症

易百款活症

加桂附身冷拘急腹痛肝泡

附子肉桂散寒回陽名附桂六合湯

便秘畜血

桃仁黃大便秘小便赤明青

幽者名大黃六合湯

安胎養

血先為主餘因各症細察詳

後人法此治經水過多過少

別溫涼濕六合湯加芩木加

芩白木治經水過多黃芩

抑陽白朮補脾能新血色

黑後期連附商加黃連清熱

連附六合湯加

子黃連治

血熱妄行寒六合湯加附姜

加炮姜附子

治血海虛寒氣六合湯加陳

朴加陳皮厚朴

治氣鬱經阻風六合湯加

芫菴加秦芫菴恬

此皆經產

通用劑說與時師好審量

膠艾湯金中四物先阿膠艾葉

甘草全阿膠川芎甘草各二

芍藥地黃各四兩酒煎內

阿膠烱化服之四物養血阿

膠補陰艾葉補陽甘草人良

草和胃加酒行經

方單膠艾亦名膠胎動血漏

尤宜手火熱熾盛之人永無瘡疔之患

蜜酒亦佳花葉同功而花香尤勝

蠟藥丸治一切瘡癤惡毒先服此丸護

膜托裏使毒不攻心或為毒虫蛇犬所

傷並宜服之

黃蠟二白白琴一先將蠟溶化候少冷

人羸和勻為丸酒下每服十丸漸加至

百丸則有力瘡愈後服之亦佳加雄黃

名雄馨丸治惡毒蛇犬虫咬毒

此等少陰藥也心為君主不易受邪凡

患癰疽及蛇犬所傷毒上攻心則命立

傾矣黃蠟甘溫白琴酸澁並能固膜護

心解毒定痛托裏排膿使毒氣不致內

攻故為患諸症者所必用也

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒如

發脈弦洪實發腫甚欲作膿者脈弦洪

實熱墜滿之

症故宜下之

金銀花三錢當歸一兩大黃 朴硝 花粉

連翹 牡蛎 皂角刺三錢 黃芩

赤芍一錢 每服五錢半酒半水煎

此等方集詳傷寒托裏散 下七

湯頭歌

腹痛痊膠艾四物加香附

附香用童便鹽水酒醋各浸三日炒

方名婦寶

當歸散金益婦人姪木芍芎歸

及子芩安胎養血宜常服產

後胎前功效深婦人恆胎宜常服之臨盆

易產且無眾疾當歸川芎芍藥黃芩各一斤白朮半斤為

未酒調服○丹溪曰黃芩白朮安胎之聖藥益懷妊宜清

勢涼血血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白朮補脾亦除胃熱脾胃健則能

思也

黑神散局中熟地黃歸芍甘草

桂炮姜蒲黃黑豆童便酒消

瘀下胎痛逆忘瘀血攻衝則作痛胞胎不

下亦由血滯不行諸藥各四兩黑豆炒去皮半升酒童便

合煎日熟地歸芍酒以糯米蒲黃黑豆滑以行血黑姜官

桂熱以動血緩以甘草散以童便行以酒力也

清魂散嚴氏用澤蘭葉人參甘草

川芎協荊芥理血兼祛風產

中昏暈神魂帖澤蘭人參甘草各三分

且勿自誤舌產

此足陽明厥陰藥也金銀花清熱解毒

瘡癤主藥當歸赤芍調營血大黃芒硝

蕩胃熱黃芩清肺火牡蛎軟堅痰連翹

花粉散結排膿角刺鋒銳直達病所而

潰散之也李東垣曰瘡瘍及結病面赤

氣拂鬱邪氣在徑宜發表以去之故曰火鬱則發之

其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脈風症只宜發表風藥便可以

通利大便若只乾燥秘澀尤宜潤之慎不可下九竅不利瘡瘍鬱胃皆不可下

汗之則愈綱目曰大便秘實不知其氣不降也便以為實而行大黃此少寒熱

不知其血氣不和也便以為有外感而行表散如此害人甚速

救苦勝靈丹方一名救苦化治癩癧馬刀

挾瘦從耳下或耳後下頸至肩或入缺

盆中乃手足少陽經分其癩癧在頸下

或至頰車乃足陽明經分受心脾之邪

而作也今將三症合而治之一切雜病皆

所見之症外科亦然

黃芪護皮毛黃元氣活連翹能散諸經

十二經瘡藥漏芦各一葛根五

中不可無也丹皮去腸胃中當歸生

此三味足陽白芍藥各三分

明水經藥也熟地此三味和血

地白芍藥酸寒能

醫方集解瘡癤、救苦勝靈丹方

川芎五分荆芥一錢酒調下
○川芎澤蘭和血人參甘草
補氣外感風邪荆芥能疏血
中之風肝藏魂故曰清魂

羚羊角散 本事 杏薏仁防獨芎

婦及茯神酸枣木香和甘草

子癰風中可回春 羚羊角屑

薏仁防風独活川芎當歸茯
神杏仁炒各五分木香甘草
各二分牛加姜煎治雜娠中
風涎潮僵仆口噤抽掣名子
癰○羚羊平肝火防獨散風
和炙茯苓以寧神芎婦以和血
杏仁木香以利氣
苡仁甘草以調脾

當歸生髮羊角易 金匱當歸二

一斤產中腹脹勞傷

自汗身痛名虛勞腹痛者亦

瘀血不去新血不生也

有加入參芪者 氣能生血○

氣血之屬以補氣血當婦引

入血分生萎引人氣分以生

新血加參芪者

氣血交補也 **于金四物甘**

桂姜 于金羊肉湯芎婦芎地

桂姜甘草乾姜肉桂加羊肉煎

達生 散丹溪云達生紫蘇大腹

皮參朮甘陳芎婦隨再加葱

葉黃楊腦孕婦臨盆先服之

大腹皮三錢紫蘇人參白木

上炒陳皮當歸酒洗白芎酒

易真吹舌產

補中益肺治腹痛必用之 **防風** 五

夏月倍之冬寒則不可用 **獨活** 一錢此三味必關手足太陽症

之防風辛溫若瘡在膈已上虽無太陽

症亦常用之為能散上部風和去病人

拘急 **柴胡** 八分功同連翹如瘡

也 **鼠粘子** 解毒無 **人參** 各三分補肺氣如氣

腫不用 **肉桂** 二分能散

灸五分能調中和諸藥 **肉桂** 二分能散

泄火益胃氣亦去瘡邪 **肉桂** 結積陰症

瘡瘍當少用之此寒因熱用之意又為

陰寒覆蓋其瘡用大辛熱以消浮凍之

氣煩燥 **黃連** 以治 **黃柏** 熱或腿脚無力

者去之 **黃連** 煩悶 **黃柏** 熱或腿脚無力

加之如煩燥欲去衣者腎中 **昆布** 二分

伏火也更宜加之無此勿用 **昆布** 二分

軟堅瘡厚 **三稜** 煨 **莪** 逆 煨三分此二

腰者宜用 **三稜** 煨 **莪** 逆 煨三分此二

堅勿用 **益智** 人吐沫吐食胃寒者加之

麥芽 一錢治腹中結申曲炒能

二分腹脹加 **蒸餅** 為丸每服三錢如

之否則勿用 **蒸餅** 為丸每服三錢如

氣不順加陳皮木香大便不通加酒製

大黃 血燥加桃仁大黃風燥加麻仁大

黃秦 元皂角子 用

此足陽明手足少陽藥也解照東垣註

各藥下東垣立此法以聽用者之進退

倘能隨症加減實能統治諸瘍亦嘉惠

後人無窮之心也

醫方集解 卷之

九

下七

洗各一錢甘草炙二錢青蔥
五葉黃場腦七箇煎○精勻
以益其血參朮以補其氣陳
腹蘇蔥以疏其壅不虛不滯
產自無 若將川芎易白朮
雅矣

紫蘇飲子嚴子懸宜和上冲
心胸名

子懸
妊轉胞參朮飲丹溪轉胞者
痰飲阻塞胎為胞逼壓在一
邊故脘下急痛而小便或數
或閉

芎芎當歸熟地黃炙草
陳皮留兼半夏氣升胎舉自

牡丹皮散良方延胡索歸尾桂

心赤芍藥牛膝稜菝酒煎
氣行瘀散血痕削則成痕丹

皮延胡索日尾桂心各三分
赤芍牛夕菝進各六分三稜
四分酒水各半煎○桂心丹

皮赤芍牛膝以行其血三稜
菝進尾延胡兼行血中氣
滯氣中血滯則結者散矣

固經丸婦人良方用龜板君黃栢棗
皮香附群黃芩芍藥酒丸服

漏下崩中色黑及治經多不
者屬熱電板炙四兩黃栢酒
炒芍藥酒炒各二兩棗皮炒

散腫潰堅湯東治同前症

黃芩八錢半酒用知母 黃柏酒炒胆草酒

花粉酒炒桔梗 昆布錢五柴胡錢四升麻

連翹 甘草炙三稜酒洗廣逆酒洗炒葛
根 歸尾酒洗芍藥錢二黃連錢一 每服六

七錢先浸半日前食後熱服服後仰臥
取藥在上膈另將半科蜜丸留藥湯吞
量虛實服

此手足少陽足陽明藥也柴胡連翹清
熱散結升麻葛根解毒升陽花粉桔梗

清肺排膿歸尾芍藥潤肝活血甘草和
中化毒昆布散瘀潰堅三稜菝進破血

行氣三稜破血中之氣黃芩栢連龍胆
知母大泄三焦之火而桔梗又能載諸
藥而上行也

飛龍奪命丹 治一切疔腫瘡疽惡瘡初
發或發而黑陷毒氣內攻者

天南星 雄黃 巴豆去油錢黃丹乳
香 硃砂 信石五分班猫頭足炒麝
香少 爲末蟾酥和爲丸如黍米大每

易頂吹舌產

香許 爲未蟾酥和爲丸如黍米大每

香附童便浸炒各兩半黃芩酒炒二兩酒九〇陰虛不能制胞絡之火故經多龜板芍藥滋陰吐水黃芩清上焦黃柏瀉下焦香附辛以散八楞皮瀉以散脫

柏子仁丸良方熟地黄牛膝續斷

澤蘭芳卷柏加之通血脉經

枯血少腎肝匡柏子仁去油

拍各五錢熟地一兩續斷澤蘭各三兩蜜丸米飲下〇經日心氣不得下降則月事不來柏子仁安神養心熟地續斷牛夕補肝益腎澤蘭卷柏活血通經

付更用維方

望梅丸菴用鹽梅肉蘇葉薄荷

與柿霜茶末麥冬糖共搗旅

行實服勝瓊漿鹽梅肉四兩

荷葉去梗柿霜細茶各一兩紫蘇去梗五錢為極細末白霜糖四兩共搗為丸雞豆大旅行帶之每合一丸生津止渴加參一兩尤妙

骨灰固齒牙猪羊骨臘月醃成

煨研之骨能補骨鹹補腎堅

牙健啖老尤奇羊骨火煨細

研末每晨擦牙不可間斷至老而其功益彰用頭上齒骨易真次舌雜方

服十九或十四五丸量人虛實好酒送

下瘡在上者食後服瘡在下者食前服

忌油膩魚肉薑辛之物此十二經通行

之藥也毒氣內攻瘡瘍黑陷非平劑所

能勝南星雄黃黃丹味辛性燥能殺毒

破痰巴豆硃砂大毒大熱能祛寒化積

斑猫蟾酥辛寒至毒能拔疔腫下惡物

斑猫能瀉毒從小便出信石燥烈劫痰

巴豆能瀉毒從大便出麝香香竄通竅乳香能使毒氣外出不

致內攻引之以酒使行經絡無毒不瀉

也此乃厲劑所謂藥不瞑眩厥疾不瘳

此類是也下机微義曰此方世俗多用

不至者備汗吐下三法病因食一切禽獸毒發及瘡脉沉細緊數毒氣在裏併滋毒用之神効若大熱大渴毒氣熾發脉浮洪在表及膏梁積熱之人不宜輕用世人多不分此文有以半夏代雄黃者殊不知雄黃治諸瘡及百節中大風中惡者之意也

雄黃解毒丸丹治纏喉急瘰喉在後主氣

十二經中唯足太陽主表別下項餘經皆內循咽喉得病以病之而統在君相二火喉王天氣屬肺全變動為燥也則瀉而閉咽主地氣屬脾一變動為濕也則腫而脹皆火鬱上焦致痰涎氣血結聚于咽喉腫達于外麻痺且痛為纏喉

尋方集年癆毒、雄黃解毒丸 下七

亦佳

軟脚散中芎芷防細辛四味研

如霜輕撒鞋中行遠道足無

箴疤汗皆香防風白芷各五錢川芎細辛各二錢牛為末行遠路者撒少許于鞋內步履輕便不生微瘡足汗皆香

湯頭歌括後

附小兒稀痘方

稀痘神功丹三種豈粉草細

風乾配入梅花良絲瓜筋絲

煎湯服一年一次三年尤

小飯豆黑豆豉豆粉中各一而細末入竹筒中削皮留節... 固浸臘月則中一月取出洗淨風乾每葉一兩配腊月梅... 者不着人手以針刺取更妙... 知急用入紙套中畧烘即乾... 兒大者以一小者五分以... 霜後絲瓜籐上小籐絲煎湯... 空腹服忌電腥十二日解出... 黑糞為驗每年服一次一次... 可稀三次... 永不出矣... 又方蜜調忍冬末... 顧驤不住服之効亦強... 花為

風腫下兩 雄黃兩鬱金一錢巴豆十四

醋糊為丸每服五分津嚥下

此手足少陰少陽藥也吳鶴臯

曰纏喉急痺緩治則死雄黃能破結氣

變毒能散惡血巴豆能下稠涎丹溪生

平不用厲劑此益不得已而用者乎

雙蛾木舌子舌脹纏喉風走馬喉風病

同干火故不分也惟纏喉走馬喉風最

速張子和曰治喉痺用針出血最為上

策內經人鬱發之發謂發汗出血者乃

坐不眠 肺者五藏之華蓋也如于胸中

虛而風邪乘之內感于肺汗出惡風咳

嗽短氣鼻塞項強胸膈脹滿久久不瘥

則成肺痿風傷皮毛熱傷血脉風熱相

搏氣血滯留蘊結于肺則成肺癰多唾

涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿咽燥

而滑甚則四肢微腫咳吐膿血胸中隱

痛者肺癰也痿為正

氣虛癆為邪氣寔

皂莢 剝去皮 為末蜜丸以膏和湯

服三丸 此手太陰藥也喻嘉言曰火

熱之毒結聚于肺表之裏之溫之清之

曾不少應堅而不可攻者令服此丸庶

皂莢丸

下七

未糖調不更有玄參克絲子

住服之 蜜丸如彈空心膏白

相公 酒調化日二次

兔絲子半斤酒浸二宿煮乾去皮玄參四兩共為細末蜜丸彈子大白湯調下每日

次或加犀麥生地黃

又方加冬四不犀角一兩 此皆驗過稀痘法

為方簡易免倉皇

附痘科監製方歌

升麻葛根湯十味赤芍防芎甘

桔身山查蘇葉及牛蒡体氣

壯強斯藥治

粉葛一錢升麻分川芎防風各七分蘇葉桔梗各六分山查肉八分赤芍五分甘草二分姜煎此小兒初發熱無汗時服取微汗

敗毒和中

翹桔草牛蟬前麥

芎通好通麻芩殼紫荆防便

秘蒸黃微利早

連翹防風荆介牛蒡炒川芎木通各七分桔梗六分只元紫草茸各五分前胡麥冬

幾無堅不入聿成洗蕩之功不可以藥

之微賤而少之也千金方用桂枝湯去

芍藥加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯

治肺痿吐沫本方加蛤粉等分為末名

皂蛤丸治婦人風邪客于乳房而成疔

瘡每服二錢酒下

此能導其汗散其風邪汗出而病自愈矣

托裏十補湯

局方即外科精要十宜散 治瘡瘡初發或

已發邪高痛下瘡盛形羸脈無力者

若疽不四膏梁丹毒火熱因虛勞氣鬱者止宜補形氣調經脈自當消散不待汗之下

黃芪 人參 當歸 川芎

桂心 白芷 防風 厚朴 桔梗

甘草 每服二錢加至六錢熱酒調

下本方加芍藥連翹木香乳香沒藥亦

名托裏散治發背疔瘡 此手足太陰

足厥陰陽明藥也參芪補氣高滯活血

甘草解毒桂枝白芷桔梗排膿厚朴瀉

寔滯防風散風邪為表裏氣血之藥共

成助陽內托之功也

朱丹溪曰若冬月腫瘍用之可轉重就輕若潰瘍夏月用之以桂枝之溫散

佐以防風白芷吾思虽有參芪准為倚仗世人不分冬夏無論經絡不能無誤也机要曰治瘡須明在裏疏通藏府調

醫方集詳湯卷一打裏十補湯 二二三 下七

各一錢 蟬蛻十二隻 有閏月
加一隻 去頭足 黃連一分 甘
草二分 生姜 丹心 同煎 如大
便秘 澀加酒炒 大黃 微利之
升消平胃 散 朴陳芽白芷蘇芎

藿附砂吐瀉內傷兼腹痛須

加蒼木草山查 川芎紫蘇各七分 蒼木厚

村白芷陳皮各六分 藿香砂仁各五分 香附炒一錢 麥芽炒山查各八分 甘草炙一分 煨姜煎服

赤點紛已號夾班如雲突起又

名丹碎碎紛七名夾疹三症

芥茨疹須知 芥關 錢防風

荆芥半 芎藭炒各七分 升麻五分 甘草三分 水煎 有夾疹疹而出者 加桔梗七分 酒炒黃芩七分 同煎服

參芪實表保元湯 官桂芎防芷

朴當甘桔木香 姜作引氣虛

作痒賴安康 人參當歸防風

日芷川芎各七分 黃芪炙一錢 甘草炙官桂木香各三分 桔梗厚朴各五分 生姜同煎 此方專治痘作痒者宜服

驚搐休云作等閑風寒外束出

艰难參蘇羌莖芎防芥甘桔

易真次舌痘

和管衛三法內之外者其脈沉實發熱煩燥外無嫩赤痛深干內其邪深矣當疏通藏府以絕其源外之內者其脈浮數燥腫在外形症外顯恐邪氣極而內行當先托裏內外之中者外無嫩惡之氣內亦藏府宜通知其在經當和管衛用此三者 雖未即瘥必無變症

托裏黃芪湯 錄諸瘡潰後腫多內虛後

腫血多出陰陽兩竭宜大補氣血 黃芪 人參 當歸 桂心 遠志 麥冬 五味子 炒

等分每服五錢食遠服

此手足太陰足陽明藥也人參黃芪補

氣固衛富歸桂心活血生肌茯苓滲濕

健脾麥清熱補肺遠志辛散而理瘡

疔 散瘰癧補精長肌肉助筋骨 五味酸溫善收腫大丹

溪曰瘡疽潰後補氣血理脾胃實為切

要否則數月半年之後虛症仍見轉成

他病也

托裏溫中湯 孫彥和 治瘡瘍為寒變而內陷

膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛

大便微溏食則嘔逆氣短呃逆不得安

卧時發昏惰 此孫彥和治王伯祿瘡瘍方也六脈沉微色變膚涼

加以呃逆胃中虛寒極矣遂干盛夏用此大幸挽之劑益合時從症之變法也

此方集年癩疹二托裏黃芪湯

下七

陳麻笑解顏 蘇葉一錢人參甘草各二分防風荆芥陳皮川芎各七分羌活白芷桔梗各六分冬月加麻黃三分姜煎熱服但不可出汗C亦名加減參蘇飲

清毒活血 湯紫參芪牛子煴煎

白芍宜生地芩連翹桔草山

查姜引木通提 當歸酒洗生地酒洗前胡

各一錢紫草牛蒡木通通翹桔梗各七分人參白芍酒洗黃芩炒各五分生黃芪錢牛山查一錢黃連酒炒甘草各二分煩滑去參芪加麥冬五分花粉七分

防芷桂木香甘草及川芎厚

朴山查姜酒是 黃芪炙二錢山查各一錢川芎防風白芷厚朴各七分人參白芍各五分官桂木香甘草炙各三分龍眼肉三箇姜煎和好酒服

血泡通紅不作漿惟有參芪四

味湯炙草一錢官桂五管教

服之得安康 人參不半黃芪分甘草炙一七姜煎服

行漿作吐兩般云毒火梳連合

二陳困倦參砂和胃散其開

且勿自飲舌症

附子 炮四錢 干姜 炮 羌活 錢三 木香 錢 茴香

丁香 沉香 益智仁 陳皮 甘

草 錢一 加生姜五片煎 此足陽明

三陰藥也衛生寶鑑曰經曰寒淫于內

治以辛熱佐以苦溫附子干姜大辛熱

溫中外發陽氣自裏之表為君羌活味

苦辛溫透關節炙甘草溫補脾胃行經

絡通血脈胃寒則嘔吐呃逆不下食益

智沉香丁香大辛熱以散寒和為佐瘡

氣為次聚而為滿木香茴香陳皮辛苦

溫治痞散滿為使

止痛當歸湯 總錄 治腦疽皆疽穿潰疼痛

當歸 生地黃 芍藥 黃芪 人參

甘草 炙 官桂 各一兩 此足陽明厥陰

藥也當歸生地活血涼血人參黃芪益

氣補中官桂解毒化膿 毒化成膿則痛漸止芍藥

和脾酸以斂之甘草扶胃甘以緩之則

痛自滅矣 齊德之曰世人皆謂乳沒珍貴之藥可往疼痛不知臨病

制宜殊非一端抗痛涼之寒痛溫之風痛除其風濕痛導其濕燥痛潤之塞痛通之虛痛補之實痛泄之膿鬱而閉者開之惡肉敗潰者引之陰陽有不和者

此方乃三、五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九、三十一、三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三、四十五、四十七、四十九、五十一、五十三、五十五、五十七、五十九、六十一、六十三、六十五、六十七、六十九、七十一、七十三、七十五、七十七、七十九、八十一、八十三、八十五、八十七、八十九、九十一、九十三、九十五、九十七、九十九、一百

痘色要分明黃連姜炒槐仁

姜炒各三分

行漿作瀉甚難當小便紅黃毒

氣猶加味四苓散車木共苓

連牛子一齊嘗猪苓木通赤

澤泄各七分黃芩炒牛蒡子

炒各五分苗連酒炒二分

咳牙寒戰建中湯參朮黃芪熟

附宮肉桂炮姜須炙草川芎

錢半川芎八分干

姜肉桂各一分香附子製各五

清表散毒湯地骨冬牛蒡花粉

草翹宗炒冬澤泄猪苓共當

歸同煎清散通地骨皮花

粉冬錢半豈且牛蒡炒連翹各

八分猪苓澤泄黃炒各七

醫痔腹痛著中腕消毒散血湯

切莫緩炒過桃仁熟大黃紅

花乳沒芍牛纂牛蒡炒大黃

製各一錢桃

調之經絡閉症者利之

生肌散 歛瘡長肉瘡初起

寒水石 滑石二兩龍骨 海螵蛸一兩

陀僧 枯礬 定粉即鉛粉 乾胭脂五錢

共為細末搽瘡口上 此陽明藥也

瘡口不斂蓋因膿水散溢而潰爛

也石膏亦各寒水石李時珍曰唐滑石

解肌熱龍骨枯礬善收瀉胭脂活血解

毒螵蛸陀僧定粉收濕燥膿故能斂瘡

而主肉也 又方換膏各一陀僧

黃丹血竭各一輕粉五錢亦名生肌散張

子和方黃連三錢蜜陀僧五錢胭脂菽豆粉

灸法 治一切瘡疽惡瘡

凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以

濕紙裹其上先乾處即瘡頭也取獨頭

大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換

一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛

時方住最要早覺早灸為上若有十數

頭者即用蒜研作餅鋪頭上聚艾干餅

生肌散 灸法

仁炒一錢 芍酒炒六分 紅花酒洗乳香研各五分 沒藥三分水 煎溫服

調元化毒湯 參 歸 芪 白 芍 牛 蒡

連翹 宣 芩 連 荆 芥 防 風 入 木

通 甘 草 用 休 遲 黃芪 丹 身 各一錢 生 勞 炒

白芍炒連翹木通防風荆芥各七分 黃芩炒八分 參各五分 黃連炒三分 姜煎○此方專治痘不起 脹面曰頭頂腫如瓜瓢此危症也 急以此方治之 必要腫消痘起方有生機

毒氣壅蒸鼻流血毒氣亦因從此瀉天芥丹皮知母芩當歸

白芍花甘桔 花柳炒天冬蒸 當且酒洗各一錢

鐵麥冬 鐵牛 桔梗 白芍 黃芩 炒知母 炒丹皮 酒洗各七分 甘草三分 水煎入髮灰一錢 調服尤妙

利咽解毒湯 麥 玄 參 甘 桔 防 牛

山 豆 根 麥冬 錢半 牛 旁 炒 玄 參 桔 根 各 一 錢 防 風 七 分 山 豆 根 七 分 甘 草 各 五 分

玉 鎖 匙 礞 石 煨 礞石 煨 一 錢 砂 一 錢

蚕 片 為 末 吹 之 毒 氣 平 一 錢 砂 一 錢

朴硝五分 爛蚕三條 片腦七分 共為細末 以竹管吹之

易真吹活豆

醫方集詳 芙蓉外敷法

上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟

米頭子便用獨蒜片安于頭上着艾灸

十四壯或四十九壯使毒氣外出則易

愈 李迅曰癰疽着灸勝于用藥三壯一

易百壯為率但頭頂已上切不可用 恐引氣上更生大禍也 史源曰有灸至 八百壯者約艾一節初起肉不痛直灸 至好肉方痛至夜火燉滿背高阜頭孔 百數則毒外出否則內通五藏而危矣 綱目曰精要謂頭上發毒不得灸此言 過矣頭為諸陽所聚艾炷宜小壯數宜 少小者如椒粒少者三五壯而已 按東 垣灸元好問腦疽以艾炷如兩核許 者灸至百壯始覺痛而痊由是推之則 頭上灸毒灸之痛者艾炷宜小壯數宜 少若不痛者艾炷大 此數多亦無妨也

芙蓉外敷法 一切瘡疽腫毒用芙蓉花或葉或根皮 爛搗或乾研末蜜調塗四圍中間留頭 乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消 已成者即膿出已潰者則易斂傷醫秘 之名為清涼膏清露散缺漏散皆此物 也或加赤小豆末或蒼耳燒存性為末 加人亦妙 芙蓉辛平性滑涎粘清肺 涼血散熱止痛消腫排膿

醫方集詳 芙蓉外敷法

下七

經絡歌訣

休寧注 昂訥菴編輯

男狂 端其較

十二經脈歌 增潤古本 加註詳釋

手太陰肺 中焦起下絡大腸

肺與大腸相表裏 胃之行 胃之土脫 即黃門

上膈屬肺從肺系 即喉 管 橫從

腋 下膈內紫 膈下對腋處 名膈首柔 前

于心與心包脈 行少陰心 王之前 下

肘循臂骨上顛 肘以下為臂 膈尺反為肘

醫方集解卷六

經產之劑 婦人之病與男子同惟行 經難則不可以例治故 取胎產經帶數方以備採用諸 方男女可通用者茲不重出

表實六合湯 海 治妊娠傷寒頭痛身熱無 汗脈緊大陽經病

四物湯 四兩每 味一兩 麻黃 細辛 五錢

此足太陽藥也 凡婦人傷寒六經治例 皆同有懷妊者則以安胎為主藥中有 犯胎者則不可用也海藏皆以四物為 君養血安胎餘同傷寒例分症而治麻

經絡歌訣

醫方集解卷六

遂入寸口上魚際開前動脈

指後肉降起也名大指內側

爪甲根小商支絡還後腕後

出骨尺接次指交陽明經

大此經多氣而少血是動則

為喘滿欬肺主膨膨肺脹缺

衄痛肩下橫骨陷中名兩手

交替音為臂厥肺所生症欬

上氣喘渴金不煩心上肺胸

滿結脈布濡膚之內前廉痛

為厥或為掌中熱脈行少陰

掌心勞宮肩背痛是氣盛右

餘絡脈交于小便數而欠

短或汗出肺主氣虛亦痛

寒弱色變及子少氣不足以

報息虛

手陽明經大腸脈次指內側起

商陽本經循指上廉出合谷

俗名虎兩骨兩指岐兩筋中

間手背外側循臂入

黃細辛發汗解表故加用之治表實無

汗者

四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表

虛六合湯治妊娠傷寒表虛目汗身熱

惡寒頭痛項強脈浮而弱地骨皮涼血

汗四物四兩加防風蒼朮各七錢名風

濕六合湯治妊娠傷寒中風濕氣肢節

煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻

連翹各七錢名升麻六合湯治妊娠傷

寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋者

四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡

六合湯治妊娠傷寒胸脇痛而脈弦

少陽經症四物四兩加大黃五錢桃仁

十枚麩炒名大黃六合湯治妊娠傷寒

大便秘小便赤氣滯而脈沉數太陽陽

明本病也急下之大黃桃仁妊娠所忌

四物四兩加人參五味各五錢名人

參六合湯治妊娠傷寒汗下後咳嗽不

止四物四兩加厚朴枳實麩炒各五錢

謂藥病相當也經曰婦人重身毒之何

如岐伯曰有故無殞亦無殞也此之謂

敵

二九

三八

肘外行臑外廉肩臑音臑兩骨

前廉佳骨傍上出臑皆會干督

大椎會此六陽經皆會干大

絡肺下膈屬大腸相為支從

缺盆上入頸斜貫兩頰下齒

當挾口人中鼻下交左右上

挾鼻孔盡迎香本經穴經此

經血盛氣亦盛是動齒痛頸

目黃大腸口乾熱動動

大指次指痛不用皆經脈所

足陽明胃脈鼻頰起下循鼻

外入上齒環唇俠口交承漿

頤後大迎頰車裏頰下

際至頰支循喉嚨缺盆入

下膈屬胃絡脾宮相為直者

表裏直者

經絡歌訣

名和實六合湯治妊娠傷寒後虛痞脹

滿陽明本虛者本謂四物四兩加梔子

黃芩各五錢名梔子六合湯治妊娠傷

寒汗下後不得眠四物四兩加石羔知

母名五錢名石羔六合湯治妊娠傷寒

大渴而煩脈長而大四物四兩加茯苓

澤泄名五錢名茯苓六合湯治妊娠傷

寒小便不利太陽本病本病四物四

兩加阿膠艾葉各五錢名膠艾四物湯

血漏不止損動胎氣者四物四兩加附

子肉桂各五錢名附子六合湯治妊娠

傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉

遲者少陰病也林附亦辛熱動胎之藥

四物四兩加生地大黃酒各五錢名四

物大黃湯治妊娠傷寒畜血症歌曰婦

若畜血抵當桃仁黃芩施要教母子俱

無損大黃四物對分之吳波曰產後傷

寒不可輕易發汗蓋有虛時傷力發熱

有去血過多發熱有惡露不盡發熱有

三日乳蒸發熱或早起勞動飲食停滯

俱皆發熱狀類傷寒須要詳辨大抵產

後氣血空虛若汗之則變游揚肉瞶或

目迷不醒或抽掣不定或大便閉滯其

下乳俠臍中支者起胃口循

腹裏下行直合氣街逢

遂由髀關抵伏下膝臍

口膝蓋循脛廉足附而中指

通支從中指入大指厲兌之

穴經盡矣交足此經多氣復

多血振寒呻欠阿欠而顛惡

病至惡見火與人而熱甚忌

問木声心惕惕惡木也閉戶

衣而走黃響腹脹

淫及汗出多汁鼻衄口喎

井唇胗挾口環唇頸腫喉

痺循頤腹水腫土不膺乳

起處骨外足跗上背痛氣

盛熱在身以前陽明行有餘

消穀飢渴黃甚不足身以前

皆寒胃中寒而腹脹壅

皆寒胃中寒而腹脹壅

皆寒胃中寒而腹脹壅

經名八訣

醫方集解

三

十八

害非輕凡有發熱宜與四物湯芎藭為君最多白芍須炒過潤蒸熟地黃佐之於軟茵柴胡干姜人參主之最効益平姜性熱能引血藥人血分氣藥人氣分且能去惡生新有陽生陰長之道以熱治熱液合內經之旨如惡露不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食少者加白朮茯苓有痰嘔逆者加陳皮半夏其餘六經治例皆同必以四物為主乃養血務本之要也劉河間曰大抵產病天行從增損柴胡雜症從增損四物宜詳察脈症而用之

膠艾湯治婦人漏下或半產後下血不

絕或妊娠下血腹痛為胞阻漏下者懷

以陽不足謂之滋經半產者四五五月而

墮胎墮胎必傷其血海血因結下不絕

也亦治損傷衝任月水過多淋瀝不絕

崩症此劑

阿膠 芎藭 甘草 艾葉 當歸

芍藥 兩 乾地黄 原方未 水五升 酒三

升 煮取三升 內阿膠 烱化服

一方加乾姜 兩 動無乾姜

嚴氏治胎動經漏腰痛腹滿搶心短氣

加黃芪

千金治從高墜下損傷五藏吐血及金

瘡經肉絕者加乾姜

此足太陰藥也四物以養其血阿膠以

太陰肝脉起足大指循指內側

白肉際過核骨後孤切骨張

也即大指內踝前旺旁曰非

後圓骨音善足肚也一作踇音短循

足跟也然經中二字通用循

脛膝股裏股內前廉入腹中

屬脾絡胃相為表裏上膈通俠咽

連舌木舌根也舌下支者從胃

膈注心官此經血少而氣旺

是動即病舌本強上食即嘔

出胃脘痛心中善噫噫即暖而

腹脹得後與氣大便暖氣快然其

病甲病身重肌肉不能動搖

瘕泄瘕瀉水閉及黃疸濕煩

心心痛腕痛食難消下食不強

立股膝內多腫四肢不能臥

胃不和

手少陰心脉起心經下膈直絡

小腸承相為表裏支者挾咽繫胃

系直者從心系上膈騰下腋

循臑後廉出太陰膈心主句

巫各欬決

益其陰艾葉以補其陽和以甘草行以

酒勢使血能循經養胎則無漏下之患

矣

又方阿膠一斤蛤粉炒艾葉數莖赤名

膠艾湯方治胎動不安腰腹疼痛或胎

去捨心去血腹痛指迷方加秦九婦人

一月形如露珠乃大極動而生陽天一

生水謂之胚足厥陰脉主之經水即閉

飲食稍異二月如桃花孤乃太極靜而

生陰地二生火謂之娠足少陽脉所主

若吐逆思食名曰惡阻有孕明矣或偏

嗜一物乃一藏之慮如愛醜物乃肝經

只能養胎而虛也三月如清鼻涕先成

鼻與雌雄二器乃分男女于厥陰相火

所主胎最易動四月始受水精以成血

脉形像貝手足順成手足少陽脉所主五

月始受火精筋骨四肢已成手髮始生

足太陰脉所主六月始受金精以成筋

耳目皆成足陽明脉所主七月始受水

精以成骨遊其魂能動左手手太陰脉

所主八月始受土精以成皮膚九影皆

成遊其魄能動右手手陽明脉所主九

月始受石精百節畢備三轉其身足少

陰脉所主十月神氣備足乃主足太陽

脉所主惟手少陰太陽無所主者君主

之官無為而已墮胎須防三五七月宜

服清熱涼血安胎之藥

鈞藤湯方治癡癡胎動不安癡癡手足抽

風主動肝風相火為病也

鈞藤鈞當歸茯苓人參錢桔梗

道之...

之後行二脉下肘循臂後

廉抵掌後銳骨之端掌後小

指停少冲穴交此經少血而

多氣是動咽乾少陰火心痛

應目黃脇痛繫目渴欲飲臂

臑內廉痛掌熱蒸

手太陽經小腸脉小指之端起

少澤木經循手外上腕尺處

腕出中掌側腕下上臂骨

下出肘內側兩筋之間臑外

後兼肩前兩角為肩解而繞

肩胛肩下成交肩之上入缺

盆肩下橫直絡心中循隘咽

下膈抵胃屬小腸小腸與心

支從缺盆上頸頰至目銳眦

入耳中至本經支者別頰復

上頰首地抵鼻至于目內眦

內各顛交足太陽接隘痛頰

角絡顛交足太陽接隘痛頰

重循咽頭難回不可肩似拔

兮臑似折循臑耳聾目黃腫

坐各次央

半錢桑寄生分五風熱加黃芩梔子柴胡

白朮風痰加半夏南星竹瀝風勝加全

蝎殭蚕

此足厥陰藥也鈞藤之甘寒以除心熱

而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩梔子

之苦寒以平少陽厥陰之風熱風熱去

則癰疰止矣人參茯神以益氣而寧神

當歸寄生以養血而安胎也

鈴羊角散木車治妊娠中風涎潮忽仆目

閉口噤角弓反張各子癩陰王翳陽主

許風眩掉臂屬肝水故

有柳掣眩掉反張之症

鈴羊角屑一錢獨活 防風 芎藭 炙

仁炒茯神 杏仁 薏仁五分木香 甘

草二分當歸 加姜煎

一方有五加皮

此足厥陰藥也鈴角之辛涼以平肝木

防風獨活之辛溫以散風邪茯神取仁

以寧神當歸芎藭以活血杏仁木香以

和氣薏仁甘草以調脾也扶土所以抑

治筋急拘

牽之症

頰間入耳至是所生病為主
液小腸頭項肩膈肘臂痛
此經少氣而多血

足太陽經膀胱脉目内眦上額

交巔支者從巔入耳上角直

者從巔絡腦間還出下項循

肩膊肩後之扶脊去脊各一

十二前抵腰循脊旋看傍各

腎正禹勝膀胱府相為一支貫

腎八膈傳從腰脊下中行行

後曲處為膈一支從傳別貫

脾脊肉挾脊去脊各三寸行

穴循骨外為脾合膈行入膈

合貫膈足出踝脛傍循京骨

穴本經穴是外小指外側至陰

頭痛脊痛腰如折目似脫分

項似拔膈如結分膈如裂痔

肚脉入瘡太陽狂癩疾並生癩

篇亦有刺凡刃大陽經氣不

大陽經者鼻血能循經下行

紫蘇蘇氏治胎氣不和凌上胸腹滿頭
痛心腹腰脇痛白子懸由下焦氣實相

蘇葉蘇葉當歸當歸芎藭芎藭芍藥芍藥人參

陳皮陳皮大腹皮大腹皮甘草甘草加姜煎空

心服心腹痛甚者加木香玄胡索

此手足大陰厥陰也陳來章白芎藭芍

藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順

血和則胎安矣既利其氣復以人參甘

草養其氣者順則順其利逆之氣養則

養其沖和之氣也

天仙係交陳景治子氣婦人衝任素受血

天仙係交陳景香附香附烏藥烏藥陳皮

甘草甘草等分加紫蘇三葉木瓜生

姜各三片空心煎服或為米盪湯調下

日三

此手足大陰藥也天仙籐之苦溫疏氣

活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮

之辛溫以行鬱氣紫蘇生姜之辛溫以

行經氣

經絡歌

經絡歌

上申于腦目黃而淚出頤頰而為黧師

皆腰尻切臆病若動時

皆痛徹以上病皆

足腎經脈屬少陰斜從小指趨

足心湧泉出于然骨一作谷

骨陷循內踝入跟足後上臑

臑內廉尋上股內後廉臑貫

脊會于督脈屬腎下絡膀胱

深相為表裏直者從腎貫肝腸入

脈挾舌木循喉嚨支者從肺

絡心上注于胸中交手厥陰

經心包此經多氣而少血是動

病飢不欲食腹內飢而咳唾

有血脈入肺故咳腎主喝喝

喘腎氣上奔目眩屬腎子心懸脈絡

不濟坐起輒坐而欲起善恐

心惕如人將捕之腎志咽腫

舌乾兼口熱少陰上氣腎水

為心痛或心煩脈絡黃疸腎水

乘脾或為易游腎移熱于脾

女勞疸耳游胃大腸或病

疏表氣甘草之甘緩以和正氣少加木

瓜以除濕執刺筋骨調營衛也

白朮散全治浮腫面目肢體虛附如水狀

胎中挾濕水曲血搏虛氣流溢故令面

目肢體浮腫亦名胎水原因煩滑引飲

過多或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六個月多有之

白朮錢姜皮 陳皮 茯苓皮 大腹

皮五分 為米飲下指迷方有桑白皮

無白朮此即五皮飲丹溪除姜皮腹皮加川

芎朮通補中導水行氣此症有服鯉魚

消姜皮橘皮辛而能散使水從毛竅出

腹皮芩皮淡而能泄使水從溺竅出水

盛由于土衰故用白朮之甘溫以扶脾

土而隄防之不致泛溢也

竹葉湯 治妊娠心驚胆怯終日煩悶名

子煩受胎四五箇月相火用事或盛夏

動不安亦有停痰積飲滯于胸膈致令煩燥者

麥冬錢茯苓 黃芩錢人參五分 淡竹

葉片 一方茯苓為君無人參有防風

知母如有痰加竹瀝 此手太陰少陰

或便及痿瘳厥下不足脊股

後廉之內痛嗜卧但欲寐足

下熱痛切

手厥陰經心主標心包下膈絡

三焦心包與三焦為表裏起自胸中

支者出脇下腋三寸循臑內

逆太陰肺少陰心中間走入

肘下臂兩筋起掌後兩筋行

掌心勞官從中指出穴中冲支

從小指穴少冲小指內之穴

是經少氣原多血是動則病

手心九肘臂掌心腋下腫甚

赤目黃笑不歌是主脈所生

病者心主掌熱心煩心痛掣

皆經脈所過

手少陽經三焦脈起手小指次

指間無名指循腕表手出臂

外之兩骨天井貫肘循臑外

上肩交山足少陽胆之後入

缺盆布臆中傳兩乳散絡心

藥也竹葉清煩黃芩清熱麥冬涼肺心

煩固多虛也如相火乘者卑知母丸君

安者疎砂安神丸切不可

作虛煩用梔豉等藥治之

紫菀湯方治子嗽

紫菀 天冬錢 桔梗分五 甘草炙 桑白皮

杏仁三分 竹茹分一 入蜜溫服

此手太陰藥也子嗽由于火邪當以清

火潤肺為務精梗桑皮之涼以瀉之天

冬竹茹之寒以清之紫菀桑草之溫杏

仁白蜜之澤以潤之也

安營散本事 治子淋心煩悶亂子淋小腸

也虛則不能制水熱則不能通利故淋

心曲小腸相表裏故煩悶亦有因房勞

內傷胞門衝任虛者 人參 細辛兩

宜入珍湯或腎氣丸 當歸 甘草 燈草錢五 木通 滑石

來冬錢三 為末每二錢麥冬湯調下

此手太陰足太陽少陰藥也陳來章曰

虛熱宜補故用人參甘草之甘淋悶宜

通故用木通燈草之滲滑石之滑肺燥

則天氣不降而麥冬能清之腎燥則地

包而下膈循屬三焦表裏

三焦與心包為表裏支從膈中缺盆出

上項出耳上角顛以屬下頰

而至頰支從耳後入耳

過胆經客主人穴交兩頰

至目銳眥外角且經連少陽是

經少血還多氣耳聾隘腫及

喉痺少陽相火汗出多火蒸頰腫

痛及目銳眥耳後肩膈肘臂

外皆瘡癩及小次指小指次指不用

足少陽脈膽之經起于兩目銳

眥邊上抵頭角下耳後循頰

行手少陽前至肩却出少

陽後入缺盆中支者分耳後

入耳中耳前走支別銳眥下

大迎胃經穴在頰前一寸三分動脈陷中合手

少陽抵手頰下加頰車下

頸連復合缺盆下胸膈絡

肝屬胆表裏相為表裏循脇裡

氣街出俠膈四寸動脈繞手際入

氣不升而細辛能潤之經曰地氣上為雲天氣下為雨

上下交陰陽和而後便得通也血燥則清瀆不濡而當

婦能滋之也

參朮飲治妊娠轉胞轉胞者胎逼及胞

反疏下急痛澀數或閉也因氣血虛弱痰飲壅滯以致之

當歸 熟地黃 芎藭 芍藥 人參

白朮 陳皮留半夏 甘草炙 加

姜製空心服此即八珍湯而去茯苓

此足太陰厥陰藥也氣虛補以四君血

虛補以四物痰飲消以二陳使氣得升

舉而胞自通也朱丹溪曰轉胞之病婦人稟受弱者憂悶多者

性燥急者食味厚者多有之古方用滑利藥鮮効因思胎不自轉為胎所壓胎

若舉起胞系自疏水道自通矣近吳宅

寔人患此脈似瀰重則弦予曰此得之

憂思瀰為血少氣多弦為有飲血少則

胎弱必能張氣多有飲中焦不清而胎

則胎知所避而就下乃以上藥典服隨

以指探喉中吐出藥汁候氣定又與之

八貼而安此恐湖中後治數人皆効中

景云婦人本肥盛今反羸瘦胞系了戾

但利小便則愈宜服腎氣丸以中

有茯苓故也地黃為君功在補胞

又法將孕婦倒懸胎轉則小便自通矣

附丹溪參朮膏人參二錢白朮二錢黃芪

半錢茯苓陳皮桃仁各一炙甘草五分用猪

髀厭橫入髀厭直者從缺

盆下腋循胸季脇過章門

下為季脇即下合髀厭

肝經章門穴下合髀厭

髀陽外循髀外行太出膝外

廉外輔兩傍高骨赤下抵絕

骨出外踝少陽行身側故每

外循跗入小次指間支者

別跗入大指循指岐骨出其

端足大指本即後此經多氣

而少血是動口苦上溢善太

息木氣不舒心脇痠痛轉側難足

熱反熱面塵体無澤木入不

頭痛頰痛銳皆痛缺盆腫痛

亦腫脇馬刀俠瘦頸腋生少

瘡瘍堅汗出少陽相火振寒多瘧

疾少陽居半表半裏故胸脇

甲索外經絕骨外踝皆痛及

諸節皆經脈所過

足厥陰肝脈所終大指之端毛

際叢起大循足跗上廉上內

經絡考

羊胞煮湯入藥煎服治產後胎損成淋

瀝症丹溪曰收生不謹以致損胞而得

肉破傷在外者且可補完胞因思肌

亦可治診其脈虛甚因悟曰難產之人

多是氣虛產之後血氣九虛因用峻

補以參朮羔煎以循羊胞極時映之

每劑一兩一月而安益令血氣驟

長其胞可完若稍遲緩恐難成功

黑神散方治產後惡露不盡攻衝作痛及

胞衣不下胎死腹中由血滯

熟地黄 歸尾 赤芍 蒲黃炒桂心

乾薑炒 甘草兩 黑豆炒去皮 每服二

錢酒童便各生煎便產須知有生地黃

此足太陰厥陰藥也前症皆因血瘀不

行熟地芎藭之潤以濡血蒲黃黑豆之

滑以行血昂按行血則桂心干姜之熱

以破血干姜辛熱能去惡生新用甘草

者緩其正氣用童便者散其瘀逆加酒

者引入血分以助藥力也產後惡露不

者以前四味從輕治之若挾宿冷氣帶

血凝胞胎不下則宜全用快行之也經

日曰寒多及秋冬宜之若性急形瘦

有火及夏月當審用此用溪之論

古黑神散百草霜日芷等分每二錢煎入

童便醋少許和服治橫生逆產及胎前

諸方長年產代下

婦人良方

踝中封出太陰後脾脈之後入臍

中廉循股陰入毛中繞陰器

上抵小腹俠胃通屬肝絡胆

相為表裏上貫膈布于脇助循喉

嚨後上入頰頰頰頰本篇後

連目系出額會督項顛逢督

脈會于巔百會穴交者復從目系出

下行頰裏交環唇支者從肝

別貫膈上注于肺乃交宮

肺是經血多而氣少腰痛倦

仰難為工不可謂少腹腫男

瘡疝脈抵小腹乾脈絡兌

色面塵蒙入胸滿嘔逆及飧

泄木剋肝狐疝遺尿虛或閉瘞

火

奇經八脈訥菴補輯

任脈起于中極底膈下四寸穴

起于其下二陰之交會陰之

穴任由會陰而行腹背由會

陰而以上毛際循腹裡行中

上于閔元膈下三寸至咽喉上

逆各公央

產後虛損崩漏等症

失笑散局治惡露不行心包絡痛或死血

腹痛惡血阻而不行上衝干包絡

蒲黃 五靈脂 等分為末煎膏醋調

服 此手足厥陰藥也生蒲黃性滑而

行血五靈脂氣燥而散血氣燥人肝皆能入

厥陰而活血止痛故治血痛如神

本方各二兩加水通赤芍各五錢每四

錢入棗少許服名通靈散治九種心痛

清魂散治產後惡露已盡忽昏暈不知

人產後氣血虛弱澤蘭葉 人參三分

川芎五分荆芥一分甘草一分為末溫酒

調下更宜燒漆帶碎醋灰于床前使聞

其氣 此足厥陰藥也氣血虛弱故以

芎藭澤蘭生其血人參甘草補其氣外

感風邪故以荆芥疏其風風邪去氣血

生則神清矣肝藏魂故曰清魂散劑芥最

之風故以為君

返魂丹益母草治月經不調赤白帶下

胎前產後一切諸病 五月五月六月

及有方是之序三六二主內理以反思月

三十一

頤循而入目是

絡干承泣

衝脈起氣街並少陰

脈俠臍上行胸中至

任脈當臍中而上衝脈俠臍旁而上

以上並出主系問空骨論

衝為五藏六府

海衝為五藏六府所稟氣上

滲諸陽

灌諸精上出頤從下

衝上取莖義

故名亦有並腎

下行者注少陰絡氣街出陰

股內廉入臍中

膝後伏行骨

骨內踝際下滲三陰

肝脾腎

諸絡以濕肌肉至跗指

滂泉入足太指此段出尹樞順逆肥瘦篇

脊起少腹骨中央入駱廷孔

女人陰廷溺孔之端則空漏穴絡陰器合竅

二陰之交名竅

至後別繞腎與巨陽

絡太陽

少陰比二脈相合

股內後貫吞屬腎行上同太

陽起

日內背

上額交巔絡腦

間下項循肩膊仍俠脊抵腰

絡腎

此督脈並大

循男壺

子男

經絡圖說

六日或小暑日益母草花正開時連根

采收陰乾用花葉及子石臼搗末密丸

或搗汁干砂鍋內文武火熬成膏服忌

鉄如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫

生逆產胎衣不下炒鹽湯下產後血暈

口渴狂言產後中風失音口噤及血結

奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑

口乾並重便和酒下產後喘嗽惡心吐

酸脇痛無力酒下產後瀉血束湯下產

後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產

後帶下膠艾湯下產後二便不通煩燥

口苦薄荷湯下凡產後以童便化下一

丸能安魂魄調經絡破血痛經不調者

服之則調久無子者服之則孕

此手足厥陰藥也益母草功擅消水行

血去瘀生新利大小便故為經產良藥

而又能消疔腫散乳癰也

益母草一名

日益母草根莖花葉實皆可治血

分風熱明目調經用子為良若胎產瘡

腫消水行血則可並用益根莖

在葉端干行子則行中有補也

膏歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼

醫方集解卷六羊肉湯

四十一

陰下纂亦與女子類又從少
腹貫膈中貫心入喉頤及
唇上繫首下中央際此為
並任此督脈在亦同衝脈
大抵三脈同一本衝任督三
會陰之下一原而靈素言之
三岐異名而同體靈素言之
每錯綜脈任脈皆起于胸中
上循背裡是又言衝任行背
故經亦有謂衝脈為督脈者
古圖經有以任脈衝背者謂
之督自少腹直上者謂之任
亦謂之督今人大率以行身
背者為督行身前者為任從

中迎者為衝然考任督二經
所行穴道一任身前一任身
後而衝脈居中則無穴任身
道似當以此說為正督病
少腹上衝心痛不得前後便
不通衝疝攻同此督脈為病
女子為不孕衝為血海噓乾
脈循遺溺及痔瘡絡陰器合
喉嚨遺溺及痔瘡絡陰器合
脈為病同衝病裏急氣逆冲
于衝任者衝病裏急氣逆冲
血不足故急氣有餘故逆此
段出素問空骨論○督者督
領諸經之脈也衝者其氣上
衝也任者女子得之以任養
也躡陰躡乃少陰腎之別

痛名曰唇勞
黃芪兩入參 當歸七錢 生姜五錢 用羊
肉一斤煮汁去肉入前藥煎服如惠露
不盡加桂行血 薑露已盡加川芎有寒
加吳茱萸有熱加生地汁有風加細辛
此手足太陰厥陰藥也參芪補氣而
固衛當歸養血而調營生姜辛溫引氣
藥入氣分而生新血羊肉甘熱用氣益
之屬以補虛勞熱退而汗收矣
本方除人參黃芪用羊肉一斤生地五

兩當歸三兩名當歸生薑羊肉湯 治
產後腹中病痛及寒疝腹痛虛勞不足
疝音鳩又音絞急痛也
當歸散 婦人妊娠宜常服之 有熱胎動
不安及數半產難產者並宜服之胎無
疾苦臨盆易產七後百病悉皆主之
當歸 芍藥 芎藭 黃芩 白朮 半
為末酒調服日二
此足太陰厥陰衝任之藥也衝任血盛
則能養胎而胎安芍藥芎藭能養血而
益衝任又懷妊宜清熱涼血血不妄行

脉起于然骨足內踝大骨至

內踝直上陰股入陰間上循

胸入缺盆過出大迎前胃經

脉入頰頰背背合于太

陽陽躄和陽躄脉始于膀胱

蹠下隙中此段此皆靈素說

山靈樞脉度篇此皆靈素說

奇經任脉衝脉督脉帶脉陽

八脉帶脉約束一身如帶陽

說破維陰維周圍一身之脉

內經俱未

言其行度

續增日食藥物

大黃豆 味甘温無毒治寬中

下氣利大腸消水脹腫毒研

末熟水和塗痘後癩 附方

痘後生瘡黃豆燒黑研 豆

油味辛甘熱微毒 治塗瘡

疥 稍燒灰入點瘡去惡肉

有黑白黃霜奇礙數色黑者

名烏豆可入藥作豉黃者可

作腐碎油及合

醬炒食而已

則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白朮

補脾燥濕亦除胃熱胎帶系于脾脾虛

落脾胃健則能運化精微取汁為血以

養胎自無惡阻嘔逆之患矣故再淡以

黃芩白朮為安胎聖藥也

易簡方加山茱萸治經三四月不行或

一月再至數月不行者血少也滋之以

一月再至芎藭芍藥補之以白朮山茱

補脾黃芩能涼血山茱能固經

者以子宮脂滿不能孕盛不孕

塞故不受胎也

芎藭 白朮 半夏 香附 茯苓

神曲五商紅 甘草二 粥丸

此足太陰厥陰藥也橘半白朮燥濕以

除其痰香附神曲理氣以消其滯川芎

散鬱以活其血則壅者通寒者散矣茯

苓甘草亦以去溫和申助其生氣也肥

為君而加氣血藥佐之

達生散亦名東胎婦人妊娠八九月服數

散丹散丹

散丹

散丹

散丹

腸胃益氣和中調十二經脈

之氣殺鬼氣作醬作腐極佳

碗豆一名寒豆味甘平無毒調營衛

益中平氣又云食之動氣消

渴家煮食之良治寒熱除吐

逆止瀉痢利小便腹脹滿下

乳汁殺鬼毒解乳石毒其性

屬土故脾胃用之

蠶豆一名胡豆味甘溫氣微辛主快

胃利五臟多食則發脹可合

醬炒食

豇豆 味甘鹹平無毒理中益

氣補腎健胃和五藏調營衛

生精髓止消渴吐逆泄痢小

便數解鼠蛇毒有白紅紫赤

尺許如帶老時子鼠香其豆可菜可果可穀備用最多豆

品

豆腐 味甘鹹寒有小毒蠶中

益氣和脾胃消脹滿下大腸

濁氣清熱散血 豆皮解熱

十劑易生有方

詩云誕彌厥月先生如達達小羊也其生甚易產難多因氣血虛弱營衛滯澁服此則易生如達矣

當歸酒洗切藥 人參

白朮土炒 陳皮

紫蘇錢 甘草錢 大腹皮錢 人青蔥

五葉黃楊腦子七箇煎主難產

或加枳殼砂仁或春加川芎夏加黃芩

冬如本方或有別症以意消息

此足太陰厥陰藥也當歸芍藥以益其

血人參白朮以益其氣腹皮陳皮紫蘇

莖葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨產

自無留難之患矣

朱丹溪曰產難在血

富貴本養之家若貧賤者鮮有之古方有瘦胎飲為湖陽公主而作恐非至致

之言予族妹甚干難產遇胎則觸而去其血氣久坐不運男因母氣虛亦不能

自運耳當補母氣則兒健易產令其有孕五六月以八全良方紫蘇飲加補氣

藥與之數十貼得男甚快因以其方隨母之性稟賦時令加減服無不應因各

曰達生散云昔湖陽公主難產方上進瘦胎飲用枳殼四兩炒甘草二兩炙

五月後日服一錢潔古散以枳朮名束胎丸寇宗奭明其不然蓋孕婦全賴血

氣以養胎血氣充實胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之若一驟

濫施誤之甚矣按瘦胎飲又名枳殼散治胎肥難產臨月服之張氏加香附行

氣寬腸姜湯下許學士云大寧難娠惟

醫方集卷之六 產婦門

能除斑痘癩疥 豆芽充蔬

亦防發瘡動氣 永昇芽性

味雖涼食多亦動冷氣

醬奶醬醬鹹豆醬甜醬豆油味鹹

冷無毒除熱止煩消殺百藥

及熱湯火毒殺一切魚肉菜

蔬蠱毒血治蛇蟲蜂蟻毒

醬汁灌人下部治大便不通

灌耳中治飛蛾蟲蟻人耳塗

制火咬及湯火傷灼未成瘡

者看効文中砒毒調水服即

解 附方手指掣痛醬清和

浸之愈 癩瘍風馬醬清和石

乃止 日日豆醬二升去

搗之豆醬下血豆醬

酒服方寸 姪娠尿血豆醬一

七日三 乾生地黃二兩為末侵淫瘡

每服一錢米飲下 解輕粉毒服輕

症瘡瘡塗之 破者以三年陳醬化水頻敷

之心當以豆醬陳久者佳小

麥醬殺藥力 不如豆醬

胡蘿蔔 味甘平無毒覺中下

在抑陽助陰其方甚多亦惡葦葶枳壳
散所以抑陽四物湯所以養陰然枳壳
散差寒宜以內補丸佐之即
當歸一兩地黃二兩為丸也

猪蹄猪蹄治乳少

猪蹄猪蹄通草即木通煮食

此足陽明藥也猪蹄鹹能潤下通氣淡

能通竅

廣濟方用猪蹄四隻煮汁加土瓜根漏

盧木通各三兩上瓜漏盧並着少米煎

豉蒜稀粥食治同

或以猪蹄湯調益元散以木梳梳乳房

乳汁自下又穿山甲王不留行皆通乳

人服之

參荆芥散婦治血風勞血風勞者血脈

寒熱盜汗展轉

人參 白朮 熟地黃 酸棗仁炒 鱉

甲童便 羚羊角 枳殼 柴胡 荆芥

分防風 甘草 芎藭 當歸 桂心

分 加姜煎

此足大陰厥陰手足陰藥也陳莖草白

血中之風荆芥防風散之木盛生風鈴

氣散腸胃邪滯元時始自胡地來氣味似

菜蔬故名有赤黃二種苗葉似蒿不可食子似菜服向和

料食

菘菜 味甘温無毒利腸胃除

胸中煩解酒渴去魚腥消食

下氣治瘴止熱嗽胸膈悶或

食之覺冷美能制之亦云夏

至前食發皮膚風痒動氣發

病紫花松行風氣去邪熱其

花頭糟食美服甘草勿食

子作泊傳頭長髮塗刀不縮

音北人居南方不勝地土之

宜遂病忌菘菜 牛肚菘菜

最厚味甘 紫菘葉薄細味

少苦 白菘似蔓菁猶一類

也北地無菘即傳種到彼形

色俱變

芥菜 味辛氣温無毒歸鼻除

腎邪利九竅明耳目安中除

邪氣止咳嗽冷氣去頭面風

日食藥物

角柴胡平之陰虛發熱地黃驚用滋之

血氣痛滯月水不調芎藭當歸桂心枳

殼調之煩怠食少盜汗心神參白朮

參草肉仁補而救之

柏子仁丸良治經行復止血少神衰

每多憂思憂多則傷心心傷則不能生

血而血少血少則用無所藏而衝在之

脈枯故經閉不行也○經日月事不來

者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中

今氣上通肺心氣不得下降故月事不來也

柏子仁油去酒浸卷柏五錢澤蘭續斷

兩熟地黃兩 蜜丸米飲下

此手足少陰厥陰藥也柏子仁安神而

養心地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任

卷柏澤蘭活血脈而通經閉卷柏生用

止血李樞曰婦人以血為主天道氣降

或七情入結為痰為瘵凝滯于內曰血

凝或外被風寒燥濕暑熱或內傷生冷

帶或用力大通人房太甚或服食燥熱

以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯若

經後被驚血氣錯亂而妄行逆上則出

干口鼻水血相搏則為水腫怒極傷肝

則有眩暈嘔血癩癧瘡瘍等病濕熱相

搏則為崩帶凝結于內則為癥瘕變疔

百出不出血滯與血枯而已血滯經閉

醫方集解

多食動風氣生食發丹石不可同兔肉食食則生惡瘡同鯽魚食發水腫 子主傳射工及疰氣痲氣發汗胸膈痰冷而黃又和藥為膏治骨節痛治風腫毒及麻痺醋研傅之扑損瘀血腰痛腎冷和生薑研微煖塗貼心痛酒醋服丹溪云痰在皮裡膜外非此不能達又治遊腫諸毒用子

為未猪膽調和如泥傅之但其類多 青芥葉粗大味辣妙 紫芥作蘆萑 白芥尤辛美俱入藥出太原 有便血痔漏者忌之 莧菜 味甘寒無毒通九竅又云食之動風令人煩悶冷中損腹 子治青盲白翳明目除利大小便利九竅治赤白痢去寒熱殺虻蟲久服益

設夏思却宜溫補或兼痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不可純用峻藥以虧陰道至于耗氣抑血之說雖女科要法但氣為血配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果人火氣盛于血者方可用單香附散抑氣散加木香枳壳枳實行氣開入若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣耗則血亦涸耳豈可專耗其氣哉

芎歸六君子湯 治經後期其來滿少形

體肥盛體肥而經水後期滿少者氣虛而痰滯于經絡也

當歸 芎藭 人參 白朮 茯苓

甘草 橘紅 半夏 加姜煎

此足太陰厥陰藥也二陳治其痰滯參

朮補其氣虛氣行則痰行 芎歸活其經血

連附四物湯丹 治經水過期紫黑成塊

紫血熱也黑熱甚也過期而成塊氣滯也或風冷乘之也若淡白者虛也或挾痰停水以混之也如烟歷豆汁屋漏水混濁稠者濕痰也

四物湯見血 加香附黃連

此手少陽手足厥陰藥也四物以益陰

養血加黃連以清血熱香附以行氣鬱

四物加芩朮湯亦名溫 治經水過多黃

切陽白朮補脾脾能統血 四物加芩連湯治經水適

氣力輕身不饑 葉息與驚
同食丹溪云莧有六種人莧
赤莧白莧紫莧五色莧其一
即馬齒莧也下血又入血分
且善走與馬齒同食下胎臨
產煮食易產又有野生一種
灰條莧亦可食亦入藥 治
蛇蟲射工螫者以紫莧菜搗
汁傾一升敷傷處即愈 菜
子治肝經風熱上攻眼目赤

痛生翳遮障不明青盲赤瞻
並宜服之為末每夜茶服方
寸七

菠菜 味冷微毒利五臟通腸
胃解熱毒酒毒北人多食肉
與麵食此則平南人多食魚
鱉水米食此則冷故多食冷
大小腸發腰痛令人脚弱不
能行一云服丹石人食之佳
劉禹錫佳話錄云此菜來自

斷五心煩熱經來色黑或如豆汁或如豆汁
熱濕而寒勝熱 四物加梔連為熱六
合湯加薑附為寒六合湯加陳材為氣
六合湯加羌芫為風六合湯皆婦病與
經產通用之藥也

固經丸治經行不止及崩中漏下紫
黑成塊衝任為經脈之海若無損傷則
過度損傷藏府衝任之氣虛不能納制
經血故經多暴下或由陰虛陽搏為熱
所乘攻傷衝任血得熱則妄行也脈數
疾小為順大者為逆紫黑成塊者熱甚
而反兼水化非寒也王機微義曰血
得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板炙四兩 芍藥酒三兩 黃柏酒三兩 芩藥酒三兩 梔子炒二兩
香附童便炒 檉皮炒兩 酒丸

此足少陰厥陰藥也經多不止者陰氣
不足以制胞絡之火故越其常度也崩
中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火
極似水也黃芩清上焦之火黃柏瀉下
焦之火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水
以制陽光也香附辛以散鬱檉皮瀉以
止脫

升陽舉經湯治崩漏身熱自汗短氣

西域頗稜國誤呼波稜莖莖

雌黃亦云

苦蕒 味冷無毒療疔黃腫

力止困傳蛇蟲鼠又汁傳疔

腫根即出蠶婦食之壞蠶蟻

蒼蓮 味平淡微毒補中下氣

理脾胃去頭風利五臟冷氣

多食則動氣先患腹冷人食

之破腹 莖灰淋汁洗衣滌

白如玉色

藥菜 味甘平無毒解胡

葛草莖即葛根每煮食之搗

汁和酒服治難產葛生花白

摘其苗以土壅之即活與野

葛相似取汁滴野葛即死

茛菪一名 味甘平無毒主安

心氣養脾胃消痰飲利腸胃

多食動風氣熏入心令氣滿

水芹 味甘平寒無毒治女子

赤白帶下止血養精益氣保

日食藥物

醫方集解卷之五

四七

下八

倦怠懶食此由勞傷所致

補中益氣湯見氣門

三片棗二枚煎

此足太陰陽明藥也補中湯以益氣升

陽退熱收汗加芍藥以和血欵陰黑扼

以清熱止血

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當

歸白朮各三錢羌活防風藁本各二錢獨活

附子炮甘草炙人參熟地小茴各一錢

細辛六分桃仁十箇去工皮尖研碎桂肉桂盛夏勿用

藥各五錢每服三錢漸加至五錢治經水

不止原文曰如右尺脈按之空虛是氣

舉指弦緊或澀皆陽脫之症陰火亦亡

先亡也當溫之舉之升之燥之當

大升浮氣血切補命門之下脫也

如聖散 治崩漏不止凡非時血行淋瀝

然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五臟

櫻櫚燒烏梅二兩墨薑兩為末每服二

錢烏梅湯下

此足厥陰藥也瀉能止血故用櫻櫚酸

能收斂故用烏梅濕能守中故用乾薑

醫方集解卷之五

四八

血脉滑煩渴令人肥健嗜食

利齒

諸竹筍

味甘微寒無毒諸竹筍皆發

冷血及氣○筍同消渴利水

道益氣可久食利膈下氣化

熱消痰爽胃 苦竹筍氣味

苦甘寒治不睡去面目并舌

上熱黃消渴明目解酒毒除

熱氣健人理心煩悶益氣力

利水道下氣化痰理風熱脚

氣并蒸煮食之治出汗中風

失音乾者燒研入鹽擦牙疳

篋竹筍消渴風熱益氣力

發氣脹蒸煮炒食皆宜 淡

竹筍創中味甘寒消痰除熱

狂壯熱頭痛頭風并妊婦頭

旋頭什驚悸瘧疾迷悶小兒

驚癇天弔多食令人發迷悶

脚氣 箭筍新可食作筍乾

佳但硬而難化不可與小兒

果能止血水勝火也故並煨用

牡丹皮散良方

治血瘕瘕者瘀血凝聚而成也伏于隱僻之處盤結膠固非攻伐之不易乎也

丹皮

桂心

歸尾

延胡索分三牛膝

赤芍藥

莪朮

三稜

水酒各半煎

此足厥陰藥也桂心丹皮赤芍牛膝以

行其血三稜莪朮歸尾延胡以行其血

中氣滯氣中血滯氣血週流則結者散矣

正氣天香散細治一切諸氣氣上秦心

心胸攻築脇肋刺痛月水不調婦人多憂鬱故

氣病為多氣為血配氣滯則血亦不能行故月候不調也

香附十八錢烏藥二錢陳皮 蘇葉錢乾薑五

每五六錢煎

此手太陰足厥陰藥也烏藥陳皮而入

氣分而理氣香附紫菀能入血分而行

氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸

辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經

行有常口無痛壅之患

抑氣散廉治婦人氣盛于血變生諸症

頭暈膈痛凡人血氣和平則無諸疾若血少氣多壅于胸膈則痛土

醫方集解卷下 正氣天香散 氣滯 四六

食 毒荀味甘止肺痿吐血

鼻衄治五痔并妊婦何外為何內

為荀故從竹從旬作非

冬荀一名備荀味甘温生於

冬不出土者利九竅通血脉

治吐血衄血及產後心腹痛

一切血症食之肥白人小兒

痘疹不出者粥食即有發生

之意 筆荀味亦然大抵荀

類味與人然性少難化不

益脾胃是宜少食唯素患痰

疾之人最宜多食 桃竹筴

味苦有小毒王治六畜瘡中

蛆禱碎納之蛆盡出 刺竹

筴味甘苦有小毒食之落人

髮 酸荀味酸凉無毒治作

湯食止渴解醒利肺 蘆荀

味甘寒無毒治隔寒客熱止

渴利小便解諸毒 蘆根療

五壹膈氣煩悶吐逆不納飲

日食藥物

攻下頭則量矣

香附兩陳皮兩茯苓 甘草一 為

末每服二錢

此手太陰少陽藥也經曰高者抑之香

附能散鬱氣陳皮能調諸氣茯苓能安

心氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢

害之患矣若鬱甚者當于理氣門中諸

方選用不必泥此此昂按氣盛于血因當用抑氣若過用行氣之

藥則血氣耗散陰火愈盛而成血兩虛矣是方平和為可當用或用滋血之

藥使陰血充足而陽火自平亦正治之一法益補其不足即所以制其有餘也

治赤白帶下帶下起于風寒

胞中或中經脈流入藏府陰虛陽竭榮氣不升衛氣不固帶下下焦奇經之分

因帶脈而得谷故曰帶赤者屬血白者屬氣其狀如涕洟連而下言帶者亦病

形也有濕熱流滯下焦者自肝腎陰注濕勝者有驚恐而水乘上位濁液下流

者或思想無窮而為白淫者或餘經濕熱屈滯于小腹之下者病木雖殊皆為

氣血虛損榮衛累滯而成其標則一也

檮皮兩白芍錢良薑黑黃柏三錢 粥

丸米飲下

此足少陰厥陰藥也陳來章曰檮皮苦

燥濕寒勝熱瀦固下故赤白帶因于濕

食白日前濃湯飲甚効又解

河豚毒

芋菜

芋有六種青芋紫芋白芋
日芋連繩芋野芋野芋名

老芋形葉相似如一根有木
毒並氣人不可食○一名土
芋一石樽鴨有水旱二種水
種者味勝其莖作莖甚新
人取莖作餚

滑有小毒

生則有毒味苦不
可食性滑下石服

多食難消化滯氣困脾寬

腸胃充肌膚滑口冷咳療煩

熱止渴令人肥白開胃通腸

閉產婦食之破血飲汁止血

渴破宿血去死肌和血煮食

甚于氣調中補虛十月後啞

月食不發病○芋以蠶同附

煮過換水再煮方可食之附

方腹中瘕氣生芋子一斤壓

破酒五斤漬二

七日空腹每

飲一升神良

身上浮風牛煮

瘡風邪種痛用白

之乾頭上軟用大芋搗

葉莖味辛冷滑無毒除煩止

瀉癆妊婦心煩迷悶胎動不

熱者用之為君古方有蒼柏槲皮側柏

皮等九隨症加香芎歸

芍藥之酸欬陰

氣收下溜為臣良薑之熱以散寒溫黃

柏之寒以祛熱濕並炒黑以止血收脫

為佐使也

當歸煎丸治赤白帶下腹中痛不飲

食羸瘦此血虛有熱之症法當涼補肺

當歸 熟地黃 阿膠 續斷 白芍

藥炒赤芍藥炒土蠣 牡蠣段粉也前炒黑

醋糊丸米飲下

此足少陰厥陰藥也歸芍熟地續斷阿

膠補肝滋腎以治血虛牡蠣地榆清熱

收脫以止帶下赤芍酸寒能散惡血去

瘀所以生新散之亦以收之也

白芷散方 治赤白帶下脫不禁良方曰

干風寒濕熱所傷傷肝經者色青如泥

傷心經者色赤如津傷肺經者色白如

涕傷脾經者黃如爛瓜

白芷兩海螵蛸二筒 胎髮一錢 為末

酒調下二錢

白芷散

白芷散

五

五

安又鹽搗傳蛇蟲咬并癰腫

毒痛及胃毒箭梗擦蜂螫尤

良汁塗蜂螫傷劉陽隱居工

蛛為蜂所螫墜地腹鼓欲裂

徐行人草嚙破辛梗以瘡就

嚼處搽之良久腹消如附方

黃水瘡辛苗晒乾燒附金野

芋形菜與芋相似芋種三年

不乘成相芋前能殺人誤

食之厥悶垂死者惟以土醬

及糞汁大豆汁飲之則活矣

野芋根辛冷有大毒醋摩傳

蟲瘡惡癬其葉搗塗毒腫初

起無名者即消亦

治蜂螫餘之良

白芷 味苦寒無毒補筋骨利

五臟開胃腸擁氣通絡止

脾氣令人齒白聰明少睡可

煮食之解熱毒酒毒止消渴

利大小腸

葛 味苦淡微毒久食昏人

不宜食○葛有有毒口重不

敢近蛇虺触之則目眩不見

物人由其毒以姜汁解之可

○紫葛有毒人燒煉用木

五臟通經脈開胸膈功同白

芷利氣堅筋骨去口氣白齒

此足陽明少陰厥陰藥也白芷辛溫燥

濕而祛風烏海魚即鹹溫收濕而和血

髮者血之餘補陰消痰煨墨又能止血

也

醫方集解

救急良方人之以疾病死而得於其

有暴橫之遭大如裕弱此蠱蛇犬之

傷小如骨哽刀斧湯火之害坐視其

轉死而莫之能救者多矣茲取簡便

良方以備緩急倘用此而救活一命

于人心神

無校乎

暴死 此人涎潮於心卒然倒仆急扶入

煖室扶策正坐用火炭沃醋使醋氣衝

八病人鼻中良久自甦或搗韭菜汁灌

喉中或用皂角末吹入鼻中得嚏則醒

食卒無藥急於人中穴及兩足大拇指

及百方長子卷之二 暴死 附錄

牙明眼目通乳汁利小便殺

蟲蛇毒 附方乳汁不通

小便尿血 同上方 沙蝨水毒

高芭菜搗汁 延人耳 乾者一

分雄黃一分為末糊丸吞

核大煎生油塞耳中引出

蟲入耳 高芭搗汁滴 子王

治下乳汁通小便治陰腫痔

漏下血傷損作痛 自葛國來

人監晒厥賣以備

瓜 味甘平滑無毒

多食令人吐利患肺氣虛冷

脹冷氣苦食之永不除也治

消渴惡瘡鼻口中內爛痛利

水道治熱服丹石人宜之除

煩治心熱利小腸潤心肺治

石淋 浙人食瓠瓜多吐瀉

壅成故也惟莖香 附方腹

脹黃腫 用亞腰毒 芦連子燒

湯下十餘日見效 葉味

甘平無毒治為茹耐飢 蔓

離甲一韭菜許各炙三五壯即活 凡

人卒然昏倒身冷無痰此名氣厥 亦名

若身温有痰 但扶正坐氣順即安或用

皂角末吹鼻冷嚏亦佳 凡冬月中寒

卒倒身強口噤手足厥冷如無醫藥當

濃煎姜湯灌之 凍死有氣者以灰炒

熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遽以

火烘冷與火爭必死浴以熱湯亦死或

用姜汁熱酒各半温服 比尋月道中

中熱卒死以路上熱土圍臍令人尿其

中即活姜湯童便乘熱皆可灌之或用

熱上大蒜等分搗水灌之或置口中或

令近火以熱湯灌之即活切勿飲以冷

水及卧冷地正如凍死人若遠近火即

縊死 急用手裏衣物緊塞穀道抱起解

繩安放正平揪髮向上掠其項痕捻圓

喉管脚踏兩肩以兩管吹氣入耳內或

刺雞冠熱血滴口中男用雌女用雄鼻

即氣轉或再屈伸其手足將手摩之若

氣不接將腰打三四拳或以皂角末搗

鬚花解毒 附方預解胎毒

七八月或三伏日或中秋日剪盡芦鬚如環子脚着陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘

子治齒斷或腫或露齒搖疼痛用八

兩同牛膝四兩每服五錢煎

水含漱日三四次名飽瓜

瓜小者名瓢皆利水道故夏月食之不但堪烹食日可為器大者壅蓋小者瓢樽孫腰可以浮水為笙可以奏樂靈野可以養猪犀解可燒煉利用極矣俗作葫葫非

味甘溫無毒多食

補中益氣

越瓜 一名菜瓜

味甘寒無毒

中動氣令人心痛膈下癥結發諸瘵又令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及酪同食

胃止煩渴利小便去煩熱解

酒毒宜洩熱氣燒灰傳口吻

瘡及陰莖熱瘡和飯作餅久

食益腸胃

黃瓜 一名胡瓜

味甘寒有小毒

白食藥物

鼻切不可斷絕繩索雖且至暮身冷猶

可活

弱死 急倒提出用水牛一頭令橫卧以

腹合牛背上牽牛徐行令吐出腹中之

水以老姜擦牙即活口噤者攪開橫一

筋於牙間使水得出如無牛以鍋覆地

將病人臍對鍋臍俯卧以手托其頭水

出即活或俯卧椽上脚後稍高蘸鹽擦

臍中待其水自流出或用皂角末編裹

納下部出水即活切已火熯逼寒入內

不效

斃死 如原有燈即得切息火照但痛咳

其脚跟或咬大指指而唾其面或以皂

角末吹入鼻中得嚏即醒

中毒 凡中蠱毒令背白礬不瀆食黑豆

不腥即是中毒毒可濃煎石榴皮汁飲之

或熱茶化胆礬半錢探吐出惡毒或米

飲調礬金末三錢令下 凡中砒霜毒

急飲以人溺及人糞汁或搗烏柏樹根

葉汁或監汁令服或刺羊血熱服或取

多食動寒熱多瘧病積癆熱
發產氣令人虛熱上逆少氣
損陰血發瘡疥脚氣虛脹百
病天行病後不可食之小兒
切忌滑中生疳清熱解渴利
蟲不可多用醋

水道 附方小兒熱痢

蜜食十 水病肚脹

子以醋煮一半至爛空開連
心俱食之須臾干水也

腫痛 老黃瓜一枚去子入硝
填備陰乾為末每以少

許吹 火眼赤痛 瓜一條上開
小孔去穢八苦硝令滿懸陰

處待硝透出刮下留點眼甚
妙湯火傷灼五月五日拍黃

葉味苦平有小
別之良

毒治小兒疳癖一歲用二葉

生按攪汗服得吐下良根

擣傳狐刺毒腫

苦瓜 一名錦 味苦寒無毒除
邪熱解勞乏清心明目子

味苦甘無毒益氣壯陽

稍瓜 味甘寒利腸胃去煩熱

止渴利小便解酒熱宣洩熱

氣多食動氣發瘡令臍下癢

日食疾物

生螺研冷水服 中鹽鹵毒縱飲生豆
腐漿解之 中諸菌蕈毒及虫蟻八腹
黃土和水飲下之 綠豆湯甘草湯能
解百毒

服鉛粉 以麻油調蜂蜜加飴糖與服

蛇蟲犬咬傷 凡惡蛇傷急於傷處上下

焚縛使毒不散走隨浸糞缸內食隸飲

酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分

冷水服二三錢更搗蒜敷患處加艾圓

灸之此法兼治百虫毒蟻又方五靈脂

一兩雄黃五錢酒調服瘁敷患處又方

貝母為末酒調盡醉飲之頃久酒自傷

處為水流出血水盡以藥渣敷瘡上垂

死可活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處

吸去其毒即投蜘蛛於水中令吐毒以

全其命又方生雞血傳之又法鹽水洗

淨雞涎或糞塗之 壁虎咬用桑柴灰

水煎數沸濃汁調白礬末塗之 蝎

子螫用白礬生夏等分醋調塗之 外臺

遇一切毒螫之物不得起惡念向之亦
不得殺之若轉殺之後必遭螫慎之

公醫方集解卷之三 雜錄 蛇傷 蜈蚣 蟻 蝎

痛及虛弱不能行小兒不宜食不可同乳酪及魚鮮食若空心食之令胃脘痛一云和飯並糞食亦益脾胃

甜瓜 味寒無毒少食治消渴

除煩熱利小便通三焦壅塞夏月中暑氣并治口鼻瘡多食令陰下濕痒生瘡動宿冷氣並虛熱手脚無力破腹落水沉者雙頂雙蒂者皆有

毒殺人切不可食取瓜蒂用

栝櫚裹掛東牆風乾治身面

四肢浮腫下水殺蟲毒欬逆

上氣風癩喉風痰涎酒後反

食果病在胸腹中皆吐下之

去鼻中息肉瘰癧疽及暴急

黃花玉心痛欬逆 無髮

人搗葉汁塗頭上髮即出

土瓜 一名菴薯 味苦氣寒無

毒治消渴內痺瘰癧血月閉寒

日食禁物

凡瘋狗咬傷急用菴木驚半箇碎切斑蝥七個去頭翅足若過一日加個糯米一撮慢火炒脆去斑蝥取米研未好酒調服取下惡物多日凶者頭上有紅髮三根拔去之若仍凶腹內有狗聲者再加木鱉一個用斑蝥甘一枚如前製法與服後以黃連甘草湯解之三月不可聽鑼鼓聲再發則難治終身不得食羊犬肉稍輕者急于無風處捏去惡血孔乾者針刺出血用小傾或鹽湯洗淨

搗葱貼上若常犬咬者洗淨血水用虎

骨煨研敷患處或爛嚼杏仁傅之

湯泡傷 雞子清調大黃末塗之炒黃稍

末亦可一法以冷燒酒澆淋甚妙

刀斧傷 割海螵蛸末傅之血立止古壙

石灰為末傅之亦佳金瘡血出不止用

原蠶蛾炒為末傅之

骨哽 凡魚骨哽食橄欖即下如無鮮者

用橄欖核磨水飲之 橄欖木作舟楫魚

畏有如 又猫涎亦能下魚骨哽 斤雞

此者 附錄一

執酸疼益氣愈尊療諸邪氣

熱結鼠瘻散癰腫留血止下

便數遺不禁除黃疸行乳

汁通經水此瓜蔓生嫩時可

食根如括蕷有紅白黃數種

可以充饑亦可澄粉用亦佳

醬瓜味甘寒有毒利腸胃止

消渴不可多食即菜瓜別種瓜形如枕且生時剖開醃晒醬藏以供蔬茹熟則肉鬆不肥不可作蔬矣

才耳味甘平有小毒氣發痲疾令人助下急損經絡皆脾悶人○木耳惡蛇蟲從下過者有毒楓木上生者令人笑不止采歸色瘦者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者並有毒並生檮冬瓜蔓汁解之○赤色及仰生者並不可食益氣不饑輕身

強志斷穀治痔一人患痔諸藥不效用木

耳煮羹食附方眼流冷淚

木耳一兩燒存性米賊一兩

為末每服二錢以清米泔煎

服血注脚瘡菘耳者耳牛屎

灰男用女用男三錢研

未出和塗之或乾塗之

崩

崩

崩

骨哽用野苧根槁爛如龍眼大雞湯化

下如魚骨哽魚湯化下 諸骨哽用大

弔一足取其涎徐徐嚥下或用硼砂并

花水洗化下或醋煎威靈仙嚥下或加砂糖

或雞冠子煎湯嚥下凡治哽之法可以類推如頭鵝鵝掌

治魚哽磁石治針哽髮灰治髮

哽虎犬治骨哽亦各從其類也

誤吞銅鐵金銀 但多食肥肉自隨大便

而出吞針者煮蠶豆同韭菜食針與菜

自從大便出誤吞銅者食芋薺茨菰化

吞髮燒喉不出 取自亂髮燒灰白湯調

下一錢

頰車開不能合 醉之睡中用皂角末吹

其鼻嚏透百合呃逆不止 用紙燻刺

鼻中得嚏即止

舌脹滿口 刺雞冠血浸紙撚蘸麻油

燃薰艾法以生蒲黃塗之或加乾薑末

乳蛾喉痺 凡乳蛾水漿不入者先用皂

角末點被再取杜牛膝汁和醋含嚥一

法艾葉搗汁口含良久腫自消冬月無

葉搗根用之又喉閉者取山荳根汁含

諸方集解卷之六乳脹喉痺頰車不合舌脹五之附錄

中漏下

木耳半斤炒見烟爲末每服二錢一分頭

髮灰三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服出汗

血痢下血

木耳炒研五錢酒服即可亦用井花

水服或以水煎鹽一切牙痛

木耳削芥等分煎湯頻嗽

香蕈味甘平無毒益氣不飢

治風破血松蕈治溲濁不禁

食之有效

皆因濕氣熏蒸而成生山僻處者有毒殺人○生深山爛楓木上小於菌而薄黃黑色味甚香美最爲佳品

任品

麝

味甘寒無毒有毒動氣發病不可

多食益腸胃化痰理氣名肉草出山東

准北諸處承之長二三寸小未大白色柔軟其中空虛狀如未開土簪花俗名雞腿麝菰謂其味如雞也一種狀如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜

鯪魚一名鱧魚

味甘溫無毒

鯪魚

一名鱧魚鱧音序

溫中益氣多食令人熱中發

渴又發瘡疥

鮓魚一名鱧魚俗呼

味甘溫

無毒根可供食煖胃益人食

別無功用

霍亂絞腸痧以針刺其手指近甲處一分半許出血即安仍先自兩臂將下令惡血聚於指頭後刺之

鼻衄不止亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又白笈末新汲水調下又紙數十層米浸溫安頂中以火熨之紙乾

立止又用線扎中指中節左孔出血扎

左指右孔出血扎右指兩孔出血則俱

扎之又以大蒜搗餅貼足心

入耳中用猫尿滴耳中虫即出以生

跌打損傷韭汁和童便飲散其瘀血骨

折者蜜和葱白搗勻厚封酒調白笈末

二錢服

產婦血暈扶坐燒灰沃醋或燒舊漆罌

令烟入其白鼻即甦

即尿

猫鼻猫

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

即尿

之已疢多最動風熱發瘡疥

鯨魚一名

味甘温無毒能充

煖胃和中

瞻照月救味苦

寒無毒治喉痺飛尸水和攪

服一切骨鯁竹木刺在喉中

以酒化二枚温呷取吐

青魚

味甘平無毒服本人治

脚氣濕痺同韭白煮食治脚

氣脚弱煩悶益氣力鮓味

與服石人相反不可合生胡

同食

頭中枕治水腫服

主心腹空氣痛治血氣心痛

平水氣作飲解蠱毒眼

睛汁治注目能夜視層臘

收取味苦寒無毒點暗眼塗

熱瘡消赤白腫痛吐喉癰瘰

涎及魚骨鯁瘰癧瘡東方青

肝膽開竅於目用青魚膽以

治目疾蓋取此義其治喉痺

骨鯁則取漏泄條附方乳

手酸苦之義也

我喉痺青魚膽含燕用汁

灌鼻中取吐○用膽

產後子腸不收 醋三分冷水七分和喫

產婦面一嘔一縮三嘔即収又法以蓖

麻子十四粒去殼搗膏塗頂心即収収

即去之又法皂角末吹鼻中嚏即止上

醫方集解卷下附餘之三

勿藥玄詮 人之有生備五官百骸之

非細也不加葆攝恣其戕傷使中道

而天橫負天地之賦畀事父母之生

成不祥孰大焉故內經曰聖人不治

已病治未病夫病已成而後藥之譬

猶渴而穿井闕而鑄兵不亦晚乎茲

取養生家言淺近易行者聊錄數則

以曉信士之修持又將飲食起居之

禁忌撮其大要以爲縱恣者之防範

使人知謹疾而却病不猶

勝了修藥而求匡也乎

內經上古天真論曰上古之人法於陰陽

和於術數保生 食飲有節起居有時不

饕餮盛青魚膽中陰乾每用少許吹喉取吐○一方用朴硝代膽赤目障青魚膽頻頻如黃連海藥嚼末等分○用黃連切片并水熬濃去滓待成膏入大青魚膽汁和就入片膠小許瓶取密封每日點之甚一刀障魚膽青羊膽妙一切障牛膽各半兩熊膽二錢牛麝香少許石決明一兩為末糊丸梧子大角空心茶下十九

白魚一名鱖魚味甘平無毒宜和

鼓作羹雖不發病多食亦泥人經宿者勿食令人腹冷食亦少動氣或醃或糟藏皆可食炙食生痰與藥同食思

腰痛開胃下氣去水氣令人肥

健助脾氣調五臟治肝氣不

足補肝明目助血脈灸瘡不

發者作鱖食之良患瘡癩人

食之發鱖肉中有細刺一名鱖魚形空腹扁鱖細頭尾俱向上夏至後皆行水面試玉白魚人舟即此

鮒魚味甘平無毒瘡疔補虛

勞蒸下油以瓶盛埋土中取

塗湯火傷甚効

厥魚味甘平無毒治腹內惡

度百歲乃去今時之人不然也以酒為漿以下為常醉以入房以欲竭其精以耗損其真不知持滿之意恐傾不時御神務快於心逆於生樂起居無節故半百而衰也夫上古聖人之教下也虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來

調息一調息一法貫徹三教大之可以入

道小用亦可養生故迦文垂教以視鼻端曰數出入息為止觀初門莊子南華

經曰至人之息以踵大易隨卦曰君子

以嚮晦入冥息王龍溪曰古之至人有

息無睡故曰嚮晦入冥息冥息之法當

向晦時耳無聞目無見四體無動心無

思慮如種火相似先天元神元氣停育

相抱真意綿綿老子曰綿綿若存開閣自然與

虛空同體故能與虛空同壽也世人終

日營擾精神困憊夜間罪此一睡始殼

一日之用一點靈光盡為後天濁氣所

掩是謂陽陷于陰也

血去腹內小蟲益氣力令人

調息之法不拘時候隨便而坐平直其身

肥健補虛勞益脾胃治腸風

縱任其體不僵不曲解衣緩帶腰帶不寬則上

瀉血越州邵氏友年十八病勞瘵累年偶食鱖魚羹

下氣不務令調適口中舌攪數遍微微

愈尾治小兒軟癆貼之良

呵出濁氣不得有聲鼻中微微納之或三五

膽味苦寒無毒治骨鯁不

遍或一二遍有津嚥下叩齒數通舌抵

拘久近附方骨鯁竹木刺

上腭唇齒相着兩目垂簾令臃臃然漸

入咽喉收取鱖魚膽懸北簷下乾每用一皂子煎

次調息不喘不粗或數息出或數息入

酒溫呼得吐則鱖隨涎出未吐再服以吐為度酒隨壘飲無不出者鱖鮓皆可

從一至十從十至百攝心在數勿令散亂如心息相依雜念不生則止勿數任其自然坐久愈妙若欲起身須徐徐舒

鱖魚一名鮓味甘平無毒煖

放手足勿得遽起能勤行之靜中光景種種奇特直可明心悟道不但養身全

中益氣非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也大者長四五寸味頗美

生而已也調息有四相呼吸有聲者風

鱖魚一名餐魚一味甘溫無

也守風則散雖無聲而鼻中濇滯者喘

毒煮食已憂癯自止冷瀉

也守喘則結不聲不滯而往來有形者

泥魚一名鮓味甘平無毒不可合白

氣也守氣則勞不聲不滯出人綿綿若

大血食煖中益氣醒酒解消

存若亡神氣相依是息相也息調則心

一云涼煖中益氣醒酒解消

定真氣往來自能奪天地之造化息息

渴同米粉煮羹食調中收痔

歸根命之蒂也

附方消渴飲水用泥鱖魚十頭陰乾去頭

蘇子瞻養生頌曰已饑方食未飽先止散

尾燒灰乾荷葉等分為末每服二錢新汲水調下日三名

散

洗焦喉中物用生鱖魚線禪其頭以尾

散

散

散

先入鍋中把草名一兩雄燕子一箇酸石榴皮半兩搗成團人瓦罐內盛泥固濟先文後武燒灰十斤取研日用一月以來白者皆 **鳴事不起** 泥餵煮 **牛狗**

羸瘦 取鰵魚一二枚與之食即肥也

白鵝 **膏味甘微寒無毒治灌**

耳治卒聾潤皮膚可合面脂

塗面急令人悅白唇藩手足

皴裂消癰腫解礬石毒 肉

味甘平無毒 白鵝辛涼無毒其蒼鵝冷有毒發

瘡腫 鵝肉性冷多食令人霍亂發痼疾 **嫩鵝毒老鵝**

良利五臟解五臟熱服丹石

人宜之煮汁止消渴 蒼鵝食

工毒為良曰鵝不食蟲止渴為勝發風發瘡莫此為甚

尤毒

鵝尾肉 **塗手足皴裂納耳**

中治聾及聾耳血味鹹平

微毒治中射工毒者飲之

井塗

其身解藥毒 膽味苦寒無

步道進務今腹空當腹空時即便入室
不拘晝夜坐卧自便唯在攝身使如木
偶常自念言我今此身若少動推如毫
髮許便隨地獄如商君法如孫武令事
在必行有死無犯又用佛語及老聃語
視鼻端白數出入息綿綿若存用之不
勤數至數百此心寂然此身兀然與虛
空等不煩禁制自然不動數至數千或
不能數則有一法強名曰隨與息俱出
復與俱入隨之不已一旦自往不出不

人忽覺此息從毛竅中八萬四千雲蒸

兩散無始以來諸病自除諸障自滅自

然明悟 定能生慧譬如盲人忽然有眼此時

何用求人指路是故老人言盡于此

小週天 先要止念身心澄定面東跏坐

平生亦可但前膝不可低腎子不可著物呼吸和乎用三昧

印稍無名指右安于臍下叩齒三十六

通以集身神赤龍攪海內外三十六遍

赤龍舌也內雙目隨舌轉運舌抵上腭

靜心數息三百六十週天畢待神水滿

毒解執毒及痔瘡初起頻塗

抹之自消 附方痔瘡有核

白鵝膽二三枚取汁八能膽二分片腦半分研勻磁器密封勿令泄氣用則手指塗之立効

卵味甘温無毒補中益氣

多食發痼疾

涎治咽喉及戊小兒誤吞稱不能出者名曰穀賊毛治

惟以鵝涎灌之即愈

射工水毒小兒驚癇又燒灰

酒服治瘧疾 掌上黃皮燒

研擦脚趾縫爛焙研油調

塗頑瘡良 尿王絞汁服治

小兒鵝口瘡蒼鵝屎傳蟲蛇

咬毒 附方鵝口瘡自內生

自外生入不可治用食草白鵝下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眼倒者燒灰入麝香少許搽之並効

鴈一名驚筋味甘平無毒治風孿

拘急偏枯血氣不通利久服

益氣不飢輕身耐老長毛髮

鬚眉殺諸石藥毒治耳聾和

漱津數遍用四字訣撮抵閉吸也撮提

閉上視鼻從任脈撮過穀道到屋閣以

意運送徐徐上夾脊中閉漸速些閉

自上視鼻吸莫呼撞過玉枕頸後骨目

徃前一忍直轉崑崙頭頭頂倒于鵲橋舌分

津送下重樓八離宮也心而至氣海丹田

畧定一定復用前法連行三次口中之

津分三次嚥下所謂天何水逆流也靜

坐片時將手左右擦丹田一百八下連

臍抱任放手時將衣被圍住臍輪勿令

風入古云養得丹田暖煖熱此是神仙真妙訣次將大指背

擦熱拭目十四遍去心火擦鼻三十六

遍潤肺擦背十四遍補腎擦面十四遍

健脾雙手掩耳鳴天鼓徐徐將手徃上

卽朝天揖如此者三徐徐呵出濁氣四

五口收清氣雙手抱肩移筋換骨數遍

擦玉枕關二十四下擦腰眼二百八十

下擦足心各二百八下

道經六字訣呵呼咽噓吹嘻 每日自子

至巳爲六陽時面更靜坐不必閉意亦

豆黃佐丸補勞瘦肥白人陰

癰腫耳疳又治結熱胸痞嘔

吐嗚助日肉

味甘乎無毒治風麻痺久食

動氣壯筋骨利臟腑解丹石

毒骨燒灰和米泔沐頭長

髮毛治喉下白瘰小兒疔

有効自落翎毛小兒佩之辟

驚癇尿白治灸瘡腫痛和

人精塗之

予馬一名肉味甘涼無毒九月

以後立亦以前節補中益氣

平胃消食除十二種蟲身上

有諸小熱瘡年久不愈者但

多食之即瘡治熱毒風及惡

瘡癩殺腹臟一切蟲治水氣

浮腫血解挑生蟲毒熱飲

探吐

野維一名味酸微寒無毒每秋

益春夏毒有痢人不可食久食令人瘦九月至十一月

勿令風入即齒三十六通舌攬口中候

水滿時漱鍊數遍分三口咽嚥嚥下以

意送至丹田微微噉口念呵字呵出心

中濁氣念時不得有聲及損心氣即閉

口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞吸

聲但呵出令短吸八令長如此六次再

念呼字六遍以治脾再念呵字六遍以

治肺再念嚥字六遍以治肝再念嚙字

六遍以治三焦客熱再念吹字六遍以

治腎並如前法謂之三十六小週天也

詩曰春嘘明目木扶肝夏至呵心火自

閉秋咽定收金氣潤冬吹惟要故中安

三焦嚙却除煩熱四季長呼脾化食

切忌出聲聞口耳其功猶勝保神丹

一稱金訣曰一吸便提氣氣歸臍一捉便

嚥水火相見不拘行住坐臥舌攬華池

抵上腭候津生時漱而嚥下嚥嚥有聲

人一身之水皆成惟舌下華池之水

甘淡又曰嚥下嚥嚥響百脈自調勻隨

干鼻中吸清氣一口以意目力同律送

至臍下丹田畧存一存謂之一吸隨將

下部輕輕如忍便狀以意目力從尾間

提起上來脊雙關透玉枕八泥丸頂謂

稍有補他月則發五痔諸瘡
疥不共胡桃同食發頭風眩
運及心痛與菌薑木耳同食
發五痔立下血同蕎麥食生
肥蟲即同葱食生寸白蟲補
自死瓜甲不申者殺人

中莖氣力止瀉痢除蟻瘦

附方產後下痢用野雞一隻
作餌餵食之

治渴飲水用野雞一隻五味
煮取三升已來汁

亦可食 腦塗凍瘡 嘴治

蟻癩 尾燒灰和麻油傳天

火丹毒 屎治久瘡

竹雞 味甘平無毒解野雞毒

殺腹中諸蟲煮炙食之又解

山菌毒狀如小雞無尾○諺
云家有竹雞啼白蟻

化爲漏益 好食蟻也

鷓鴣 味溫無毒不可與竹筍
同食令人小

腹脹白死者不可食或言此
鳥天地之神每月取一隻饗

至治茹南野葛菌子毒生金

毒及溫瘧久病欲死者合毛

熬酒漬服之或生搗汁服最

諸傷 良酒服之靈氣欲生能利五

臟益心力聰明 脂膏塗於

曰食菜物

之一呼周而復始久行精神強旺百病
不生

金丹秘訣曰一擦一塊左右換手九九之
功真陽不走成亥一時陰旺陽衰之候
一手兜外腎一手擦臍下左右換手各
八十一半月精固久而彌佳

李東垣曰夜半收心靜坐片時此生發適
身元氣之大要也

積神生氣積氣生精此自無而之有也鍊
精化氣鍊氣化神鍊神還虛此自有而

之無也

髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常彈

閉耳彈腦
名鳴大鼓舌宜抵腭齒宜數叩津宜數

嚥濁宜常呵背宜常暖胸宜常護腹宜

常摩穀道宜常振肢節宜常搖足心宜

常擦皮膚宜常乾沐浴即擦
摩也大小便宜

閉口勿言

諸傷 久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久

立傷骨久行傷筋暴喜傷陽暴怒傷肝

窮思傷脾極憂傷心過悲傷肺多恐傷

醫方集解卷之六

卷之二

轉家令不龜裂

白鴿 味鹹平無毒解諸藥毒

及人馬久患疥食之立愈調

精益氣治惡瘡疥癬風瘡白

癩瘡風炒熟服雖益人食

多恐減藥力 附方消渴飲

水 不知足用白花鴿一隻切

預解痘毒 每至除夜以白鴿

前湯浴之則 血解諸藥百

出痘稀少 附 蟲毒 則解瘡毒痘毒 附

方預解痘毒 小兒食之永不

用白鴿一對入竹筒封置

廁中半月取出以明白和辰

砂三錢丸菜豆大每服三十

丸三豆飲下毒從大小便出

也 屎名左盤龍 野鴿者味

辛溫微毒治人馬疥瘡炒研

傳之駙馬和草飼之消腫及

腹中痞塊消癭瘰諸瘡療破

傷風及陰毒垂死者殺蟲

附方陰症腹痛 面青甚者湯

研未極熱酒一鍾和勻蠶腹

勻澄清頓服即愈 由蠶腹

白食藥物

醫善醫傷

醫善醫傷 胆多食傷胃醉飽八房傷精

竭力勞作傷中 春傷于風夏為食泄

夏傷于暑秋為瘧瘧秋傷于濕冬必咳

嗽冬傷于寒春必病溫 夜寢語言大

損元氣故聖人戒之

風寒傷 沐浴臨風則病腦風痛風飲酒

向風則病酒風痛風勞汗暑汗當風則

病中風暑風夜露乘風則病寒熱臥起

受風則病痺厥 衣涼胃冷則寒外侵

飲冷食寒則寒內傷 而不知有內傷寒

訛作陰症非也凡冷物不宜多食不獨

房勞為然也同揚俊曰房勞未嘗不病

陽症頭痛發熱是也但不可輕用涼藥

耳苦以曾犯房勞便用溫藥殺人多矣

昂按諸書從未有發明及此者世醫皆

罕知之周子此論可謂有功于世矣

早起露首跣足則病身熱頭痛納涼陰

室則病身熱惡寒多食涼水瓜果則病

泄利腹痛夏走炎途食涼食冷則病痢

濕傷 坐臥濕地則病痺厥癘風衝風盲

兩則病身重身痛長着汗衣則病麻木

發黃勉強洗水則病脚氣牽痺飢餓濕

浴則病骨節煩痛汗出見溫則病瘧癘

醫善醫傷

醫善醫傷

醫善醫傷

痛白鴿屎燒研冷氣心痛尿

燒存性酒服頂上瘰癧右盤

一錢即止頭痒龍炒

研未飯和丸梧桐子大頭痒每服三五丸米飲下

生瘡白鴿屎五合醋煮三頭

瘡白壳鴿屎研未傳之先以

之我鴿掌風鴿屎白雄雞屎

斑鳩肉味甘平無毒明目多

食益氣助陰陽久病虛損人

食之補氣食之令人不噎

血治熱飲解蠱毒良 尿治

聾耳出膿疼痛及耳中生聾

晦向夜明沙末等分吹之

猫肉味甘酸温無毒治勞疰

鼠痿蠱毒凡預防蠱毒身白少

善頭骨味甘温無毒治鬼

疰蠱毒心腹痛殺蟲治疰疔及

痘瘡疥惡瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

附方心下蠶瘕用黑猫頭一

方寸七多年瘰癧不愈用猫

口三多年瘰癧頭編編各

箇俱撒上黑豆同燒存性

爲未疾之乾則調田內服五

經曰飲食自倍腸胃乃傷膏梁

飲食傷經曰飲食自倍腸胃乃傷膏梁

之變足能生大疔膏梁之疾消瘴痿厥

飲食太其筋脉橫解腸澀為痔飲食失

節損傷腸胃始病熱中未傳寒中 怒

後勿食食後勿怒醉後勿飲冷引人腎

腰痛腫飽食勿便卧 飲酒過度則截

府受傷肺因之而痰嗽脾因之而倦怠

胃因之而嘔吐心因之而昏狂肝因之

而善怒胆因之而忘懼腎因之而燥精

膀胱因之而溺赤二腸因之而泄瀉甚

則勞嗽失血消渴黃疸痔漏癰疽為害

無窮 鹹味能瀉腎水損真陰辛辣大

熱之味皆損元氣不宜多食

色慾傷 男子二八而天癸至女人二七

而天癸至交合太早斲喪天元乃夭之

由男子八八而天癸絕女人七七而天

癸絕精血不生八房不禁是自促其壽

算 人身之血百骸貫通及怒事作損

一身之血至于命門化精以泄人之受

胎皆稟

香連翅走馬牙疳黑貓頭燒湯取効

七小兒陰瘡貓頭骨燒灰

咬瘡痛油頭燒灰油調敷之以瘡為度

毒瘡每服三五錢酒服

草等分為永納孔中眼睛

治癩瘰鼠瘻燒灰并華水服

方寸七日三牙治小兒痘

瘡倒靛欲死同人牙猪牙犬

牙燒灰等分研末蜜水服一

字即便發起舌治癩瘰鼠

瘻生晒研敷涎治癩瘰刺

破塗之用治癩瘰殺蟲取

黑貓肝一具生晒研末每朔

望五更酒調服之胞衣治

反胃吐食燒灰人硃砂末少

許壓舌下甚効皮毛治癩

瘰諸癭癰疽潰爛附方乳

癰潰爛貓兒腹下毛掛鬚邊

生瘡貓頭上毛猪鬃上毛各一把鼠屎一捏燒研油

此命大以有生故在子夫精者神倚之

如魚得水神必依物方有附麗故開戶

氣依之如霧覆淵不知

外雖不泄精已離宮定有真精數點隨

陽之痿而溢出如火之有烟豈能復

返于薪哉

養生法以養心為主故心不病則神不

病神不病則人不病

養生之法須要擺脫一切毋以妄想戕

真心毋以容氣傷元氣

每日胸中一團太和元氣病從何生

養心又在凝神神凝則氣聚氣聚則形

舍若日逐勞擾憂煩神不守舍則易於

衰老

收視返聽凝神於太虛無一毫雜想少

焉神入氣中氣與神合則真息自定神

明自來不過片晌間耳

人生以心為根以腎為蒂天地相去八

萬四千里人之心腎相去八寸四分中

謠傳鬼舐頭瘡貓兒毛燒灰膏和傳之

鼻擦破傷貓兒頭上毛剪之鼠

咬成瘡貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦

尿以姜或蒜擦之治疔虫

諸蟲入耳滴人即出 尿臘

取乾者泥固治痘瘡倒陷不

發癩癩潰爛惡瘡蠱症蠍咬

鼠咬燒灰水服治寒熱鬼瘡

發無期度者極驗 附方癩

癩潰爛臘貓屎以陰陽瓦合盪泥固濟瘡過研末

油調鼠咬成瘡溫屎探之蠍螫

作痛貓兒尿塗之三五次即瘥

有一脉以通元息之浮沉息總百脉一呼則百脉皆開一吸則百脉皆闔天地化工流行亦不出呼吸二字人之呼吸常在於人身正中處則無氣自固元氣自壯七情不熾百病不治自消矣

醫方集解正卷六

六

