


本草醫方合編

六五

中武 9
124
6止



門中武9
編 124
卷 6 止

鱧魚胆 凡胆皆苦惟鱧魚胆

甘而拔味 喉痺將死者點入

即差病深者水調灌之俗

名烏魚即七星魚首有七星

道家講之水厭雁為天曆犬

為地獸衛生歌曰雁行有序

犬有義黑魚世北知臣祀人

無祀我反食之天地鬼神皆

不喜揚世醫方摘要云除夕

黃昏時取大黑鱧魚一尾小

者二三尾煮湯浴兒遍身七

竅俱到能免出痘不可嫌腥

而以清水洗去也如不信留

一手或一足不洗遇出痘時

醫方集解卷之五

休寧汪昂著輯

弟汪桓武恭閱

瀉火之劑

火者氣之不得其平者也

衛中和經脈調暢何火之有一失其

常度則衝射搏擊而為火矣故丹溪

曰氣有餘便是火也有本經自病者

如忿怒生肝火方倦生脾火之類是

也有五行相剋者如心火太盛必剋

肺金肝火太甚必剋脾土之類是也

有藏府相移者如肝移於脾則口

苦心移於脾則小腸則林閱之類是也

又有他經相移者有按經合病者相

男汪端其

姪汪惟寵

瀉火之劑

火者氣之不得其平者也

衛中和經脈調暢何火之有一失其

常度則衝射搏擊而為火矣故丹溪

曰氣有餘便是火也有本經自病者

如忿怒生肝火方倦生脾火之類是

也有五行相剋者如心火太盛必剋

肺金肝火太甚必剋脾土之類是也

有藏府相移者如肝移於脾則口

苦心移於脾則小腸則林閱之類是也

又有他經相移者有按經合病者相



一斤以上和冬瓜葱
白作羹治十種水氣

鱷魚 甘温補五藏除風濕尾

血療口眼喎 相少麝香左
塗左正即洗去千金云驚血

滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄 點

目治痘後生翳 時珍曰鱷善
性故能走經絡療風和及諸

竅之病風中血脉用血主之
從其類也

鱷魚 甘平去風殺虫 按虫由
風字治骨蒸勞瘵濕痺風瘙

從虫

陰尸蝕痒 皆有虫張鼎云其
薰竹木碎蛇虫甫虛損有病
相染已死物人乃取病者釘
之棺中弃于流水永絕傳染
活取置魚舍多食鱧鯉病愈
遂以為妻聖惠方鱧鯉淡炙
食治諸虫心痛多吐冷氣土
政蒲

甲乙風木氣寒有小毒其味

苦而帶甘涼血明目療疔殺

虫主厥陰太陰之病 脾木肉

冉音它胆冉稟已士之氣胆屬

虫

冉音它胆冉稟已士之氣胆屬

虫

冉音它胆冉稟已士之氣胆屬

虫

冉音它胆冉稟已士之氣胆屬

死者諸病之中火病為多不可以不
加察也○有以泄為泄者大苗芒硝
芩連厄柏之類是也有以散為泄者
羌防柴葛升陽散火之類是也有以
滋為泄者地黃天冬玄參知母之類
壯水之主以制陽先見也有以補為
泄者參芪甘草泄火之聖藥是也

黃連解毒湯 相傳此方為太倉公火劑而
崔氏治劉護軍又云其自製

者治一切火熱表裏俱盛狂躁煩心口

燥咽乾大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血

熱甚發斑 毒則火和也邪入于陽則狂
甚也口燥咽乾火盛津枯也乾嘔熱毒

上逆也錯語熱昏其神也不眠陰未得
復也傷寒吐衄血者當汗不汗熱毒逼
血上行也發斑熱毒入胃也○崔尚書

曰胃有燥糞令人錯語至塊盛亦令人
錯語若秋而錯語者宜承氣湯通而錯
語者宜黃

連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪

火妄行故用黃芩泄肺火干上焦黃連

泄脾火干中焦 王梅藏曰黃連泄心實
泄脾也子能令母實實

其子黃柏泄腎火干下焦梔子通泄三

焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰火盛

則水衰故用大苦大寒之藥抑陽而扶

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

陰泄其亢甚之火而救其欲絕之水也

極腴美主治零同取胆粟許

置水上旋行極速者真胆土

頭中甸近心下甸近尾能護心止痛受杖時偷之杖多不死

白花蛇 甘鹹而溫蛇善行數

脫如風之善行數變花蛇又

食石南食石南藤花菓石南辛苦治風故能

內走藏府外徹皮膚透骨搜

風截驚定搐治風濕癱瘓大

風疥癩開字本草云治中風

徑疏云前症定緣陰虛血少內挑而發得之風濕者殊

科白花蛇非所宜也宜辨凡服蛇酒藥切不可見風

出斬州龍頭虎口黑質白花

脇有二十四方紋腹有念珠

斑尾有佛指甲雖死而眼光

不枯他產則否頭尾有毒各

去三寸亦有車用頭尾者酒

浸三日去盡皮骨大蛇一條

只得淨肉四兩

烏梢蛇 功用同白花蛇而性

善無毒 性善不噬物眼光

本草綱目卷之五 烏梢蛇 蛇

然非實熱不可輕投刻河問曰傷寒表

不可忍或收或嘔裏有微熱不可發汗吐下旋以小柴胡天水京膈之類和辨

恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚木氣損虛而脈不能實

疑更下之恐脫而立死不下亦熱既而死或濕熱內餘小便赤澀大便溏泄頻

併少腹急痛者必欲作前也宜黃連解毒湯

本方去梔子名柏皮湯治三焦實熱用

粥丸名三補丸治三焦有火熾燥喉乾

二便閉結及濕疹夜熱經曰壯火食氣

火宜升壯火宜降今以黃芩泄上黃連泄中黃相泄下則壯火降而少火升氣

得生而血得養本方去芩連加甘草名二焦皆受益矣

梔子柏皮湯仲景治傷寒發黃身熱

瘧熱宜下之發熱為熱未作矣蓋寒濕之症在于得熱則勢外出而不內入

矣故不必發汗利小便用梔子清肌表黃柏泄膀胱以和鮮之按傷寒發黃有

在太陽膀胱者熱在胃者不問故仲景亦有不可下當于寒濕中求

赤小豆湯發汗利表之劑者方見傷寒論

本方去黃柏梔子加酒浸大黃名三

黃瀉心湯金匱治心下痞熱心氣不足吐

血衄血六黃用酒蒸晒九次蜜丸名三

黃芩治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡

心膈煩燥大便秘結小便赤澀及消渴

醫方類聚卷之五 黃芩 藥

至死不枯以尾細能穿百錢者佳重七錢至一兩者為上

十兩至一鎰者中大者力減去頭與皮骨酒者或酥炙用

蛇蛻 甘鹹無毒甄權有毒性靈而

能辟惡故治鬼魅蠱毒鼠而善去風故治驚癇風瘧重

舌聖惠方燒未傳喉風性毒而能殺

臣故治疥癬瘡疔腫痔漏

屬皮而性善蛻故治皮膚瘡

瘍雁難自翳 用白色如銀

者皂莢水洗淨或酒或醋或

蜜浸炙黃用或燒存性或鹽

泥固煨各隨本方

海狗腎一名膠一名臍甘鹹大熱補腎

助陽治虛損勞傷陰痿精冷

功近菴蓉瑣陽 出西蕃今

東海亦有之似狗而魚尾置

器中長年溫潤臘月浸水不

凍置睡犬傍犬驚跳者為真

羸瘦消渴羸瘦由于火炎水乾或問心

泄心丹溪曰少陰不足亢陽無補致陰

血妄行故用大黃泄其亢甚之火又心

本不足肺肝各受火和而病作故用黃

芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心

之母血之舍也肺肝火退則血旺經而

自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦

補其心蓋一舉而兩得之吳鶴臯曰治

病必求其本陽毒上竅出血則熱為本

血為標能去其熱則血不治而自旺經

矣李士材曰古人用大黃治虛勞吐血

意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀

血不去則新血不生也昂按此乃傷寒

外感移熱而吐衄故用三黃寒泄之劑

若虛寒內傷吐衄而誤服此則殺人矣

揚仁齋曰血遇熱則宜流故止血多用

涼藥然亦有氣虛挾寒營氣虛散血亦

錯行所謂陽虛陰必越是已法當溫中

使血自且經宜理中湯加木香七氣湯

如川芎或甘草 本方加石羔沒鼓麻黃

名三黃石羔湯別見表裏門本方水凡名三

黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

驚悸吐衄淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃

名梔子金花丸去梔子加大黃名大金

花丸治畧同

附子瀉心湯仲景治傷寒心下痞而復惡寒

汗出者傷寒心下滿鞭而痛者為結胸

經日心下痞按之濡閉脈浮者大黃黃

連世心湯心下痞而復惡寒汗出者附

子泄心湯大抵諸痞皆熱故攻之多寒

劑此加附子恐三黃重損其陽非補虛

本草綱目

卷五

奇

長

火

志

附

子

泄

心

湯

下

或曰運時取下故名時或曰乃濕時取之時也昂按兩名不凡恐一是海魚之腎一是出賦之時也綱目以此條入

穿山甲

一名鱗鱗鹹寒善竄山善守窟

能行散通經絡達病所病用其處之入厥陰陽明腎治風

甲更良濕冷痺通經下乳消腫潰瘡

止痛排膿和傷發痘元氣虛者慎用

風癩瘡科須為要藥以其穴

故能出入陰陽貫穿經絡達于指分以破邪結故用為使

以其食蟻又治蟻瘻

漏也音

漏有婦人項下忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一疏瘡

久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中誤食蟻得之用穿山

甲燒存性為木傳之立愈刻伯溫多能鄙事去油龍滲漏

刮甲裏肉壓殺人自至漏處補住永州記云不可干堤岸

殺之恐血入上則是岸參漏現此二說其性之走竄可知

癰瘍已潰者忿服如蠶

而短似鯉有足尾甲力更勝

或生或燒酥炙醋炙童便炙

油煎土炒隨方用

本草補要 鱗海標蟬

卷五

醫方集解

附子瀉心湯

五

下

也或下後復汗或下後陽虛故惡寒汗出諸世心湯皆治傷寒痞滿滿在心胸不在胃也若雜病痞滿有寒熱虛實之不同保命集云脾不能行氣于四藏結而不散則為痞傷寒之痞從外之內故宜苦泄雜病之痞從內之外故宜辛散

大黃兩黃連

黃芩兩附子

皮破開煮取汁此足太陽手少陰藥也吳鶴

臯曰心下痞故用三黃以泄痞惡寒汗

出故用附子以回陽非三黃不能去痞

熱無附子恐三黃益損其陽寒熱並用

斯為有制之兵矣喻知言曰此邪熱既

于三黃湯內加附子汁其成傾痞之功

辛各二兩附子一枚炮治脇下偏痛發

熱脈弦緊此寒也以溫藥下之陽中有

陰當以溫藥下其寒後人罕識其旨

有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類也

有陰陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃

連加附子之類也有陰盛陽虛而痞用

辛熱多而寒藥少者半夏生薑甘草泄

心之類也經又曰傷寒大下後復發汗

心下痞惡寒者表未解也當先解表乃

可攻痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連泄

心湯又曰水以下之故心下痞與泄心

湯痞不解口渴而煩燥小便不利者五

苓散主之此有停飲故也○李東垣曰

酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多

亡陰陰者脾胃水谷之陰也胸中之氣

因虛下陷于心之分野故致心下痞宜

調胃氣之血藥兼之若全用氣藥導之

則痞益甚甚而復下之氣愈下降必變

為中滿膨脹非其治也按脾無積血心下不痞故須兼血藥

海螵蛸一名烏賊走血溫和血

人肝腎血分通血脉祛寒濕

治血枯內經血枯治血痕血

崩血閉腹痛環臍陰蝕腫痛

燒末酒服瘧痢疳疘目翳淚出

耳出膿性能燥膿收水為厥

陰少陰肝腎經病出東海亦名

黑魚腹中有黑書字逾年乃

用惡附子白及白欬能淡菴

龜板 甘平至陰屬金與水補

心益腎滋陰濟智性靈故資

滋陰治陰血不足勞熱骨蒸

腰脚痠痛久泄久痢能益大腸

嗽痰瘧老瘧也或經數年瘧

瘦崩漏五痔產難為未酒服

髮陰虛血弱之症益陰清熱

時曰龜鹿皆天而壽龜首常

以補心補腎補血以養陰也

鹿首常返向尾能通督脈故

取其角以補命補精補氣以

養陽也昂按本草有鹿膠而

本方去附子名三黃瀉心湯前見再去黃

芩名大黃黃連瀉心湯仲景治傷寒心下

痞按之濡音軟閉上脉浮沉為實熱浮為

自濡但氣痞耳周陽俊日以非痰飲結

聚故無取半夏生薑也活人云結胸與

痞閉脉須皆沉若開脉浮而結者三黃

以泄肝李時珍曰仲景治心氣不足吐

衄血者用泄心湯實泄心包肝脾胃四

經血中之伏火也又治心下痞滿按之

軟者用泄心湯亦泄脾胃之濕熱非泄

心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒

傷官血邪結上焦胃之上皖在心故曰

泄心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣

在上則生膈脹是已腐發于陽而反下

之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上膈

故大陷胸湯九皆用大黃亦泄脾胃血

分之邪而散其熱也若結胸在氣分只

用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏泄

心湯按發陽發陰諸解不同終成疑按

李氏則以傷寒為陰病熱陷為陽病然

仲景所用皆寒藥未嘗有所分也周揚

俊則謂總屬下早所致然似為近理

半夏瀉心湯仲景治傷寒下之早胸滿而不

痛者為痞身寒而嘔飲食不下非柴胡

症經曰傷寒五六日嘔而發熱柴胡症

且而以他藥下之柴胡症仍在者復

與柴胡湯此雖曰下之不為逆必蒸蒸

而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭

痛者此為結胸也大陷胸湯主之若滿

而不痛者此為痞柴胡不可與也宜半

夏泄心湯凡用泄心右皆屬

誤下之症非傳經熱邪也

半夏斤黃連兩黃芩甘草炙人參

不及龜膠然板不如膠誠良藥也合龜鹿一陰一陽名龜

鹿二 大者良上下用皆可

用酥炙或酒炙醋炙猪脂炙

煨灰用洗淨槌碎水浸三日

用桑柴熬膏良 目死敗龜尤良得陰氣最

也惡人參 龜尿走竅透骨

染鬚髮治啞聲 以鏡照之龜見其影則淫

死而尿出或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

鱉甲 鹹平屬陰色青入肝治

旁瘦骨蒸往來寒熱温瘧瘧

母癩必暑邪類多陰虛之人

中焦則結為瘰母鱉甲能益

陰除熱而散結故為治瘰癧要

藥 腰痛脇堅血痕痔核 鹹能

經阻產難腸癰瘡腫驚癇 玃

疹瘕陰血分之病 時珍曰介

皆補陰或曰本物屬金典 色

上故入脾肺而治諸症 綠九筋重七兩者為上醋炙

若治勞童便炙亦可熬羔鱉

肉涼血補陰赤治瘰癧 煮作

加生薑砂糖不用 惡磐石忌

于姜 三 大棗 十二 此手少陰足太陰

藥也成氏曰否而不泰為痞苦先入心

泄心者必以苦故以黃連為君黃芩為

臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必

以辛故以半夏于姜為佐以分陰而行

陽也欲通上下交陰陽者必和其中故

以人參甘草大棗為使以補脾而利中

已下之後則痞執消而大汗以解矣 註

脾氣必虛則痞執消而大汗以解矣 註

云此方藥味益本理中人參黃芩湯方

王海藏曰外症全是下症而脈反細不

可下若泄心湯主之脈有力者黃連泄

心湯脈無力者半夏泄心湯喻嘉言曰

諸泄心湯原以滌飲此症因嘔故推半

夏為君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣人

裏拂入于心胸之分寒亦成熱矣寒已

成熱則不能外出而熱非實穢又不能

下行唯用苦寒從其部而泄之仍慮下

焦之陰邪入入兼辛熱以溫之陰陽兩

解不攻痞而痞自散所以寒熱互用若

陰痞不開陽入即人而未成熱只是上

下陰陽剖分拒格而成泄心之法藥不

可用也又曰人皆曰汗多亡陽不知下

多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰耳

反因下而成實以火氣不下行故也治

多泄上補下心君得苦寒而安則反能

從陽引之入陰故茶連梔子泄亦成補

若汗下相因有虛無實溫補恍惚不足

前法亦無一 本方除人參再加甘草兩

葛菜雞子

蟹青色故走肝益腎而除熱龜色黑故通心入腎而滋陰

陰性虽同所用略別

辣可代椒解腥

蟹

鹹寒除熱解結散血通經

續筋骨

筋絕傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續

生骨節脫離者生搗熱酒調服渣塗半日骨肉谷谷有聲

即塗瘡能取然寒胃動風

蟹爪墮胎

產准及子死腹中者服蟹爪湯即出

其蟹炆烟能集鼠干庭中蟹毒者搗藕節熱酒調服醃蟹

中入蒜則不少

鰕

甘溫托痘瘡下乳汁吐風

痰

中風症以鰕半斤入姜醬醬料水煎先吃鰕次吃汁

以鷲翎探引吐出痰涎隨症用藥

牡蠣

鹹以軟堅化痰消癭瘰

結核老血痕疝瘻以收脫治

遺精崩帶止嗽欬汗

或同麻黃根糯

米為粉撲身或加入前劑

固大小腸微寒

以清熱補水治虛勞風熱濕

瘡赤痢利濕止渴為肝腎血

分之藥

王好古曰以柴胡引之去脇下硬茶引之

反下之不利谷不化腹中雷鳴心下痞

鞭而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益甚

此非結熱但以胃虛客氣上逆故使鞭

也為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘

草以和中益胃復真陰退虛熱大要

痞滿下利者為虛便閉者為實按甘草

甘令人滿故中滿症忌之而別錄甄權

並云甘草能除滿以脾健運則滿除也

現仲景用以消痞豈非取其散滿哉又

按此乃傷寒之不利腸鳴也雜症腸鳴

亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則腸鳴腹

滿又云中氣不足腸為之苦鳴宜參朮

補劑加甘草連芩連枳實干姜等丹溪又

曰腹中水鳴乃火激動其水也宜二陳

湯加芩連芩子芩挺曰自利舊分陰症

陽症又分脇熱脇寒而治法相同陽症

下利亦必裏虛而表熱乘之虽大惟初

症不利亦然與表邪傳裏協熱下利無

異至下陰即協熱其症尤顯所以云陽

死此等支離處尤當詳辨

本方加生薑四兩名生薑瀉心湯

治汗解後胃中不和心下痞鞭乾噫噦食臭完穀不

化脇下有水氣腹中雷鳴下利

客氣上逆伏飲

博隔故痞鞭中氣不和故乾噫噦胃虛火

盛邪熱不殺穀故宗穀不化脇下有未

氣土弱不能制水故腹中雷鳴下利謂

之協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加

生薑以散邪滌飲蓋胃復陽劉河間曰

瀉而水穀變色者為熱不變色而澄徹

清冷者為寒若肛門燥濇小便黃赤水

穀雖不變猶為熱也此由人性急速食

下即出無容耐化所

謂邪穀不殺穀也

本方除黃芩大棗

下

消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精收瀉止小便利以貝母為使消積結

加枳實厚朴麥芽白朮茯苓蒸餅糊丸名枳實消痞丸東垣別見消導門

時煨粉用亦有生用者貝母為使惡麻黃辛夷吳茱萸得

白虎湯仲景治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒浮為在表滑為在裏裏寒指傷寒即病熱之本因也及三陽合

甘草牛膝遠志蛇床子良海化成純雄無雌故名牡

病脈浮入腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則

蛤粉 蛤蜊殼煨為粉牡蠣同

頭上生汗手足逆冷自汗出者腹滿身重日不仁譫語陽明症也面垢少陽症也遺尿太陽症也三症之中陽明為多屬表裏有邪發表則燥熱益甚故譫語攻裏則陰氣下竭而虛陽生脫必額汗出而手足逆冷若自汗出者三陽熱通治陽明

自試覺無善遂併三帖為一以進如服之是夕寢安嗽止而腫亦消帝大悅賜李萬金李不知其方懼得罪伺得市人重價求之乃蚌殼煨粉少加青黛也以淡蘆水加藤油數滴調服聖惠方白蜆壳研粉米飲調治咳嗽不止

病脈洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎目痛鼻乾不得臥心煩躁亂目瞽潮熱或陽毒發斑胃熱諸病盛故脈洪大熱在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚無畏故不惡寒反惡熱中風有汗傷寒無汗傳入陽明則有汗謂之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故肌熱脈交頰中故目痛脈俠鼻金燥故鼻乾胃不和故臥不安人之陽氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒症中日晡潮熱為胃實無虛症胃熱失下則發斑

鹹冷止渴解酒牡蠣蛤蜊海大抵海物鹹寒功用路同江湖蛤蚌無鹹水浸漬但能清熱利濕不能軟堅

石膏數十沸味淡難出再投藥米熟湯成

能除煩渴利小便

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合先煮

九楞子即蚌殼 甘鹹消血塊散

痰積煨紅醋淬三次為末醋膏丸治一切氣血腐瘕

九楞子即蚌殼 甘鹹消血塊散

石膏數十沸味淡難出再投藥米熟湯成

痰積煨紅醋淬三次為末醋膏丸治一切氣血腐瘕

石膏數十沸味淡難出再投藥米熟湯成

本草備要介九楞子田螺

醫方集腋卷五白虎湯

下二

田螺 味甘大寒利濕清熱止

渴消醒酒利大小便能引熱

彥誠病前後不通腹脹如鼓

衆醫莫措遇一異人曰此易

耳奉施一藥即脫靴入水探

得一大螺曰事濟矣以鹽和

殼搗碎帛繫臍下一寸三分

曾未安席善然暴下歸訪異

人無所見矣董守約以脚氣

攻注或教棍數螺繫兩股便

覺冷氣趨下至 治脚氣黃疸

足既而亦安

噤口毒痢用螺加少麝搗餅

烘熱貼臍下引熱

下行自 目熱赤痛入鹽花取

然思食 擦痔瘡狐臭

石決明 鹹平除肺肝風熱除

青盲內障水飛點目外障亦

治骨蒸勞熱通五淋能清肺

占方多用 鮮酒酸爲未投熱

治癆疽看 如蚌而扁惟一片無對七孔

九孔者良鹽水煮一伏時或

麩裹煨熟研粉極細水飛用

惡旋覆花

真珠 甘鹹性溫感月而胎語

上已有風梨有蠹 水精所孕

中秋無月蚌無胎

溫服 此足陽明手太陰藥也熱淫于

內以苦發之故以知母苦寒爲君熱則

傷氣必以甘寒爲取故以石膏爲臣石

滑石味皆甘寒凡藥 津液內燬故以甘

帶甘者皆瀉中有補 草粳米甘平益氣緩之爲使不致傷胃

也又煩出于肺燥出于腎石膏清肺而

瀉胃火知母清肝而瀉腎火甘草和中

而瀉心脾之火或瀉其子肺或瀉其母

心不熾治陽明氣分熱也石膏甘草不

發表然必實熱方可用或有血虛身熱

脾虛發熱及陰盛格陽面赤煩躁類白

虎湯症候役之不可救也按白虎症脈

洪大有力類白虎症脈大而虛以此爲

辨又按陰盛格陽陽盛格陰二症至爲

難辨蓋陰盛極而格陽于外外熱而內

寒陽盛極而格陰而外外冷而內熱經

所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重

熱則寒是也當于小便分之便清者外

虽燥熱而中必寒便赤者外虽厥冷而

內實熱再春口中燥閉及舌胎淺深蓋

舌爲心苗應南方火邪在表則未生胎

邪入裏津液搏結則生胎而滑胎白者

丹田有熱胸中有寒邪在半表半裏也

熱人漸深則燥而澀熱聚于胃則黃宜

承氣及白虎若熱病口乾舌黑乃腎水

刑于心火熱益深而病篤矣然亦有胎

黑屬寒者舌無芒刺口有津液也又當

用溫補之劑尤宜細辨李東垣曰邪在陽明肺受火剋故用辛寒以清肺所以有白虎之名白虎西方金神也吳鶴臯曰郊秋金之令行則夏火之災退成氏

水能制火入心肝二經鎮心

安魂肝藏魄謂曰昂云淮熱亦藉其室氣也大抵室

物多能鎮心安魂如金箱琥

珀真珠之類龍齒安魂亦假

其神也墜痰拔毒收口生肌治

驚熱痘疔下死胎胞衣珠來

服苦酒塗面好顏色點目去翳

膜綿裹塞耳治聾取新潔

未經鑽綴者乳浸二日研粉

極細用不細傷人藏府陸佃

須雀化成故能生珠專一千陰精也

蛤蚧鹹平補肺潤腎益精助

陽治渴通淋定喘止咳肺痿

氣虛血竭者宜之能補肺益水

補肺止渴功同人參益精扶

羸功同羊肉經疏曰咳嗽田

風寒外邪者不宜用出廣南首如蟾

蝮背綠色斑點如錦紋雄為

蛤鳴而亦名皮粗口大身小

尾粗雌為蚧皮細口尖身大

尾小雌雄相呼屢日乃交兩

兩抱捕者擊之雖死不開房

本草綱目要略蛤蚧

卷五

醫方集解

十一

曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰

有是病則投是藥苟拘于時何以措手

若以白虎為大寒承氣又何以行于冬

令乎太陽發熱無汗而渴忌白虎表未

解也陽明汗多而渴忌本方如人參三

五苓猪苓津液大耗也

無表症者白虎解熱人參生津凡身發

熱為熱在表渴欲飲水為熱

在裏身熱飲水表裏俱有熱身涼不渴

表裏俱無熱欲飲水者不可不與不可

過與恣飲則有水結胸心下悸喘

咳喘噎腫脹脹秘下利諸變症亦治

傷寒無大熱口燥渴心煩皆微惡寒者

背為陽背惡寒口中渴者少陰病也宜

附子湯今熱未退而微惡寒為表未金

罷尚熱太陽然燥渴心煩為裏熱已熾

與白虎湯解表邪清裏熱加人參補氣

生津○太陽病在表故惡寒少陽在牛

表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒

反惡熱問有惡寒者與太陽合病也許

叔微曰仲景云傷寒吐下後七八日不

解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加人參

湯主之又云脈浮滑此表有熱裏有寒

白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發

熱無汗其表不解不可與白虎林億校

正謂于此表裏差矣予謂不然大抵白

虎能除傷寒中渴表裏發熱前後二症

或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服

之一種發熱無汗其表不解全是麻黃

與葛根症安亦治太陽中暍音謁身熱

汗出惡寒足冷脈微而渴在表足冷脈

微又不亦治火傷肺胃傳為膈消喻嘉

肺消以地黃丸治其血分腎消白白

本虎湯治其氣分病不能除醫之罪也

術用之甚効不論牝牡者只可八雜藥口含少許奔走不

喘者真藥力在尾見人捕之較自齒斷

其尾尾不雷教全者不効凡使去頭足雷教

毒在眼用洗去鱗肉不淨及須去眼

肉毛酥炙或蜜炙或酒浸用焙

蜂蜜亦名石蜜草木精英含露氣

以釀成生性凉能清熱熟性

温能補中甘而和故解毒柔

而滑故潤燥甘緩可以去急

故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘

緩可以和中故能調營衛通

三焦除衆病和百藥故九葉多用之

而與甘草同功止嗽治痢解毒

開腸最治痢疾明百悅顏同

姜汁和服甚佳

雍白鳩塗湯火傷煎鍊成膠

通大便秘乘熱納谷道然能

滑腸泄瀉與中滿者忌用以

自如膏者良汪穎曰蜜以花

川蜜温西蜜凉安宜州有黃

連蜜味小苦點目熱良西凉

方如蒼木白虎加蒼木治濕温脉沉細

者沉細属湿先受暑後受湿暑温相搏

名温温其症頸冷腹痛頭多汗渴

而謔語李東垣曰勤而傷暑火熱傷氣

辛苦之人多得之宜白虎蒼木湯

傷暑温勝身重安樂之人本方加桂枝

名桂枝白虎湯治濕瘧但熱無寒骨

節疼痛時嘔本方如柴胡黃芩半夏名

柴胡石羔湯治暑嗽喘渴本方除粳米

加人參名化斑湯治胃熱發斑脉虛者

竹葉石羔湯治傷寒解後虛羸少氣氣

逆欲吐傷寒解後餘熱未尽津液不足

收虛羸少氣虛熱上逆故欲吐

亦治傷暑發渴脉虛

竹葉二斤石羔一斤人參三兩甘草炙一兩麥冬

升半夏升粳米升加姜煎此手太

陰足陽明藥也竹葉石羔之辛寒以散

餘熱芍藥能止喘人參甘草麥冬粳米

之甘平以益肺安胃補虛生津半夏之

辛温以豁痰止嘔故去熱而不損其真

導逆而能益其氣也

又方竹葉石羔木通薄荷桔梗甘草亦

名竹葉石羔湯治胃實火盛而作渴李

下

本草綱目卷五 醫方集解 卷五 十一 竹葉石羔湯

有梨花蜜用銀石器每蜜一

斤入水四兩桑火慢熬掠去

浮沫至滴水成珠用忌葱鮓

高苣同食昂按生葱食殺人

者頗多未見作害豈點過則無患乎抑藥忌亦有不尺然

乎黃蠟甘温止痛生肌療

下痢蜜汁柔性潤故滑腸胃蠟質堅性澁故止泄痢

續絕傷而蜜味至甘蠟味至

淡故今人言無味者謂之嚼蠟

蠶蜂房 甘平有毒治驚癇癎

癎附骨痛疽根在臧府和性

髮燒灰酒服按附骨疽不破附骨成膿故名不知者誤作賦風治附骨疽痛處發熱四

休乍熱在寒小便赤大便秘而無汗泄熱發散則消賊風

痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得熱則少寬

時有汗宜風藥治之塗瘰癧

成瘰音漏灸所止風重牙痛

煎水含漱時診日陽明藥也取其以毒攻毒兼殺面者耳

傳小兒重舌燒灰和酒傳

起陰瘕燒灰傳取懸于樹受

風露者灸用治瘰腫醋調

材曰陽明外實則用柴葛以解肌陽明

內實則用承氣以攻下此云胃實非有

停滯但陽散盛耳火旺則金困故以竹

葉泄火以桔梗固金薄荷升火于上木

通泄火于下甘草石膏直入戊土而清

其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣

升陽散火傷垣治肌熱表熱四肢發熱骨

髓中熱熱如火療捫之烙手此病多因

血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣

干脾土並宜服此脾主四肢四肢熱即

行若入而不達則反以銷燠真陰而肌

膚筋骨皆為之熱也若飲食真塞至陰

則清陽不得上行故不能傳化也經曰火入宛之

柴胡八錢防風二錢葛根 升麻 羌活

獨活 人參 白芍五錢甘草三錢生甘

草二錢 每服五錢加姜蜜煎

此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火

為君升葛以發陽明之火羌防以發太

陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆

味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使

三焦暢遂而火邪皆散矣人參甘草益

脾上而瀉熱芍藥瀉脾火而斂陰且酸

斂甘緩散中有收不致有損陰氣而佐

使也吳鶴臯曰經曰少火生氣天非此

殭也 辛鹹微温殭而不腐得

清化之氣故能治風化痰散

結行_聖蚕病風則殭故因以

痰其氣味俱薄輕浮而升入

肺肝胃三經治中風失音頭

風齒痛喉痺咽腫_{湯調下}

錢當吐_{皆風熱}丹毒瘙痒_{為病}癩

癰結核痰瘰血病崩中帶下

風熱_{乘肝}小兒驚疳膚如鱗甲_{由氣}

血不足亦名胎下浮干成癩

痕若諸症由子血虛而無嵐

寒客邪者勿服 以頭蚕色

白條直者良糯米泔浸一日

待桑涎浮出漉起焙乾拭淨

肉毛口甲搗用惡桑螵蛸茯

苓扶神積梗草解 蚕繭甘

温能泄膀胱相火引清氣上

朝于口止消渴_{金真馬並屬}

作_{齒退}之際故燥絲湯_{飲之能抑}心火而治消渴瘰

疽無頭者燒灰酒服_{服一棰}

揚之則光過之則滅今為飲食抑遏則

生道幾乎息矣使清陽出上竅則濁陰

自歸下竅而飲食傳化無抑遏之息矣

東垣聖干脾胃治之必主升陽俗醫知

降而不知升是抑其少火也安望其精

生即又曰古人用辛散必用酸收故桂

枝湯中亦有芍藥 本方除人參獨活

加葱白名火鬱湯治同_{脈沉數火入無}

陶節巷升陽散火湯人參白朮茯苓甘

草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃芩加羌

朮人參煎治傷寒又手冒心尋衣摸床

譏語昏沉不省人事_{節巷曰俗匠不識}

乃肝熱乘肺元氣虛衰不能主持名撮

空症小便利者可治有痰加姜炒半夏

大便燥實_{○陽虛故又手自冒其心}昏

其神故尋衣摸床小便利則肺氣恍惚

按此病非升散之症方中僅柴胡一味

且升散之名而節巷以此名方何歎

涼膈散_局治心火上盛中焦燥實煩躁口

渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小

便秘諸風癩瘰胃熱發斑發狂及小兒

驚急痘瘡黑陷_{上症皆上中二焦}

連翹_四大黃_酒芒硝 甘草_二梔子_炒

黃芩_酒薄荷_酒 為末每服三錢加竹

葉_酒煎服

卷五 醫方集解 古

二枝出雄蚕娥氣熱性淫主

固精強陽交接不倦存性

人少許蜜和敷走馬牙疳

加白礬片妙百一方蚕紙燒

原蚕砂 蚕食而不飲屬火性

燥燥能去風勝濕日燥勝

風屬其砂辛甘而溫炒黃浸

酒治風濕為病支節不隨皮

膚頑痺腰脚冷痛冷血瘀血

夫因公藥炒熟患赤良

寇氏曰醉酒三升作蚕砂五

斗蒸熟鋪屛室席上合患冷

風痺氣人以患處就卧厚覆

取汗不愈間日再作須防昏

問麻油調敷治爛弦風眼目

下胞屬脾脾有風濕則虫生

弦爛用新瓦爇為末少加雄

黃麻油調敷治蛇串瘡有人

食烏梢蛇渾身變黑漸生毒

甲見者驚縮鄭奠一今日服

晚蚕砂五錢尺一二斗久之

乃退晚蚕矢也淘淨晒乾

桑螵蛸 甘鹹入肝腎命門益

精氣而固腎治虛損陰痿夢

遺白濁血崩腰痛傷中疝瘕

本草備要 虫桑螵蛸 卷五 醫方集解 火卷五 當歸龍薈丸

葉生蜜煎葉生竹上

此上中二焦瀉火藥也熱淫于內治以

鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩竹葉薄

荷升散于上而以大黃芒硝之猛利推

蕩其中使上升下行而膈自清矣用甘

草生蜜者病在膈甘以緩之也李東垣

法戒尤黃甚硝加桔梗竹葉治胸膈與

六經之熱以手足少陽俱下胸膈同相

火游行一身之表乃至高之分故用舟

楫之刮浮而上之以去胸腹六經之熱

也重症用前方輕者用此方喻加言曰

按中風症大熱風木合君相二失主病

古方用涼膈散居多如轉舌羔用涼膈

散如葛蒲遠志活命金丹用涼膈散加

青黛藍根益風火上炎胸膈正燎原之

地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功

居多不可以宣通腸胃輕警之也按轉

舌羔散心經之蘊熱活命丹散肝經之

入火也潘思敬曰仲景調胃承氣湯後

人一麥加連翹危子黃芩薄荷謂之涼

膈散至河間又麥加川芎薄荷芍白木防

風散芥麻黃桔梗石羔滑石謂之防風

通聖散右

之複方也

當歸龍薈丸宣治一切肝胆之火神志不

寧驚悸搐搦躁擾狂越頭暈目眩耳鳴

耳聾胸膈痞塞咽噎不利腸胃燥澀兩

脇痛引少腹肝移熱于肺而咳嗽肝屬

主筋主怒主驚故搐搦驚狂皆屬肝火

目為肝竅胆脈絡于耳二經火盛故自

下

下

肝腎不足通五淋縮小便能通故

不足通五淋縮小便能通故

化則能出故能通腎氣既故

宗爽怡便數有桑螵蛸茯神

參湯下二錢能補灸飼小兒

心安神亦治健忘灸飼小兒

者為好房長寸許有子如蛆

旋栗花螳螂能出箭簇螳螂

傷處微痒且忍極痒乃搗拔

之楊氏方用羌蠅餅出傳生

肌散螳螂蠅餅皆治驚風

便閉下痢脫肛瘡疽疔痔

蟬脫蟬乃土木餘氣所化飲

風露而不食其氣清虛而味

甘寒故除風熱其休輕浮故

發痘疹其性善蛻故退目翳

催生下胞其蛻為殼故治皮

膚瘡瘍癰癤與薄荷等分其

吉清响故治中風失音又書

眩耳聾心脈俠咽歷膈腎脈貫膈循淚

龍水衰火盛故膈咽不利而脇少腹皆

肝胆經所循故相引而痛五藏六府皆

有欬然必傳以典肺肝之移邪則為肝

亦治盜汗盜汗屬熱此與當

當歸酒洗龍胆草洗梔子黑黃連炒黃柏

炒黃芩炒一兩黃芩青黛飛蘆薈錢木

香錢麝香分五蜜丸姜湯下

此足厥陰手足少陽藥也肝木為生火

之本肝木盛則諸經之火相因而起為

病不止一端矣故以龍胆青黛直入本

經而折之而以大黃芩連梔柏通平上

下三焦之火也黃芩泄肺火黃連泄心

脾胃火梔子蘆薈大苦大寒氣腺入肝

能引諸藥同入厥陰先平其甚者而諸

經之火無不漸平矣諸藥苦寒已甚當

歸辛溫能入厥陰和血而補陰故以為

君少加木香麝香者取其行氣通竅也

然非實火不可輕投

龍胆瀉肝湯治肝胆經實火濕熱脇痛

耳聾胆溢口苦筋痠陰汗陰腫陰痛白

濁溲血脇者肝胆之部也火盛故作痛

鳴夜息故止小兒夜啼蟬類

甚多惟大而色黑者入藥洗

去泥土翅足漿水煮晒乾用

全用 蚱蟬治小兒驚癇夜

啼殺疔去熱出胎下胞時珍

皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻治

藏府經絡當用蟬身各從其

五倍子 酸鹹其性瀉能欬肺

其性寒能降火生津化痰止

嗽止血欬汗鄭贊寰曰焙研

口水調敷臍上 解酒療消渴

泄痢瘡癬五痔下血脫肛膿

水濕爛子腸墜下散熱毒消

目腫煎水 欬瘡口熱散瘡其

色黑能染鬚與水澆之善

吐噴痰解熱毒黃昏咳嗽乃

失浮肺中不宜用涼藥宜五

桔五味欬而滑之醫聖綱目

云玉元珪虛而滑精屢與加

味四物湯吞河間秘真丸及

真珠粉丸不止後用五倍子

一兩茯苓二兩九服遂愈此

則倍子欬瘡之功敏于龙骨

蛤粉也昂按凡用秘清藥能

通而後能秘此方用茯苓倍

本草借要 五倍子 白蟻 卷五

官也謀慮出焉胆者中正之官也決斷

出焉胆虛數謀慮而不能決胆氣上溢

故口為之苦肝主筋濕熱筋故筋痠肝

脈絡干陰器故或汗或腫或痛白濁溲

血皆肝 龍胆草炒酒 梔子炒酒

泄 木通 車前子 當歸洗酒 生地黄

此足厥陰少陽藥也龍胆泄厥陰之熱

與三焦之熱以佐之澤泄泄腎經之濕

木通車前瀉小腸膀胱之濕以佐之然

皆苦寒下泄之藥故用煇地以養血而

補肝用甘草以緩中而不使傷胃為臣

使也東垣無黃芩梔子甘草亦名龍胆

瀉肝湯治前陰熱燥具此因飲酒風

焦為邪厥陰肝脈絡干陰器柴胡八肝

為引澤泄車前木通利小便亦除躁氣

所謂在下者因而竭之生地龍胆苦寒

也 一方除當歸生地木通澤泄車前加

人參五味天冬冬黃連知母亦名龍胆

泄肝湯治筋痠急口苦瓜枯亦治前症

加人參者扶土所以抑木用二冬五味

者清金亦以平土潤燥所以養筋用黃

連知母者上以泄心火下以泄

腎火一為肝子一為肝母也

醫方集解 卷五

本草綱目卷之五

子五味一泄一收嗽由外感

是以能尽其妙也

瀉非虛脫者藥用 生鹽膚

木上乃小虫食汁遺種結毬

干葉間故主治之症與殼輕

脆而中虛可以築堤炒用

白蠟 甘溫屬金生肌止血

實曰涇御章年十六常患尿

血屢醫不効予以白蠟加入

藥中遂愈定痛補虛續筋按

外科要藥 辛寒有毒外用蝕死肌

傳癰癰瘡內用破石淋拔

癰癰疔重楊登甫云癰癰之

治以班蝥地胆為主制度加

法能令其根從小便出如粉

片血塊爛肉此其驗也以木

通滑石灯心等導之也班蝥

捕得尾射臭不可聞故奔

走下竅直至精溺之處能下

敗物痛不可下狒犬毒一死

當可須斟酌下狒犬毒一死

之候急用班蝥七枚去頭翅

足糯米炒黃為末酒煎空心

下取小拘三四枚如數

少再服又方用糯米一勾班

蝥其一枚分三次炒至青烟

為度去殼取米為粉冷水人

左金丸又名萊 治肝火燥盛左脇作痛吞

酸吐酸筋疝痞結吐酸亦由肝火土干

肺胃從本之化故酸厥陰之脈絡陰器

寒虛干之則成筋疝肝木過盛冠制脾

土則成 亦治噤口痢湯藥入口即吐

加糯米一撮濃煎佳得 三匙下咽即不復吐矣

黃連六兩吳茱萸一兩 水丸

此足厥陰藥也肝實則作痛心者肝之

子實則泄其子故用黃連瀉心清火為

君使火不剋金金能制木則肝平矣吳

茱萸熱能入厥陰肝行氣解鬱又能引

熱下行故以為反佐一寒一熱寒者止

治熱者從治而治之亦曰反治故能相

濟以立功也肝居于左而平肝也李東

者謂使金令得行于左而平肝也李東

病机曰諸嘔吐酸皆屬干熱此上焦受

外來客邪也以雜病論之嘔吐酸水者

其則酸水浸其心次令牙酸不能相對

以大辛熱劑療之必戒若以病机作熱

致之誤矣或問吞酸素問以為熱東垣

以為寒何也丹溪曰吐酸與吞酸不同

吐酸吐出酸水如醋平時津液隨上

之氣鬱而成積溫中生熱故隨木化遂

作酸味非熱而何其有鬱之火伏于腸

胃之間略不得上膈不得下肌表得風

寒則內熱鬱鬱而酸味刺心肌表溫煖

腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦

醫方集解 卷五

七

鼓聲復發則不可治服之肚痛急者煎汁或黃連水解之

清肉肌肉近墮胎 荳葉上

重黃黑斑文去頭足糯米炒熟生用則吐泄人亦有用米

取氣不取質者畏巴豆丹麥

惡甘草豆蔻 班蝥蚘青葛上

形色不同功略相近食芫花為芫青青綠色尤毒春生食

暑花為亭長黑身赤頭夏生食豆蔻花為班蝥班色秋生食

入地為地胆黑頭赤尾陶隱居下乃一物而四時變花者蘇恭云非也皆

蝎 辛甘有毒屬木故治

諸風眩掉 比皆屬肝木驚癇搐

眼喎邪 白疳瘡全蝎等分

二錢 瘧疾風癢耳聾帶心厥

陰風木之病 東垣曰凡病氣

竭乃治風要藥但宜加減用

之注凡曰破傷風宜以全蝎防風類中風慢驚屬虛者忌

用 全用去足焙或用尾尾

方尤緊形緊少者良 人被驚者塗蝎

水草備要 虫蝎 蜈蚣

可暫解非寒而何素問言熱言其本也東垣言寒言其未也予嘗治吞酸用黃

連采英制炒隨時令送為佐使蒼木茯

苓為輔湯浸蒸切為丸吞之仍教粒食

蔬單自養則病易安戴氏曰房勞腎

虛之人肚膈多有隱痛此腎虛不能納

氣氣虛不能生血之故氣曲血滯水也

盛則流暢虛則鮮有不滯者所以作痛

宜破故紙之類補腎芍藥之類

補血若作尋常脇痛治則殆矣

本方加炒蒼朮陳皮亦名萊連瓦治

同本方加芍藥等分為丸名戊巳丸治

熱痢熱泄 熱泄者黃肝瀉也戊為胃

熱痢熱泄 土已為脾上加芍藥伐肝泄

水便不本方除吳茱萸加附子二兩名

連附六一湯治胃脘痛寒因熱用也本

方用黃連一味吳茱萸湯浸一宿為丸

名抑青丸大瀉肝火治左脇作痛單黃

連煎服名瀉心湯治心熱

瀉心丸 錢 治肝火鬱熱不能安臥多驚

怒筋痿不起目赤腫痛 肝屬風木木盛

甚于寅卯木旺之時按之在肉之下骨

之上為肝熱肝胆之經行于兩脇風火

干之故因不安肝在志為怒故多怒肝

虛沮法故多驚肝王筋逢熱則縱故痿

龍胆草 山梔 炒 大黃 酒 川芎 當歸

酒洗活 防風 等分蜜丸竹葉湯下

醫方集解 卷五 瀉心丸

下

蜈蚣 辛温有毒入厥陰肝經

善走能散治腦風撮口

調服驚癩癩瘧蛇瘻能制瘡甲

內惡刃夾出俗名雞眼睛蜈蚣所敷之以兩星未醋調敷四殺虫古方治產墮胎

取赤足黑頭者火炙去頭足

尾甲將荷葉火煨用或酒炙

畏蜘蛛延由不敗過所行之虫虫路觸着即死

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁盪其毒去之被

以者捕蜘蛛置咬處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之

蟾余即痛土精而應月魄辛

涼微毒入陽明胃發汗退熱

除濕殺虫治瘡疽發背

活蟾蜍繫齋上牛日蟾必昏憤置水中救其命再易一個

三易則毒散矣勢重者則蟾除今瘡上不久必臭不可聞如此二三易

小兒勞瘦疳疾

蟾酥辛温大毒助陽氣治疔

腫發皆小兒疳疾腦疳

問曰汁能爛人肌肉惟疔疽或合他藥服一二厘取其以毒攻毒腦疳乳和滴鼻中外

科多用之蟾蜍胆塗玉刻之

此足厥陰少陽藥也肝者將軍之官風

淫火熾不易平也龍胆大黃苦寒味厚

沉陰下行直入厥陰而散泄之所以抑

其怒而折之使下也羌活氣雄防風善

散並能搜肝風而散肝火所以從其性

而升之干上也少陽火鬱多煩燥梔子

能散三焦鬱火而使邪熱從小便下行

少陽火實多頭痛目赤芩能上行頭

目而逐風邪且川芎當歸皆血分之藥

能養肝血而潤肝燥血虛故肝燥肝燥故多怒多驚又

皆血中氣藥辛能散而温能和兼以培

之也一泄一散一補同為平肝之劑故

曰瀉青五藏之中惟肝實有餘散之即

所以補之以木喜條達故也然必壯實

之人方可施用余子容曰時多執肝嘗有餘之說舉手便云

平肝按聖濟經云原四時之所化始干未究十二經之所養始干春女子受娠

一月是厥陰肝經養之肝者乃春陽發動之始萬物生之源故戒怒養陽使

先天之氣相生干无窮是攝生之切要也不可泥干干前說昂此說本之內經

陸節藏象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其藏求其勝也皆始春益春

屬肝木乃吾身升生之氣此氣若有不充則四藏向所稟承如春无所生則夏

如

白頸蚯蚓 蚓土德而星應軫

水其性鹹寒故能清熱下行

故能利水治温病大熱狂言

大腹黃疸腎風脚氣蘇頌曰脚氣必

須用之 白頸者乃老虫蚯蚓治

大熱搗汁并水調下入藥或

晒乾為末或搗化為水或微

炙或燒灰各隨本方中其毒者盪水

解之張將軍病蚯蚓咬毒每每

而愈 此虫泥自出甘寒性

熱解毒治赤白久痢傳小兒瀉黃散

陰囊熱腫臃腫丹毒

五穀色即糞寒治熱病晉書古

妄勞痢作吐小兒疳積疔瘡

漂淨晒乾或炒或煨為末用

人部

髮一名髮者血之餘味苦微寒

入足少陰厥陰腎補陰消痰

通閉格利二便治諸血疾能去

本草傳要人

卷五

醫方集解 火卷五 瀉黃散

三

下

長秋收冬藏者何物乎五行之中惟木
有發榮陽茂之象水火金土皆元是也
花葉蕊蕊艷麗而可愛結實成實食之
以全生此皆木也使天地而无木則世
界黯淡其无色矣由是言之培之養之
犹恐不暇而尚欲剪之伐之乎故養血
和肝使火不上炎則心氣和平百骸皆
理不特養身之要道亦養德之切務也
昂又按世医多云肝有泄无補而不知
六味地黄丸七宝美髯丹等劑皆補肝
之藥也人特習而不察耳外台秘要曰
五行五藏皆互相生肝虽處中而為藏
首位在甲乙懷養怀仁故應春而王也
為心之母餘藏循次而生焉心為王主
神四藏為四鄰四鄰有憂王必憂憂四
鄰和平則王有悅悅則管衛不錯憂則
經絡思生心不受邪所病者惟憂樂能
致也肝為風府呼吸之門諸藏紊乱氣
息皆形誰能出不由戶耳若風熱盛心
憂則頭痛過憂則心痛寒盛必熱七盛
必寒儻然之道也世平風熱
抑狂邪而管衛自然通泰矣

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口

鼻煩渴易飢熱在肌肉脾之外候日燥

唇乾口瘡口鼻皆屬脾火 熱故煩渴

易飢病名中消脾主肌肉故熱在肉分

輕按重按皆不熱不輕不重乃得之遇

夜尤甚者為脾熱天熱宜此湯及調胃

承氣虛熱宜補中益氣湯按面上熱

身前熱一身尺熱狂而妄言妄見其足

陽明肩背熱及足外廉腫踝後挑皆足
太陽日熱舌乾而喘足下熱而痛皆足
少陽肩熱項似拔耳前熱若寒皆下
太陽身熱膚痛手少陰酒淅寒熱手太
陰掌中熱手太陰少陰厥陰熱而筋絛
不收陰痿足陽明厥陰又曰胃居膈上
胃熱則膈以上熱腸居膈下腸熱則膈
以下熱肝胆居膈肝胆熱則脇亦熱

心竅之血故 血痢血淋舌血

亦治馬癩 鼻血 燒灰專胞不通

根湯服 小兒驚風 為合雞子黃煎

能去 合諸藥煎膏涼血去瘀

長吻 眉屬肝 稟木氣而側生

鬚眉腎稟水而下生或曰髮

屬肝稟木氣而上生眉屬金

稟金氣而橫生金無餘氣故

短而不長至老金氣鍊則眉

長矣昂按肺主毛毛亦短而

不長者何以狗無所屬乎

毛既為肺之合自當屬肺屬

金胃當屬肝屬木以其側主

砍木枝也此乃臆說附質明

者經曰腎者精之處也其華

在髮王水注曰腎主髓腦者

髓之海髮者腦之華腦髓賦

則髮柔時珍曰髮人上子年

不朽以火煨之為血質煎

鍊至枯復有液出誤吞入腹

化為癥生煨煉服食使髮不

自故本經有白還神化之稱

嗽癯器曰生人髮得葉樹上

則烏鳥不敢來又人逃走取

其髮于緯車上轉之則迷亂

不知所適此皆神化子丹秘

錄亂髮燒灰亦治尸疰瘡脂

調塗小兒疔口即兩角生瘡

也宋丞相王郛公小腹切痛

備治不劫用附子煎黃五夜

又左之煩亦不差張附馬取

女人油頭髮燒灰研篩 皂

酒服二不其痛立立 水

洗淨入罐固煨存性用

居胸背肺熱則胸背亦熱腎居

腰腎熱則腰亦熱可類推也

防風 四錢 山梔 一兩 石羔 五錢 甘草

二兩 右末微炒香蜜酒調服

此是太陰陽明藥也山梔清心肺之火

使屈曲下行從小便出香理脾肺之

氣去上焦壅熱辟惡調中石羔大寒泄

熱兼能解肌甘草甘平和中又能瀉火

重用防風者取其升浮能飛脾中伏火

又能于土中瀉木也 木盛能上防風能

能開脾中伏火何以不用黃連余曰燥

矣又聞既惡燥何以用防風余曰亦用

有言防風乃風藥中潤劑也李東垣曰

瀉黃散非瀉脾也脾中瀉肺也實則瀉

其子以脾為生肺之上

原故用石羔厄子之類

錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳殼黃芩

各錢 石斛 二分 半夏 錢 甘草 七分 治同前

症或唇口皸爛燥裂也脾之華在唇觸動

白芷升麻皆陽明藥防風祛風而散脾

火燥在唇日故從其性而升發之也黃

芩泄中上之熱只壳利中上之氣半夏

能燥能潤發表開入石斛清脾平胃退

熱補虛甘草和脾兼能泄火亦火鬱發

之之義也 治日病諸藥脾熱則日

生地芍藥黃連泄火禍曲萊蕪消食人

肝熱則日酸黃連龍胆泄肝心熱則日

苦柴胡芩連黃芩黃連泄火肺熱則日

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

辛黃芩芩厄子泄肺符藥泄脾麥冬清心

胎髮尤良補衰潤頭
治淋及噎膈勞復

人牙 鹹温有毒治痘瘡倒靨

痘疹論出不快而黑陷者須
循血調下一錢服涼藥而血
溢倒靨者窮香酒調服時珍
曰欲其象入骨經發出毒氣
蓋切劑也若伏毒在心不省
人毒氣虛色白疥場無膿及
然癩紫泡之症只宜補虛解
毒尚快服此則八悶声啞反
成不 煨退火毒研用

人乳 甘鹹潤五藏補血液止

消渴澤皮膚治風火症謂卷
日老
人便秘服木血所化自得血
人乳最良

而能視用點赤澁多淚熱者
黃連

濕然性寒滑藏寒胃弱人不

宜多服時珍曰人乳無定性
其人和平飲食冲淡

其乳必平其人煩暴飲酒食
辛或有火病其乳必熱又有
孕之乳為忌乳最有毒小兒
食之吐泄成疳疔之病內亦
堪胎長按乳乃陰血所化生
于脾胃燥干衝任未受孕則
下為月水既受孕則留而養
胎已產則變赤為白上為乳
汁以食小兒乃造化之玄微
也服之益氣血補腦髓所謂
以人補人也然能滑腸溫脾
藏痛天設之以為小兒非壯
者所當常服惟製為粉則有
益無損又須旋用久則酒渣

腎熱則日鹹却母烏則骨泄腎胃熱則
口淡痰吟白木半夏生姜燥脾勝濕日
泄黃芩泄水葛根生津防風
薄荷疎風瓜蒌茯苓行痰

清胃散東治胃有積熱上下牙痛牽引頭

腦滿面赤熱其牙喜寒惡熱或牙齦潰

爛或牙宣出血或唇口頰腮腫痛足陽
明胃

脈循鼻外入上齒中俠口環唇循頰車
上耳前主上齒齦喜寒而惡熱手陽
明太陽脈上頸胃頰人下齒俠日主下
牙齦喜熱飲而惡寒足陽明脈絡腦故
腦痛陽明之脈榮于面故而熱二經熱
感故唇口齒頰病而腫痛也齒為骨屬
腎牙宜齒根出血或齒齦出血也亦名
齒疳乃腎病若血多而涌出不止為陽
明熱盛以陽明多氣多血也唇屬脾胃
大腸經燥則乾熱則裂風則爛則爛

若腫破裂加垂蒲名曰爛唇唇舌者那
肉之木也人中平滿者為唇反唇反者
肉生

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升
麻 一方加石膏 此足陽明藥也黃

連泄心火亦泄脾火脾為心子而與胃

相表裏者也當歸和血生地丹皮涼血

以養陰而退陽也石膏泄陽明之大熱

升麻升陽明之清陽清升熱降則腫消

而痛止矣論新甫曰濕熱盛面牙痛者
承氣湯輕者清胃散大腸熱

而腫痛者清胃散甚者調胃湯六入

而痛者越鞠凡中氣虛而痛者補中益

須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜乳粉未等分蜜九名參乳九

大補氣血 取年少無病婦人乳白而稠者如兒食良

莫赤清色氣腥穢者並不堪用或暴晒用茯苓粉收或水

頓取粉尤良取粉法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大亦可傾

乳少許入瓢浮滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用再頓再刮如攤粉皮法

紫荷車自胞衣一甘鹹性温本

人之血氣所生故能大補氣

血治一切虛勞損虛損一

偏毛落二損心血脉衰少三損脾肌肉消脫四損肝筋緩不收五損腎骨疼不赴六極日氣極血極筋極用極骨極

極恍惚失志癲狂 以初胎

及無病婦人者良有胎毒者

害人以銀器插人恬長流水

洗極淨酒蒸焙乾研末或煮

爛搗碎入藥如新瓦炙者亦

氣湯思慮傷脾而痛者痛腫湯腎經虛熱而痛者六味丸腎經虛寒而痛者還少丹重則入味尤其屬風熱者他活散

若陳散風寒人勝者羌活附子湯當且時制宜附他活散他活羌活川子防風各五錢細辛荆芥薄荷生地各二錢每服三錢

甘露飲方治胃中濕熱口臭喉瘡齒齦宣露及吐衄齒血胃之竅在口其肝上齒

日瘡陽熱拂人胃中越出于口鼻故吐血衄血齒屬少陰腎屬陽明胃二絡有熱則齒齦齒縫出血各齒

或牙齦相脫齒相宜露也 生地黄 熟地黄 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉

甘草 等分每服五錢一方加桂苓各

桂苓甘露飲本方加犀角云如此甚

有道理犀角凉心泄肝清胃中大熱

此是陽明少陰藥也煩熱多屬于虛二地二及甘草有解之甘治腎胃之虛熱

泄而兼補也茵陳黃芩之苦寒折熱而

去濕火熱上行為患故又以枳殼枇杷

葉抑而降之也

河間桂苓甘露飲滑石兩石羔寒水石

甘草各二兩白木茯苓澤泄各一兩猪苓肉

可調和煮食

李時珍曰：雀行衣宜藏天德月德吉方深埋緊聚苦為猪狗食，令兒癩狂。蟻食食今兒癩癩烏雀食今兒惡死充火中，令兒癩爛。近社廟并灶街巷皆有所忌。此亦銅山西崩洛鐘東應自然之理，令人以之炮炙入藥，雖以人補人，然食其同類，猶不犯雀氏之戒乎？以故木集如天、天益等藥不入錄。

童便

一名還元水，飲自鹹寒。時珍曰：溺名輪迴酒。

日能引肺火下行，從膀胱出，乃其舊路，降火滋陰，甚速潤。

市散赤，鹹走治肺痿失血吐。

血損傷，此跌打損傷，血閉欲灌之下，咽即醒，一切金瘡受。

效並宜用之，不傷臟腑者，用他藥恐無效者，胞胎不下，皆反致誤人，矢。

功：凡產後血運，敗血入肺。

陰虛久嗽，火蒸如燔者，惟此。

可以治之，音清澄，勞極論云：神飲，瘦弱百無一生，取十服，寒涼藥百無一生。

二歲以下童子，無相火，不食。

薑腥酸鹹者，佳。去頭尾，取中間一節，清徹如水者，用當熱。

桂各五錢，每服五錢，治中暑安瀉，引飲過。

多頭痛，煩渴濕熱便秘，此亦五苓六一。

張子和去猪苓減三石，一半加入。

參乾葛各二兩，藿香五錢，木香分每服三錢。

亦名桂苓甘露飲，治伏暑煩渴，脈虛水。

逆，渴欲飲水，水入。

瀉白散

錢乙治肺火皮膚蒸熱，酒浙寒熱，日。

晡尤甚，喘嗽氣急也。酒浙寒熱，邪在皮膚，

膜也。日晡，凡甚，金旺于酉，名肺苦氣土，

迎故咳嗽喘急，輕按即得，重按全無，是

熱在皮毛，日晡。桑白皮、地骨皮。

甘草分兩，粳米百粒，易老加黃連。

此手大陰藥也，桑白皮甘益元氣之，不

足辛泄肺氣之，有餘除痰止咳，嗽水泄火，

故能除痰，地骨皮寒瀉肺中之伏火，

陰瀉肝腎之虛熱，涼血退蒸，肝木盛能

則剋金，腎為肺子，實則泄其子。甘草瀉火而益脾，粳米

清肺而補胃，土為金母，虛並能瀉熱，從

小便出，肺主西方，故曰瀉白。李時珍曰：此瀉肺諸

方之準繩也。瀉白散，世肺經氣分之

火，黃芩一物，湯丹，清金丸泄肺經血

分之火，法酒金丸，即木方加人參五味

黃芩炒為末，水丸。瀉白散。

飲熱則真氣尚存其行自速

冷則惟有鹹寒之性人姜汁

行非十散更舒冬月用湯溫

之李士材白煉成秋石直元

普洛方治目赤腫痛用自已

此以重氣退

秋石 鹹溫滋腎水潤三焦養

母田安五藏退骨蒸軟堅

治虛勞咳嗽白濁遺精為滋

陰降人之聖藥若煎煉失道

多服其服反生燥渴之患能

走血且經煨鍊中寓煖氣

使虛陽妄作則真水愈虧家

筮曰秋月取童便每缸用石

羔七錢柔修攪澄傾去清液

如此二三次乃入秋露水攪

澄故名如此數次滓穢淨鹹

味減以重紙鋪灰上晒乾刮

去在下重濁取輕清者為秋

石世醫不取秋時雜收人溺

以皂莢水澄晒為陰煉火煨

茯苓青皮陳皮名加減瀉白散東垣伯咳

嗽喘急嘔吐本方加知母黃芩桔梗青

皮陳皮亦名加減瀉白散鑑治咳而氣

喘煩熱口渴胸膈不利本方除甘草類

米加黃芩知母麥冬五味桔梗亦名加

減泄白散羅謙治過飲傷肺氣出腥臭

唾涕稠粘嗝噎不利口苦乾燥原文云

骨味苦微寒降肺中伏火而補氣為君

黃芩知母苦寒治氣出腥臭清肺利氣

為臣五味酸溫以收肺氣麥冬苦寒治

唾涕稠粘口苦乾燥為臣桔梗辛溫輕

浮治痰逆利

燥口糜舌瘡咬牙口渴心曲小腸相表

亦熱故便赤林痛心屬君火是五藏六

府火之主故諸經之熱皆應于心面赤

煩燥咬牙口渴皆心熱也舌為心苗若

心火上炎薰蒸于口則口糜舌瘡輕手

按至皮毛之下肌肉之上則熱口申大

甚是在血脈為心熱朱丹溪曰五

藏各有火五志激之其火隨起若諸寒

病必身犯寒氣口食寒物非若諸火病

白內 生地黃 木通 甘草稍 淡

竹葉 等分煎 此手少陰大陽藥也

生地涼心血竹葉清心氣葉生竹上本

通降心火入小腸君火宜木通相火宜

卷之五 本草綱目

為陽煉盡去干道安能應病

况經火煉性却變溫耶秋石

入罐鐵蓋蓋定蓋泥固務升打升起蓋上者名秋水味淡而香乃秋石之精英也保壽堂方用童男童女小便各煉成秋石且色如雪和勻加乳汁日晒夜露取日情月華乾即加乳待四十九日足收貯配藥摘之云腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳

人中黃 甘寒入胃清痰火消

食積大解五藏實熱治天行

熱王良倉血熱無眉不起

內甘草末干竹筒塞孔冬月

浸甕缸中至春取出洗懸風

處陰乾取甘草用亦有用作須削去

青皮一云節甕缺多存黃

涎煨存性用

蘇精一名金汁王治同人中黃用

穆皮棉紙上鋪黃土淋甕瀝

汁入新甕碗裏埋土中一年

清如泉水全無穢氣用年久

者彌佳男間發糞下土篩傳瘧疽如水着背

各別君心火草稍達莖中而止痛赤

以甚導丙丁之火由小水而出也小腸

火心為丁火心執世小腸金底抽薪之義也易老用導亦散合五苓散治口糜神効徑曰膀胱移熱于小腸腸腸不便上為口糜亦有理中湯加附子者因脾胃虛衰之火被逼上炎故用參朮甘草補其上姜附散其寒則火得所助接引退合矣綱目曰心氣熱則上竅宜導赤散留氣虛則下竅宜地黃丸

蓮子清心飲方治身熱煩燥或

酒色過度火盛冠金口苦咽乾漸成消

渴遺精淋濁遇勞即發四肢倦怠五心

煩熱夜靜晝甚及女人崩帶煩燥遺精

虛而有熱也心火妄動則不能下交手腎故元精失守也遇勞則充為勞淋勞則動其心火也晝偏熱者陽虛也崩中內損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病本于帶脈而得名者屬血白屬氣由陰虛陽竭營氣不升衛氣下陷或濕痰濕熱而下流也

石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡

錢黃芩 地骨皮 麥冬 車前子

甘草炙 空心服 此手足少陰足少

陽大陰藥也參芪甘草所以補陽虛而

泄火東垣曰參芪甘草助氣化而達州都

勝腕也氣化則能出地骨退肝腎之虛執柴胡散

本草綱目

人中白 鹹平降火散瘀治肺

痲鼻吻 刮人中白新瓦火 勞

熱消渴痘瘡倒陷牙疳口瘡

即溺至煨研用 以蒙籠童子

僧溺器取下者危佳

醫方集解 卷五

肝胆之火邪蓄琴交冬清熱于心肺上

焦茯苓車前利濕于膀胱下部中以石

蓮清心火而交心腎則諸症悉退矣

道赤各半湯節治傷寒後心下不硬腹中

不滿二便如常身無寒熱漸疲神昏不

語或睡中獨語目赤口乾不飲水與粥

則嘔不與勿思形如醉人名越經症傷

不硬不滿二便如常病不在府也神昏

睡語不思食形如醉人此邪熱傳手少

陰心心火上而逼肺也邪熱入裏故目

赤舌乾邪熱在陰故不渴此症自足而

傳手經故

醫方湯頭歌括

休寧汪昂訂補編輯

男汪端其兩較

補益之劑 十首附方七

四君子湯局中和義參朮茯苓

甘草比 人參白朮茯苓各二錢

和故名 益以夏陳 牛夏陳皮 名六

君子祛痰補氣陽虛餌 二陳除痰

四君補氣脾 弱陽虛宜之 除却半夏名異

功散錢 或加香砂胃寒使加

湯頭歌括

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔

滑石 麥冬 人參 甘草 茯苓

加燈心姜盞煎 此手少陰太陰太陽

藥也陳來章曰熱人心經涼之以黃連

犀角卮子心移熱于小腸泄之以滑石

甘草燈心心熱上逼于肺清之以黃芩

卮子麥冬然邪之越經而傳于心者以

心神本不足也故又加人參茯苓神以補

之 昂按傷寒傳邪手足原無界限必伸

景亦有傷心散湯而麻黃桂枝先正

以為皆肺熱也此湯泄心脈之邪熱從

小腸膀胱出故亦口導赤其曲惟心異

醫方集解 卷五 清涼瀉湯 二八 下

香砂仁行氣溫中
名香砂六君子湯

升陽益胃垣 參朮芪黃連半

夏章陳皮苓泄防風羌獨活

柴胡白芍朮姜隨昔芪二兩
人參半斤

炙甘草各一兩羌活獨活防

風白芍炒各五錢陳皮四錢

白木茯苓澤泄柴胡各三錢

黃連二錢每服三錢加姜朮

前○六君子助陽補陰除痰

重用黃芪補氣固胃柴防羌

獨除濕升陽澤泄茯苓泄熱

降泄加芍藥和血飲陰少佐

黃連以退陰火按東垣治癆

首重脾胃而益胃又以升陽

為先故每用補中上升下滲

收脾胃諸方
多從此時也

黃耆散羅 地骨皮凡苑參

苓柴半知地黃芍藥天冬桂

甘桔桑皮勞熱宜治虛勞骨
蒸肺熱咳

嗽食少盜汗黃耆散羅申天冬

各五錢地骨秦凡茯苓柴胡

各三錢紫苑牛夏知母生地

白芍桑皮炙草各二錢半人

參肉桂桔梗各錢半每服一

兩加姜煎○驚申天冬知芍

者以無痞
硬之症也

晉濟消毒飲垣 治大頭天行初覺癰寒体

重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉

不利口渴舌燥俗曰大頭天行初感不
相訪問染者多不救

和問多有病此者醫以承氣加藍根下

之稍緩翌日如故下之又緩終莫能愈

漸至危篤東垣視之日夫身半以上天

之氣也牛身以下地之氣也此邪熱容

于心肺之間上攻頭面為腫盛以承氣

瀉胃以之實熱是為誅伐無過病以適

至其危篤故遂處此方全活

甚眾遂名晉濟消毒飲子

黃芩酒炒 黃連酒炒 五不陳皮去 甘草生 玄參

薄荷錢 僵蚕升麻 柴胡枳椇

為末湯調時時服之或蜜拌為丸喻

化一方無薄荷有人參三錢亦有加大

黃治便秘者或酒浸或煨用

此手太陰少陰足少陽以明藥也天連

苦寒泄心肺之熱為君玄參苦寒橋紅

苦辛甘草寒瀉火補氣為臣連翹朴

荷氣粘辛苦而平藍根甘寒馬勃僵蚕

苦平散腫消毒定喘為佐升麻柴胡苦

平行少陽陽明二經之陽氣不得伸桔

散羅

治風勞地骨柴

秦克驚申散羅 治風勞地骨柴

漢書可補

胡及青蒿當痛知母烏梅合

止嗽除蒸欬汗高驚甲地骨

一兩青蒿五葉秦艽當歸知母各五錢烏梅五箇治略同前汗多倍黃芪此方加高嵩烏梅皆欬汗退蒸之意

秦艽扶羸湯直蟹甲柴地骨當

歸紫苑偕半夏人參兼炙草

肺勞蒸嗽服之譜治肺痿骨

啞自汗休倦柴胡二錢秦艽蟹甲地骨當歸人參各錢半紫苑半夏甘草炙各一錢加姜枣煎按黃芪當歸散益本此方除當歸加餘藥○透肌

故骨蒸方中多用之此方星表裏交治而以柴胡為君

紫苑湯海中知貝母麥冬五味

阿膠偶再加甘桔治肺傷咳

血吐痰勞熱治肺傷氣極

痰吐血肺痿肺癰紫苑知母貝母阿膠各一錢人參茯苓甘草桔槓各五分五味十二粒一方加連肉○以保肺正嗽為君故用阿膠五味以清火化痰為臣故用知母貝母佐以參苓甘草扶上以生金使以桔槓上浮而利膈

百合固金湯趙一地黃玄參貝

母桔甘藏麥冬芍藥當歸配

梗辛温為丹榘不令下行為載也此解水之

東垣而稍加潤潤然十書中無此方見于葦繩

清震湯問治雷頭風頭面疔瘡腫痛憎寒

犬執吠如傷寒一云頭如雷鳴風動作

陽不可過用寒藥重劑誅伐無過延清震湯治之○三陽之氣皆會于頭頭從額至巔絡腦後者屬太陽從額至鼻下面者屬陽明從頭角下耳中耳之前後者屬少陽

升麻 蒼朮五錢荷首二破

此足陽明藥也升麻性陽味甘氣升能鮮百毒君木辛烈燥温強脾能辟瘴疔

此局方升麻湯也荷葉色青氣香形似象震震仰着為雷通於中清陽上類象形以治之助胃中清陽上行用甘温辛散之藥以升發之使邪從

上越且固胃氣使邪不傳裏也

紫雪局治內外煩熱不解狂易叫走發斑

發黃口瘡脚氣瘡毒蠱毒熱毒藥毒及

小兒驚癇

黃金百兩寒水石 石膏 滑石 磁石

水煎三斤梹煎去渣入後藥升麻 玄參一斤甘草半

犀角 羚羊角 沉香 木香五兩

香一斤並鴉割人前藥小稍硝石各

此方見于葦繩

喘咳痰血肺家傷

生地三錢
熟地三錢
麥冬錢半
貝母百合
當歸五白
芍甘草各一錢
玄參桔梗各
八分
○火旺則金傷故以玄
參二地助腎滋水
麥冬百合
保肺安神
芍藥甘平
肝養
血甘桔貝母
清金化痰
皆以
甘寒培木不傷以苦
寒傷生癸之氣也

補肺呵膠散

馬兜鈴 罌粟 甘草

草杏 糯停 肺虛 火盛 人當服

順氣生津 嗽噴寧

阿膠兩牛
馬兜鈴倍
鼠尾子炒甘草
銀糯米各一
兩杏仁七錢
○牛蒡利膈滑
痰杏仁降氣
間故李時珍曰

小建中湯

芍藥六兩
桂枝三兩
甘草一兩
炙甘草一兩
黃芪兩半
名黃芪建中湯
金匱若除飴糖
則名黃芪五物
湯不名建中矣
今人用建中
申者絕不用飴
糖何哉

加飴糖補中藏虛勞腹痛服

之瘥

增入黃芪名亦再

虛身痛效無過又有建中十

四味陰斑勞損起沉疴

亦百陰症

方頁次舌補

斤提淨入煎藥汁中微火煎不住手
將柳木鏡候汁欲凝再加入後二味
辰
少三兩
研細麝香當歸子
一兩二錢研細
人煎藥拌勻
合

成退火氣冷水調服每一二錢
本事
力無黃金
此手足少陰足厥陰陽明

藥也寒水石石羔滑石硝石以瀉諸經
之火而兼利水為君磁石玄參以滋腎
水而兼補陰為臣犀角羚羊以清心寧

肝升麻甘草以升陽解毒沈香丁香木
香以溫胃調氣麝香以透骨通竅丹砂

黃金以鎮驚安神寫心肝之熱為左使
諸藥用氣確獨用質者以其水鹵結成

性峻而易消以泄火而散結也

人參清肌散

治午前潮熱氣虛無汗

熱

午前陽虛而陰火乘之也火燥熱入故

無汗經曰陽氣有餘為身熱無汗陰氣

有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而

寒按此有餘乃病邪有餘即不足也陰

陽和則無病過中則皆病也經又云陽
盛生外熱陰盛生內寒皆亢則為害非
真陰真
陽盛也
人參 白朮 茯苓 甘草
半夏 麩 當歸 赤芍藥 柴胡
乾葛 加姜棗煎 此足少陽陽明藥
也四君以補陽虛參朮歸芍以調陰血

醫方集詳火六五五人參清肌散

三一 下

湯司司

死斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏于下逼其無根之火

子麥夏薤苓仔細哦即十全大補湯

加附子麥冬半夏肉桂各十四味建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉桂

益氣聰明湯東垣葛荆升葛參芪

黃柏并再加芍藥炙甘草耳

聾目障服之清參芪各五錢葛荆子葛根

各三錢黃柏白芍各二錢升府錢半炙草一錢每服四錢○人之中氣不足清陽不升

發表之劑十四首附方入

麻黃湯仲景中用桂枝杏仁甘草

四般施發熱蕙寒頭項痛傷

寒服此汗淋漓麻黃去節三兩

杏仁老十枚去皮尖甘草汁一兩傷寒太陽表症無汗用此發之○麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之且草和之

六五五更表

生夏和胃而行痰紫葛 陽而退熱益

以甘溫泄火甘溫能發寒活血

甘解肌有汗宜實表此之無汗與傷寒

無汗不同故但解其肌熱而不必發出

其汗也

前藥各二兩加黃芩五錢每服三錢加

姜葱煎名人參散許叔微治和熱客于經

絡痰嗽煩熱頭痛目昏盜汗倦怠一切

血熱虛勞喻嘉言曰此邪熱淺在經絡

全藉參朮之力以達其邪又恐邪入痰

白泉除濕湯東垣治午後發熱背惡風四肢

沉困小便色黃又治汗後發熱午後發熱

陰分陽陷陰中也背為陽腹為陰皆惡風者陽不足也脾主四肢四肢沉困濕勝而脾不運也小便黃濕蒸熱也汗後而熱不退陽虛也

人參 赤茯苓 甘草 柴胡 白朮

一兩 生地黃 地骨皮 知母 澤泄

七錢 每服五錢如有刺痛加當歸七錢

小便利減芩泄一半

白泉除濕湯

三一 下

桂枝湯仲景治太陽中風芍藥

葛根湯仲景治太陽中風有汗

麻黃湯仲景治太陽中風無汗

小續命湯仲景治風濕痺痛

大續命湯仲景治風濕痺痛

羌活湯仲景治風濕痺痛

獨活湯仲景治風濕痺痛

三拗湯仲景治風寒咳嗽

麻黃湯仲景治風寒咳嗽

桂枝湯仲景治風寒咳嗽

小續命湯仲景治風濕痺痛

大續命湯仲景治風濕痺痛

羌活湯仲景治風濕痺痛

獨活湯仲景治風濕痺痛

三拗湯仲景治風寒咳嗽

麻黃湯仲景治風寒咳嗽

桂枝湯仲景治風寒咳嗽

小續命湯仲景治風濕痺痛

大續命湯仲景治風濕痺痛

羌活湯仲景治風濕痺痛

獨活湯仲景治風濕痺痛

三拗湯仲景治風寒咳嗽

麻黃湯仲景治風寒咳嗽

此足太陰少陰少陽藥也陽陷陰中熱

在血分故以生地滋其少陰而以知母

地骨泄血中之伏火也柴胡升陽以解

其肌陽陷陰中故用柴胡提出其陽苓泄利濕兼清其

熱參朮甘草益氣助脾氣足陽升虛熱

自退脾運而濕亦除矣方各除濕而治

濕中而下降也

清骨散治骨蒸勞熱火炎水竭真陰虧

蒸而耗也李東垣曰晝夜發熱夜靜者是

陽氣旺于陽分也晝靜夜熱者是陽氣

下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜俱

熱是重陽死陰也當亟泄其陽峻補其

陰陰虛病則在氣夜病則在血

銀柴胡錢胡黃連秦羌煎甲童便

地骨皮青蒿知母錢甘草分炙五

此足少陽厥陰藥也地骨胡連知母之

苦寒能除陰分之熱而平之于內柴胡

青蒿秦朮之辛寒能除肝胆之熱而散

之于表醫陰類而用屬骨能引諸藥入

骨而補陰甘草甘平能和諸藥而退虛

熱也

石膏散外治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脉

致姜桂麻黃芍藥甘細辛半

小續命湯仲景治水氣喘咳嘔噦

燥者方可用之以甘草佐麻黃發表以姜束佐桂枝解肌石羔質重泄火氣輕亦達肌表義取青龍者龍因而雲升雨降鬱執頭除煩躁乃解也若少陰煩躁而候服此則逆風寒兩解此為良麻黃湯治治風大青龍兼風寒而兩解之陶節菴曰此湯險峻令人罕用

夏兼五味 于姜桂枝麻黃芍藥酒炒炙草細辛

各二兩半夏五味子各半升

○桂麻解表使水從汗洩芍

味欬肺以收喘咳姜夏辛細

問腎行水以止渴嘔亦表裏

分消之意

葛根湯 內麻黃二味加入

桂枝湯 桂枝芍藥炙草各二

兩姜三兩棗十二枚

此桂枝湯也加葛根可去是

根四兩麻黃三兩

因無汗 中風表實故汗不得

出十剗日輕可去安

葛根麻黃有汗加葛無麻黃

升麻葛根湯 錢氏再加芍藥

甘草是 升麻三錢葛根芍藥

各二錢炙草一錢

○輕可去實辛能達表故用升

葛發散陽明表邪陽邪盛則

陰氣虛故加芍藥欬陰和血

升麻甘草升陽解毒故亦治

時疫陽明發熱與頭疼無汗惡

寒均堪倚及目痛鼻乾亦治

不得固痔症

時疫與陽斑痘疹已出慎勿

使恐升散重

使虛其表也

九味羌活 湯張用防風細辛蒼

芷與川芎黃芩生地同甘草

長者 勞熱之症不尺屬陰虛亦有陽邪

入裏傳為骨蒸令人先後寒熱漸

成羸瘦者有汗胃寔

也脈長陽明症也

石膏 研細每夕新汲水服方寸七取

熱退為度 此足陽明藥也石羔大寒

質重能入裏降火味辛氣輕能透表解

肌雖寒而甘能緩脾益氣火勞有是熱

者非此不為功故外台秘要名醫錄皆

載之玄珠曰五行六氣水特其一耳一

載之水既虧豈能勝五火哉醫不知邪

氣水除便用補劑邪氣得補遂入經絡

至死不悞夫涼劑能清火養水熱劑能

補火燥水理易明也勞為熱症明矣尚

可補乎惟無熱無情之人脈微無力方

可補之必察其胃氣及石腎二火果虧

後用補劑可也證治要訣云治虛勞獨

用熱藥者猶釜中无水而進火也過用

冷藥者猶釜下无火而添水也非无益

而又

害之

母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑

者肺虛扶火或咳嗽發熱陰虛已甚再

服補陽之藥則火益亢而陰愈虧故

有重病虛勞不

能服溫補藥者

知母炒 貝母炒 葶

分為末服 古方二母各二兩加巴霜

十粒姜三片臨臥白湯嚼服治咳嗽痰

喘必利下寒痰 此手太陰藥也火旺

旺燥金肺虛勞熱能受溫補者易治不

三陽解表益姜蔥羌活防風

牛白芷川芎黃芩生地甘草各一錢細辛五分加生姜蔥

煎陰虛氣弱人禁用加減臨

時在麥通潔古製此湯以代

半時湯用羌防蒼細芎芷各走一經祛風散寒為諸路之

應兵加黃芩池氣中之熱生地泄血中之熱甘草以調和

諸藥然黃芩生地寒瀉未可槩施用時宜審

十神湯方裡葛升麻陳草芎蘇

白芷加麻黃赤芍兼香附時

行溫感冒文堪誇葛根升麻

附等分加姜蔥煎治風寒兩感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽

鼻塞○葛麻升葛蘇芷香附辛香利氣發表散寒加芍藥

者欲陰氣于芎芷之中加甘

草者和陽氣疎利之陳也吳

緩曰此方用升麻于芎能解

陽明溫疫時氣若大陽傷寒

發熱用之則引邪入陽明傳

變發班矣慎之

神木散方用甘草蒼細辛藁本

芎芷羌蒼木二兩炙草細辛

各一兩每服四錢生姜蔥白煎

各走一經祛

風濕太陰蒼木少陰細辛厥

陽少陽川芎太陽羌活

能受溫補者難治故又設此法以滋陰

用貝母化痰瀉肺火知母滋腎清肺金

取其苦能瀉熱寒能勝熱潤能去燥也

二母皆潤燥之劑

利膈湯本治脾肺火熱虛煩上壅咽痛生

瘡十二經脈惟足太陽在表別下咽不

歷咽膈餘經皆循喉嚨歷膈或濕熱

上攻或虛火妄行痰涎結聚則成咽痛

咽瘡寔火宜升之散之若虛火宜用人

參姜附辛熱之藥多有過服寒涼而病

反甚者張子和曰經何以言一陰一陽

結為喉痺蓋君相二火獨勝則熱結經

絡故痛且速也監乾噤痛咽腫頰腫舌

木強皆君火也惟喉痺急速相

火也君火入火也相火危火也

薄荷 荆芥 防風 桔根 甘草

牛蒡子炒 人參 等分或為末每服二

錢或加蠶蚕其氣清化能散相火逆結之痰

此手太陰少陰藥也咽痛咽瘡由于火

鬱結根甘草甘桔湯也辛苦散寒甘平

除熱為清膈利咽之要藥加薄荷荆防

醫方集解 火卷五 利膈湯

葉本陽明白芷此方典九味
羌活湯意同加藜蘆本除黃芩
生地防風較

羌活湯更檢風寒瀉泄總堪
膏大無神木散大無丹即平

胃散加入葛蒲與藿香陳皮
一二錢蒼木厚朴各一錢炙草

蒼木防風各
蒼木防風各

陽無汗代麻黃二兩炙草一
兩用代仲景麻黃湯

治太陽傷寒無汗若以白
水易蒼木太陽有汗此湯良

名白木湯用代桂枝湯治太
陽傷風有汗二木主治各同

特有止汗
發汗之異

麻黃附子細辛湯

仲景發表溫經
兩法彰麻黃細辛各二兩附
子一枚炮○麻黃芩

太陽之汗附子溫少陰之經
細辛為腎經之表藜蘆屬其

開若非表裏兼治少陰反
熱身能康少陰症脈沉屬裏

為太陽表
症未除

人參敗毒即熱濕也茯苓草枳
桔柴前羌獨芎薄荷少許姜

三片時行感冒有奇功
人身參

身首入舌表

甘桔湯金匱名治少陰咽痛喉痺肺癆吐
膿乾咳無痰火鬱在肺咽足少陰腎脈

循喉喉火炎則痛經曰一陰一陽結請
之喉痺一陰少陰君火一陽少陽相火

也肺癆者金匱云熱之所過血為之凝
滯畜結癥膿吐如米粥始萌可救膿成

難治火鬱在肺亦治心藏發咳則心
痛喉中介介如梗狀

甘草二桔根一或等分玉好古加法
失音加訶子声不出加生夏上氣加陳

皮涎嗽加知母目昏欬渴加五味酒毒
加葛根少氣加人參嘔加生夏生姜吐

膿血加些薤白痰加阿膠胸膈不利加
枳殼痞滿加枳實自赤加梔子大黃面

腫加茯苓膚痛加黃芪發斑加荆芥防
風痰毒加牛蒡子大黃不得眠加梔子

昂按現海藏之所加而
用藥之大較亦可識矣

此手太陰少陰藥也甘草甘平鮮毒而
瀉火桔根苦辛清肺而利膈又能開提

氣血表散寒邪排膿血而補內漏故治
咽痛喉痺肺癆咳嗽取其辛苦散寒甘

平除熱也金匱日咳而胸滿振寒咽乾
不渴時出涕唾腥臭為肺癆

苦方表詳火卷五甘桔湯
三一

三一

三一

三一

三一

三一

三一

只壳枯根柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服一兩加卜荷生姜煎○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清只壳前胡行痰降氣甘桔參茯苓清肺強胃輔正匡邪也喻嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一俗醫減却人參曹典他方有別耶

再造散 治亦同台消風散名風散見風門消風散毒散

再造散 用參芪甘桂附羌防

芎芍參細草加炙煨姜黃陽

虛無洋法當請人參黃芪甘

酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨姜大棗煎○以參芪計姜附大補其陽助羌防芎細散寒發表加芍藥皆干陰中斂陽散中有收也附節菴曰發熱頭痛惡寒無汗服汗劑不出者為陽虛不能作汗名無陽症庸醫不識不論時令遂以麻黃重劑取其汗誤人死者多矣又曰人第知參芪能止汗而不知其能死汗以在表藥隊中則助表藥而解散也

麻黃人參芍藥湯 東垣桂枝五味

麥冬養芩芪甘草汗兼補虛

人外感服之康麻黃白芍黃芪當歸甘草

此湯主之喻嘉言曰此上提之法乘其新起提其敗血或從唾出或從便由足以殺其毒此因胸滿振寒不渴病尚在表用此開提咳氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此法不中用矣綱目曰喉痺惡寒為寒閉于外熱鬱于內忌用阻鬱酸寒等劑煎喉使陽鬱不得伸又忌確黃等寒劑下之使陽邪憎裏宜用表藥提其氣升以助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之敵劑收之也○外台秘要曰五藏之尊心為王而肺居其上肺為華蓋下覆四藏合天之德通達風氣性愛溫而惡寒心火更炎上蒸其肺金被火傷則葉萎倚着于肝肺榮痒則嗽因心肝虛弱不能傳陽于下焦遂至正陽俱踈變成嗽矣肺主皮毛遇寒則慄而栗起肺嗽因痿倚着于肝而成病中水能扣金與鳴也先養肺抑心肝虛熱和其腎則愈矣

本方除積梗名甘草湯 治同本方加

防風名甘桔防風湯治同本方加防風

荆芥連翹名如聖散宋仁宗治上焦風熱

本方加連翹薄荷竹葉庵子黃芩名桔

梗湯治上焦熱喉痺熱腫又方桔梗

桑皮貝母瓜蒌當歸枳殼苡仁防已一作

防風各五分黃芪七分杏仁百合甘草各三分加

姜煎亦名桔梗湯生治肺癆吐膿噎乾

多渴如大便閉加大黃小便赤加木通

本方加訶子名訶子清音湯加重使服

各月方集年火六之五甘桔湯

三一 下二

湯頭歌括表

炙各一錢人參麥冬各三分
桂枝五分五味五粒○東垣
治一人內蘊虛熱外感大寒
而吐血法仲景麻黃湯加補
劑製此方一服而愈原餅口
麻黃散外寒桂枝補表虛黃
芪實表益衛人參益氣固表
麥冬五味保肺氣甘草補脾
芍藥安大陰當
歸和血養血

神白散衛生用白芷甘姜茵淡

白芷一兩甘草五
三片蔥白三
十煎服取汗一切風寒皆可

服婦人雞犬忌窺探誠服乃

名蔥湯用代麻黃湯功不慙傷
初覺頭痛身熱便宜
服之可代麻黃湯

攻裏之劑 七百附方四

大承氣湯景用芒硝枳實大黃

厚朴三合厚朴八兩枳實
五枚救陰瀉熱功偏擅急下陽

明有數條大黃治大寒世硝
治有形血瘀厚朴治大滿積

毒傳入陽明胃府痞滿燥實
以此下之○胃為水谷之海
上為萬物之母四旁有病皆

醫方集解 卷五

治中風不語

肺屬金主音金空則有音
筋脈清痰散逆破積梗梗利肺氣甘草
和元氣童便降火潤肺或加木通以利
脾脈連舌本手少陰心別膈繫舌本三
經虛則痰涎凝寒脈道舌不轉運而不
能言或三脈亡血舌無血榮養而音舌
如故喉痛者勞嗽失音之類而舌木則
能轉通也本方除甘草加枳殼名枳桔湯
言語也

治胸中痞塞噎氣吐酸或欬

散痞寒消痞而除欬活人云傷寒懸死
汗反下之遂成痞只實理中丸最良也
知是痞先用枳桔湯九妙
綠桔梗只壳行氣下服也

玄參升麻湯

者少陰
相火也

玄參 升麻 甘草 等分 此足陽

明少陰藥也升麻能入陽明升陽而解

毒玄參能入少陰壯水以制火甘草甘

平能散能和故上可以利咽而內可以

散斑也 本方除玄參加犀角射干黃

芩人參名陽毒升麻湯治陽毒發斑頭

項背痛狂躁罵詈咽腫吐血溫服取汗

消斑毒飲菴治傷寒邪傳裏亡是表

虛陽毒發斑血熱不散悉于皮虛則為

斑輕如疹子重若銀紋

及有方三羊火之在六十餘易世有依公

傳他經矣陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須看氣氣淺深用藥大承氣最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

小承氣湯

景朴實黃厚朴二兩

姜炒枳實三枚大柴胡又次之大承氣最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

強熱在上焦則滿在中焦則下焦直陰也益以羌活名三

化湯中風閉貫可消詳氣通

二便加羌活治風中風休天者可偶用然涉虛者多不可

投輕

調胃承氣湯

景景硝黃草

各一兩甘草緩微和將胃保

用甘草甘以緩之微和胃氣勿令大泄下不用朴

實傷上焦不用厚朴根實恐

也中焦燥實服之好

木香檳榔凡張青陳皮枳殼柏

連稜逆隨大黃黑丑兼香附

芒硝水丸量服之一切實積

能推蕩泄利食瘧用咸宜香

易頑軟舌攻

黑者熱甚而胃爛也多死此或因陽症誤投熱藥或因下早表熱乘虛入胃或因下遲熱留胃中皆死○班症有六日傷寒死班或下早或下甚也自溫毒死班冬時感寒至春始死也日熱病死班冬時感寒至夏乃死也日時氣死班天疫時行之氣也治不相同口內傷死班先因傷暑飲食涼物逼其暑火浮遊千表也宜加香需扁豆口陰症死班元氣大虛寒伏于下逼其無根失守之火也宜大建中湯誤投寒劑則殆矣

青黛黃連犀角石羔知母

玄參厚子生地黃柴胡人參

甘草加姜棗煎入苦酒也一匙和服

大便甚者去人參加大黃

此足陽明藥也發瘧雖因胃熱亦諸經

之火有以助之青黛黃連以清肝火枳

子以清心肺之火玄參知母生地以清

腎火犀角石羔以清胃火此皆大寒而

能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表

柴胡清少使以姜棗以和營衛其用人

參甘草者以和胃也胃虛散熱毒乘虛

入裏而發于肌肉也加苦酒者其酸收

之義乎

玉屑無憂散

治纏喉風痺咽喉腫痛

醫方集解小益玉屑無憂散

三五 下一

三稜莪朮並醋煮各五錢大黃酒浸一兩香附牽牛各二兩芒硝水丸量虛實服○木香香附青陳枳殼利氣寬腸而牽牛極稠下氣尤速氣行則無痞滿後重之患矣連相犀溫清熱移莪行氣破血硝黃去血中伏熱並為推墜峻品溫熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通

秘寶導滯 丸東首大黃芩連麩

木茯苓 勤澤泄蒸餅糊丸服

溫熱積滯 力能攘

苦寒力 咳故加

利濕神 曲佐之以消食又恐

苦寒力 咳故加

白木補 土固中

氣滯木香 導滯丸

溫脾 金

婦硝大黃 寒熱並行治久痢

臍腹絞 結痛非常

各一兩大黃五兩當歸子

各三兩煎服日三本方除當

赤白脾胃冷實不消心硝黃

以瀉其積姜附以祛其寒參

草當歸以保其氣血按古人

馬頭次舌攻

咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人

酒癥小兒奶癖及骨屑哽塞

玄參 黃連 荆芥 貫眾 山荳根

茯苓 甘草 砂仁 滑石 五錢 硼砂

寒水石 錢 為末每一錢先挑入口

徐以清水咽下能除三尸去八邪僻瘟

瘡瘍 糊砂玄參最能生津凡泄

此足陽明少陰藥也玄參黃連寒水石

清火貫眾山荳根解毒滑石茯苓利水

砂仁 硼砂 煎堅 膏便 荆芥 散結 甘草

和中故能統治諸病 朱丹溪曰咽痛必

必用玄參○又有陰氣大虛七火游行

無制客于咽喉遂成咽痛脈必浮大重

取必清宜濃煎入參湯細細

咽之如用清降之藥立斃

香連丸 治下痢赤白膿血相雜裏急後

重 濕熱之積于血分則赤于氣分

裏急者氣滯不通也按裏急後重有因

火熱者有因氣滯者有因精滯者有因

氣虛者有因血虛

者當審症論治

黃連 二十兩吳茱萸十 木香 四兩八錢

醋糊丸米飲下一方等分蜜丸一方加

甘草八兩黃連用蜜水拌蒸晒丸次人

方中多有硝黃柏連典姜棗
桂附寒熱並用者亦有參朮
硝黃補世並用者亦有六黃
麻黃汗下兼行者今人罕識
其指姑錄此方以見
治療之妙不一端也

蜜煎導法通大便

仲景用蜜煎
如飴捻作挺

子按皂角未乘熱
納谷道中或搽鹽或將猪胆

汁灌人中或用猪胆汁醋和以

猪胆汁導法仲景 **不欲苦**

寒傷胃府陽明無熱勿輕攻

胃府無熱而便秘者為汗多
津液不足不宜用承氣攻
此仲景心法後人罕知
故錄二方于攻下之末

浦吐之劑

二首附方六〇
治
瘵之四法經皆在上者涌
之其高者因而越之故古
人治病用吐法者最多朱
丹溪曰吐中就其發散之
義張子和曰諸汗法古方
多有之惟以吐發汗者世
罕知之今人醫療惟用汗
下和而吐法絕置不用可
見時師之缺畧特補涌吐
一門方藥雜簡而法不可
廢也若丹浮用四物四君
引吐又治小便不通亦用
吐法是又在用
者之園神矣

瓜蒂散

仲景
甜瓜蒂炒
黃赤豆共

為末熱水或雞
水調量虛實服或入藜蘆

木香為丸 此手足陽明藥也痢為飲

食不節寒暑所傷濕熱蒸入而成黃連

苦燥濕寒勝熱直折心脾之火故以為

君用吳茱萸同炒者取其能利大腸壅

氣痢乃脾病且以殺大寒之性也裏急

由于氣滯木香辛行氣溫脾能通利

三焦泄肺以平肝使不和剋脾土氣

行而滯亦去也一寒一熱一陰一陽有

相濟之妙經所謂熱因寒用寒因熱用

也痢疾初起忌用為黃連厚肉瀉腸也

寒則不能消谷何由反化為膿也燥鬱
為白屈肺金也瀉痢皆兼干濕之熱甚
于腸胃之內致氣液不得宣通使煩渴
不止也下痢赤白俗言寒熱相兼其說
尤誤寒熱胃氣豈能俱甚于腸胃而同
為痢乎各隨五藏之部而見其色其本
則皆出于熱但分淺深而已或曰何故
服辛熱之藥亦有愈者曰為能開鬱
結使氣液流通流濕開燥氣和而已莫
若用苦辛寒之藥微加辛熱佐之如錢
氏香連丸
之類是也

本方加石蓮肉治噤口痢本方倍大黃

治挾痢積滯本方加吳茱萸肉豆豉烏

梅湯丸本方加訶子龍骨名黃連丸

並治痢疾斷下 石蓮清心火開胃口大
黃瀉胃熱蕩積滯吳茱

易真火舌吐

石蓮清心火開胃口大黃瀉胃熱蕩積滯吳茱

四

下

金湊 張子和一去赤豆加藜芦

金桂汁 俱名三至散 **此吐是**

熱與風痰 瓜蒂吐實熱虛者

參茸 散一味勾能服瓜蒂者

或加竹沢 **若吐虛煩** 厄鼓湯

仲身是危子十四枚 欒劇痰烏

附尖方透 瓜蒂厄子苦參黎

尚存燒鹽方一切積滯功能

秦 燒鹽熱湯調服以指探吐

稀涎 散用和皂角白礬班

分心白礬散苦涌泄能軟頭

痰皂角辛鹹通竅專制風木

用之或益藜芦微吐問風中痰

升人眩仆當先服此通其閉

令微吐稀涎 通閉散用細辛

皂角為末 吹鼻得嚏保生還

者用此吹鼻有嚏者可

治無嚏者為肺氣已絕

和解之劑 凡首附方五

利壅氣肉菴河子烏 梅龍骨皆滿大腸

白頭翁湯 治傷寒熱利下重欲飲水者

此傷寒轉利之症也 仲景見于厥陰篇

欲飲水與渴不同 渴但津乾欲水是陰

分為大所灼欲得涼以解之也 不可過

典利典痢不同 利者瀉也 陽熱之利典

陰寒不同 陰利宜理中 四逆溫藏陽利

黃連則止原病式曰瀉白 為寒赤黃紅黑皆為熱也

白頭翁 黃連 黃柏 黃芩 黃蘗

此足陽明少陰厥陰藥也 白頭翁苦寒

能人陽明血分而涼血止瀉 秦皮苦寒

生齒能涼肝益腎而固下焦 漬水色青

黃連 涼心清肝 黃柏瀉火補水並能

燥濕止利而厚腸 取其寒能勝熱苦能

堅骨瀉能斷下也 成無已曰腎欲堅急

焦虛故以純苦之劑 堅之徐忠可曰此

虛熱利下重乃熱傷氣氣下陷而重也

陷下則傷陰七傷則血熱雖後重而不

用調氣之藥病不在氣耳 周揚俊曰邪

傳厥陰少陽其表也 藏府相連干法禁

下故阻謀去其熱上除而利自止矣

腎熱湯 治腎熱耳流膿血不聞人聲

腎熱舌為心竅以舌非孔竅故心亦奇

小柴胡湯景仲和解供半夏人參

甘草從更用黃芩加姜枣少

陽百病此為宗柴胡八兩半

甘草黃芩生薑各三兩大棗

十二枚治一切往來寒熱胸

滿脇痛心煩喜嘔口苦耳聾

咳滑利半表半裏之症屬

少陽經者但見一症即見不

必悉具○胆府清淨無出無

人經徑半表半裏法宜和解

柴胡升陽達表黃芩退熱和

陰半夏祛痰散逆參草輔正

補中使邪不得復傳入裏也

四逆散仲裡用柴胡芍藥枳實

甘草須柴胡芍藥枳實此

是陽邪成厥逆陽邪入裏四

飲陰泄熱平劑扶芍藥欽陰

甘草和逆柴胡散邪用平劑以和解之

黃連湯仲內用干姜半夏人參

甘草藏更入桂枝兼大寒

熱平調嘔痛忘黃連炒干姜

各三兩八參二兩半夏半升

大棗十二枚治胸中有熱而

欲嘔胃中有寒而作痛或丹

田有熱胸中有寒者仲景亦

用此湯○按此湯與小柴胡

湯同意以桂枝易柴胡以黃

連易黃芩以干姜易生薑餘

藥同皆和解之意但小柴胡

或經藏積熱或大怒氣逆或渴飲痞隔

或熱聚不散流出膿血或血熱搏結成

核塞耳皆令暴赤宜

通耳調氣安腎之劑

磁石根紅洋土所煆水煮

冬芍藥四甘草一生地黄汁葱白

一大棗十五分三服

此足少陰藥也磁石體重辛鹹色黑補

腎祛熱通耳明目故以為君牡蛎鹹寒

軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘

寒補肺清金肺為腎母又声屬金王太

息而白芍酸寒平肝和血逆則耳声不

聰又曰耳得皆能生水而制火退熱而

血而能聰

飲陰白水甘草大棗補脾之品益土氣

正以制腎邪也土能防水經曰頭痛耳

生數者皆固本之藥使精氣充足邪熱

自退耳竅自通加葱白者以引腎氣上

通于耳也

辛夷散嚴治鼻生瘖肉氣息不通不聞香

臭鼻為肺竅氣清則鼻通氣熱則鼻塞

地得熱而辛夷白芷升麻藜

本防風川芎細辛木通甘

生芝茵也

生芝茵也

生芝茵也

生芝茵也

湯屬少陽藥此湯

屬太陽陽明藥也

黃芩湯 仲景用甘芍并二陽合利

芎藭湯 治太陽少陽合病下

利黃芩二兩芍藥日

草各二兩芎藭十二枚○陽邪

人裏故以黃芩散其熱甘芍

大和此方遂為治痢祖後

其太陰

人加味或更名 利泄瀉也痢

本治傷寒下利機要用此治

痢更名黃芩芍藥湯濕古治

痢加木香檳榔大黃黃再加

連當歸肉桂名芍藥湯再加

生姜與半夏 各黃芩加生姜

前症兼嘔此能平兼用芍藥

與甘草 炙等分各沖藥散

止痛能和營 虞天民曰白芍

能行氣腹痛者營氣不和逆

于肉裏以白芍行營氣以甘

草和逆氣

故治之也

逍遙散 局用當歸芍藥木草

加姜薄荷 柴胡當歸酒炒白芍

各一錢甘草炙五分炒赤芍

分加煨姜上荷煎散鬱除蒸

功最奇 肝虛則血病痛芍養

禾草和中補土柴胡升陽散

熱法苓利濕寧心生姜煨散

祛痰薄荷消風理血醫曹白

方中柴胡薄荷二味最妙益

身百欠否和

草 等分為末每服三錢茶調下外用

為未加啞少許吹鼻中能消化之

此手太陰足陽明藥也經曰天氣通于

肺若腸胃無痰火積熱則平常上升皆

清氣也由燥火內焚風寒外束血氣壅

滯故鼻生瘰肉而竅室不通也辛夷升

麻白芷辛溫輕浮能引胃中清氣上行

頭腦防風藁本辛溫雄壯亦能上入巔

頂勝濕祛風細辛散熱破結通精氣而

利九竅川芎補肝潤燥散諸鬱而助清

陽此皆利竅升清散熱除濕之藥木通

通中茶清寒苦以下行泄火甘草和中

又以緩其辛散也 李時珍曰肺開竅于

行腦為元神之府鼻為命門之竅人之

中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅

為之不利

蒼耳散 無治鼻淵 鼻流濁涕不止曰鼻淵

也經曰腦滲為涕又曰胆移熱于腦則

辛類鼻淵頰間山根辛類酸痛也原病

式日知以人燥金熱極則反化為水肝

熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則

出延肺熱甚則出涕腎熱甚則出

唾皆火熱甚極錯燥以致之也

白芷 兩薄荷 辛夷 錢 蒼耳子 錢

醫方集解 火登耳 蒼耳散

田 下

大喜風搖寒即催萎溫則發
生木鬱則火鬱火鬱則土鬱
土鬱則金鬱金鬱則水鬱五
行相因自然之理也余以一
方治木鬱而諸鬱周經八味
皆解道遙散是也言經八味
丹初看道遙散治肝傷血少

為未食前葱茶湯調下一錢
此手太陰足陽明藥也凡頭面之疾皆
由清陽不升濁陰逆上所致白芷主手
足陽明土行頭面通竅表汗除濕散風
辛夷通九竅散風熱能助胃中清陽土
行頭腦蒼耳疎風散濕上通腦頂外達
皮膚薄荷泚肺疎肝清利頭目葱白升
陽通氣茶清苦寒下行使清升濁降風
熱散而腦液自固矣

霍亂正氣方 大腹蘇甘桔陳

芩朮朴俱夏麴白芷加姜朮

感傷外感風癘並能驅區霍香

皮紫蘇茯苓白芷各三兩陳
皮白朮土炒厚朴姜汁炒半
夏曲桔梗各二兩甘草一兩
每服五錢加姜枣煎○藿香
理氣和中辟惡止嘔蘇芷芩
梗散寒利膈以散表邪腹朴
消滿陳夏降痰以疎裏滯芩
朮甘草益脾去濕以輔正氣
正氣通暢則邪逆自除

六和湯 局霍利杏砂星半夏木
瓜赤茯苓朮參扁豆同甘草

醫方集解卷五之二

除痰之劑 痰之源不一有因熱而生

因氣而生者有因風而生者有因寒
而生者有因濕而生者有因暑而生
者有因鬱而生者有多食而成者有
傷冷物而成者有嗜酒而成者有脾
虛而成者俗云百病皆由痰起然內
經有飲字而無痰字至仲景始立五
飲之名而痰飲居其一處安常曰善
治痰者不治痰而治氣氣順則一身
津液亦隨氣而順矣準繩云痰之生
由于脾氣不足不能收精于肺而痰
以成者也治痰宜先補脾脾復健運
之常而痰自化矣○腎虛不能制水
水泛為痰是無火之痰痰清而稀陰
虛火動火結為痰是有火之痰痰稠
而濁痰症初起發熱頭痛類外感表
症久則朝咳夜重又類陰火內傷走

醫方集解卷五之二 除痰湯 四十五 下

湯司哥

姜炙煎之六氣平 荳蔻香厚朴杏仁砂仁

半夏木瓜赤茯苓曰木人參扁豆甘草加姜炙煎能禦風寒暑濕燥火六氣故曰六和
○薑朴杏砂理氣化食參木陳夏輔正匡脾豆瓜祛暑赤茯苓行水大抵以理氣強脾為主脾胃既強則**或益香薷**或諸邪不能于矣

蘇葉傷寒傷暑用須明 加蘇葉傷暑加香薷

清脾飲 嚴用 **用青朴柴芩夏甘**

苓白木楷更加草果姜煎服

熱多傷虛此方佳 青皮厚朴

藹芩半夏姜制甘草炙茯苓白木土炒草果煨加姜煎服不止加酒炒常山一錢烏梅二箇大渴加麥冬知母○瘧疾一名脾寒蓋因脾胃受傷者居多此方乃相減小柴胡湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯升夏平胃祛痰芩芩清熱利濕木草補脾調中草果散太陰積寒除消截瘧

痛瀉要方 劉草 **陳皮芍防風白**

木煎丸 白木土炒三兩白芍酒炒四兩陳皮

炒兩半防風一兩或補瀉煎或丸久瀉加升麻 **補瀉**

木理肝 陳皮理氣補脾若

作食傷醫便 錯食腹瀉得瀉

注肢節疼痛又類風症但肌色如故脈滑不勻為異

一陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸 腫虛不能健運則生痰飲稠者為痰稀者為飲水濕其本也得火則結為痰隨氣升降在肺則咳在胃則嘔在頭則眩在心則悸在皆則冷在脇則脹其變不可勝窮也

半夏 二錢 **陳皮** 去 **茯苓** 一錢 **甘草** 五分 **加**

姜煎 其陳久則無燥散之患故名二陳

治痰通用 **二陳風痰加南星白附皂角**

竹瀝痰加半夏姜汁火痰加石膏青

黛瀉痰加蒼朮白木燥痰加瓜蒌杏仁

食痰加山查麥芽神曲老痰加枳實海

石芒硝氣痰加香附枳殼脇痰在皮裏

膜外加白芥子四肢痰加竹瀝

此足太陰陽明藥也半夏辛溫體滑性

燥行水利痰為君痰因氣滯氣順則痰

降故以橘紅利氣痰由濕生濕去則痰

消故以茯苓瀉濕為臣中不和則痰涎

聚又以甘草和中補土為佐也 或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母瓜蒌吳鶴旱曰渴而喜飲水者易之渴而不能飲水者臣渴宜半夏也此濕為本熱為標濕極而兼勝已之化非真象也按貝母寒潤

各百百百五五五

便減今瀉而痛不減
故青之士敗木賊也
表裏之劑 八首附方五

大柴胡湯

仲景用大黃枳實芍藥

法內攻併外攘柴胡八兩大黃二兩枳實

四枚半夏半升黃芩芍藥各三兩生姜五兩大棗十二枚治陽邪入裏表症未除裏症又急者○柴胡解表大黃枳實攻裏黃芩清熱白芍斂陰半夏和胃止嘔姜棗調和營衛按本方次方治少陽陽明後方治太陽陽明為不同

柴胡加芒硝湯義亦爾

加芒硝六兩仲景仍有桂枝加大黃

湯仲景桂枝湯內加大黃一兩芍藥三兩治太陽陽明下轉屬大陰大實痛者

防風通聖

散河大黃硝荆芥麻

黃梔芍翹甘倍苈葶滑石

薄荷芩朮力偏饒表裏交攻

陽執盛外科瘍毒總能消

酒蒸芒硝防風荆芥麻黃黑梔白芍炒連翹川芎當歸薄荷白木各五錢枳實黃芩各三兩加姜葱煎○荆防麻黃下荷發汗而散熱搜風梔子滑

主肺家燥痰半夏溫燥主脾家溫痰

俱化痰而寒溫燥潤各異脫或悞施貽害匪淺用者宜審之○有血不足陰火上逆肺受火傷肅清之令不得下行由是津液渾濁生痰不生血者名燥痰當用潤劑如地黃門冬拘杞之類滋陰降火而痰自清若投二陳立見危殆有痰飲流人四肢肩背痠痛手足罷軟誤以為風則非其治宜導痰湯加木香姜黃八凡痰飲變生諸症當以治飲為先飲消則諸症自愈如頭風肩脊骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又知眼赤羞明與之涼藥不瘳昇以痰劑獲愈凡此之類不一而足有人坐處吐痰滿地不堪稠結只是沫多此氣虛不能攝涎不可用利藥宜六君子加益智仁一不以攝
本方加入參白朮名六君子湯治氣虛有痰本方去茯苓甘草名陳皮半

夏湯再加桔梗名桔梗半夏湯本方去

陳皮甘草名半夏茯苓湯再加生姜名

小半夏加茯苓湯金匱並治水氣嘔惡本

方加黃芩名茯苓半夏湯金匱治熱痰本

方加黃連梔子生姜名二陳加梔連生

姜湯治膈上熱痰令人嘔吐去生姜治

嘈雜本方加砂仁枳殼名砂枳二陳湯

行痰和氣本方加胆星枳實名導痰湯

治頑痰膠固非二陳所能除者加胆星

夏加枳實以成再加葛蒲治驚悸健忘

右硝黃利便而降火行水
桔石羔清肺世胃川芎歸身
養血補肝連翹散氣聚血凝
甘木能補中燥濕故能汗不
傷表下不傷裏也

五積散局治五般積寒積食積
氣積血積

積麻黃蒼芷芍歸芎枳桔桂

姜甘茨朴陳皮生夏加姜葱

當歸川芎白芍茯苓枳殼各
八分蒼朮白芷厚朴陳皮各
六分只壳七分麻黃生夏各
四分肉桂干姜甘草各三分
重表者用桂枝心桂麻解表
散寒甘芍和裏止痛蒼朴平
胃陳夏行痰芎歸養血茯苓

除桂枳

陳餘畧炒三味生用餘藥微
炒各熟料五積散

熟料尤增溫散功溫中解表

祛寒濕散痞調經用各充陶
菴曰凡陰症傷寒脈浮沉無
力均當服之亦可加附子

三黃石羔湯 芩柏連梔子麻黃

淡豉全姜炙細茶煎服寒
因

執表裏三焦熱盛宜石羔兩
半黃芩

黃柏黃連各七錢梔子三十
箇麻黃淡豉各二合每服一
兩姜三片棗二枚茶一撮煎
熱服治表裏三焦大塊諸狂
易真次舌表裏

怔忡不寐導痰湯加木香香附名順氣

道痰湯治痰結胸滿喘咳上氣本方加

枳實瓜蒌腹子山查神曲治食積痰嗽

發熱本方加蒼朮枳殼片子姜黃名加

味二陳湯治痰眩眼腫併酒家手臂

重痛麻木本方除甘草加干姜姜汁糊

丸名溫中化痰丸續治胸膈寒痰不快

本方除茯苓甘草加黃連麩糊丸姜湯

下名三聖丸治痰火嘈雜心懸如飢單

用陳皮生薑名橘皮湯金治乾嘔歲及

手足厥者單用半夏姜汁名生薑半夏

湯金治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤懣無茶者本方半夏醋煮除

陳皮姜汁丸名消暑丸見暑者
丸

潤下丸即二
腎散治膈中痰飲

廣陳皮去白八兩
鹽水浸洗甘草二兩
蜜炙蒸餅糊

丸或將陳皮鹽水煮爛曬乾同甘草為

末名二賢散姜湯下濕勝加星夏火盛

加芩連

此足太陰陽明藥也陳皮燥濕而利氣

醫方集解痰飲二潤下丸桂枝白朮湯四八下二

斑駁身目俱黃心黃琴泄上焦黃連泄中作黃相泄下焦梔子通泄三焦之火以清裏麻黃淡鼓散寒發汗而解表石羔休重能泄脾胃之火氣輕亦能解肌也

葛根黃芩黃連湯 甘草四股

治二陽 治太陽桂枝症醫誤下利脈促喘而汗出者葛根八兩炙草黃芩各二兩黃連二兩

解表清裏兼和胃喘汗自

自利保平康 成無已曰邪在為陽盛知表未解也病有汗出而喘者為邪氣外甚今喘而汗出為裏熱氣逆與此湯

日提用葛根者專主陽明之表

參蘇飲 內用陳皮枳殼前胡

半夏宜乾葛木香甘桔茯苓

傷外感此方推 人參紫蘇前胡半夏陳皮只

干葛茯苓各七錢半陳皮只壳麩炒桔梗木香甘草各二錢每服五錢加姜棗煎治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰眩風泄外感重者去棗加葱白○蘇葛前胡解表參苓甘草補中陳皮木香行氣破滯半夏枳殼利膈祛痰

前若去青柴入飲號葛蘇治

不差 去人參前胡加川芎柴胡各芍蘇飲不服參者

濕去則痰消氣順則痰行食塩潤下而軟堅潤下則痰降軟堅則痰消痰在膈中故用甘草引之入胃且草經蜜炙能健脾胃脾胃健則痰自行矣虛弱人

慎用 朱丹溪曰胃氣亦賴痰

桂苓甘木湯 治心下有痰飲胸脇支滿

目眩 稀者為飲稠者為痰痰飲積于厥中之陽水情不能上布故目眩

茯苓 兩桂枝 白朮 兩甘草 兩 此足

太陰藥也喻嘉言曰茯苓治痰飲伐腎

邪滲水濕桂枝通陽氣開經絡和營衛

白朮燥痰水除脹滿治風眩甘草得茯苓則不資滿而反泄滿故本草曰甘草

能下氣除煩滿此症為痰飲阻抑其陽

故用陽藥以升陽而化氣也 金匱曰短者當從小便去之桂苓甘木湯主之腎氣凡亦主之按醫氣丸亦通陽行水之藥也

清氣化痰丸 治熱痰 熱痰者痰因火盛

火即無形之痰痰隨火而升降火引痰而橫行變生諸症不可純極火借氣于五臟痰借液于五味氣有餘則為火液有餘則為痰故治痰者必降其火治火

宜香蘇飲局僅陳皮草感傷

內外亦堪施香附炒些蘇各二錢陳皮去白

二錢甘草七分加姜葱煎

茵陳凡欲用大黃硝鱉甲常山

巴豆邀杏仁梔鼓蜜丸服汗

吐下兼三法超時氣毒蕩及

瘧痢一丸兩服量病調茵陳

鱉甲炙梔子各二兩大黃五兩常山杏仁炒各三兩巴豆

一兩去心皮炒鼓五合蜜丸梧子大每服一丸或吐或汗

或利不應再服一丸不應以

仁可以解肌大黃甘硝承氣湯也可以蕩熱去實合茵陳

可以利濕退黃加巴豆大熱以祛藏府積寒加鱉甲滋陰

以退血分寒熱此方備汗吐下三法雖云劫劑真是佳方

大羌活湯即九味已獨知連白

木暨即九味羌活湯加防已知母獨活黃連內生地

川芎知母各一兩餘文九培藥各三錢每服五錢音辛培

陰表裏和傷寒而感差堪慰

兩感傷寒一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病

三日少陽與厥陰俱病陰陽表裏同時俱病欲汗則有專

湯頭歌括卷五

者必順其氣也

生夏製胆星兩橘紅枳實製杏仁去

尖栝蒌仁油黃芩酒炒茯苓兩姜汁糊

丸淡姜湯下 此手足太陰之藥治痰

火之通劑也氣能發火火能從痰生夏

南星以燥濕氣黃芩栝蒌以平熱氣陳

皮以順裏氣杏仁以降逆氣枳實以破

積氣茯苓以行水氣水濕火熱皆生痰

之本也蓋氣之亢而為火猶民之反而

為賊賊平則豐為良民而復其業矣火

退則還為正氣而安其位矣故化痰必

以清氣為先也

順氣消食化痰丸瑞氣治酒食生痰胸膈

膨悶五更眩嗽暹飲則脾濕多食辛熱于胸膈故備悶五更咳嗽由胃有

食積至此時火氣流入肺中故嗽

生夏製胆星斤青皮陳皮去白蒸葶子

生蘇子者炒山查炒麥芽炒神曲炒葛

根 杏仁去皮炒香附製各姜汁和蒸餅

糊丸一方半夏兩星各一斤皂角日曬為度去皂角姜切開搗乾用

醫方集解卷五 順氣消食化痰丸 五十一 下二

症欲下則有表症經曰其兩感于寒者必死仲景無治法
燥古為製此方間有生者
卷獨蒼防細辛以散寒發表
岑連防已知母芍地以清裏
培陰白木甘辛以固中相表裏

消補之劑 七首附方六

平胃散局是蒼朮朴陳皮甘草

四般藥 蒼朮木泔浸二錢厚朴
姜汁炒陳皮去白汁

除濕散 滿馬瘴風
草炙各一錢

調胃諸方從此擴 蒼朮厚朴
散滿平胃陳皮利氣行痰甘
草和中補土泄中有補也

或合二陳 湯治痰 或五苓 湯治
名平陳 名平陳

大湯消黃麥均堪著 加麥
治泄 曲消食加大若合小柴湯名

柴平 湯前加姜朮能除瘧又

不換金正氣散即是此方加

夏藿 半夏 藿香

保和丸 神曲與山查蒼夏陳

煎音子加麩糊為丸麥芽湯

下亦可方中用麥芽 山查去
神曲茯苓半夏各一兩陳皮
煎子微炒連翹各五錢○山
查消肉食麥芽消谷食神曲
消食解酒煎子下氣制曲茯苓

消食解酒煎子下氣制曲茯苓

此手足太陰藥也痰由濕生夏南星

所以燥濕痰由氣升蘇子葶子杏仁所

以降氣痰由氣滯青皮陳皮香附所以

道滯痰因于酒食葛根神曲所以解酒

山查麥芽所以化食濕去食消則痰不

生氣順則咳嗽止痰泄既去滿悶自除

也 久嗽有痰者燥脾化痰無痰者清金
降火益外感久則鬱熱內傷久則火
炎俱要開鬱潤燥其七情氣逆者順氣
為先停水宿食者分導為要氣血虛者
補之飲之不
宜妄用瀉劑

治痰濕氣逆而咳嗽 肺受火傷
宜安用瀉劑

為咳脾有停濕則生痰而作嗽病有五
藏六府之殊而其要皆歸于肺以肺為
五藏華蓋下通膀胱外達皮毛為氣之
主而发声也大法新嗽脈浮為表邪宜
發散脈實為內熱宜清利脈濡散為肺
虛宜溫補久嗽會經解利以致肺胃俱
虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥○
素問曰肺之能令人欬何也曰五藏六
府皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之合
也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五
藏各以其時受病非其時各傳以與之
有自外得者肺主皮毛風寒暑濕之邪
自皮毛入內傳藏府而為嗽也有自內
發者七情飢飽內有所傷則邪氣上逆
肺為氣出入之道故五藏之邪上蒸于
肺而為嗽也然風寒暑濕有不為嗽者
蓋所感者重不留于皮毛徑傷藏府而
成傷寒濕熱諸病七情亦有不為嗽者
蓋病尚淺只在水藏未傳入肺所以傷
寒以有嗽為輕而七情飢飽之致必久

消食解酒煎子下氣制曲茯苓

湯頭哥

今按濕熱連翹故結陳夏健脾
化痰此內傷而氣未病者故
但以和平之品消而

化之不必攻補也 大安丸

內加白朮兩消兼補力堪誇

健脾 參朮與陳皮枳實山查

麥蘖芽隨曲糊作丸米飲下

消補兼胃弱宜 炒各二兩陳

皮麥芽炒各一兩山查兩半

枳實麩炒三兩○陳皮枳實

理氣化積山查消肉食曲麥

消谷食人參白朮益氣強脾

枳朮丸 潔亦消兼補 炒枳實

麩炒奇葉莖飯上升奇 荷葉

米飯煨乾為丸引胃氣

及少陽甲胆之氣上升

參朮白朮 散 扁豆陳山藥甘蓮

砂薏仁 數藥利 桔梗上浮 載

行兼保肺 恐燥藥 末湯調服益

脾申人參茯苓白朮上炒陳

扁豆皮山藥甘草炙各一斤

每服三錢水湯 或米飲調下

枳實消痞 丸 東 四君全麥芽夏

曲朴姜連蒸餅糊丸消積滯

清熱破結補虛 枳實麩炒

而後 發也

杏仁去皮尖 貝母 茯苓 桔梗 甘草

五味子 橘紅五分 加姜煎食遠服

若春時傷風咳嗽鼻流清涕宜清解加

防風薄荷紫蘇炒苓夏多火熱宜清降

加桑皮麥冬黃芩知母石羔秋多濕熱

宜清熱利濕加蒼朮桑皮防風梔苓冬

多風寒宜解表行痰加麻黃桂枝干姜

生薑半夏防風火嗽加青黛栝藿海石

食積痰加香附山查枳實濕痰除貝母

加半夏南星燥痰加栝藿知母天冬牛

前嗽屬胃火宜清胃加石羔黃連午後

嗽屬陰虛宜滋陰降火加芎藭芍地知

柏三冬竹瀝姜汁傳送黃昏嗽為火浮

于肺不可用涼藥宜五倍五味訶子欬

而降之勞嗽見血多是肺受熱邪宜加

歸芍阿膠天冬知母款冬紫苑之類久

嗽肺虛加參芪如肺熱去人參用沙參

可也 此手太陰之藥治嗽之通劑也

杏仁解肌散寒降氣潤燥貝母清火散

三十一 下二

炒各五錢人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴姜汁炒茯苓各三錢甘草炙于姜各二錢黃連枳實治痞君藥麥夏姜朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使氣足脾運痞乃化也

驚風飲子氏治瘧母久瘧不愈中有結癖

甘陳芪朮芍芎偶草菓檳榔

厚朴增烏梅姜棗同煎取漿

醋炙黃芪白朮土炒甘草陳皮川芎白芍酒炒草果曲煨檳榔厚朴等分姜三片棗二枚烏梅少許煎○驚風屬陰入肝退熱散結為君甘陳芪朮助陽補氣川芎白芍養血和陰草菓溫胃檳榔破積厚

葛花解醒湯 查砂仁三苓參朮

蔻青陳神曲干姜兼澤泄濕

中利濕酒傷珍葛花砂仁豆蔻各一錢

香一分決令人參白朮炒青皮陳皮各四分神曲炒干葛及吐世痞宰○砂蔻神曲皆能解酒青厚朮香干姜行氣溫中葛花引濕熱從肌肉出益以參朮固其中氣也

理氣之劑 十一首附方八

補中益氣湯 芪朮陳升柴參

易百飲活 補

結潤肺化痰五味飲肺而寧嗽茯苓除濕而理脾橘紅行氣甘草和中桔梗清肺利膈載藥上浮而又能開壅發表也

金沸草散活治肺經傷風頭目昏痛咳嗽

多痰風盛則氣壅氣壅則痰升故頭目昏痛而咳嗽○直指方云咳嗽感風者鼻塞聲重傷冷者涕清怯寒挾熱為焦煩受濕為纏滯瘀血則膈間腥悶

停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也

旋覆花即余前胡細辛一錢荆芥錢赤

茯苓六分半夏五分甘草一分加姜棗煎

局方加麻黃赤芍無赤茯苓玉肌微

柴胡黃芩頭痛加川芎

此手大陰藥也風熱上壅荆芥辛輕發汗而散風痰涎內結前胡旋覆消痰而

降氣半夏燥痰而散逆甘草發散而緩

中茯苓行水細辛溫經蓋痰必挾火而

兼濕故下氣利濕而症自平茯苓用赤

者人血分而泄丙丁也小腸為丙火心

云一婦人牙痛治瘰不効口煩皆腫以金洲草散大劑煎湯量飲而愈

百花膏治喘嗽不已或痰中有血虛人

益以參朮固其中氣也

易百飲活 補

草當歸身

黃芪蜜炙錢半人參日草炙各二錢

白朮土炒陳皮留白當歸各五分升麻柴胡各三分加姜末煎表虛者升麻用蜜水炒用○東垣曰升柴味薄性陽能引脾胃清氣行于陽道以資春氣之和又引參芪甘草上行充實脾胃使氣外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之虛勞內傷功獨擅亦者此也

治陽虛外感因

虛人感冒不任發散者此方可以代之

或加辛散藥水香蒼朮易歸

木調中益氣易神申除當歸

木香蒼朮各調中益氣湯前

亦名調中益氣湯俱李東垣方

烏藥順氣湯

用枳殼正姜橘紅枳

培及麻黃蠶桑麥草姜煎服

中氣厥逆此方詳厥逆痰壅

身溫為中風身冷為中氣中風多痰涎中氣無痰涎以此

為辨詳學士云中氣之症不可作中風治喻嘉言曰中風

症多挾中氣烏藥橘紅各二錢川芎白芷枳殼枳實麻黃

各一錢蠶桑去絲嘴炒炮薑炙草各五分加姜末煎○麻

頭可正發汗散寒以順去氣烏藥陳枳行氣供痰以順衷氣加蠶桑清化消風甘草協和諸藥古云氣順則風散耳

尤宜 百合 欬花 等分蜜丸龍

眼大食後臨臥姜湯下或嚼化加紫苑

百部烏梅各加味百花膏治同前服亦

可 此手太陰藥也欬冬泄熱下氣清

血除痰百合潤肺寧心補中益氣要為

理嗽要藥

三仙丸治中脘氣滯痰涎不利破氣滯

氣痰走注攻刺亦曰氣痰

南星麴 半夏麴兩香附兩 糊去姜

湯不 此足陽明手足太陰藥也星夏

以燥脾胃之痰香附以快三焦之氣使

氣行則痰行也五机微義曰此方與局

皆行痰而積用氣藥則跟氏氣順則痰

白下之意然枳殼紫蘇肺氣藥也厚朴

脾胃氣藥也香附用氣藥也隨藏氣而

用不可不分又云嚴氏以人之七情入

結氣滯生痰氣道通利痰自降下又有

原有積痰其氣因痰而結者必先逐

去痰結則氣自行豈可尚主一說○有

一咳痰即出首理濕勝而痰消也宜半

夏南星皂角之屬燥其脾胃苦利氣之劑

所當忌也宜枳殼紫蘇杏仁之屬

痰瀉也宜枳殼紫蘇杏仁之屬

利其肺若燥脾之劑所當忌也

半夏天麻白朮湯東垣治脾胃內傷眼黑頭

眩頭痛如裂身重如山惡心煩悶四肢

湯頭歌括

邪卒中當
先治標也

越鞠丸治一切鬱氣血痰火

濕食因鬱也
芎蒼香附兼梳

迴氣暢舒痞悶伸
吳鶴早

開氣鬱者木燥溫鬱撫背調
血鬱施于清火鬱神曲消食

鬱各等分曲胡為丸又濕鬱
加茯苓白芷火鬱加青黛痰

鬱加星夏括真海石血鬱加
桃仁紅花氣鬱加木香枳榔

食鬱加麥芽山查
痰鬱加吳茱萸

蒼芎附甘苓橘牛梳砂仁
木

川芎香附甘草茯苓橘紅牛

兼治痰人看六入中之重
首為君餘藥隨加減用之

蘇子降氣湯局
橘半情前胡桂

朴草姜茯苓虛上盛痰嗽喘

亦有加參貴合机
蘇子橘紅

前胡厚朴姜汁炒各一錢肉
桂炙甘草各五分加姜煎一

方無杜加沉香○蘇子前胡
橘紅半夏降氣行痰氣行則

痰行也效真兼能發表加富
掃和血甘草緩中下虛土成

故又用肉桂引火情元如
氣虛亦有加人參五味者

四七湯理七情氣
七氣寒熱

悲也亦名
牛夏厚朴茯苓蘇

七氣湯

醫方集解卷五

厥冷謂之足太陰痰厥頭痛
痰厥首濕

上也痰逆則土胃故令頭痛目眩眼前
見黑花也○東垣曰太陰頭痛必有痰

也少陰頭痛足寒而氣逆也太陰少陰
二經虽不上頭然痰與氣逆壅于膈中

頭土氣不得
暢而為痛也

生薑製麥芽神曲炒
白朮一錢蒼朮浸

人參黃芪陳皮茯苓澤泄

天麻五分乾姜三分黃柏二分
每服五錢

此足太陰藥也痰厥頭痛非生夏不能

除牛夏燥痰頭旋眼黑虛風內作非天

麻不能定天麻有風不黃芪人參甘溫

可以泄火亦可以補中二朮甘苦而濕

可以除痰亦可以益氣建脾故益氣苓

泄泄熱導水陳皮調氣升陽神曲消食

蕩胃中滯氣麥芽化結助戊巳運行胃

為已上
戊土脾于姜辛熱以滌中寒黃柏苦寒

酒洗以療火在前發躁也
李東垣曰

受之風寒傷土邪從外入令人頭痛身

重惡寒比傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅

不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩

頭痛者過在手太陽少陰乃濕熱頭痛

也如氣土不下頭痛巔痛者下虛土實

也過在足太陽少陰其則入腎風濕頭

痛也外頭半寒痛者先取手少陽陽明

次取足少陽陽明此偏頭痛也有厥逆

者取足少陽陽明此偏頭痛也有厥逆

者取足少陽陽明此偏頭痛也有厥逆

半夏麥汁炒五錢厚朴姜汁炒三錢茯苓四錢紫蘇二錢

有局方名四七湯參桂夏草

妙更殊人參官桂半夏各一錢五分加姜煎

四磨湯嚴氏亦治七情使人參烏

藥及枳殼人參烏藥枳殼

以烏藥枳殼降而順之加參者恐傷其氣也

前服調逆氣實者枳殼易人

參去參加入木香枳實五磨

飲子白酒甚烈卒死名氣厥

代類施藥湯用人參半夏甘

姜炙末臨重以鎮逆減軟痞

痞鞭音噫音氣力能禁

夏半斤生薑五兩棗十二枚○旋覆之類以軟堅類石之重以鎮逆姜夏之辛以散虛痞參甘大棗之日以補胃弱

頭痛者所犯大寒內至骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛有真頭痛者其即腦逆痛手足寒至節死不治頭痛再以風藥治之者高巖之士惟風可到味之薄者陰中之陽乃自地升天者也太陽頭痛惡風寒脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根

曰芷石羔為主太陰頭痛必自痰體重或腹痛為痰癖其脈沉緩者木半夏南星為主少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之厥陰頭痛或吐涎沫厥冷脈浮緩與柴胡湯主之血虛頭痛

當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少川芎蔓荊子細辛青空高麗溫頭痛藥也白木半夏天麻湯痰厥頭痛藥也

以苦吐之不可執力而清其痰以苦吐之瓜蒂散瀉茶之類是也

痰疔皆速治痰疔中腕兩臂疼痛飲伏

停滯中腕脾主四肢脾滯而氣不流

下故土行攻其脾沈細者是也

半夏麩兩茯苓乳一兩風化石二錢

成但以細粉撒竹盤中少時盛水置

當風處即乾如已確取亦可

姜汁糊丸姜湯下此是太陰陽明藥

也半夏燥濕茯苓冷水相殺行氣化積

擊痰去壅生薑製半夏之毒而除痰使

痰行氣通醫痛目止矣雖多此方甚效○痰飲流人四肢令人眉皆酸痛兩手

醫方類聚

卷五

下二

湯頭新法

紺珠正氣天香散香附于姜蘇

葉沉烏藥舒鬱兼除痛氣行

血活自調勻香附八錢烏藥各一錢于姜五分每服五六錢

○烏陳入氣分而理氣香蘇入血分而利氣于姜兼入氣血用辛溫以順氣平肝氣行則血行絡自調而痛自止矣

橘皮竹茹湯治嘔呃參有半夏

枇杷麥冬茯苓再加姜棗煎勞

由金匱此加歸竹茹各二升人參二兩甘草五兩生姜半

治嘔逆即呃逆也後人加牛夏麥冬赤茯苓芩藜○呃逆由胃火上冲肝悲之火助之

肺金之氣不得下降也竹茹麥冬枇杷梨清肺和胃而降氣肺金清則肝木自平矣二陳降痰逆赤茯苓心火生姜嘔家聖藥久病虛弱故以參甘大棗扶其胃氣

香柿蒂湯嚴內人參姜呃逆因

寒中氣戕丁香柿蒂各二錢人參一錢生薑五

片濟生香薷僅二味亦名丁香神帶

湯加姜煎○古方單用柿蒂取其苦溫降氣濟生加丁香主姜取其開入散痰也或加竹加參者扶其胃氣也

木香黃芩各五分輕者皆涉茯苓丸重者控涎丹外有血虛不能榮筋而致臂痛宜蠲痺四物湯各半助和服

控涎丹一名妙應丸三因方治人忽患胸背手足腰

項筋骨牽引鈎痛走身不定或手足冷痺氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下誤

認癰瘰非也

甘遂去心大戟去皮白芥子等分為末糊

丸臨臥姜湯下五七丸至十丸痰猛加

丸散脚氣加栝榔木瓜松枝卷柏驚痰

加硃砂全蝎驚氣成塊如穿山甲蟹甲

延胡索蓬朮熟痰加盆硝寒痰加胡椒

丁香姜桂

此手足太陽太陰藥也十味湯加減行水例藥亦厲劑

李時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不

到入心則迷成癲癩入肺則塞為喘

咳皆冷入肝則膈痛乾嘔寒熱往來入

經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引鈎痛

入皮肉則癰癧腫陳無擇三因方並

以控涎丹主之殊有奇功此乃治痰之

本痰之本水也濕也得氣與火則結為

湯頭歌

橘用皆良加竹茹橘紅各丁

定喘湯白菓與麻黃款冬半夏

白皮桑蘇杏黃芩兼甘草肺

寒膈熱喘喘膏白菓三十枚

夏姜制款冬各三錢桑皮蜜

炙蘇子各二錢杏仁黃芩各

錢半甘草一錢加姜煎○麻

黃杏仁桑皮甘草散表寒而

清肺氣款冬溫潤白菓收喘

定喘而清全黃芩清執蘇子

降氣半夏煇痰共

成散寒疎壅之功

理血之劑一首附方六

四物湯局地芤與歸芎血家百

病此方通當歸酒洗生地各

芎錢半○當歸辛苦甘溫入

心脾生血為君生地甘寒入

心腎滋血為臣芍藥酸寒入

肝脾斂陰為佐撫芎辛溫通

行血中之八珍湯合入四君

氣為使子參木氣血獲療功獨崇四君

補氣四再加黃芪與肉桂加

肉桂引火歸元十全大補湯

補方雄補方十全除却芪地

草除生地黃加粟米百煎之

名胃風湯張元素治風客腸胃

湯張元素治風客腸胃

醫官不負用

痰大戟能泄藏府水濕甘遂能行經隧

水濕直達水氣所結之白芥子能散皮

裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也

三子養親湯治老人氣貫痰盛喘滿懶

食痰不自動因火而動氣有餘便是火

紫蘇子沉小白芥子 萊菔子 各微

炒研煎服或等分或有病所主為君

此手足太陰藥也白芥子除痰紫蘇子

降氣萊菔子消食然皆行氣豁痰之藥

氣行則火降而痰消矣吳鶴皋曰治痰

耳終不若二陳能健脾胃去濕有治本之

功也李士材曰治病先攻其甚昔氣實

而喘則氣反為本痰反為標矣是在

智者神而明之若氣虛者非所宜矣

滌痰湯嚴氏治中風痰迷心竅舌強不能言

心開竅為舌心別攝繫舌根脾脈連舌

木散舌下腎脈挾舌本三脈虛則痰涎

乘虛閉其脈道故舌不能轉運言語也

若三脈亡血不能榮養而滑者又當加

補血藥心風痰塞其絡舌強不能言

其症為重若藥熱上攻舌腫不能轉者

為弊

半夏製胆星五分橘紅 枳實 茯苓

錢人參 菖蒲錢竹茹七分甘草五分 加

姜煎 此手少陰足太陰藥也心脾不

易百大舌血

醫官不負用

人參養營湯 卽十全湯見前除

却川芎五味聯陳皮遠志加

姜朮脾肺氣血補方先卽十全大

補湯除川芎加五味陳皮遠志○薛立齋曰氣血兩虛變

生諸症不問脈症俱服此湯諸症悉退

歸脾湯生用木參芪歸草茯神

遠志隨酸朮木香龍眼肉煎

加姜朮益心脾怔忡健忘俱

却腸風崩漏總能醫人參白

扶神聖仁龍眼肉各二錢黃芪蜜炙錢半當歸酒洗遠志

各一錢木香甘草炙各五分血不歸脾則妄行參芪草

朮之甘溫以補脾志茯苓仁

龍眼之日溫酸苦以補心當

養心湯用草芪參二朮芎歸柏

子尋夏曲遠志兼桂味再加

酸水總寧心黃芪蜜炙茯苓

酒洗半夏曲各一兩甘草炙

一錢人參柏子仁去油肉桂

五味子遠志朮仁炒各二錢

半每服五錢○參芪補心氣

芎歸養心血二朮柏仁遠志

瀉心熱而寧心神五味朮仁

收心氣之散越半夏去擾心

之痰涎甘草補土以培心子

足風邪乘之而痰與火塞其經絡故舌

本強而難語也人參茯苓甘草補心益

脾而泄火陳皮南星半夏利氣燥濕而

祛痰黃蒲開竅通心枳實破痰利膈竹

茹清燥開鬱使痰消火降則經通而舌

柔矣喻嘉言曰此症最忌此藥最緩有

調下牛黃丸審其屬寒用此湯調下二

可丸庶足開痰通竅附二丹丸丹參

地天冬兩半麥冬茯苓神日草一兩丹砂

人參菖蒲遠志五錢蜜丸安神養血清

痰息風服之得睡○有風中心脾首有

痰塞心裏者有風寒壅滯者致舌木木

強又有氣虛血虛腎虛及老人暴不

能言者宜十全大補湯加菖蒲遠志

礞石滾痰丸王隱治實執老痰怪症百病

風木太過尅制脾土氣不運化積滯生

痰壅塞上中二焦回薄腸胃曲折之處

謂之老痰變生百病不可測非

尋常藥餌所能療也此丸主之

青礞石一兩沉香五錢大黃酒蒸黃芩八兩

右將礞石打碎用焰硝一兩同入瓦罐

鹽泥固濟晒乾火煨石色如金爲度研

末和諸藥水丸量入虛實服之姜湯送

下服後仰臥今藥在胸膈之間除逐上

醫方集解卷之五

湯頭歌括

赤桂引藥以達心經

當歸四逆湯 桂枝芍藥細辛甘草

草木通着再加木末治陰厥

脈細陽虛由血弱 當歸桂枝

各三兩甘草炙木通各二兩

先入心補血當歸之苦以

助心血心苦緩急食酸以收

之急食甘以緩之甘草大棗

木通以內有人寒加姜葉有

緩陰血久寒者加吳茱萸二升生

半斤酒煎各四逆加吳茱萸

生薑湯 發表帶通脈絡桂

枝

用附子及乾姜助陽過劑陰

反灼 姜附四逆在于回陽當

故里內有久寒止加生薑吳

茱不用乾姜附子恐反灼陰

桃仁承氣湯 五般奇甘草硝

黃芩桂枝桃仁五十枚去皮

硝甘草桂枝各二兩○硝黃

甘草調胃承氣也熱甚傳血

故加桃仁潤燥緩肝表症在

未除故加桂枝調營解表毒

結膀胱小腹脹如狂畜最

相宜 小腹脹而不利自利知

易煩飲活血

醫方集解卷三

膈藥必須在膈將治頭痛之藥亦必令

之上注于頭即吐痰水士以蒙石未

摻之痰即隨下故為利痰聖藥蒙石煨

遇無金星者不堪用陳久者佳新煨者

火毒未除 此手足太陰陽明藥也礞石

剋悍之性能破陳積伏歷之痰大黃蕩

熱去實以開下行之路黃芩泄肺涼心

以平上僭之火沉香能升降諸氣上至

天而不至泉以導諸藥為使也然乃峻

劑非徒實者不可輕投 王隱君曰痰症

雖有五飲諸飲之異而莫知其為病之

源或頭風作眩目運耳鳴或口眼煽動

眉稜耳輪痛痒或四肢游風腫硬似疼

非痰或為齒頰痛牙齒浮而痛痒或

暖氣吞酸心下嘈雜或痛或噦或咽嗝

不利咯之不出噦之不下其痰似墨有

如破絮桃膠現肉之狀或心下如停水

跌心氣若痛或夢脈奇怪之狀或足腕

酸軟腰背骨節卒痛或口肢筋骨疼痛

難以名狀並無常處以致手臂肝痛狀

若風濕或吞上一條如線之寒起者或

渾身習習如臥芒刺者或眼粘濕痒口

糜舌爛喉痺等症或遠項結核狀若癩

瘡或胸腹問如有二氣交組噎息煩悶

有如烟火上冲頭面烘熱或為失志癲

醫方集解卷三

下二

故如

犀角地黄 湯 芍藥丹 生地兩半

犀角 丹皮犀角各二錢半每服五錢 血升胃熱火

邪汗斑黃陽毒皆堪治 犀角大寒

解胃熱而清心火 芍藥酸寒和陰血而散肝火 丹皮苦寒瀉血中之伏火 生地大寒涼血而滋水 以其平諸經之僭

逆也 或益柴芩總伐肝血者加柴胡 黃芩

咳血方 丹中訶子收 栝蔓海石

山梔投 養蠶丸口噤化咳

嗽痰血服之 瘰 訶子煨取肉 栝蔓仁去油 海石去砂 卮子炒 黑青黛水 飛等分 蜜九嗽 甚加杏仁 青黛清肝 泄入 梔子清肺 涼心 栝蔓潤燥 滑痰 海石軟堅 止嗽 訶子欬肺 定喘 不用血藥者 入退而血自止也

東垣秦艽白朮丸 尾桃仁枳

實攢地榆澤泄皂角子糊丸

血痔使 韋 大陽燥結故便 尾酒洗 桃仁研地榆各一兩 枳實 炒澤瀉 皂角子 燒存性 各五錢 糊丸 尾尾桃仁 以活血 秦艽 皂角子 以潤燥 枳實 他胃熱 澤泄 地榆 以破血 止血 白朮 以燥濕 益氣

或隨藏氣作 六畜之聲

胆星 全蝎 去足 蚰蛭 二錢 牛黃 白

附子 疆蚕 焙防風 天麻 錢 麝香 五

菖朮 肉桂 水銀 五分 細研入藥末為

丸 荆芥 湯下 此手少陰足太陰藥

也 牛黃 清心 解熱 開竅 利痰 天麻 防風

南星 全蝎 辛散之味 疆蚕 蚰蛭 清化之

品 白附 頭面之藥 去頭面 皆能搜肝風

而散痰 積麝香 通竅 水銀 劫痰 引以姜

朮者 亦以逐風而行痰也 按牛黃丸之

方類多互有

下二

于世 本方加玄明粉一兩 硃砂為衣

治同本方 減大黃 黃芩 各六兩 加橘紅

生夏各二兩 甘草一兩 竹瀝 姜汁 為丸

名竹瀝 達痰 丸治同力 稍和緩 單用礞

石二味 製同前法 名奪命丹 傷薄荷自

然汁 蜜調溫服 治小兒急慢驚風 痰涎壅

中受驚 或因大驚 而得 蓋小兒神氣尚

弱 驚則神不守舍 舍空則痰涎滯 滯之

致痰迷心竅 或感風寒 暑濕 或飲食不

節 逆于藏氣 入而生涎 閉塞 諸經 厥面

乃成 或數日一發 或一日數發 發則顛

仆 倒地 昏不知人 癱瘓 抽掣 口目 喎邪

或隨藏氣作 六畜之聲

胆星 全蝎 去足 蚰蛭 二錢 牛黃 白

附子 疆蚕 焙防風 天麻 錢 麝香 五

菖朮 肉桂 水銀 五分 細研入藥末為

丸 荆芥 湯下 此手少陰足太陰藥

也 牛黃 清心 解熱 開竅 利痰 天麻 防風

南星 全蝎 辛散之味 疆蚕 蚰蛭 清化之

品 白附 頭面之藥 去頭面 皆能搜肝風

而散痰 積麝香 通竅 水銀 劫痰 引以姜

朮者 亦以逐風而行痰也 按牛黃丸之

方類多互有

下二

仍有蒼朮防風劑潤血疏風

燥濕安本方除白朮當歸地榆加蒼朮防風大黃

黃柏世御各秦芫蒼朮湯除根實皂角地榆加防風升麻

紫胡陳皮炙甘草黃柏大黃紅花名秦芫防風湯治並同

槐花散用泊湯風側柏葉黑荆

枳殼充為末等分米飲下

寬腸涼血逐風功槐花柏葉枳殼

小薊飲子藕節蒲黃炒木通滑石

淡竹葉等分血淋熱結服之

涼小薊藕節散瘀血生地涼血補黃止血木通泄心火

達小腸槐子散蠶火出勝財

竹葉清肺涼心滑石泄熱利

甘草和中調氣

四生丸濟用三般葉側柏艾荷

生地協側柏葉艾葉等分生

搗如泥煎而執妄行吐衄兩

側柏生地補陰涼血竹葉散

瘀血留好血艾葉生者性溫

理氣止血

復元活血湯柴胡花粉當歸

異同然大要在於搜風化痰寧心通竅

多用火不用椎金珠犀珀皆中藏首宜

之如中府中血脉者反能引風入骨此

方藥味頗簡故姑錄之以概其餘也喻

嘉言曰牛黃九與蘇合丸異治熱阻閉

竅宜牛黃丸寒阻閉宜蘇合丸若手

撒口開遺尿等死症急用參附峻補

間有生者若牛黃蘇合入甘即斃

辰砂散治風痰諸癩癲狂心疾

一驚寤不可復治此手少陰藥也辰

砂鎮心泄心火乳香入心散瘀血杏仁

補肝胆而寧心本方加人參一兩蜜

丸彈子大各靈芝膏每服一丸薄荷

湯下治同

白金丸治癩狂失心不多喜笑尚矧畏

忿怒人不能制症屬有餘此病多因驚

憂痰血塞于心竅所致難經云諸陽為

狂諸陰為癩○喜屬心怒屬

肝二經皆火有餘之地也

白礬三錢金兩薄荷糊升

此手少陰藥也白礬酸咸能軟頑痰鬱

山甲俱桃仁紅花大黃草槁

傷瘀血酒煎祛柴胡五錢花

甲炮甘草紅花各二錢桃仁五十枚去皮尖研大黃一兩每服一兩酒煎○血積必干而脇屬肝胆經故以柴胡引用為君以當歸活血脈以甘草緩其急以大黃桃仁紅花山甲花粉破血潤血

祛風之劑十二首附方四

小續命湯千金桂附芎麻黃參芍

杏防風黃芩防已兼甘草六

經風中北方通通治六經中

語言難通及剛柔二症亦治厥陰風泄防風一錢二分桂枝麻黃八分芍酒炒杏仁炒研川芎酒洗黃芩酒炒防已甘草炙各八分附子四分姜炙煎○麻黃杏仁麻黃湯也治寒桂枝芍藥湯也治風參甘補氣芍藥養血防風治風淫防已治濕淫附子治寒淫黃芩治熱淫故為治風套劑劉宗厚曰此方無分經絡不辨寒熱虛實量多亦笑以為尋按此方今人罕用然古今風方多從此方損益為治

大秦朮湯要獨防芎芷辛芩

二地黃石菖蒲芍藥甘木風

邪散見可通嘗治中風風邪

金華辛能去惡血痰血去則心竅開而

疾已矣

青州白丸子 治風痰涌盛嘔吐涎沫口

眼喎邪手足癱瘓小兒驚風皆風痰壅

及痰盛泄瀉肥人滑泄多屬之痰脈滑

白附子生用南星生用半夏水浸生衣川

烏去皮臍生為末絹袋盛之水攪出

粉未盡再搗再攪以盡為度貯磁盆日

晒夜露養五日夏三秋七冬十日晒乾

糯米糊丸如菉豆大每服二十丸姜湯

下癱瘓酒下驚風薄荷湯下三五丸

此足厥陰大陰寒也痰之生也山風由

寒由濕故用半夏南星之辛溫以燥溫

散寒川烏白附之辛熱以溫經逐風浸

而暴之者殺其毒也喻嘉言曰此治風

痰迷厥者非所宜施

星香散 治中風痰盛體肥不渴者

胆星八錢木香二錢為末服或加全蝎

此足厥陰藥也南星燥痰之品製以牛

胆以殺其毒且胆有益肝胆之功肝胆

經者秦芫石羔各二兩羌活
 獨活防風川芎白芷黃芩酒
 炒生地酒洗熟地當歸酒洗
 白芍酒炒茯苓甘草炙白朮
 土炒各一兩細辛五錢每服
 一兩。劉宗厚曰秦芫湯愈
 風傷虽有補血之藥而行經
 散風之劑居其大半將何以
 養血而益筋骨也。按治風
 有三法解表攻裏行中道也
 初中必扶外感故用風藥解
 表散寒而用血藥氣藥調裏
 活血降
 火也

三生飲方用烏附星三皆生用

木香聰生南星一兩生川烏
 附子去皮各五錢不
 香二加參對半扶元氣每服

加參一兩卒中痰迷服此靈烏附

行經逐寒南星辛烈除痰散
 風重用入參以扶元氣少佐
 木香以行逆氣醫貫曰此行
 經散痰之劑斬開摛王之將
 宜急用之凡中風口開為心
 絕手撒為脾絕眼合為肝絕
 遺尿為腎絕鼻鼾為肺絕吐
 沫直視髮豎頭搖面赤如粧
 汗綴如珠者皆不治**星香散**
 若服此劑間有生者**亦治卒中**
 中藏中府者重中經者稍輕
 胆星八錢散煨木香二錢行
 氣為未服易簡加
 姜煎服名星香飲

地黃飲子河山茱斛麥味菖蒲

湯頭次舌風

屬風佐以木香取其行氣以利痰也
 木香疏肝氣肥而不渴宜燥可知加全蝎
 和脾氣者以散肝風也
 中風体虛有痰者宜四
 君子或六君子湯調下
 此散

常山飲局瘧久不已者用此截之

瘧初起
 不宜禁
 禁則利氣未尺發生
 他症發久則可截之
常山燒酒炒**草菓**煨**檳榔**知母貝
 母錢烏梅箇姜三片棗一枚半酒半

水煎露一宿日未出時面東空心溫服
 渣用酒浸別待瘧將發時先服一方有

夏麥香草無檳榔一方加穿山甲甘草

此足少陽太陰藥也古云無痰不作
 瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下
 氣破積能消食行痰陰陽不和則瘧作
 陽勝則熱知母滋陰能治陽明獨勝之
 陰勝則寒知母滋陰能治陽明獨勝之
火草菓辛熱能治太陰獨勝之寒貝母
清火散結瀉熱除痰烏梅酸欬瀉收生
津退熱欬陰故合為截瘧之劑也
 德曰
 常究本草知母草菓常山甘草烏梅檳
 榔穿山甲皆云治瘧集以成方者為知
 母性寒人足陽明治獨勝之熱使退就
 太陰草菓溫燥治足太陰獨勝之寒使

傷寒論卷五常山飲

二十二

遠志英莖蓉桂附巴戟天少

入薄荷姜棗服熟地山茱肉

味石菖蒲遠志茯苓肉蓯蓉

宮桂附子炮巴戟天等分每

服五錢加薄荷瘖厥風能治

荷少許煎之匹肢不收為瘖厥火痛水

中水生木熟地以滋根本之

以返真元之火山茱石斛平

胃溫肝志苓菖蒲補心通腎

麥味保肺以滋水涼水既

交風人自息矣風非外感之風良由將息失

宜心火暴甚腎水虛衰不能

制之故卒倒無知也治宜和

截瘧通經絡更宜治風醫賈

日痰涎上涌首水不歸元也

面赤煩渴者火不歸元也惟

桂附能火歸元火歸水中則

水能生木木不生風而風自

息矣

獨活湯湯中羌獨防芎歸辛桂

參夏菖茯神遠志白微草麴

瘖音瘖昏憤力能匡瘖活獨

當歸川芎細辛桂心人參牛

夏菖蒲茯神遠志白微各五

退就陽明二經和則無陰陽交錯之變

是為君藥常山主寒熱瘧吐胸中痰結

是為臣藥甘草和諸藥烏梅去痰槓榔

除痰癖破滿氣是為佐藥穿山甲穴山

而居遇水而入是出入陰陽貫穿經絡

干營分以破暑結之和為使藥也惟脾

胃有瘧瘵者用之收功李士材曰常山

生用多用則吐與甘草同用亦必吐若

酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其

或吐也世人泥于老人久病忌服之說

使良藥見疑而沉痾唯起抑何愚耶李

時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散

表邪及提出陽分之後用之得宜得甘

草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則

入肝得小麥竹葉則入心得秋流麻黃

則入肺得龍骨附子則入腎得草菓槓

槓則入脾蓋無痰不作瘧一

物之巧亦在往逐痰水而已

截瘧七寶飲簡治實瘧久發不止寸口脉

弦滑浮大者脉弦為肝風滑為痰浮為

細者不問鬼瘧食瘧並皆治之瘧有經

禁用寒瘧風瘧溫瘧暑瘧濕瘧

痰瘧食瘧瘴瘧鬼瘧之別

常山酒炒草菓煨枳榔 青皮 厚朴

陳皮 甘草 等分用酒水各一鐘煎

熟絲綿益之露一宿于富發之早面東

溫服瘧正發時不可服藥經曰工不能

助藥助熱此足少陽太陰藥也常山

能吐老痰積飲槓榔能下食積痰結草

菓能消太陰膏梁之痰陳皮利氣厚朴

湯頭歌括風

蒲開心駭茯神遠志交心神
白微退執止厥風靜火息血
活神年慙
廢自巳矣

順風勻氣散 木烏沉白芷天麻

蘇葉參木瓜甘草青皮合喘

僻偏枯口舌瘡 枯不遂皆田

宗氣不能周于一身白水二
錢烏葉錢半天麻人參各五
分紫蘇白芷木瓜青皮甘草
炙沉香磨各三分加姜煎○
天麻蘇芷以疎風氣烏葉青
沉以行滯氣參米炙草以補
正氣氣勻則風順矣木
瓜伸筋能于士中泄木

黃柏蒼朮天南星桂枝行防已

行及威靈仙上行桃仁紅花龍

胆草下上行羌芷上行川芎上行神

麴行停痛風濕熱與痰血上中

下通用之聽黃柏酒炒蒼朮

各二兩防已桃仁去皮尖胆
草白芷川芎神曲灶各一兩
桂枝威靈仙紅花羌活各二
錢半曲糊九各上中下通用
痛風方丹溪○黃柏清熱蒼
木燥濕龍胆瀉火防已利水
四者治濕與桃仁紅花活
血去瘀川芎血中氣藥南星
散風燥痰四者治血與痰羌
活去百節風白芷祛頭面風

醫方集解卷五

平胃青皮伐肝肝為皆為濕散行痰之

品加甘草入胃佐常山以吐瘧痰也玉

渺義曰此方乃溫脾燥烈之藥蓋作脾
寒治也用之亦効者值病人陰陽相併
脾氣鬱結濁液凝痰閉塞中脘因得燥
熱亦以暫開所以氣通而疾止若中氣
虛弱內有鬱火之人復用燥熱愈切愈
虛若將誰執楊仁齋曰瘧有血有水有
水飲所以作寒熱惟瘧血所以增寒熱
常山能逐水故也若是血症當加五靈
脂桃仁為佐入生姜蜜同煎荷無行血
之品何以收十全之功耶保命集云瘧
夜發者乃邪氣深遠而人血分為陰經
有邪宜加桃仁與桂麻湯中發散血中
之風寒按瘧書發
屬氣夜發屬血

醫方集解卷下之三

消導之劑消者散其積也導者行其

行氣不流行則停滯而為積或作泄
痢或成癥痞以致飲食減少五臟無
所資稟血氣口以虛衰致因危困者
多矣故必消而導之輕則用和解之
常劑重必假峻下之湯丸蓋濁陰不
降清陽不升客邪不除則真元不復
如戡定禍亂然後可以致太平也峻
劑見攻裏門茲集緩攻平治消補兼
導之劑

平胃散崩治脾有停濕痰飲痞隔宿食不

消滿悶嘔瀉風瘴霧不服水土土濕大

乘所不勝而侮之脾虛不能健運故有
痰食留滯中焦致生痞滿諸症胃異則

桂枝威靈去臂脛風四者所以治風加神曲者消中州陳積之氣也症不兼者加減為治

獨活寄生湯干 芩防辛芎歸地

芍桂苓均杜仲牛膝人參草

冷風頑痺屈能伸獨活桑寄生秦芎防

風細辛川芎酒洗當歸酒洗白芍酒炒熟地桂心茯苓杜仲姜汁炒斷絲牛夕人參甘草等分每服四錢若去

寄生加芪續黃芪續斷 湯名三痺

古方珍名三痺湯治風寒濕

用參芪四物一派補藥加羌

活通腎氣用治三氣衰虛成痺者宜準諸此

消風散內羌防荆芎朴參苓陳

草并殭蚕蟬蛇藿香入為末

茶調或酒行頭痛目昏項背

急頑麻癢服之清人參防風

羌活殭蚕炒蟬蛇藿香各二兩荆芥厚朴姜汁炒陳皮去

白甘草炙各五錢每服三錢

茶調下瘡薄酒下羌防芎

荆治頭目項背之風殭蚕蟬

川芎茶調散方荆防辛芷薄荷

易員次舌風

醫方集解 卷五

嘔濕盛則瀉風庫水土之病亦由胃虛故感之也

蒼朮甘浸 厚朴姜炒 陳皮去白 甘草炙一錢

加姜朮煎傷食加神曲麥芽或枳實濕

勝加五苓瘰多加半夏脾倦不思食加

參芪痞悶加枳殼木香大便秘加大黃

芒硝小便赤澀加芩瀉傷寒頭痛加葱

豉取微汗

此足太陰陽明藥也蒼朮辛烈燥濕而

強脾厚朴苦溫除濕而散滿苦降能瀉

能散實瀉辛溫 陳皮辛溫利氣而行痰甘草中州

主藥能補能和蜜炙為使瀉中有補務

令濕土底于和平也

本方加藿香半夏名藿香平胃散又名

不換金正氣散治胃寒腹痛嘔吐及

瘴瘧濕瘧再加人參茯苓草菓生姜烏

梅名人參養胃湯治外感風寒內傷生

冷夾食停痰嵐瘴濕疫或飲食傷脾發

為瘧瘧老瘧也 本方合二陳加藿香名除

濕湯治傷濕腹痛身重足軟大便滑瀉

本方加藁本枳殼桔梗名和解散治

醫方集解 卷五 平胃散

五三

甘草羌目昏鼻塞風攻上正

偏頭痛悉平康薄荷入錢川芎荆芥各四

錢防風錢半細辛一錢羌活

白芷甘草炙各三錢為末每

服三錢茶調下羌活治太

陽頭痛白芷治陽明頭痛川

芎治少陽厥陰頭痛細辛治

少陰頭痛防風為風藥卒徒

下荷荆芥散風熱而清頭目

以風熱攻上宜于升散巔頂

之上惟風藥可到也加甘

草以緩中加茶調以清降

方

內若加殭蠶菊菊花茶調散

用亦臧菊花清頭目

青空膏蠶垂去風痰

之人頂鼻為末茶調如膏服

正偏頭痛一時蜀川芎五錢

半柴胡七錢黃芩酒炒黃連

酒炒羌活防風名一兩每服

三錢風痰濕熱土攻頭腦

則痛頭兩旁屬少陽偏頭痛

屬少陽相火等連苦寒以羌

防芎柴升之則能去濕熱于

高巔之

人參荆芥散熟地防風柴枳

芎痛比酸束驚矜桂木甘血

風勞作風虛治血脈空疎乃

盜汗久漸成勞人參荆芥熟

地柴胡枳壳束仁炒驚甲童

易頁欠舌風

四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐利本

方一兩加桑白皮一兩名對金飲子治

脾胃受濕腹脹身重飲食不進肢痠膚

腫本方除蒼朮加木香草蔻子姜茯苓

名厚朴温中湯治脾胃虛寒心腹脹滿

及秋冬客寒犯胃時作疼痛散以辛熱

以甘淡氣温本方加麥芽炒麴名加

味平胃散治宿食不消吞酸噯臭

枳木丸古消痞除痰健脾進食消痞除痰

荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶加陳皮

氣滯加木香傷食加麥芽神麴

此足太陰陽明藥也李東垣曰白术甘

温補脾胃之元氣其味苦除胃中濕熱

利腰膈間血過于枳實剋化之藥二倍

枳實苦寒寫胃中痞悶化胃中所傷是

先補其虛而後化其傷則不峻矣荷葉

中穴色青形仰象震在人為少陽胆生

化之根蒂也飲食入胃營氣上行即少

陽甲胆之氣也胃氣元氣穀氣甲胆上

皆方集并角卷五根本丸

下三

便炙羚羊角白朮各五分防風甘草炙當歸川芎桂心各三分加姜煎○劑防柴於以疎風平本地黃蟹甲以退熱滋陰芍藥桂枳以止痛調經參朮炙草杏仁以欬汁補虛除煩進食

祛寒之劑 十二首防方一

理中湯 仲景曰理中 景曰理中 景曰理中 景曰理中

甘草人參朮黑姜 炒二兩

人參干姜炮甘草各一兩治太陰厥逆自利不溫脈沉無力○人參補氣益脾為君白朮健脾燥濕為臣甘草和中補上為佐干姜嘔利腹痛溫胃散寒為使

陰寒盛或加附子總扶陽附

子理中湯

盂武湯 仲景壯腎中陽茯苓朮

附生薑 兩炒茯苓白朮二

姜各三兩少陰腹痛有水氣悸眩

潤腸保安康 仲景有水氣故心

陽故肉潤筋惕音純動貌○朮木補土利水以療悸眩姜附回陽益火以逐虛寒芍藥欬陰和營以止腹痛真武比方水神腎中火足水乃歸元此方補腎之陽壯火而利水故名

易有有疾

升之氣一也食藥感此氣化胃氣何由

不上升乎燒飯與白朮協力滋養谷氣

補令胃厚不至再傷其利廣矣 王安石

飲食俱為內傷然勞倦傷誠不足也飲食傷又當于不足之中分其有餘夫飢餓不飲食者胃氣空虛此為不足而傷也飲食自倍腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不足故補益准其有餘故消導亦有物滯氣傷消補兼行者亦有物滯氣不傷但須消導者亦有不須消導但須補益者枳朮丸之類雖曰消導間有補益之意焉若所滯之物非根本丸之力所能去者備急丸煎黃芩瓜蒂散等深古東垣亦未嘗委之而勿用也

本方作湯名枳朮湯 治水飲心下堅

大如盤邊如旋盤也 治心下上焦陽分本方

加半夏一兩名半夏枳朮丸治脾濕停

痰及傷冷食淋者加瀉瀉一兩本方如

橘皮一兩名橘皮枳朮丸治飲食不消

氣滯痞悶本方加陳皮半夏名橘半枳

朮丸健脾消痞化痰本方加木香一兩

名木香枳朮丸治氣滯痞滿 木香平肝

下疝 再加砂仁名香砂枳朮丸破滯氣

消飲食強脾胃如加于姜伍錢名木香

于姜枳朮丸兼治氣寒再加人參陳皮

醫方集名消痞五枳朮丸

七二

下三

四逆湯仲景中姜附草三陰厥逆

太陽沉附子一枚生用于姜一兩甘草炙二兩冷

脹專治三陰厥逆大或益姜陽初症脈沉亦用之

葱麥芍桔通陽復脈力能任

音仁面赤格陽于上也加易心

白通湯復痛加芍藥和陰咽痛加桔梗利咽利止脈不出

加人參補氣復脈嘔吐加生姜以散逆氣

白通加人尿猪胆汁湯仲景尿音鳥去声

小便也俗于姜附子兼葱白讀平声非

附子一枚炮于姜一兩葱白四兩此白通湯也葱白以通

陽氣姜附以散陰寒加凡因人尿五合猪胆汁合煎因

寒用妙義深陰盛格陽厥無

脈陰寒內甚格陽于外故厥脈逆無脈純與執藥則寒氣格拒不得入故于執劑中加

尿汁寒藥以為引用使得入心三兩同陽也

吳茱萸湯仲景人參朮重用生姜

溫胃好陽明寒嘔太陽熱少嘔忌用

陰下利厥陰頭痛皆能保吳

煎一升泡人參三兩生薑六兩朮十二枚吳茱萸參朮補

士散寒吳茱萸辛熱能入厥陰治肝氣上逆而致嘔通腹痛

易真次否寒

名木香人參干姜枳木丸開胃進食本

方加神曲麥芽各一兩名麩藥枳木丸

治內傷飲食或泄瀉本方加酒炒黃連

黃芩大黃炒神曲橘紅各一兩名三黃

枳木丸治傷肉食濕麵辛熱味厚之物

填塞悶亂不快本方加五苓五錢十姜

七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔逆

保和丸治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐

酸積滯惡食食滯下痢傷于食飲脾不傷于食飲脾不

故有瀉痢食滯等症傷而未甚不欲攻以房利惟以平和之品消而化之故曰

保和丸李東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以道其溫傷食者有形之物也輕則消化或損其谷重則方可吐

下脈云大腸有宿食寒涼之發熱有時如瘧症則消直重則下之當求之傷食門

山查三兩去核或由麩炒茯苓半夏

一陳皮兩萊菔子散炒連翹五錢麥糊丸

麥芽湯下或加麥芽人藥亦可

此足太陰陽明藥也山查酸溫收縮之

性能消油膩臃膾之食收縮故由由麩子

溫毒醫之物皆過切能消酒食陳腐之積

菴子辛甘下氣而制麩麥芽鹹溫消谷

醫方集解卷之五保和丸 七十一

益元易治人 艾附與干姜參味知

連參草將附子炮艾葉干姜

人童便內寒外熱名戴陽

此症陰盛格陽之症面赤身

熱不煩而躁但飲水不人口

為外熱內寒此湯姜附加知

連與白通加人尿猪胆汁同

意乃熱因寒藥為引用也按

內熱曰瀕為有根之火外熱

曰躁為無根之火故但躁不

煩及先導後煩者皆不治

回陽救急湯節菴曰用六君桂

附干姜五味羊附子炮干姜

陳皮各七分甘草三分五味

九粒加麝三厘或猪胆汁三

陰寒厥見奇動其陰寒六君

溫補助其陽氣五味人參以

生其脈加麝香者以通其窮

加胆汁者熱因寒用也

四神丸 故紙吳茱萸肉蔻五味

四般須大朮百枚姜八兩故破

紙四兩酒浸炒吳茱萸一兩

鹽水炒肉豆蔻二兩麩裏煨

湯頭歌古寒

而軟堅整積傷食必兼乎濕茯苓補脾

而滲濕積久必鬱為熱連翹散結而清

熱半夏能潤能燥和胃而健脾陳皮能

降能升調中而理氣此內傷而氣未病

者但當消導不須補益大安丸加白朮

而消補兼施也 本方加白朮白芍去

半夏服子連翹蒸餅糊丸名小保利丸

助脾進食本方加白朮二兩名大安丸

或加人參治飲食不消氣虛和微本方

加白朮香附黃芩黃連厚朴枳實治積

聚痞塊本方合越鞠丸扶脾開鬱

健脾丸 治脾虛氣弱飲食不消

人參 白朮上炒陳皮 麥芽炒山

查去核枳實三神曲糊丸米飲下

此足太陰陽明藥也脾胃者倉廩之官

胃虛則不能容受故不嗜食脾虛則不

能運化故有積滯所以然者由氣虛也

參朮補氣陳皮利氣氣運則脾健而胃

強矣山查消肉食麥芽消谷食戊巳不

足脾為戊土故以二藥助之使化枳實

醫方集解消痞五健脾丸

七十一 下三

瀉火衰扶

由腎命火衰不能生脾主故五更將交陽分陽虛不能健閉而世瀉不可專責脾胃也故紙之溫能補相火以通君火火盛乃能生土肉蔻煖胃固腸吳茱燥脾去濕五味神附瀉精生薑溫中大棗補士以防水

厚朴溫中湯 陳草苓干姜草蔻

木香停煎服加姜治腹痛虛

寒脹滿用皆靈 厚朴陳皮各一錢甘草五分

芥草豆蔻木香各五分干姜三分加姜煎○干姜草蔻辛熱以散其寒陳皮木香辛溫以調其氣厚朴辛溫以散滿茨艾日淡以利濕甘草甘平以和中寒散氣行痛脹自已

寒痢痛用導氣湯川棟茴香與

木香吳茱煎以長流水散寒

通氣利小腸 兩亦名小腸氣

三錢黃香二錢吳茱一錢湯泡同煎○川棟苦寒入肝舒筋能導小腸膀胱之熱從小便下行為治疝君藥茴香煖腎散寒吳茱溫肝燥濕木香行三焦通氣

疝氣方用荔枝核梔子山查

枳殼益勞交變結狀類羣丸能入肝腎時寒散滯梔子泄火利水只亮行氣破癥山查散癥磨積羣音臯腎子再入吳茱煖厥陰

易煩次舌寒

力猛能消積化痞佐以參朮則為功更

捷而又不致傷氣也夫脾胃受傷則須

補益飲食難化則宜消導合斯二者所

以健脾也 本方去山查麥芽加茯苓

炙甘草名益氣健脾丸治脾虛食少本

方加山查麥芽陳皮加當歸芍藥芎藭

麥冬柏子仁名養管健脾丸治脾陰不

足飲食不為肌膚 血充然本方去人參

枳實麥芽加香附木香半夏茯苓神曲

黃連當歸芍藥 一方無 荷葉燒飯丸名

理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉久痢本

方去人參山查麥芽加神曲川芎香附

麴糊丸名舒鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲

食不消本方去山查麥芽加半夏胆星

蛤粉茯苓神曲糊丸名化痰健脾丸治

內傷痰痰本方去人參山查麥芽加半

夏山樞黃連水丸名清火健脾丸治脾

虛有火本方去人參山查麥芽加木香

檳榔厚朴半夏甘草名和中健脾丸治

胃虛飢不欲食再加人參名妙應丸治

醫方長伴消心石健脾丸

下三

非腎病以肝
脈絡陰器也
長流水煎疝痛

釋等分或為
釋木空心服

橘核丸生中川棟桂朴實延胡

藻帶昆桃仁二木酒糊合癩

疝痛頑鹽酒吞橘核川棟子
海藻海帶昆

布桃仁各二兩桂心厚朴枳
實延胡索木香木通各五錢

酒糊為升鹽湯或酒下○橘
核木香能入厥陰氣而行氣

桃仁延胡能入厥陰血分而
活血川棟木通能導小腸膀

胱之濕官桂能法肝腎之寒
厚朴枳實行結水而破宿血

祛暑之劑 五百明方十一

三物香薷方 豆朴先香薷辛
溫香散

能入脾肺發越陽氣以散蒸
熱厚朴除濕散滿扁豆清暑

和若云執盛加黃連名黃連
香薷散

活人治中暑執或加苓草
茯苓

盛口渴心煩 或加苓草茯苓

草名五物飲 利濕祛暑不

瓜宣加木瓜名六味香薷
飲木瓜茯苓治濕勝再

加參芪與陳不兼治內傷十

味全六味加參芪陳皮白二
木名十味香薷飲

香散 合入香蘇飲五味香薷
飲合香蘇

易通次舌暑

胃虛不能食藏府或結或泄本方去山

查加半夏青皮木香砂仁草寇干姜炙

甘草茯苓猪苓澤瀉蒸餅丸名寬中進

食丸東垣補脾胃進飲食

枳實消痞丸東垣治心下虛痞惡食懶倦右

關脈弓脾虛不運故痞滿惡食脾主四
肢虛故懶倦右關屬脾脈脈者

為積飲痞隔皆陰勝陽也受病之戕心

與脾也因而鬱塞為痞者火與濕也益

心陽火也主血脾陰土也主濕凡傷其

腸則火熖鬱而火凝傷其除則土壅塞

而濕聚陰陽之分施治之法不可同也

枳實造黃連黃連姜汁炒厚朴姜汁炒半夏

麩麥芽炒人參 白朮土炒茯苓三錢甘

草炙干姜二錢 蒸餅糊丸

此足太陰陽明藥也枳實苦酸行氣破

血脾無積血不痞黃連苦寒瀉熱開鬱消

痞之君藥厚朴苦降散濕滿而化食厚

腸麥芽鹹溫助胃氣而軟堅破結半夏

燥痰濕而和胃干姜去惡血而通閉開

藏六府通節皆所以散而瀉之也參朮苓

草甘溫補脾便氣足脾運而痞自化既

以助散瀉之力又以固本便不傷真氣

醫方集解消痞丸

卷三

下三

飲香附紫蘇陳皮蒼朮名二
香散治外感內傷身執腹脹

仍有藿香湯香葛湯傳二物
香藿香葛

飲合香藿正氣散名藿香湯
治伏暑泄瀉三物香藿飲加

葛根名香葛湯
治暑月傷風

清暑氣垣 參草芪當歸麥

味青陳皮麴柏葛根蒼朮
升麻澤瀉萊菔隨人參黃芪

歸酒洗麥冬五味青皮麴炒
陳皮留白神曲炒黃柏酒炒

葛根蒼朮白朮土炒升麻澤
瀉加姜朮煎暑熱傷氣參芪

益氣歛汗濕傷脾二朮燥濕
強脾火旺則金病而水衰故

用麥味脾肺生津黃柏瀉火
滋水青皮理氣而破滯當歸

養血而和陰楚草和中而消
食升葛以升清澤瀉以泄濁

縮脾飲用清暑氣砂仁草菓烏

梅暨甘草葛根扁豆加吐瀉

煩渴溫脾胃砂仁草菓煨烏

兩扁豆炒研各二兩○暑必
兼濕而溫屬脾土故用砂仁

草菓利氣溫脾扁豆解暑滲
溫葛根升陽生津甘草補土

和中烏梅
清執止渴

古人治暑多用溫

如香藿飲大暑為陰症此所

調餘中暑為陰症為不足經

易頂次舌暑

易頂次舌暑

也 玉机微義曰此半夏瀉心湯加減法
也內有枳朮四君子芩等藥和濕消

痞氣丸 東垣治脾積在于胃脘大如盤久不
愈令人四肢不收或發黃疸飲食不為

肌膚 全匱云堅而不移者名積為藏病
由陰伏陽蓄氣血不運而成處心下位

中央填塞痞滿皆土病也與脹滿有輕
重之分痞惟內覺滿悶脹滿則外有脹

急之形也前人皆指誤下所致益傷寒
之病由于誤下則裏氣虛表邪乘虛入

于心下若雜病亦有中氣虛衰不能運
化精微而成痞者有飲食痰積不能施

化而成痞者有濕熱火其上來心下而
成痞者古方用黃連黃芩只實之苦以

瀉之厚朴半夏生薑之辛以散之入參
白朮之甘苦濕以補之茯苓澤瀉之淡

以參之惟宜上下分消其氣果有內實
之症庶可畧施疎導世人苦于痞塞喜

用利藥暫時通快藥過瀉甚皆不察夫
下多亡陰之意也

黃連 八錢 厚朴 五錢 吳茱萸 三錢 白朮 土炒 黃芩 三錢

茵陳 酒炒 干姜 炮 砂仁 半錢 人參 茯苓

澤瀉 錢 川烏 炒 川椒 分 官桂 巴

豆霜 分 蜜丸 燈草湯下

此足太陰陽明藥也黃連瀉熱燥濕消

痞君藥瀉心湯若用之厚朴砂仁行氣

而散滿茵陳芩瀉利水以實脾黃芩清

散行集方詳消卷五痞氣丸

三十一 下三

曰脈虛身熱大順散杏仁姜

得之傷暑桂甘散寒燻濕斯為貴

白砂炒次人干姜杏仁炒合

肉桂為未每服二錢吳鶴皋

生脈散麥味與人參保肺清心

治暑淫氣少汗多兼口渴病

危脈絕急前甚冬八分五味

冬甘寒潤肺五味酸敗歛肺

並能瀉火生津益心主脈血

朝百脈補肺清心則氣充而

六一散滑石同甘草解肌行水

兼清燥統治表裏及三焦熱

渴暑煩瀉痢保滑石六兩甘

湯下亦有別用姜湯下者○滑

石氣輕解肌質重降火滑能

利痰涎能行米故能通治上

下表裏之濕熱甘草瀉火和

中又以煖滑也益元散碧玉散

與雞蘇散砂蜜薄荷加之好

易頭欬舌暑利濕之劑十三首防方

肺而養陰椒萸燥脾而逐冷姜桂川烏

補命火以生脾土而姜桂又能去瘀生

新痞多血病黃連

為斬關奪門之將藉之以為先驅加參

朮者以補脾元正氣正旺然後可以祛

邪也滿皆血症也下多亡陰謂脾胃水

之谷之陰亡也心主血心虛而和陷下血

愈下降變為中滿鼓脹矣世有用氣藥

治痞而不効者本方除吳茱萸白朮

茯苓澤瀉茵陳川椒砂仁加葛蒲茯神

丹參紅豆名伏梁丸治心積起臍上至

心下大如臂令人煩心本方除吳茱萸砂

仁桂朮黃芩澤瀉加柴胡菝葜皂角昆

布甘草名肥氣丸治肝積在左脇下有

頭足令人發咳咳瘧不已本方除吳茱

白朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫菀桔梗

天冬白蔻陳皮青皮三稜名息實丸淡

姜湯下治肺積在右脇下令人酒漸寒

熱喘咳發肺癰秋冬黃連減半本方除

吳茱白朮砂仁人參干姜川椒黃芩茵

五苓散仲景治太陽府傳入膀胱

府者白木澤瀉猪茯苓膀胱

化氣添官桂利便消暑煩渴

清猪茯苓白木炒各七八

每服三錢〇二苓甘草利水

澤瀉甘鹹瀉水能入肺腎而

通膀胱導水以泄火邪加白

木者補土所以制水加官桂

者氣化乃能出也經曰膀胱

則能除桂名為四苓散無藥

但渴服之靈濕勝則氣不得

濕則渴則止

猪苓湯仲景除桂與木加入阿膠

滑石停猪苓茯苓澤瀉阿膠

瀉火解肌最能行水與鶴臯

日以諸藥過燥故加阿膠以

存津此為利濕兼瀉熱疽黃

便閉渴嘔寧五苓治濕勝

小半夏加茯苓湯仲景行水散痞

有生薑半夏一升茯苓三兩

小半夏湯加桂除夏治悸厥茯苓

甘草湯名彰加桂枝甘草除

草湯仲景治傷寒水氣乘心

厥而心下悸者先治其水後

陳加葛蒲丁香附子苦棟延胡索獨活

全蝎名貫豚丸淡鹽湯下治腎積發于

小腹上至心下若豚狀上下無時令人

喘咳骨疼及男子七疝女子瘕聚帶下

此東垣五種方也虽有破帶削堅之藥

多藉人參之力贊助成功經曰大積大

聚其可犯也衰其大半而止過者死矣

鶴臯曰五積丸非東垣之方也故匡方

考中皆不錄

葛花解醒湯專治酒積或嘔吐或泄瀉

痞塞頭痛小便不利酒大塊有毒又水

兼濕濕熱積下腸胃故見諸症

葛花 豆蔻 砂仁 木香 青皮

陳皮 人參 白木 茯苓 神曲

干姜 猪苓 澤瀉 水煎服

此手足陽明藥也過飲無度濕熱之毒

積于腸胃葛花獨入陽明令濕熱從肌

肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為

君神曲解酒而化食木香干姜調氣而

溫中青皮陳皮除痰而疏滯二苓澤瀉

能驅濕熱從小便出乃內外分消之劑

飲多則中氣傷故又加參朮以補其氣

醫方身解卷五 五積丸 下三

治其致心火因水而下行
則悸眩止而痞滿消矣

醫者湯置金內用干姜茯苓甘草

曰木襄傷濕身痛與腰冷亦

名甘姜炒木湯乾姜炮茯苓

炙自木炒各二兩○散藥行

水補上此濕邪在經而未入

府藏黃芪防已湯全除姜袪

甘姜束共煎嘗此治風水與

諸濕身重汗出服之良防已

各一兩白木七錢半甘草炙

五錢加姜束煎○防已大辛

苦寒通行十二經開竅行水

黃芪生用達表白木燥濕強

以制水又以緩防已之峻急

舟車九河牽牛及大黃遂戟荒

花合木香青皮橘皮加輕粉

燥實陽水却相嘗口渴面赤

而腫脹者為陽水黑牽牛四

兩炒大黃二兩酒浸廿逐麩

裏煨荒花醋炒大戟麩裏煨

青皮炒橘紅各一兩木香五

錢輕粉一錢水九○牽牛大

黃遂戟荒花行水防藥木香

青皮以行氣少却輕粉以透

易煎次古温

也人參補氣最能解酒李東垣曰酒大

熱有毒無形之物也傷之只當發汗

次利小便上下分消其濕氣今人或

酒為丸大熱之藥下之或用大黃牽牛

下之是無形元氣受傷反損有形陰血

陰血愈虛陽毒大旺元氣消亡而虛損

之病成矣或曰葛花解酒而發散不知

枳椇樹一各雞距一各木蜜經霜黃

赤而味甘其葉入酒酒化為水門

外植此木者屋內釀酒多不佳

驚甲飲嚴治瘧久不愈腹中結塊名曰瘧

母瘧久不愈為瘧瘧多或瘧于左脇之

下名曰瘧母乃丹之積也瘧屬少陽

胆經胆與肝相表裏久瘧屬在血分血

亦肝所主也當以驚甲為君隨症虛實

而施佐

使之藥

驚甲醋白木土黃芪炒芎藭酒白芍炒

枳椇厚朴陳皮甘草

等分姜三片棗一枚烏梅少許煎

此足少陽厥陰大陰藥也久瘧必由脾

虛白木補脾氣黃芪補肺氣使氣足脾

運方能磨積也川芎補肝而行血中氣

滯芍藥助脾而散肝經火邪二藥並和

疏鑿以棋榔及商陸芩皮大腹

厥陰營氣營血調則陰陽和矣陰陽爭

同椒目赤豆芫蕪木通煎

熱枳椇下氣而攻積草菓煖胃而祛寒

易煎次古温

厚朴破血而散滿陳皮理氣而消痰甘

易煎次古温

草和中而補土驚甲鹹平屬陰色青八

易煎次古温

受胃方集解消痞五驚甲飲

易煎次古温

下三

益姜皮陽水服

俱欄商陸法
椒目赤小豆秦艽羌活活澤泄
木通等分加姜皮末煎○此
羌散性上升通瀉瀉濕下降
苓腹姜皮行水于皮膚椒豆
商供改水于腹裏亦
上下表裏公消之意

肝端能益陰補虛消執散結故為瘡癰之君藥也

實脾

飲厚
氏 芩朮與木瓜甘草水

醫方集解卷下之四

吞大腹加草蔻附姜兼厚朴

虛寒陰水効堪誇便利不渴
而腫脹者

為陰水茯苓白朮土炒木瓜
甘草木香大腹子草豆蔻煨附
子炮黑姜厚朴炒加姜末煎○
脾虛補以芩朮甘草脾寒溫以
蔻附黑姜脾溫利以茯苓大腹
脾滯導以厚朴木香又上之
不足由于水之有餘木瓜木
香皆能平肝瀉木使水不尅
土而脾和則土能制水而脾
實矣經曰濕勝則地泥實土
正所以
制水也

五皮飲蔡用五般皮陳茯苓桑

易百疾古濕

收瀉之劑

滑則氣脫脫則散而不收
必得酸澀之藥欬其耗散
而後發者可返脫者可收也如汗出
亡陽精滑不禁泄痢不止大便不固
小便口遺久嗽亡津此氣脫也若亡
血不口崩中暴下諸大吐衄此血脫
也十劑曰瀉可去脫壯筋骨之屬
是也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥
亦兼氣藥氣苦血之帥也陽脫者見
鬼陰脫者目盲此神脫也當補陽助
陰非瀉劑
所能收也

赤石脂禹餘糧湯仲傷寒服湯藥下利

不止心下痞鞭脹瀉心湯已復以他藥

下之利不止醫以理中與之利益甚理

醫方集解卷五赤石脂禹餘糧湯

大腹奇 陳皮法苓皮姜皮或

用五加皮 易桑白脾虛脹

此方司 脾不能為胃行其津液故水腫半身以上

直汗半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

羌活勝濕湯 局 羌獨芎甘蔓蒙

本與防風濕氣在表頭腰重

痛發汗升陽有異功風能勝

濕升能降 氣升則水自降 不與行水

滲濕筒 濕氣在表宜汗又風能勝濕故用風藥上

升使濕從汗散羌活獨活各一錢川芎甘草炙蔓蒙本助風各五分葛根于三分如若有寒濕加附子助已 若除

獨活芎蔓草除濕湯 升麻蒼

朮充 除獨活川芎蔓荆甘草加升麻蒼朮名羌活勝

濕湯治風

濕身痛

大橘皮湯治濕熱五苓六一二

方綴陳皮木香枳櫛增能消

水腫及瀉泄 用五苓散赤茯苓一錢猪苓澤

瀉白木桂各五分用六一散滑石六錢甘草一錢加陳皮

錢半木香枳櫛各五分每服五錢加姜煎心小水併入大

中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘

糧湯主之 下焦主分 復利不止者當利

其小便 利小水所以

赤石脂 禹餘糧 等分杵碎煎

此手陽明藥也瀉可去脫重可達下石

脂餘糧之瀉以止脫重以固下甘以益

氣 李先知曰下焦有病入

桃花湯 仲景治少陰病三三日至四五日腹

痛小便不利下利不止便膿者 成氏曰陽

明下利便膿血者為協熱也少陰下利腹

痛便膿血者下焦不約而裏寒也○凡

下利便膿血身涼脈小者

赤石脂 一斤 干姜 一斤 粳米 一斤

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重

瀉入下焦血分而固脫于姜之辛溫煖

下焦氣分而補虛粳米之甘溫佐石脂

于姜而潤腸胃也 朱丹溪曰桃花湯主

姜之溫石脂之重瀉不能止血用粳米

之甘以引人腸胃韋繩曰便膿血熱勢

下流也成氏釋為裏寒非也桃花湯雖

用于姜然分兩最微石脂粳米居多以

調正氣瀉滑脫佐以于姜用辛以散之

之義謂便膿血皆傳經之熱和也吳鶴

臯曰少陰腎水主禁固二便為火所灼

且勿百八十五

醫方集解 卷之...

七十九

腸致小便不利而大便瀉泄
二散皆行水瀉熱之藥加枳
椀峻下陳皮木香理氣以利
小便而實大便也水腫亦濕
熱為病故
皆治之

茵陳蒿湯治疸黃陰陽寒熱

細推詳陽黃大黃梔子人
在裏口渴便閉身如橘色脉
沉實者為陽黃茵陳六兩大
黃二兩酒浸梔子十四枚
茵陳洗汙切水能泄太陽陽
明之濕熱梔子導濕熱由陰
小便大黃導濕熱由大便陰
黃附子與子姜以茵陳為主
色暗便澀者除梔子大黃亦
加干姜附子以散濕散寒亦

有不用茵陳者仲景柏皮梔

子湯黃柏二兩梔子十五枚
於燥者宜下之知免熱者則
勢外出而不內人不必汗下
惟用梔子黃柏清熱利濕以
和解之若小便利色白無熱
者仲景在虛勞
治用小建中湯

八正散局木通與車前扁蓄大

黃滑石研甘草梢瞿麥兼梔
子煎加燈草痛淋濁方有
濕熱下注口渴咽乾林痛尿
血小腹急滿木通燈草瞿
麥降心火入小腸車前清用
人人膀胱厄子瀉三焦鬱火

易有坎舌濕

勝熱瀉可收脫用于姜者假其辛熱以
從治用梗米者恐石脂性寒損胃也聊
攝之明而恍惚此况其下乎程刻情曰
此症終是火憂不能生土未可指為傳
經之熱邪也不知此而漫云滲瀉醫防
一徹前後瀉利而腸神陷矣昂按成氏
生于千載之後而能昌明仲景之書便
後學有所循人其功非小奈何後世之
士動輒非之成氏之死已久安能起而
辨其是非乎如此症成氏以為寒而王
肯堂吳鶴皋皆以為熱窮謂便膿血者
固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固
而亦便膿血者乎若以此為傳經熱邪
仲景當用寒劑以徹其熱而反用石脂
固瀉之藥使熱閉于內而不得瀉豈非
閉門養盜自貽伊戚也則仲景之治
腸熱利如甘草瀉心生薑瀉心白朮芎
藭湯皆用苓連黃柏而治下焦虛寒下
等湯皆用赤石脂禹餘糧湯比類以視斯
可厚矣此症乃因虛以見寒非大寒者

故不必固熱藥惟用甘辛溫之劑以鎮
固之耳本草言石脂性溫能益氣調中
固下未聞其能相胃也若準繩則訣凡
傳經者皆屬熱利一語遂以為然耳程
刻情每以直中為寒別傳經為熱利占
今相傳二語却未足然不為無見若專
未深造而輕議古人
多見其不知量也矣

訶子散治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹

痛脫肛及作膿血日夜無度

御米殼炒五分訶子七分于姜炮六分

橘紅五分右末空心服

此手足陽明藥也御米殼酸澁微寒固
腎瀉腸訶子酸澁苦溫收脫住瀉炮姜

易有坎舌濕

大苗骨石世火利水之捷藥
扁蓄利便通淋草稍入莖止
痛足治下焦而不專于治下
必三焦通利小乃下行也

草薺分清石菖蒲甘草稍烏

藥益智俱甘草稍戎牛或益

茯苓鹽煎服加莖通心固腎

濁精區遺精白濁革薺能

數益智固脾腎而開入結石

菖薺開九竅而通心甘草稍

達腎垂而止痛使濕熱去而

心腎通氣化行而淋濁止宿

矣此以疏泄為禁止者也

泉九益智同烏藥等山藥

糊丸便數遺尿

當歸拈痛湯東垣羌防升猪澤茵

陳琴葛明二木苦參知母草

瘡瘍濕熱服皆應常掃酒洗

升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒

炒葛根蒼朮白朮土炒苦參

知母並酒炒甘草炙羌活

通關節防風散留濕苦參黃

芩茵陳知母以瀉濕熱當掃

以和氣血升葛助陽而升情

苓傷七濕而降濁參甘二木

補正固中使苦寒不傷胃疏

泄不損氣也劉宗厚曰此方

東垣本治濕熱脚氣後人用

易直飲舌濕

辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調
氣以固氣脫亦可收形脫也泄瀉為氣

河間訶子散訶子一兩半木香五錢

草黃連錢三為末每服二錢用白朮芍

藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少

以此止之如不止加厚朴一兩竭其餘和

未香黃連香連丸也行氣清火止痛厚

腸甘草芍藥甘芍湯也甘緩酸收和中

止痛加訶子瀉以收斂加白朮補以強

脾厚和除濕散滿平胃調中故更藉之

以去餘

真入養臟湯治泄痢日久赤白已盡虛

寒脫肛門為大腸之使大腸受熱受

官腎者造作之官酒色過度則腎虛而

世母氣肺因以虛大腸氣無所主故脫

肛小兒血氣未壯老人亦治下痢赤白

血氣已衰皆易脫肝

臍腹疼痛日夜無度

瞿粟殼去蒂蜜炙訶子麵裹煨一肉豆

蔻麵裹煨木香二兩肉桂八錢人參白

木炒當歸六錢白芍六錢生甘草一兩

每服四錢臍寒甚加附子一方無當

歸此手足陽明藥也脫肛由于虛寒

醫方集解卷五真人養臟湯

潤燥之劑 十二首防方二

炙甘草湯 仲景參姜桂麥冬生地

大麻仁大束阿膠加酒服虛

勞肺痿效如神 甘草炙人參

二兩阿膠蛤粉炒二兩生地

一斤麥冬麻仁研各半升

十二枚水酒各半煎仲景治

傷寒脈結代心動悸乃肺痿

唾多下金匱用治虛勞寶鑑

滋燥香榮湯 兩地黃芩甘歸芍

及凡防 凡防風瓜蒌膚燥兼

風秘火燥金傷血液亡 當歸

二錢生地熟地白芍炒黃芩酒

活血潤燥生津飲 丹一冬熟地

兼瓜蒌桃仁紅花及歸芍利

秘通幽善澤枯 熟地當歸白

冬麥冬瓜蒌各八分

非汗牛乳 飲用脾胃滋養營散

痰潤腸奇五汁安中 飲張

黎藕三般加入用隨宜 牛乳

易直歌活燥

故用參朮甘草以補其虛肉桂肉蔻以

祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和血

芍藥酸以收斂訶子瞿殼則澇以止脫

也 此虛寒脫肛之劑宜大補元氣或加

芎芩調血及升柴以升提之又有氣

熱血熱而肛反提出者宜用芩連槐柏

或四物加升麻柴胡秦艽防風之類

附丹溪脫肛方 人參 黃芪 當歸

當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗發熱心

所藏在内者為血發于外者為汗汗乃

心之液也五藏六府表裏之陽皆心主

之以行其變化隨其陽氣所在之逃而

生津亦隨其火擾所在之迅瀉而為汗

是汗尺由心出也醒而出汗曰自汗屬

陽虛睡而出汗曰盜汗屬陰虛汗者心

之陽寢者腎之陰陰虛睡熱補外之陽

乘虛陷入陰中津液失其固衛故嚴嚴

然汗出覺則陽氣復而汗止矣因熱和

乘陰虛而出者汗必熱因寒和乘陽虛

而出者汗必冷有火者謂有面赤口乾

唇燥便赤言重脈數諸症○凡傷風傷

濕中暑風溫柔痲氣虛血虛脾虛胃熱

亡陽痰飲驚悸勞役房室癩瘍產後等

症皆能令人出汗經又曰飲食飽甚汗

出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行

外感初症多自汗

韭菜汁少許滾湯頓服名韭
汁牛乳餘牛乳六分韭汁姜
汁藕汁梨汁各五分和服名
五汁安中飲此治臍膈口反
胃噎膈由火盛血枯或有痰
血寒痰阻帶胃口故食人反
出也牛乳潤燥養血為君韭汁
藕汁消痰益胃姜汁溫胃散痰
梨汁消痰降火聽各症用之或
加陳酒亦佳以酒乃米汁也

潤腸丸 東用掃尾羌桃仁麻仁

及**大黃** 掃尾羌活大黃各五
兩蜜丸錢桃仁大麻仁各一

兩蜜丸錢桃仁大麻仁各一
血羌活散火搜風大黃破結
通幽麻仁或加芫防皂角子
滑腸利竅或加芫防皂角子
風溫加秦芫防風皂角子燒
存性研皂子得濕則滑善通

便利九防風秘血秘善通腸
用以治風風秘血秘善通腸

風燥血燥
致大便秘

通幽湯 東中二地俱桃仁紅花

掃尾羌活大黃各五兩蜜丸

不升濁陰則不降故大便不
通生地熟地各五分桃仁研
紅花當歸身甘草噎塞便閉

此方需有加麻仁大黃蒼朮

掃尾羌活 大黃蒸制李麻仁

搜風順氣 大黃蒸制李麻仁

山藥增防獨車前及枳椇

易直吹舌燥

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃
柏 黃連分黃芪加

此手足少陰藥也盜汗由于陰虛當歸
二地所以滋陰汗由火擾黃芩柏連所
以瀉火濕無熱不作汗得汗由腠理

不固信用黃芪所以固表李時珍曰當

麻黃根治盜汗甚捷蓋其性能行周身
肌表引諸氣至衛分而固腠理也按此
盜汗由傷寒盜汗不同傷寒盜汗邪在
半表半裏故以和表為主古法小柴胡
加桂主之此屬陰虛故以補陰為主李
士材曰陰虛則元氣有降而無升而復
用此苦寒劑之利得毋犯虛虛之戒
乎惟火實氣強者宜之不然苦寒損胃

病彌深耳準繩曰陰虛陽必湊故發
熱自汗當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰
必乘故發厥自汗黃芪建中湯甚名加
附子或芪附湯有濕熱合和汗出不休
以風藥勝其濕甘藥瀉其熱羌活勝濕
湯有痰症冷汗自出宜理氣降痰痰去
則汗自止有用固澀藥汗愈不收只可
理心血汗乃心之液心失所養不能攝
血故溢而為汗宜大補黃芪湯加酸棗
仁有微熱者更加石斛下元砂丹王海
藏曰晉即中童子盜汗七年諸藥不効
予與涼膈散三黃丸三日病已蓋腎主
五液化為五溫腎水上行乘心之虛心
火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而
開為汗出也先以涼膈散瀉其中相火
次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還
本藏立府閉而汗自止矣

附撲汗法白朮藁本川芎各二錢半 米粉兩

醫方集解卷五批錄散柏子仁丸

絲牛膝山茱仍中風風秘及
氣秘腸風下血總堪憑九蒸

九晒五兩大麻仁卻李仁去
皮山藥酒蒸車前子牛夕酒
蒸山茱肉各三兩兎絲子酒
浸防風獨活栝榔只壳麩炒
各一兩蜜丸○防獨潤腎搜
風槌柳順氣破滯大黃酒蒸
晒則性稍和緩同二仁滑利
潤燥通幽牛夕車前下行利
水加山藥山朱兔絲固本
益陽不使過于攻散也

消渴方丹中花粉連藕汁生地

汁牛乳研粉連研未或加姜

汁蜜為膏服瀉火生津益血

瘞黃連世心火生地滋腎水
藕汁益胃花粉生津牛乳
潤燥

白茯苓九治腎消花粉黃連葷

薛調三參熟地茯苓子石斛

蛇床脛脛音皮鴉雞脛皮
也茯苓花粉黃

連葷薛人參玄參熟地黃栗
盆子各一兩石斛蛇床子各
七錢半雞脛皮三十具微炒
蜜丸磁石湯下○黃連降心
火石斛平胃熱熟地玄參生
腎水茯苓盆蛇床固腎精人參
補氣花粉生津茯苓交心腎
葷薛利濕熱脛脛治膈消磁
石色黑屬水
假之人腎也

為末絹袋盛週身撲之治汗出不止又
方龍骨牡蛎糯米等分為末撲之

牡蛎散 治陽虛自汗

牡蛎煨黃芪 麻黃根錢一浮小麥百粒

煎服 此手太陰少陰藥也陳來章曰

為心之液心有火則汗不止牡蛎浮
小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之
衛陽氣虛則衛不固黃芪麻根之甘溫
走肌表而固衛

柏子仁丸 治陰虛盜汗

柏子仁炒研去油二兩人參 白朮 半夏

五味子 牡蠣 麻黃根一兩麥麩五錢

束肉九米飲下五十九日三服

此手足太陰少陰藥也陳來章曰心血
虛則睡而汗出柏子仁之甘辛平養心
寧神為君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫
為臣五味酸欬瀝收生夏和胃燥濕為
佐溫能麻黃根走肌表引人參白朮
以固衛氣為使

茯苓丹方治遺精白濁及強中消渴心腎

湯頭哥推

猪腎薺危湯干 參茯神知芩葛

草石膏因磁石天花同黑豆

強中消渴此方珍下消之症

至交精出名強中綠服和術

熱藥而毒盛也猪腎一具大

豆一升薺危人參石羔各三

兩磁石綿裹伏神知母黃芩

葛根甘草花粉各二兩先煮

地黃飲子易參芪甘二地二冬

批斛黍澤瀉枳實疏二府燥

煩消渴血枯含人參黃芪甘

冬主地枇杷葉蜜炙石斛澤

泄枳實炒每服三心〇參

芪甘草以補其氣氣能生水

二地二冬以潤其燥潤能益

酥蜜膏酒金用飴糖二汁百部

及生姜杏棗補脾兼潤肺戶

嘶氣德酒濕膏酥蜜飴糖杏

清燥湯二水與黃芪參芝連

易煩飲舌燥

醫方集解

卷五

二四

火之藏法天施地生之道心神傷則火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所受五藏六府輸至之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢泄戴氏曰遺精有因用心過度心不攝腎以致失精者有思色慾不遂致精失位輸泄而出者有色慾太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也又曰赤濁為心虛有熱因思慮而得白濁由腎虛有寒由嗜慾而得滑症下消者名強中腎水虧心火亢也

菟絲子兩五味子兩石蓮肉 白茯苓

兩山藥兩 將菟絲用酒浸過餘酒

煮山藥糊為丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下

此手足少陰藥也菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒淋渴五味滋腎生津石蓮清心止濁山藥健脾利濕皆瀆精固氣之品也茯苓能通心氣于腎利小便而不走氣取其淡滲于補正中能瀉腎邪也

治濁固本丸 治胃中濕熱滲入膀胱下

濁不止淋病在溺精穀屬腎膀胱部或由濕熱或由虛火大抵熱者多而寒者少赤屬血

白屬氣或由敗精痰血壅塞尿道痛澁

不宜用杯藥治

八五 下四

柏草陳皮猪澤升柴五味麩

麥冬歸地癆癆雄治肺金受濕熱之邪

痰覺喘促口渴便赤黃芪炭半蒼木炒一錢白木炒陳皮澤瀉各五分人參茯苓升麻

各三分當歸酒洗生地麥冬甘草炙神曲炒黃柏酒炒後

苓各二分柴胡黃連炒各一分五呀凡粒煎心肺為辛金

王氣大腸為庚金主津燥金受濕熱之邪則寒水生化之

源絕而痰覺喘渴諸症作矣參芪苓六陳草補土以生金

麥味保金而生水連相痛地瀉火滋陰猪澤升柴升清降

濁則燥金肅清水出高源而諸症平矣此方不尺潤藥因

有清燥二字故附次于此然

東垣所謂清燥者共指此與大腸為燥金也

瀉火之劑二十七首附方

黃連解毒湯毒即火 四味黃柏

黃芩梔子備等躁狂大熱嘔

不眠吐血衄鼻血音斑黃均

可使若云三黃石膏湯再加

麻黃及淡豆豉此為傷寒

溫毒盛三焦表裏相兼治梔

子金花黃芩黃柏

大黃潤腸瀉熱真堪倚

蓮鬚 黃柏 益智仁 砂仁

半夏製茯苓而猪苓甘草

此足少陰太陽不陰藥也精濁多由濕

熱與痰黃連瀉心火黃柏瀉腎火所以

清熱二苓所以利濕半夏所以除痰濕

熱多由于鬱滯砂仁益智辛溫利氣又

能固腎強脾既以散滯之氣且稍濟

連柏之寒甘草和中而補土惟蓮鬚之

瀉則所以固其脫也

朱丹溪曰巢氏原由勞傷腎氣虛冷故也歷代宗其說

思內經人無白濁之名世言少陰在泉客勝便便少陰在泉客勝則溲白又

言思想無窮入房大甚發為白淫與脾移熱于腎出白二者皆隨溲而下夫非

白濁之源乎原病式因舉內經諸病水液渾濁皆屬于熱言天氣熱則水澤

濁寒則清涼可謂發聖人之旨以正干

載之誤矣予嘗聞先聖論赤白濁多因

濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂中氣

不足溲便為之變是也必先補中氣使

升舉之而後分其藏府氣血赤白虛實

以治與夫其他和熱所傷者固在泄熱

補虛設血氣虛甚或火熱九極者則不

宜過用寒涼之劑必以反佐治之要在

權衡輕重而已葉氏曰遺精多作腎虛

補虛之而固効不知此因脾胃濕熱所

乘飲酒厚味痰火之人多有此疾醫

醫者脾胃受傷濕熱內鬱使中氣滯而

不精則所輸皆濁氣和火擾動心不得

清則所輸皆濁氣和火擾動心不得

醫者脾胃受傷濕熱內鬱使中氣滯而

不精則所輸皆濁氣和火擾動心不得

附子瀉心湯仲景用三黃寒加熱

藥以維陽二兩附子一枚炮

藥治傷寒痞滿從外之內其

加附始相當經曰心下痞按

大黃黃連瀉心湯心下痞而

復惡寒汗出者附子瀉心湯

妙異膏大黃細辛各二兩附

有陰宜以溫藥下具

無後八字識其指

半夏瀉心湯仲景黃連各三

草與人參大棗和之治痞痞

法在降陽而和陰半夏半升

于姜黃芩甘草炙人參各三

而大棗十二枚治傷寒下之

早脈滿而不痛者為痞身寒

而嘔飲食不下非柴胡症凡

用泄心者多屬誤下非傳經

熱和否而不泰為痞泄心

者必以苦故用芩連散痞者

必以辛故用姜夏欲交陰陽

通上下者必和其

中故用參甘大棗

白虎湯仲景用石膏煨知母甘草

粳米石羔一斤知母六兩

甘草二兩粳米六合

而安靜故

水陸二仙丹治遺精白濁

濁即生膏淋肝脾之火也精濁乃精氣

滑出不便亦然此腎水不足淫火薰蒸

故精離

其位也

金櫻膏取半黃者熬膏一斤

能滋陰濟能止脫一生于水一生于山

故名水陸二仙丹

故名水陸二仙丹

沙苑蒺藜炒芡實蒸蓮鬚二龍骨

此足少陰藥也疾來補腎益精蓮子交

通心腎牡蛎清熱補水芡實固腎補脾

合之蓮鬚龍骨皆瀦精秘氣之品以止

滑脫也

迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者

潔古珍珠粉丸黃怕蛤粉等分滋陰降

火思想傷陽者謙甫鹿茸菴蓉兔絲等

補陽陰陽俱虛者丹溪作心虛治用珍

珠粉丸定志丸補之附本事猪苓丸猪

苓末二兩先將一半炒半夏令黃取半

心腎不

交也

亦有加入人參者名入參白虎湯方金

煩熱渴舌生胎神此方清肺

金而瀉胃火故名然必實熱方可用之或有血虛身熱脾虛發熱及陰盛格陽類白虎湯症候投之不可救也按白虎症脈洪大有力類白虎症脈大而虛以此為辨又當視小便赤者為內熱白者為內寒也

竹葉石膏湯仲景人參麥冬半夏

與同林甘草生姜兼粳米暑

煩熱渴脈虛尋竹葉二把石

三兩日草炙二兩麥冬一升半夏粳米各半升加姜煎治

傷寒解後嘔渴少氣○竹葉石膏之辛寒以散餘熱參甘梗麥之甘平以補虛生津

姜夏之辛溫以豁痰止嘔

升陽散火湯東垣葛升柴羌獨防

風參芍儕生炙甘草加姜炙

陽經火鬱發之佳柴胡八錢

羌活獨活人參白芍各五錢防風二錢半炙甘草二錢生甘草二錢每服五錢加姜炙煎心火發多在肝胆之經以木盛能生火而二經俱核相火故以柴胡散肝為君羌防以發太陽之火升葛以發陽明之火獨活以發少陰之火加參甘者補上以泄火加白芍者瀉肝而益脾且令散中

易損人活火

夏為未糊凡更用猪苓末一半同炒微製砂鈺養之申未間空心酒鹽湯在下釋曰半夏有利性猶冬導水益腎閉導氣使通之意也定志丸見日門

人參樗皮散治藏毒挾熱下血久痢膿

血不止挾熱者謂挾客熱攻飲酒煎

人參樗根白皮東引者去等分為

未米飲下或酒調下

此手足陽明藥也人參之甘以補其氣

樗皮之苦以燥其濕寒以解其熱瀉以

收其脫使虛者補而陷者升亦劫劑也

初起勿用

桑螵蛸散寇氏治小便數而欠數便頻也欠

出于膀胱然秘別者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便短能安神

魂補心氣療健忘

人參茯苓一用遠志石菖蒲蒸桑

螵蛸鹽水龍骨煨龜板酥炙一方用富

婦等分為末臨臥服一錢人參湯下

此足少陰手足太陽藥也虛則便數

故以螵蛸龍骨固之螵蛸補腎丸則便

欠故以富婦龜板滋之人參補心氣菖

蒲開心竅茯苓能通心氣于腎遠志能

桑螵蛸散

下四

湯頭歌

有補發中
有收也

涼膈散局 硝黃梔子翹黃芩甘

葶薄荷饒竹葉蜜煎療膈上

葉生竹上 中焦燥實服之消

故治上焦 運翹四兩大黃酒浸芒硝甘

草各二兩梔子炒黑黃芩酒

炒小荷各一兩為末每服三

錢加竹葉生蜜煎○連翹薄

荷竹葉以升散于上危等硝

黃以推瀉于下使上升下行

而隔自清矣加甘草生蜜者

病在隔甘以緩之也潘思敬

曰仲景調胃承氣湯後人加

味一變而為涼膈散再變而

為助風

通聖散

清心蓮子方 石蓮參地骨柴 醫方集解卷下之五

胡赤茯苓苳麥冬車前子

躁煩消渴及崩淋 石蓮人參

苳黃苳各三錢黃芩酒炒地

骨皮麥冬車前子甘草炙各

二錢○參苳甘草補虛瀉火

柴胡地骨退熱平肝黃芩麥

冬清熱上焦赤茯苓前利濕

下焦中以石蓮交其心腎也

甘露方 兩地 熟與茵陳苳枳

枇杷 黃芩枳殼 石斛倫甘草

二冬 麥天 平胃熱 等分煎○二

石斛平脾腎之虛熱清而兼

補黃芩茵陳枳殼而去濕枳

通腎氣于心並能清心解熱心者小腸
之合也心補則小腸不虛心清則小腸
不熱矣

殺蟲之劑 開尹子曰人之身內包

人身以為生者是吾身 小天地也

蟻蚋為人所常有之虫倘寒侵火迫

則不友其位亦能為病若飲食不慎

血氣虛衰又能變生諸虫不可名狀

如髮微驚癢疥疥瘡傳曰之類至于殺

身戒門重之為患若斯其酷也是以

先賢以法殺之苟人不能

殺虫則虫必且殺人矣

烏梅丸 治傷寒厥陰症寒厥吐虫傷寒

者死穢厥者脈微而厥至七八日膚冷

發燥無暫安時也虵厥者吐上入隔則

煩須臾復止得食則嘔而又煩虵聞食

丸溫裁 亦治胃府發咳而嘔甚則

安枕

醫方集解

卷下之五

穀杷把那桂苓犀角可加均
氣而降火
加扶苓肉桂各桂苓甘露飲
本專方加犀角通治司中濕
執口瘡
叶動

清胃散用升麻黃連當歸生

地牡丹全或益石膏平胃熱

口瘡吐衄及牙宣

○黃連瀉心火亦泄脾火丹
皮生地牛血執當歸引血歸
經石膏瀉陽明之火升麻升
陽明之清昇按古人治血多
用升麻然士升之
藥終不可輕施

瀉黃散甘草與防風石羔梔子

藿香充炒香蜜酒調和服胃

火口瘡並見功

子一兩藿香七錢石羔五錢
○梔子石羔泄肺胃之火藿
香辟惡調中甘草補脾瀉熱
重用防風者能發脾中伏火
又能干土
中瀉本也

錢乙瀉黃散升防芷苓夏石斛

同甘枳亦治胃熱及口瘡火

鬱發之斯為美
升麻防風白
芷各錢半黃
芩只壳牛夏石斛各一錢甘
草七分○升防白芷以散可
火苓夏枳殼以清熱開鬱
石斛甘草以平胃調中

長出亦主久痢

烏梅三百細辛桂枝人參附子

泡黃柏六黃連斤干姜兩川椒土當歸

四苦酒醅浸烏梅一宿去核蒸熟和

樂蜜丸

此足陽明厥陰藥也虻得酸則伏故以
烏梅之酸伏之虻得苦則安故以連柏

之苦安之虻因寒而動故以桂附姜椒
溫其中藏而以細辛當歸潤其腎肝人
參用以助脾烏梅兼以斂肺寒之故則

成虻厥宜理中湯加炒川椒五粒俱擗

五分吞烏梅丸和郊情口烏梅丸味辛
酸入肝藥中微加苦寒納土逆之陽邪
而順之使下也各口安虻實是安胃故
併主久利見陰陽不相順接而下利之
症皆可以此方治之也○經曰凡陰陽
不相順接使為厥方時行曰經曰手之
三陰復腹走手手之三陽從手走頭足
之三陽從頭走足足之三陰從足走腹
是三陰三陽俱相接手手足者也陽氣
內陷不與陰氣相順
按故手足逆冷也

集効丸治重嗜腹痛作止有時或耕起

往來

腹病有作止者重嗜與痛不嗜則
止也氣耕往來者重不妄于胃也

大黃半鶴虱炒檳榔訶子皮燕
黃炒木香干姜炒附子七錢蜜丸

易自公舌人

醫方集卷之五

瀉痢歌括

瀉白散錢桑皮地骨皮甘草梗

米四般宜桑皮地骨皮各一錢甘草五分梗米白粒

米白粒○桑皮瀉肺火地骨退虛熱日草補土生金梗米和中清肺李時珍曰此瀉肺諸方之準繩也

知芩皆可入大參扶苓知母黃芩曉加名加

成泄肺炎喘嗽此方施

瀉青丸錢用龍胆梔下行瀉火

大黃養羌防升上芎歸潤火

鬱解經用此宜龍胆草黑危子大黃酒蒸

羌活防風川芎當歸酒洗等分蘆花竹葉湯下○羌防引

火上升危胆大黃抑火下
降芎歸養肝血而潤肝燥

龍胆瀉肝方梔苓柴生地車

前瀉瀉皆木通甘草當歸合

肝經濕熱方能排胆草酒炒梔子酒炒

黃芩酒炒生地酒炒柴胡車前干澤瀉木通當歸甘草生

用○龍胆柴胡瀉肝胆之熱黃芩梔子瀉肺與三焦之熱

以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉小腸膀胱之濕以

佐之扁地養血補肝甘草緩中益胃不令苦寒過干瀉下

當歸龍薈丸陽用四黃龍胆

蒼木麝香黑梔青黛姜湯下

身須飲五火

醫方集解 卷五

食前烏梅湯下婦人醋湯下

此手足陽明藥也重喜溫惡酸而畏苦

故用姜附之熱以溫之烏梅訶皮之酸

以伏之大黃檳榔蕪黃鶴虱之苦以殺

之木香辛溫以順其氣也

雄極丸 治腹痛胃痛乾痛有時乾痛者瀉而但痛也有時者淡食而飢則痛厚味而飽則痞此為重也

雄黃 檳榔 白礬 等分飯丸每五

分食遠服

此手足陽明藥也雄黃之辛毒檳榔之

苦降白礬之酸瀉皆殺重之品也故合

用以治之

化虫丸 治腸胃諸虫為患腸胃之中無物不容所以

交生諸虫者緣正氣虛衰或誤食生虫之物或濕熱蒸鬱而成亦犹物必先腐而後虫生

之義也

鶴虱 胡粉炒 苦棟根東引未 檳榔一

蕪黃 使君子錢 枯礬一錢 為末酒

煮麵糊作丸量人大小服之一歲之兒

只可五分

此手足陽明藥也藜蘆皆殺重之品也

醫方集解 卷五 雄極丸 化虫丸 下五

一切肝火盡能攘當歸酒洗

梔子炒黑黃連酒炒醋相酒
炒黃芩酒炒各一兩大黃酒
浸青黛水飛青蒿各五錢木
香二錢麝香五分蜜丸姜湯
下○肝木為生火之源諸經
之火因之而起故以龍胆青
黛入本經而直折之而以大
黃芩連厄柏通平上下三焦
之火也苦管大苦大寒氣腥
入肝恐諸藥過干寒瀉故用
當歸養血補肝用姜湯辛溫
為引加水麝者取其行氣通
竅也然非實
熱不可輕投

左金連月柴連六一九肝經火

鬱吐吞酸黃連六兩姜汁炒
吳茱萸一兩搗湯

泡亦名茶連九○肝實則作

痛或嘔酸心為肝子故用黃
連瀉心清火使火不尅金則
金能制木而肝平矣吳茱萸能
入厥陰行氣解鬱又能引熱
下行故以為反佐寒者正治
熱者反治使之相濟以立功
也左金者使肺合之金得行
于左而再加芍藥名戊巳丸
平肝也

治胃痛寒因熱用理一般黃

六兩附子一
兩亦反佐也

導赤散錢生地與木通甘草稍

單用尚可治之類羣為丸而虫焉有不

死者乎吳鶴皋曰古方殺虫如雷丸貫
其所常用者也有加附子干姜者壯正
氣也加苦參黃連者重得苦而伏也加
烏梅詞于者重得酸而軟也加梨芦瓜
蒂者欲其帶虫吐出也加荒花黑丑者
欲其帶虫瀉下也用雄黃用椒蛇床樟
腦水銀檳榔者治瘡疥之虫也用胡桐
淚良君子子子螺酥者治蠅齒之虫也
用川槿皮海桐皮者治風癬之虫也用
青箱子栗盆葉者治九竅蠱蝕之虫也
用敗鼓心桃符板虎糞骨死人枕顛瓜
鶴骨者驅勞
瘵之虫也

使君子丸 治蠱脹腹痛及食積黃毒

食茶米炭土等物飲食停滯溫熱蒸鬱

痛或發黃身腫喜食生米

使君子去殼南星製檳榔兩 右藥合

炒如喜食生米用麥芽一斤炒喜食茶

葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥

為末蜜丸每晨砂糖水下

此手足陽明藥也使君子之甘南星之

毒檳榔之苦皆能殺虫炒以諸物因其

所嗜引以砂糖誘之以甘也

願肝丸治鬼疰傳尸勞瘵
熱沉沉熱熱不知所苦而無
恙不惡死後傳人乃至成門

此五疰之一

湯頭

竹葉四般攻口糜淋痛小腸

火引熱同歸小便中等分煎

涼心血竹葉清心氣木通世心火入小腸草稍連腎莖而

止痛

清骨散用銀柴胡胡連秦艽

甲符地骨青蒿知母草骨蒸

勞熱保無虞銀柴胡錢牛胡

童便炙地骨皮青蒿知母各

一錢甘草炙五分○地骨胡

連知母以平內熱柴胡青蒿

秦艽以散表邪醫用引諸藥入骨而補陰甘草和諸藥而瀉火

清震湯治雷頭風升麻蒼朮

兩般充二味局方荷葉一枚

升胃氣邪從上散不傳中頭面

腫痛疔瘡各雷頭風一有頭

加雷鳴東垣曰邪在三陽不

可通用寒藥重剉誅伐無過

處清震湯升陽解毒益取震為雷之義

鼠尾

獺肝一且須從獺身陰乾為末水服二

錢日三次

此三陰藥也吳鶴臯曰獺肝治鬼疰此

何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出

者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其

肝者肝為厥陰藏魂之臟也昂按物之

晝伏夜出者狐鼠皆然不獨獺也本草

云諸肝皆有葉數惟獺肝一月一葉其

間又有退葉獨異于他獸

此其所以能治鬼疰也欬

消渴殺虫方治消渴有虫苦楝根 取新白皮一握切焙入麝香

少許煎空心服雖困頓不妨取下虫三

四條類虬而色紅其渴乃止

此陽明藥也消渴一症有虫耗其津液

而成者蓋飲醇食炙積成胃熱濕熱生

虫理固有之臨病宜諦審也

日勿真及活人

應百方長年再家立消渴殺虫方

九三

下五

湯山野語

卷之四

以竹



