



儒門事親 五尾

中武  
127  
方止





門武9  
號 127  
卷 52

儒門專親卷之十三

劉河間先生三消論

因在前此書未傳於世恐為沉沒故刊而行之

易言天地自太虛至黃泉有六位內經言人之身自頭至足亦有六位今余又言人胸腹之間自肺至腎又有六位人與天地造化五行同一爐備知彼則知此矣故立天之氣曰金與火立地之氣曰土與水立人之氣曰風與火故金與火合則熱而清水土合則濕而寒風火合則溫而炎人胸腹之間亦猶是也肺最在上為金主燥清心次為君火主熱肝又次之為風木主溫膽又次之為相火主極熱脾又次之為濕





土主涼腎又次之黃泉爲寒水主寒故心肺象天脾  
腎象地肝膽象人不知此者不可與論人之病矣夫  
土爲萬物之本水爲萬物之元水土合德以陰居陰  
同處乎下以立地爲氣萬物根於地是故水土濕寒  
若燥熱陽實則地之氣不立萬物之根索澤而枝葉  
枯矣五常政大論曰根於中者命曰神機是爲動物  
根本在於中也根本者脾胃腎也食入胃則脾爲布  
化氣味榮養五藏百骸故酸入肝而養筋膜苦入心  
而養血脉甘入脾而養肌肉辛入肺而養皮毛鹹入  
腎而養骨髓五氣亦然故清養肺熱養心溫養肝濕

養脾寒養腎也凡此五味五氣太過則病不及亦病  
惟平則常安矣故六節藏象論曰五味入口藏於腸  
胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自  
生是其理也又太陰陽明論云脾病而四肢不用者  
何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於  
脾胃乃稟也今脾病不能爲胃行其津液不得稟水  
穀氣脾日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故  
不用焉帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中  
央常以四時長四臟各十八日寄治不得獨主於時  
也脾藏者常着胃土之精也土者生萬物而法天地



故上下至頭足不得獨主於時也帝曰脾與胃以膜相連爾而能行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗑故太陰爲之行氣於三陰足陽明者表也五臟六腑之海也亦爲之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣以益陽明故爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉不用者謂不能爲之運用也由是觀之則五臟六腑四肢百骸皆稟受於脾胃行其津液相與濡潤滋養矣後之醫者欲以燥熱之劑以養脾胃滋土之氣不亦外乎况消渴之病者本濕寒

之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚更服燥熱之藥則脾胃之氣竭矣叔世不分五運六氣之虛實而一槩言熱爲實而虛爲寒彼但知心火陽熱一氣之虛實而非臟腑六氣之虛實也蓋肺本清虛則溫心本熱虛則寒肝本溫虛則清脾本濕虛則燥腎本寒虛則熱假若胃冷爲虛者乃胃中陰水寒氣實甚而陽火熱氣衰虛也非胃土濕氣之本衰故當溫補胃中陽火之衰退其陰水寒氣之甚又如胃熱爲實者乃胃中陽火實而陰水虛也故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛水然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪非



胃爲濕者之本其餘例同法夫補瀉脾胃濕土之水  
氣者潤其濕者是補濕燥其濕者是瀉濕土本濕故  
也凡臟腑諸氣不必腎水獨當寒心火獨當熱要知  
每臟每腑諸氣和同宣而平之可也故余嘗謂五常  
之道陰中有陽陽中有陰孤陰不長獨陽不成但有  
一物皆備五行通相濟養是謂和平交互克伐是謂  
衰興變亂失常患害由行故水少火多爲陽實陰虛  
而病熱也水多火少爲陰實陽虛而病寒也其爲治  
者瀉實補虛以平爲期而已矣故治消渴者補腎水  
陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟

身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血  
利而不澀則病日已矣况消渴者本因飲食服餌失  
宜腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過違其  
度或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱  
甚之所成也故濟衆云三消渴者皆由久嗜鹹物恣  
食炙燂飲酒過度亦有年少服金石丸散積久石熱  
結于胸中下焦虛熱血氣不能制石熱燥甚於胃故  
渴而引飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食  
多而不甚饑小便數而漸瘦者名曰消中若渴而飲  
水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消如此三



消者其燥熱一也但有微甚耳余聞世之方多一方而通治三消渴者以其善消水穀而喜渴也然叔世論消渴者多不知本其言消渴者上實熱而下虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰水數一爲物之本五行之先故腎水者人之本命之元不可使之衰弱根本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體不榮消渴病者下部腎水極冷若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火亢甚而難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝

退上焦火則自然渴止小便如常而病愈也若此之言正與仲景相反所以巧言似是於理實違者也非徒今日之誤誤已久哉又如蔣氏藥證病原中論消渴消中消腎病曰三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似冰又曰腰腎虛冷日增重又曰膀胱腎臟冷如泉始言三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似冰復言五臟亦冷且腎臟水冷言爲虛其餘熱者又皆言其虛夫陰陽興衰安有此理且其言自不相副其失猶小至於寒熱差殊用藥相反過莫大焉或又謂腎與膀胱屬水虛則不能制火虛既不能制火故小便多者愈失



之遠矣彼謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多豈知消渴小便多者非謂此也何哉蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故腸胃之外燥熱太甚雖復多飲于中終不能浸潤於外故渴不止小便多出者如其多飲不能滲泄於腸胃之外故數溲也故金盡言原病式曰皮膚之汗孔者謂泄汗之孔竅也一名氣門者謂泄氣之門戶也一名腠理者謂氣液之隧道紋理也一名鬼門者謂

幽冥之門也一名玄府者謂玄微之府也然玄府無物不有人之臟腑皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙至於萬物悉皆有之乃出入升降道路門戶也故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老非升降則無以生長收藏是知出入升降無器不有故知人之眼耳鼻舌身意神識能爲用者皆由升降出入之通利也有所閉塞則不能用也若目無所見耳無所聞鼻不聞香舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉塞而致津液血脉榮衛



清氣不能升降出入故也各隨鬱結微甚而有病之  
大小焉病在表則怫鬱腠理閉密陽氣不能散越故  
燥而無汗而氣液不能出矣叔世不知其然故見消  
渴數溲妄言爲下部寒尔豈知腸胃燥熱怫鬱使之  
然也予之所以舉此世爲消渴之證乃腸胃之外燥  
熱痞閉其滲泄之道路水雖入腸胃之內不能滲泄  
於外故小便數出而復渴此數句足以盡其理也試  
取內經凡言渴者盡明之矣有言心肺氣厥而渴者  
有言肺痺而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴  
者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有

言小腸癰熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘石  
藥而渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇  
大熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因腎熱而渴  
者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所  
遇各異其歸燥熱一也

所謂心肺氣厥而渴者厥論曰心移熱於肺傳爲膈  
消注曰心熱入肺久而傳化內爲膈熱消渴多飲也  
所謂肝脾而渴者痺論曰肝痺者夜卧則驚多飲數  
小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾而渴肌  
肉不仁發爲肉痿



所謂腎熱而渴者刺熱論曰腎熱病者先腰痛胛酸  
苦渴數飲身熱熱論曰少陰脉貫腎絡於肺繫舌本  
故曰燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不能制心火爲上  
實熱而下虛冷以熱藥溫補腎水欲令勝退心火者  
未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲  
熱心火屬陽而本熱虛則爲寒若腎水陰虛則心火  
陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明矣故氣厥論曰  
腎氣衰陽氣獨勝宣明五氣論曰腎惡燥由燥腎枯  
水涸藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物  
屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎

水既不勝心火則上下俱熱柰何以熱藥養腎水欲  
令勝心火豈不繆哉又如胃與大腸熱結而渴者陰  
陽別論二陽結爲之消注曰陽結胃及大腸俱熱結  
也腸胃藏熱善消水穀又氣厥論曰大腸移熱於胃  
善食而瘦脉要精微論曰瘰成爲消中善食而瘦如  
腸痺而渴者數飲而不得中氣喘而爭時發殮泄夫  
數飲而不得中其大便必不停留然則消渴數飲而  
小便多者止是三焦燥熱怫鬱而氣衰也明矣豈可  
以燥熱毒藥助其強陽以伐衰陰乎此真實實虛虛  
之罪也夫消渴者多變聾盲瘡癬痤癩之類皆腸胃



燥熱怫鬱水液不能浸潤於周身故也或熱甚而膀胱怫鬱不能滲泄水液妄行而面上腫也如小腸瘴熱而渴者舉痛論曰熱氣留于小腸腸中痛瘴熱焦渴則便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣如言病瘡而渴者瘡論曰陽實則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也然陽實陰虛而為病熱法當用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石藥而渴者奇病論曰有口甘者病名為何岐伯曰此五氣之所溢也病名脾瘴瘴為熱也脾熱則四臟不稟故五氣上溢也先因脾熱故曰脾瘴又

經曰五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而為消渴通乎虛實論曰消瘴什擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴之人膏粱之疾也或言人惟胃氣為本脾胃合為表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今消渴者脾胃極虛益宜溫補若服寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故妄言而無畏也豈知腹中論云帝曰夫子數言熱中消中不可服芳草石藥石藥發癩芳草發狂



注言多飲數洩謂之熱中多飲數洩謂之消中多喜  
曰癩多怒曰狂芳美味也石謂英乳乃發熱之藥也  
經又曰熱中消中皆富貴人也今禁膏梁是不合其  
心禁芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草之  
味美石藥之味悍二者之氣急疾堅勁故非緩心和  
人不可服此二者帝曰何以然岐伯曰夫熱氣慄悍  
藥氣亦然所謂飲一洩二者當肺氣從水而出也其  
水穀之海竭矣凡見消渴使用熱藥誤人多矣故內  
經應言渴者皆如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸  
氣過極反勝也者是以人多誤也如陽極反似陰者

是也若不明標本認似爲是始終乖矣故凡見下部  
覺冷兩膝如冰此皆心火不降狀類寒水宜加寒藥  
下之三五次則火降水升寒化自退然而舉世皆同  
執迷至如易素二書棄如朽壤良可悲夫故處其方  
必明病之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害  
者可以制其方也已所謂標本者先病而爲本後病  
而爲標此爲病之本末也標本相傳先當救其急也  
又云六氣爲本三陰三陽爲標蓋爲病臟病最急也  
又云六氣爲胃之本假若胃熱者胃爲標熱爲本也  
處其方者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以



甚者爲邪衰者爲正法當瀉甚補衰以平爲期養正除邪乃天之道也爲政之理補賤之義也大凡治病明知標本按法治之何必謀於衆陰陽別論曰謹熟陰陽無與衆謀標本病傳論知標知本萬舉萬當不知標本是謂妄行至真要大論曰知標知本用之不知明知逆順正行無問不知是者不足以言診適足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以爲可知言熱未已寒病復起同氣異形迷診亂經此之謂也夫標本之道要而博小而大可以言一而知百言標與本易而弗損察本與標氣可令調明知勝復爲萬民式天之道

畢矣天元紀大論曰至數極而道不惑可謂明矣所謂藥之巧能者溫涼不同寒熱相反燥濕本異云云前已言之矣斯言氣也至於味之巧能如酸能收甘能緩辛能散苦能堅鹹能軟酸屬木也燥金主於散落而木反之土濕主於緩而水勝之故能然也若能燥濕而堅火者苦也易曰燥萬物者莫燥乎火凡物燥則堅也甘能緩苦急而散結甘者土也燥能急結故緩則急散也辛能散抑散結潤燥辛者金也金主散落金生水故也况抑結散則氣液宣行而津液生也藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致



津液通氣也鹹能軟堅鹹者水也水潤而柔故勝火之堅矣此五臟之味也其爲五味之本也淡也淡胃土之味也胃土者地也地爲萬物之本胃爲一身之本天元紀大論曰在地爲化化生五味故五味之本淡也以配胃土淡能滲泄利竅夫燥能急結而甘能緩之淡爲剛土極能潤燥緩其急結令氣通行而致津液滲泄也故消渴之人其藥與食皆宜淡劑至真要大論曰辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽六者或散或收或緩或急或燥或潤或堅或軟所以利而行之調其氣也本草云藥

有三品上品爲君主養命小毒以應天中品爲臣主養性常毒以應人下品爲佐使主治病大毒以應地不在三品者氣毒之物也凡此君臣佐使者所以明藥之善惡也處方之道主治病者爲君佐君者爲臣應臣之用者爲佐使適其病之所根有君臣佐使奇偶小大之制明其歲政君臣脉位而有逆順反正主療之方隨病所宜以施用其治法多端能備所用者良工也寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之結者散之散者收之微者逆而制之甚者從而去之燥者潤之濕者燥之堅者軟之軟者堅之急者緩之容



者除之留者却之勞者温之逸者行之驚者平之衰者補之甚者瀉之吐者下之摩之益之薄之劫之開之發之灸之制之適足爲用各安其氣必清必淨而病氣衰去臟腑和平歸其所宗此治之大體也陰陽應象論曰治不法天之紀不明地之理則災害至矣又六節藏象論曰不知年之所加氣之所衰不可以爲功也今集諸經驗方附于篇末

神白散 治真陰素被損虛多服金石等藥或嗜灸煇鹹物遂成消渴

桂府滑石 六兩

甘草 乙兩生用

右爲細末每服二錢温水調下或大渴欲飲冷者新汲水尤妙

猪肚丸 治消渴消中

猪肚 乙枚

黃連 五兩

栝藹 四兩

麥門冬

四兩

知母

四兩如無以茯苓代之

右四味爲末納猪肚中線縫安置甌中蒸極爛熟就熱於木臼中搗可丸如硬少加蜜丸如桐子大每服三十九漸加至四五十丸渴則服之如無木白以沙盆中用木杵研亦可以爛爲妙矣

葛根丸 治消渴消腎



葛根 三兩

括萇 三兩

鉛丹 二兩

附子 乙兩

者炮去皮臍用

右四味搗羅為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九日進三服治日飲碩水者春夏去附子

胡粉散 治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹

胡粉

各半兩

括萇

乙兩半

甘草 二兩

半炙

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂

各半兩

右八味為細末水服方寸七日二服壯者一七半一年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹痛

者減之如丸服亦妙每服十九多則腹痛也

三黃丸 主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉

婦人帶下手足發寒熱者

春三月

黃芩

四兩

大黃

二兩

黃連

四兩

夏三月

黃芩

六兩

大黃

兩

黃連

一兩

秋三月

黃芩

六兩

大黃

二兩

黃連

三兩

冬三月

黃芩

三兩

大黃

五兩

黃連

二兩

右三味隨時加減搗為細末煉蜜和丸如大豆大每服五丸日三服不去者加七丸服一月病愈嘗

試有驗矣



人參白朮散

治胃膈癰熱煩滿不欲食或癰成爲消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃真陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身不得潤濕故瘦瘠黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或爲目瘡癰疽瘡瘍上爲喘嗽下爲痿痺或停積而濕熱內甚

不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖無所不載以內經者之但燥熱之微甚者也此藥兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃溢滯壅塞瘡癰痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得宣通并宜服之

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

澤瀉

已上各半兩

連翹

瓜蒌根

乾葛

茯苓



已上各一兩

官桂

木香

藿香

各一分

寒水石

二兩

甘草

二兩

石膏

四兩

滑石

盆硝

各半兩

右為粗末每服五錢水一盞生薑三片同煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加十餘錢無時日三服或得臟腑疏利亦不妨取効更妙後却常服之或兼服消痞丸似覺腸胃結滯或濕熱內甚自利者去大黃芒硝

人參散

治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡寒畜熱寒戰或膈痰嘔吐煩熱煩渴或燥濕瀉痢或目疾口瘡或咽喉腫痛或風昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞嗽一切邪熱變化真陰損虛並宜服之

石膏

乙兩

寒水石

二兩

滑石

四兩

甘草

二兩

人參

半兩

右為細末每服二錢溫水調下或冷水亦得

三消之論劉河間之所作也因麻徵君寓汴梁暇日訪先生後裔或舉教醫學者即其人矣徵君親詣其家求先生平昔所著遺書乃出三消論氣宜病機三書未傳于世者又多不全止取三消論於卷首增寫



六位藏象二圖其餘未遑潤色卽付友人穆子昭子昭乃河間門人穆大黃之後也時覓官于京師方且告因徵君欲因是而惠之由是余從子昭授得一本後置兵火遂失其傳偶於鄉人霍司承君祥處復見其文然傳寫甚誤但依倣而錄之以符後之學者詳爲刊正云時甲辰年冬至日錦溪野老書續方栢亭東久亭寺僧悟大師傳經驗方

治飲水百盃尚猶未足小便如油或如杏色服此藥三五日小便大出毒歸于下十日求除根本此方令子和辯過云是重劑可用悟公師親驗過矣

水銀 四錢

錫

二錢用水銀研成砂子

牡礪

乙兩

蜜陀僧

乙兩 知母 乙兩

紫花苦參 乙兩

貝母 乙兩

黃丹 半兩

瓜蒌根 半斤

右爲細末男子用不生兒猪肚一箇內藥婦人用猪肚一箇麻線縫之新瓦一合繩繫一兩遭米一升更用瓜蒌根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內研爛就和爲丸如猪肚丸法用之

儒門事親卷之十三



令用磁盆內形開黃明為其收皆其去用之

一托更用瓜蔓財末半升洗淨水煮熟取出

蘇散塊一箇煎熟銜之條其一合蘇藥一兩薑米

式為略末與子用不主只蘇塊一箇內藥散入用

貝母五兩

黃丹半兩

瓜蔓財

半兩

蜜刺節五兩

吹耳五兩

紫蘇苦參五兩

水雞四錢

駐和煎過子

二錢用冰雞

此散二兩

儒門事親卷之十四

戴人張子和著

新安吳勉學校

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謔語者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈



病人面黃目青者至期而死重出在下文

病人面黃目赤不死赤如衄血者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面黃目黑者不死黑如苔死

病人面黑目青者不死

病人面目俱黃者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪

入胃經膽氣妄泄目則爲青雖天救亦不可生

病人面赤目白者十日死憂恚思心氣內索面色反好急棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白八日死腎氣內傷病因留損

病人面青目白五日死

病人着牀心痛短氣脾氣內竭後百日復愈能起徬徨因坐於地其上倚牀能治此者也

病人耳目鼻口有黑色起于入口者必死

病人目無精光若土色不受飲食者四日死



病人目精光及牙齒黑色者不治

病人耳目及顴頰赤者死在五日中午

病人黑色出于額上髮際直鼻脊兩顴上者亦死在

五日中午矣

病人黑色出天中下至上顴上者死

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三

日中午矣

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者必死矣

病人面黑直視惡風者死

病人面黑唇青者死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不回直視者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人卧遺尿不覺者死



傷尸事類 卷之十四 三  
病人尸臭者不可治

肝病皮黑肺之日庚辛死

心病目黑腎之日壬癸死

脾病唇青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫唇黃脾之日戊己死

青欲如蒼壁之澤不欲如藍

赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如鵝羽不欲如枯骨

黑欲如黑漆不欲如炭

黃欲如羅裹雄黃不欲如土

目赤色者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃  
色不可名者病在胸中

診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病  
也從外入內者少陽病也

診寒熱瘰癧目中有赤脉從上下至瞳子見一脉一

歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半

二歲半死見三脉三歲死

診牙齒痛按其陽明之脉來太過者獨熱在右右熱  
熱在左左熱熱在上上熱熱在上下下熱



傷寒論卷之十四  
診血者脉多赤多熱多青多痛多黑多黃多痺多赤多黑多青皆見者寒熱身痛面色微齒垢黃爪甲上黃疸也安卧少黃赤脉小而瀉者不嗜食

診百病死生訣第七

診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死

温病三四日已下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治

温病穰穰大熱其脉細小者死千金穰穰作特行

温病下痢腹中痛甚者死不治

温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者生虛緩者死

温病二三日身體熱腹滿頭痛食如故脉直而疾者

八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細強十二日死

八九日頭不疼身不痛目不變色不變而反利脉死

喋喋按之不彈手時時心下堅十七日死

熱病七八日脉不軟一作喘不散一作數者當有瘡

瘡後三日温汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑者死



熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥

熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治

熱病已得汗大熱不去者亦死

熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治

熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必

下利

診人被風不仁痿廢其脉虛者生堅急疾者死

診癩病虛則可治實則死

診癩病脉實堅者生脉沉細者死

又癩疾脉得大滑者久而自已其脉沉小急實不可

療小堅急者亦不可療也

診頭痛目痛久視無所見者死

診人心腹積聚其脉堅強急者生虛弱者死又實強

者生沉者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長

者死腹脹滿便血脉大時絕極下血小疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脉沉則生浮則死

腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生懸澹者死以臟



腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

洞泄食不化不得留下膿血脉微小連者緊急者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死

蚕蝕陰注其脉虛小者生緊急者死

欬嗽脉沉緊者死浮直者浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者

必死欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗若衄其脉小滑者生大躁者死

吐血脉緊強者死滑者生

吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死

上氣脉數者死謂損形故也

上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者

必死

上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死

上氣注液其脉虛寧伏匿者生堅強者死

寒氣上攻脉實而順滑者生實而則逆而者死

太素云寒



氣在上脉滿實何如曰實而滑則生實而逆則死矣  
其形盡滿向如曰舉形盡滿者脉急大堅大滿而不  
應知是者順則生逆則死何謂順則生逆則死所謂  
順者手足溫也逆者手足寒也

病癰脉實大病久可治脉弦小堅急病久不可治

消渴脉數大者生細小浮短者死

消渴脉沉小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細不可治

水病脹閉其脉浮大軟者生沉細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛則死

卒中惡咯血數升脉沉數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死

緊細而微亦生

瘡腰脊強急瘰癧皆不可治

寒熱瘰癧其脉代絕者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

斫瘡出血一二升脉來大二十日死

斫刺俱有病多少血出不自止者其脉來大者七日

死滑細者生

從頭頓仆內有血腹脹滿其脉堅強者生小弱者死

人爲百藥所中傷脉溢而疾者生微細者死洪大而



遲者生千金遲作速

人病甚而脉不調者難治脉洪大者易瘥

人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆  
體不得安靜者死脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏  
必死矣

老人脉微陽羸陰強者生脉大而加加者死陰弱陽  
強脉至而代期月而死

尺脉濇而堅爲血實氣虛也其發痛腹痛逆滿氣上  
行此爲婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕得病以冬  
時忝當赤而死

尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣  
不克病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之左手  
寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸至關關至尺三部  
之位其脉動各異不同其人病仲夏得之此脉桃花  
落而死

右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝浮大而暮沉伏浮  
大卽太過上出魚際沉伏卽下不止關中往來無常  
時復來者榆華枯而死

右手尺部脉三十動一止有須臾還二十動止乍動  
乍踈連連相因因不與息數相應其人雖食穀猶不



愈繁草生而死

右手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循張  
弓弦絀絀然然如兩人共一索至立冬死

病機

諸風掉眩皆屬於肝甲乙木也木鬱達之  
諸寒收引皆屬於腎壬癸水也水鬱泄之  
諸氣廣鬱皆屬於肺庚辛金也金鬱折之  
諸濕腫滿皆屬於脾戊己土也土鬱奪之  
諸痛痒瘡瘍皆屬於心丙丁火也火鬱發之  
諸熱瘡瘕皆屬於火

諸厥固泄皆屬下

下謂下焦肝腎氣也夫守司於下厥固泄皆屬下也厥謂氣逆也固謂禁固也泄謂氣逆上行反謂固不禁出入無度燥濕不恒皆由下焦主

諸病喘嘔皆屬於上上謂上焦心肺氣也炎熱薄燥

承熱分化肺之氣也熱鬱化上故病屬上焦

諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火熱之內作

諸頸項強皆屬於濕太陽傷濕

諸逆衝上皆屬於火炎上之性用也

諸脹腹大皆屬於熱熱鬱於內肺脹於上

諸躁狂越皆屬於火熱盛於胃及四末也



諸暴強直皆屬於風陽內鬱而陰行於外

諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱

諸熱附腫疼酸驚駭皆屬於火

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱反戾筋轉也水液小便也

諸病水液澄清徹冷皆屬寒上下所出及吐出溺出

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之

盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達

而致和平此之謂也五勝謂五行更勝也

標本運氣歌

少陽從本為相火本陰從本濕土坐厥陰從中火是

家陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相

包裹風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可萬病能將

火濕分徹開軒岐無縫鎖

辯十二經水火分治法

膽與三焦尋火治肝和包絡都無異脾肺常將濕處

求胃與大腸同濕治惡寒表熱小膀胱溫惡熱表寒心

腎熾十二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有

寒時攻裏解表細消息濕同寒火同熱寒熱到頭無



兩說六分分來半分寒寒熱中停真浪舌休治風休  
治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時  
莫解表表裏如或兩可攻後先內外分多少敢謝軒  
岐萬世恩爭柰醯雞笑天小

治病

不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病  
未必得法識病得法工中之甲

六陳

藥有六味陳久爲良狼棗半橘枳實麻黃

十八反

本草名言十八反半萸貝欬及攻烏藻戟遂芫俱戕  
草諸參辛芍叛藜蘆

運氣歌

病如不是當年氣看與何年運氣同只向某年來治  
法方知都在至真中

五不及

坎一丁三土五中一七癸九是災宮勝復都來十一  
位誰知臟腑與宮同

斷病人生死

靈樞經云人有兩死而無兩生陽氣前絕陰氣後竭



其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭其人死身色必赤故陰竭則身青而冷陽竭則身赤而溫

#### 四因

夫病生之類其有四焉一者始因氣動而內有所成二者始因氣動而外有所成三者不因氣動而病生於內四者不因氣動而病生於外

因氣動而內成者謂積聚癥瘕瘤氣癭起結核癩癧之類是也

不因氣動而病生於內者謂流飲滯食饑飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類

不因氣動而病生於外者謂瘴氣賊魅蟲蛇蠱毒食鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射刺割持杆之類也如此四類有獨治內而愈者有兼治內而愈者有獨治外而愈者有兼治外而愈者有先治內後治外而愈者有先治外後治內而愈者有須解毒而攻擊者有須無毒而調引者凡此之類方法所施或重或輕或緩或急或收或散或潤或燥或軟或堅方士之用見解不同各擅己心好丹非素故復問之

#### 五苦六辛

五苦六辛從來無解蓋史家闕其疑也一日麻徵君



儒門事親 卷之十四  
以此質疑于張先生先生亦無所應行十五里忽然  
有所悟欣然廻告于麻徵君以為五苦者五臟為裏  
屬陰宜用苦劑謂苦涌泄為陰六辛者六腑為表屬  
陽宜用辛劑謂辛甘發散為陰此其義也徵君大服  
其識鑒深遠鑿昔人不傳之妙故口知其要者一言  
而終不知其要者流散無窮

中出四時百病皆由內而愈者百病皆由內而愈者百病  
食果饗衝藪望望風寒暑熱而後陳陰陽之脈也  
不因陰虛而病生於外者皆謂氣氣相相也

儒門事親卷之十五

戴人張子和著

新安吳勉學校

瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良薑 白芨 瀝青 已上各等分

右為細末嚼芝蔴水同熬為膏入冷水共定用緋  
絹片火熨斗作膏藥貼瘡上

又方千年石灰 茜根燒灰

右為細末用水調雞翎塗上



水沉金絲膏 貼一切惡瘡

瀝青 白膠 已上各一兩 春秋宜用油

夏宜油臍二錢半 冬宜用油蠟四錢

右件鎔開油蠟下瀝青白膠用槐枝攪勻綿子濾過入冷水中扯一千餘遍如瘡透了喫數丸作劑於瘡口填者亦妙攤紙上貼勿令火炙

乳香散 治下疳

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏魚骨

黃連 黃芩 銅碌 已上各等分 麝香少許

右為細末先以溫漿水洗過貼疔瘡上

治蛇傷方

右用蒲公英科根作泥貼于傷處用白麵膏藥貼之大効

紫金丹 治疔瘡

白礬四兩 黃丹二兩

右用銀石器內鎔礬作汁下丹使銀釵子攪之令紫色成也用文武火無令太過不及如有瘡先以週圍挑破上藥用唾津塗上數度着無令瘡乾其瘡潰動取疔出也兼瘡顏色紅赤為効如藥未成就再杵碎炒令紫色



治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡週迴用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤之用緋絹蓋覆如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之

千金托裏散 治一切發背疔瘡

- 連翹 乙兩
- 黃耆 乙兩
- 厚朴 二兩
- 川芎 乙兩
- 防風 一兩
- 桔梗 一兩
- 白芷 乙兩
- 芍藥 乙兩
- 官桂 乙兩
- 木香 三錢
- 乳香 三錢
- 當歸 半兩
- 沒藥 二錢
- 甘草 七兩
- 人參 半兩

右為細末每服三錢用酒一碗盛煎三沸和滓溫服膏子貼之

二聖散 治諸瘡腫

- 黃丹 二兩
- 白礬 二兩

右為細末每服乾摻瘡口上後用保生錠子捏作餅子貼之

保生錠子

- 巴豆 四十九箇另研
- 金脚信 二錢
- 雄黃 三錢
- 輕粉 半匣
- 硃砂 二錢
- 麝香 二錢

右件為末用黃蠟一兩半化開藥將和成錠子冷



水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖膏貼之神聖膏藥 貼治一切惡瘡

當歸兩半 沒藥三錢 白芨二錢半 乳香三錢

藁本兩半 琥珀二錢半 黃丹四兩 木鱉子五箇去皮

膽礬乙錢 粉霜乙錢 黃蠟二兩 白膠三兩

巴豆二十五箇去皮 槐柳枝一百二十條各長一把 清油乙斤

右件一處先將槐柳枝下油內者焦取出次後下其餘藥物煮得極焦亦撈出却將油澄清再熬成

膏子用緋絹上攤貼之

破棺丹

大黃乙兩半 甘草二兩 荆三稜乙兩半 山梔子

二兩半 牽牛末二兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服半丸食後酒半盞研化服之忌冷水

三聖散 治臙瘡疔瘡搭手背疽等瘡

葱白一斤 馬莧一斤 石灰一斤

右三味濕搗為團陰乾為細末貼瘡如有死肉者宜先用潰死肉藥



潰死肉藥方

炊飯尖

半兩各三等

一等半兩入巴豆二箇

一等半兩

入巴豆三箇

一等半兩入巴豆五箇

各熬

作白錠子

右先用二巴豆納瘡如不潰再用納三巴豆又不潰用五巴豆者更用丹砂炒紅色摻瘡口追出清水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖散貼之用膏藥傳之

治臙瘡久不愈者

用川烏頭黃蘗各等分為末用唾津調塗紙上貼

之大有效矣

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之或為細末貼之亦妙

又方 用臘月人中白燒灰油調塗瘡疥上

又方 以瓦松不拘多少陰乾為末先用槐枝葱白

湯洗之過摻之立効灸瘡久不斂者更妙

又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺

替鍼丸 治一切惡瘡

川烏 二錢

草烏 二錢

五靈脂 二錢

輕粉 一分

粉霜 一分



備門專類 卷之十五 五

又方 加斑猫二十箇去足翅用 巴豆二十箇去皮用

右將三件為末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班猫巴豆以水調糊為錠子如作散是謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡

懸蔓一箇 大黃兩乙 金銀花兩乙 當歸半兩

皂角刺兩乙

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者

加黍粘子

治附骨癰及一切惡瘡

當歸兩半 甘草兩乙 山梔子十二箇 木鱉子十二箇

右為細末每服三五錢冷酒調服之

治諸惡瘡

白疆蚕直者 大黃二味各等分

右為細末生薑自然汁與蜜同和為劑丸如彈子

大每服一丸細嚼

治惡瘡死肉錠子

巴豆乙錢去皮油 五靈脂半兩 黃丹二錢飛

加枯白礬乙錢

右為細末以糊和丸錠子入瘡內用之

當歸活血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人

當歸 活血散



產前後腹痛

當歸二錢

沒藥乙錢半

乳香半錢

白芍藥三錢

瘡瘍者加人參木香婦人加赤芍藥

右為細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服日二服婦人酒煎瘡既發不須用

薰惡瘡方

紫花地丁一名米布袋收

右取根曬乾用四箇半頭埽壘成爐子燒着地丁用絡埽填一枚蓋了使令埽眼內煙出薰惡瘡出

黃水自愈

治蛇瘡

用蒲公英科根作泥貼于傷處用白膏藥封之

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣乙箇

金色自然銅

半兩燒紅醋碎研為細末用之

乳香二錢為細末用之

銅錢

重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細

金絲水蛭

乙錢半每箇作三截瓦上煨去氣道為度

沒藥

三錢研細

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明



一宿自破便効如打折骨頭并損傷可用前項接  
骨散半錢加馬兜苓末半錢同好酒一大盞熱調  
連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了  
藥立便止住疼痛此方屢經効驗不可具述服藥  
覩可以食前服食後服又外用接骨藥

陳爛麻根

兩把羊耳  
原已對

亂絲

一握多者更妙

右取肥松節劈碎約量多少先放三兩根於新瓦  
上都於上外三味在上燒着存性就研爲末如生  
再燒研爲度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香  
少許和藥如茶褐色爲度用布條子約纏一遭先

攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用  
軟帛三五重上又竹篦子纏勒得緊慢得中初三  
日換上一次再後五日換一次又七日再換上一  
次無有不接者

赤龍散

消散一切腫毒

用野葡萄根紅者去粗皮爲末新水調塗腫上頻  
掃新水

便癰方

本名血疔

牡礪

大黃

甘草

已上各半兩

懸萋

乙箇

右酒浸露一宿服之以利爲度



又方 冬葵子為末酒調下三兩服

又方 皂角不蛀者燒過陰乾為末酒調服立効皂

角子七箇水調服之亦効

又方 胡桃七箇燒過陰乾研為末酒調服之不過

三服大効

又方 生蜜米粉調服休喫飯利小便為度

治瘡無頭者

蛇退皮於腫處貼之

又方 皂角刺燒灰陰乾

右為末每服三錢酒調嚼葵菜子三五箇煎藥送

下大効

生肌歛瘡藥

白欵

定粉

各等分

黃丹

少許

右同為細末洗淨瘡口乾貼之

治諸瘡水度腫者

生白礬末水調塗之自消

接骨藥

銅錢

半兩醋浸淬  
焦燒研為末

木香

乙錢

自然銅

乙錢

射香

少許

右為極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一



枚乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折其藥反出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨未接再服如前老者十餘日少者不過五七日

萬聖神應丹出箭頭

莨菪科

一名天仙子取着中一科根本枝葉花實全者佳

右於端午日前一日持不語尋見莨菪科言道先生你却在這裏那道罷用柴灰自東南為頭圍了用木楔子擷取了根週迴土次日端午日未出時依前持不語用鑊口一鑊取出土用淨水洗了不令雞犬婦人見於淨室中以石臼搗為泥丸如彈

子大黃丹為衣以紙袋封了懸於高處陰乾如有入着箭不能出者用緋絹盛此藥訖放臍中用綿裹肚繫了先用象牙末於瘡口上貼之後用前藥如瘡口生合用刀子利開貼之

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡口上

又方 以正黃蘗為細末用乳汁調塗瘡口上

又方 以山藥少許生於新瓦上磨為泥塗瘡口上

治手足裂

白芨不以多少為末水調塗裂處



治面上瘡

用礞子底黑煤於小油中以匙打成膏子攤在紙上貼瘡神効

治金瘡血不止

用白薇末貼之立止

善應膏藥

黃丹二斤 南乳香另研 沒藥另研 當歸  
 木鱉子生用 白斂生用 白礬生用 官桂三寸  
 杏仁生 白芷已上各乙兩 新柳枝各長一片  
 右除黃丹乳沒等外八件用芝蔴油五斤浸一宿

用鐵鍋內煎令黃色藥不用次入黃丹鍋內柳條攪令黃色方可撥下用柳枝攪出大煙入乳沒勻令冷傾在磁盆內候藥硬用刀子切作塊油紙裹

接骨丹

五靈脂乙兩 茴香乙錢

右二味為細末另研乳香為細末於極痛處搽上用小黃米粥塗了後用二味藥末搽於上再用帛子裹了用木片子纏了少壯人二日効老者五六日見効矣

治癰如聖丸



黃蘗 黃芩 黃連 防風 已上各半兩

白疆蚕 乙兩 全蝎 三分 輕粉 半錢

右為細末羊蹄根汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二三十丸嚼羊蹄根汁送下隨病人上下分食前後又羊蹄汁塗癬

治小兒癩雜瘡

白膠香 黃蘗 輕粉

右為細末羊骨髓調塗癬上

治癩癰方

班猫 去頭翅足 赤小豆 白疆蚕 苦丁香

白丁香 磨刀泥

右各等分為細末十歲已上服一錢二十已上服二錢五更用新汲水一盞調下比至辰時見効女人小便見赤白色三兩次男子於大便中見赤色白色為効當日服白粘粥不得喫別物大忌油膩患三四者只一服七八年者再一服

玉餅子 治癩癰一切惡瘡軟癬

右用白膠一兩磁器內鎔開去滓再於磁開後以草麻子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙頭柱點水中試硬軟添減膠油如得所量瘡大小



以緋帛攤膏藥貼之一膏藥可治三五癬

又方治瘰癧

小龍肚腸

一條炮乾

鯨殼裙襪

炮

川練子

五箇

牡礪

大黃

牛蒡子

燒存性

皂角子

五十箇

右為細末蒸餅為丸如棗豆大每服十五丸食後

艾湯下日三服

又方將臘月猫糞用新瓦兩箇合在內外用鹽泥固濟燒成灰以小油調塗瘡口上

又方取小左盤龍不以多少為末陳米飯搜和得所丸如梧桐子大每服三五丸却用陳米湯送下

治眉煉頭瘡

小麥不以多少燒冷黑色存性為末以小油調塗

瘡上

治小兒疔瘡

羊糞熬湯洗去痂用屋懸燥炒羅為末以小油塗

瘡上

聖靈丹 治打撲胸損痛不可忍者

乳香

三錢另研

烏梅

五箇去核細切焙乾為末

白蒿苣子

二兩

八錢炒黃

白米

一捻另研細末

右再入乳鉢內研數百下煉蜜為丸如粟大細嚼



熱湯下病在上食後在下食前

出靨方

右用蕎麥楷一擔不爛者燒灰存性入石炭半斤同灰一齊過令火滅然後以熱水霖灰窩淋下灰水用鐵器內煮以捺起攪成膏子於靨上點自出或先以草莖刺破亦可

又方桑柴灰石灰淋汁熬成膏草莖刺破點以新水沃之忌油膩等物

燒湯火方

多年廟上物與走獸爲末小油調塗燒湯火瘡動

又方生地黄汁入小油蠟同熬成膏磁器內盛用雞翎掃盪處

又方培上青苔燒灰小油調塗燒燙處

治燒燙方

生地黄旋取新者爛搗取自然汁入小油黃蠟少許銀石器中熬成膏子用雞翎掃瘡上

又方血餘灰用臘豬脂調塗

又方寒水石燒過爲細末水調塗之

枯瘤方

砒

礪砂

黃丹

雄黃

粉霜

輕粉



已上各等一錢

斑猫二十箇生用

朱砂乙錢

乳香三錢

沒藥乙錢

同研為末粥糊為丸捏作碁子樣爆乾先灸破瘡頂三炷為則上以瘡藥餅蓋上用黃蘗末以水調貼之數日自然乾枯落下

又方以銅碌為末草刺破瘡摻在上以膏藥塗之

治頭面生瘤子用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落

乳香散 貼杖瘡腫痛

大黃 黃連 黃蘗 黃芩 已上各三錢

乳香另研

沒藥各乙錢

腦子少許

右四味為末後入三味冷水調勻攤於緋絹上貼

杖瘡上

治疔瘡

馬明退燒灰三錢

輕粉少許

乳香少許

右研為細末先以溫漿水洗淨乾摻之

治疔瘡久不愈者

海浮石

燒紅醋淬數次

金銀花

右海石二停金銀花一停同為細末每服二錢半如發茶一般日用二服瘡在上食後在下食前服如病一年服藥半年則愈



瀉肺湯 治肺癰喘急坐卧不安

桑白皮

剉燒

甜葶藶

隔紙焙各乙兩

右二味粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服以利為度

桔梗湯 治肺癰吐膿

桔梗

剉炒乙兩半

甘草

炙剉半兩

右為粗末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須臾吐膿立愈

黃蘗散 治鵬窠微腰等瘡

黃蘗

白芨

白斂

已上各等分

黃丹

少許

右為細末涼水調塗

口齒咽喉第二

地龍散 治牙痛

地龍

去土

玄胡索

萹撥

已上各等分

右為細末每用一字用綿子裹隨左右痛於耳內塞之大効

牙宣藥

萹撥

胡椒

良薑

乳香

另研

麝香

細辛

青鹽

雄黃

已上各等分

右為細末先以溫漿水刷淨後用藥末於痛處擦



追出頑涎休吐了嗽數十次痛止忌油膩一二日  
仙人散 刷牙

地骨皮

二兩酒浸二宿

青鹽

乙兩

黍粘子

乙兩半炒

細辛

乙兩酒浸

右為細末入射香少許每用一字臨卧擦牙茶酒

嗽良久吐出

又方

石膏

細辛

柳樵

己上各等分

右為末擦之

治牙疳

米二停

鹽一停

盆碱

射香

少許

白礬

右相合水伴勻紙包裹燒黑焦為末貼瘡上立愈

治牙痛

口噙水水一口用大黃末紙捲隨左右痛處鼻內

任之立止

又方

韶粉

二錢

好朱砂

乙錢

右為末每用少許擦痛處

又方

好紅豆

二錢

花減

少許

右為末隨牙痛處左右鼻內噏之

又方

華細辛

去苗

白茯苓

去皮

川升麻



華撥、青鹽、明石膏、川芎、不蛀皂角去皮

茲酥灸黃色 已上各等分

右為細末早晚刷牙溫水嗽之牙痛處更上少許

又方

以巴豆去皮用針刺於燈焰上灸令煙出薰牙痛處薰三五上

又方 高良薑一塊 全蝎一隻

右為細末先用酸漿水嗽牙次用藥末擦之流下涎水即愈

又方治牙疼 牙坑痛立止

又方 枯白礬去毒 之

治走馬咽痺

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚

又方

用生白礬研細塗於綿針上按於喉中立破綿針以榆條上用綿纏作棗大是也

又一法如左右喉痺於頂上分左右頭髮用手挽拔之剥然有聲立効此法年幼時常見鄭六嫂救人甚多不得其訣近與子正話及方得其傳



又一法以馬勃吹咽喉中立止  
治喉痺

大黃 朴硝 白姜蚕

右件同為細末水煎量虛實用以利為度

口瘡方

白礬 乙兩飛至半兩 黃丹 乙兩炒紅色放下再炒紫色為度

右二味為細末摻瘡上立愈

目疾證第三

治倒睫拳毛

將川山甲以竹篦子刮去肉用羊腰窩脂去皮膜

仍將川山甲於炭上炙令黃色用脂擦去山甲上  
如此數遍令酥為末隨左右眼噙水鼻內噙一字  
一月餘見効

又方

木鱉子 三箇乾炒 木賊 乙百二十節 地龍 二條去土

赤龍瓜 乙百二十箇則勾刺針也

右為細末摘去倒睫每日以紙撚蘸藥噙之一日  
三五次

又方

穿山甲 炮 地龍 去皮 蟬殼 五倍子 已上等分



信... 卷之一五  
右為細末如用藥時先將拳毛摘盡後用藥一字  
隨左右鼻內啗之次日目下如線樣微腫是驗也  
貼赤眼

取青泥中蛆淘淨曬乾為末赤眼上乾貼之甚妙  
貼赤瞎

蘆甘石<sub>二兩</sub> 密陀僧<sub>乙兩</sub> 黃連 朴硝

右方先將黃連用水熬成汁入童子小便再同熬  
後下硝又熬少時用火煨爐甘石紅黃連汁內淬  
七次與密陀僧末同為末臨卧貼之

貼赤眼

銅碌 輕粉 牙硝 腦青<sub>少許</sub> 麝香

右為細末乾貼之

截赤眼方

黃連 綠礬 杏子 甘草 銅碌 各等分

右為粗末水煎洗甚効

碧霞丹 治赤眼暴發并治赤瞎

銅碌 白土 芒硝

右件各分為末丸如皂子大每用白湯研化一丸  
洗之立効

汾州郭助教家神聖眼藥



麤仁乙 二兩 金精石二 兩 銀精石二 兩 爐甘石四 兩

燒赤石脂乙 兩 滑石二 兩 密陀僧二 兩 高良

薑三 兩 秦皮乙 兩 黃丹乙 兩 飛過 銅碌三 錢 礶砂

三錢 礶砂乙 錢 乳香三 錢 盆硝少 用 青鹽

腦子 射香 已上并少用之

右用東流水三升先入麤仁次下餘味等白沙蜜一斤熬至二升以線絹細濾過澄清入前藥攪之勻點大効

視星膏

白沙蜜一斤 棟去蜜滓可 蜜陀僧乙 兩 金色

水淘可得六七錢 新柳筭子四兩去皮心

右用臘雪水五升與蜜鎔調入藥與柳筭子同貯於磁瓶中以柳木塞瓶口油絹封勒於黑豆鍋中熬從朝至暮仍用柳捧閣瓶防傾側用文武火另添一鍋豆水滾下旋於另鍋中取水添之熬成用重綿濾淨却入瓶中用井水浸三兩日埋在雪中更妙頻點為上

復明膏 治外障

白丁香 鷹月收者九佳 棟黃連乙 兩 防風去

對一指 新柳枝方一寸



右好四味用新水一升半雪水更妙春秋兩三時  
冬月一宿以銀石器內熬至六分瀝去滓另用蜜  
一斤蜜陀僧研極細末三字入蜜攪勻另熬以無  
漆匙撩點下蜜中急攪候沸湯定一人攪蜜一人  
旋又攪藥汁都下在內攪勻再熬三兩沸色稍變  
用新綿三兩重瀝去滓盛器內點眼如常本方每  
藥半合用片腦一麥粒大不用亦可

錠子眼藥

黃丹乙兩 黃蘗半兩 黃連半兩 枯白礬  
爐甘石半兩用黃連製 銅碌兩 硃砂三錢

川烏三錢

乾薑二錢

蝎稍乙錢

信半錢 火燒

乳香少許

沒藥少許

右爲細末入豆粉四兩澆蜜和就如大麥許錠子  
於眼大眦頭待藥化淚出爲効

治冷淚目昏

密蒙花 甘菊花 杜蒺藜 石決明 木賊  
去節 白芍藥 甘草 各等分

右爲細末茶清調下一錢服半月後加至二錢

又方 乾薑肥者爲末每用一字浸湯點洗

又方 貝母一枚膩白者胡椒七粒爲末點之



單治目昏

荊芥穗 地骨皮 楮實 已上各等分

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九米湯下

治一切目昏

川椒乙斤微炒搗取 甘菊花四兩末之

生地黄乙斤取新者作泥極爛

右將地黃泥與前藥末同和作餅子透風處陰乾

再為末以蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後

茶清送下

洗眼黃連散

當歸 赤芍藥 黃連 黃柏 各等分

右細剉以雪水或甜水濃煎汁熱洗能治一切風

毒赤目

諸物入眼中

好墨清水研傾入眼中良久即出

點攀睛瘀肉

黃丹乙兩二錢水飛過泣乾 白礬乙兩銀器內化成汁

右將白礬於銀器內化成汁入黃丹末在內以銀

匙兒攪勻更入乳香沒藥各一錢慢火不住手攪

令枯乾為粉候冷研極細熟絹羅過後入鷹條一



錢半血竭二分射香少許輕粉三分粉霜二分共  
研極勻如粉再以熟絹羅過細末點之大有神効  
古金散

芒硝兩乙 螺青 沒藥 乳香 已上各少許

右為細末每用少許鼻內噴之

治雀目

真正蛤粉炒黃色為細末

右油蠟就熱和為丸如皂子納於猪腰子中麻纏  
蒸熟食之可配米粥

頭面風疾第四

治黥黯風刺方

苦參斤乙 紅芍藥 冬苳 二味各四兩

玄參兩乙

右為末每用一字用手洗面上

猪蹄膏洗面上黥藥

右用猪蹄一副刮去黑皮切作細片用慢火熬如  
膏粘用羅子濾過再入鍋內用蜜半盞又用

白芷 黑豆去皮 瓜蒌筒乙 白芨 白薇

苓苓香 藿香 各一兩 鵝梨二箇細切

右將七味藥為末同梨入藥一處再熬滴水不散



方成以絹漚過臨卧塗面次日用漿水洗面

治面風

益母草灰麴湯和燒七遍洗面用之

治面黥黑斑點方

白附子乙兩 白芨 白蘞 蜜陀僧 胡粉

白茯苓 已上各等分

右為細末洗淨臨卧以乳汁調一錢塗面但洗光  
淨牛乳亦可

治頭風

苦丁香 川芎 藜蘆 各等分

右為細末噙水鼻內嚙之

芎黃湯 治頭目眩運

大黃 荊芥穗 貫芎 防風 已上各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服之以利為度

耳聾方 草麻子五十箇去皮

右與熟棗一枚同搗丸如棗子大更入小兒乳汁  
就和每用一丸綿裹納於聾耳內覺熱為度一日  
一易如藥難丸日中曝乾

又方口噙甘草一枚耳中塞二塊用綿裹立通

腦宣方



皂角不蛀者去皮弦子蜜炙搥碎水中揉成濃汁熬成膏子鼻內疳之口中咬筋良久涎出為度

治耳底方

以枯白礬為末填於耳中立効

治鼻中肉螻蛄

赤龍爪

苦丁香

已上各三十箇

苦葫蘆子

不以多少

射香

少許

右為末用紙撚子點藥末用之

臍臭方

烏魚骨

三錢

枯白礬

三錢

蜜陀僧

乙錢

右為末先用漿水洗臍處後用藥末擦之

又方蜜陀僧不以多少研細先以漿水洗臍處乾擦烏頭藥

細針沙

炒

蕎麵

炒

已上各一盞

大麥

亦同

醱醋半升與前二味打糊

凡用先使皂角水熱洗淨時前二味糊稀稠得所於髭鬚上塗之均勻先用荷葉包次用皮帽裹之三五時辰用溫漿水洗了却收取元針沙其髭髮淨後用黑藥塗之黑藥方

沒食子

石榴皮

乾荷葉

另搗

已上各一兩



五倍子 柯子皮 百藥煎 金絲礮

礮礮 另研旋點諸藥

右將七味為細末炒熟麪五六匙入好醋打麪糊和藥末再塗髭鬚又用荷葉封裹後用皮帽裹之三五時間洗淨甚黑若更要黑光用猪膽漿水澤洗如鴉翎

又方 酸石榴 五倍子 芝蔴葉

右同杵碎用絹袋盛之於鉄器內水浸掠髮自黑治大頭病兼治喉痺方歌曰

人間治疫有仙方 一兩疆蚕二大黃

薑汁為丸如彈大 井花調蜜便清涼

又法 砭針刺腫處出血立効

治時氣

馬牙硝 寒水石 黍粘子 鬼臼 川大黃

鬼箭草 已上各等分 腦子 少許

右六味為細末用新井花水一盞藥末一二錢入腦子喫外一半留用新水得稠雞翎掃在腫處有風涼處坐

解利傷寒第五

雙解丸



巴豆

六箇去皮油

天麻

二錢半

胭脂

少許

右將巴豆天麻為末滴水丸如秫米大胭脂為衣一日一九二日二丸三日三丸已外不解先喫冷水一口後用熱水下如人行十里以熱湯投之又一法無藥處可用兩手指相交緊扣腦後風府穴向前禮百餘拜汗出自解

又一法適於無藥處初覺傷寒傷食傷酒傷風便服太和湯百沸湯是避風處先飲半椀或以薑汁亦妙以手揉肚覺恍惚更服半椀又用手揉至恍惚更服以至厭飫心無所容探吐汗出則已

不卧散

川芎

乙兩半

石膏

七錢半

藜蘆

半兩去土

甘草

二錢半生

右為細末口噙水鼻內各噴之少時喫白湯半椀汗出解之

川芎湯

解利一切傷寒

川芎

藁本

蒼朮

右三件為細末沸湯點三錢須臾覺嘔道便解如不解再服之

諸腰脚疼痛第六



皂角膏

右用醇酒二大椀皂角一斤去皮弦搗碎熬至一半沸去滓再用前汁入銀石器熬為膏子隨痛處貼之

治腰脚疼痛方

天麻

細辛

半夏

已上各二兩

右用絹袋二箇各盛藥三兩者煮熟交牙慰痛處汗出則愈

牛黃白朮丸

治腰脚濕

黑牽牛

大黃

各二兩

白朮

乙兩

右為細末滴水丸桐子大每服三十九丸食前生薑湯下如要快利加至百丸

婦人病證第七

如聖丹

治婦人赤白帶下月經不來

枯白礬

蛇床子

已上各等分

右為末醋打麵糊丸如彈子大以胭脂為衣綿子裹納於陰戶如熱極再換

洗洗丸

療婦人無子

當歸

熟地黃

已上各二兩

玄胡索

澤蘭

已上各一兩半

川芎

赤芍藥



白薇 人參 石斛 牡丹皮 已上各一兩

右為末醋糊為丸每服五十九丸桐子大空心酒下

當歸散 治月經欲來前後腹中痛

當歸以米醋微炒 玄胡索生用 沒藥另研 紅花生用

右為末温酒調下二錢服之

治產婦橫生 草麻子三十箇

研爛婦人頂上剃去髮少許以上藥塗之須臾覺

腹中提正便刮去藥却於脚心塗之自然順生也

治血崩 蚕沙不以多少

右為末每服三五錢熱酒調下服

又方 管仲去須剉碎

或用酒醋煎三錢煎至七分去滓温服一服立止

當歸散 治血崩

當歸乙兩 龍骨乙兩燒赤 香附子三錢炒

搜毛灰半兩

右為細末空心米飲調下三四錢忌油膩雞猪魚

兔等物

蓮殼散

乾蓮蓬燒灰存性 搜欄皮及毛各燒灰已上各半兩

香附子炒一錢



右為細末每服三四錢空心米飲湯調下服之

治婦人血枯 川大黃

右為末醋熬成膏就成雞子大作餅子酒磨化之

三分散 治產後虛勞不進飲食或大崩後

白木 茯苓 黃耆 川芎 芍藥 當歸

熟乾地黄 已上各一兩 柴胡 人參

已上各一兩六錢 黃芩 半夏洗切 甘草炙

已上各六錢

右為粗末每服一兩水一大盞煎至半盞去滓溫

服日二服

治產後惡物上潮痞結大小便不通

芒硝 蒲黃 細墨 各等分

右為末用童子小便半盞水半盞調下服之

治婦人產後虛弱和血通經

當歸焙 芍藥 香附子三兩炒

右為細末每服一二錢米飲調下服之無時

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝 竈底焦土研細

用酒調三五錢瀉出惡物立止

治娠婦下痢膿血及咳嗽



傷風事類 卷之十五

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末每服三五錢水煎去滓食前加桑皮止嗽

百花散 治婦人產中欬嗽

黃蘗 桑白皮 用蜜塗至慢火炙黃色為度 二味各等分

右為細末每服一二錢水一盞入糯米二十粒同

煎至六分以欬冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫

服之

治婦人吹妳

以樺皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之

又方 馬明退 燒灰五錢 輕粉 三錢 射香 少許

右為細末每服二錢熱酒調下服之

又方 以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字下得

喉嚨笑呵呵

又方 以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹簫枝透

乳孔甚妙

欬嗽痰涎第八

九仙散

九尖草麻子葉 三錢 飛過白礬 二錢

右用猪肉四兩薄批碁盤利開摻藥二味荷葉裏文武火煨熟細嚼白湯送下後用乾食壓之



止嗽散

半夏乙兩半湯洗七次

枯白礬四兩

右二味為末生薑打麵糊和丸桐子大每服三三十九丸空心溫酒送下

八仙散

款冬花 佛耳草 甘草 鍾乳 鵝管石

白礬 官桂 井泉石 已上各等分

右為細末每服三錢水煎服之又一方摻日喉中

三才丸 治嗽

人參 天門冬去心 熟乾地黄 已上各等分

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大含化服之

三分茶 茶二錢 蜜二兩 蕎麥麵四兩

右以新水一大椀約打千餘數連飲之飲畢良久下氣不可停人喘自止

石膏湯 治熱嗽

石膏亂文者一兩 人參半兩去蘆 甘草半兩炙

右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

三生丸 治嗽

胡桃仁乙兩 生薑乙兩去皮細切 杏仁乙兩



右二味同研為泥就和作劑可得十三四丸臨卧爛嚼一九可數服即止

化痰延壽丹

天麻

半兩

枸杞子

二兩

白礬

乙兩半半生

半夏

乙兩半湯洗七次用

乾生薑

乙兩

人參

乙兩

右為細末好糯酒拌勻如砂糖用蒸餅劑蒸熟去皮杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如小豆大每服三五丸生薑湯下

半夏湯

治噦欲死者

半夏

乙兩洗

生薑

一兩

右二味細切水二盞煎至八分去滓作二服食後

治肺痿喘嗽

漢防己

右為細末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓

溫服之

治年高上氣喘促睡卧難禁

右蘿蔔子搗羅為末白湯浸調五七錢食後服之或炒或用糖蜜作劑為丸服之

麻黃湯

治因風寒衣服單薄致嗽

麻黃

不去節

甘草

生用

杏仁

生用

右為粗末每服三二錢水煎食後溫服



心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛并男子小腸氣

五靈脂 半兩 蒲黃 半兩炒

右為末每服三錢醋半盞煎二沸再入水半盞再煎二沸空心食前和滓溫服之

又方 醋一盞加生白礬一小塊如皂子大同煎至七分溫服立愈

又方 高良薑 半兩 山梔子 半兩 蔚金 半兩

又方 以新嫩槐枝一握切去兩頭水二盞煎至一盞去滓分作二服熱服之

又方 沒藥 乳香 薑黃 玄胡索 已上各等分

右為末每服三錢水煎食後服之

小腸疝氣第十

抽刀散

川練子 乙兩破四分巴豆三箇同炒黃色去巴豆用之

茴香 乙兩鹽炒黃色去鹽用之

右為細末每服三錢葱白酒調下空心服之

治陰痛不可忍

吳茱萸 二兩洗七遍焙乾微炒 檳榔 乙兩 茴香 乙兩

右為細末醋糊為丸熱酒送下十九食前服之



治偏腫 茴香 甘遂

右二味各等分爲末酒調二錢食前服之

又方 巴戟去心 川練炒 茴香炒

各等分爲末溫酒調二錢服之

治小兒疝氣腫硬

地龍不去土 爲末唾津調塗病處

治小腸氣痛

全蝎乙兩 茴香乙兩炒黃

右爲細末醋糊和丸如梧桐子大如發時每服五  
七十九丸溫酒送下食前服之

治小便渾濁如精之狀

沒藥 木香 當歸 已上各等分

右爲末以刺棘心自然汗爲丸如梧桐子大每服  
五七丸食前鹽湯下

治小便頻滑數不禁

知母 黃蘗 已上各等分

右剉碎酒浸透炒微黃爲末水丸梧桐子大如服  
藥前一日休喫夜飯來日空心立服米飲湯下一  
百丸只用一服効後喫淡白粥一頓

蕩痼丹



川練子炒 苜

黑牽牛二錢

廣茂四錢 木

右八味為細末用

空心食前溫酒下

灸疝法 放疝邊取

腸風下血第十

神應散 治腸風痔

牛頭角腮九隻

九片或圓取或方取或一字取

右五味鉅碎盛在小

乾瓶口微露出烟用

放冷為細末如服時

半箇如糊用溫醇酒

日交五更服藥驗症

用水半大碗醇糯酒

辰時再服

又一服再依前服藥

忌油膩魚蟹雞兔

溫白丸 治臟毒下血



椿根白皮

凡引者去粗皮酒浸晒乾服

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服三五十九淡酒送或酒糊丸

治脫肛痔瘻

胡荽子

升一

乳香

許少

粟糠

半升或一升

右先泥成爐子止留一小眼可抵肛門大小不令透煙火薰之

治脫肛

蔓陀羅花子

蓮殼

對一

椽椀

十升

右搗碎水煎三五沸入朴硝熱洗其肛自上

治痔漏下血不止

紫皮蒜

十箇獨科者妙

大椒

六十箇

豆豉

四兩

右搗爛爲泥丸彈子大空心細嚼一丸塩湯下日進三服効

治痔漏

白牽牛頭末

四兩

沒藥

一錢

右同爲細末如欲服藥先一日不食晚飯明日空心將獐猪精肉四兩燒令香熟薄批摻藥末在內暴之漸又細嚼食盡然後用宿蒸餅壓之取下膿血爲効量病大小虛實加減服之忌油膩濕麵酒



色三日外不忌一服必効或用淡水煮肉熟用上法亦可又云服前一日不食午飯并夜飯明日空心用之

又方 黑白牽牛一合炒黃為末猪肉四兩切碎炒熟與藥末攪勻只作一服用新白米飯三二匙壓之取下白虫為効

又坐藥黑鯉魚鱗二三甲以薄綿罽裹如棗柱樣納之痛即止

淨固丸 治痔漏下血痒痛

槐花炒

枳殼去穰

已上各一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九粒飲湯下空心食前十服見効

黃連貫衆散 治腸風下血

黃連

雞冠花

貫衆

大黃

烏梅

已上各

甘草

三錢

枳殼

炮

荆芥

已上

各二兩

右為細末每服二三錢溫米飲調服食前

槐荆丸 治痔漏

荆芥槐花等分為末水煎一大椀服丸亦可為之

又方

豆豉炒

槐子炒

各等分

右為末每服一兩水煎空心下



薰漑藥 鳳眼草 赤皮葱 椒

三味搗粗同漿水滾過坐盆令熱氣薰痔但通手  
漑之如此不過三次愈矣

小兒病證第十二

治小兒脾疳 蘆薈 史君子 已上各等分

右為細末米飲調下一二錢服之

土筋散 治小兒馬脾風

甘草 一寸煎水 甘遂末 一字

右同油蜜生薑銀釵兒攪調下後用冷水半盞調

奪命散

奪命散 治小兒胸膈喘滿

檳榔 大黃 黑牽牛 白牽牛 各等分皆

當各半生熟用之

右為細末蜜水調服之

治小兒班瘡入眼

麩炒蒺藜炙甘草 羌活防風等分搗

每服二錢漿水下 撥雲見日直到老

治瘡疹黑陷

鐵腳威靈仙 一錢炒末 腦子 一分

右為末用溫水調下服之取下瘡痂為効



治小兒黃瘦腹脹 乾雞糞 一兩 丁香末 一錢

右為末蒸餅為丸如小豆大每服二十九米湯下

黃連散 治小兒頭瘡

川黃連 黃蘗 去粗皮用 草決明 輕粉 已上各等分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗之立愈

治班瘡倒壓方

胡桃 一箇燒灰存性 乾胭脂 三錢

右為末用胡荽煎酒調下一錢服之

又方 人牙燒灰存性研入射香少許每服三錢温

酒調下少許服之不拘時

又方 小豬兒尾尖取血三五點研入腦子少許新

水調下食後與服之

又方 人中白臘月者最佳通風處以火煨成煤木

調三五錢隨者自出

消毒散 治瘡疹已未出咽喉腫痛

牛蒡子 二兩炒 甘草 半兩剉炒 荆芥 乙分

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓温

服不拘時

治小兒癰瘡入眼

猪懸蹄甲 二兩甘鍋內鹽泥固齊燒焦為末用 蟬殼 二兩去土取末乙兩



羚羊角 鎊為細末  
研之用

右二味為末研入羚羊角細末一分拌勻每用一字百日外兒服半錢三歲已上服三錢新水或溫水調下日三四服夜一二服一年已外則難治之

又方 透耳藥

朱砂 乙錢

粉霜 八分

右研為細末水調少許用匙杓頭傾一兩點於耳內中後用

白菊花

菘豆皮

穀精草

夜明沙

右四味為末用米泔半椀熬成去滓入乾柿十餘

箇再同熬每日喫三兩箇仍飲煮乾柿湯

又方 治小兒班瘡入眼

朱砂 腦子 水銀 射香 已上各等分

右四味研為細末用水銀調滴入耳中

發班藥 珠子七箇研碎用新水調勻服之

破傷風邪第十三 陰毒傷寒亦附於此

辰砂奪命丹

鳳凰臺

川烏頭

生已上  
各二錢

射香 少許

朱砂 少許

右為細末棗肉和為丸如彈子大朱砂為衣鯁酒送下量病人年甲虛實加減用之小兒半丸以吐



爲度不止以葱白湯解之

治破傷風

病人耳塞并爪甲上刮末唾津調塗瘡口上立効  
無瘡口者難用

治破傷風

烏稍尾 乙箇

兩頭尖 四箇

全蝎 四箇

右三味爲細末另用石灰五升柴灰五升沸湯五  
升淋灰水澄清下藥熬之鐵鑄器內攪成膏子如  
稠用唾津調先用溫漿水洗淨瘡口後塗藥即時  
藥行吐黃水一日以新水漱口卽愈

又方 天南星

半生半熟

防風

去蘆二味各等分

右爲末清油調塗瘡上追去黃水爲驗

又方 白芷

生用

草烏頭尖

生用去皮二味等分

右爲末每用半錢冷酒一盞入葱白少許同煎服  
之如人行十里以葱白熱粥投之汗出立愈甚者  
不過二服

又方 蜈蚣散

蜈蚣頭

烏頭尖

附子底

蝎稍

四味各等分

右爲細末每用一字或半字熱酒調下如禁了牙  
關用此藥幹開灌之



治陰毒傷寒破傷風

草烏頭

七箇文武火燒熟去牙頭

麝香

半錢

朱砂

乙錢

右為細末每服一字以熱酒調下食前服之汗出為度忌猪兔魚鱉粘穀肉

治陰毒病者

用芥末以新水調膏藥貼臍上汗出為効

又方牡礪乾薑末新水調塗手心握外腎汗出為効

諸風疾證第十四

不老丹 治一切諸風常服烏髭注顏明目延年

蒼朮四斤

米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子肉乙斤用椒三兩去白炒黃去椒

乙斤鹽三兩炒黃去鹽乙斤好醋一升煮泣盡

何首烏二斤

米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子用瓦甑蒸先鋪黑豆三升乾

棗二升上放何首烏上更鋪棗二升黑豆三升用炊單復著上用盆合定候豆棗香熟取出不用棗

地骨皮

去粗皮重二斤

右件於石臼內搗為細末後有椹汁搜和如軟麵劑相似磁盆內按平上更用椹汁藥上高三指用紗綿帛覆之晝取太陽夜取太陰使乾再搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下六十丸忌五辛之物

四仙丹



春甲乙採杞葉

夏丙丁採花

秋庚辛採子

冬壬癸採根皮

右為末以桑椹汁為丸每服五十九茶清酒任下起死神應丹 治癱瘓四肢不舉風痺等疾

麻黃

去根節河水五升熬去滓可成膏子五斤

白芷

二兩 桑白皮

二兩

蒼朮

二兩

甘松

二兩

川芎

三兩

苦參

三兩

加浮萍

二兩

已上各為細末用膏子和丸如彈子大每服一丸溫酒一盞化下臨卧服之微汗出勿慮如未安隔三二日再服手足即時軟快及治卒中風邪涎潮

不利小兒驚風服之立効

愈風丹

芍藥

川芎

白僵蚕

炒

桔梗

細辛

去葉

羌活

已上各半兩

麻黃

去節

防風

去蘆

白芷

天麻

全蝎

炙已上各乙兩

甘草

三錢

南星

半兩生薑製用

朱砂

半兩為衣

為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒吞下

香芎散 治偏正頭風

貫芎

香附子

炒

石膏

亂紋者良水飛

白芷

甘草

薄荷

已上各乙兩

一方川烏頭

半兩炮去臍皮用之



右為細末每服二錢溫酒或茶清調下服之  
妙功十一丸 治癩

丁香 木香 沉香 乳香 射香 荆三稜

炮廣茂 炮黑牽牛 微炒黃連 雷丸

鶴虱 炒胡黃連 黃芩 大黃 焙陳皮

青皮 雄黃 熊膽 甘草 炙各二錢半赤小豆

三百六十粒煮白丁香 直尖者二百六十箇輕粉 四錢巴豆 七粒

右二十三味為細末赤小豆爛煮研泥同蕎麵打糊和作十一丸朱砂為衣陰乾服時水浸一宿化一丸大便出隨病各有形狀取出為驗或作化一

番不可再服曾經火灸者不治遠年愈効

朱砂滾涎散 治五癩

朱砂 飛水白礬 生用赤石脂 消石 已上各等

右同為細末研蒜膏如丸菴豆大每服三十九食

後荆芥湯下

又方 末砂不以多少水飛研為細末

右用猪心血浸蒸餅為丸如菴豆大每服二十九

空心金銀湯下之

治諸風疥癬及癩

浮萍 乙兩荆芥 川芎 甘草 麻黃 已上各半



或加芍藥 當歸

右為粗末每服一兩水一椀入葱白根豆豉同煎至一半無時服汗出為度

治癩塗眉法

半夏生用 羊糞燒 已上各等分

右為末生薑自然汁調塗

五九散 治癩

地龍去土 蟬殼 白僵蚕 凌霄 全蝎

已上各等九箇

右同為末只作一服熱酒調下浴室中汗出粘臭

氣為効

苦參散 治癩風

苦參取頭末 秤二兩 猪肚已箇

右以苦參末摻猪肚內用線縫合隔宿者軟取出洗去元藥先不喫飯五頓至第二日先飲新水一盞後將猪肚食之如吐了再食之食罷待一二時用肉湯調無憂散五七錢取出小虫一二萬為効後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子搥碎用水四椀煮至一椀用生絹瀝去滓再入苦參末攪熟稀麵糊膏子相似取出放冷後入餘藥相和藥附後



何首烏 二兩

防風 乙兩

芍藥 五錢

人參 三錢

當歸 乙兩

右爲細末入皂角膏子爲丸如桐子大每服三五  
十丸温酒或茶清送下不拘時候日進三服後用  
苦參荆芥麻黃煎湯洗冷

水腫黃疸第十五

治通身黃腫

苡蒂焙乾三四錢

右爲細末每用半字於鼻內吹上日一度併吹三  
日如不愈後用黃芩末之煎湯五錢下

治蠱氣

取環腸草不以多少曝乾水煎利小便爲度

治黃疸面目遍身如金色

瓜蒂 乙十

母丁香 乙箇

黍米 四十九粒

右先搗瓜蒂爲末次入二味同爲細末每用半字  
夜卧令病人先嚙水一口兩鼻內各半字吐了水  
令病人便睡至夜或明日取下黃水旋用熟帛搵  
了直候取水定便服黃連散病輕者五日重半月

黃連散 治黃疸大小便秘澁壅熱

黃連 三兩

川大黃 乙兩

剉碎醋拌炒過用之

黃芩

甘草



各一兩

右為細末每服二錢食後溫水調下一日三服

治水腫不利小便非其法也故內經云濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之吐瀉後長服益元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣大忌腳膝上針刺出水取一時之効後必死矣充忌房室濕麵酒醋鹽味犯之必死

木通散 治水腫

海金沙 舶上茴香 巴戟 大戟 甘遂  
芫花 木通 滑石 通草 已上各等分

右為細末每服三錢以大麥麵和作餅子如當二錢大爛嚼生薑湯送下

下痢泄瀉第十六

治痢

紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮 已上各等分  
右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒  
燒服之後用白湯送下食前

治痢

杜蒺藜炒碾為末酒調下三兩服

香鼓丸 治痢



蒜為泥

豉為末

右二味相和作丸如梧桐子大米飲湯下五七十丸食前服之

治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞閉

五靈脂 青皮 陳皮 硫黃 芒硝已上各等分

右將硝黃於銚子內以文武火鎔開用匙刮聚自然結成砂子取出研碎與前三藥同末麵糊為丸如菽豆大小是麻子黃米大每服二十丸量虛實加減米飲湯送下無時

又方治瀉 車前子不以多少右為細末每服二錢

米飲湯調下服之水穀分吐瀉止

諸雜方藥第十七

治消渴 揀黃連 二兩八九節者良

右剉如吹咀以水一椀煎至半椀去滓頓服立止  
百日還丹

佛茄子 樟柳根 已上各等分

為末枸杞汁和丸如雞頭大每服十丸新水送下  
酒癥丸

巴豆十六箇 全蝎十五箇 椎黃乙塊 白麵五兩

右為末滴水丸如椀豆大每一丸如痛飲者二丸



立應丸 治臟腑泄痢膿血不止腹中疼痛

乾薑

乙兩炮

百草霜

乙兩

巴豆

連皮乙兩炒用

杏仁

乙兩同巴豆和皮炒黑色并為泥後入霜研用

右用黃臘四兩鎔開臘次入前四味用鉄器攪勻旋丸桐子大每服三五丸甘草湯下白痢用乾姜湯下食前若水瀉温水下

反胃 黃蘗末熱酒調三五錢食後服之

治小便多

滑數不禁

金剛骨為末以好酒調下三錢服之

又方

白茯苓

去黑皮

乾山藥

去皮白礬水內湛過慢火焙乾用之

右二味各等分為細末稀米飲調下服之

治卒淋痛

芫花散

三錢

茴香

二錢微炒黃名

右為細末水煎服之

治疝方

以水調白麵稀稠得所糊疝上以紙封之明日便乾如不曾破者剥去麵便行

治大便秘

生麻子不以多少研爛水調服之坐劑治大便久秘攻之不透者用之



又用蜜不計多少慢火熬令作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪作劑搓作劑樣如棗核大粗如筋長一寸許蘸小油內于肛門中坐良久自透有加鹽少許以素問鹹以軟之

交加飲子 治久瘡不已山嵐瘴氣

肉苳蔻 十一箇麵裹燒一箇 草苳蔻 二箇同上法用 厚朴 二

一半生用一半熟用生薑汁製過用 甘草 二寸半一半生用一半炙用

生薑 一塊如棗紙裹煨過半生半熟

右為末每服分一半水一椀銀石器內煎至一大盞去滓溫服發日空心未愈則再服

天真丸 補虛損

佛袈裟男用女女用男以新水四擔洗盡血水以酒煮爛為泥

葳靈仙 兩乙 當歸 兩半 確砂 兩乙 蓮子肉 三兩炒熟

乾地黄 酒浸兩 廣茂 兩半 甘草 兩二 牡丹皮 兩乙

牛膝 酒浸兩 木香 兩半 白朮 兩乙 白茯苓 兩乙

右為細末與君主同搗羅為細末酒浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十九三進日服

取雕青

水蛭取陰乾為末先以白馬汗擦青處後用白馬



汗調藥塗之

治蚰蜒入耳中

右用猫尿灌耳中立出取猫尿用盆盛猫以生薑

擦牙大妙

又方 黑驢乳灌耳中亦出

又方 以湿生虫研爛塗於耳邊自出

辟穀絕食第十八

辟穀方

大豆五升 洗淨蒸三遍 去皮為細末

蒸二遍令口開 去皮為細末用

糯米五升

淘淨同白茯苓 一處蒸熟用之

大麻子五升 湯浸一宿鹿出

白茯苓五兩

去皮同上糯米 一處蒸熟為用

右將麻仁末一處搗爛如泥漸入豆黃末同和勻

便團如拳大再入甑蒸從初更着火至半後夜住

火至寅時出甑午時曝乾搗為末服之以飽為度

不得喫一切物用麻子汁下第頓一月不饑第二

頓四十日不饑第三頓一千日不饑第四頓永不

饑顏保日增氣力加倍如渴飲麻仁汁轉更不渴

滋潤五臟若待喫食時分用葵菜子三合為末煎

湯放冷服之取其藥如後初間喫三五日自米稀

粥湯少少喫之三日後諸般食飲無避忌此藥大



忌欲事

又方 茯苓餅子

白茯苓四兩為末 頭白麵一二兩

右同調水煎餅麵稀調以黃臘代油燂成煎餅臘  
可用三兩飽食一頓便絕食至三日覺難受三日  
後氣力漸生熟菓芝蔴湯米飲凉水微用些小潤  
腸胃無令涸竭開食時用葵菜湯并米飲稀粥少  
少服之

又方 保命丹

人參五兩 麻子仁二兩炒 乾地黄 瓜蒌子

炒 兔絲子酒浸已上

兩 大豆黃一升煮 黑附子乙兩生用乙兩

白茯苓 茯神 地骨皮去粗皮 蔓精子煮熟

杏仁去皮尖炒 麥門冬炒去心用 地膚子蒸七遍

黍米作粉 粳米作粉 白糯米作粉 天門

冬去心 車前子蒸 側柏葉煮三遍已上各二

石司為細末各揀選精粹者臈月內合者妙他時  
不可合日月夾蝕不可合如合時須揀好日淨室  
焚香志心修合勿令雞犬婦人見又將藥末用臈  
一斤半瀝去滓白蜜一斤共一斤半一處溶開和



勻入臼杵二千下微入酥油丸如梧桐子大每服  
十九服至五日如來日服藥隔宿先喫糯米一頓  
粳米白麵皆可次日空心用糯米粥飲送下如路  
行人服遇如好食喫不妨要止便止如喫些小蒸  
餅爛嚼嚥或乾果子以助藥力不喫更妙忌鹽醋  
日後退下藥來於長流水中洗淨再服可百年不  
饑矣



諸國將領... 子以助藥力不... 妙...  
日... 下... 藥... 於... 長... 水... 中... 洗... 淨... 再... 服... 可... 有... 奇... 效...  
後天



