



武
130
卷

傷寒譯通序

香齋


佩
叔
蘭

弄珪玉者必有温潤之象。佩叔蘭者必有酷烈之氣焉。於戲仲景氏傷寒一書神思妙合。為古今絕世醫宗。其論治辨證。廣惠于後人。後人亦無復有毫髮異議也。然近世欲學此經者。穿鑿失真。鹵莽滅裂。靡能澄其流而溯其源也。豈不深為痛惜也乎。大阪人鈴木温卿。從予遊學。頗嫻文辭。旁修經方。夙攻此書。頃日纂輯其方。一一因本論之意。詳其所主。譯以國字。雖稍有。所觀不敢妄襍。一箇私說。蓋懼刻。

意求其義則多不出自得也。要之
孫真人曰。讀方三年。天下無不可
醫之病。醫病三年。天下無可依之
方。有味哉此言也。刻初成乞予序
文。予識淺陋。固未得所言。然平生
之誼。何忍以不文辭也。因聊徵此
書之反覆詳校。大異世之竊名射
利。以偽亂真之徒。所為云。

天明癸卯秋九月

浪華 奧田元繼撰



傷寒譯通自序

漢張仲景先生。夙傷古方之淪喪。
上原神農黃帝諸臣之精義。手著
傷寒論金匱要畧二書。各立方法。
廣脈後人。是乃為仁之至也。其論
悉暨黃岐之所未發。但黃岐言其
常。仲景言其變。能言其變者。必救
生。舌死焉。故昔人云。醫之有仲景。
猶儒之有孔子歟。信然。生今之世。
不讀其書者。猶暗夜探物也。然其
道太古不遠。其言亦簡而義深。故
歷代名賢。註釋之相踵數十家。各
行于世。予自少且暮。手其二書。未

得其一端。頃日撮其治方要訣。而定各門。藏于家。以比中郎之秘。今茲壬寅春。積玉主人來頻。乞刊此書。予辭不得。命再加校正。以國字直解。授之繡梓也。聊使邊鄙乏醫者。得古方配劑之便。豈小補云爾。

天明甲辰春正月

浪華鈴木定寬撰

於二無堂中



傷寒諱通後序

號赤水

中古以來業醫者。第按脈處方。非如夫上古以割皮浣胃導筵抉膜。能知衆疾。皆絜然也。然則不研確方書。而復何爲哉。近世諸家專宗傷寒金匱二經。可謂得其所焉。然其方其論。意味淵深。是故能領會其旨趣。屢奏十全治功者。蓋鮮矣。友人鈴木温卿氏。獨有憂于茲。竟纂輯二書之方。譯以國字。不知將爲時醫忠臣乎。抑將爲長沙忠臣乎。石蘊玉山耀樹。含花園媚。其所居實以醫事有赫赫者也。仲景

氏名實嘗懐于堦寓固醫家之聖也身生今之世刺以少壯與耆老並得其道正脉者海内凡幾人於予之所觀恃有此郎而已

昔

天明七年歲次丁未春二月上浣

播陽五島惠迪寓浪華醉月

堂跋



例言

○此書ハ仲景氏ノ二書ヲ通俗スル者

ト知ルベシ其初ニ先賢ノ所謂病論脉

論等ヲ出シ次ニ和寒温汗吐下ノ六ヲ

擧テ劑ノ大槩ヲ示ス其藥名ノ下ニ各

主治ノ要語ヲ註シ又藥名ノ上ニ各出

所ヲ記ス其例ヲ示サバ傷寒方ハ

用ヒ金匱方ハ

ルハ又

名下ノ註釋ハ東洞氏ニ從ヒ其餘ハ悉

ク傷寒金匱ノ舊文ヲ取用ヒテ古方ノ

大畧ヲ示スノミ

傷寒論ハ六經ヲ以テ病ヲ辨シ專

ラ傷寒ヲ治スルノミニ非ズ故ニ和寒
 温汗吐下ノ六劑ヲ舉テ祖方トス蓋シ
 方ノ祖タルハ桂枝白虎四逆麻黄施子
 承氣等ノ類ヒ本之或ハ複シ或ハ減ジ
 或ハ因或ハ變凡テ一十三方ヲ擴成
 ス又金匱方ハ臟腑ヲ以テ病ヲ辨ズ凡
 テ二百六十二方アリ今此書ハ二書ヲ
 合シテ其要方ヲ記ス其外千金外臺肘
 后方又後世ノ諸方書ニ於テ經驗頗ル
 多シ然レ一々爰ニ舉ルニ暇アラズ觀
 者尚信用ノ書ニ依テ精ク其方ヲ求テ
 羽翼スベシ

○凡ソ治法ハ病證ヲ以テ主方ヲ定メ

又脈ヲ取テ證ニ拘ラザルアリ證ヲ取
 テ脈ニ拘ラザルモアリ然レ見證又腹
 部ヲ正シク候察スル一此醫人ノ第一
 義トス或ハ證ヲ先ニシテ治ヲ施スア
 リ腹ヲ先ニシテ治ヲ施スアリ是所謂
 先務ヲ急ニスルノ義ナリ夫醫ハ意ナ
 リ心ノ發動シテ能變ヲ知ルヲ云最病
 苦ヲ速ニ除ヲ以テ良トス然レ醫ニ定
 良ナシ唯人ヲ活スルヲ以テ良トス假
 令古方今方ノ異アリトイヘ氏其術ハ
 他ナシ病痛ヲ除クニ有ノミ其方ニ緩
 急アリ人ニ虛實アリ能察見シテ其方
 ヲ與ヘ或ハ奇方妙術鍼灸トイヘ氏皆

捨ベカラス。是韓氏ノ所謂醫師ノ良ナ
リトス

○當世ノ醫者動スレハ古方流後世流
ノニ途ヲ分テ其術ヲ術スル者多シ。是
漢ヨリ宋ニ至ルテテヲ古方トシ。宋ヨ
リ今ニ至ルヲ後世方トス。然ルニ世俗
一統ニ古方ハ唯暴キ療治ト思テ厲キ
病ニハ古方ヲ宜トシ。緩キ病ニハ後世
方ヲ宜ト云。沙汰アリ。此皆其道ヲ知ラス。
其書ヲ讀サル者ノ語ナリ。最其人其脉
其症ヲ察見シテ其的スル方ヲ與フレハ。
金石參朮モ各主ドル所アリ。其暴緩ニ
拘ラシヤ。或ハ時氣感冒ノ證ニ桂枝湯ヲ

恐テ敗毒散ヲ用ヒ。麻黃湯ノ症ニ十神
湯ヲ用ヒ。建中湯ノ場ニ益氣湯ナドガ
宜ト云者モ又僻論ナリ。是所謂己ガ欲
セザル所ヲ厭テ我寺ノ佛ノミ貴シト
スルノ類ナリ。然凡其術ハ皆一理ニ歸
ス。只恐ルハ此書ニ吾臆見ヲ吐テ舊文
ヲ亂シカト。因テ先賢ノ確言ヲ取捨シ
テ。古方配劑ノ見分易カラシメ。且仲
景氏ノ功德廣ク後世ニ及ブヲ知ラシ
ムルノミ。故ニ言ノ重複頗ル多シ。見ル
者夫コレヲ詳ニセヨ

旭山識

傷寒譯通目錄

病論 一

脈論 二

風熱寒濕上下說 四

傷寒傷足不傷手經說 五

傷寒捉證不拘日數說

傷寒傷風時疫說

痙病濕痺中暍說 六

傷寒見證識病法 七


仲景藥量法 九

太陽病 十 陽明病 十一

少陽病 大陰病 十二

少陰病 厥陰病

合病 十三 併病



發熱^{十四}

惡寒

惡風

寒熱^{十五}

潮熱

自汗

盜汗^{十六}

頭汗

頭痛^{十七}

項強

頭眩

煩熱^{十八}

煩燥

虛煩^{十九}

懊憹

舌上胎

噦

咳嗽^{二十}

喘

嘔吐^{廿一}

乾嘔

口乾舌燥

消渴^{廿二}

咽痛

咽喉不利

痰飲

肺痿^{廿三}

肺癰

腸癰

胸痺^{廿四}

結胸

身體疼痛

骨節疼痛

四肢拘急^{廿五}

腹痛

腰痛

奔豚^{廿六}

心中悸

心下痞鞭

心下滿痛^{廿七}

腹滿

少腹滿^{廿八}

腹中雷鳴

宿食

不欲食

譫語^{廿九}

鄭聲

發狂

發黃^{三十}

水腫

霍亂^{卅一}

下利

大便鞭

燥屎 卅二

小便不利

小便自利

厥冷 卅三

振

戰慄

驚悸 卅四

虺厥

狐惑

中風

脚氣 卅五

瘧疾 卅六

瘰癧

不得眠

勞復病

諸血 卅七

妊娠

產後 卅八

和寒温汗吐下主方目次

右六劑共二百二十二方

各附論治

傷寒譯通上卷

浪華 鈴木定寛温卿撰

○病論

傷寒ノ爲病ヤ其證最多レ其治法モ亦隨テ

煩レ蓋レ其的方ヲ察ン以テ各其術ヲ施サバ假

令誤治壞症ノ後ト雖凡手ニ隨テ治セラシヤ論

曰春氣ハ温和夏氣ハ暑熱秋氣ハ清凉冬

氣ハ冷冽此則四時ノ序ナリ若春温ナル應ニ反

テ大ニ寒シ夏熱カルベキニ反テ大ニ涼シ秋涼カルベ

キニ反テ大ニ熱シ冬寒カルベキニ反テ大ニ温ナルハ

此四時不正ノ氣ナリ四時不正ノ氣皆ヨク病

ヲ爲然ニ寒ハ唯冬ノ正氣ト雖凡亦能人ヲ傷ル

者ハ其殺厲ノ氣甚シケレバナリ故ニ冬時嚴寒

萬物閉藏スルニ人モレ調護周カラス起居節ナラ
 サレバ乃寒邪侵入テ體ヲ傷リ易シ或ハ之ニ中
 ノ特ニ重者ト資性虛弱ノ者トハ時ニ即チ病此
 ノ名ケテ傷寒ト云フ又感スルノ輕者ト資性壯
 實ノ者トハ時ニ即チ不病ト雖氏寒毒肌膚ノ間ニ
 藏レ春ニ至テ溫氣ニ觸發ル此ヲ名ケテ溫病ト
 云フ夏ニ至テ暑氣ニ觸發ル此ヲ名ケテ暑病ト
 云フ然氏均ク是レ傷寒ニ天時ノ氣ニ隨ツテ病
 名異ナリ約ノ之ヲ言ハ其病寒ヲ以テ本トス其
 寒變ノ熱トナル故ニ古人ノ曰熱病ハ皆傷寒ノ
 類ナリト因テ以テ其意ヲ辨知スベシ

○脈論

仲景氏ノ曰脈ニ陰陽ノ別アリト凡脈浮大數

動滑此ヲ陽ト沉澹弱弦微此ヲ陰ト人
 身ノ微妙ハ脈ニアリ察セズニバ有ヘカラス脈ニ陰陽ノ
 別アル者ハ脈ハ陰陽ヨリ始故ナリ其脈ニ各五アル者
 ハ脈ハ五行ヨリ生ズレハナリ

○王叔和ノ曰脈ニ七表八裏ノ別アリ亦九道

ノ脈アリ合メ二十四脈トス共ニ天ノ二十四氣ニ
 應メ玄微ヲ盡ス所以ナリ然氏其各名ノ脈古ノ

神醫ニ非ズニバ一々辨知スルヲ甚難故浮沉

遲數ノ四ヲ取分フヲ肝要トス凡脈浮花滑實

弦緊洪此ヲ七表トシ屬ス微沉緩澹遲伏濡

弱此ヲ八裏トス屬ス細數動虛促結散代革

此ヲ九道トス亦別ニ長短大ノ二脈アリ凡テ此

等ヲ取分ツ至テ難ト雖氏其醫タル者ハ心ヲ

盡サルベケンヤ○經曰人一呼ニ脈再動一吸ニ

脈再動一吸三亦再動呼吸定息二脈五
 動入閏スルニ太息ヲナス此即平人ナリ蓋シ呼
 吸トヲ合シテ一息トス一息ニ脈五動シテ浮ヲ
 ス沉ナラサル此ヲ平脈トス呼ハ心ト肺トニ出吸
 ハ腎ト肝トニ入ル太息ヲ脾ニトル是乃五臟ノ
 息出入スルノ義ナリ大凡一日一夜ニ二萬三
 千五百息トシ脈行一五十度トス身ヲ周
 一環ノ端無カ如ク陽ヲ行一二十五度陰ヲ行
 一二十五度周ル一凡テ五十度陰陽ハ即チ營衛ヲ云
 度陰陽ハ即チ營衛ヲ云脈ノ始テ發スルヤ平旦
 寅ノ時ニ至テ中焦脾胃ヨリ起テ手ノ大陰肺
 經ニ會シ大陰ヨリ流レ注テ手ノ陽明大腸經
 足ノ陽明胃經足ノ大陰脾經手ノ少陰心
 經手ノ大陽小腸經足ノ大陽膀胱經足ノ

少陰腎經手ノ厥陰心胞經手ノ少陽三焦
 經足ノ小陽膽經足ノ厥陰肝經ト次第ニ流注
 テ復始ル如斯此所謂五十度アズ

左手 寸脈 心 關脈 肝 尺脈 腎 膀胱

右手 寸脈 肺 關脈 脾 尺脈 命門 三焦

寸脈ヲ陽トシ上部ニ位シテ天ニ法ル胸ヨリ已上頭
 二至ルノ病ヒアルヲ主レ尤寸ハ君火ニ

屬ス右寸ハ關脈ハ陰陽ノ關トス中部ニ位シ
 燥金ニ屬ス

關ヨリ已下臍ニ至ルノ病ヒアルヲ主レ尺脈ヲ
 尤關ハ風木ニ屬ス右關ハ濕上ニ屬ス

陰トス下部ニ位シテ地ニ法ル臍ヨリ已下足ニ至ル
 病ヒアルヲ主トル尤尺ハ寒水ニ屬ス右

尺ハ相火ニ屬ス○脈浮ハ病表ニ在トス浮緊ニシテ
 有カハ傷寒

トス浮緩ニシテ無○沉ハ病裏ニ在トス沉實ニシテ
 有カハ傷風トス

經ノ裏症トス或積トス沉緩ニシテ○遲ハ病臟ニ
 無カハ直中ノ裏症トス或鬱トス

在トス遲ニシテ有カハ痛○數ハ病腑ニ在トス
 在トス無カハ寒トス

數ニシテ有カハ熱トシ無 ○人迎左手關前脈大
 カハ瘡瘍ヲ發セントス ○氣口右手關前脈大九者
 ナル者ハ外寒トス ○脈陰陽俱ニ大ナル者ハ病進ト
 ハ内傷トス ○邪氣盛俱ニ緩ナル者ハ病退トス正氣復スレ
 ナリ ○俱ニ緊ナル者ハ傷寒トス凡寒ニ傷ラレハ ○尺
 寸俱ニ盛ニシテ重テ寒ニ感ズル者變シテ温瘧
 トナル ○陽脈浮滑ニシテ陰脈濡弱九者更
 ニ風ヲ承レハ變シテ風温トナル ○陽脈洪數ニシ
 テ陰脈實大ナル者更ニ温熱ニ觸レハ變シテ
 温毒トナル ○陽脈濡弱ニシテ陰脈弦緊ナ
 ル者更ニ温氣ニ觸レハ變シテ温疫トナル ○傷
 寒ノ脈尺寸俱ニ浮ニシテ頭痛腰脊強リ惡
 寒スル者病大陽ニアリ ○尺寸俱ニ長ニシテ身

熱シ目疼之鼻乾テ卧ヲ得ガル者病陽明
 ニアリ ○尺寸俱ニ弦ニシテ胸脇痛テ耳聾寒
 熱往來嘔ニシテ口苦者病少陽ニアリ ○尺
 寸俱ニ沉細ニシテ腹滿テ咽乾キ黃ヲ發シ自
 利スル者病大陰ニアリ ○尺寸俱ニ沉ニシテ口
 燥キ舌乾テ渴スル者病少陰ニアリ ○尺寸
 俱ニ微緩ニシテ煩滿シ囊縮ル者病厥陰ニア
 リ ○總シテ脈論ノ一條醫者特ニ心ヲ盡ス
 ベシ其微意ハ言外ニアリト知ルベシ

○風熱寒濕上下說

凡人身ヲ七尺五寸ト定メ五臟百骸ヲ兼テ
 天ヲ戴キ地ヲ履故ニ半身已上ハ天氣コレヲ
 主トル半身已下ハ地氣コレヲ主トル是ヲ以

テ上體多ハ風熱ヲ蒙リ。下體多ハ寒濕ニ感ス。十月小雪ノ後ヨリ始テ太陽寒水事ヲ司ドル。房勞辛苦ノ人其太陽寒水ノ氣或ハ虚ニ乘シテ足ノ太陽膀胱經ニ入ル。此乃チ同氣相求ムルノ意ナリ。故ニ風寒ノ一ノ人ヲ傷ニ上下ノ差別アルヲ辨知スヘシ

○傷寒傷足不傷手經說

傷寒ノ病足ノ六經ヲ傷レ凡手ノ六經ヲ不傷者ハ足ノ六經ハ水土木ニ屬ス。足ノ太陽膀胱ハ水ニ屬ス。陽明胃ハ土ニ屬ス。少陽膽ハ木ニ屬ス。太陰脾ハ土ニ屬ス。少陰腎ハ水ニ屬ス。厥陰肝ハ木ニ屬ス。蓋シ水得寒トキハ氷ル。土得寒トキハ折ル。木得寒トキハ垂落枝枯ル。故ニ寒ハ只足經ニ傷ル。手ノ六經ハ火ト金トニ屬ス。手ノ太陽肺ハ金ニ屬ス。少陰心ハ火ニ屬ス。厥陰心胞モ火ニ屬ス。大腸小腸モ亦火ニ屬ス。陽明大腸ハ金ニ屬ス。蓋火ニ屬スルモノ多シ故ニ能寒ニ勝。金ハ寒ヲ得トキハ愈堅。故ニ寒ハ自ラ手經ヲ傷ラザルナリ

○傷寒捉證不拘日數說

凡傷寒ヲ治スルニ或ハ頭痛惡寒發熱。或ハ項強リ。脈浮ナルハ是表證ナリ。日數ノ多少ニ拘バ先表ヲ解スベシ。○耳聾脇痛ミ寒熱シ。嘔シテ口苦ク。脈弦數ナルハ是半表半裏ノ證トス。日數ニ拘ラズ。即チ和鮮ノ劑ヲ用ユベシ。○頭痛惡寒悉ク止。熱猶盛ニシテ渴シ。譫語シ。衣被ヲ脫去シ。手ヲ揚足ヲ悶。乃發狂。或ハ潮熱自汗シ。大便不通。小便短赤。或ハ胸中

ヨリ臍腹ニ連テ注悶疼痛シ。脈沉ニシテ有力。

或ハ上氣シ喘ヲ見スニ及テハ即是裏ニ傳ル熱
證トス日數ニ拘ラズ便チ通利下藥ヲ用スベシ
○病發テ頭痛ナク身ニ熱ナク便寒ニ怕レ四
肢厥冷シ或ハ腹痛吐瀉或ハ口ニ涎沫ヲ流シ
或ハ戰慄シ面ヲ刮ルガ如ク衣袖ヲ牽引
シ或ハ踈卧シテ渴セズ脈來ルヲ沉遲ニシテ
無力者ハ即是直中ノ陰證トス急ニ熱藥ヲ
用ヒテ温ムベシ○右各證表裏ニ隨ッテ治
法ノ工夫ヲ費スヲ要トス安ニ湯劑ヲ投シテ
後臍ヲ壅塞氏益ナシ故ニ仲景ノ奧ニ至ル者ニ
非ズニハ共ニ此意ヲ語ベカラズ

○傷寒傷風時疫說

傷寒ハ天地殺烈ノ氣ニ感シテ發ス其邪下部

ヨリ入テ一自身表裏ニ彌ル其初メ感冒ノ因有
テ既ニ鬱熱ヲ待ズシテ直ニ惡寒發熱シ又
頭痛身痛之四肢拘急シ其脈浮數或ハ
緊ニシテ無汗ナリ傷寒ハ寒ノ營血ヲ傷ル故ニ陰邪トス無汗ハ閉藏ノ
故ヘナ

○傷風ハ天地不正ノ氣ニ感シテ發ス其邪
上部ヨリ入テ一自身表裏ニ彌ル即チ頭痛發
熱惡寒シ其脈浮緩ニシテ有汗ナリ傷風ハ風ノ

衛氣ヲ傷ル故ニ陽邪トス
開發ヲ主トツテ汗多シ

○時疫ハ天地ノ厲氣ニ感シテ發ス其邪口鼻
ヨリ入テ募原ニ藏レ其初メ感冒ノ因無シテ
忽チ憎寒シテ後發熱シ午後ニ唯熱シテ惡
寒セズ晝夜發熱シ日晡ニ益甚シク頭痛身

疼ス其脈多ク浮數緊實ナル者ト知レベシ

○痙病濕痺中喝説

痙病ハ傷寒ニ相似テ脈ハ沉ニシテ細ナリ其人身熱シ足寒頸項強急シテ惡寒シ時ニ頭熱ス

面目共ニ赤ク頭ウゴキ口禁ジ背反張ス亦發熱シテ汗ナク反テ惡寒ス此ヲ剛痙ト云

汗出テ惡寒セザル此ヲ柔痙ト云皆妄汗シテ

太陽ノ津液ヲ傷ルニヨル故ニ脈不和シテ強急ス宜ク太陽ノ氣ヲ温補スベシ

○濕痺ハ一身盡疼ク發熱シテ身ノ色薰黄ノ如シ頭汗出テ背強リ胸滿小便不利

大便反テ快通シ或ハ日晡所ニ發熱劇キ者アリ宜ク小便ヲ利スレバ自ラ去ル

○中喝ハ即チ暑病ナリ或ハ中暑中熱皆ナリ天地ノ熱氣ニアテラレテ發熱シテ咽渴

キ面垢キ自汗出テ其脈ハ浮虚ナリ宜ク熱氣ヲ清涼スベシ

○傷寒見證識病法

頭痛項強ルハ八陽症 ○頭ノ搖クハ裏ノ病ヒ ○頭眩ハ少陽或

ハ邪氣衛ヲ傷ル ○盜汗ハ膽ニ熱アリ或ハ額汗ハ風温

面色乍チ變ハ狐惑 ○面斑々錦文ノ如キハ陽毒

傷寒 ○面垢不慘ハ傷風 ○口苦ハ少陽 ○口甜ハ脾ノ熱

○口難言ハ血虚 ○口噤ハ肝熱

○面赤ハ心火盛

○面青ハ肝木盛

○面黃ハ脾土盛

○面白ハ肺金盛

○面赤白ハ心火盛肺金衰

○面青白ハ肝木盛脾土衰

○面黃白ハ脾土盛肺金衰

○面赤黃ハ心火盛脾土衰

○面青黃ハ肝木盛脾土衰

○面黃赤ハ脾土盛心火衰

○面白赤ハ肺金盛心火衰

○面赤白黃ハ心火盛脾土衰肺金衰

○面青白黃ハ肝木盛脾土衰肺金衰

脾經ニ ○口燥ハ少陰 ○口破唇赤キハ可下ニ誤

乗ズ ○汗シ熱 ○唇瘡ハ狐惑 ○舌乾久少陽 ○

舌黒キハ熱極 ○舌上胎ハ裏熱 ○舌赤クハ

裂紋アルハ君火ノ熱毒 ○舌上生刺ハ熱愈盛ナリ

○目痛ハ陽明 ○目不明ハ裏証腎水枯ル ○目睛

黄ナルハ小腸熱 ○目中生華ハ陰陽易 ○睛不和

ハ内未解 ○瞼ニ生風粟ハ肝ニ瘀血壅ル ○目直視

シテ瞬スルヲ不能ハ將發 ○目舌如常ハ表症

○鼻乾クハ陽明 ○鼻中乾クハ必衄 ○鼻如

烟煤ハ陽毒熱極 ○鼻衄ハ風温 ○鼻頭色青キハ

腹中痛 ○或ハ黄ナルハ小便難シ ○或ハ赤キハ肺熱

○或ハ白キハ氣虚 ○或ハ微黒ナルハ裏ニ水

或ハ鮮明ナルハ留飲 ○或ハ濁汚ヲ流スハ風邪

○耳聾ハ少陽 ○耳中痛ハ少陽 ○咽痛

ムハ少陰 ○咽中生瘡ハ上實シテ下虚ス ○吐血ハ

諸陽ニ熱ヲ受 ○衄血ハ肝虚 ○食臭ヲ惡ハ胃虚 ○

寒熱シテ區スルハ少陽 ○嘔吐シテ下利スルハ

霍亂 ○渴シテ嘔スルハ内熱 ○不渴シテ嘔ス

内寒 ○乾區スルハ寒ノ中脱ニ ○食穀シテ嘔セ

ント欲スルハ胃熱 ○咳嗽ハ寒邪肺 ○喘ル

ハ邪氣肺ヲ侵ス ○吐厥ハ藏寒 ○身痛ハ寒ノ營ヲ

○一身盡ク痛ハ風温 ○身微腫スルハ風温

○身重ク多睡ルハ風温 ○一身黄ナルハ鬱熱

小便不利 ○身上虫ノ蠕行ガ如クハ表虚 ○身痒

キハ陽虚シテ ○發熱惡寒ハ太陽 ○寒熱往

來ハ少陽 ○皆惡寒ハ陰勝 ○戰慄ハ陰陽ノ

○發斑ハ熱甚シテ血ヲ傷ル ○發狂ハ熱甚母目ニ有テ心ニ乘ズ故ニ神志定ラス

○譫語ハ胃熱心ニ乘シテ狂ス ○鄭聲ハ胃虚 ○心下悸スルハ心虚 ○喜悪シテ加

狂ハ畜血 ○多眠ルハ神倦 ○不眠ハ神虚 ○

空シテ眠ルハ裏ノ不足 ○寐ルヲ欲ルハ少陰 ○

跖スルハ内寒 ○脇痛乾嘔心滿ルハ水氣

○脇下痛ハ肝ノ實熱 ○腹痛ハ熱裏ニ

滿時ニ痛ハ大陰 ○腹中滿痛ハ邪氣甚

實ト ○四肢拘急ハ寒ノ皮毛ヲ侵スナリ ○四肢厥

逆ハ直中ノ寒ナリ ○四肢温ナルハ陽証 ○自

利シテ不渴ハ大陰 ○清穀ヲ下利スルハ直中

○鴉瀉スルハ寒 ○轉矢氣スルハ燥糞 ○失

精スルハ腎虚 ○飢テ食スルヲ不能ハ邪胃中

○又手シテ胸ヲナデ衣ヲ尋或ハ牀ヲ摸リ謔

語スルハ此ヲ撮空ノ症トス肝熱肺ニ煩滿シテ

囊縮ルハ厥陰 ○筋惕肉瞤ハ汗下虚 ○言語

遲キハ風 ○歩行徐キハ表強 ○呻スルハ病ヒ

○欠スルハ無病

右諸證ノ屬スル所 律哲ノ確証ト予ガ見ル

處ト符合スル者ヲ採輯シテ此ニ示ス然凡

軫識ノ士時々刻々變證ヲ察シ拘見セスシ

テ可ナリ

○仲景藥量考

夫量衡ノ法ハ歷代沿革アリ今此書ニ漢ノ

量衡ノミヲ攻テ以テ其大槩ヲ擧テ張氏ノ量

目ヲ知ラシム

易方集釋通

七

一升本朝ノ九勺 ○一斗今ノ九合三 ○

一銖今ノ一分二厘 ○一兩今ノ二錢九分

○一斤今ノ四十七錢四分 ○一錢今ノ三分

○一尺今ノ七寸二分 ○方寸今ノ七分

ナリ。七八匙ナリ。古ハ竹木ヲ用ユ。今ハ銅ヲ用ユ。其

制正方一寸ナリ。散ヲ抄テ落ザルヲ取テ度トス。其

重サ一分許ヲ ○一枚即チ一箇ナリ。字彙

ト。個モ又 ○附子一枚八枚ニ大小アリ。一枚

ト ○大棗十二枚數十二ノ一ナリ。顆ニ大小

シテ核ヲ去テ一類 ○枳實一枚其重サ凡

ハカリ和漢ニ大小有 ○桔樓實一枚其重サ凡

ナリ。然ルニ只一枚ト云ハ其分量詳ニ示シ難シ。

○吳茱萸一升今升ノ九勺三才餘ナリ。

○半夏一升今升ニテ同上此ヲ ○水一升八

用上大抵 ○厚朴一尺尺或ハ斤ノ誤トス未詳

トシテ ○甘草一尺其大サニ大小アリ。テ定テ

右仲景氏ノ藥量大抵如此其餘ハ擴テ知ル

ベシ。又近來ニ生姜一升ト云アリ此ハ二分ト心

又水一盃此ハ一合ト心得ベ 凡分量

ハ其書其人ノ時代ヲ詳ニシテ後秤ルベシ。

妄ニ是ヲ増減スレバ立方ノ人ノ本意ニ背テ宜

シカラズ素ヨリ藥驗モ少キノ理ナリ。然レ凡

老弱幼婦等ノ如キ其大劑濃煎ノ口ニ適セ

ザル者アリ。是ニ於テ或ハ半劑或ハ一分劑

或ハ二分劑ト宜キヲ得テ斟酌スベシ

○大陽經

易美釋

太陽ノ病ハ頭項強痛シテ腰脊強リ發熱
シテ惡寒ス是足ノ太陽膀胱經ニ受ルナリ假
ハ先ツ發ル惡寒ハ本病ノ標著スルナリ若少シ
ニテモ頭痛惡寒身熱アルハ日數ニ拘ラス早
發散セハ變症ノ出ヅキ理ナシ

夫主方ハ大抵左ニ方名ノミヲ舉テ並兼症
ノ要ヲ記シテ以テ治法ヲ察シ易カラシム然
レ凡各方ニ於テ其主トスル所アリ醫者人審
察誤ルベカラズ後諸方皆如斯

和桂枝湯 汗出 和桂枝加葛根湯 項背強
桂枝去芍藥湯 利後胸滿 汗桂麻各半湯 發熱無汗
汗麻黃湯 無汗 汗葛根湯 無汗 項強 汗葛根加
半夏湯 嘔 和桂枝去桂加苓朮湯 小便不利

大柴胡湯 腹滿拘攣 和 小柴胡湯 表解 胸滿 汗大青
龍湯 不汗出 煩躁 汗 小青龍湯 少腹滿 喘咳 下 五苓
散 小便不利 微熱消渴 和 小建中湯 心中悸 寒 白虎
加人參湯 汗後煩渴 汗 葛根黃連黃芩湯 利不止

○陽明經

陽明ノ病ハ目痛ミ鼻乾キ眠ラズ微ク惡寒
ス大便難シ是足ノ陽明胃經ニ受ルナリ假
ハ先ツ目痛ミ惡寒身熱スルハ陽明經ノ本
病トス後潮熱自汗譫語口渴キ大便實スル
ハ標病トス本病ハ發散ニ宜シ標病ハ急ニ下
スベシ

大承氣湯 潮熱大便秘 下
小承氣湯 譫語 下
調胃承氣湯 不吐下 心煩 下
猪苓湯 小便不利 下
茵

藜藿湯 發黃 ⑤ 梔子蘗皮湯 身黃 ⑥ 麻黃
連軹赤小豆湯 發黃 ⑦ 吳茱萸湯 嘔 ⑧ 麻
仁丸 大便 ⑨ 蜜煎導 虛勞大 便閉

○少陽經

少陽ノ病ハ耳聾脇痛寒熱往來嘔シテ
口苦ク咽乾キ目眩ス是足ノ少陽膽經ニ
受ルナリ假ヘハ先ッ惡寒身熱耳聾脇痛ス
ルハ本病トス後嘔シテ舌乾キ口苦キハ標
病トス膽ハ蓋シ水穀ノ出入スルヲ無ニ因テ
病半表半裏ノ間ニアリ正ニ小柴胡湯ニ加
減シテ表裏ヲ和解シテ可ナリ此經タハ汗
吐下ノ三ツハ大ニ禁ズベシ

○小柴胡湯

○大陰經

大陰ノ病ハ腹滿テ吐シ食下ラズ自利シテ時
時腹痛津液咽ニ到ラス手足温カ九ハ是
足ノ大陰脾經ニ受ルナリ假ヘハ先ッ腹滿咽乾
クハ本病トス後身黄ナルハ標病トス

⑩ 桂枝加芍藥湯 腹滿 ⑪ 桂枝加大黃湯 實痛

○少陰經

少陰ノ病ハ舌乾キ口燥キ但寐ント欲ス是
足ノ少陰腎經ニ受ルナリ假ヘハ先ッ舌乾キ口
燥クハ本病トス後譫語大便實スルハ標病ト
ス病陰經ニ至ルトキハ定法ニ拘ラズシテ温メ
或ハ下シ其宜キニ從フベシタ直中ハコレ

寒証トシ傳經ハコレ熱証トス

汗麻黃附子細辛湯發熱脈沉汗麻黃附子甘

草湯無表證和黃連阿膠湯心中煩不得卧温附子

湯口中和皆惡寒温桃花湯下利膿血温吳茱萸湯吐利

厥和甘草湯咽痛和桔梗湯咽痛和苦酒

湯咽中生瘡和半夏湯咽中痛温白通湯下利温

白通加猪膽汁湯下利厥逆温真武湯腹痛水氣温

通脉四逆湯厥逆脈微温四逆散厥逆腹痛下猪苓

湯心煩不眠

○厥陰經

厥陰ノ病ハ消渴氣上テ心ニツキ心中痛シ

饑テ食ヲ欲セス食セバ則吐シ煩滿シ

テ囊縮ル者ハ是足ノ厥陰肝經ニ受ルナリ

假ハ先消渴煩滿スルハ本病トス後舌ニキ囊

縮ハ標病ナリ

温烏梅圓蛇厥久利温當歸四逆湯手足厥冷温四

逆湯下利厥逆汗麻黃升麻湯咽喉不利唾膿血和乾

薑黃連黃芩人參湯寒下反吐温通脉四逆湯

裏寒寒白頭翁湯熱利

○合病

合病ハ兩經或ハ三經齊ク病テ傳ヘザル

云フ

汗葛根湯大陽陽明汗葛根加半夏湯不利嘔下汗

麻黃湯大陽陽明喘而胸滿和黃芩湯大陽少陽自下利和

黃芩加半夏生薑湯嘔寒白虎湯三陽下

大承氣湯陽明少陽有宿食

併病

併病ハ一經先病テ未盡ナルニ又一經ヲ過テ傳ルモノヲ云又ハ二陽合病ノ後一陽ノ邪盛ニシテ一陽ノ邪衰ヘ一經ニ併歸シテ獨重ク初症モ亦解シ罷サルモ云フニツノ者ニナ併病

○麻黃湯 大陽陽明 桂麻各半湯 大陽未罷 ○當刺肺俞大椎 大陽少陽ノ併病ハ發汗スベカラズ若發汗スレハ乃譫語ス 讞言止ザレハ即期門ヲ刺ズ

○發熱

發熱ハ傷寒ノ常ナリ翕々トシテ發スル表熱トシ蒸々トシテ發スル裏熱トス表熱罷ズシテ邪氣裏ニ傳ヘ裏實セザルトキハ表裏俱ニ熱ス此ヲ半表半裏ノ熱トス

桂枝湯 汗出 麻黃湯 無汗 葛根湯 下利

大柴胡湯 屬裏 小柴胡湯 半表半裏

大青龍湯 喘咳 小青龍湯 喘咳 五苓散 小便

桂枝加芍藥湯 腹痛 桂枝湯 上衝 桂枝加葛根湯 項背強

桂枝加附子湯 四肢微急 桂麻各半湯 二越脾一湯 惡風

桂枝黃芩湯 黃汗 麻黃附子細辛湯 少陰 桂枝去桂加

蒼朮湯 心下滿 真武湯 頭眩身動 白虎加人

參湯 煩渴 大承氣湯 大便 四逆湯 裏

調胃承氣湯 發汗不解 梔子豉湯 心中懊懣

梔子蘂皮湯 身黃 茵陳蒿湯 發黃

○惡寒

惡寒ハ風寒トモニ營衛ノ中ニ客タリ故ニ風ニ當ラズト雖凡自然ニ寒ク假ヒ密室ニ居ト雖凡猶自ラ憎寒ス亦身ハ大ニ熱スト雖凡衣被ヲ襲ント欲ス

和桂枝湯發熱和柴胡加桂枝湯腹痛

小柴胡湯寒熱往來和附子湯背寒和芍藥甘草附子湯汗後温四逆湯厥冷汗大青龍湯發熱寒白虎加人參湯渴和附子瀉心湯心下痞大陷胸湯心中懊憹小承氣湯轉矢和桂麻各半湯發熱

○惡風

惡風ハ風邪ノ衛ニ中ルナリ風ノ動テ見レハ即

惡ム故ニ密室ノ中或ハ帷帳ノ内ニ居テ風ヲ見ザレバ惡ム所ナシ

和桂枝湯發熱汗麻黃湯無汗和桂枝加葛根湯汗出和桂枝加附子湯發汗不止四肢微急

汗葛根湯項背強和小柴胡湯滿下和桂枝甘草附子湯骨節痛寒白虎加人參湯吐下後

○寒熱

寒熱往來スルハ陰陽爭ヒ勝故ナリ陽勝トキハ熱シ陰勝トキハ寒ス蓋寒ヲ陰トシ熱ヲ陽トス裏ヲ陰トシ表ヲ陽トス邪ノ表ニ客タルトキハ寒多シ裏ニ客タルトキハ熱多シ表裏ニ相ワタル時ハ寒熱相半スルナリ宜ク此ヲ和解スベシ

傷寒論通 卷之五
○小柴胡湯嘔而發熱 ⑤大柴胡湯熱在裏 ⑥柴胡桂薑湯頭汗 ⑦桂麻各半湯瘧狀 ⑧桂枝二越婢一湯熱多寒少

○朝熱

潮熱ハ潮水ノ時ヲ違ヘズシテ到ルガ如ク一日ニ一發ス惟日晡ノニ發スルハ是胃實ナリ陽明ニ屬ス其餘ノ潮熱ハ虛實アリ詳ニスヘシ

④大承氣湯大便鞭 ⑤小承氣湯譫語 ⑥大陷胸湯少腹滿痛 ⑦小柴胡湯大便溏

○自汗

自汗ハ皮膚虚シテ自然ニ出ル汗ナリ身ヲ動カスハ汗ヲカクハ自汗ニアラズ安居シテ汗ノ出ルナリ

⑧桂枝湯發熱 ⑨桂枝加葛根湯項強 ⑩柴胡加桂湯上衝 ⑪桂枝加附子湯四肢急

⑫桂枝甘草附子湯骨節疼 ⑬五苓散小便不利

⑭茯苓甘草湯不渴而小便不利 ⑮甘草乾姜湯陰少

⑯四逆湯厥冷 ⑰白虎湯霍亂 ⑱大承氣湯腹滿 ⑲小承氣湯譫語 ⑳蜜煎導大便鞭

㉑真武湯心下悸 ㉒大柴胡湯心下痞 ㉓白虎加人參湯煩渴 ㉔葛根黃連黃芩湯喘 ㉕附子瀉心湯心下痞 ㉖十棗湯心下痞 ㉗通脈四逆湯厥 ㉘厚朴生薑甘草半夏人參湯脹滿 ㉙麻黃杏仁甘草石膏湯喘無大熱

○盜汗

盜汗ハ眠リ熟シテ汗出ル故ニ盜ト云又寢汗

ト名ク

①小柴胡湯 脈浮 ②柴胡加桂湯 微惡寒 ③

黃耆建中湯 黃汗 ④黃芩湯 潮熱 ⑤大陷

胸湯 微結 ⑥桂枝加黃耆湯 自汗

○頭汗

頭汗ハ邪氣三陽經ニ在テ津液上リ濇ハ汗

即頭ニ發ス亦元氣脱シテ頭汗珠ノ如クニ

シテ不流モノアリ死症ナリ左頰ハ汗右頰ハ

肺鼻脾頤ハ腎額心ハ三焦額上偏ニ多キ

者ハ心ニ屬シテ血症トス

⑦小柴胡湯 心下滿 ⑧柴胡桂薑湯 小便不利渴而

嘔 ⑨大陷胸湯 小便不利 ⑩枳子豉湯 懊憹寒

茵陳蒿湯 身無汗發黃

○頭痛

頭痛ハ邪氣陽經ニ在テ清氣升ラス濁氣上

逆スル故ナリ亦真頭痛アリ頭痛ハ甚シク

腦盡ク痛ミ手足冷テ節ニ至ルモノハ不治亦

偏頭痛アリ左痛ハ風ニ屬ス右痛ハ痰ニ

屬ス傷寒太陰少陰ノ症ハ自熱有テ頭痛

ナレ厥陰ノ症ハ頭痛アツテ身熱ナシ

⑪桂枝湯 汗出 ⑫麻黃湯 無汗 ⑬小柴胡

湯 少陽 ⑭桂麻各半湯 瘧狀 ⑮桂枝加桂

湯 奔豚 ⑯桂枝加葛根湯 項背強 ⑰桂枝加

芍藥湯 腹痛 ⑱桂枝加附子湯 支節痛 ⑲桔

萸桂枝湯 汗出 ⑳五苓散 發熱 ㉑承氣湯

大便不通 ㉒十棗湯 心下痛 ㉓吳茱萸湯 厥陰 ㉔

大陷胸湯 結胸

○項強

項強ルハ太陽ノ表熱トス凡々トシテ強ルハ短羽ノ鳥ガ飛ニト欲シテ飛テ不能ノ鳥乃形容強急ヲ云必發散シテ此ヲ解スヘシ

①葛根湯 無汗 ②桂枝加葛根湯 有汗 ③

大陷胸湯 結胸 ④小柴胡湯 脇下滿

○頭眩

頭眩ハ乃眩運ナリ。多クハ發汗吐下ノ後ニ發スル者ナリ。上虚スル時ハ眩シ。下虚スル時ハ厥ス。眩ハ本虚ニ属スト雖凡風ニ因テモ亦眩スルアリ。益風ハ運動ヲ主ドハナリ

①葛根湯 風 ②小柴胡湯 咽乾 ③真武湯

發汗不止 ④五苓散 顛眩 ⑤苓桂朮甘湯 痰飲

⑥桂枝加龍骨牡蠣湯 失精 ⑦小半夏加

茯苓湯 眩悸

○煩熱

煩熱ハ鬱悶シテ安カラス。熱ノ爲ニ煩スルナリ。煩ハ即熱ナリ。時ニ發シ時ニ止ムノ類ヒニ非ス。故ニ此ヲ煩熱ト云フ

①桂枝湯 大病 ②麻黃湯 目瞤 ③柴胡加

桂湯 煩疼 ④柴胡加附子湯 身體疼煩 ⑤柴胡

桂枝乾姜湯 心煩 ⑥小柴胡湯 心煩 ⑦大

柴胡湯 鬱々微煩 ⑧小建中湯 心中悸 ⑨大承氣

湯 煩不 ⑩小承氣湯 微煩 ⑪梔子豉湯 胸中

窒 ⑫梔子乾姜湯 下後微煩 ⑬梔子厚朴湯 煩

腹滿 ①調胃承氣湯 心煩 ②和黃連阿膠湯 中
 煩 ③五苓散 水逆 ④烏梅圓 ⑤白虎加
 人參湯 煩渴 ⑥猪苓湯 心煩 ⑦甘草瀉心
 湯 心煩 ⑧乾薑黃連黃芩人參湯 心煩

○煩燥

煩燥ハ熱ノ陰陽ナリ。煩ハ熱輕シ陽トシ燥ハ
 熱甚シク陰トス。益心熱スルトキハ煩シ賢熱
 スルトキハ燥ス燥ハ乃内外安カラズシテ手
 足悶ルナリ

⑨五苓散 湯 少陰 ⑩小承氣湯 心下
 枝甘草龍骨牡蠣湯 火逆 ⑪乾姜附子湯
 夜靜 ⑫大青龍湯 無汗 ⑬茯苓四逆湯 悸
 ⑭大陷胸湯 結胸 ⑮甘草乾姜湯 咽中 ⑯

五苓散 小便不利

○虚煩

虚煩ハ心中鬱々トシテ煩ス。經曰下利ノ後
 更ニ煩シコレヲ按シテ心下濡ナル者ヲ虚煩ト
 ス。煩ハ表熱ナリ。其熱裏ニ傳ヘハ即胸中煩。心
 中煩。虚煩ノ別アリ。三ツノモノ、要ハ其熱ノ從
 來スル所ヲ觀テ虚實ヲ詳ニスベシ

⑰梔子豉湯 不得眠 ⑱小建中湯 心中悸 ⑲小
 柴胡湯 心中煩 ⑳和黃連阿膠湯 心中煩 ㉑調
 胃承氣湯 心煩 ㉒下 ㉓梔子厚朴湯 心煩 ㉔
 梔子蘄皮湯 身黃 心煩

○懊憹

懊憹ハ益誤リ下シテ正氣内虚シテ陽邪虚

二懸シテ内陷シ心胸ノ間ニ凝結シテ鬱悶
舒ガルナリ乃煩悶ノ甚シキ者ト知ルヘシ

④ 梔子豉湯 ⑤ 梔子大黃湯 ⑥ 大承氣湯
燥屎 ⑦ 大陷胸湯 結胸 ⑧ 茵陳蒿湯 發黃

○ 舌上胎

舌上或ハ燥キ或ハ澀リ或ハ黄或ハ白ク或
ハ黒シ是等ハ熱氣ノ淺深ノ謂ナリ邪氣表ニ
在トキハ舌上無胎邪氣裏ニ傳ニ及ニテ津
液結搏スレハ即舌上胎ヲ生ズ

⑨ 小柴胡湯 白胎 ⑩ 梔子豉湯 懊憹 ⑪ 白

虎加人參湯 舌上 乾燥 ⑫ 五苓散 煩燥

○ 噦

噦ハ胸膈ノ間ニ氣閉塞シテ下ニ通スルコトヲ
指ス

不得吃水然トシテ聲アル者ナリ多クハ胃中
ノ虚冷ヨリ發ス

⑬ 橘皮湯 嘔噦 ⑭ 橘皮竹茹湯 噦逆 ⑮ 小

半夏湯 腹滿 ⑯ 小柴胡湯 食穀 ⑰ 小承氣

湯 即噦

○ 咳嗽

咳嗽ハ邪氣肺ニ乘ズルカ爲ニ肺氣逆シテ聲
ヲナス或ハ肺寒ノ咳アリ停飲ノ咳アリ邪氣
半表半裏ニ在テ咳スルアリ又五臟ノ咳アリ
咳ハ氣動シテ聲アリ痰ナシ嗽ハ痰アリ聲
ナシ皆肺ニ屬ス故ニ咳ヲ言フトキハ嗽ヲ
兼云フ

⑱ 小青龍湯 心下水氣 ⑲ 大青龍湯 煩燥 ⑳ 真

武湯少陰 和 小柴胡湯 寒熱 温 四逆湯少陰
猪苓湯 下利 和 苓甘五味姜辛湯 咳胸滿
汗越婢加半夏湯 喘咳 下 十棗湯 支飲

○喘

喘ハ身ニ寒ヲ帶テ冷ヲ飲ハ即肺ヲ傷ル故ニ
肺氣逆シテ上衝シ因テ氣急ニシテ喘ヲ爲
ス或ハ邪氣表ニ在テ喘スル者ハ心腹堅カラ
ズシテ無汗裏ニ在テ喘スル者ハ心腹脹滿
シテ有汗又水氣ニテ喘スルハ心下怔忡ス
ル者ナリ

和 桂枝加厚朴杏仁湯 胸滿微喘 汗 小青龍湯
欬 汗 葛根黃連黃芩湯 汗出 汗 麻黃杏仁
甘草石膏湯 汗出而無大熱 汗 麻黃湯 胸滿無汗 吐 梔

子豉湯 腹滿 下 大承氣湯 潮熱 汗 越婢加
半夏湯 喘目如脫 温 枳薑蘆白白酒湯 喘息

○嘔吐

嘔吐ハ多クハ胃虚ニ属ス物ヲクヒ胃ニ入トツ
ノミ吐カヘスナリ其内嘔ハ聲ノミニシテ吐ハ
其物ヲ吐出スナリ故ニ乾嘔有テ乾吐ナシ
其證一ナラス寒嘔熱嘔痰嘔食嘔氣嘔等
アリ宜ク辨知スヘシ

和 小半夏湯 穀不化 和 大半夏湯 嘔 和 小柴
胡湯 發熱 下 大柴胡湯 心下急 汗 葛根加半
夏湯 不下利嘔 温 吳茱萸湯 吐涎沫 和 烏梅圓
下 猪苓湯 心煩 和 半夏瀉心湯 嘔腸鳴 温 四
逆湯 寒飲 和 乾姜黃連黃芩人參湯 食入即吐

竹葉石膏湯 欲吐 和桂枝湯 乾嘔 和黃連湯 胸中熱 和黃芩加半夏生姜湯 胃中邪

○乾嘔

乾嘔ハ空嘔物ナシキヤウクト聲出ルノ大 概熱胃腕ニ有テ穀氣ト併テ上ニ薰シテ兀 兀トシテ吐ント欲スレト吐ガルナリ

和桂枝湯 發熱 和甘草瀉心湯 心煩 下十

藜湯 汗出不 和橘皮湯 嘔 溫通脈四逆湯 手足厥逆 惡寒 和半夏乾姜散 吐涎 脉微腹痛 沫

○口乾舌燥

口乾ハ邪熱胃ノ腑ニ聚リ津液ヲ消耗スル故 ナリ舌燥ハ心熱ノ甚キナリ

白虎加人參湯 無大熱 下五苓散 小便不利 下

大承氣湯 少陰 下大陷胸湯 少腹 鞭

○消渴

消渴ハ邪氣厥陰ニ傳テ木邪火ヲ狹ミテ腎 水ヲ消ス故ニ飲水多クシテ小便澁リ少シ此 ヲ消渴ト云フ

白虎湯 渴欲飲水 寒白虎加人參湯 煩渴 寒

白虎加桂枝湯 身熱 下五苓散 小便不利 下猪

苓湯 和茯苓澤瀉湯 小便不利 寒竹葉石膏 湯 中暑 和小柴胡湯 渴 汗小青龍湯 咳喘

和生姜甘草湯 咽燥 汗文蛤湯 吐後 溫腎

氣丸 腰痛 寒茵陳蒿湯 發黃

○咽痛

咽痛ハ大陰經脉咽ヲ絡少陰ノ經ハ喉ヲ絡

熱邪此ニ乘ズレバ乃咽痛ヲ生ス

甘草湯急迫 和桔梗湯肺癰 和苦酒湯

咽中生瘡 和半夏散上衝

○咽喉不利

咽喉不利ハ息シガタク咽セムルヲ云是肺腑ノ

冷熱調ラガルニ氣ノ上下液結シテ喉間ヲ

搏テ吞吐ニ或ハ塞リ或ハ痛ムナリ

麻黃升麻湯唾膿 和麥門冬湯火逆 和

半夏厚朴湯如左有灸

○痰飲

痰飲ハ水穀胃ニ入り脾弱シテ剋制スルコト不

能膈ニ留リ中下ニ焦ノ氣薰蒸稠粘ス稀ナ

ルヲ飲ト云稠ナルヲ痰ト云フ痰ハ多ク湿ヨリ

生ス故ニ湿痰ト云又食痰火痰酒痰燥痰氣

痰熱痰風痰寒痰虛痰鬱痰等ノ別アリ諸

方書ニ委シ今此ヲ畧ス

茯苓飲停痰 和甘遂半夏湯留飲 和苓

桂朮甘湯微飲 和十棗湯懸飲 和大青龍

湯溢飲 和小青龍湯 溢飲 和小半夏湯 嘔

木防己湯支飲 和厚朴大黃湯支飲 和

八味丸微飲 和排膿散瘡家粘痰

○肺痿

肺痿ハ年ヲ經テ久ク咳シ熱極シテ肺焦レ自

ラ痿ヲナス其症ハ寒熱往來シテ自汗咳唾

シ口中涎多キ者ナリ

和生姜甘草湯效唾 和桂枝去芍藥加皂莢

湯吐涎 ① 湯甘草乾姜湯 煩燥

○肺癰

肺癰ハ咽乾キ口燥テ渴セズ膿痰ヲ吐ス其
膿痰ヲ盆水ノ中ヘ吐シムレバ沉ムモノハ肺癰
ナリ浮ムモノハ肺癰ニ非ルナリ ① 桔梗湯咽痛

① 葶藶大棗湯 胸滿 ② 桔梗白散吐下膿汁

○腸癰

腸癰ハ風寒感シテ裏ニ入大小腸ノ間ニ氣血
塞ギ營衛利セザレバ層紋皮ノ如ク俗ニ云サメ
其處ヲ按シテ濡ニシテ腫タル如クナルハ内癰
膿アリトス

① 薏苡附子敗漿散身如甲錯 ② 大黃牡丹皮

湯便膿 ③ 排膿散粘痰 ④ 枳實芍藥湯膿癰

○胸痺

胸痺ハ邪氣胸膈ニ在テ閉フサカルヲ云フ痺ハ

閉ナリ ① 橘皮湯嘔噦 ② 橘皮竹茹湯嘔逆

③ 橘皮枳實生姜湯嘔 ④ 茯苓杏仁甘草

湯氣塞 ⑤ 人參湯留氣 ⑥ 桔萸薤白白酒

湯喘息 ⑦ 枳實薤白桂枝湯滿痛 ⑧ 薏苡

附子湯惡寒 ⑨ 桂枝去芍藥湯胸滿 ⑩ 括

萸薤白半夏湯心痛微背

○結胸

結胸ハ益誤リ下シテ實邪内陷シ其邪氣胸

中ニ結ル故ニ胸鞭ク滿テ痛ムナリ

① 大陷胸湯項強 ② 小陷胸湯心下按痛 ③ 大

陷胸丸項背強 ④ 小柴胡湯心下滿痛 ⑤ 小半夏

加茯苓湯 眩悸

○身體疼痛

身體疼痛ハ寒邪表ニ在テ或ハ血凝テ周流スルヲ不得故ニ身痛ナリ

汗麻黃湯無汗發熱 溫附子湯少陰 和桂枝加

芍藥生姜人參新加湯發汗後 和桂枝湯表

溫四逆湯裏 和桂枝附子湯不能轉側 汗大青

龍湯不汗煩燥 汗麻黃杏仁薏苡甘草湯風濕

五苓散霍亂

○骨節疼痛

骨節疼痛ハ濕氣痰火ノ類ニ内ニ攻テホ子節ノ痛ムナリ

汗麻黃湯身疼腰痛 溫附子湯手足寒 和桂枝甘

草附子湯風濕 和桂枝芍藥知母湯脚腫如脫

○四肢拘急

四肢ハ即手足ナリ拘急ハ寒邪經絡ノ中ニ客タル故ニ拘急シテ不和ナリ乃手足屈伸ナラザルヲ云フ

和桂枝加附子湯難屈伸 溫真武湯沉重疼痛 和

柴胡加桂枝湯煩疼 溫四逆湯下利 和小

建中湯腹中拘急 下大柴胡湯腹滿 溫烏頭湯

腹中拘急 和桂枝芍藥湯腹拘攣 和芍藥甘草湯拘攣

○腹痛

腹痛ハ寒熱邪氣裏ニ入正氣ト相爭トキハ腹痛ス陽邪ノ痛ニハ或ハ止或ハ痛ニ大便閉ル

痛ス陽邪ノ痛ニハ或ハ止或ハ痛ニ大便閉ル

ハ熱トス陰寒ノ痛ハ休息ナシ腸鳴大便利
スルハ冷トス

○小建中湯 急痛 和 小柴胡湯 脇下 大

柴胡湯 心下 温 大建中湯 寒痛 和 桂枝加

芍藥湯 腹滿 和 柴胡加桂枝湯 同上 下 桂

枝加大黃湯 實痛 下 枳實芍藥湯 腹滿 下

大承氣湯 腹滿 和 黃連湯 欲嘔 温 真武湯

小便 和 附子粳米湯 逆滿 和 甘草粉蜜湯

蛇 温 烏頭湯 不伸 温 烏頭桂枝湯 寒疝 温

通脉四逆湯 手足厥 下 備急圓 心腹 下 厚

朴三物湯 痛閉

○腰痛

腰痛ハ腎經虛損シテ風冷コレニ乘スル故痛

ヲナスナリ其内老人ノ痛ハ陰氣ノ不足ト知
ルベシ

○麻黃湯 身疼 温 八味丸 小便 和 苓姜朮

甘湯 心下

○奔豚

奔豚ハ病少腹ヨリ發リ上ツテ咽喉ニツキ其動

狀豚ノ奔ガ如ク衝上ル者ナリ後人此ヲ腎

積ト云フ

○奔豚湯 腹痛 和 桂枝加桂湯 上衝 和 苓

桂甘棗湯 脐下 和 苓桂五味甘草湯 少腹 上衝

○心中悸

心悸ハ心中築々トシテ動キ怔忡スルナリ其症

三ツアリ氣虚ノモノアリ停飲ノモノアリ氣虚ノ

モノハ陽氣内ニ弱ク心下空虚ニテ正氣内ニ動
 シテ悸ヲナス又汗下ノ後正氣内ニ虚シテ亦悸
 ヲナス停飲ノモノハ水ヲ飲フ過多ナルニ因テ
 心下ニ停留シ心火水ヲ畏レ自安キフ不
 能シテ悸ヲナスナリ和茯苓澤瀉湯小便不利
 和桂枝甘草湯自冒和小建中湯煩和真
 武湯頭眩和茯苓甘草湯小便不利和小柴胡
 湯小便不利和炙甘草湯心動和蜀漆散胎下動氣
 和桂枝去桂加苓朮湯小便不利
 ○心下痞鞭
 痞鞭ハ益陰病ヲ誤リ下スニ因テ痞ヲ為ス是
 虚邪心下ニ留滯シテ循行スルヲ得ズ故ニ
 滿レレ不痛シテ鞭キ者ナリ

和瀉心湯心氣不定和半夏瀉心湯瀉熱和生
 姜瀉心湯嘔和甘草瀉心湯上逆和附子
 瀉心湯惡寒和大黃黃連瀉心湯心煩和
 桂枝人參湯上衝急迫和大柴胡湯發熱汗出和小
 承氣湯食傷和五苓散小便不利和十棗湯脇下
 引痛寒和水防己湯煩渴和甘遂半夏湯飲留
 和大半夏湯反胃和人参湯胸中痺和桂枝
 加芍藥生姜人參湯拘攣和生姜甘草湯
 肺痿和旋復代赫石湯瘀血和枳實薤白
 桂枝湯胸痺滿痛和茯苓飲小便不利
 ○心下滿痛
 心下滿痛ハ心下ニ當テ鞭ク凝痛ムモノヲ云フ
 是病氣分ニ在リ邪氣裏ニ入ラテ入ラス或ハ

下ス早キトキハ邪氣裏ニ入テ即チ滿ラ生ス

和小柴胡湯 不食 吐梔子豉湯 懊憹 下大

承氣湯燥屎 下大陷胸湯 結胸 和桂枝去

桂加苓朮湯微痛 和桂苓朮甘湯 頭眩

○腹滿

腹滿ハ乃腹脹ナリ。滿テ減スル時ナク。此ヲ按テ

痛ムヲ實トス。宜ク此ヲ下スベシ。又滿テ時ニ減

ズ此ヲ按テ不痛ヲ虚トス

下大承氣湯 燥屎 下調胃承氣湯 吐後 下

小承氣湯大便秘 下大柴胡湯 拘攣 和小柴

胡湯脇胸苦滿 下厚朴三物湯 閉 下梔子厚朴

湯胃起不安 和厚朴生姜半夏人參湯 嘔 温 四

逆湯下利 汗厚朴七物湯 上逆 下大陷胸

湯結胸 下大黃消石湯 結塊 下走馬湯 心痛

○少腹滿

少腹滿ハ乃臍下滿ルナリ。邪氣上ヨリシテ下リ

下焦ニ至リ。結シテ利セザル故ニ少腹滿トナ

ルナリ

下大陷胸湯 結胸 下大黃甘遂湯 如敦 下

大黃牡丹皮湯臍下塊 下抵當湯 瘀血 汗小

青龍湯小便利 下消礬湯 黃家 下桃核承氣

湯少腹急結

○腹中雷鳴

雷鳴ハ飲水多クシテ水腸胃ノ間ニ流レ走ニ

因テ澁々トシテ聲ヲナス又ハ脾胃ノ虚ニテ自ラ
雷鳴スルアリ其虚實ヲ察スベシ

①和生薑瀉心湯 痞鞭 ②和甘草瀉心湯 心煩

③和半夏瀉心湯 痞鞭 ④和附子粳米湯 腹痛

○宿食

宿食ハ食物腹中ニヤドリ滯ルヲ云フソノ證
六七日モ大便セズ亦煩熱セズ腹滿テ痛ム
モノナリ

①大承氣湯 譫語 ②瓜蒂散 上脫 宿食

○不欲食

不欲食ハ邪氣表裏ニ客タルニ由ナリ若邪氣
表ニ在ハ稍食シ裏ニ在モノハ食スルコト不
能ナリ

①和小柴胡湯 心下滿 ②和茯苓飲 停痰宿水

○譫語

譫語譫又譫ニ作ル譫ハ妄ナリ或ハ見所アルガ
如クシテ妄言スルヲ云フ又目ヲ合シテ自ラ自用
常行クヲ云フ此胃熱盛ニシテ心ニ乘スルトキ
ハ譫語或ハ獨語或ハ狂語等アリ蓋其病實
スルニ因ナリ

①大承氣湯 燥屎 ②小承氣湯 潮熱 ③調

胃承氣湯 胃氣不和 ④白虎湯 遺尿 ⑤柴胡加

龍骨牡蠣湯 小便利 ⑥柴胡桂枝湯 吐 ⑦

梔子豉湯

○鄭聲

鄭聲ハ邪音ヲ為ナリ其聲耳鄭衛ノ音ヲ轉

シテ正レカラサルガ如シ。經ニ日虚スレバ則鄭聲
スト。今大汗ノ後又ハ久ク病テ乃人聲ノ轉ズル
者是ナリ。故ニ虚タル一從テ知ルベシ。蓋鄭聲
ハ謔語ト別事ニシテ同類ト知ルベシ。尤其虚
實ヲ詳ニシテ施治スルヲ要トス

○發狂

發狂ハ熱毒胃ニ在テ心ト併バ神志定リガタ
ク遂ニ狂ヲ發ス。其人臥テ少フシテ食ヲ欲セズ。
妄ニ言笑シ或ハ高ニ登テ歌ヒ衣ヲ棄テ走
リ。垣ヲ踰屋ニ上リ。親疎ヲ避ザル者アリ
和防已地黄湯 狂狀 ①抵當湯 瘀血 ②温桂
枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 胸腹 ①桃
核承氣湯 少腹 ①大承氣湯 獨語見 ②瀉

心湯 心氣 不定

○發黃

發黃ハ即黃疸ナリ。其病モト脾胃ノ濕熱ヨリ
生ス。蓋濕熱血熱ヲ薰蒸シテ土色面目ニ上行
シ。爪甲身躰ニ及ヒ俱ニ黃ハムモノナリ。譬ハ朱麩
ノ土室ノ中ニ橙時シテ自然ニ黃ヲ生ズルガ如シ
茵陳蒿湯 大便 ①茵陳五苓散 小便 ②寒
梔子蘗皮湯 發熱 ①大黃消石湯 腹滿 ②汗
麻黃連軛赤小豆湯 痲熱 ①黃蘗芍藥桂
酒湯 黃汗 ②麻黃醇酒湯 黃疸

○水腫

水腫ハ一身面目手足ニ浮腫ルナリ。或ハ腹
大ニシテ鼓ノ如ク。面目四肢不腫モノヲ脹滿

ト云フ又鼓脹ト名ク皆脾土濕熱ヨリ生ズ

凡水腫ニ陰陽アリ陽腫ハ多クハ外因水ヲ涉

リ兩二目サレ或ハ風寒暑氣ヲ兼テ陽症ヲ見

ス陰腫ハ多クハ内因水ヲ飲及ヒ茶酒ヲ過シ

或ハ飢飽勞役房慾等ニ因テ陰症ヲ見ス陽

腫ハ上體ヨリ發リ陰腫ハ下體ヨリ發ルモシ

男子脚ヒモクカ下ヨリ腫發リ女子頭上ヨリ腫發レハ

是逆ギヤクニシテ難治ナシナ中氣不足チウキフクシテ水ヲ防グ

フ不能キレユニ其水ミヅ遍身ヘンシニ泛濫ハンランスレバナリ

汗アツク越婢湯エツヒトウ風水フヱスイ汗アツク越婢加朮湯エツヒトウカヂトウ裏水ウラスイ温ユヅメ真

武湯ブトウ心ココロ中ナカ躁ソウ下シタ牡蠣澤瀉散ボウキソクサクサン腰ウシ以ヨリ下シタ葵子アヅキ茯苓フクラン

苓散レイサン水スイ妊ニシ娠ニシ和ワ防已フウイ茯苓湯フクラントウ皮水ヒスイ和ワ防已黃

芩湯チントウ風水フヱスイ汗アツク小青龍湯コウセイリウトウ喘咳センカク下シタ枳朮湯シキヂクトウ心ココロ

堅滿ケンマン和ワ生薑瀉心湯シヤウキヤウシントウ脇下ウヂノシタ汗アツク麻黃附子甘

草湯ソウトウ氣水キスイ汗アツク甘草麻黃湯カンサウマキヤウトウ裏水ウラスイ寒サムイ木防已

湯トウ支飲シイン和ワ澤瀉湯ソクサトウ支飲シイン和ワ茯苓澤瀉湯フクランソクサトウ腰ウシ

水氣スイキ和ワ薏苡附子敗漿散イイヒフシバイヤウサン腫狀シュウサウ

○霍亂

霍亂ハ暑熱ノ間飲食生冷ニ傷レ外邪ニ感シ

交雜コウザクテ一時イツジ吐瀉トシャシテ身ヲ悶モトヘ手足テ振シ廻マ

スルヲ揮霍キカク撩乱リョウラント云フ因テ霍亂ト名ク

下五苓散ゲゴレイサン頭痛テウツウ温ユヅメ理中丸リチュウワン寒多サムイタカシ温ユヅメ四逆湯シギャクトウ

手足テ厥冷ケツレイ和ワ桂枝湯ケイシトウ吐利トリ後

○下利

下利ハ邪氣腸胃ニ在テ水分スイブン職シキヲ守ルモ不

能故ニ水穀スイコク一時イツジ下ルナリ

汗葛根湯項背和黃芩湯裏熱溫四逆湯

厥逆身疼下大承氣宿食下小承氣諸語溫

白通湯少陰下猪苓湯少陰病溫桃花湯

便膿溫通脈四逆湯手足厥寒白頭翁湯

熱利汗葛根黃連黃芩湯表未汗麻黃升

麻湯唾膿溫真武湯少陰溫桂枝人參湯

心下痞寒白頭加甘草阿膠湯血症

○大便鞭

大便鞭五六臟三焦俱二調和セザレハ即チ冷

熱并結シテ熱氣偏ニ腸胃入レバ津液竭燥ス

故ニ大便鞭塞ス寒瀉心湯心下

下麻仁丸秘結下小承氣湯小便下大承

氣湯諸語下五苓散消渴和小柴胡湯食不

下調胃承氣湯胃不和下抵當湯大便下蜜

煎導小便下大黃甘草湯食已下厚朴三

物湯腹滿和桂枝附子去桂加朮湯小便

○燥尿

燥尿ハ乃乾糞ナリ乾糞アレハ下孔塞ル故其

氣モ又不順ニシテ起居安カラス時々轉矢

氣スルナリ治方同上

○小便不利

小便不利ハ邪氣下篤ニ聚リ結シテ散セズ

甚キ時ハ少腹硬ク滿テ痛ミヲナス

下五苓散表裏下茵陳五苓散身黃寒茵

陳蒿湯一身黃下猪苓湯裏熱和猪苓散

心下悸和苓桂朮甘湯痰飲溫八味丸少腹

①麻黃加朮湯濕 ②茯苓澤瀉湯心下悸

茯苓戎鹽湯心下悸 ③小柴胡湯心下悸 ④桂枝

枝芍藥湯心下悸 ⑤桂枝加芍藥湯心下悸 ⑥桂枝

加黃芩湯心下悸 ⑦桂枝加附子湯小便不利 ⑧桂枝甘草

湯盜汗 ⑨桂枝加附子湯小便不利 ⑩桂枝甘草

湯附子湯 ⑪葵子茯苓散腫滿 ⑫柴胡

桂姜湯胸脇有動 ⑬桃花湯膿血 ⑭紫胡龍

骨牡蠣湯胸滿煩驚 ⑮抵當湯瘀血 ⑯真武湯

⑰小青龙湯少腹滿 ⑱大黃牡丹皮

湯越婢加朮湯 ⑲大承氣湯大便難或

○小便自利

小便自利ハツカラ通利シテ覺ガルヲ云フ

コレ下元虚冷シテ腎膀胱水ヲ攝方ス故

三瀝湯ヲ致スナリ

①白虎湯遺尿 ②小建中湯腹痛 ③蜜煎

導大便閉 ④抵當湯瘀血 ⑤桂枝附子芍藥

加朮湯心下滿大便鞭 ⑥苓姜朮甘湯腰冷 ⑦

麻黃甘草湯面目黃 ⑧八味丸

○厥冷

厥冷ハ乃手足逆冷スルヲ云フ厥ハ逆ナリ此陽

氣暴衰シテ陰氣獨盛ニシテ陰陽ニ勝ユヘニ

陽脈手足ニ不通ニ因テ逆冷スルナリ

①四逆湯直中寒 ②通脈四逆湯腹痛微 ③當

歸四逆湯下利脈細 ④吳茱萸湯煩躁 ⑤麻黃

升麻湯咽不利 ⑥甘草乾姜湯肺痿 ⑦白虎

湯中喝 ⑧附子湯身體痛手足寒 ⑨茯苓甘草湯

心下 ㊟乾薑附子湯 腹痛 下利

○振

振ハ森然トシテ寒キガ如ク聳然トシテ振動ス。是虚寒トス。益發汗吐下ノ太過スルニ由ツテ血氣虚損シテ自ラ振ヲ作ス。振ハ戰ニ近シ。輕キ者ヲ振トス。戰ハ正ト邪トノ争トス。振ハ但虚シテ争ヒニ至ラズ。故ニ々々聳動シテ振ナリ。

㊟苓桂朮甘湯 頭眩 ㊟真武湯 欲擗

○戰慄

戰慄ハ邪氣ト正氣ト争ヒ甚キナリ。争ヒ微ナル時ハ振ヲ為ス。戰ハ身ヲ戰揺スルヲ云フ。正氣ノ勝ナリ。慄ハ心ノ戰ヒトス。邪氣ノ勝ナリ。宜ク温熱ノ劑ヲ與フベシ。

㊟四逆湯 手足厥冷 ㊟附子湯 背惡寒

○驚悸

驚悸ハ事ニ因テ大ヒニ驚クアリ。心神觸忤テ氣ト涎ト鬱シテ遂ニ驚悸ヲ生ズ。此乃心虚膽怯ノ致ス處ナリ。

㊟甘麥大棗湯 急迫 ㊟奔豚湯 腎積 ㊟桂枝加蜀漆龍骨牡蠣湯 起卧不安 ㊟柴胡加龍骨牡蠣湯 煩驚

○蛇厥

蛇厥ハ胃中虚冷。邪氣盛ナレバ自ラ腹中ニ蛇虫ヲ生ズ。其症胃脘忽痛。忽止。身上忽熱。忽涼。頻ニ口中黄水ヲ吐テ不食。モノヲ云モシ。蛇ヲ吐下セハ即チ安シ。病厥陰ニ屬ス。

和烏梅圓 臘寒 和甘草粉蜜湯 吐涎心痛 和黃連湯 心煩

○狐惑

狐惑ハ猶豫シテ進退ヲ決セザルノ義ナリ其
症四肢沉重シテ懶ク食氣ヲ耳ニ聞クモ惡
ミ黙々ト眠ント欲シテ目閉ルノ不能面目
ノ間赤白黒色變易シテ常ナシ上脣ニ瘡
ヲ生シ虫下部ヲ食フヲ狐トス下脣ニ瘡ヲ生
シ虫臟ヲ食フヲ惑トス其聲タシハ啞ナリ
和甘草瀉心湯 蝕於上部 苦參湯 蝕於下部宜即咽乾者
以一味洗之

○中風

中風ハ乃今ノ傷風古ヘコレヲ中風ト云々今
世ニ謂所ノ証ハ多クハ癱瘓不仁或ハ偏枯
シ舌強リテ語ラス口眼喎斜四肢舉乏身
體疼痛シ神氣昏冒スル其症一ナラズ或卒
ニ暈倒シテ氣ヲ失フ此ヲ卒中ト云又氣體
虚弱ニシテ自ラ邪氣虚ニ乘ジ入テ中風ニ類
スル者此ヲ類中風ト云其證紛々尤辨知
スヘシ

和續命湯 半身不遂 和小續命湯 在外邪 和侯氏

黑散 四肢煩重 和黃耆桂枝五物湯 身體不仁 和烏

頭枝桂湯 手足不仁 和桂枝湯 身痺

○脚氣

脚氣ハ古ヘノ説ナシ黃帝ノ時ハ名テ厥トス而
漢ノ間名テ緩風トス宋齊ノ後ニ始テ此ヲ

脚氣ト云フ其名同シカラスト雖其症ハ一ナリ
今ノ感スル所ハ皆風毒ニ由テ致スナリ是所
謂地ノ風寒暑湿皆蒸氣アリ脚常ニ其氣ヲ
フミテ遂ニ痛ヲ得テ歩行成難ク此ヲ脚氣
ト云フ

⑤附子湯 身體痛 ⑤烏頭湯 歷節痛 ⑤礬石湯

脚不仁 ⑤真武湯 小便不利 ⑤越婢加朮湯 腫滿

⑤八味丸 胎下不仁 ⑤桂枝芍藥知母湯 脚腫如脫

⑤芍藥甘草湯 脚掣急

○瘧疾

瘧疾ハ種類尤多シ其名同ジカラストイヘトモ
皆外風寒暑湿ノ氣ニ感ジ衛氣ト爭ヒ搏テ
後ニ病一日ニ一發スルヲ陽トス邪淺シ故ニ

解シ易ク或ハ日ヲ隔テ二三日ニ一發スル

ヲ陰トス邪深シ故ニ解シ難ク是多クハ夏日

暑ニ傷ラレテ秋ニ至テ病ムモノナリ

⑤白虎加桂枝湯 温瘧 ⑤蜀漆散 牡瘧 ⑤

牡蠣湯 牡瘧 ⑤柴胡桂枝生薑湯 寒多 ⑤

柴胡去半夏加枳實湯 渴

○瘧狀

⑤大承氣湯 日晡發熱 ⑤桂枝湯 日再發 ⑤桂枝

二麻黃一湯 日再發 ⑤桂麻各半湯 熱多 ⑤

小柴胡湯 寒熱 ⑤葛根湯 發熱惡寒

○不得眠

不得眠ハ是陰虛ナリ晝夜不分熟眠スルヲ

ヲ得ズ若陰盛ニシテ陽虛スレバ則チ嗜ムナ

リ亦夜ニ至レバ安靜シ晝ハ煩躁シテ眠ルコト
不得モノハ此汗下ノ後暴ニ陽氣ヲ傷ルニヨル
ナリ

和黃連阿膠湯熱利 ⑤五苓散煩燥 ⑥枳

子豉湯虛煩 ⑦猪苓湯心煩 ⑧大承氣湯

二便難通 ⑨乾姜附子湯煩燥 ⑩酸棗仁湯燥

和 小建中湯心中悸

○勞復病

勞復病ハ大病新ニ愈テ後氣血尚虛シ餘
熱盡ガハ宜ク安卧靜養スベシ若早起テ
勞動スバ即血氣沸騰シテ發熱再復ス或
ハ頭ニ梳リ沐浴スバ即氣ヲ動シ或憂愁
思慮セバ即神ヲ傷ル酒色ヲ犯ハ其害最モ
甚シ

和 小柴胡湯發熱 ⑪竹葉石膏湯耳鳴目痛 ⑫

枳實梔子豉湯胸滿 ⑬甘草瀉心湯腹中雷鳴

⑭附子粳米湯雷鳴嘔吐 ⑮半夏瀉心湯腸鳴

⑯牡蠣澤瀉散腰下水氣 ⑰黃耆建中湯諸不足

和 燒棍散陰陽易

○諸血

諸血ヲ見ス者ハ其脈多クハ乾大ナリヤス沉
小丸ヲ宜ントス洪大ナルハ不宜吐血衄血下
血便血其外一切ノ血症多クハ熱ニ属ス宜ク
清涼ノ劑ヲ與フベシ

和 芎歸膠艾湯吐血 ⑱黃土湯下血 ⑳栝

葉湯吐血 ㉑瀉心湯吐血 ㉒抵當湯瘀血

下瘀血湯 瘀血 温桃花湯 便膿 下桃核

承氣湯 少腹急結 下大黃甘遂湯 月水不調 下桂枝

茯苓丸 癥病 下土瓜根湯 帶下 和麥門冬

湯 火逆 汗麻黃湯 不發汗 因致衄

○妊娠

妊娠ハ女子ニ七ニシテ天癸至ル天癸ハ乃陰

氣ナリ陰氣盛ニシテ月水下ル月水後七日ノ

間血海始テ淨シ是ニ於テ男女ノ二氣交感ス

レハ妊娠自ラ成ル張介賓曰少壯ノ時ノ子或ハ

ハナリ老後ニ得ルノ子反テ強壯多ト者ハ慾少シテ精全ケレバナリ

温當歸散 安胎 和白朮散 養胎 和桂枝湯

渴不食 無寒熱 下桂枝茯苓丸 胎動 和膠艾湯 血

半產 和當歸芍藥散 癥病 胎動 和乾姜人參半

夏九 嘔吐 下葵子茯苓散 小便利

○産後

産後其脉緩滑沉細ナルヲ宜シトス實大弦

數ナルハ不宜最産後ノ諸症多シトイヘトモ皆

虚ニ属ス假ヒ瘀血トイヘトモ虚中ノ實ニシテ

全ク實ニ非ズ治方ハ大抵氣血ヲ補ヒ瘀血

ヲ行スヲ以テ法トスベシ

和小柴胡湯 嘔不能食 下枳實芍藥散 腹痛 下

大承氣湯 惡露不盡 下下瘀血湯 經水不利 寒白頭

翁加甘草阿膠湯 血證急迫 寒竹皮大丸 乳汁

温當歸散 安胎 和芎歸膠艾湯 腹痛 下葵

子茯苓散 腫滿 下桂枝茯苓丸 瘀血 和小

建中湯 虚羸 腹痛 和三物黃芩湯 煩 和柴胡桂

十一 桂枝去桂加苓朮湯 心下悸

十二 桂枝附子去桂加朮湯 身體疼煩 小便自利

十三 黃耆桂枝五物湯 身體不仁 嘔不急迫

十四 桂枝甘草湯 上衝 急迫

十五 桂枝甘草附子湯 骨節疼煩 小便自利

十六 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 失精陰寒 胸腹有動

十七 桂枝生薑枳實湯 胸滿 上逆

十八 小柴胡湯 胸脇苦滿 寒熱往來

十九 柴胡桂枝湯 寒熱 腹痛

二十 柴胡桂薑湯 頭汗 壯癢

廿一 柴胡去半夏加栝蒌湯 胸脇滿 渴不嘔

廿二 柴胡加龍骨牡蠣湯 胸脇有動 不可轉側

廿三 小建中湯 腹痛失精 四肢痠痛

廿四 黃耆建中湯 虛勞裏急 盜汗自汗

廿五 黃耆芍藥桂酒湯 身體腫發熱 汗出如藥汁

廿六 茯苓甘草湯 心下悸

廿七 茯苓戎鹽湯 小便不利

廿八 茯苓杏仁甘草湯 氣塞 短氣

廿九 茯苓澤瀉湯 小便不利 嘔吐發渴

三十 茯苓飲 心下痞鞭 小便不利

卅一 苓桂朮甘湯 上衝頭眩 小便不利

卅二 苓桂甘棗湯 臍下悸 腹拘急

卅三 苓桂五味甘草湯 心下悸 咳急迫

卅四 苓甘五味薑辛湯 痰飲 欬滿

卅五 苓甘薑味辛夏湯 支飲 嘔吐

卅六 苓甘薑味辛夏仁湯 欬滿 微腫

卅七 澤瀉湯 支飲 胃眩

卅八 猪苓散 小便不利 吐後思水

卅九 防己茯苓湯 水有皮中

四十 防己黃耆湯 小便不利 腰下浮腫

四十一 附子粳米湯 腹中雷鳴 胸脇逆滿

四十二 附子瀉心湯 心下痞鞭 惡寒疼痛

四十三 半夏瀉心湯 心下痞鞭 腹中雷鳴

四十四 甘草瀉心湯 腹中雷鳴 心煩不安

四十五 生薑瀉心湯 心下痞鞭 腹中雷鳴

四十六 黃連湯 腹痛嘔吐

四十七 黃連阿膠湯 心中煩 不得眠

四十八 甘草湯 咽痛

四十九 桔梗湯 咽痛 肺癰

五十 半夏散 咽喉痛

五十一 苦酒湯 咽中 生瘡

五十二 半夏厚朴湯 咽中如有物

五十三 半夏乾薑散 乾嘔

五十四 大半夏湯 嘔吐

五十五 小半夏湯 吐而不渴

五十六 小半夏加茯苓湯 嘔吐眩悸

五十七 生薑半夏湯 似嘔不嘔 似噦不噦

五十八 乾薑人參半夏丸 嘔吐不止 心下痞鞭

五十九 乾薑黃連黃芩人參湯 心煩吐下 心下痞鞭

六十 厚朴生薑半夏甘草人參湯 腹滿嘔吐

六十一 梔子乾薑湯 心中微煩

六十二 薏苡附子散 胸痺惡寒

六十三 薏苡附子敗漿散 身甲錯 腹皮急

六十四 橘皮枳實生薑湯 胸痺 氣塞

六十五 橘皮竹茹湯 噦逆

六十六 橘皮湯 嘔噦

六十七 排膿湯 肺癰

六十八 芍藥甘草湯 拘攣 急迫

六十九 芍藥甘草附子湯 心煩 惡寒

七十 甘麥大棗湯 狂驚

七十一 甘草粉蜜湯 蛇虫

七十二 生薑甘草湯 肺痿

七十三 炙甘草湯 心下 動氣

七十四 葶藶大棗湯 肺癰

七十五 烏梅丸 吐衄

七十六 黃芩湯 拘急 下利

七十七 黃芩加半夏生薑湯 乾嘔 下利

七十八 物黃芩湯 心下痞鞭 乾嘔 下利

七十九 三物黃芩湯 心胸 苦煩

八十 旋覆花代赭石湯 心下痞鞭 噫氣不除

八十一 酸棗仁湯 虛煩不 得眠

八十二 括蕪薤白半夏湯 心痛徹背 喘息或嘔

八十三 麥門冬湯 火逆上氣 咽喉不利

八十四 當歸芍藥散 懷妊 腹痛

八十五 當歸四逆湯 手足 厥寒

八十六 當歸四逆加吳茱萸生薑湯 久寒 嘔吐

八十七 赤石脂禹餘糧湯 毒在臍下 下利不止

八十八 奔豚湯 腎積 驚恐

傷寒論通目次

八十九 芎歸膠艾湯 吐衄腹痛 血下血

九十 燒視散 陰陽易

九十一 續命湯 中風

九十二 小續命湯 中風

九十三 防己地黄湯 狂狀

九十四 桂枝芍藥知母湯 支節疼痛 脚腫如脫

○寒劑 寒能勝熱 熱在上則咽渴鼻乾 熱在下則便秘唯除熱宜寒劑

九十五 白虎湯 大渴 燥煩

九十六 白虎加入參湯 大煩渴 脈洪大

九十七 白虎加桂枝湯 煩渴 上衝

九十八 竹葉石膏湯 頭痛耳鳴 目痛齒痛

九十九 木防己湯 支飲喘滿 心下痞鞭

一百 瀉心湯 心下痞

百一 大黃黃連瀉心湯 心煩

百二 茵陳蒿湯 一身黃 大便鞭

百三 梔子蘘皮湯 身黃 心煩

百四 文蛤散 渴

百五 白頭翁湯 下利欲水

百六 白頭翁加甘草阿膠湯 產後下利

百七 竹皮大丸 乳汁閉

○溫劑 寒中于表宜汗 寒中于裏宜溫

百八 四逆湯 手足厥冷 身體疼痛

百九 通脈四逆湯 手足厥逆 脈微欲絕

百十 四逆加入參湯 手足厥冷 下利清穀

傷寒論通目次

百十一 茯苓四逆湯 煩躁惡寒

百十二 桂枝附子湯 身體疼煩不能轉側

百十三 桂枝芍藥加附子湯 胸滿惡寒

百十四 桂枝加黃耆湯 盜汗自汗

百十五 桂枝加龍骨牡蠣湯 煩躁失精

百十六 桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 動

百十七 人參湯 心下痞鞭小便不利

百十八 桂枝人參湯 心下痞鞭上衝急迫

百十九 枳實薤白桂枝湯 胸痺

百二十 枳實薤白白酒湯 胸背痛

百廿一 枳實瞿麥丸 小便不利

百廿二 苓薑朮甘湯 小便不利腰冷或重

百廿三 八味丸 腰痛

百廿四 牡蠣湯 牡瘡

百廿五 大黃附子湯 腹痛惡風

百廿六 甘草乾薑湯 肺痿

百廿七 乾薑附子湯 腹痛下利手足厥冷

百廿八 白通湯 下利氣逆

百廿九 白通加豬膽汁湯 下利不止厥逆乾嘔

百三十 烏頭湯 骨節疼痛不可屈伸

百卅一 赤丸 心下悸有痰飲

百卅二 真武湯 水氣頭眩

百卅三 附子湯 身體痛手足寒

百卅四 天雄散 小便不利胛下有毒

百卅五 吳茱萸湯 嘔吐胸滿

百卅六 大建中湯 腹大痛不飲食

百卅七 桃花湯 便膿血

百卅八 蜀漆散 壯癰

百卅九 礬石丸 經水不利 下白物

百四十 蛇狀子散 陰中痒 下白物

百四一 溫經湯 月水不調 帶下不止

百四二 當歸散 姙娠安胎

百四三 白朮散 姙娠養胎

百四四 黃土湯 血證

百四五 栝葉湯 吐血

百四六 侯氏黑散 四肢煩重

百四七 烏頭桂枝湯 腹中絞痛 手足不仁

○汗劑 凡服發汗藥中病便止後服不
必盡劑也 大底病在表者宜發汗

百四八 麻黃湯 發熱無汗 骨節疼痛

百四九 麻黃加朮湯 骨節疼痛 小便不利

百五十 麻黃甘草湯 喘急息迫 無汗黃腫

百五一 麻黃附子甘草湯 無汗而喘 惡寒身疼

百五二 麻黃附子細辛湯 痰飲

百五三 麻黃杏仁甘草石膏湯 喘咳 煩渴

百五四 麻黃杏仁薏苡甘草湯 喘咳 水氣

百五五 桂枝麻黃各半湯 頭痛發熱 無汗身疼

百五六 桂枝二麻黃一湯 頭痛發熱 身體疼痛

百五七 桂枝二越婢一湯 頭痛發熱 惡風身腫

百五八 越婢湯 惡風煩渴 一身悉腫

百五九 越婢加朮湯 面目黃腫 小便不利

百六十 越婢加半夏湯 喘咳 煩渴

百六一 葛根湯 項背強急 發熱惡風

百六二 葛根加半夏湯 項背強急 下利嘔吐

百六三 葛根黃連黃芩湯 項背強急 下利不止

百六四 小青龍湯 心下水氣 喘咳發熱

百六五 大青龍湯 喘咳及渴 身疼惡風

百六六 文蛤湯 煩渴 喘咳

百六七 半夏麻黃丸 喘 嘔

百六八 桂薑棗草黃辛附湯 心下堅大 惡寒身疼

百六九 射工麻黃湯 喘

百七十 麻黃連軹赤小豆湯 發熱 發黃

百七一 麻黃升麻湯 咽喉不利 泄利不止

百七二 麻黃醇酒湯 黃疸

○吐劑 凡服吐藥中病即止後服不必盡劑也大抵病在膈上者宜吐

百七三 梔子豉湯 懊憹

百七四 梔子甘草豉湯 懊憹急迫

百七五 梔子生薑豉湯 懊憹嘔吐

百七六 瓜蒂散 上脘 宿食

○下劑 凡服下藥用湯勝丸中病即止後服不必盡劑也大抵病在裏者宜下

百七七 大承氣湯 腹堅滿 大便鞭

百七八 小承氣湯 譫語 潮熱

百七九 調胃承氣湯 大便不通

百八十 桃核承氣湯 狂狀血證 少腹急結

百八二 大柴胡湯 腹滿嘔吐

百八二 大黃牡丹皮湯 有堅塊 便膿血

百八三 大黃甘遂湯 少腹滿

百八四 大黃消石湯 黃疸 腹滿

百八五 大黃甘草湯 秘閉 急迫

百八六 大陷胸湯 結胸

百八七 大陷胸丸 結胸 項強

百八八 小陷胸湯 小結胸

百八九 橘皮大黃朴硝湯 心胸間 有宿滯

百九十 厚朴三物湯 腹滿 秘閉

百九一 厚朴七物湯 腹滿發熱 上逆嘔吐

百九二 梔子厚朴湯 胸腹煩滿

百九三 梔子大黃豉湯 懊憹 熱痛

百九四 枳實梔子豉湯 胸滿 懊憹

百九五 枳實芍藥散 腹滿 拘攣

百九六 枳木湯 心下堅滿 小便不利

百九七 下瘀血湯 經水不利

百九八 土瓜根散 經水不利 少腹滿痛

百九十九 抵當湯 瘀血

二百 抵當丸 瘀血

二百一 走馬湯 胸腹有毒 大便不通

二百二 大豬膽汁方 肛中乾燥 大便閉塞

二百三 蜜煎導方 肛中乾燥 大便閉塞

二百四 麻仁丸 大便秘閉

二百五 己椒蘆黃丸 腹滿口乾 二便澀滯

二百六 十棗湯 支飲 懸飲

二百七 排膿散 瘡癰 粘痰

二百八 桂枝茯苓丸

經水變或胎動

二百九 桂枝加芍藥大黃湯

胸滿痛有停滯

二百十 葵子茯苓散

小便不利

二百十一 苓甘薑味辛夏仁黃湯

腹中微結面熱如醉

二百十二 五苓散

消渴霍亂

二百十三 茵陳五苓散

黃疸或渴小便不利

二百十四 猪苓湯

小便不利淋瀝欲水

二百十五 牡蠣澤瀉散

腰下水氣

二百十六 柴胡加芒消湯

苦滿難解

二百十七 甘遂半夏湯

拘攣急迫心下鞭滿

二百十八 厚朴大黃湯

支飲

二百十九 消礬散

一身黃

二百廿 礬石湯

腳氣痿弱

二百廿一 桔梗白散

胸咽有毒咳而胸滿

二百廿二 備急圓

胸腹有毒心痛腹痛

傷寒譯通下卷

浪華 鈴木定寛温卿撰

○和劑

○桂枝湯 此方ハ傷寒頭痛發熱汗出

惡風スル者主之

桂枝 芍藥 生薑各三

甘草二 大棗十二枚擘。量目各見前。

右五味咀咀シ水七升ヲ以テ微火ニ煮テ三

升ヲ取滓ヲ去寒温ニ適テ一升ヲ服ス服已テ

須臾シテ熱稀粥一升餘ヲ啜テ藥力ヲ助

ベシ温覆スル一時許ヲラシメ遍身粟々ト

シテ微ク有汗ニ似タル者ハ益佳ナリ大ニ汗

シテ水ノ流滴スルガ加クナラシムベカニス病除

傷寒論
カスシテ却テ害アリ。若一服ニシテ汗出テ
病瘥ハ後服ヲ停ム必劑ヲ盡サズ若シ汗セ
ズンバ更ニ服スル一前法ニ依ベシ。又汗セスンバ
後服ヲ促ベシ。其間半日許ニシテ三服ヲ盡
サシム。若病重キモノハ一日一夜ニ服ス。周時
之ヲ觀テ一劑ヲ服シ盡シテ病症猶在者
ハ更ニ服ヲ作ス。若汗出た者ハ乃チ二三劑
ニ至ルベシ

論治 太陽ノ中風陽浮ニシテ陰弱陽
浮ナル者ハ熱自發シ陰弱ナル者ハ汗自出
瀉々ト惡寒シ淋々ト惡風シ翕々ト發熱
シ鼻鳴テ乾嘔スル者此方主之。○太陽病
之ヲ下シテ後其氣上衝スル者ハ此湯ヲ與

ベシ。若上衝セザル者ハ與ベカラス。○太陽病
初此湯ヲ服シ反ツテ煩シテ不解者ハ重テ
此湯ヲ與フレハ即愈。○桂枝ハ本肌ヲ解ス
トス。此發汗ニ非ルヲ明ス。其人脈浮緊發熱シテ
汗不出者ハ與ベカラス。此症麻黃湯ヲ可與常ニ此
ヲ識テ妄ニ治スル一勿ルベシ。○太陽病外證
未解セズ脈浮弱ナル者ハ當ニ汗ヲ以テ解
スベシ。此湯主之。○太陽病外證未解者ハ
下スベカラズ。此ヲ下スヲ逆トス。外ヲ解セント
欲ル者主之。○傷寒汗ヲ發シ已ニ解シテ
半日許ニシテ復煩シ脈浮數ナル者ハ邪氣不
盡ナリ。更ニ汗ヲ發スベシ。主之。○太陽病發
熱汗出ル者ハ此藥弱ク衛強キニヨル故ニ

汗出カシム風邪ヲ救ント欲ル者主之○
病人裏和シテ無他病時ニ發熱シ自汗出
テ不愈者ハ此衛氣不和ナリ其時ニ先ツテ
汗ヲ發スレバ則愈此湯ニ宜シ○傷寒醫
此ヲ下ス果シテ下利シ清穀止ズ身疼痛ス
ル者ハ急ニ裏ヲ救フベシ四逆湯後身疼痛
シ清便自ラ調者ハ急ニ表ヲ救フベシ此湯
主之○傷寒大ヒ下シテ後復汗ヲ發シ心
下痞シ惡寒スル者コレ表未ダ解セガルナリ
必痞ヲ攻ベカラス當ニ先此湯ヲ與ヘテ表
ヲ解スベシ表解シテ乃痞ヲ攻ベシ攻痞ハ
大黃黃
連瀉心湯 ○太陽病三日已ニ汗ヲ發シ若
ハ吐シ若ハ下シ若ハ温鍼シテ仍不解者ハ

此ヲ壞病トス桂枝ヲ與ルニ不啻ナリ能其脈
證ヲ察シテ何レノ處ニ犯逆スト云フヲ辨知シ
テ後證ニ隨テ治スベシ○陽明病脈遲汗出
ト多ク微シ惡寒スル者此方主之○下利ノ後
身疼痛シ清便自ラ調者主之○下利シテ
腹脹滿身體疼痛スル者先四逆湯其裏ヲ
温テ後其表ヲ攻ベシ此湯ニ宜シ○吐利止
テ身ノ痛シ猶不休者主之○太陰病脈
浮大者主之○病人煩熱汗出ハ則解ス
又瘧狀ノ如ク日晡所ニ發熱スル者ハ陽明ニ
屬ス脈實スル者ハ太承氣此ヲ下スヘシ脈
浮虚ナル者ハ汗ヲ發スベシ此方主之○
桂枝湯ヲ服シテ大ヒニ汗出テ脈洪大ナ

傷寒釋義 申

ル者ハ桂枝湯ヲ與ル^ル前法ノ如クス若
 形瘧ノ如ク毎日再發スル者汗出レハ必ズ
 解ス桂枝ニ麻黄一湯ニ宜シ。許氏ノ云
仲景傷寒ヲ
 治スニハ則桂枝ニハ則麻黄ニハ則青龍ニ方
 門ノ如クニ立偏ニ廢ベカラス若證候ト脉ト相
 對スレハ手ニ應ジテ
 愈ズト云フナシ

二

○桂枝加桂湯 此方ハ桂枝湯ノ證ニシテ
 上衛劇キ者王^レ之^ラ

桂枝湯ノ方中ニ只桂ニ兩ヲ加フル^ル
 共ニ五兩餘ハ全ク同シ

●論治 燒鍼ヲ用ヒテ汗セシメ鍼スル處
 寒ヲ被リ遂ニ肉變ジテ赤ク腫高ク起テ核
 ノ如キ者ハ必奔豚ヲ發ス其勢ヒ塊物^ノ
 ヲテ少腹ヨリ上逆シテ心ニ衝者ハ其核上ニ

三

○桂枝加葛根湯 此方ハ桂枝湯ノ證ニシ
 テ項背ノ強急スル者王^レ之^ラ

桂枝 芍藥 甘草 各二兩
 生薑 三兩 大棗 十二枚 葛根 四兩

右六味水一斗ヲ以テ葛根ヲ煮テ二升ヲ
 減シ上沫ヲ去諸藥ヲ入亦煮テ三升ヲ取滓
 ヲ去一升ツ温服ス衣ヲ覆テ微シ汗似タル
 ニ取ル粥ヲ啜ベカラス餘桂枝湯ノ法ノ如シ

●論治 太陽病項背強ク凡々トシテ反
 テ汗出テ惡風スル者此方主之

四

○桂枝加芍藥湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニ
 シテ腹ノ拘攣スル^ル甚キ者王^レ之^ラ

桂枝湯ノ方中ニ只芍藥三兩ヲ加ヘテ
共ニ六兩餘ハ全同

・論治 本太陽病醫誤テ之ヲ下シ因テ
腹滿テ時々痛ム者ハ太陰ニ属ス此方主
之ヲ

五 ○桂枝加附子湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニ
シテ惡寒シ或ハ四肢骨節微痛スル者主之

桂枝湯ノ方中ニ附子一枚ヲ加フ餘
ハ全同

・論治 太陽病汗ヲ發シテ漏不止其
人惡風シ小便難ク四肢微急シテ屈伸
成難キ者此方主之

六 ○桂枝厚朴杏子湯 此方ハ桂枝湯ノ症
ニシテ胸滿微喘痰咳アル者主之

桂枝湯ノ方中ニ厚朴二兩杏子五十
個ヲ加フ

・論治 喘家ハ桂枝湯ニ厚朴杏子ヲ加
ヘテ佳ナリ ○太陽病之ヲ下シ未下シテ微
喘スル者ハ表未解ユヘナリ此湯主之

七 ○桂枝加芍藥生薑人參湯 此方ハ桂
枝湯ノ症ニシテ心下痞鞭シ或ハ拘攣シ又ハ
嘔スル者主之

桂枝湯ノ方中ニ芍藥生薑各一兩ヲ
加ヘ且人參三兩ヲ加フ

・論治 發汗ノ後身疼痛シ脉沉遲ナル
者主之

八 ○括蕞桂枝湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニシテ

渴スル者主之ヲ

桂枝湯ノ方中ニ括蕞根ニ両ヲ加フ

・論治 太陽病其證備テ身體強ルルハ

然トシテ脈反テ沉遲ナル此ヲ瘥病トス此

方主之ヲ

九 ○桂枝芍薬湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニ

シテ拘攣セザル者主之ヲ

桂枝湯ノ方中ニ芍薬ヲ太ルノミ

餘ハ全同

・論治 太陽病此ヲ下シテ後脈促胸滿

ル者此方主之若微シ惡寒スル者ハ芍薬

ノ方中ニ附子ヲ加ヘテ主之ヲ

十 ○桂枝芍薬湯加皂莢湯 此方ハ桂枝

芍薬湯ノ症ニシテ濁唾涎沫ヲ吐スル者

主之ヲ

桂枝湯ノ方中ニ芍薬ヲ太テ皂莢ニ

枚ヲ加フ

・論治 肺痿涎沫ヲ吐スル者此方主之

○桂枝芍薬湯加苓朮湯 此方ハ桂枝湯ノ

症ニシテ心下悸シ小便利セズ上衝セザル

者主之ヲ

桂枝湯ノ方中ニ桂ヲ太テ茯苓白朮各

三兩ヲ加フ

・論治 桂枝湯ヲ服シテ或ハコレヲ下シ

テ仍頭項強痛シ翕々ト發熱シ汗ナク心

下満シ微痛シ小便不利者此湯王^レ之^ヲ

十三

○桂枝附子去桂加朮湯 此方ハ桂枝附子湯ノ症ニシテ大便硬ク小便自利シテ上^レ衝^セザル者王^レ之^ヲ

附子^三 生薑^三 甘草^二

大棗^{十二} 白朮^四 此方即金匱ノ白朮附子湯ナリ

右五味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓^{カス}

ヲ去分温メテ三服ス

・論治 風湿相搏身體疼煩シテ自^レ轉^レ側スル^レ不能嘔^セス渴^セザル者桂枝附子湯ヲ主^ル若大便鞭ク小便自利スル者此湯王^レ之^ヲ

十四

○黃耆桂枝五物湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニシテ^レ嘔^{アリ}身體麻痺シ急迫ナラザル者王^レ之^ヲ

黃耆 桂枝 芍藥^{各三}

生薑^六 大棗^{十二} 右五味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り七合ヲ温服スル^一日ニ三度

・論治 血痺其脉陰陽俱ニ微ニシテ寸口關上モ亦微ナリ尺中小緊其人不能^レ行風痺ノ狀ノ如キ者此方王^レ之^ヲ

十五

○桂枝甘草湯 此方ハ上^レ衝^シテ急迫ナ^ル者王^レ之^ヲ

桂枝^二 甘草^二

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓^{カス}

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓^{カス}

去リ、頭服ス

・論治 發汗過多シテ其人又手シ自ヲ

心ヲ冒心下悸シテ按ント欲スル者此方主之

十五 ○桂枝甘草附子湯 此方ハ桂枝甘草

湯ノ症ニシテ骨節煩疼シ小便利セザル者

主之ヲ

桂枝 四兩 甘草 二兩 附子 一枚

白朮 二兩

右四味水六升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓

ヲ去リ一升ヲ温服スル一日ニ三度兩此

シテ微汗ヲ得レハ則解ス能食シテ汗出テ亦

煩スル者ハ五合ヲ服セヨ

・論治 風湿相搏骨節疼痛屈伸

スルヲ得ズ近クコレニ觸レハ則痛ミ劇ク

汗出テ短氣ニシテ小便利セズ風ヲ惡テ衣

ヲ太ルヲ欲セズ或ハ身ニ微腫アル者此方

十六 ○桂枝甘草龍骨牡蠣湯 此方ハ胸腹

ニ動氣アリテ急迫ナル者主之ヲ

桂枝 一兩 甘草 龍骨

牡蠣 各二兩

右四味水五升ヲ以テ煮テ二升半ヲ取リ

滓ヲ去リ八合ヲ温服ス日ニ三度

・論治 火逆此ヲ下シ燒鍼ニ因テ煩躁

スル者此湯主之ヲ

十七 ○桂枝生薑枳實湯 此方ハ胸滿テ上逆

シ或ハ嘔スル者主之ヲ

五苓散

申

桂枝 生薑各三兩 枳實五枚

右三味水六升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ去リ分温テ三服ス

●論治 心中痞シ諸逆シテ心懸痛スル者主之

十八 小柴胡湯 此方ハ胸脇苦滿シ或ハ寒熱

往來又ハ嘔スル者主之

柴胡 半斤 黃芩 人參

生薑 甘草各三兩 半夏半升

大棗 十二枚

右七味水一斗二升ヲ以テ煮テ六升ヲ取リ滓ヲ去リ再煎シテ三升ヲ取リ一升ツ温服スル一日ニ二度 加減法 胸中煩シテ嘔セ

サルニ半夏八分ヲ入テ枳實一枚ヲ加フ

●渴スルニ半夏八分ヲ入テ人參一兩半ヲ増

枳實根四兩ヲ加フ 腹中痛ムニ黃芩ヲ

去テ芍藥三兩ヲ加フ 脇下痞鞭スルニハ

大棗ヲ去テ牡蠣四兩ヲ加フ 心下悸シ小

便不利ニハ黃芩ヲ去テ茯苓四兩ヲ加フ

不渴シテ表ニ微熱アルニハ人參ヲ去テ桂三

兩ヲ加フ 衣覆シテ微汗ヲ取テ愈 效スルニハ人參大棗

生薑ヲ去テ五味子半升 乾薑二兩ヲ加フ

●發熱乾燥シテ有汗ニハ石膏三兩ヲ

加フ

●論治 傷寒並ニ中風六七日ニシテ寒熱

往來或ハ胸脇苦滿シ默々シテ飲食ヲ欲

セズ心煩シテ喜デ嘔シ或ハ胸中煩シテ不嘔
 或ハ渴シ或ハ腹痛或ハ脇下痞鞭心下悸シ
 小便利セズ或ハ不渴シテ身ニ微熱アリ或ハ
 欬スル者此方主之○傷寒四五日ニシテ身
 熱惡風シ頸項強ク脇下滿シ手足温ニシテ
 渴スル者主之○腹中急痛スル者先小建
 中湯ヲ與フベシ不差モノハ此湯主之○傷
 寒中風等ニ柴胡ノ症有テ但一證ヲ見サバ
 便チ與フベシ○嘔シテ發熱スル者ハ柴胡湯
 ノ證ナリ既ニ他藥ヲ以テ此ヲ下シ柴胡ノ
 證仍在者ハ又柴胡湯ヲ與レバ必蒸々トシ
 テ振ヒ却テ發熱汗出テ解ス○傷寒十二
 三日解セズ胸脇滿シテ嘔シ日晡所ニ潮

熱ヲ發シ既ニシテ微利スルハ此本柴胡ノ症
 ニシテ此ヲ下セ凡大柴胡
 湯ニシテ利ヲ得ズ今反テ
 利スル者ハ醫九藥ノ類ヲ以テ之ヲ下スヲ知ル
 然レ凡其治法ニ非ルナリ潮熱ハ熱實ナリ先
 小柴胡ヲ以テ外ヲ解シ後柴胡加芒硝湯
 ヲ與フベシ○婦人中風七八日ニシテ寒熱
 發作時アリ經水適断ル者ハ此熱血室ニ入
 其血必結ス故ニ瘧狀ノ如ク發作時アラシム
 此方主之○陽明病潮熱ヲ發シ大便溏
 シ小便モ亦ヨク利シ然ルニ胸脇滿ク去ラザ
 ル者主之○陽明病脇下鞭滿シ大便セズ
 シテ嘔シ舌上白胎ノ者此湯ヲ與フベシ
 ○脇下鞭滿シ乾嘔シテ食スル不能寒

熱往來シ脈沉緊ナル者主之○若已ニ吐
 下シ發汗シ温鍼ヲ譏語シ柴胡ノ症ヤ必壞
 病トナル此豫ノ治法ヲ用ユベシ○傷寒差テ
 後更ニ發熱スル者主之○諸黃腹滿テ嘔ス
 ル者主之○婦人草薢ニ在テ不覺發露
 シテ風ヲウケ四肢煩熱シテ頭痛スル者此
 方主之○其外灸後ノ發熱諸症或ハ耳目
 ノ痛下痢便毒又ハ小兒驚風等ニモ宜
 シ

十九 ○柴胡桂枝湯 此方ハ小柴胡湯ト桂枝
 湯ノ二症ヲ相兼ル者主之ヲ
 柴胡 兩四 黃芩 人參
 桂枝 甘草 各一 芍藥

生薑 各一 半夏 二合 大棗 六
 兩半 半 枚
 右九味水七升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ
 去リ升々温服ス

・論治 傷寒六七日發熱微ク惡寒シ肢
 節煩疼シ此大陽之症 微ク嘔シ心下支結シ此邪氣
 ハル外證イニダホラガル者此方主之○心
 腹卒ニ痛ム者亦主之○其他積聚疝氣
 瘰癧產後ノ諸症惡寒發熱アル者ニ亦宜シ或
 ハ婦人瘀血ニ因テ耳鳴手足痠痛スルニ此
 方ニ大黃ヲ加ヘテ與フヘシ

二十 ○柴胡桂薑湯 此方ハ小柴胡湯ノ症ニ
 シテ嘔セズ痞セズ上ノ衝シテ渴シ腹中ニ動
 氣アル者主之ヲ

傷寒釋義 申 七

柴胡半斤 桂枝 乾薑

黃芩 牡蠣各三兩 枳實根四兩

甘草二兩

右七味水一斗二升ヲ以テ煮テ六升ヲ
取り滓ヲ去再ビ煎シテ三升ヲ取り一升ヲ
温服スル。日ニ三度初メ服スレハ微煩ス復
服ス汗出テ便愈

・論治 傷寒五六日。已ニ汗ヲ發シ然ルニ

復此ヲ下シ胸脇滿シ微結シ小便利セズ

渴シテ嘔セス但頭汗出テ寒熱往來シ心

煩スル者此方主之○瘧疾微熱シテ寒多

久或ハ但寒シテ熱セザル者主之

廿二 ○柴胡半斤夏加枳實湯 此方ハ小柴

胡湯ノ症ニシテ渴シテ嘔セザル者主之

小柴胡湯ノ方中ニ半夏ヲ去テ枳實

根四兩ヲ加フ

・論治 瘧疾渴ヲ發スル者此湯主之勞

瘧モ亦主之

廿三 ○柴胡加龍骨牡蠣湯 此方ハ胸脇ニ動

氣アル者主之

柴胡四兩 生薑 人參

龍骨 鉛丹 桂枝

茯苓各一兩半 大黃二兩 牡蠣半兩

半夏二合 大棗六枚

右十一味水八升ヲ以テ煮テ四升ヲ取り
滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

●論治 傷寒八九日。此ヲ下シテ胸滿煩
 驚シ。小便利セス。譫語シ。身重クシテ轉側
 スベカラザル者。此湯主之。○其外婦人瘀血
 ヲ兼テ動氣甚シク。或ハ大便通ゼザル者亦
 主之ヲ

五
 ○小建中湯 此方ハ裏急シテ腹皮拘急
 シ。又ハ急痛スル者主之ヲ

- 桂枝
- 甘草
- 生薑 各三兩
- 芍藥 六兩
- 大棗 十二枚
- 膠飴 一斤

右六味。水七升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ。滓
 ヲ太リ。膠飴ヲ入レ。更ニ微火ヲ以テ消解シテ。
 一升ヲ温服スル。日ニ三度。此湯ヲ用ベカラ
 ス。甜キヲ以テノ故ナリ

●論治 腹中急痛スル者。先此湯ヲ與フ
 ヘシ。差ザル者ハ小柴胡湯ヲ與フ。○心中悸
 シテ煩スル者。此方主之。○虚勞裏急。急シ悸シ
 テ血ス。腹中痛之。夢ニ失精シ。四肢痠痛。或
 ハ煩熱シ。咽乾キ。口燥ク者主之。○其外産
 後虚羸ニシテ少腹急痛シテ背腰ニ引痛ム
 ニハ。此方ニ當歸ヲ加ヘテ主之ヲ

六
 ○黄耆建中湯 此方ハ小建中湯ノ症ニ
 シテ。盜汗自汗等ノ者主之ヲ

小建中湯ノ方中ニ黄耆一兩半ヲ加フ
 ●論治 虚勞裏急レテ諸不足スル者此
 方主之ヲ

七
 ○黄耆芍薬桂酒湯 此方ハ身體腫テ發

熱シ汗出テ衣ヲ沾シ其色黄テ藥汁ノ如クナル者王^レ之

黄耆^{五兩} 芍藥 桂枝^{各三兩}

右三味苦酒一升ト水七升ヲ以テ相合セ煮テ三升ヲ取リ一升ヲ温服ス服シテステニ心煩ス後六七日ニ至テ乃チ鮮ス若シ心煩不止モノハ苦酒ノ阻ツル故ナリ

論治 黄汗ノ病ハ身體腫テ發熱シ汗出テ渴ス狀風水ノ如クニシテ汗衣ヲ沾シ其色正黄ニシテ藥汁ノ如ク脉ハ素ヨリ沉ナル者ナリ此方王^レ之

○茯苓甘草湯 此方ハ心下悸シ上衝シテ區スル者王^レ之

茯苓 桂枝^{各二兩} 生薑^{三兩} 甘草

右四味水四升ヲ以テ煮テ二升ヲ取リ滓ヲ去リ分温メテ三服ス

論治 傷寒汗出テ渴スル者ハ五苓散王^レ之不渴モノ此方王^レ之○傷寒厥冷シテ心下悸スル者ハ宜ク先此湯ヲ服シテ水氣ヲ治スベクシテ後其厥冷ヲ治スベシ然ラザレハ水氣漬テ胃ニ入り必下利ヲ作ナリ

○茯苓戎鹽湯 此方ハ心下悸シ小便利セザル者王^レ之

茯苓^{半斤} 白朮^{二兩} 戎鹽^{即青鹽ナリ彈丸ノ大サ一枚}

六

右三味水六升ヲ以テ先ツ茯苓白朮ヲ煮テ
三升ヲ取滓ヲ去我鹽ヲ入レ再ヒ煎ジ分温
メテ三服ス 右煎法仲景詳カニセズ
故ニ他例ニ依テ是ヲ記ス
○茯苓杏仁甘草湯 此方ハ悸シテ胸中
痺スル者主之ヲ

茯苓 三兩 杏仁 五十個 甘草 一兩

右三味水一斗ヲ以テ煮テ五升ヲ取リ一
升ヲ温服スル日ニ三度モシ差ザルモノハ
更ニ服ス

●論治 胸中氣塞テ短氣ナル者此方主
之橘皮枳實生薑湯モ亦宜シ

五

○茯苓澤瀉湯 此方ハ心下悸シ小便利
セズ上衝及ビ嘔吐シ渴シテ飲水ヲ欲ス
ル者主之ヲ

茯苓 半斤 澤瀉 各四兩

桂枝 各二兩 甘草 各二兩 白朮 三兩

右六味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ澤
瀉ヲ入再ヒ煮テ二升半ヲ取リ八合ツ温
服スル日ニ三度

●論治 胃反吐シテ渴アリ頻ニ飲水ヲ
欲スル者此湯主之ヲ

三

○茯苓飲 此方ハ心下痞鞭シテ悸シ小
便利セズ胸滿テ吞酸シ或ハ宿水ヲ吐ス
ル者主之ヲ

茯苓 人參 白朮 各三兩

枳實 二兩 橘皮 二兩 生薑 四兩

右六味水六升ヲ以テ煮テ一升八合ヲ
取り分温メテ三服ス。

・論治 心胸中ニ停痰宿水アツテ自ラ

水ヲ吐出シテ後心胸ノ間虚シ氣滿テ食スル
不能者主之ヲ

卅

○苓桂朮甘湯 此方ハ心下悸シ上衝シ
テ起ントスレバ頭眩シ小便利セザルモノ
主之ヲ

茯苓四兩 桂枝三兩 白朮

甘草各二兩

右四味水六升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓
ヲ去リ分温メテ三服ス

・論治 傷寒或ハ吐シ或ハ下シテ後心下

卅

逆滿逆滿氣上衝シテ起ントスレバ則頭眩スル者此
方主之○心下痰飲アツテ胸脇支滿支滿レ日
眩スル者亦主之○短氣ニシテ微飲アルハ必
小便ヨリ此ヲ去ルベシ此方主之ヲ

○苓桂甘棗湯 此方ハ臍下悸シテ身急
上衝スル者主之ヲ

茯苓半斤 桂枝四兩 甘草三兩

大棗十五枚

右四味甘爛水一斗ヲ以テ先ツ茯苓ヲ煮
テ二升ヲ減シ諸藥ヲ入レ煮テ三升ヲ取り

滓ヲ去リ一升ヲ温服スル日ニ三度

作甘爛水水二斗ヲ取り大盆ノ内ニ置

持ヲ以テ此ヲ揚レ水水上ニ珠子アル五六千

類相逐テ此ヲ取用ユ

●論治 發汗ノ後其人臍下悸スル者ハ必
奔豚ト作此方主之

廿三

○苓桂五味甘草湯 此方ハ心下悸シト

衝シ咳シテ急迫スル者主之

茯苓

桂枝 各四兩

五味子 半升

甘草 三兩

右四味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓
ヲ去リ分温メテ三服ス

●論治

欬逆倚息シテ卧下得ザルハ小

青龍湯ヲ主ドル小青龍湯ヲ服シ已テ多ク

唾シ口燥キ手足厥逆シ氣少腹ヨリ上ツテ

胸咽ニ衝ガ如ク手足痺レ其面合翕熱シテ醉

状ノ如シ因テ又陰股ニ下流シ小便難ク時ニ

亦冒スル者此方主之

廿四

○苓甘五味薑辛湯 此方ハ前方ノ症ニ

シテ上衝セズ痰飲滿ル者主之

茯苓 四兩

甘草

乾薑

細辛 各三兩

五味子 半升

右五味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓
ヲ去半升ツ温服ス

●論治

衝氣低テ反ツテ更ニ欬シ胸滿ル

者ハ桂苓五味甘草湯ノ方ニ桂ヲ去リ乾薑

細辛ヲ加ヘテ以テ其欬滿ヲ治ス

廿五

○苓甘薑味辛夏湯 此方ハ前方ノ症ニシ

テ嘔スル者主之

茯苓

甘草

乾薑

細辛

夏麻

茯苓四兩 甘草 乾薑

細辛各三兩 五味子各半

右六味水八升ヲ以テ煮テニ升ヲ取り瀉ヲ去リ半升ヲ温服ス

●論治 欬滿止テ更ニ復渴シ衝氣發ル者ハ細辛乾薑ノ熱藥ヲ以テ服スルユニ

遂テ渴スベシ然ルニ渴反ツテ止ム者ハ支飲アレバナリ支飲ノ者胸中ノ陽氣ヲ阻テ反逆シテ胃ス冒スルモノハ必ズ嘔ス嘔スルモノハ

又半夏ヲ入レテ其水ヲ瀉去レ嘔即止此方主之

○苓甘薑味辛夏仁湯 此方ハ前方ノ症ニシテ微腫アルモノ主之

共

茯苓四兩 甘草 乾薑

細辛各三兩 五味子各半

杏仁各半

右七味水一斗ヲ以テ煮三升ヲ取り瀉ヲ去リ半升ヲ温服ス

○瀉瀉湯 此方ハ冒眩ニ苦ミ小便利ヒザル者主之

澤瀉五兩 白朮二兩

右二味水二升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り瀉ヲ去リ分温メテ再服ス

●論治 心下支飲アツテ冒眩ヲ苦ムモノ主之

共

○猪苓散 此方ハ渴シテ心下悸シ小便

利セサル者主之

猪苓 茯苓 白朮 各等分

右三味、杵テ散トス。方寸七ヲ飲服ス。

・論治 嘔吐スル者ハ病_ハ偏_カ上ニアリ。吐シ

テ後水ヲ思フモノハ解ス。急ニ此方ヲ與フベシ。

芫

○防己茯苓湯 此方ハ四肢_レ聳_テトシテ動キ。水氣_レ皮膚_ニ有テ上_ニ衝_{スル}者主之。

防己 黃耆 桂枝 各三兩

茯苓 六兩 甘草 二兩

右五味、水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り。滓ヲ去リ、分温メテ三服ス。

・論治 皮水ノ病ハ四肢腫テ水氣_レ皮膚_ニ有テ

ノ中ニアリ。故ニ皮_ハ薄_クシテ光リアルモノ此方

主之

芫

○防己黃耆湯 此方ハ水病身重ク汗出テ惡風シ。小便利セサル者主之。

防己 四兩 黃耆 五兩 白朮

生薑 各三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚

右六味、水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り。滓ヲ去リ、分温メテ三服ス。

・論治 風水、脈浮ニシテ身重ク汗出テ

惡風スル者此方主之。腹痛ニハ芍藥ヲ加フ。

○風水ニテ頭汗出テ表ニ他病ナク病者冬下重ク腰ヨリ以上ハ和シ腰以下腫テ陰ニ及ビ以テ屈伸シ難キ者主之。

聖

○附子粳米湯 此方ハ腹中雷鳴シテ痛
ム。或ハ下利シ。或ハ嘔吐スル者主之。

附子 一枚 粳米 半升各半

甘草 一兩 大棗 十枚

右五味水八升ヲ以テ煮テ米熟シテ後滓
ヲ去リ一升ツク温服ス

・論治 腹中雷鳴シテ切ニ痛ム。胸膈逆

満スル者此方主之

聖

○附子瀉心湯 此方ハ瀉心湯ノ症ニシテ
惡寒スル者主之。

瀉心湯ノ方中ニ附子一枚ヲ加フ

瀉心湯方見
第百

・論治 心下痞シテ復惡寒シ汗出ル者

此方主之

聖

○半夏瀉心湯 此方心下痞澀シ腹中雷
鳴スル者主之。

半夏 半升 黃芩 乾薑

人參 各三兩 黃連 一兩 大棗 十二枚

甘草 三兩

右七味水一斗ヲ以テ煮テ六升ヲ取り滓
ヲ去リ再ヒ煎シテ三升ヲ取り一升ツク温服ス

・論治 嘔吐シテ腸鳴心下痞スル者此方主

之。○其外不食或ハ熱瀉或ハ嘔吐下利スル
者亦主之。

聖

○甘草瀉心湯 此方ハ半夏瀉心湯ノ症
ニシテ心煩安カラザル者主之。

半夏瀉心湯ノ方中ニ甘草一兩ヲ加フ

●論治 醫誤下シテ其入下利スルヲ日ニ數テ行數化セス腹中雷鳴シ心下痞鞭シテ滿シ乾嘔シ心煩シテ安キコトヲ得ズ醫心下痞スルヲ見テ病盡ズト謂テ復テ此ヲ下シ其痞益甚シ此結熱ニ非ス但胃虚シ客氣上逆スル故ニ鞭カラシム此方主之○狐惑病ハ傷寒ニ似テ黙々ト眠ント欲レレ目閉コトヲ得ズ卧起安カラス喉ヲ蝕ス此ヲ惑陰ヲ蝕ス此ヲ狐食臭ヲ惡ム其面目乍赤色変シ易シ上部ヲ蝕スレバ則聲破ル者亦主之

聖五 ○生薑瀉心湯 此方ハ半夏瀉心湯ノ症ニシテ嘔スル者主之

半夏瀉心湯ノ方中ニ乾薑二兩ヲ減シ

生薑四兩ヲ加フ

●論治 傷寒汗出テ解シテノ後胃中和セズ心下痞鞭シ食臭ヲ乾噎シ脇下水氣アリ腹中雷鳴シテ下利スル者此方主之

聖六 ○黃連湯 此方ハ心煩心下痞嘔吐又ハ上衝スル者主之

黃連 甘草 乾薑

桂枝 各三兩 人參 二兩 半夏 半升

大棗 十二枚

右七味水一斗ヲ以テ煮テ六升ヲ取滓ヲ去リ一升ツ温服スル日ニ三度夜ニ二度

●論治 胸中熱アリ胃中邪氣アリ腹中

痛テ嘔吐セント欲スル者此方主之

聖

○黃連阿膠湯 此方ハ心中悸シテ煩シ

眠ルコトヲ得サル者主之

黃連四兩 黃芩一兩 芍藥二兩

雞子黃二枚 阿膠三兩

右五味水五升ヲ以テ先ツ三物ヲ煮テ二升

ヲ取り滓ヲ去リ阿膠ヲ入烱盡シ少シ冷シ

雞子黃ヲ入攪セ七合ツ温服ス

●論治 少陰病ヲ得テ二三日心下煩シ

テ卧コトヲ不得者此方主之

聖

○甘草湯 此方ハ急迫シテ咽ツヨク痛ム

甘草二兩

右一味水三升ヲ以テ煮テ一升半ヲ取り

滓ヲ去七合ツ温服ス

●論治 少陰病二三日咽痛ム者此湯

ヲ與フベシ若差サル者ハ桔梗湯ヲ與フ

聖

○桔梗湯 此方ハ甘草湯ノ症ニシテ咽中

痛テ膿アリ或ハ粘痰出ル者主之

桔梗各一兩 甘草各一兩

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓ヲ

去リ分温メテ再服

●論治 欬シテ胸滿振寒脉數咽乾テ渴

セス時々嘔唾ノ腥臭ヲ出シ久シクシテ膿

ヲ吐シ米粥ノ如キ者ハ肺癰タリ此方主

辛

○半夏散 或曰半夏湯 此方ハ咽中喉痛テ上衝急迫スル者主之ヲ

半夏 桂枝 甘草 各等分

右三味各別ニ擣篩テ後合シ白飲ヲ以テ方寸匕ヲ和服スルコト日ニ三度若散服スル不能者ハ先水一升ヲ以テ煎スル七沸シテ右ノ散ヲ兩方寸匕入再ヒ煎スル三沸シテ火ヲ除キ少シ冷シテ少々ツ此ヲ嚥ベシ

・論治 少陰病咽中痛ム者此方主之ヲ

辛

○苦酒湯 此方ハ咽中二瘡ヲ生シテ聲出ガル者主之ヲ

半夏 十四枚 雞子 一枚

右二味半夏ヲ苦酒ノ中ニツケ雞子殼ヲ以テ刀鏤中ニヲキ火上ニ置三沸シテ滓ヲ去リ少々ツ含々嚥ベシ差ズバ更ニ三劑ヲ服スベシ
・論治 少陰病咽中傷テ瘡ヲ生シ語言スル不能者此湯主之ヲ

辛

○半夏厚朴湯 此方ハ咽中灸瘡アルカ加ク或ハ嘔シ或ハ心下悸スル者主之ヲ

半夏 一斤 厚朴 三兩 茯苓 四兩

生薑 五兩 乾蘘葉 二兩

右五味水七升ヲ以テ煮テ四升ヲ取リ分温メテ一升ツ温服ス

辛

○半夏乾薑散 此方ハ乾嘔吐逆シ涎沫

ヲ吐者三之

半夏 乾薑 各等分

右二味、杵テ散ト為シ、方寸匕ヲ取り、漿水一升半ヲ以テ煎シテ七合ヲ取り、頓ニ服ス

辛 〇大半夏湯 此方ハ嘔吐シテ心下痞鞭スル者主之

半夏 二升 人参 三兩 白蜜 一斤

右三味、水一斗二升ヲ以テ蜜ニ和シ、杵ヲ以テ此ヲ揚ルコト二百四十遍シテ煮テ一升半ヲ取り、一升ツツ温服ス

辛 〇小半夏湯 此方ハ吐シテ渴セザルモノ主之

半夏 一斤 生薑 半斤

右二味、水七升ヲ以テ煮テ一升半ヲ取り、滓ヲ去リ、分温メテ再服ス

●論治 嘔家ハ本渴ス、渴スル者ハ解セントスルナリ、今反ツテ渴セズ、此心下ニ支飲アル

故ナリ、此方主之、〇黄疸病、小便色變セスレテ、自利セント欲シ、腹滿テ喘シ、若ハ臑スル

モノ亦主之、〇諸嘔吐シ、穀下ルコト不得者モ亦主之

美 〇小半夏加茯苓湯 此方ハ小半夏湯

症ニシテ眩暈スル者主之

半夏 一斤 生薑 半斤 茯苓 三兩

右三味、水七升ヲ以テ煮テ一升五合ヲ取り、滓ヲ去リ、分温テ再服ス

・論治 卒^ニ嘔吐^レ心下^ノ痞^ニ眩悸^{スル}モ
ノ此^ノ膈間^ニ水氣^{アル}故^{ナリ}此方^ヲ主^ス之^ヲ○先^ツ
渴^{シテ}後嘔^{スル}者亦^主之^ヲ

姜

○生薑半夏湯 此方^ハ喘^ニ似^テ喘^セス^ニ
ニ似^テ嘔^セズ^ニ噦^ニ似^テ噦^セス^ニ心中^ノ憤^々然^ト
トシテイカ^ニ疝^{スル}ナキ者^ヲ主^ス之^ヲ

半夏^半升

生薑汁^一升

右二味水三升ヲ以テ半夏ヲ煮テ二升ヲ
取り生薑汁ヲ入^レ煮テ一升半ヲ取り少^シ冷^シ
シテ四服ニ分チ日ニ三度夜ニ一度若^シ嘔^マハ
後服ヲ止ム

姜

○乾薑人参半夏丸 此方^ハ嘔^吐止^ズ心^下
下痞^軟スル者^ヲ主^ス之^ヲ

乾薑

人参^各一^兩

半夏^二兩

右三味細末シ生薑汁ヲ以テ糊^ニ三^テ指^子ノ
大サ^ニ丸^シ十^九ヲ飲服ス

・論治 妊娠ノ嘔吐止^ミザル者此方^ヲ主^ス之^ヲ

姜

○乾薑黃連黃芩人参湯 此方^ハ心煩心
下痞^軟シ或^ハ吐^{スル}者^ヲ主^ス之^ヲ

乾薑

黃連

黃芩

人参^各三^兩

右四味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓
ヲ去リ分温^メテ再服ス

姜

○厚朴生薑半夏甘草人参湯 此方^ハ
胸腹滿^テ嘔^{スル}者^ヲ主^ス之^ヲ

厚朴

生薑^各半^斤

半夏^半斤

人參一兩 甘草二兩

右五味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓ヲ去リ一升ツ温服ス

・論治 發汗シテ後腹脹滿スルモノ此方主之

空 ○ 梔子乾薑湯 此方ハ心中微煩スル者

主之
梔子十四枚 乾薑二兩

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升半ヲ取り滓ヲ去分温メテ再服ス

・論治 傷寒醫丸藥巴豆ノ類ヲ以テ犬ヒニコレヲ下シ身熱去ラス微煩スルモノ此方主之

空 ○ 薏苡附子散 此方ハ胸中痺シ惡寒スル者主之

薏苡仁十五兩 大附子十枚

右二味并テ散ト為シ方寸ヒヲ飲服ス
・論治 胸痺シ緩急ナル者此方主之

空 ○ 薏苡附子敗漿散 此方ハ身體甲錯シテ腹皮急心ヲ按セハ濡ニシテ腫狀ノ如ク腹ニ積聚ナク身ニ熱ナキ者主之

薏苡仁十分 附子二分 敗漿五分

右三味并テ細末シ方寸ヒヲ取り水二升ヲ以テ煎シテ半ヲ減シ頓ニ服ス

空 ○ 橘皮枳實生薑湯 此方ハ胸中痺シ滿シテ嘔吐スル者主之

橘皮 枳實 生薑

橘皮斤一 枳實兩三 生薑斤半

右三味水五升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ
去リ分温メテ再服ス

論治 胸痺シ胸中氣塞テ短氣ニハ痰

苓甘草湯主之此湯モ亦主之

五
○橘皮竹茹湯 此方ハ胸中痺シテ噦逆

スル者主之ヲ

橘皮斤二 竹茹斤二 大棗三十枚

生薑斤半 甘草兩五 人參兩一

右六味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取り二升
ツ温服ス

六
○橘皮湯 此方ハ胸中痺シテ嘔噦スル
者主之ヲ

橘皮兩四 生薑斤半

右二味水七升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓ヲ
去リ一升ツ温服ス咽ニ下レハ即愈

論治 乾嘔シ噦シ或ハ手足厥スル者此

湯主之ヲ

七
○排膿湯 此方ハ膿血粘痰急迫ナルモノ

主之ヲ

甘草兩二 桔梗兩三 生薑兩一

大棗十枚

右四味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓ヲ
去リ五合ツ温服ス

八
○芍藥甘草湯 此方ハ拘攣急迫ナルモノ

主之ヲ

芍藥

甘草

芍藥 甘草各四兩

右三味。吹咀。水三升。以テ煮テ一升半ヲ取り。滓ヲ太リ。分温メテ再服ス

○芍藥甘草附子湯 此方ハ芍藥甘草湯ノ症ニシテ惡寒スル者主之ヲ

芍藥 甘草各三兩 附子一枚

右三味。水五升。以テ煮テ一升五合ヲ取り。滓ヲ太リ。分温メテ服ス

●論治 發汗シテ。病解セズ。反テ惡寒スル者ハ。虛スルノ故ナリ。此方主之ヲ

○甘麥大棗湯 此方ハ急迫シテ狂驚スル者主之ヲ

甘草二兩 小麥一升 大棗十枚

右三味。水六升。以テ煮テ三升ヲ取り。滓ヲ太リ。分温メテ三服ス

○甘草粉蜜湯 此方ハ涎ヲ吐シ。虫ヲ吐シ。心痛時々發作スル者主之ヲ

甘草二兩 粉一兩粉。鉛粉一名白粉。俗ニ云フシロイ 蜜四兩

右三味。水三升。以テ先甘草ヲ煮テ二升ヲ取り。滓ヲ太リ。粉蜜ヲ入レ攪和シ。煎シテ薄

粥ノ如クナラシメテ。一升ツ温服ス。差レハ即後服ヲ止ム

●論治 蛇蟲ノ病ハ。涎ヲ吐キ。心痛ミシム。發作時アリ。既ニ殺蟲ノ毒藥ヲ用ユレドモ

其功ナキ者。此方主之ヲ

○生薑甘草湯

此方ハ咳唾涎沫ヲ吐シ

心下痞鞅ツツカクシテ急迫キツクナル者主之ヲ

生薑五兩 人参三兩 甘草四兩

大棗十五枚

右四味水七升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ去リ分温メテ三服ス

論治 肺痿病ハ欬唾涎沫ヲ吐シ止ズ咽燥テ渴スル者此方主之ヲ

七三 〇炙甘草湯 此方ハ心下ニ動氣アリテ元

巨里ノ動脈甚シキ者主之ヲ

甘草四兩 桂枝二兩 生薑各三兩

麥門冬各半升 麻仁各半升 人参一分

阿膠各二兩 大棗十二枚 生地黃一斤

右九味清酒七升ニ水八升ヲ以テ先八味ヲ煮テ

三升ヲ取リ滓ヲ去リ阿膠ヲ入レ烱消シテ一

升ヲ温服ス

論治 傷寒脈結代ニシテ心中動悸ス

ル者此方主之 〇肺痿涎唾多ク心中温々

液々タル者主之温々液々ハ即虚心ノ意ナリ 〇虚勞不足

汗出テ悶シ脈結シテ心悸スル者亦主之ヲ

五四 〇葶藶大棗湯 此方ハ浮腫シテ咳逆喘

鳥迫塞シ胸滿強急スル者主之ヲ

葶藶搗丸如大棗 大棗十二枚

右先水三升ヲ以テ大棗ヲ煮テ二升ヲ取リ棗ヲ去リ葶藶ヲ入レ煮テ一升ヲ取リ頓ニ服ス

論治 肺癰胸滿ハリ身面目浮腫シ

鼻塞テ香臭酸辛ヲ聞ズ欬逆上氣喘鳴迫

鼻窒テ香臭酸辛ヲ聞ズ欬逆上氣喘鳴迫

塞スル者此方主之○支飲息スルコト不得者亦主之

至五 ○烏梅丸 一本丸 此方ハ蛇ヲ吐シ或ハ痢

疾久ク止スシテ休息痢トナル者主之

烏梅 三百個 細辛 六兩 乾薑 十兩

黃連 一斤 當歸 川椒 各四兩

附子 桂枝 人參

黃蘗 各六兩

右十味別ニ搗篩ツキカケルヒ合ユク治シ苦酒ヲ以テ烏

梅ヲ漬スヒキ一宿核ヲ去リガ蒸熟シテ搗ツキテ

渥ト成シ藥ヲ和シテ蜜ニテ梧桐子ノ大サ

ニ丸シテ食飲ニ先ツテ十圓ヲ服ス日ニ三度

稍加ヘテ二十圓ニ至ル

●論治 蛇厥ハ當ニ吐ヲ吐スベシ病者難

ニシテ又時ニ煩セシム此藏寒ニヨル蛇上ツ

テ膈ニ入ル須臾ニシテ復止ム食ヲ得テ嘔

ス又煩スル者ハ蛇食臭ヲ聞テ出ツ其人自

ラ蛇ヲ吐スベシ蛇厥ノ者此方主之

至五 ○黃芩湯 此方ハ下利シテ腹拘急スル

者主之

黃芩 三兩 甘草 芍藥 各二兩

大棗 十二兩

右四味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓ヲ

去リ一升ツ温服ス

●論治 太陽少陽トノ合病 太陽ハ發熱 惡寒ス少陽

ハ寒熱自ラ下利スル者此方主之若嘔スル者

往來ス

八黃芩加半夏生薑湯主之

七五〇黃芩加半夏生薑湯 此方ハ黄芩湯ノ症

ニシテ嘔逆スル者主之

黄芩湯ノ方中ニ半夏半升生薑二兩

ヲ加フ

・論治 乾嘔シテ下利スル者此方主之

七六一〇六物黄芩湯 此方ハ心下痞鞭シ乾嘔

下利スル者主之

黄芩 人参 乾薑各三兩

桂枝一兩 大棗十二枚 半夏半斤

右六味水七升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ三服ス

・論治 乾嘔シテ下利スル者此方主之

七六一〇三物黄芩湯 此方ハ心胸苦煩スルモノ

主之

黄芩一兩 苦参二兩 乾地黄四兩

右三味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓

ヲ去リ一升ヲ温服ス

・論治 婦人草蓐ニ在テ不覺發露シ

テ風ヲウケ四肢煩熱シテ頭痛スル者ハ小

柴胡湯ヲ與ヘ頭痛セスレテ但煩スル者此

方主之

七六二〇旋覆花代赭石湯 此方ハ心下痞鞭シ

噎氣不除者主之

旋覆花三兩 人参二兩 生薑五兩

半夏半斤 代赭一两 大棗十二枚

傷寒論通
甘草三
右七味水一斗ヲ以テ煮テ六升ヲ取リ滓
ヲ去リ再ヒ煎シテ三升ヲ取リ一升ツ温
服ス

・論治 傷寒汗ヲ發シ若ハ下シ解シ後
心下痞鞭シ噫氣除カザル者此方主之○
其外下利止ズ嘔吐シ或ハ婦人瘀血産前
後ヲ問ズ少腹痛シ或ハ腰痛シ足膝痛ム
者亦主之ヲ

全 ○酸棗仁湯 此方ハ煩燥シテ眠ル得
ザル者主之ヲ
酸棗仁一升 甘草
茯苓 芍藥各二兩 知母

右五味水八升ヲ以テ酸棗仁ヲ煮テ六升
ヲ得諸藥ヲ入レ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ去リ
分温メテ三服ス

全 ○栝蘘薤白半夏湯 此方ハ胸背痛喘
息咳唾シテ嘔スル者主之ヲ
栝蘘實一枚 薤白三兩 半夏半升
白酒一斗

右四味同ク煮テ四升ヲ取リ一升ツ温
服ス

・論治 胸痺ニテ臥テ得ズ心痛背
ニ徹スル者此方主之ヲ
全 ○麥門冬湯 此方ハ火逆上氣シ咽喉利
セズ心下痞スル者主之ヲ

傷寒論通
申

麥門冬升七 半夏升一 人參

甘草各二兩 粳米三合 大棗十二枚

右六味水一斗二升ヲ以テ煮テ六升ヲ取
リ滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

全

○當歸芍藥散 此方ハ懷妊シテ腹中疴
痛スル者主之ヲ

當歸三兩 芍藥一斤 茯苓

白朮各四兩 澤瀉 芍藥各半斤

右六味拵テ散ト為シ方寸匕ヲ取テ酒ニテ
和シテ日ニ三服ス

全

○當歸四逆湯 此方ハ手足厥冷シ脉細
ニシテ絶セントスル者主之ヲ

當歸 桂枝 芍藥各三兩

細辛 甘草 通草各二兩

大棗二十個

右七味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ
去リ一升ヲ温服ス

・論治 下利シテ脉大ナル者ハ虚ナリ此強

テ下スノ故ナリ若脉浮革ニシテ腸鳴者此
湯主之ヲ

全

○當歸四逆加吳茱萸生薑湯 此方ハ

當歸四逆湯ノ症ニシテ内ニ久寒アルモノ
主之ヲ

當歸四逆湯ノ方中ニ生薑半斤吳茱

萸二升ヲ加フ

全

○赤石脂禹餘糧湯 此方ハ病毒下ニ

在テ下利スル者王^レ之

赤石脂

禹餘糧各一

右二味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ三服ス

●論治 藥ヲ服シテ下利止ズ心下痞鞭スルハ瀉心湯ヲ與フレバ則痞ヤム反ツテ他藥ヲ以テ此ヲ下シ其利止ズ故ニ理中湯ヲ與ヘハ利益甚シ理中ハ中焦ヲ理ム此利ハ下焦ニアリ此方王^レ之

全

○奔豚湯 此方ハ積聚下ヨリ衝上ルモノ

五^レ之

甘草

芍藥

當歸

芍藥

黃芩

生葛

半夏

生薑各四

甘李根白皮升

右九味水二斗ヲ以テ煮テ五升ヲ取り滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

●論治 奔豚氣上ツテ胸ニ衝腹痛ク寒熱往來スル者王^レ之

全

○芎歸膠艾湯 此方ハ漏下シテ腹中痛ム者王^レ之

芎藭

阿膠

甘草各二

艾葉

當歸各三

芍藥四

乾地黄六

右七味水五升ニ清酒三升ヲ以テ合セ煮テ三升ヲ取り滓ヲ去リ阿膠ヲ入レ消盡シテ一升ヲ温服ス

傷寒論
卷之九
九
論治 妊娠ノ下血或ハ半産ノ後續下
血スル者此方主之○其外吐血衄血一切
血症ニ宜シ

孕

○燒視散 此方ハ陰陽易ノ者主之

右婦人ノ中視隱處ニ近キヲ取り剪テ
燒灰ニシ水ヲ以テ和シテ方寸匕ヲ服
ス日ニ三度小便即通利シテ陰頭微
腫スレバ則愈婦人ノ病ハ男子ノ視ヲ
取燒灰ニスベシ

●論治 傷寒陰陽易ノ病ハ身體重クシ

テ少氣ナリ或ハ少腹裏急シ又ハ陰中ニ引
テ拘攣シ熱上ツテ胸ニツキ頭重クシテ舉
ルコトヲ欲セス或ハ眼中ニ花ヲ生シ膝腫

拘急スル者ナリ此方主之

孕

○續命湯 此方ハ中風ニテ半身遂不拘

急シテ轉側スルコト不能者主之

麻黃 桂枝 當歸

人參 石膏 乾薑

甘草各三兩 芎藭一兩 杏仁四十粒

右九味水一斗ヲ以テ煮テ四升ヲ取り滓
ヲ去リ一升ツ温服ス

●論治 中風藏ニ入り身體自ラ收ルコト

不能口言フコト不能冒昧シテ痛處ヲ不知
拘急シテ轉側スルコトヲ不得者此方主

之ヲ

孕

○小續命湯 此方ハ中風ニテ外邪アリ

傷寒論

申 此五

頭疼身熱脊強者主之

麻黃 防己 人參

黃芩 桂心 芍藥

防風 川芎 杏仁

甘草 附子 生薑

右十二味咬咀レ水一斗二升ヲ以テ先ツ

麻黃ヲ入レ煮テ三沸シテ沫ヲ去リ諸藥ヲ

入レ煮テ三升ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ

三服ス

●論治 卒中風ニテ死セントス或ハ身體

緩急シテ口眼不正舌強リテ語ルコト不能

奄々忽々トシテ神情悶乱スル者此方主之

聖 ○防己地黄湯 此方ハ狂狀ノ如クシテ妄

行獨語猶休ス身ニ寒熱ナク其脉浮ナル

者主之 防己一錢 防風 桂枝各三錢

甘草二錢

右四味酒一盃ヲ以テ此ヲ浸ス一宿シテ

絞テ汁ヲ取り生地黃二斤咬咀シ此ヲ蒸コ

ト斗米飯ノ久キガ如クシテ今ノ米一升ヲ銅

器ヲ以テ其汁ヲ盛更ニ地黃汁ヲ絞リ和シ

合セテ再服ス

聖 ○桂枝芍藥知母湯 此方ハ肢節疼痛シ

テ身體羸弱脚腫テ脫スルガ如ク或ハ頭

眩短氣ニシテ温々ト吐セントスル者主之

桂枝四兩 芍藥三兩 甘草

傷寒釋義 申 此六

麻黄各二 生薑 白朮各五

知母 防風各四 附子二枚

右九味水七升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ七合ツ温服ス

○寒劑

至五 ○白虎湯 此方ハ大ヒニ渴シテ飲ラ引煩燥スル者主之ヲ

知母六 石膏一 甘草二

粳米六

右四味水一斗ヲ以テ煮テ米熟シ湯成テ滓ヲ去リ一升ツ温服ス

・論治 三陽ノ合病腹滿ヲ身重ク轉側シ難ク口不仁シテ面垢キ譫語シ遺尿

ス汗ヲ發セバ譫語シ此ヲ下セバ額上ニ汗ヲ生ズ或ハ手足逆冷シテ自汗出ル者此方主之○其外温熱病時疫等ニ煩渴シ吐瀉シテ昏冒ス或ハ舌上白胎アル者モ亦主之ヲ

至六 ○白虎加人參湯 此方ハ白虎湯ノ症ニシテ心下痞鞭スル者主之ヲ

白虎湯ノ方中ニ人參三兩ヲ加フ

・論治 桂枝湯ヲ服シテ大ヒニ汗出テ後大ヒニ煩渴シテ解セズ脉洪大ナルモノ此方主之○傷寒ニ大熱ナクシテ口燥渴心煩シテ背惡寒スル者亦主之○傷寒若ハ吐シ若ハ下シテ後七八日解セズ熱結シテ

裏ニアリ。表裏俱ニ熱シ。時々惡風大ニ渴
シ。舌上乾燥シテ煩シ。水飲數升ヲ飲スルモノ。
主之。○汗出テ惡寒シ。身熱シテ渴スル者
モ亦主之。

至 ○白虎加桂枝湯 此方ハ白虎湯ノ症ニ
シテ上衝スル者主之。

白虎湯ノ方中ニ桂枝三兩ヲ加フ

右水一斗五升ヲ以テ煮テ八升ヲ取り。滓
ヲ去リ。温服ス

・論治 温瘧ニ其脉平ニシテ身ニ寒ナク
但熱シ。骨節疼煩シ。時々嘔スルモノ。此方
主之。

至 ○竹葉石膏湯 此方ハ氣逆シテ頭痛シ

或ハ耳鳴。目痛。齒痛。亦暑ニ傷レテ煩渴
シテ脉虚ナル者主之。

竹葉二把 石膏一觔。觔ハケト同 半夏

粳米各半升 人參五兩 甘草二兩

麥門冬一升

右七味水一斗ヲ以テ煮テ六升ヲ取り。滓ヲ
去リ。粳米ヲ入レ。未熟シテ米ヲ去リ。一升ツ
温服ス

・論治 傷寒解シテ後虚羸ニシテ少氣氣
逆シテ吐セント散スル者此湯主之。

至 ○木防己湯 此方ハ心下痞鞭シテ煩渴ス
ル者主之。

木防己三兩 石膏雜子ノ大 桂枝二兩

人參 四兩

右四味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ
去リ分温メテ再服ス

・論治 膈間ニ支飲アルハ其人喘滿シ心

下痞堅ス面色黧黑ニシテ其脈沉緊醫コ

レヲ吐下シテ愈ガル者此湯主之ヲ

百 ○瀉心湯 一名三黃丸 此方ハ心氣定ミラズ

シテ心下痞シ此ヲ按テ濡ナル者主之ヲ

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 各一兩

右三味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓
ヲ去リ頓ニ服ス

・論治 心氣不足シ吐血 衄血スルモノ

此方主之 ○本病下スヲ以テノ故ニ心下

痞スルニ此湯ヲ與スベシ ○其外積熱或ハ狂

癪或ハ眼目腫頭頭腫痛モ又ハ口舌ニ瘡ヲ

生シ或ハ大便秘結スル者モ亦主之ヲ

百 ○大黃黃連瀉心湯 此方ハ心煩シ心下

痞シコレヲ按シテ濡ナル者主之ヲ

大黃 二兩 黃連 一兩

右二味麻沸湯二升ヲ以テ此ヲ漬スコト須
臾シテ絞テ滓ヲ去リ分温メテ再服ス

・論治 傷寒大ヒ下シテ後又汗ヲ發シ

心下痞シ惡寒スル者コレ表未解セス先表ヲ

解スベシ桂枝湯ヲ與ヘ表解シ乃痞ヲ攻

ベシ此湯主之ヲ

百 ○茵陳蒿湯 此方ハ一身發黃シ或ハ大便

溏

神

鞭キ者王^レ之^ヲ

茵陳蒿^六 梔子^{十四} 大黃^二

右三味水一斗ヲ以テ先茵陳ヲ煮テ六升ヲ減シニ味ヲ入レ煮テ三升ヲ取り滓ヲ太リ分温メテ三服ス

●論治 寒熱レテ不食スレハ即頭眩シ心胸安カラズ久クシテ黃ヲ發シテ數疸トナル者此方王^レ之^ヲ○頭汗出テ身ニ汗ナク小便利セス渴シテ水飲ヲ引モノ身ニ必ず黃ヲ發ス此湯王^レ之^ヲ○身黃ニシテ橘子色ノ如ク或ハ小便利セス腹滿ル者王^レ之^ヲ
○梔子蘘皮湯 此方ハ身黃ニシテ發熱心煩スル者王^レ之^ヲ

梔子^{一十} 甘草^一 黃蘘^二

右三味水四升ヲ以テ煮テ一升半ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ三服スニ味ニ酸モク大甘ニ

文蛤^五

右一味散ト為シ沸湯ヲ以テ一錢ヒヲ和服ス

○白頭翁湯 此方ハ熱利下重シテ心憊スル者王^レ之^ヲ

白頭翁^二 黃連^一 黃柏^一

右四味水七升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ一升ヅク温服ス

秦皮^{各三}

申

論治 下利シテ飲水ヲ欲スル者王^レ之

夏 ○白頭翁甘草阿膠湯 此方ハ白頭翁湯ノ症ニシテ血證アリ急迫スル者王^レ之

白頭翁湯ノ方中ニ甘草阿膠各二兩ヲ加フ

論治 産後下利スル者此方王^レ之

夏 ○竹皮大丸 此方ハ婦人乳汁閉テ中氣虚^レ或ハ煩乱嘔逆スル者王^レ之

生竹茹 石膏^{各二} 桂枝

白微^{各一} 甘草^{各一}

右五味細末シテ棗肉ニ和シ彈子ノ大サニ丸シテ一丸ヲ飲服スルコト日ニ二度夜ニ一度モシ有熱バ白微ヲ倍シ喘セバ栝

實一分ヲ加フ

○温劑

夏

○四逆湯 此方ハ四肢厥逆シテ身體疼痛シ清穀ヲ下利シ或ハ小便清利スルモノ主^レ之

附子^{一枚} 乾薑^{一兩} 甘草^{二兩}

右三味咬咀シ水三升ヲ以テ煮テ一升ニ合ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ再服ス

論治 傷寒醫誤リ下シテ續テ下利ヲ

得清穀止ズ身疼痛スル者急ニ此湯ヲ與

スベシ ○發熱頭痛シテ脉反ツテ沉モシ差ス

シテ身體疼痛スレバ當ニ其裏ヲ救フベシ此

方主之○脈浮ニシテ遂清穀ヲ下利スルモノ
主之○自利シテ渴セザルハ大陰ニ属ス其
藏ニ寒アル故ナリ先ヲ温ムヘシ四逆輩ヲ服
スベシ○少陰病ニ脈沉ナル者ハ急ニ温ムヘ
シ此方主之○大ヒニ汗出テ熱去ラス内
拘急シ四肢疼シ又下利厥逆シテ惡寒ス
ル者主之○下利シテ腹脹滿シ身體疼痛
スル者先裏ヲ温ムベシ此湯主之後表ヲ攻
ベシ桂枝湯ニ宜シ○嘔シテ脈弱小便反ツ
テ利シ身ニ微熱アツテ厥ヲ見ス者ハ難
治此方主之○吐利汗出テ發熱惡寒シ
四肢拘急又厥冷スル者主之○既ニ吐シ且
下シ小便モ亦通利シ大ヒニ汗出テ清穀

ヲ下利シ内寒外熱脈微ニシテ絶セントスル
者主之

夏

○通脈四逆湯 此方ハ四逆湯ニテ脈微
ニシテ絶セントスル者主之

附子 一枚 乾薑 甘草 各三兩

右三味水三升ヲ以テ煮テ一升ニ合ヲ取
リ滓ヲ去リ分温メテ再服ス其脈即出ル
者ハ愈ユ加減法 面色赤キ者ニ葱九莖
ヲ加フ・腹中痛ムニハ葱ヲ去リ芍藥二兩
ヲ加フ・嘔スルニハ生薑三兩ヲ加フ・咽痛
ニハ芍藥ヲ去リ桔梗一兩ヲ加フ・下利
止テ脈ノ不出ニハ桔梗ヲ去リ人參二兩ヲ
加フ

●論治 少陰病清穀ヲ下利シ手足厥

逆シ脉微ニシテ絶セント欲シ身反ツテ惡寒

セズ面色赤ク或腹痛或ハ乾嘔或ハ咽

痛或ハ利止テ脉不出者此方主之○清穀

ヲ下利シ汗出ニシテ厥スル者亦主之

草 ○四逆加人參湯 此方ハ四逆湯ノ症ニ

シテ心下痞スル者主之

四逆湯ノ方中ニ人參一兩ヲ加フ

●論治 惡寒シ脉微ニシテ又利シ利止

テハ血スル者此方主之

草 ○茯苓四逆湯 此方ハ前方ノ症ニ悸シ

テ惡寒シ或ハ煩躁スル者主之

茯苓六兩 人參一兩 甘草二兩

乾薑一兩 附子一枚

右五味水五升ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ滓

ヲ去リ七合ツ温服ス

草 ○桂枝附子湯 此方ハ桂枝去芍藥湯ノ

症ニシテ身體疼煩シ自ラ轉側スルコト不

能者主之

桂枝四兩 附子三枚 生薑三兩

甘草二兩 大棗十枚

右五味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取リ滓ヲ

去リ分温メテ三服ス

●論治 傷寒八九日風濕相搏身體疼

煩シ自ラ轉側スルコト能ハズ嘔セズ渴セ

サル者此方主之若其人大便秘小便自利

スル者ハ本桂加木湯ニ宜シ

○桂枝芍薬加附子湯 此方ハ桂枝芍薬湯ノ症ニシテ惡寒スル者ニ主之

桂枝芍薬湯ノ方中ニ附子一枚ヲ加フ

●論治 大陽病ヲ誤リ下シテ後脈促胸滿ルモノハ芍薬湯ニ主之モレ微シ惡寒スル者ハ芍薬湯ノ方中ニ附子ヲ加ヘテ主之

○桂枝加黄耆湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニシテ黄汗或ハ自汗盜汗スル者ニ主之

桂枝湯ノ方中ニ黄耆ニ兩ヲ加フ

●論治 黄汗ノ病ハ兩脛自ラ冷若ハ發熱スルハ此歷節ニ屬ス食シ已テ汗出ツ又

常ニ暮テ盜汗出ル者ハ營氣ノ虚ナリ若シ汗止反ツテ發熱スル者ハ久シケレハ其人必甲

錯ス甲錯ハ魚鱗ノ乾キ枯タル状ノ如シ 若シ發熱止サル者ハ必惡瘡ヲ生ズ若シ身重ク汗出テ輒輕ク覺ユル者ハ久クシテ必ズ身腫々

タリ即胸中痛ム又腰ヨリ以上ハ汗出テ以下ハ汗ナク腰腹弛痛シ物ノ皮中ニアル

状ノ如シ劇キ者ハ食スルノ不能身疼重ク煩躁シテ小便不利者此方主之

○桂枝加龍骨牡蠣湯 此方ハ桂枝湯ノ症ニシテ胸腹ニ動氣アル者ニ主之

桂枝湯方中ニ龍骨牡蠣各三兩ヲ

加フ

●論治 夫失精家ハ少腹弦急ニシテ冷
頭寒目眩シ。髪落其脈虚ニシテ孔遲清穀
不化。血少失精ス或ハ脈孔動微緊ヲ得ル
トキハ男子ハ失精シ。女子ハ夢交スル者ナ
リ。此方主之ヲ

夏

○桂枝芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯 此
方ハ桂枝芍薬湯ノ症ニシテ胸腹ニ動
氣アツテ象ク或ハ火邪ノ者主之ヲ

桂枝 生薑 蜀漆 各三兩

龍骨 四兩 牡蠣 五兩 大棗 十二枚

甘草 二兩

右七味末ト為シ水一斗ヲ以テ先ツ蜀漆

ヲ煮テ二升ヲ減シテ諸藥ノ末ヲ入レ煮テ
三升ヲ取り滓ヲ去リ升ツ温服ス

●論治 傷寒脈浮ナルニ反テ火ヲ以テ

火鉢或ハ火コレヲ迫劫シテ陽ヲヒセバ必驚

狂シ起臥安カラザル者此方主之ヲ

夏

○人參湯 亦名理中 此方ハ心下痞鞭シ
小便利セス或ハ急痛或ハ胸中痺スルモノ
主之ヲ

人參 白朮 乾薑

甘草 各三兩

右四味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓
ヲ去リ一升ツ温服ス 加減法 臍上ニ築
動スルニハ白朮ヲ去リ桂枝四兩ヲ加フ。吐

傷寒釋通

申 四十五

多キニハ木ヲ忝リ生薑三兩ヲ加フ・下ル

コト多キニハ木ヲ用ユヘシ・悸スルニハ茯苓ニ

兩ヲ加フ・湯シテ水ヲ得トスルニハ木ヲ

加ヘ前ト供ニ四・腹中痛ムニハ人参ヲ

加ヘ兩半トス・寒ズルニハ乾薑ヲ加ヘ共ニ四兩

加ヘ半トス・腹滿ニハ木ヲ忝リ附子一枚ヲ加フ湯ヲ

テ食頃シテ熱粥一升許ヲ啜テ微シ自ラアタ、

△衣被ヲ發揭スルヲ勿レ・活人書ニ云或ハ四肢

拘急シ或ハ轉筋スルニ木ヲ忝リ附子ヲ加フト・後

人本方ニ附子ヲ加ヘテ附子理中湯ト名ツテ手足

厥冷シテ下利スル者ノ主方トス

●論治 霍乱ニ頭痛發熱シテ身疼シ熱

多クシテ水ヲ飲ント欲スル者ハ五苓散ヲ主ル

寒多クシテ水ヲ不欲者ハ此方主之○大病差

テ後喜テ唾シタクアタラサル者モ亦主之

○心中痞シ留氣結シテ胸ニアリ胸滿脇下

逆シテ心ニ衝ハ枳實薤白桂枝湯主之人参

湯モ亦主之

夏

○桂枝人参湯 此方ハ人参湯ノ症ニシテ

上衝シ急迫スル劇キ者主之

桂枝 甘草 各四兩 人参

白朮 乾薑 各三兩

右五味水九升ヲ以テ先四味ヲ煮テ五升ニ

煎シテ桂ヲ入更ニ煮テ三升ヲ取り一升ツ

温服ス

●論治 大陽病外證イマダ不除ニ數此

ヲ下シテ遂ニ熱協ニ利シ下利止ス心下

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

痞鞭シ表裏解セザル者此方主之

夏九 ○枳實薤白桂枝湯 此方ハ胸中痺滿シテ痛者王^レ之^ヲ

枳實^{四枚} 薤白^{半升} 桂枝^{一兩}

厚朴^{四兩} 枳實^{一枚}

右五味水五升ヲ以テ先^ニ枳實ヲ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ諸藥ヲ入^レ煮ル^ヲ數沸シ分温メテ三服ス

夏見 ○枳實薤白白酒湯 此方ハ胸^{キツク}背^イ痛^ク之^ヲ

喘息咳唾スル者王^レ之^ヲ

枳實^{一枚} 薤白^{半升} 白酒^{七升}

右三味同ク煮テ二升ヲ取り分温メテ再服ス

夏見 ○枳實瞿麥丸 此方ハ心下悸シ小便利

セズ惡寒シテ渴スル者王^レ之^ヲ

枳實^{二兩} 瞿麥^{一兩} 茯苓

薯蕷^{各三兩} 附子^{一枚}

右五味細末シテ蜜ニ煉テ梧子ノ大サニ丸シ三丸ツ飲服ス日ニ三度モシ知ズンハ増テ七八丸ニ至ルベシ小便利シ腹中温ルヲ以テ知トス

・論治 小便利モム水氣アルナリ其人渴スル者ハ此方ニ之^ヲ

夏見 ○苓薑朮甘湯 此方ハ心下悸シテ小便

自利シ腰中冷ル^ト水甲一坐スルガ如ク或ハ痛^ク重^クシテ形水狀ノ如クナル者王^レ之^ヲ

茯苓 乾薑^{各四兩} 白朮

傷寒釋通

申 四七

甘草 各二兩

右四味水五升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ三服ス

●論治 腎着ノ病ハ其人身體重ク腰中冷ル一水中ニ坐スルガ如ク反ツテ渴セズ小便自利シ飲食常ノ如シ病下焦ニ属ス腰以下冷痛ス腰ノ重キ一五千錢ヲ帶ルガ如キ者此方主之○其他淋疾或ハ下利スル者ニ亦宜シ

夏三
○八味丸 一名腎氣丸 此方ハ臍下不仁シ小便利セス或ハ自利シ或ハ腰脚ノ痛ムモノ主之

乾地黄 八兩 山茱萸 暮蕪 各四兩

澤瀉 茯苓 牡丹皮 各三兩

桂枝 附子 各一兩

右八味細末シテ蜜ニ煉和シテ梧子ノ大サニ丸シ酒ニテ十五丸ヲ下ス日ニ再服ス

●論治 脚氣上ニ馳セ少腹不仁スルモノ

此方主之○腰痛ニ少腹拘急シテ小便利セザル者主之○消渴病ニ小便反ツテ多ク

飲一斗ナレハ小便モ亦一斗トルモノ此方主之○短氣微飲アルハ小便ヨリ去ルベシ

桂苓朮甘湯主之腎氣丸モ亦主之後人ハ

桂附ヲ去リ六味丸ト名ツケ小兒ノ疳疰發熱咳嗽シ或ハ老人大便秘シ或ハ房勞過度シテ咳嗽シ或ハ淋病久シク不愈或ハ腎水不足シ虚火炎上スル等ニ主之

夏四
○牡蠣湯 此方ハ麻黄甘草湯ノ症ニシテ

胸中ニ動氣アル者主之ヲ

牡蠣 麻黄 各四兩 蜀漆 三兩

甘草 二兩

右四味水八升ヲ以テ先蜀漆麻黄ヲ煮

テ上沫ヲ去リ六升ヲ得テ諸藥ヲ入煮テ

二升ヲ取リ一升ツ温服ス若吐セハ必ス服スルヲ勿レ

・論治 牡蠣ノ者此方主之瘧ニ寒多キモノヲ云

夏五 ○大黃附子湯 此方ハ腹絞痛シテ惡寒

スル者主之ヲ

大黃 三兩 附子 一枚 細辛 二兩

右三味水五升ヲ以テ煮テ二升ヲ取リ滓

ヲ去リ分温メテ三服ス

・論治 脇下偏痛發熱シ其脉緊弦ナ

ル者此寒ナリ温藥ヲ以テコレヲ下スベシ此方主之ヲ

夏 ○甘草乾薑湯 此方ハ厥シテ煩燥シ涎

沫ノ多キ者主之ヲ

甘草 四兩 乾薑 二兩

右咬咀シ水三升ヲ以テ煮テ一升五合ヲ取

リ滓ヲ去分温メテ再服ス

・論治 肺痿涎沫ヲ吐シテ咳セサルモノ

多ク渴セズ必遺尿シ小便數シ是上虚シ

テ下ヲ制スルヲ不能ノ故ナリ必肺ノ冷ナル

ニヨリ眩シテ涎沫多シ此湯ヲ以テ温ムヘシ

夏 ○乾薑附子湯 此方ハ腹痛或ハ下利シ

手足厥冷スル者主之ヲ

傷寒 經 申 九

乾薑兩一 附子枚一

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓ヲ
去リ頓ニ服ス

●論治 下シテ後又汗ヲ發シ晝日煩躁シ

テ眠ルコトヲ得ズ夜ニ至テ安靜ス嘔セス渴

セス脈沉微ナル者此方主之

○白通湯 此方ハ氣逆シテ下利スルモノ

主之

葱白四莖 乾薑兩一 附子枚一

右三味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ再服ス

●論治 少陰病下利スル者此方主之

○白通加猪膽汁湯 此方ハ下利止ズ厥

逆シテ脈ナク或ハ乾嘔シ煩スル者主之

シテ脈暴カニ出ル者ハ死ス

葱白四莖 乾薑兩一 附子枚一

人尿五合 猪膽汁一合

右三味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓ヲ

去リ膽汁人尿ヲ入レ和シ得テ分温メテ再服

ス或ハ猪膽ナク凡亦用ユベシ

○烏頭湯 此方ハ骨節疼痛シテ屈伸ナ

シ難シ若ハ自汗或ハ盜汗若ハ腹絞痛スル

者主之

麻黃 芍藥 黃耆

甘草各三兩 川烏五枚 咬咀シ蜜ニ

一升ヲ取り即

右五味、咬咀、水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ
取り、滓ヲ去リ、蜜ヲ煎中一入レ、更ニ煎シ七
合ヲ服ス

●論治 歷節屈伸スベカラスシテ疼痛ス
ル者此方主之○脚氣疼痛シテ屈伸不能者
主之○寒疝腹中絞痛シ又ハ拘急シテ轉
側スル不能發作時アリ或ハ陰縮ミ手足厥
逆スル者主之

○赤丸 此方ハ心中悸シ痰飲アツテ惡寒
シ或ハ微厥スル者主之

茯苓 半夏 各四兩一
方ニ用桂 烏頭 二
兩

細辛 一兩千金ニ
作入參

右四味細末ト為シ、朱砂ヲ入レ色ヲ為シ、蜜

ニ子リ麻子ノ大サニ丸シ、食ニ先ツテ酒ニ
丸ヲ下ス、日ニ二度夜一度モシ知ズンバ稍
レヲ増ベシ

●論治 寒氣厥逆スル者此方主之

○真武湯 此方ハ心中噪ク身攣動シ振
々トシテ地ニ擲ントシ小便利セズ或ハ區シ
或ハ下利シ或ハ拘痛スル者主之

茯苓 芍藥 生薑 各三
兩

白朮 二
兩 附子 一
枚

右五味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り、
滓ヲ去リ七合ツ、温服ス、加減法
ニ五味子半升細辛乾薑各一兩ヲ加フ
●小便利スルニハ茯苓ヲ去・下利ニ芍

藥ヲ忒リ。乾薑二兩ヲ加フ。嘔吐ニハ附子ヲ忒リ生薑ヲ加フ前ト供ニ半斤ト成

●論治 少陰病腹痛小便利セズ四肢

沉重疼痛シテ自ラ下利シ此水氣アリ其人

或ハ效シ或ハ小便利シ或ハ下利シ或ハ嘔ス

ル者此方主之○大陽病汗ヲ發シ汗出

テ解セズ仍發熱シ心下悸シ頭眩シ身

動シ振ヤトシテ地ニ擗ト欲スル者モ亦主之

○附子湯 此方ハ身體攣痛シテ小便

利セズ心下痞鞭シ或ハ腹痛スル者主之

附子 二枚 茯苓 芍藥 各三

人參 二兩 白朮 四兩

右五味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り

滓ヲ忒リ一升ヲ温服ス

●論治 少陰病ヲ得テ二日口中和シ

テ背惡寒スル者ハ先關元ノ穴次ニ大谿ノ

穴ニ灸シテ此方主之○身體痛シ手足寒

骨節痛シ脉沉ナル者亦主之

○天雄散 此方ハ小便利セズ一逆シテ

臍下ニ動氣アリテ惡寒スル者主之

天雄 龍骨 各三 桂枝 六

白朮 八兩 天雄ハ即附子ノ一種ナ

リ丹ヲ烏頭トシ附生ス

ル者ヲ附子トシ連リ生スル者ヲ側

子トシ細ク長キ者ヲ天雄トシ兩岐

ノ者ヲ烏喙トス五物同ク出テ名ヲ異ニス

右四味杵テ散ト為シ半錢ヒヲ服ス●若知ズバ稍此ヲ増ベシ

夏

○吳茱萸湯 此方ハ胸滿心下痞鞭シテ嘔スル者主之

吳茱萸 一分
人參 三兩
生薑 六兩
大棗 十二枚

右四味水七升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ七合ツク温服ス

・論治 穀ヲ食シテ嘔セントスル者此方

主之 此陽明ニ属ス ○少陰病吐利シテ手足

冷煩躁シテ死セントスル者主之 ○嘔シテ

胸滿ル者亦主之 ○乾嘔シ涎沫ヲ吐シ

頭痛スル者主之

夏

○大建中湯 此方ハ腹大ヒニ痛ミ嘔シテ食スル不能腹皮起テ頭足アルガ如キ

蜀椒 二合
乾薑 四兩
人參 兩

右三味水四升ヲ以テ煮テ二升ヲ取滓ヲ

去リ膠飴一升ヲ入レ微火ニテ煎シ一升半ヲ

取り分温メテ再服ス須臾シテ粥二升ヲ

啜テ後温覆スベシ

・論治 心胸大ヒニ痛ミ嘔シ飲食スル

不能腹中ヒへ上衝シテ皮起リ出見レ

頭足アルガ如クシテ上下痛ミ觸近ツクヘカラ

ザル者此方主之

夏

○桃花湯 此方ハ膿血ヲ便スル者主之

赤石脂 一斤
乾薑 兩
粳米 一升

右三味水七升ヲ以テ煮テ米熟シテ滓ヲ

太リ七合ツ温服ス

●論治 少陰病下利シテ膿血ヲ便ズル者此方主之○腹滿テ小便利セズ下利止ス膿血ヲ便ズル者主之

夏

○蜀漆散 此方ハ寒熱發作時アリ臍下ニ動氣アル者主之

蜀漆 即常山苗 腥 燒 去 雲母 燒

龍骨 各等分

右三味拵テ散ト為シ寒熱ノ發セザル前ニ漿水ノ以テ半錢ヲ服ス・温瘧ニハ蜀漆半分ヲ加ヘ發スル時ニ臨テ一錢七ヲ服ス

●論治 瘧ニ寒多キ者ハ名ツケテ牡蠣ト云此方主之

夏

○礬石丸 此方ハ經水閉テ血塊散ズ中

三乾血有テ白物ヲ下ス者主之

礬石 三分 杏仁 一分

右二味細末シテ蜜ニテ煉棗核ノ大サニ丸シテ臍中ニ入レ劇キ者ハ再ヒ此ヲ入ル

夏

○蛇床子散 此方ハ白物ヲ下シ陰中痒ク或ハ小瘡アル者主之

蛇床子

右一味細末シテ白粉少シバカリヲ以テ

和シ合セ 白粉ハ胡粉ナレドモコレハ白礬ノヤキタルヲ用ヒテ可ナリ

相得テ棗ノ大サニシテ綿ニツミテ此ヲ陰中ニ入ル自然ニ温ルナリ此ヲ陰中ヲ温ムル坐

藥ト云フ 坐シテ藥ヲ陰中ニ入ルヲ以テコレヲ坐藥ト名ツク

夏

○温經湯 此方ハ少腹寒テ又シク胎ヲ

受ズ崩漏血ヲ去或ハ月水來ルノ過多シ又
ハ期ニ至テ來ラザル者王ル之ヲ

吳茱萸三兩 當歸 芍藥

芍藥 人參 桂枝

生薑 阿膠 牡丹皮

甘草各二兩 半夏半斤 麥門冬一斤

右十一味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取リ
滓ヲ去リ分温メテ三服ス

●論治 婦人年五十許ニシテ下利ヲ瘥
數十日止ズ暮ニ及テ發熱シ少腹裏急
腹滿シテ手足煩熱シ唇口乾燥スルモノ
其病帶下タイゲ 屬人曾テ半產ヲシテ瘀血少
腹ニ在テ去ラザル者此方王ル之ヲ

○當歸散 此方ハ婦人妊娠シテ常ニ服ス
レハ即易産胎ニ疾ノ苦ミナシ又ハ産後ノ
百病悉ク王ル之ヲ

當歸 芍藥 芍藥

黃芩各一兩 白木半兩

右五味并テ散ト為シ酒ニテ方寸匕ヲ服
スル一日ニ二度

夏 ○白朮散 此方ハ妊娠胎ヲ養フニハ王
之

白朮 芍藥 牡蠣各二分

蜀椒三分除目
或開ル者

右四味并テ散ト為シ酒ニテ一錢匕ヲ服
ス日三度夜一度 加減法 腹痛ニハ芍藥ヲ

加フ・心下毒痛ニハ苦ヲ苦ヲ倍加ス・心

煩シ或ハ吐シ痛ク食飲スルヲ不能ニハ細

辛半夏ヲ加フ

夏○黄土湯 此方ハ吐血衄血下血等ノ者

手之ヲ

甘草 乾地黄 白朮

阿膠 附子 黄芩各三兩

竈中黄土半斤

右七味水八升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテニ服ス

・論治 下血便ヲ先ニシテ血ヲ後ニスル

此ヲ遠血ト云此湯主之ヲ

夏○栝葉湯 此方ハ吐血不止者主之ヲ

栝葉 乾薑各三兩 艾三把

右三味水五升ヲ以テ馬通汁一升ヲ取リ

合セ煮テ一升ヲ取り滓ヲ去リ分温メ

テ再服ス

夏○侯氏黑散 此方ハ大風四肢煩重シ心

中惡寒シ不足ノ者主之大風ハ即癩風ナリ也 俗云三病ナリ

黄芩五分 防風十分 細辛三分

桔梗八分 乾薑三分 菊花四分

人參三分 白朮十分 茯苓

當歸 川芎 牡蠣

礬石 桂枝各三分

右十四味并テ散ト為シ酒ニテ方寸匕ヲ

服スルヲ日ニ一度・初メ二十日間ハ温酒

ニテ服スベシ。一切ノ魚肉大蒜ヲ禁ス。常ニ必^イ食スベシ。後六十日ニシテ即止。藥積^{ツク}テ腹中ニアリ。若^レ熟食スレハ即下ル。冷食スレバ自^ラ藥カヲ助ク

夏

○烏頭桂枝湯 此方ハ腹中絞痛^{カクツク}シテ手足逆冷^{ギヤクレイ}シ。或ハ不仁^{ヒツカカリ}シ。又ハ身疼ム者王^ル之^ヲ

烏頭五枚

右一味蜜二斤ヲ以テ煎シテ半ヲ減シ。滓ヲ去リ。桂枝湯五合ヲ以テ此ヲ煎シテ一升ヲ得テ初メニ合ヲ服シ。知ズレバニ合ヲ服シ。又ハ五合ニ至ル。其知ル者ハ醉狀^{イグサウ}ノ如クシテ吐スル者ハ病ニアタルトス

・論治 寒疝^{カシヒシ}腹中痛^ハ逆冷^ニ手足不

仁或ハ身疼痛^{イタク}シ。灸刺^{イタク}諸藥ノ無驗者。此方王^ル之^ヲ

○汗劑

夏

○麻黃湯 此方ハ喘^{ゼン}シテ無汗^ハ頭痛發熱^{ツク}惡寒^{ヤウキ}シテ身體疼者王^ル之^ヲ

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草一兩

杏仁七十個

右四味水九升ヲ以テ先^ニ麻黃ヲ煮テ二升ヲ減シテ上沫^{ウケ}ヲ去^ル。諸藥ヲ入^レ。煮テ二升半ヲ取^リ。滓ヲ去^リ。八合ツク。温服ス。覆^フテ微似汗^シヲ取^ル。粥ヲ啜^スベカラス。餘ハ桂枝湯ノ法ノ如シ

論治 太陽病頭痛發熱身痛腰痛骨節疼痛惡風無汗シテ喘スル者此方主之

○太陽ト陽明ト合病ニテ喘シテ胸滿ル者ハ下スベカラズ此湯主之○脉浮ナ

ル者ハ病表ニアリ汗ヲ發スヘシ主之○傷寒脉浮緊汗ヲ發セス因テ致ス者主

之○陽明病脉浮無汗シテ喘スルモノハ汗ヲ發スレバ則愈主之○脉浮細ニシテ

臥ヲ嗜者ハ外ステニ解スル也設胸滿脇痛ム者ハ小柴胡湯ヲ與フベシ脉但浮

ナル者ハ主之○太陽病脉浮緊ニシテ無汗發熱身疼痛シテ八九日解セズ表症仍アル者ハ其汗ヲ發スベシ藥ヲ服シ終テ微

除ク其人煩ヲ發シテ目瞑ス甚キ者ハ必衄ス衄スレハ乃解ス然ル所以ハ陽氣重ル故ナリ此方主之

○麻黃加朮湯 此方ハ麻黃湯ノ症ニシテ小便不利者主之

麻黃湯ノ方中ニ白朮四兩ヲ加フ

論治 濕家身煩疼スレバ此湯ヲ與フベシ其汗ヲ發スルヲ宜シトス慎ンテ火ヲ以テ攻ベカラス

○麻黃甘草湯 此方ハ喘急息迫シ或ハ自汗或ハ無汗者主之

麻黃 四兩 甘草 二兩

右二味水五升ヲ以テ先麻黃ヲ煮テ上

湯更

神

五十八

味ヲ忒リ甘草ヲ入レ煮テ三升ヲ取り一升
ヲ温服ス衣ヲ覆ヘハ汗出ツ若汗セズハ再
服ス必風寒ヲ慎ムベシ

夏

○麻黄附子甘草湯 此方ハ麻黄甘草
湯ノ症ニシテ惡寒シ或ハ身微シ痛ムモノ
主之ヲ

麻黄 甘草 各二 附子 一枚

右三味水七升ヲ以テ先麻黄ヲ煮ルコト
一二沸シテ上沫ヲ忒リ諸藥ヲ入レ煮テ
三升ヲ取り滓ヲ忒リ一升ヲ温服ス

●論治 少陰病ヲ得テ二三日 邪氣下
利厥逆等ノ裏症ナキ者ハ微シ發汗スヘシ

此方主之ヲ

夏

○麻黄附子細辛湯 此方ハ麻黄附子
甘草湯ノ症ニシテ急迫セズ痰飲ノ變ル
者主之

麻黄 細辛 各二 附子 一枚

右三味水一升ヲ以テ先麻黄ヲ煮テ二
升ヲ減シテ上沫ヲ忒リ煮テ三升ヲ取り
滓ヲ忒リ一升ヲ温服ス

●論治 少陰病始テ之ヲ得反ツテ發熱
シテ脉沉ナル者此方主之ヲ

夏

○麻黄杏仁甘草石膏湯 此方ハ麻黄
甘草湯ノ症ニシテ咳シ煩渴スル者主之ヲ

麻黄 杏仁 各五 甘草 二

石膏 半斤

右四味水七升ヲ以テ先麻黄ヲ煮テ二升ヲ減シテ上沫ヲ去リ一升ヲ温服ス

●論治 發汗ノ後更ニ桂枝湯ヲ用ユヘカラス汗出テ後喘シテ大熱ナキ者主之金匱

夏四

○麻黄杏仁薏苡甘草湯 此方ハ前劑ノ症ニシテ煩渴セス水氣アル者主之方

麻黄半兩 杏仁十個 薏苡仁半兩

甘草二兩

右四味水五升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ再服ス汗出レバ即愈

●論治 病者一身盡ク疼ク發熱日晡所ニツホ

三劇キ者ハ風湿ト名ツク此汗出テ風ニ

當ルニ傷レ或ハ久ク冷ヲ取ルニ傷レテ致ス所ナリ宜ク此湯ヲ與フベシ

夏五

○桂枝麻黄各半湯 此方ハ桂枝湯ト麻黄湯ノ二症相兼テ半ナル者主之方

桂枝一兩 芍藥六銖 生薑

甘草各一兩 麻黄各一兩 大棗四枚

杏仁二十個

右七味水五升ヲ以テ先麻黄ヲ煮ル一升ニ沸シテ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入レ二升ヲ取り滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

●論治 發熱惡寒シ熱多ク寒少ク其人

嘔セズ大便自ラキザシ有テ一日ニ二三

度發熱シ脉微緩ナル者ハ愈ント欲スルノ

ナリ。若面色ニ熱色アル者、未ダ解スルコト不能ナリ。其微汗出難キ者ハ必痒シ。此方主之。

夏 ○桂枝ニ麻黄一湯 此方ハ桂枝湯ノ症多クシテ麻黄湯ノ症少キ者主之

- 桂枝 一兩十 芍藥 一兩十 麻黄 十六六 銖
- 生薑 一兩十 杏仁 十六六 甘草 一兩十 銖
- 大棗 五五 枚

右七味水五升ヲ以テ先麻黄ヲ煮ル一ト二沸シテ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

・論治 桂枝湯ヲ服シテ大ヒニ汗出テ脉洪大ナル者ハ更ニ服ヲ作ス若形手痺ノ

如ク日ニ再發スル者ハ汗出テ必解ス此方主之

夏 ○桂枝ニ越婢一湯 此方ハ桂枝湯ノ症多クシテ越婢湯ノ症少キ者主之

- 桂枝 芍藥 甘草 各十十 銖
- 生薑 一兩十 大棗 四四 枚 麻黄 十八十 銖
- 石膏 二十十 銖

右七味咬咀シ水五升ヲ以テ麻黄ヲ煮ル一ト二沸シテ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ二升ヲ取り滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

・論治 大陽病發熱惡寒熱多ク寒少ク脉微弱ナル者此方主之

夏 ○越婢湯 此方ハ大青龍湯ノ症ニシテ

咳嗽並ニ上衝セザル者主之ヲ

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩

大棗十五枚 甘草二兩

右五味水六升ヲ以テ先麻黃ヲ煮テ上沫

ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ三升ヲ取り滓ヲ

去リ分温メテ三服ス **加減法** 惡風六附

子一枚ヲ加フ・風水ニハ白朮四兩ヲ加

フ

・論治 風水惡風一身悉ク腫脉浮ニ

シテ渴セズ自汗出テ大熱ナキ者此方

主之ヲ

○越婢加朮湯 此方ハ越婢湯ノ症ニシテ

小便不利者主之ヲ

越婢湯ノ方中ニ白朮四兩ヲ加フ

・論治 裏水風邪裏ニ入り 一身面目俱

ニ黃腫ス其脉沉ニシテ小便不利故ニ水ヲ

病シム假ヒ小便自利スレバ津液ヲヒスル

故ニ渴セシム此方主之ヲ○裏水ハ越婢加

朮湯主之甘草麻黃湯モ亦主之○其他

脚氣腫滿或ハ歷即痛風又ハ腰以下ノ浮

腫スル者主之ヲ

○越婢加半夏湯 此方ハ越婢湯ノ症ニ

シテ煩渴シ嘔逆スル者主之ヲ

越婢湯ノ方中ニ半夏半升ヲ加フ

・論治 欬シテ上氣シ此ヲ肺脹トス 其人喘シ

テ目脱セル狀ノ如クシテ脉浮大ナルモノ此

方主之ヲ

葛根湯 此方ハ項背強急シテ發熱惡風シ或ハ喘シ或ハ身疼ム者主之

葛根 兩四 麻黃 生薑 各三兩

桂枝 芍藥 甘草 各二兩

大棗 十二枚

右七味咬咀シ水一斗ヲ以テ先麻黃葛根ヲ煮テ二升ヲ減シ沫ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ三升ヲ取り滓ヲ去リ一升ツツ温服ス衣被ヲ覆テ微汗ニ似タルニ取ルヲ啜ベカラス餘ハ桂枝湯ノ法ノ如シ

論治 太陽病項背強リ凡々トシテ無汗惡風スル者此方主之○太陽ト陽明ト

ノ合病ハ必自ラ下利ス此湯主之○太陽病無汗シテ小便反ツテ少ク氣上ツテ胸ニ衝口禁シ語ル得マシテ剛瘕トナラントスル者主之○其他時疫癘疾或ハ痢疾各其初發熱惡寒スル者亦主之

葛根加半夏湯 此方ハ葛根湯ノ症ニシテ嘔アル者主之

葛根湯ノ方中ニ半夏半升ヲ加フ

論治 太陽ト陽明トノ合病ニテ下利セズシテ但嘔スル者此方主之

葛根黃連黃芩湯 此方ハ項背強急シテ心悸シ下利スル者主之

葛根 半斤 黃連 三兩 黃芩 兩

方主之ヲ

甘草各二兩

黃芩

右四味水八升ヲ以テ先葛根ヲ煮テ二升ヲ減シ諸藥ヲ入レ煮テ二升ヲ取リ滓ヲ去リ分温メテ再服ス

・論治 桂枝湯ノ症ヲ醫反ツテコレヲ下シ利遂ニ止ス其脈促ナル者ハ表未ダ解セズ喘シテ汗出ル者此方ニ主レ之

葛

○小青龍湯 此方ハ咳喘上衝頭痛發熱惡風シ或ハ乾嘔スル者ニ主レ之

麻黃

桂枝

芍藥

乾薑

細辛

甘草各三兩

半夏

五味子

各半升

右八味水一斗ヲ以テ先麻黃ヲ煮テ二升ヲ減シ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ三升ヲ取リ滓ヲ去リ一升ツク温服ス

加減法

微利スルニハ麻黃ヲ去リ堯花燻テ赤色ナラシメテ雞子ノ大サ加フ

夏ヲ去リ括蕁根三兩ヲ加フ

壺スルニハ麻黃ヲ去リ附子ヲ炮シテ一枚ヲ加フ

小便不利少腹滿ルニハ麻黃ヲ去リ茯苓四兩ヲ加フ

喘スルニハ麻黃ヲ去リ杏仁半升ヲ加フ

・論治 傷寒表解セズ心下水氣アリ

區シ發熱シテ或ハ渴シ或ハ利シ或ハ噎シ或ハ小便利セズ少腹滿或ハ喘スル者此方ニ主レ之

或トハ未定ノ辭ニテ其有無ヲ指テ云フ

○心下水

氣アリ。效シテ微喘シ。發熱シテ不渴者。主之。
 ○效逆倚息シ臥ルヲ得ズ。亦主之。○
 人涎沫ヲ吐ス。醫反ツテ此ヲ下シテ心下
 即痞スルハ。先其涎沫ヲ治スベシ。此湯
 之涎沫止テ乃痞ヲ治スベシ。瀉心湯主之。
 ○大青龍湯 此方ハ喘シテ咳嗽シ。渴シ
 テ飲水ヲ欲シ。上衝發熱。或ハ身疼。風寒
 ヲ惡ム者。主之。

麻黃 六兩
 桂枝 二兩
 甘草 各二兩
 杏仁 四十個
 生薑 三兩
 大棗 十二枚
 石膏 雞子大者

右七味水九升ヲ以テ。先麻黃ヲ煮テ二升
 ヲ減シテ上沫ヲ去リ。諸藥ヲ入レ煮テ二升
 ヲ取リ。滓ヲ去リ。一升ヲ温服ス。

●論治 太陽ノ中風。其脈浮緊。發熱惡寒
 身疼痛シ。汗出スシテ煩躁スル者。此湯主之。
 ○傷寒脈浮緩。身疼。重ク勿心輕キコ
 トアリ。少陰ノ症ナキ者。亦主之。
 小青龍湯 ○溢飲ノ者。其汗ヲ發スヘシ。此
 湯主之。小青龍湯モ亦主之。
 ○文蛤湯 此方ハ煩渴シテ喘咳急ナル
 者。主之。

文蛤 石膏 各五兩
 麻黃 二兩
 甘草 生薑 各三兩
 杏仁 五十個
 大棗 十枚

右七味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取リ。

滓ヲ去リ、一升ヲ温服ス

・論治 吐シテ後渴シテ水ヲ欲シ食リ
飲者此湯主之ヲ

夏 〇半夏麻黄丸 此方ハ喘シテ嘔スル者

主之ヲ

半夏 麻黄 各等分

右二味細末シ蜜ニテ煉小豆ノ大サニ丸
シテ三九ヲ飲服ス

・論治 心下悸スル者此方主之ヲ

夏 〇桂薑棗草黄辛附湯 此方ハ桂枝太

芍藥湯ト麻黄附子細辛湯ノ二症相兼
ル者主之ヲ

桂枝 生薑 各三兩 大棗 十二枚

甘草 麻黄 細辛 各二兩

附子 一枚

右七味水七升ヲ以テ麻黄ヲ煮テ上沫
ヲ去リ諸藥ヲ入レ煮テ二升ヲ取り滓ヲ
去リ分温ノテ三服ス

・論治 心下堅大ニシテ邊リ旋盃ノ如
キハ水飲ノ作所ナリ此方主之ヲ

夏 〇射干麻黄湯 此方ハ欬シテ上氣シ喉

中水雞ノ聲ヲナス者主之ヲ

射干 十三枚 麻黄 生薑 各四兩

細辛 紫苑 欬冬花 各三兩

五味子 半升 大棗 七枚 半夏 八枚 或

右九味水一斗二升ヲ以テ先麻黄ヲ煮

ルコト兩沸シテ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入煮
テ三升ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ三服ス

夏 ○麻黃連軀赤小豆湯 此方ハ痰熱裏
ニアリ身ニ黃ヲ發スル者主之

麻黃 連軀 即連翹根ナリ
各三兩

赤小豆 一升 杏仁 四箇 大棗 十二枚

生梓白皮 一升 桑白皮 以之代之 生薑 二兩

甘草 一兩

右八味 潦水 下斗ヲ以テ先麻黃ヲ煮ルコ
ト再沸シテ上沫ヲ去リ諸藥ヲ入煮テ三
升ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ三服ス

夏 ○麻黃升麻湯 此方ハ手足厥逆シ咽喉
不利シテ膿血ヲ唾レ泄利不止者主之

麻黃 二兩 升麻 當歸 各一兩 半分

芍藥 白朮 天門冬

桂枝 芍藥 乾薑

黃芩 知母 石膏

茯苓 甘草 各六銖

右十四味 水一斗ヲ以テ先麻黃ヲ煮ル
コト一沸シテ上沫ヲ去リ煮テ三升ヲ取り
滓ヲ去リ分温メテ三服ス

夏 ○麻黃淳酒湯 此方ハ喘シテ黃ヲ發シ
或ハ身痛ム者主之

麻黃 三兩

右一 味美酒 五升ヲ以テ煮テ二升半ヲ取
リ頓ニ服ス 冬月ハ酒ヲ用ヒ
夏月ハ水ヲ用ヒ

○吐劑

○梔子豉湯 此方ハ心中懊懐スル者主之

梔子

十四枚

香豉

四合

右二味水四升ヲ以テ先梔子ヲ煮テ二升半ヲ得。豉ヲ入レ煮テ一升半ヲ取リ。滓ヲ去リ分テ二服トシ温メテ一服ヲ進ム。若吐ヲ得レハ後服ヲ止ム

・論治

發汗吐下ノ後虚煩シテ眠ルコトヲ得ズ。若劇キ者ハ反覆顛倒シ心下懊懐スル者。此方主之。○汗ヲ發シ若ハコレヲ下シテ煩熱シ胸中空者主之。○大ロニ下シ

テ後身熱去ス心中結痛スル者亦主之。○

陽明病脉浮ニシテ緊咽燥キ口苦ク腹滿テ

喘シ發熱汗出テ惡寒セス反テ惡熱シ身

重ク若汗ヲ發スレハ則燥キ心憤々シテ反

テ讞語ス。若燒鍼ヲ加フレハ必怵惕躁シ

テ眠ルヲ得ズ。若コレヲ下セバ則胃中空

虚シ客氣膈ニ動シ心中懊懐シテ舌上胎

ヲナス者主之。○陽明病ヲ下シ外熱シ手

足温ニシテ結胸セス心中懊懐。饑テ食ス

ルヲ不能。但頭汗出ル者主之。○下利ノ後

更ニ煩シ心下按シテ濡ナル者ハ虚煩トス

此方主之

夏 ○梔子甘草豉湯 此方ハ梔子豉湯ノ症

ニシテ急迫^{キウハク}シ或ハ少氣ナル者主^{ユル}之ヲ

施子豉湯ノ方中ニ甘草二兩ヲ加フ

夏 ○施子生薑豉湯 此方ハ施子豉湯ノ症

ニシテ嘔スル者主^{ユル}之ヲ

施子豉湯ノ方中ニ生薑五兩ヲ加フ

夏 ○瓜蒂散 此方ハ温々トシテ吐セントス

ル者主^{ユル}之ヲ

瓜蒂 赤小豆 各等分

右二味各別ニ搗フルヒ散ト為シテ合テ一

錢七ヲ取り香豉一合ヲ以テ熱湯七合

ヲ用ヒ煮テ稀糜トナシ滓ヲ去リ汁ヲ

取り散ニ和シ温メテ頓ニ服ス若不吐者

ハ少々々加ヘ快ク吐ヲ得ルハ乃止ム諸ヒ

血或ハ虚家ノ者ニハ決シテ此ヲ與フベカラ

ス

論治 宿食上皖ニアル者コレヲ吐スベシ

此方主^{ユル}之ヲ

○下劑

夏 ○大承氣湯 此方ハ腹堅滿^{ハツクミ}或ハ下利

臭穢^{シウタイ}或ハ燥屎^{サウシ}アル者主^{ユル}之ヲ

大黃^{四兩} 厚朴^{半斤} 枳實^{五枚}

芒消^{三合}

右四味水一斗ヲ以テ先厚朴枳實ヲ煮

テ五升ヲ取り滓ヲ去リ大黃ヲ入レ煮テ二

升ヲ取り芒消ヲ入レ更ニ火ニカケ一兩沸

シテ滓ヲ去分温メテ再服ス若下利ヲ得レバ
後服スルヲ勿レ

・論治 陽明病潮熱シテ大便鞭キ者ハ

此湯ヲ與フベシ若鞭カラザル者ハ與フベカラ

ズ若大便不通一六七日恐クハ燥屎アラ

シ是ヲ知ラント欲セバ少シク小承氣湯ヲ

與ヘ即チ轉矢氣スル者ハ此燥屎アリ此

ヲ攻ベシ轉矢氣セザル者此但初頭鞭ク

後必瀉シコレヲ攻ベカラス○傷寒若ハ吐シ

若ハ下シテ後解セズ大便セザル一五六日

ヨリ十餘日一至リ日晡所ニ潮熱ヲ發シ惡

寒セズ獨語鬼狀ヲ見ルガ如ク劇キ時ハ

則人ヲ知ラズ或ハ衣ヲ循牀ヲ摸リ惕ト

シテ安カラズ微喘シテ直視シ其脈弦ナル者ハ生ク濇ナル者

ス但發熱譫語スル者ハ此方王レ之若一

服ニシテ下利セハ後服ヲ止ム○陽明病譫語

潮熱アツテ反ツテ食スル一不能者ハ燥屎ア

リ若能食スル者ハ但大便鞭一此湯ニテ

是ヲ下スベシ○汗出テ譫語スル者ハ燥屎ア

リ是ヲ下スベシ此方王レ之○潮熱ヲ發シ手

足藪々トシテ汗出テ大便鞭シテ譫語

スル者コレヲ下セバ則愈王レ之○陽明病

ヲ下シテ心下懊懣シテ煩シ胃中燥屎ア

ル者ハ攻ベシ腹スコレ滿大便初ハ鞭久後

必瀉シ是ヲ攻ベカラス若燥屎アル者ハ王レ之

○大ヒニ下シテ後六七日大便セズ煩シテ

陽明病

解セス腹滿痛ムモノハ必是燥屎アリ此湯
主之○病人小便利セズ大便乍チ難シ
乍チ易シ時々微熱アリ喘冒シテ卧スコ
ト不能者ハ燥屎アルナリ主之○目中了々
タラス睛和セス大便難ク身ニ微熱アル者
此ヲ實トス主之○發汗シテ解セス腹滿
痛ムモノ主之○少陰病口燥キ咽乾ク
者ハ急ニ是ヲ下スベシ主之○腹脹大便
セザル者急ニ主之○下利シテ脉平心下鞭
キ者急ニ主之○下利シテ食ヲ不欲モ
ノハ宿食アル故ナリ是ヲ下スベシ宿食其
脉浮ニ
シテ大此ヲ按セハ反テシテ大此ヲ按セハ反テ○腹中滿痛ム者此
ヲ實トス下スベシ主之

○小承氣湯 此方ハ腹滿テ大便鞭キ
者主之

大黃四兩 厚朴二兩 枳實三枚

右三味水四升ヲ以テ煮テ一升ニ合ヲ取り
滓ヲ去リ分温メテ二服ス若カク更イ衣スル者
ハ此ヲ服スルヲ勿レ

・論治 傷寒大便セザル一六七日頭痛
シ熱アル者此湯主之○手足濇然トシテ
汗出ル者ハ此大便已ニ鞭ク大承氣湯主
之若汗多ク微シ發熱惡寒スル者其熱潮
セズンバ此湯ヲ與フベカラズ若腹大滿シテ
大便不通者ハ此湯ヲ與ヘテ微ク胃ノ氣ヲ
和スベシ○陽明病潮熱シ大便鞭キモノハ

大承氣湯ヲ與フベシ或ハ大便セザルコト六七
 日恐クハ是燥屎アラシク此ヲ知ント欲セハ少ク
 小承氣湯ヲ與ヘ即轉矢氣スル者ハ此必
 燥屎アリ此ヲ攻ベシ轉矢氣セザル者ハ此
 タ初頭鞭ク後必澹シ是ヲ攻ベカラズ若
 攻レハ必脹滿シテ食スルコト不能或ハ水
 ヲ飲ント欲シテ水ヲ與レハ則噦ス其後却
 テ發熱スル者ハ必大便亦鞭ク此湯ヲ與ヘ
 テコレヲ和スベシ轉矢氣セザル者ハ慎テ
 攻ベカラズ○大便鞭キハ多ハ讞語ス此湯
 主之若一服ニシテ讞語止ハ後服スル
 勿レ○陽明病讞語シ潮熱ヲ發レ脉滑
 ナルモノハ此湯主之既ニ一升ヲ與ヘテ轉

矢氣スル者ハ更ニ一升ヲ服ス若轉矢氣セ
 ガル者ハ此ヲ與フルコト勿レ○大陽病若ハ吐
 シ若ハ下シ若ハ汗ヲ發シ微煩シ小便數
 大便鞭キ者主之○下利讞語スル者ハ燥
 屎アルナリ主之○大便不通シテ噦シ數
 讞語スル者主之○其他食傷腹滿硬痛或
 ハ痢疾熱忒テ後裏急後重止サルモノ亦
 主之

夏

○調胃承氣湯 此方ハ大黃甘草湯ノ症
 ニシテ實スル者主之

大黃 四兩 甘草 二兩 芒消 半斤
 右三味咬咀シ水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取リ
 滓ヲ去リ芒消ヲ入更ニ火ニカケ微シ沸シ少

少温メテ之ヲ服ス

・論治 太陽病三日汗ヲ發シテ猶解セズ。蒸々ト發熱スル者此方主之。○汗ヲ發メ後惡寒スル者ハ虚スル故一リ惡寒セズ便熱スル者ハ實ナリ當ニ胃ノ氣ヲ和スヘシ主之。○心下温々トシテ吐セン欲シテ胸中痛シ大便反ツテ澹シ腹微シ滿テ鬱々ト微煩スル者亦主之。○陽明病吐セズ下ラズ心煩スル者主之。○吐シテ後腹脹滿スルモノ主之。○大便不通胃ノ氣不和者主之。

○桃核承氣湯 此方ハ血證ヲ見シ或ハ少腹急結シテ上衝スル者主之。

桃仁五十個 大黄四兩 桂枝

芒消各二兩 甘草

右五味水七升ヲ以テ煮テ二升半ヲ取り滓ヲ去リ芒消ヲ入更ニ火ニカケ微シ沸シ食時ニ先ツテ五合ヲ温服ス

・論治 太陽病解セス熱膀胱ニ結ル其

人狂ノ如ク血自下下ル者ハ愈其外解セザル者尚攻ベカラス先桂枝湯ノ類ニテ外ヲ解スベシ外解シ已テ但少腹急結スル者ハ乃攻ベシ此方主之。○其他吐血衄血婦人瘀血少腹堅シテ痛シ或ハ産後瘀血下ラズシテ腹大ニ痛ム者モ亦主之。

○大柴胡湯 此方ハ小柴胡湯ノ症ニシ

テ心下痞鞭ツカヘカクセズ腹滿拘攣ツカヘカクシ或ハ嘔スル者主之ラ

柴胡斤半 黃芩 芍藥各二兩

半夏升半 生薑兩五 枳實枚四

大棗十二枚

右七味水一斗二升ヲ以テ煮テ六升ヲ取リ滓ヲ去リ再ヒ煎シテ一升ツ温服ス一方ニ大黃二兩ヲ加フ若然ラザレバ大柴胡湯ノ功ヲ見ガタシ

●論治 太陽病過經十餘日反テ二三

此ヲ下シテ後四五日柴胡ノ證猶在者ハ

先小柴胡湯ヲ與ヘ嘔イキ止ズ心下急ニ

鬱ツクトシテ微煩スル者ハ是未ダ解セザル

ナリ此方主之ラ○熱結シテ裏ニアリ復テ寒

熱往來スル者主之ラ○發熱汗出テ解セズ

心下痞鞭嘔吐シテ下利スル者主之ラ按ズルニ下利或

不利ノ誤 ○心下按シテ滿痛ム者此ヲ實トス

當ニ下スベシ此湯主之ラ○其他瘧熱大便不

通痢疾熱多ク裏急後重止ズ或ハ積氣腹

痛ノ類ヒ亦主之ラ

頁 ○大黃牡丹皮湯 此方ハ臍下堅塊アツ

テ是ヲ按ハ即痛ム及ヒ膿血ヲ便スル者

主之ラ

大黃兩四 牡丹皮兩一 桃仁五十個

瓜子半斤 芒消三合

右五味水六升ヲ以テ煮テ一升ヲ取リ滓ヲ

太り込消ヲ入再ヒ煎シテ頓ニ服ス

・論治 腸癰ハ少腹腫疼コレヲ按ハ即痛

ム淋ノ如クナレ凡小便自ラ調ヒ時々發熱

シ自汗出テ又惡寒ス其脉遲緊ナル者ハ

膿未ダ成サズ此ヲ下スベシ此湯主之

夏三

○大黃甘遂湯 此方ハ少腹滿テ敦狀ノ

如ク小便微シク難シ或ハ月水不調者主

大黃^{四兩} 甘遂 阿膠^{各二兩}

右三味水三升ヲ以テ一升ヲ取り滓ヲ去

頓ニ服スレバ其血自ラ下ルベシ

夏四

○大黃消石湯 此方ハ黃ヲ發シテ腹中

大黃 黃蘗 消石^{各四兩}

梔子^{十五枚}

右四味水六升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り

滓ヲ去リ消石ヲ入更ニ煮テ一升ヲ取り

頓ニ服ス

・論治 黃疸腹滿テ小便利セスシテ赤

ク自汗出ツコレ表和シテ裏實トス是ヲ下

スベシ此方主之

夏五

○大黃甘草湯 此方ハ大便秘閉シテ急

大黃^{四兩} 甘草^{一兩}

右二味水三升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ再服ス

論治 食已テ即吐スル者此熱ノ此方 爲スル者爲スル者 此方
主之主之

夏 ○大陷胸湯 此方ハ結胸結胸シ或ハ心下ヨリ
少腹ニ至テカタクミツル 鞭滿スル者主之主之

大黃 六兩 芒消 一分 甘遂 一分

右三味水六升ヲ以テ先大黃ヲ煮テ二
升ヲ取り滓ヲ去リ芒消ヲ入レ煮ル一兩
沸シテ甘遂ノ末ヲ入レ下升ツ温服ス若快
得レバ後服利ヲ
ヲ止ムベシ

論治 膈内拒痛胃中空虛容氣膈

ニ動シ短氣躁煩イキリキキカシシ心中懊懐陽氣内ニ階リ

心下因テ鞭ケレバ則結胸トス此湯主之○

傷寒六七日結胸熱實脈沉ニシテ緊心下

痛此ヲ按テ石鞭ナル者主之○太陽病

重テ汗ヲ發シテ復コレヲ下シ大便セザル

コト五六日舌上燥シテ渴シ日晡所少潮

熱アリ心下ヨリ少腹ニ至リ鞭滿シテ痛近

ツクヘカラザル者主之○心下滿テ鞭ク痛

ム者主之主之

夏 ○大陷胸丸 此方ハ結胸結胸シ若ハ項背強

ル者主之主之

大黃 葶藶 各半 芒消

杏仁 各半

右四味二味ヲ搗篩ヒ杏仁芒消ヲ入レ合
セ研テ脂ノ如クニシテ散ニ和シ彈丸ノ大ナ
ニシテ別ニ甘遂ノ末一錢七ヲツキ白蜜ニ

合水二升ヲ以テ煮テ一升ヲ取り分温メテ頓ニ服ス一宿シテ乃下ル若下ラズンバ更ニ服スベシ下ルヲ取テ効トス
・論治 結胸ハ項モ亦強シ柔瘕ノ狀ノ如シ是ヲ下セバ則和ス此方主之

夏

○小陷胸湯 此方ハ小結胸ノ者主之

黃連 一兩

栝蔞實 大者一個

半夏 半升

右三味水六升ヲ以テ先栝蔞ヲ煮テ三分ヲ取り滓ヲ去リ分温メテ三服ス大陷胸湯ハ熱實ヲ治シ大陷胸丸ハ喘ヲ兼又小陷胸湯ハ痞ヲ治スルナリ

・論治 小結胸ノ病ハ心下ニアリ是ヲ按ハ則痛ク脈浮滑ナル者此湯主之○其他痰飲盛ニシテ熱邪心下聚ル者亦主之

夏

○橘皮大黃朴消湯 此方ハ心胸ノ間ニ宿滯有テ結スル者主之

橘皮 一兩

大黃

朴消 各二兩

右三味水一斗升ヲ以テ煮テ小升ニ至リ頓ニ服ス

・論治 膾ヲ食シテ心胸ノ間ニ在テ化セズ吐セザレバ速ニコレヲ下スベシ久シケレバ癥病ヲ成ス此方主之

夏

○厚朴三物湯 此方ハ小承氣湯ノ症ニシテ腹滿ノ甚キ者主之

厚朴 八兩

大黃 四兩

枳實 五枚

右三味水一斗二升ヲ以テ先厚朴枳實ヲ煮テ五升ヲ取り大黃ヲ入レ煮テ三升

ヲ取り一升ヲ温服ス

・論治 痛テ閉ル者主之

○厚朴七物湯 此方ハ腹滿テ發熱或ハ

上衝シテ嘔スル者主之

厚朴 半斤 枳實 五枚 大黃

甘草 各三兩 桂枝 二兩 生薑 五兩

大棗 十枚

右七味水一斗ヲ以テ煮テ四升ヲ取り八

合々温服ス 加減法 嘔スルニハ半夏五合

ヲ加フ・下利スルニハ大黃ヲ去ル・寒

多キニハ生薑ヲ加フ

・論治 腹滿發熱スル一十日脉浮ニシ

テ數ク飲食ツ子ノ如キ者此方主之

夏

○梔子厚朴湯 此方ハ胸腹煩滿スルモノ

主之 梔子 十四枚 厚朴 四兩 枳實 四枚

右三味水三升半ヲ以テ煮テ一升半ヲ

取り滓ヲ去リ分温メテ三服ス 若吐ヲ得

止ム

夏

湯ノ症ニシテ閉ル者主之

梔子 十二枚 大黃 一兩 枳實 五枚

豉 一升

右四味水六升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ三服ス

・論治 酒黃疸心下懊憹レ或ハ熟痛

スル者此方主之ヲ

〇枳實梔子豉湯 此方ハ梔子豉湯ノ症ニシテ胸滿ル者主之ヲ

枳實三枚 梔子十四枚 豉一升

右三味清漿水七升ヲ以テ空ク煮テ四升

ヲ取り枳實梔子ヲ入レ煮テ二升ヲ取り豉

ヲ下シ更ニ煮ル一五六沸シテ滓ヲ去リ

分温メテ再服ス 衣被ヲ覆フテ微汗シテ愈ユ

・論治 大病差テ後勞復スル者此方主

之若宿食アル者ハ大黃博碁子ノ大サニ

シテ五六枚ヲ加フベシ

〇枳實芍藥散 此方ハ腹滿拘攣シ或

ハ痛ム者主之ヲ

枳實 芍藥各等分

右二味杵テ散ト為シ方寸匕ヲ服スルコト

日ニ三度

・論治 産後腹痛煩滿シテ卧ルヲ得

ガル者此方主之〇産後ノ腹痛ニ此方ヲ

與フベシ若愈ガル者ハ此腹中ニ乾血有テ

臍下ニ着トス宜ク下瘀血湯ヲ主トルベシ

亦經水利セザルモ主之

〇枳朮湯 此方ハ心下堅滿シテ小便不

利者主之ヲ

枳實七枚 白朮二兩

右二味水五升ヲ以テ煮テ三升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ三服ス

●論治 心下堅大ニシテ邊旋盤ノ如キハ
水飲ノ作所ナリ此方主之

○下瘀血湯 此方ハ臍下毒痛シ或ハ經
水利セザル者主之

大黃 二兩 桃仁 二十個 蟅蟲 二十枚

右三味細末シ蜜ニテ煉和シテ四九トス酒
一升ヲ以テ一丸ヲ煎シテ八合ヲ取り頓ニ

服ス○蟅蟲ハ沙中及ヒ人家墻壁ノ下ニ中濕所ニ生シテ形鼠婦ニ似テ大ナル者寸餘形扁ニテ驚ノ努故ニ驚多

●論治 産後ノ腹痛ハ當ニ積實芍藥散

ヲ以テスベシ若不愈者ハ此腹中ニ瘀血有
テ臍下ニ着トス此方主之亦經水利

モ主之

○土瓜根散 此方ハ少腹拘急シ經水

利セス或ハ白物ヲ下ス者主之

土瓜根 芍藥 桂枝

蟅蟲 各三分

右四味杵テ散トナシ酒ヲ以テ方寸匕ヲ
服ス日ニ三度

●論治 帶下經水利セザレバ少腹滿痛

ム或ハ經一月ニ再ヒ来ル者此方主之

○抵當湯 此方ハ瘀血アル者主之

水蛭 三十個 蟅蟲 二十個 或人ノ曰モ蟅蟲ヲ
クレンラフ 鹿杖ニ易ヘ用テ可ナリ

桃仁 二十個 大黃 三兩

右四味末ト為シ水五升ヲ以テ煮テ三升
ヲ取り滓ヲ去リ一升ヲ温服ス

●論治 太陽病身黃脉沉結ニシテ少腹

百

鞭ク小便利セザル者ハ血ナシトス小便自利
 ス其人狂ノ如キ者ハ血證詳ナリ此方主之
 ○陽明ノ證其人ヨク恐ル者ハ必畜血アリ
 屎鞭ト雖モ大便反テ易ク其色必黒キ
 者主之○婦人經水利下セザル者主之○
 男子膀胱滿急リ瘀血アル者主之

○抵當丸 此方モ瘀血アル者主之 其病急ナ

ルハ湯ヲ用ユ緩ナルハ丸ヲ用ユ凡瘀血アルモノ
 ニ症アリハ乃少腹鞭ク滿小便快ク利スハ乃腹
 滿タズ其人我滿
 ルト云フアリ

水蛭 二十個 蟅虫 二十個 桃仁 二十個

大黃 三兩

右四味杵分テ四九トナシ水一升ヲ以テ
 一丸ヲ煮テ七合ヲ取リ是ヲ服ス 晷時ニ

百

下血スベシ若不下者ハ更ニ服ス

○走馬湯 此方ハ胸腹ニ毒アリ或ハ心痛
 或ハ腹痛スル者主之

巴豆 杏仁 各二枚

右二味綿ヲ以テ纏ヒ槌ニテ碎キ熱湯ニ
 合ニ白汁ヲ絞リ取りコレヲ飲當ニ下ルベシ
 老人或ハ小兒見合テ用ユベシ

・論治 中惡心痛之腹脹大便不通者

此方主之○飛尸鬼擊ノ病ヲ通治ス 飛尸
 鬼擊ハ俗ニ云天狗ニツカニレ怪物ニ出テ七氣
 ヲウシテ顛狂スルノタグヒナリ

○大猪膽汁方 此方ハ肛中乾燥シテ大
 便澁ル者主之

大猪膽 一枚

右汁ヲ瀉醋少シ和シテ穀道ノ中ニツグ一
食頃ハカリシテ大便出ベシ

・論治 陽明病自汗出テ若發汗シテ

小便自利スル者ハ津液ウチニ竭ルトスハホヒ 鞭

ト雖モ攻ベカラス當ニ自ラ大便セント欲ス

ルヲ須ベシニツ 蜜煎導ヲニテ是ヲ通ズルニ宜シ

若ハ土瓜根及ヒ大猪膽汁ト皆導ヲ為ベシ

導ハ導引スルナリ葉ヲ
以テ外ヨリ治スルヲ云フ

○蜜煎導 此方モ肛中乾燥シテ大便澁

ル者王^レ之^ヲ

蜜七合

右下味銅器ノ中ニ入ニルキ 微火ニテ煎シ稍コツ

テ飴ノ狀ニ似タリ是ヲ攪必魚看シムル

コト勿レ丸セント欲セバ手ヲ併ヒ子ツテト

ナシ頭ヲ銳シメ大サ指ノ長サノ如クニ寸ガカリ

ニシ熱キ時ニ急ニ為スベシ冷レハ則鞭シ以テ

穀道中ニ入手ヲ以テ急ニ拘ヘ大便セントス

ル時ニ乃コレヲ舂ル

○麻仁丸 此方ハ平日大便秘結スルモノ

王^レ之^ヲ

麻子仁ニ升 芍藥半升 枳實

大黃各一升 厚朴一尺 杏仁一升

右六味細末シ煉蜜ニ和シテ梧子ノ大サニ

丸シ十丸ヲ飲服スルヲ日ニ三度

○已椒蘆黃丸 此方ハ腹滿一 舌乾燥

シニ便澀滯スル者王^レ之^ヲ

防己 椒目 葶藶

大黃 各一兩

右四味細末之蜜ニテ梧子ノ大サニ丸ジ食ニ先テ一丸ヲ飲服スルヲ日ニ三度

・論治 腹満口舌乾燥スルハ腸間ニ水

氣アルナリ此方主之

三頁

○十棗湯 此方ハ病胸腹ニ在テ擊痛スル者主之

芫花 甘遂 大戟 各等分

大棗 十枚

右三味等分各別ニ搗散トナシ水一升半ヲ以テ先大棗ノ肥ナル者一枚ヲ煮テ八合ヲ取り滓ヲ去リ藥末ヲ入強人ハ一錢

ヒヲ服レ蓋人ハ半錢ヲ服ス何レモ温服ス

・論治 太陽ノ中風下利嘔逆シテ表解スル者ハ乃是ヲ攻ベシ其人熱々トシテ汗出

テ發作時アリ頭痛心下痞シ鞭滿シテ脇

下ニ引痛シ乾嘔短氣汗出テ惡寒セザル者

ハ此方主之○懸飲ノ者主之○欬家其

脉弦ナルハ水氣アリトス主之○支飲有テ

欬煩シ胸中痛者卒ニ死セザレバ十日或

ハ一歳ニ至ル此方ニ宜シ

三頁

○排膿散 此方ハ瘡家胸腹拘滿シ若ハ粘痰ヲ吐シ或ハ膿血ヲ便スル者主之

枳實 十六枚 芍藥 六分 桔梗 二分

右三味杵テ散ト為シ雞子黃一枚ヲ取り

藥散ヲ以テ相和シテ白散ニテ服ス

頁

○桂枝茯苓丸 此方ハ拘攣シテ上衝シ

心下悸シ或ハ經水變アリ又ハ胎動クモノ
主之ヲ

桂枝 茯苓 牡丹

桃仁 芍藥各等分

右五味細末シ煉蜜ニ和シ兔屎ト大サニ

丸シテ毎日食前ニ一丸ヲ服ス若知ズンバ

加テ三九ニ至ル

●論治 婦人宿ヨリ癥瘕アツテ經タヘ

未三月ニ及スレテ漏下止ザルヲ得胎動

レテ臍上ニ有者ハ此ヲ癥瘕ノ害ストス

此方主之○妊娠六月ニシテ動スル者ハ

前ノ三月經水利スル時ノ胎ナリ血下ル者ハ

後断テ三月ハ衄ナリ血止ザル所以ハ蓋シ其

癥不レ去故ナリ當ニ其癥ヲ下スベシ此方主

之ヲ

竟

○桂枝加芍藥大薑湯 此方ハ桂枝加

芍藥湯ノ症ニシテ停滯アル者主之ヲ

桂枝加芍藥湯ノ方中ニ大黃一兩

ヲ加フ

●論治 モト太陽病醫誤テ之ヲ下シ

因テ腹滿時々痛ム者ハ桂枝加芍藥湯

主之大ヒニ實痛スル者ハ此湯主之ヲ

章

○葵子茯苓散 此方ハ小便不利シテ心

下悸腫滿スル者主之ヲ

五の長 經 通

申 八二〇

葵子即冬葵子ナリ 茯苓各三兩

右二味杵テ散トス方寸匕ヲ飲服スル
1. 日二三度小便利スレバ則愈

・論治 妊娠水氣アリテ身重ク小便利

セズ灑淅惡寒シ起レハ即頭眩スルモノ此

方王^レ之^ヲ

三章

○苓甘薑味辛夏仁黃湯 此方ハ苓甘

薑味辛夏仁湯ノ症ニシテ腹中微結アル

者王^レ之^ヲ

茯苓四兩 甘草三兩 乾薑

細辛 大黃各三兩 五味子

半夏 杏仁各半升
右八味水一斗ヲ以テ煮テ三升ヲ取り

滓ヲ去リ半升ヲ温服ス

・論治 若面熱シテ醉ルガ如キハ胃熱上

衝シテ其面ヲ薰ストス大黃ヲ加ヘ以テ此

ヲ利ス

三章
十二

○五苓散 此方ハ小便利セス或ハ渴シテ

水ヲ飲ント欲シ飲ハ則吐スル者王^レ之^ヲ

猪苓十八銖 澤瀉一兩六銖半 茯苓十八銖

桂枝半兩 白朮十八銖

右五味細末シ白飲ヲ以テ方寸匕ヲ服ス

ル1日二三度

・論治 脉浮ニシテ小便利セス微熱消渴

スル者此方王^レ之^ヲ ○汗ヲ發シテ脉浮數煩渴

スル者モ王^レ之^ヲ ○傷寒汗出テ渴スル者モ王

〇發熱六七日解せずシテ煩シ渴シテ水
 ヲ飲ト欲シ飲ハ則吐スル者ハ名ヅケテ水逆
 ト云フ王^レ之^レ〇病陽ヲレバ汗シテ解スベシ
 反ツテ冷水ヲ以テ喫シ若ハ是ヲ灌ギ其熱
 ニ却サレテ太ルヲ得ズシテ益煩シ肉上
 粟ノ如ク起リタゞ水ヲ飲ント欲シテ反テ
 渴セザル者ハ文蛤散ヲ服シテモシ差サレバ
 此方王^レ之^レ〇小便數キ者ハ大便必鞭シ更
 衣セサルヲ十日苦ム所ナク渴シテ水ヲ飲
 ント欲セバ少々此ヲ與ヘ其法ヲ以テ救フ
 ベシ渴スル者ハ王^レ之^レ〇霍亂頭痛發熱身
 疼痛シ熱多クシテ水ヲ飲ント欲スル者王
 之^レ寒多クシテ水ヲ飲ザル者
 〇假ヘバ瘦人臍

下悸アリ涎沫ヲ吐シテ顛眩スルハ此水飲ナ
 リ此方王^レ之^レ〇消渴小便反ツテ多ク飲フ
 一斗ナレバ小便モ亦一斗ナルハ腎氣凡ヲ
 主ドル脉浮小便利セズ微熱消渴スル者ハ
 宜ク小便ヲ利シ汗ヲ發スヘシ此方王^レ之^レ
 〇モト此ヲ下スヲ以テノ故ニ心下痞スルニハ
 瀉心湯ヲ與ヘ痞解セズ其人渴シテ口燥
 煩シ小便利セザル者王^レ之^レ

三十三
 〇茵陳五苓散 此方ハ五苓散ノ症ニシ
 テ黄ヲ發スル者王^レ之^レ

茵陳蒿末 五苓散
 十分

三十四
 石ニ物ヲ和シテ食ニ先ツテ方寸七ヲ飲服ス
 〇猪苓湯 此方ハ小便利セス或ハ淋瀝或

小便血或ハ渴シテ水ヲ飲ント欲スルモノ
主之ヲ

猪苓 茯苓 阿膠

滑石 澤瀉各一兩

右五味水四升ヲ以テ先四味ヲ煮テニ
升ヲ取り滓ヲ去リ阿膠ヲ入レ烱消シテ
七合ツ温服ス

・論治 脉浮發熱渴シテ水ヲ飲ト欲シ
小便利セザル者此方主之○陽明病汗出
ルト多クシテ渴スル者ハ此湯ヲ與フベカラ
ズ汗多キヲ以テ胃中燥ク此湯ハ亦其
小便ヲ利スル故ナリ○少陰病下利六七
日效シテ嘔シ渴シ心煩シテ眠ルト得

ザル者ハ主之

○牡蠣澤瀉散 此方ハ身體浮腫シテ腹
中ニ動氣アツテ渴シテ小便利セザルモノ
主之ヲ

牡蠣 澤瀉 枯蘘根

蜀漆 葶藶 商陸根

海藻各等分

右七味各搗篩ルト散トナシ更ニ臼中ニ入是
ヲ治メ白飲ニテ方寸七ヲ和服ス

・論治 大病差テ後腰ヨリ已下ニ水氣
アル者此方主之ヲ

○柴胡加芒消湯 此方ハ小柴胡湯ノ症
ニシテ苦滿解シ難キ者主之ヲ

七百

小柴胡湯方中ニ区消六兩ヲ加フ

○甘遂半夏湯 此方ハ芍藥甘草湯ノ

症ニシテ心下鞅ク滿ル者主之

甘遂三枚 半夏十二枚 芍藥五枚

甘草指ノ大者一枚

右四味水二升ヲ以テ煮テ半升ヲ取り

滓ヲ去リ蜜半升ヲ以テ菜汁ヲ和シ煎

シテ八合ヲ取り頓ニ服ス

●論治 病者脈伏シ其人自利セント欲

ス利スレハ反テ快シ利スト雖モ心下堅滿

ナルハ此留飲去ント欲スルノ故ナリ此方主

之

七百

○厚朴大黃湯 此方ハ支飲胸ニ滿ル者

主之

厚朴一枚 大黃六兩 枳實四枚

右三味水五升ヲ以テ煮テ二升ヲ取り滓

ヲ去リ分温メテ再服ス

七百

○消礬散 此方ハ一身悉ク黄テ腹脹水

狀ノ如ク大便黒ク時ニ澹スル者主之

消石 礬石各等分

右二味散ト為シ大麥粥ノ汁ニ和シテ方

寸ヒヲ服スル日三度病大小便ニ隨テ

去ル小便正黄大便正黒コレ其候ヒナリ

●論治 黄家ハ日晡所發熱シテ反テ惡

寒ス膀胱急ニ少腹滿身盡ク黄額上

黒ク足下熱ス因テ黒疸トナル其腹脹水狀ノ如ク

大便必黑ク時ニ溏ス此女勞病トス水ニ腹アラザルナリ満ル者ハ治シ難シ此方主之

○礬石湯 此方ハ脚氣痿弱不仁シ或ハ上リ入テ心ニ搶ル者主之

礬石二兩

右一味漿水一斗五升ヲ以テ煎ズルコト

三五沸シ脚ヲ浸シテ良漿水ノ代ニ醋五分ニ水一斗ヲ合シ

テ煮テ礬石ヲ細未シテ入ルベシ

○桔梗白散 此方ハ病毒胸咽ニアリテ

或ハ吐下膿汁ノ如キ者主之

桔梗

貝母各三分 巴豆一分

右三味散ト為シ強人ハ半錢ヒヲ飲服ス

羸人ハ此ヲ減ズ病膈上ニ在ル者ハ膿血ヲ

吐ス膈下ニアル者ハ瀉出ス若下ル一多ク

シア止ズンバ冷水一杯ヲ飲ハ則定

・論治 欬シテ胸滿振ヒ寒ク脉數ニシテ

咽乾テ渴セス時ニ濁唾腥臭ヲ出シ久リ

シテ膿ノ米粥ノ如キ者ハ肺癰トスユノ方

主之

二百九

○備急圓 此方ハ心腹卒ニ痛ム者主之

大黃

乾薑

巴豆

各一分

右ノ藥各精新ニスベシ先大黃乾薑ヲ搗

テ末ト為シ巴豆ヲ研テ中ニ入レ合セ治メ

杵テ散トス蜜ニ和シ丸スルモ亦佳ナリ蜜

器ノ中ニ是ヲ貯ヘ氣ヲ歇シムルヲ勿レ

・論治 心腹モロク卒暴百病若ハ中

惡客忤心腹脹滿卒ニ痛テ錐ニテ刺ガ
 如ク氣急ニ口噤シ停尸卒死ノ者ヲ主ル
 煖水苦酒ヲ以テ大豆ノ大ニシテ三四
 丸ヲ服ス或ハ咽ニ下ラズンバ頭ヲ捧起シテ
 マグヘシ若差スンバ更ニニ丸ヲ與ヘ當ニ腹
 中鳴即吐下スベシ便差若コ噤セハ亦齒
 ヲ折テコレヲ灌ベシ此方最證ニ對スレバ誠ニ
 神驗アリ常ニ貯ヘ置ベシ
 若對セサレバ反テ大ヒニ
 害アリ宜ク審詳ニスベシ

天明七年丁未九月
 東都書林 前川六左衛門
 浪華書林 柳原喜兵衛
 傷寒譯通下卷終

積玉圃醫書藏版目錄

相列 天俊英校

醫宗金鑑 傷寒論部 全八冊
大清乾隆皇帝大醫院ノ諸医官ニ勅シテ天下ノ書ヲ
 アツテ纂定シ玉フトコロニテ魏晉ヨリノカタ成無己王叔
 和ホガマヤリ傳ルトコロヲ正シテ仲系全書ノ正本トス○金匱
 要畧部モ追日ニ翻列ス

漫遊禱記 獨嘯庵著 全一冊
先生ミヅカラ医術ヲ以テ四方ニ漫遊シ其經歷セシ地ニテ急
 症ラスクイ沈痾ヲクダキ汗吐下ノ三方ニテ捷効ヲイリシ
 ヲヲシルス并ニ医家ノ學問ノタスケニルベキ一又ハ婦女カドヲ
 シルス醫家ノ子ニシテ書ヲ以テ機ニ応スルノ標準ニ變ニ處ニル
 ノ考證トシシ五ハ其益大ナルベシ

吐方考 同人著 全一冊
吐方一切ノ口訣藥方ヲシルシ張子知カ説ハモトヨリ紅夷人ノ傳
 トコロマテ吐方ニヨリタル一ハハコトヨクアゲ論ス

癰瘡口訣 同人著 全一冊
濕毒治療ノ口訣ハ茯苓 輕粉ノ用マウ禁忌ノ食物溫泉
 灸治ホノ可カラ論シ彙中 祕方ヲ附録ス

古方便覽

六角重任筆記

全三冊

古方便東洞先生ノ口授ニシテ古方ヲアツタ各方ノ下ニ其方ヲ用ニキ病症ヲシルヌ又一圈ヲ加テシタシク捷効ヲトリタル經驗ヲシルヌ医家ハモトヨリ素人ニテモコノ書ヲミドレ忽チ療治ノ勳デキルヤウニ國字ヲカキトリタル療治本ナリ卷ニ未ニ腹候之圖ヲ附録ス

古方羽異

野間俊齊著

全五冊

コノ書ハ病症ヲ部類シテオソク療治ノ仕カタヲ片カタニテキコエヤスク書トル症ニアセテ仲系ヨリ王憲孫思邈マデノ古方ヲツケテスグニ医療ノナルヤウニシタル書ナリ

長沙證彙

田中榮信著

橫本一冊

仲系全書ノ傷寒ナニニ雜病ノ方ヲ病門ヲ以テ部分テ探ホスルニ便シラシム藥箋中ニ必用ノ書ナリ

傷寒方規

全一冊

三陽三陰ヨリニテ感冒溫疫ノ諸症ヲ治法形察古色病論ヲクワシクシルニ藥方ヲイロク分ニシテアツム

傷寒譯通

鈴木旭山著

全一冊

十四經	難經本義
大成論	本草序例
正傳或問	原病式
運氣論	局方發揮
外科精義	格致餘論

右ノ書世ニ類板アリト金印紙製造麻絲ニシテ善本ナラス某家ニ制スル處ハ別ニ七部摺ト号シテ極上紙ニテ仕タテニ素讀又ハ講席ニ推乃テ書入ヲナスニ勝手ヨクヌ

痘疹手引草

小本一冊

小兒科痘疹ノ療治ノ書受毒ノ源ヲ探リ傳變ノ効ヲ究メ応症ノ要方ヲ載セコレヲ古今名匠ノ經驗ヲアゲテ證ス片カナニテシルヌ

食療正要

松岡云達著

四冊

平生ノ食物水穀造醸ヨリシニ菜蔬栴菹禽介魚ニ至マテニ能氣味ヲ記ス並ニ合食禁救急妙藥ホラレルヌコノ書ヨリテ禁忌修養ヲセハスニシミアヤキ有リナシ

醫書療歌配劑

吉林見祐著

全三冊

諸病ノ療治ヲ和歌狂詩ニシテテニシテテノ語ニシテ記述シテヤウニヒラカナニテシル

景岳傳忠錄

明張介賓著

全五冊

十三科古方選註

清王晉三著

全三冊

導引秘傳抄

明徵相公傳來
按方法

小本一冊

日用食性大全

全冊

同平假名

食物食合セ又ハ病ヨリテ毒忌スキ品日用食物至能マテクハシクシル

産家達生編

兼葭堂主人校訂

全冊

清ノ西冷拙園先生ノ著述ニテ胎前臨産産後調護ノ法ヲアラハシ先賢ノ古方ニ種ニシテ奇効アリシ劑ヲミラミテシル

大同類聚方

右同人校訂
本朝上代ノ医書ナリ

全冊

右方規ノ書曰深切ニ編集シテ初考ノ医生ニハ科益アレドモ明医ノ説ニヨリタレバ治療ニ的切ナラスヨツテコノ書ハヒトヘニ金匱傷寒ノ二書目ヲ以テ據トレカテ益先生ノ説ヲ折中シテ片カナニテシルニ初考ノ人仲系全書ヲ解セスト魚コノ書ヲミハ傷寒ヒトホリハ大ガイ療治ノ出來レヤウニ迷タリ並ニ藥方ヲ彙ルニ和寒温江吐下ノ六經ヲモツテ區別シテ症ニヨツテ方ヲ施スニ便ナラシム

千金要方

清周岐來先生著

全冊

コノ先生ハ昔ニ享年中ニ吾日本長崎江清朝ヨリ客寓シテ治療ヲ施シタルヲ三年ナリソウチニ活人起瘵ノ効ヲトモノ無慮數千人ニ及アモツトモ奇効著明ナリニ医按ヲタチテ治術ノ考證トス因ニ本府吉野氏製薬人參三臟圖ハコノ先生ノ授ケ至ヒシ方ナリコノ事ヲ以テ其神醫ナルヲ知シ況フ書ハ目ヲカテ用ヒ至モノナルヤ

病名彙解

江南桂洲先生著

全冊

凡ソ病ノ名ヲシラスニハ治療ヲ施スキヤウニ改ニ医名者其名實ヲ詳ニセザンバ有ヘカラス仍テコノ書ハ諸病名ヲ以テ波分ニシテ以テ部ニ月瘧噎膈ナドヲ出シオノノ其下ニ病源ヲ論シニ病因ヲタシコトク古書ヲ引證シ最モ片カニ聞易ク弁ス医門ツニ収メオキテ病者診候ニ疑惑ヲトルナキ重寶ノ書ナリ

奇疾便覽

下津春抱子著

全五冊

ラ書ハ通例ノ医書ニ異ナル人面瘡心聲虫虱瘡尸頭カノ異疾奇疾ノ群書ニ見タレモノヲ鈔撮シテ國字ニテ記シ医按ニシテニ藥方ヲシルシ瘻ニアフテ敬篤ザレタメニ又医門平生ニ者讀マシテニロエオクキ書ナリ

東垣十書

元李東垣先生著

全三冊

脉訣

湯液本草

局方發揮

此事難知

脾胃論

蘭室秘藏

辨惑論

滌洞集

格致餘論

外科精義

近頃ヲ鏤板ラ某家ニ購求シテ校訂重脩シテスコシモ差謬アルナレ尤米快浩大ナルヲ厭玉フ諸君子ニ脾胃論弁惑論蘭室秘藏等ハ一品宛抽出シタル制本ヲシタカツテ價モ下直ニツケリ

醫家七部書

傷寒方規

此書ハ古方新方ヲ合シテ其未名國字四七音ニ分テ傷寒ノ療治見易タラシム

產家達生編

清ノ何拙田氏作ニテ産前後ノ經驗方ヲ出シ療治ノ秘ヲアラハス

其慎集

清朝ノ名医周南岐來先生長崎ニテ療治セシ医按奇方ヲアツム

痘疹手引草

痘瘡麻疹初中後療治ノ心得ヲ委クシ小兒科ヲ益アルトヲシルス

天明七年丁未九月

出雲寺文次郎

小川多左衛門

京師書林

山本長兵衛

林 權兵衛

田中市兵衛

江戸書林

前川六左衛門

大阪書林

柳原喜兵衛

北夕太郎町心斎橋筋

Handwritten text at the top right of the page.

Main body of handwritten text, including vertical columns and a central section with a red seal.



Handwritten text at the bottom right, including a signature and date.

Small vertical characters on the left side of the main text block.

Small vertical characters on the left side of the main text block.

