

70

75


80

85

90

95

門  
新 132  
卷 2



醫通纂要



參河 滕謙齋 纂要

清張璐玉先生著

平安 滕玄順 校正



傷寒

桂枝湯

太陽中風。頭痛頂強。發熱惡風。汗出

脈浮緩。或啞啞惡寒。浙浙惡風。翕翕發熱。鼻

鳴乾嘔

桂枝三錢芍藥三錢甘草二錢生薑五片大棗四枚

右五味。水煎溫服。啜熱稀粥一盞。覆煖取微

汗。若不解。加羌活藁本

小青龍湯

心下有水氣。乾嘔發熱。喘或咳。或

噎。或渴。或小便不利。小腹滿者。主之。○脈浮

緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。主之。

桂枝湯。去薑。加麻黃三錢。半夏二錢。乾

姜細辛五味子。各半錢

灸甘艸湯

治傷寒脈結代。心動悸

桂枝湯。去芍藥。倍甘草。加人參二錢。生地

三錢。麥門冬二錢。麻子仁一錢。阿膠二錢。

60

65

70

75

80

85

90

95

麻黃湯 大陽傷寒。頭痛頂強。惡寒發熱。身疼。腰痛。嘔逆。脈浮緊。無汗。而喘。

麻黃三錢 桂枝三錢 甘草五錢 杏仁二十枚

大青龍湯 治營衛俱傷。脈浮緊。汗不得出。而煩躁。

麻黃六錢 桂枝二錢 甘草一錢 杏仁十四枚 石膏五錢 生姜三片 大棗五枚

五苓散 治傷寒。表裏未解。渴而小便不利。

白朮 茯苓 猪苓各二錢 澤瀉三錢 桂一錢

右五味為散。白飲和服。方寸匕。日三服。或生料煎服。溫覆取微似汗。○邪犯太陽本。而小便不利。飲水即吐之。

桃核承氣湯 治熱結膀胱。其人如狂。或下血者。此寒傷營之犯本也。

小養氣湯。去厚朴。枳實。加芒硝。甘草。桃仁。桂枝。

桂枝加葛根湯 陽明之經證。身熱目疼。鼻乾。不得臥。頭痛自汗。而脈長。

桂枝湯。加葛根二錢。

有食。必作脹悶。更加橘皮。半夏。枳實。厚朴。○若自利者。葛根湯。嘔加半夏。

葛根湯 治太陽陽明合病。自利。或發熱。無汗。喘滿。不食。

麻黃湯。去杏仁。增桂枝。加葛根四錢。芍藥二錢。生姜三片。大棗三枚。

脈遲。必入陽明之府。其證日晡潮熱。手足熱。熱自汗。而脈滑。此屬胃實。俟其結定。用諸藥氣攻之。

小養氣湯 治少陽陽明存證。

大黃四錢 厚朴三錢 枳實三枚

右水煎  
調胃養氣湯 治太陽陽明存證。

小養氣湯。去厚朴。枳實。加芒硝三合。甘草二錢。

大養氣湯 治少陽陽明存證。  
小養氣湯。倍用厚朴半兩。枳實五枚。加芒硝三合。

小柴胡湯 治少陽證。頭痛目眩。耳聾口苦。脈

弦脇痛寒熱往來

柴胡三錢 黃芩 人參 甘草各一錢 半夏二錢

生姜五片 大棗四枚

右水煎去滓溫服

大柴胡湯 少陽寒熱往來六七日。至十餘日。

大便不行。腋下汗出。宜微利之。

小柴胡湯。去人參。甘草。加芍藥。枳實。各一

錢。大黃二錢。

小建中湯 太陰則腹滿噎乾。下利。而脈沉細。

桂枝湯。倍芍藥。加膠胎三錢。

桂枝加芍藥湯 因誤下。陽邪內陷。而痛者。

桂枝湯。加芍藥三錢。甚者。加大黃。

理中湯 直中太陰。胸膈滿。手足寒。臍上痛。下

利清穀。而不渴。必因內傷冷物所致也。太陰

者有內寒。無外感。

乾姜半錢至一錢 人參一錢至二錢 白朮一錢至二錢 甘草半錢至一錢

右四味。水煎去滓。溫服。甚。則加附子。下利

不已。宜四逆湯。

四逆散 少陰。必口燥舌乾而渴。脈沉下利。邪

熱奔迫。手足微逆者。

甘草 枳實 柴胡 芍藥各半錢

為散。白飲服方寸匕。○腹中痛者。加附子一枚。

○下利清水。心下鞭痛。而譫語者。

大棗氣湯

○若元氣素虛。或汗過劇。陽虛。未傳成中者。

宜溫補

四逆湯 直中少陰。四肢厥冷。吐利而渴。渴不

能飲。惡寒倦臥。身體疼。當臍下。小腹痛。

附子一枚 乾姜二錢 甘草六錢

右三味。水煎。分溫服。再服。○加人參三錢。至

一兩。名四逆加人參湯。○四逆加人參湯。加

茯苓六錢。名茯苓四逆湯。○本方倍甘草。名

通脈四逆湯

附子湯 前症口中和。背惡寒者。

附子三錢 茯苓三錢 人參三錢 白朮四錢 芍藥三錢

右五味水煎

麻黃附子細辛湯 前症發熱脈沉者。

麻黃湯。去桂枝。杏仁。甘草。加附子一錢。細

辛半錢。

○直入少陰中風。但覺畏寒而不厥冷。自言

腹滿而按之則濡。大便秘。小便數。欲吐不吐。臥而欲起。恍惚多驚。心懸若饑。稍食則痞脹不寧。舌上灰黑。或淡紫帶青。脈來弦細。浮弱。其證頗似太陰。而實少陰中風。最難辨別。宜桂枝湯。加乾姜。下虛甚者。面赤戴陽。急用桂枝人參湯。加葱白。生附。陰結不大便。脹滿不能食者。四逆湯。下金液丹。

桂枝人參湯

理中湯。加桂枝四兩

當歸四逆湯

厥陰。手足厥冷。脈細欲絕。或下利。脈大而腸鳴者。并用

桂枝湯。去姜枣。加當歸三錢。細辛。通草。各一錢。

○若誤下而脈沉。厥逆自利。煩滿囊縮。

小養氣湯。○若脈浮緩。而囊不縮者。雖厥逆下利。必自愈。可與小劑桂枝湯。

○直中厥陰中風。嘔吐涎沫。頭痛。吳茱萸湯。加桂枝。○若腎氣素虛。則厥冷自利。少腹痛。四逆湯。加肉桂。厥陰但有中風。而無中寒。

吳茱萸湯

吳茱萸一升 人參三兩 生姜六兩 大棗十二枚

右水煎

○傷寒五六日。神昏不語。或睡中獨語。一二句。目赤唇焦。舌乾。不飲水。稀粥與之則嘔。不與則不思。六脈沉數而不洪大。心下不痞。腹中不滿。大小便如常。或傳至十日以來。形貌如醉人狀。虛見神昏。導赤瀉心湯主之。溫熱傳變。亦有此證。

導赤瀉心湯 治熱傳手少陰。神昏

黃連 黃芩 山梔 滑石 知母  
犀角 甘州 人參 麥門 茯神 各一匙  
生姜 三片 大棗 三枚

右加燈心為引。水煎熱服

● 發熱 傷寒發熱。多屬表證。故翁夕發熱。捫之烙手。當以脈之。浮緩浮緊。證之無汗。有汗。分風寒營衛。施治。若汗不得出。而煩躁者。營衛俱傷。陽邪內擾也。大青龍湯。○若尺中無力者。此本虛。小建中湯加減。

○凡服表藥三劑。汗不出。熱不止者死。然有

陽微不能作汗者。可用再造散。或黃耆建中湯。加附子。血虛加芎歸。此皆冬月發表藥也。若汗後惡寒脈弱。大便不結者。屬虛。宜溫補助陽為主。

再造散

治陽虛不能作汗。名無陽證。

黃耆 人參 桂枝 甘草各一 附子  
細辛各五分 羌活 防風 川芎各八分 煨姜五片  
右水煎。將成。加酒芍藥一撮。更煮三沸。去滓溫服。

○寒邪傳裏。而發熱。蒸々發熱。此即本身中。元氣為寒所鬱。不得泄。而化為火也。若裏證。具而表證未已者。大柴胡湯。表證既罷。而裏證已急者。三養氣湯。選用。

○三陰經寒證。太陰厥陰。俱不發熱。惟少陰病。有反發熱。脈沉者。此非傳經。乃直中少陰。而仍兼大陽。故能發熱。

○發熱而脈細小。或虛。足脛逆冷。而陽縮入腹者。為夾陰。

○發熱脈沉小。或短濇。而足冷。陽縮兼腹滿。或痛。為食鬱。雖夏月。不妨用姜桂。

○有食積發熱。則胸脇煩熱。熱則顛脹。復有瘀血發熱。則脇下。或少腹痛。不可拊。又有陰虛發熱。必夜熱晨涼。若瘡瘍初起發熱。必有痛處。並不可誤施汗劑。

○其脈陰陽俱虛。熱不止。大汗後身愈熱。下利煩躁。熱不止。下後。脈躁亂者。皆不可治。

●頭痛 三陽經各有部分。太陽頭痛。自腦後上。至顛頂。下有頂強。腰脊痛之異。陽明頭痛。上連目珠。痛在額前。兼鼻孔乾。下有身熱不眠之分。少陽頭痛。上至兩角。下有耳聾。脇痛之殊。

○三陰經。至頸而還。惟厥陰之脈。上顛。與督脈會。故有頭痛。上則顛頂。收引頭角。下有脈弦細。手足厥冷。此為在經。當歸四逆湯。若在裏。則乾嘔吐涎沫。吳茱萸湯。

○陽明熱蒸而頭痛。必小便赤而短數。調胃養氣湯。

○太陽脈沉。身熱頭痛。為夾陰。黃耆建中湯。若誤汗不差者。四逆湯。

○太陽證下之。頭痛未除。唇寒面青。指頭微

厥。復發熱者。為表邪內陷於陰分。雖頭痛發熱。不可用表藥。宜竹葉石膏湯。

○內傷火炎。新產血虛。皆有頭痛。但時痛時止。而無惱後痛者。蓋火炎則痛自兩角。血虛則痛連魚尾。以其自內達外。故必行少陽部分。是以頭痛。見兩角者。則有少陽風與虛火之別。若見額前者。亦有陽明與食積之殊。其見惱後者。必太陽外感無疑也。

●頭重 惡寒項強。不能舉。屬太陽。汗之則愈。

●項強 為太陽表熱。然項強几几如凍鳥縮頸。欲伸而不能自如者。此胃氣不得上升。乃邪將犯陽明之候。若汗出惡風者。桂枝加葛根湯。無汗惡風者。葛根湯。

○項強連脇下滿。身熱惡風。手足溫而渴者。為邪于少陽。小柴胡湯。乃知項強多兼陽明少陽。不可執認太陽。

○項強。又有結胸證。此裏實證。●惡風 見風則怯。密室之中。則不惡也。桂枝湯。專主惡風自汗發熱之證。然亦有寒傷

桂枝加附子湯

營。惡風無汗。而喘者。蓋惡寒。則有陰陽之異。惡風悉屬於陽。惡風未罷者。必當先解其外。遂漏不止惡風。治發汗大過。衛虛亡陽。

桂枝湯加附子一枚

●惡寒 傷寒惡寒。雖身居密室。猶自憎寒。拘急甚。則寒慄鼓舍。向火不能過其寒。非若寒熱之惡寒。熱至則不惡寒也。如已發熱。則身熱不欲去衣。由陰氣上入陽中。或陽微。或風虛相搏所致。惡寒一切屬表。雖裏證悉具。而微惡寒者。猶當解表。俟惡寒已。乃可攻裏。故先惡寒而發熱者。為外。惡寒為陽病。在陽宜發汗。然尺中遲弱者。慎不可汗。黃耆建中湯。

○若太陽證。本惡寒發熱。未除。渴而小便不利者。五苓散。先服一半。探吐之。

芍藥甘草附子湯

發汗後。惡寒為虛。宜此湯。

芍藥 三兩

甘草 兩

附子 一枚

右三味。以水五升。煮取一升五合。去滓分溫再服。



○若下利惡寒手足溫者陽邪內陷於太陰經也。小建中湯

○下證悉具而微惡寒及下利惡寒時々自煩者為陽邪內伏並宜大柴胡湯

○結胸證微惡寒者必先用桂枝湯解表然後用陷胸湯下之若表不解而便攻之表邪復結

○若初起惡寒踈卧脉沉者為內惡寒為陰病在陰則宜溫雖夏月亦復姜附輕則理中重則四逆若當盛暑須參大順冷香漿水等治之

○少陰病惡寒身踈而利手足厥冷煩躁脉不至及四逆惡寒不煩躁皆死證也

○背惡寒 陽虛之驗也然陽氣內陷亦有此證若風寒在表則一身盡寒矣背惡寒陰寒氣盛可知熱病初起口燥心煩而背微惡寒者此陽氣內伏於陰中肌表之陽不勝邪及陽明中暍俱有是證以陽邪內消津液故煩渴引飲勞役內傷背惡寒者必寒一陣止一陣為陽虛內熱東垣升陽散火湯又濕痰

證亦背惡寒必肢體重痛導痰湯加減若寒熱屢作而背惡寒脉來弦數身有痛處者為發瘧疽之候

●寒熱往來 邪正分爭也 表邪欲入而

正氣拒格陰陽相勝而作也然寒熱往來與寒熱如瘧不同如瘧則作止有時往來則作止無時有日二三發者傷寒寒熱往來雖專屬少陽經亦兼太陽陽明者邪居表多則多寒邪居裏多則多熱然治法專用小柴胡湯隨證加減寒多增桂枝熱多倍柴胡加芍藥寒多而脉虛去芍加熟附熱多而脉實去人參加大黃

○凡少陽證必先與小柴胡湯和之服後不解若其脉反浮者當與柴胡桂枝湯使其邪從表而散若脉加數者當與大柴胡湯其邪從裏而去也

○有元氣虛弱之人素挾痰鬱畧有動作勞傷則憎寒發熱有似傷寒其脉弦數無力腋下及臂或腿縫中有核腫痛者謂之勞瘵切勿汗下補中益氣湯降火清痰茶輕者周時

微汗自解

●如瘧者 作止有時。非若寒熱往來之無定也。病二三日。寒熱往來。有時而作。脈浮洪者。此太陽似瘧也。若熱多寒少。尺脈遲。為血少。

○若日晡時作。汗出而煩。脈實者。大柴胡湯。○若六七日發熱。惡寒。舌不短。囊不縮。脈浮緩者。此厥陰似瘧也。為欲愈。小柴胡湯。

○大率往來寒熱。不離少陽。不拘日數多少。邪氣淺深。及婦人熱入血室。並宜小柴胡湯。加減。

○大陽病。八九日。如瘧狀。一日二三度發。為欲愈。

●潮熱 陽明。旺於未申。故日晡潮熱。一日一發。如潮倍。傷寒邪。入陽明胃府。為邪熱內結。故可用養氣攻裏。凡欲攻裏。須病人脈實有力。再當審臍下鞕滿。結痛處。及問平昔有無動氣。量輕重施治。  
○發於寅卯者。屬少陽。發於午者。屬太陽。皆不可下。俟表證已。方可攻之。

倍恐信

柴胡桂枝湯

潮熱而嘔。胸脇滿。盜汗出者。不可下。此湯主之。

小柴胡湯。合桂枝湯

○潮熱而脇下汗出。為膽實。大柴胡湯。手足心汗出者。為胃實。大養氣湯。二處無汗。為結未實。尚宜小柴胡和解。俟定攻之。

●無汗 風暑濕三者犯人。皆衛氣受病。惟寒則營血受傷。腠理緻密。津液內滲。陽邪有餘。故身熱無汗。而喘也。蓋邪氣在表。熏蒸腠理。則汗出。今邪不外蒸。必傳入裏。急用麻黃湯汗之。若惡風項強者。葛根湯。緣邪漸次。入陽明經也。

○陽明病無汗。小便不利。慎懷者。必發黃。若渴欲飲水。小便不利無汗者。為犯本。俱宜五苓散。

桂枝去桂加白朮芍藥湯

前症。治有飲水內畜而無汗。

桂枝湯。去桂枝。加白朮。芍藥。各三兩。

桂枝麻黃各半湯 治脈遲無陽。不能作汗。

桂枝 六兩 芍藥 六兩 甘草 炙

生姜<sup>各一兩</sup> 大棗<sup>四枚</sup> 麻黃<sup>一兩</sup> 杏仁<sup>二十枚</sup>  
 右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取一升八合。去滓。溫服六合。  
 ○三陰不宜有汗。非三陰而無汗。無汗之證也。

●自汗 太陽中風。不由發表而汗泄。謂之自汗。以風傷衛。則表虛不能固而汗。故用桂枝湯。散邪以實衛也。然濕氣傷於脾。暑氣傷於心。皆令自汗。惟冬月寒傷營。則發熱無汗。四五日後。忽然自汗出。此寒邪傳裏而變熱。知邪已入府矣。凡傷風。則惡風自汗。頭痛發熱。若裏證自汗。必煩躁惡熱。不惡風寒。迥乎不侔也。  
 ○太陽經邪犯本。則汗出而渴。小便難。  
 ○陽明經證。則頭目痛。眉稜骨疼。而自汗。  
 ○陽明府證。則腹滿自汗。  
 ○有汗後惡寒。汗不止為表虛。黃耆建中湯。并用溫粉撲之。

桂枝附子湯

有汗多亡陽不止者

桂枝<sup>四兩</sup> 附子<sup>三枚</sup> 甘草<sup>二兩</sup> 生姜<sup>三兩</sup> 大棗<sup>十二枚</sup>

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。小便少者。加茯苓。

○若陰證自汗。必身冷厥逆。四逆湯。  
 ○若傷濕。則身重自汗。中暑。則脈虛自汗。中暈。則煩渴。自汗濕溫。則妄言。足冷自汗。風溫。則鼻衄自汗。霍亂則吐利自汗。內傷勞倦。則氣口虛大。身熱自汗。柔痙。則搖擻自汗。

●盜汗 睡即濺々然汗出。覺則止而不復出矣。蓋邪居於衛而欲入。睡即衛氣行於裏。乘表中陽氣不緻。津液得泄。故但睡而汗出。覺則氣散於表而汗止矣。故雜病盜汗。責於陰虛血熱。傷寒盜汗。責在半表半裏。為膽有熱。故專用小柴胡。若脈浮緊。潮熱盜汗。柴桂湯。

○陽明病。當作裏實。而脈微弦者。必盜汗出矣。

○三陽合病。目合則汗。熱病。白虎湯。傷寒。小柴胡湯。

●頭汗 三陰經。皆至頸胸中。獨三陽經。上循於頭。故頭汗出。身無汗。劑頸而還。乃陰陽

不和。邪居表裏之間。故有是證。當以小柴胡和之。然瘀血發黃。水氣三證。亦有頭汗。當以證辨之。蓋瘀血頭汗。則小便自利。大便色黑。發黃頭汗。則小便不利。發熱而渴。水氣頭汗。則胸滿喘欬。若半表半裏。則往來寒熱。亦有微惡寒。手足冷。脉沉者。

○大抵頭汗。雖主少陽。然屬陽明濕熱。不得發越者最多。至若額上汗出。腦後無汗者。定屬陽明無疑。

○頭汗多有裏實證。故頭汗而脇下滿。大便堅者。大柴胡湯。頭汗譫語。調胃養氣湯。

○若頭汗而懊憹者。為虛煩。梔子豉湯。

○下血。而譫語。頭汗出。熱入血室。小柴胡。去人參。加當歸。桃仁。丹皮。

○凡頭汗出。不得小便者。不治。

○濕家。誤汗。額上汗出而喘。小便難。大便自利者。為陽脫死。

●手足汗出。為熱聚於胃。胃為津液之府。以熱蘊於內。故津液傍達也。凡傷寒日晡潮熱。手足濇々汗出者。為胃實。若手足心。腋下。

濇々汗出者。為兼少陽實熱也。大柴胡。三養氣選用。若陽明病。不能食。小便不利。手足濇濇然汗出者。此欲作固瘕。大便必初鞭後溏。此胃中虛冷。欲溏泄也。當知此汗必冷。宜理中湯溫之。

●煩熱。為鬱悶不安。火熱不得發越之象。不經汗吐下。而煩熱者。為太陽表證。煩熱自汗。而渴屬陽明。煩熱。脉弦喜嘔。或煩而不嘔。屬少陽。

○汗下後。六七日不大便。小腹滿而煩。或胸中痛。而煩熱喘逆者。為有燥屎。大養氣湯下之。

○若四五日。鼻乾目瞑。脉數而煩者。為欲衄。黃芩湯。加柴。葛。枳。桔。生地。山梔。清解之。

○凡傷寒六七日。手足三部脉皆至。大煩而口噤。不能言。其人煩躁者。為欲作汗解。

○差後。得食而煩。損穀則愈。

○有內傷勞役。陰火動而時煩時靜。不可誤認外感而施汗下也。

○凡服藥後。煩悶不安。而頭面髮際遍身發

癢者。謂之茶煩。此胃虛不能勝茶力也。與熱姜湯。徐々呷之。茶中宜加用姜。以行胃氣自安。

●煩躁 凡煩熱悉屬三陽。煩躁則有陰陽之異。蓋心熱則煩。腎熱則躁。煩者心胸愠怒。如有所觸。外不形現。為熱尚輕。躁則手足動掉。若無所措。內外不寧。為熱最劇。

○有太陽表證。謖熱頭痛。惡寒不汗出。而煩躁者。大青龍湯。

○有太陽裏證。渴欲飲水。而煩躁及無熱。但狂言煩躁者。並宜五苓散。

○有表證罷。而不大便煩躁者。此陽明有實。三兼氣選用。

茯苓四逆湯

有汗下不解。而煩躁惡寒者。此為虛寒。此湯主之。

茯苓<sup>六兩</sup> 人參<sup>一兩</sup> 甘草<sup>二兩</sup> 乾姜<sup>一兩</sup> 附子<sup>一枚</sup>

右五味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。

芍藥甘草湯

有脈數心煩而躁。至夜不寧者。為血虛。此湯主之。

芍藥<sup>四兩</sup> 甘草<sup>四兩</sup>

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

乾姜附子湯

有晝日煩躁。至夜安靜者。為陽虛。宜此湯。

乾姜<sup>二兩</sup> 附子<sup>一枚</sup>

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

○有誤用姜附而煩躁。虛則升陽散火湯。實則黃連解毒湯。若躁極。脈亂者。勿治。

升陽散火湯 黃連解毒湯 見時疫

○有少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯。

○有陰盛格陽。脈沉細而疾。渴欲飲水。躁極悶亂者。此水極似火也。用霹靂散。并以火熨之。進熱茶。而躁反甚。此茶力未到。不可遽用寒涼。使陽氣益消。則死。

霹靂散 方見中寒

黃連阿膠湯

有少陰病。六七日無大熱。或厥逆自利。不得汗。脈沉數。而煩躁者。

黃連<sup>四兩</sup> 黃芩<sup>二兩</sup> 芍藥<sup>二兩</sup> 雞子黃<sup>二枚</sup> 阿膠<sup>三兩</sup>

右五味。以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠烱盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

○凡不經汗下。而煩躁者為實。汗下後煩躁者為虛。

○結胸證悉具。而煩躁發熱。下利。厥逆而躁。不得眠。少陰吐利。躁煩。四肢惡寒。身踈。脉不至。而躁者。皆死證也。

●懊憹 傷寒誤下。正氣內虛。陽邪內陷。結於心胸之間。鬱悶不舒。輕則虛煩懊憹。重則痞滿結胸矣。邪在膈上。則可吐。熱結胃府。即宜下。不可拘。

梔子豉湯

發汗吐下後。不得眠。劇者必

反覆顛倒。心中懊憹。與陽明病下之。其外有熱。手足溫而不結胸。心中懊憹。及舌上胎滑。飢不能食。頭汗出而懊憹。三者邪熱鬱結於胸中。並宜此湯。

梔子枚十四 香豉四合

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分為二服。溫進一服。得吐

者止後服

○下之後。心中懊憹。而煩者。為有燥屎。

○下後。短氣煩躁。膈中拒痛。心中懊憹者。為結胸。

○陽明病。身熱無汗。口燥渴。大小便不利。心中懊憹。此為濕熱。必發黃。

●身體痛 傷寒身疼。脉浮則為太陽表證。以寒氣鬱於經絡之間。惡寒無汗。而骨節煩疼也。必用麻黃湯辛熱發表。令氣血流通而愈。若自汗脉浮緩者。則腠理開泄。雖發熱。而身體骨節不疼矣。傷寒身痛而尺脉遲弱者。此為氣血本虛。不可驟發表。當先用黃耆建中湯溫之。然後發表可也。

黃耆建中湯方見虛損

新加湯

有汗後。身疼脉遲者。此陽氣虛

也。宜此湯。

桂枝三兩 芍藥四兩 甘草二兩 生姜四兩

大黃枚十四 人參三兩

右六味。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。

○有發汗吐下後身疼不休表證不解者桂枝湯

○有太陽表證具而身疼頭痛脈不浮而沉遲無力者此真陽內虛四逆湯溫之

○有裏證身痛者乃直中裏證非傳經急溫之凡有頭痛發熱身痛表證也無頭痛發熱者裏證也

○有少陰病脈沉手足寒身體痛骨節疼口中和背惡寒者附子湯

○有少陰下利清穀而身疼痛急當溫裏然後治表

○有陰毒身痛如被杖者有瘀血一身盡痛而熱面黃者有中濕鼻塞一身盡重而痛者有風濕一身盡痛惡風不欲去衣汗出小便難者內傷勞倦脈虛倦怠而肢體煩疼者各詳本門

●拘急 四肢為諸陽之本寒邪客於經絡之中故使拘急不和也。有因發汗亡陽津血內竭不能榮養筋脈而屈伸不便者。有陽氣內衰不能行於四末而拘急疼痛者。大抵有發

熱頭痛骨節疼而四肢拘急為表證無身熱頭痛而蹇臥不伸四肢拘急者為陰證若汗下後筋惕肉瞤而見拘急不仁者則為氣血虛弱也

○脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急不可與桂枝湯當與黃耆建中湯

○發汗後惡風小便難四肢拘急者桂枝加附子湯

○吐利後汗出發熱惡風拘急厥逆及直中陰經厥逆拘急並宜四逆湯

●心下滿 謂正當心下鞭滿乃病在氣分邪將入裏而未入也若下早表邪入裏而滿者為痞也

○凡心下滿以手按之散而濡者此虛氣也若按之汨汨有聲而軟者有停飲也若按之鞭痛者有宿食也若按之痛而其人善忘者有畜血也治法各具本條

○陽明證心下鞭滿者不可下以邪在氣分也猶兼太陽下之利不止者死利止者愈又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之此

燥屎逆上攻脾也。調胃承氣湯

●胸脇滿 為胸脇下氣塞滿悶。非心下滿

也。邪氣自表傳裏。必先胸膈。次傳脇下。而入

胃府。是以胸滿多帶表證。脇滿當半裏

○太陽陽明合病。喘而胸滿者。麻黃湯則知

胸滿屬表。而須發汗

桂枝去芍藥湯 太陽病下後。脈促胸滿

者。以病在衛氣。芍藥入營故去之

桂枝湯。去芍藥

○太陽病不解。傳入少陽。脇下鞭滿。嘔不能

食。往來寒熱。脈沉緊。只宜小柴胡湯和解

之。若舌上有白胎。雖不大便。不可下。本方去

人參。加橘皮

柴胡加龍骨牡蛎湯 傷寒七八日下之。胸滿

驚煩。此邪氣乘虛而入少陽之本也。宜此湯

柴胡<sup>四兩</sup> 半夏<sup>三合</sup> 大黃<sup>二兩</sup> 桂枝

人參 茯苓 生姜 龍骨

牡蛎<sup>各一兩</sup> 鉛丹<sup>二兩</sup> 大棗<sup>六枚</sup>

右十一味。以水八升。煮取四升。內大黃。切如

棊子大。更煮一二沸。去滓。溫服一升

○太抵胸脇滿。為邪初入裏。氣鬱不行之候。

只宜柴胡。桔。枳。和之。若邪氣留於胸中。為實

則宜可吐。經曰。病在胸中。當吐之

○若發熱。欬嗽。胸滿而兩脇痛如挫者。此邪

熱挾濕。痰攻注也。小柴胡。去參。半。加枳殼。桔

梗。括。薑。杏仁。白芥子。竹瀝。薑汁

○若心下滿。其人曾閃挫。大便黑而胸下刺

痛者。此有瘀血也。桃核養氣湯。加桔。枳。柴胡。

不應。加生附子

大黃附子湯 脇下偏痛。發熱其脈緊弦。

此寒也。以溫茶下之。此湯主之

大黃<sup>二兩</sup> 附子<sup>一枚</sup> 細辛<sup>二兩</sup>

右水五升。煮取二升。去滓。分三服。服後如人

行五里。頃。更進一服

●痞 痞塞不通之謂。以下之太早。虛邪內

入。而為痞。故胸中但滿。而按之不痛也。有表

證未解者。又當柴胡桂枝等解散。然後用瀉

心湯

生薑瀉心湯 有汗解後。下後。心下痞鞭



腹中雷鳴下利者。此胃中不和也。此湯主之。

甘草三兩 人參三兩 乾姜二兩 半夏半升

黃芩三兩 黃連二兩 生姜四兩 大棗十二枚

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

甘草瀉心湯

有太陽病誤下而痞者。此

胃虛客邪上逆也。宜此湯。

甘草四兩 乾姜三兩 半夏半升 黃芩三兩

黃連二兩 大棗十二枚

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

大黃黃連瀉心湯

有少陽病誤下。心下

但滿而不痛者。此痰濕上逆也。宜此湯。

大黃二兩 黃連二兩

右二味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。

附子瀉心湯

有心下痞。而復惡寒。冷熱

偏勝也。宜此湯。

大黃二兩 黃連二兩 黃芩各二兩 附子一枚

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞

出滓。內附子汁。分溫再服。附子一枚炮去

○大下後復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。

先用桂枝湯解表。後用大黃黃連瀉心湯攻痞。

○本以下之故。心下痞。與瀉心湯痞不解。其人渴而躁煩。小便不利者。五苓散。

十棗湯

有心下痞滿。引脇下痛。乾嘔短

氣。汗出不惡寒。此脇下有水氣也。此湯主之。

芫花 甘遂 大戟 大棗十枚

以上三味等分。各別搗為散。以水一升半。先

煮大棗肥者十枚。取八合去滓。內藥末。強人

服一錢匕。羸者服半錢。平且溫服。若下少病

不除者。明日更服。加半錢。得快下利後。糜粥

自養。

○有外證未除。而數下之利不止。心下痞鞭。

表裏不解者。此協熱利痞也。桂枝人參湯。

旋覆代赭石湯

傷寒吐下不解。心下痞鞭。噫

氣不除者。宜此湯。

旋覆花三兩 代赭石二兩 人參二兩

甘草三兩 半夏半升 生姜五兩 大棗十二枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

○傷寒發熱。汗出不解。心下痞悶。嘔吐而下利者。大柴胡湯。

○大抵胸膈痞結。未經攻下而成者。此或痰或食。或氣凝滯而然。只須小柴胡加枳。桔。以開豁之。曾經下後。此為外邪陷入。而為痞結。方可用陷胸。瀉心等劑。以疎導之。今醫不分。曾下未下。見心下脹滿。便呼結胸。輒與攻下之藥。乃成真痞結。

●結胸 傷寒誤下。實邪內陷。則為結胸。故當胸鞭滿而痛也。

大陷胸湯

治結胸證。心下鞭滿。短氣煩躁。喘滿。心中懊憹。或頂強如柔痙狀。或胸中高起。或膈內拒痛。或舌上燥渴。或日晡小有潮熱。或從心下至小腹鞭滿。脉寸浮關沉。為大結胸。

大黃 六兩 芒硝 一斤 甘遂 二兩

右三味。以水六升。先煮大黃。取二升。去滓。內芒硝。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利

止後服

○凡用陷胸湯。宜加陳倉米一撮。以曾經誤下。胃先受傷。用以護持中氣。最妙。若氣弱脉沉遲。不可攻者。理中圓頻與之。甚少加附子

小陷胸湯

心下滿而按之方痛。脉浮滑者。為小結胸。

黃連 二兩 半夏 半升 栝蒌實 一個

右三味。以水六升。先煮栝蒌。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

○若心下結痛。而無熱證。不渴不煩。此寒實結胸也。甘草乾姜湯。未効。枳實理中湯。

三物白散

前症治實症人

桔梗 三分 貝母 三分 巴豆 一分去皮必熬

右二味。為末。內巴豆。更臼中杵之。以白飲和服。強人半錢。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利。進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。

半夏茯苓湯

金匱小半夏加茯苓湯

治心下怔忡。頭汗出。無大熱者。為水結胸。輕症

半夏一升 生姜半斤

茯苓三四兩

右三味以水七升。煮取一升五合。分溫三服。重則大陷胸。加乾姜。

○心下滿而微鞭。不可按。其人善忘。小便不利。而不渴者。此血結也。桃核承氣湯。

○心下石鞭。胸前大熱。而脹滿結痛。飽悶氣急者。此食結也。或已下未下。並宜調中飲。虛者枳實理中湯。

調中飲 治食積類傷寒。但身不痛者

蒼朮炒 白朮生 厚朴姜汁炒 陳皮炒

甘草炙 神麩炒 枳實炒 黃連姜汁炒

山查姜汁炒 草菓炒 乾姜炮

右水煎去滓。磨木香調服。○腹痛。加桃仁。痛甚便秘。加大黃。口甘加蘭。

○胸中滿結。脉浮大者。不可下。下之則死。此邪猶在表也。先與桂枝湯。解表。俟表證已。然後攻之。

○若未經下者。非結胸也。雖有胸脇痞滿。只宜小柴胡。加枳。桔。或加桂枝。和解之。

○誤下之。初覺結胸證見。急宜理中湯。便可

解散。如未解。候日足。再下之。

○凡結胸。有兼發黃。發斑。發狂。發呢。發噦者。最劇。結胸證具。而煩躁者死。結胸二三下之。不退者死。喘急直視。昏憤厥逆。手足冷。或下出稀水糞者。皆不可治。大抵結胸之脉。沉緊滑實者。乃可攻之。若沉小者。決難救矣。

●藏結病 如結胸狀。飲食如故。時々下利。寸脉浮。關上小細沉緊。而無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌白胎滑者。藏結也。熱邪內結。只裏氣素虛。不能蒸熱。故無陽證。發見。舌胎亦不得乾燥。以本虛邪結。故為難治。至於素有痞積。又加邪結。新舊兩邪相搏。不解。故死。雖然未可槩為死證。而委之不救也。黃連湯。或連理湯。亦有能食。自利。腹脹。急者用備急丸。有腹痛引脇下。不可按者。用附子瀉心湯。有素有痞積。痛引陰筋者。用四逆湯。加萸。桂等。

●腹滿 腹滿不減。按之痛者。為實。養氣湯下之。腹滿時減。按之不痛。為虛。理中湯。溫之。○病人自言腹滿。他人按之不滿。此屬陰證。

切不可攻。攻之必死。四逆湯溫之。

○氣口脈微弦。法當腹滿。不滿必便難。兩胛疼痛。此為虛寒。後下上也。當溫之。金匱大建中湯。

蜀椒 三合 汗 乾姜 四兩 人參 二兩 右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服

○陽明病發熱。腹滿微喘。口燥不大便。或譫語者。大柴胡湯。

○少陰病。咽乾腹滿。六七日不大便。或下利。純清水。為陽熱亢極。急下之。大承氣湯。

**厚朴七物湯** 病腹滿。發熱十餘日。脈浮數。飲食如故。此風熱內陷。此湯主之。

厚朴 半斤 甘草 二兩 大黃 二兩 大棗 十枚  
枳實 五枚 桂枝 二兩 生姜 五兩

右七味。以水一斗。煮取四升。溫服八合。日三服。○嘔者。加半夏五合。○下利。去大黃。○寒多。加生姜。至半斤。

**厚朴生姜半夏甘草人參湯** 汗後腹滿。當溫之。宜此湯。

厚朴 半兩 生姜 半兩 甘草 二兩 半夏 半升 人參 二兩  
右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。

日三服

**附子粳米湯** 腹中寒氣。雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐。宜此湯。

附子 一枚 半夏 半斤 甘草 一兩 大棗 十枚 粳米 半升  
右五味。以水八升。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

○吐後腹滿。宜下之。調胃承氣湯。

**梔子厚朴湯** 下後腹滿。宜吐之。

梔子 十四枚 厚朴 四兩 枳實 四枚  
已上三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者止。後服。

○大抵。陽熱為邪。則腹滿而咽乾。陰寒為邪。則腹滿而吐利。食不下。若曾經汗吐下後。腹滿者。治各不同也。

●腹痛胸膈 屬表邪內陷。脇痛屬半表半裏證。若腹痛則純屬於裏。但有傳經直中之殊。蓋陽邪傳裏。與正氣相搏而痛。其痛不常。而滿腹攻攪。此猶帶表邪。當以小建中湯和之。因誤下陽邪陷入太陰而痛。虛則桂枝加芍藥湯實則桂枝加大黃湯。

○陰寒在內而痛者。則痛從臍下注少腹綿綿無休止。時欲作利也。當以四逆輩溫之。

○有燥屎宿食痛者。則煩躁不大便。腹滿鞭痛是也。當以三姜氣攻之。

○下之大過而痛者。則時劇時輕。却喜溫按。用理中湯。金匱大建中溫補之。

○少陰病。腹痛四逆。或欬。或悸。或小便不利。或泄利下重。四逆散。清解之。

黃連湯 胃中寒熱不和。腹中痛。欲嘔吐者。此湯和之。

黃連

人參

甘草

半夏

乾姜

大棗

桂枝

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。溫服一升。日三夜二服。

○中脘痛者。屬太陰。當臍痛者。屬少陰。少腹痛者。屬厥陰。

○諸痛為實。下之則痛隨利減。此言陽邪傳裏而痛也。先腹痛下利。此言陰寒內結也。

○凡腹痛喜得溫。按而痛無休息者。為直中陰寒。若時止而喜按揉者。為傳經壞證。皆宜

溫之。痛不可近。而鞭滿者。為實結痛。不可近而濡軟者。為畜血。皆當下之。此陰陽虛實。血氣之大端也。

○小腹滿痛。皆為裏證。與胸脇滿之屬氣不同。大陽風傷衛不解。渴而小便不利。邪熱結膀胱如狂。小便自利。小腹急滿結痛。桃核

養氣湯

代抵當湯

便反利。亦有難瀉者。為畜血。宜此湯。

大黃

芒硝

桃仁

歸尾

穿山甲

桂枝

右為極細末。煉蜜丸。如桐子大。畜血在上焦。丸如芥子大。臨服去枕仰臥。以津嚥之。令停喉下。搜逐膈上之瘀。中焦食遠。下焦空心。俱

桐子大。以百勞水煎湯下之。如血老成積。此

某攻之不動。去歸地。加醋製廣茂一兩。倍肉

桂。或煮湯和滓服之。尤効。

茵陳蒿湯 見濕門

大陰身黃。脈沉小腹滿。小便

不利。宜此湯。

○陽明府實。小便短赤。大便秘結。小腹鞭滿。

大承氣湯

○陰證初起。自覺小腹滿。腰腹痛。手足厥冷者。真武湯

○若冷結膀胱關元而陽氣不化。小便不通者。不可誤認。溺閉而與利水藥。宜先灸本穴。然後溫補。若灸後。手足不溫者不治

○又有陰陽易病。小腹痛。引腰膝。小便不利者。逍遙湯。下燒視散

○病人素有痞氣。連在臍旁。痛引入陰筋者。名藏結難治。四逆湯。加吳茱萸。肉桂

●讖語 邪氣盛則實。精氣奪則虛。故實則讖語。虛則鄭聲。傷寒胃中熱甚。上乘於心。心為熱冒。則神識昏迷。妄有所見而言。輕者睡中呢喃。重者不睡亦語

○有讖語者。合目自言。日用常行之事。是熱未至於甚也。獨語者。如見鬼狀。若劇者。發則不識人。語言不休者。又其甚也。言亂者。謂妄言也。罵言不避親疎。神明已亂也。狂言者。大開目。與人言所未嘗見之事。此邪熱之最劇者。九此見熱之輕重也

○脈來沉實。或數盛有力。二便秘瀼。燥渴讖語。狂妄腹脹滿。潮熱自汗。或下利純清水。或心腹鞭痛。或過經不解。皆當下。若下後。熱不止。或喘滿氣逆。而上奔。或泄利。氣脫而下奪。皆逆也

○大抵熱入於胃。水涸燥結。必發讖語。皆為實。有被火劫。取汗而讖語者。亡陽讖語者。此為虛也

○發汗多。亡陽讖語。身自和。不可下。柴胡桂枝湯和之

○火迫讖語者。津液內竭。火熱侵耗所致也。桂枝甘草龍骨牡蛎湯

○得病無熱。但狂言煩躁不安。精采不與人相當。以熱結在膀胱。五苓散水調探吐之。或加知母。甘草。名桂苓飲

○得病無頭痛。不惡寒。但身熱發渴。小便利大便黑。口出無倫語。此熱在心脾。當歸活血湯

○當汗失汗。讖語。善忘善飢。漱水。身黃腹滿。如狂者。屬瘀血也。桃核養氣湯

○婦人熱入血室。夜則讖語。如見鬼狀。小柴胡加當歸丹皮。

○大熱乾嘔。呻吟錯語。不得眠。黃連解毒湯。○凡讖語。無實熱燥結可攻者。皆不可治。下後讖妄雖緩。仍不止。若未見溇糞者。為下未盡。更下之。

○諸如此者。脈短則死。脈自和則愈。又身微熱。脈浮大者生。逆冷直視。脈沉細死。

●鄭聲者。謂虛而聲轉無力。不相接續。造字出於喉中。若鄭聲之輕怯也。又重語疊出。說過又說。亦謂鄭聲。蓋因汗下後。失其正音。精氣衰奪之候。

○其脈弦細而微。身有微熱。或寒熱。或嘔逆。大小便自利。而鄭聲者。小柴胡湯。

○脈雖微弱而和。手足溫者。生。脈散。人參三白湯。

參胡三白湯 治汗下後。虛微少氣。發熱口燥。

人參 二錢 柴胡 三錢 白朮 三錢 白芍 酒洗

茯苓 各一錢 生姜 三片 大棗 三枚

右水煎溫服。○榮衛不和。去莖胡。加桂枝。口

乾心煩。加麥冬。五味。心下痞。加黃連。枳實。不得眠者。加竹茹。○本方去柴胡。名人參三白湯。

○氣息短促。而脈沉細欲絕。附子湯。倍參。○若上氣喘促。或呃逆不止。神昏不省人事者死。

●發狂 傷寒熱毒在胃。併於心。使神不寧。遂發狂也。

○發狂雖主胃府實熱。亦有屬經證者。如病人不欲食。小便自利。大便自調。脈來緊盛。骨節煩痛。翕然如有熱狀。奄然發狂。澀然汗出而解。此陽明經熱。欲作汗也。不必用茶。宜類與姜湯。助其作汗自解。

○病人熱甚。脈來數實。欲登高棄衣。狂妄罵詈。不避親疏。蓋陽盛則四肢實。實則能登高也。大養氣湯。

○頭痛不解。熱結膀胱。其人如狂。而血自下者愈。外已解。但少腹急結。脈沉身黃。唇焦漱水。小便自利者。此為畜血。如狂。桃核養氣湯。○陰證煩躁。如狂。渴欲飲水。而不能嚥。或身

戴陽。手足逆冷。脉沉細。或虛大無根。附子湯。火焰散。霹靂散。選用。

●發斑 夫熱則傷血。血熱不散。裏實表虛。熱氣乘虛。出於皮膚。而為斑。輕則如疹子。甚則如錦紋。或病本屬陽。誤投熱藥。或當汗不汗。當下不下。或汗下未解。或冬溫誤用麻黃助熱。或溫病。誤用辛溫發表。皆能至此。慎不可發汗。重令開泄。更增斑爛。亦不可輕下。以其熱毒散漫於外也。惟大便秘。躁渴色紫者。可微下之。

○凡汗下不解。足冷耳襲。胸中煩悶。欬嗽嘔逆。躁熱。卧起不安。便是發斑之候。

○凡斑欲出。未出之際。慎不可用寒涼攻熱。恐傷胃氣。必作嘔噦也。

○發斑皆失於汗下。熱毒內攻。不得外散。蘊於胃府。而發出肌表。宜先與升麻。黑參。甘草。甚則升麻湯。加犀角。黑參。若斑已出。不宜再汗升發。始發又不宜便下。恐毒內陷也。若熱毒勢盛。咽痛心煩。狂言悶亂者。犀角黑參湯。咽痛。可加牛旁。薄荷之類。若斑發已盡。外勢

已退。內實不大便。讖語。小劑涼膈散。或大柴胡湯。微下之。

○陰證發斑者。狀如蚊迹。發痕。手足多而胸脇少。頭面背上陽部殊無。其色淡紅。稍久則為微黃。身雖有熱。而安靜。脉來沉細。以其人元氣素虛。或先因慾事傷腎。或誤服涼藥。太過。逼其無根之火。聚於胸中。薰灼肺胃。傳於皮膚。而發。當用理中。去朮。加附子。藿香。升麻。橘皮。甚則通脉四逆湯。然多不效。

○凡斑紅赤者為胃熱。紫者為胃傷。黑者為胃爛。

●發黃 陽明裏熱極甚。熱鬱留飲不散。溼熱相搏。而成。大抵濕熱。蒸太陰。脾土色見於外。必發黃也。經曰。溼熱交併。民多病瘴。溼氣勝則如熏黃。而晦。熱氣勝則如橘黃。而明。傷寒發黃。熱勢已極。且與畜血相類。但小便不利。大便實而渴者。為發黃。小便自利而不渴者。為畜血也。凡白暗微黃。而頭汗及環口汗出。便是發黃之候。

○凡小便利。而大便黑。其人如狂。頭汗發渴。



身黃如橘。為瘀熱。但胸脇痛者。犀角地黄湯。加大黃。茵陳。小痛者。桃核養氣。加茵陳。

犀角地黄湯 見衄血

○一身盡痛。發熱。頭汗。口渴。小便不利。身如蠶黃。為溼熱。五苓散。加茵陳。腹微滿。茵陳蒿湯。

麻

黃連。軹赤。小豆湯。大陽病。失汗。一身盡痛。頭汗發熱。而黃。宜此湯。

麻黃 二兩

連軹 二兩即連軹根

赤小豆 一升

甘草 二兩炙

杏仁 半個

生梓白皮 一升

生姜 二兩

大棗 十枚

以上八味。以潦水一斗。先煮麻黃。再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。半日服盡。

梔

子。藥皮湯。發黃。發熱。小便不利。而渴者。

梔子 十五枚

藥皮 二兩

甘草 一兩

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。

●不大便不通。陽明內實也。因發汗。利小便過多。致津液耗損。腸胃乾燥。而轉屬少陽。陽明者多矣。其人發渴。讖語。脈實。狂妄。潮熱。自汗。小便赤。或小腹遠臍鞭痛。舌胎黃黑。乾

裂。並宜三養氣選用。凡欲攻之。當先與小養氣。服後轉失氣者。與大養氣湯。

○傷寒不大便。六七日。頭痛有熱。多汗。小便黃赤者。此裏熱蒸陽明。調胃養氣湯。小便清者。知邪熱不在裏。不可下。

○陽明證具。而脈浮。或發熱者。為表未盡。小柴胡和之。

○嘔多者。雖有陽明證。不可下。

○脈浮而惡寒者。雖不大便。猶帶表邪。未可便下。大便難。小便少。不轉失氣。攻之初。鞭後澹。俟結定。乃可攻之。

○陽明脈浮。多汗。小便利。而大便難。為津液內竭。下之。必清穀脹滿。宜蜜煎導。

麻

仁九。治脾約大便難。○跌陽脈浮。而潘浮。則胃氣為強。潘則小便數。數潘相搏。大便則難。其脾為約。宜此湯。

麻子仁 二升

大黃 一斤

芍藥 半斤

厚朴 一斤

杏仁 一斤

枳實 半斤

右六味為末。煉蜜為丸。桐子大。飲服十九。日三。漸加以和為度。

○陰結不大便。四逆湯。加姜汁。白蜜。下金液丹。

○婦人血風崩漏。男子失血過多。有內燥熱。撮空閉目。錯語神昏。而不大便者。生地黄黃連湯。加荆芥。脉實。稍加酒。大黃。

○大病後。津枯氣逆。攻痛。大便不行。當歸三錢。生枳殼。廣皮。人參。各一錢。入姜汁。白蜜。熱服。若血虛。至夜有熱。加二地。餘熱不盡。并溺赤。瀉。加二冬。切不可潤腸。麻仁等丸。

○凡不大便。而脉虛瀉。循衣摸床。直視喘急。為真陰內竭。舌黑唇焦。齒根灰腐者。為燥屎上衝。皆死候也。

●自利 傷寒邪氣傳裏。裏虛挾熱。則自下利。當別其陰陽。三陽下利。皆身熱。太陰下利。手足溫。少陰厥陰。身寒無熱。此大槩也。夫自利。清穀不渴。或渴不能飲。或喜熱飲。小便色白。厥冷惡寒。脉來沉遲無力。或身反發熱。手足逆冷。皆直中陰寒。自利也。若渴欲飲冷。溺色黃赤。自利黃水。及泄利下重。臭穢。日晡發熱。脉來數實。而滑。雖或厥逆。而發熱。皆傳經

挾熱下利也。蓋因風邪入胃。木來侮土。故令暴下。或溫。或攻。或固下焦。或利小便。但不可發汗。汗之。使邪內攻。必成脹滿耳。惟合病發熱自利。則為表邪。不可例為裏證也。

○自利者。不因攻下。而自泄利也。然有夾食夾水。表邪傳裏。合病。伏氣。傍流。陰寒之不同。又須辨其協熱。協寒。而利者。必為鷺溲。協熱而利者。定為腸垢也。

○如夾食證。過用消導裏藥。引邪內犯。而泄利者。胃令湯。見泄瀉。

○有表證。發熱。飲水。水停心下。而喘欬自利者。小青龍加減。輕者五苓散。如葶藶。

○有水停脇。下鞭痛。欬而自利者。十棗湯。脇下一片獨冷。加炮姜。虛寒者。必加桂。附。行之。

○有表邪傳裏。腸鳴腹痛下利。脉沉遲者。小建中湯。和之。

○有合病。發熱。脉浮。自利者。葛根湯。

○少陰四逆。泄利下重。四逆散。

○下利。讖語。有燥屎。小養氣湯。

○傷寒十四日。口燥舌乾。心中疼。自利清黃。

臭水。大兼氣湯。急下之。凡食下即化腐臭而出。是有火也。今火邪內燦。陰津耗竭。燥結如石。故傍流清黃臭水。與完穀不化之。屬陰寒者。不同。慎勿誤認陰寒。而與溫藥必死。  
○凡始病發熱。便腹痛嘔吐。為陰寒自利。如太陰自利。不渴而脈沉。理中湯。寒甚。加附子。小便不利者。合五苓散。

附子湯

色白者

治少陰自利而渴。小便

真武湯

前症小便不利。宜此湯

茯苓<sup>三兩</sup>芍藥<sup>三兩</sup>白朮<sup>三兩</sup>附子<sup>一枚</sup>生姜<sup>三兩</sup>

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三

白通湯

治自利厥逆。而反面赤戴陽。或下利清穀。裏寒外熱

葱白<sup>四莖</sup>乾姜<sup>二兩</sup>附子<sup>一枚</sup>人尿<sup>五合</sup>豬膽汁<sup>一合</sup>

已上三味。以水三升。煮取一升。去滓。內膽汁。人尿。和令相得。分溫三服

通脈四逆湯

前症。或宜此湯。可選用

甘草<sup>二兩</sup>乾姜<sup>三兩</sup>附子<sup>大者一枚</sup>

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服

○吐利厥逆。煩躁欲死者。吳茱萸湯

○厥陰自利止。而煩躁發熱。陰盡復陽也。當自愈

●下利。不當下。而便攻之。內虛協熱而泄也。有協熱壞證之不同。如太陽病未解。而數下之。遂協熱而利。心下痞者。桂枝人參湯

葛根黃連黃芩湯。太陽病。下之早。遂利不止。脈促者。表未解也。宜此湯

葛根<sup>半斤</sup>黃芩<sup>二兩</sup>黃連<sup>三兩</sup>甘草<sup>二兩</sup>

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫。再服

○傷寒發熱。汗出不解。心下痞。嘔吐下利者。大柴胡湯

○下利。傍流清黃臭水者。大兼氣湯

白頭翁湯。下利。煩渴。飲水。臍下熱甚。下重。及誤用熱藥。協熱利者。宜此湯

白頭翁<sup>二兩</sup>黃連<sup>二兩</sup>黃蘗<sup>各二兩</sup>秦皮<sup>各二兩</sup>

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。

不愈更服

○下利脉大腸鳴者虛也。以其強下之故也。

當歸四逆湯

○汗下大過而畏寒。厥逆嘔吐不能食。泄利

不止。脉來虛微乏力。當從陰證例治

○下利差後。至其年月復發者。此痼寒留結

也。備急丸

備急丸 治心腹寒積。卒暴諸病。惟妊娠禁用

大黃酒浸三分 乾姜生用二分 巴豆去皮心熱一分

右先將大黃乾姜為末。次入巴豆。合研杵下。

煉蜜丸。棗豆大。密器中貯之。不拘時。溫水下

五七丸。口噤者。扶齒灌之。

○凡厥而下利。先厥後發熱者。利必自止。再

厥必復利

○下利脉大者為逆。脉緊者為未解。脉大者

為未止。脉弱者為自愈。雖發熱不死

○下利脉沉遲。面少赤。身有微熱。下利清穀。

必鬱冒汗出而解

○凡下利脉數而渴者。令自愈。設不差者。必

便清血。以有熱故也。

○傷寒厥逆下利。當不能食。今反驟能食者。

為除中也。言胃氣竭絕。而求助於食也。下利

讖語而目直視。下利厥逆煩躁不得眠。下利

發熱而自汗不止。下利止而頭眩。下利厥逆

無脉。灸之不溫。而脉不出。下利厥冷無脉。服

通脉四逆湯。脉暴出而躁。與下利日數十行。

脉反實者。皆為不治之證也。

●便膿血。便血有陰陽冷熱之不同。若便膿

血。則皆濕熱無疑。昔人有言。見血無寒。又言

血熱妄行。則知下血屬熱者。十常八九間有

一二屬寒者。陽證則下鮮血。陰證內寒則下

衄血。若紫黑成塊。或如豚肝及下血水多者。

皆難治

○陽證則脉數有力。為實熱。可用苦寒茶治

之

○少陰病。八九日。一身盡熱。以在膀胱。必便

血也。冬月當歸四逆湯。餘時黃芩湯。換赤芍

加當歸

○厥逆發熱。屢作不止。下膿血。而脉數飲水

者。白頭翁湯

○若臍下熱而痛者芍藥甘草湯

**桃花湯** 治少陰傳經壞病三四日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者

赤石脂一劬一半全用一半篩末 乾姜二兩 粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

○陰證下血色瘀晦或發呃者附子理中湯

呃加丁香柿蒂然多不救  
○凡下利膿血脈宜虛小若脈陰陽俱虛熱不止及脈弦大而實緊如按弓弦弦而細如循刀刃者皆不可治

●小便不利 邪氣聚於下焦結而不散則少腹鞭滿而痛小便不通若引飲過多水飲停畜或下焦多熱或中濕發黃皆以利小便為先惟汗後亡津液胃中乾與陽明汗多者以利小便為戒若誤利之重耗其陰反致泉竭多有涓滴不通而死者可不慎歟不但湯藥當禁外熨亦當戒之  
○大陽表邪未盡雖小便不利發表藥中不可

可便加利水藥誤用必致犯本若脈浮煩渴飲水小便不利者為入裏也或身黃脈沉結小腹鞭者為無血也並宜五苓散心煩懊發黃者加茵陳

○身黃腹滿小便不利者茵陳蒿湯

**猪苓湯** 表證盡除而引飲小便不利者此熱在下焦也

猪苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服七合日三服○若汗出多不可與猪苓湯宜竹葉石膏湯

○胸中鬱々微煩懊憹不安而小便不通者此熱傷太陰肺氣不行膀胱不化也梔子豉湯涌吐之

○若太便乍難乍易或下清黃臭水小便黃赤不利者此有燥屎也調胃養氣湯

**桂枝加大黃湯**

治太陰腹痛自利小便不利腹滿脈實者桂枝湯加大黃一兩

○前症無熱脉沉者。理中湯不効。用五苓散。

○少陰虛寒。腹痛自利。四肢疼重。小便或利。或不。或效。或喘。或嘔。此為水氣。真武湯。

○熱傳少陰。四逆。或效。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。此陽邪陷入陰經。四逆散。加茯苓。

○厥陰手足厥寒。脉細欲絕。小便不利。當歸四逆湯。

○凡小便不通。而見頭汗。為陽脫。此關格之疾也。不治。

●小便難。雖通而淋瀝。赤瀉。為陰虛。陽湊膀胱。受熱也。凡小便不利。而不至於不通者。勿妄利之。恐引邪入膀胱。而變畜血也。

○汗下後。腹滿。小便難者。理中湯。加厚朴。茯苓。不應加附子。

○汗下大過。而小便難。至夜煩躁者。當歸補血湯。合生脉散。

○汗後。舌乾微黃。黑而無積胎。心煩動悸。不寧。小便難。灸甘草湯。

○脉沉自利。四逆畏寒。而小便難者。為津液竭。而氣化不行也。雖難必無黃赤瀉。痛四逆湯。合生脉。

○凡小便不利。及瀉數而難者。服清理膀胱茶。不應即當清理肺氣。滋其化源。蓋肺氣窒塞。則小便不行。肺中虛熱。則小便難。若肺氣虛寒。則小便清利。倍常。

●小便自利。為津液偏滲。有陰陽之不同。大法有四。一為太陽表邪。未入於裏。一為大便鞭。而水液旁達。一為膀胱畜血。所傷不能約制水液。一為下焦虛寒。津液下脫。

○太陽病。發熱無汗。頭痛骨節疼。而二便如常者。麻黃湯。

○陽明府證。微熱手足汗。小便雖利。而必發黃。兼氣湯。

抵當湯

凡小腹鞭滿。應小便不利。今反自利。其人如狂者。此有畜血。以血以陰邪不能耗水故也。代抵當亦可也。

水蛭

三十箇 豬脂熬黑

安虫

三十箇 煮去翅

大黃

三兩 酒浸

桃仁

二十箇 去皮尖

右四味為末。以水五升。煮取三升。去滓溫服一升。不下再服。

○少陰之病四逆。小便自利。而色白為虛寒。四逆湯。或真武湯。去茯苓。倍附子。

○既吐且利。小便復利。大汗出。下利清穀。裏寒外熱。脈欲絕者。通脈四逆湯。

○大抵小便利而色黃。大便不行者。為裏實。若小便利而小腹痛。或善忘如狂者。為瘀血。

若小便利而身寒自利。脈沉微。其色清白。或反多者。皆屬陰寒也。

●小便數。腎虛而膀胱協熱。故水道頻數而黃赤。不長也。雖有自汗表證。不可服桂枝湯。得之便厥。為其走津液也。

○傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。腳攣急。尺脈弱者。黃耆建中湯。加生附子汁。製黃耆。尺中緊細而數者。勿用附子。本方加人參。赤茯苓。素常失血者。更加牡丹皮。此味雖涼。不凝發散也。

○脈浮濇。小便數而大便秘者。為脾約。麻仁丸。

○小便數。大便難。不更衣。十日。無所苦。渴者。五苓散。

●嘔吐。與乾嘔却異。嘔者聲物俱出。火擊痰動也。吐者無聲而但出物。濕痰無火。蓋胃

中有火。則有聲。若但吐無聲。胃中陽虛可知。能無從事辛溫乎。然嘔甚於吐。其類有五。一

為邪傳少陽。一為寒邪傷胃。一為熱邪傳裏。一為壞病胃虛。一為陰寒內拒。故凡嘔吐清

水。即為直中寒證。若胃中有熱。必見涎液酸水也。病機云。諸嘔吐酸及水液渾濁。皆屬於

熱。諸病水液澄澈清冷。皆屬於寒。此可見矣。○始病便嘔吐。飲食者。為感寒食不化。宜於芎

藭散。香薷散。正氣散。選用。○嘔多。雖有陽明證。不可下。為其氣逆。而未

收斂為實也。○嘔吐。雖出於胃。以表邪將欲傳裏。裏氣上

衝。邪正分爭。而然屬少陽。半表半裏證。如心煩喜嘔。胸脇滿。而嘔往來寒熱。而嘔。日晡發

熱。而嘔。或已發汗。而煩滿。脈洪數者。總屬少陽。并小柴胡。加減。

○若微熱不止。腹痛不大便。鬱々微煩。而嘔者。大柴胡湯。

○若初病發熱頭痛。便見嘔逆自利。為合病。以邪氣衝斥。循經熱入。而傷動胃氣也。

○食穀欲嘔者。屬陽明。胃中虛也。吳茱萸湯。得湯反劇者。屬上焦。桂枝加厚朴杏仁湯。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝湯。加厚朴。杏仁。

○汗下後。關上脈遲緩而吐。為胃寒。理中湯。

乾姜黃連黃芩人參湯

屢經汗下。食入

即吐

乾姜 黃連 黃芩 人參 各三兩

右四味。以六升。煮取二升。去滓分溫三服。

○陰證嘔吐。膈上有寒飲拒格也。太陰腹滿。

嘔逆食不下。或腹痛嘔吐。脈沉遲。飲食入口

即吐。心下溫々。欲吐復不能吐。自覺腹滿。而

按之不鞭。手足寒。自利小便色白者。四逆湯

加吳茱萸。生姜。

○大汗下後。惡寒厥逆。水漿不得入口。身痛

自利。真武湯。加半夏。下黑錫丹。與太陽病。發

汗後。水逆之。五苓散證不同。

○胃熱而嘔吐者。芩連。葛根。竹茹。蘆根。為主

○胃虛而嘔吐者。參。朮。芩。半。生姜。糯米。為主

○陰寒而嘔吐者。吳茱萸。乾姜。附子。丁香。為

主

○凡嘔吐。切不可用甘草。大棗。皆當去之。惟

胃虛者。不在禁例。

○凡嘔家。必用半夏。生姜。利水下痰。水去則

嘔自止矣。故生姜。為嘔家聖藥。

○嘔家有癰膿者。不可治。嘔膿盡自愈。此言

胃脘癰也。

○交食。夾痰。嘔吐。詳本門。

●乾嘔 寒鬱中脘。令陽氣蘊。而不舒。欲吐

而不能吐也。若有熱在內而嘔。則或出酸水。

若水痰食。矣。安有乾嘔之理哉。凡見乾嘔。即

為寒證無疑。其大陽與少陽及水氣。皆有乾

嘔。如太陽乾嘔。則有頭痛發熱。少陽乾嘔。則

有胸滿脇痛。水氣乾嘔。則有脇下引痛。若直

中陰寒乾嘔。則外無一毫表證。必見下利清

穀。及諸寒證也。然太陽少陽。水氣。三者之乾



嘔皆不離乎寒也

○傷寒表不解。乾嘔身熱微喘。或自利而效。小青龍湯

○汗出痞悶。脇下引痛。乾嘔短氣者。十棗湯

○手足厥冷。乾嘔及噦而煩滿者。橘皮竹茹

湯

○太陰腹滿。乾嘔。理中湯。加橘皮。半夏

○少陰病下利。脈沉細。乾嘔。乾姜。附子湯

○乾嘔而煩。厥逆無脈。白通加猪膽汁湯

○裏寒外熱。脈微欲絕。乾嘔。通脈四逆湯

○膈上有寒飲。乾嘔。四逆湯。加吳茱萸。生姜

○厥陰乾嘔。吐涎沫。頭痛。吳茱萸湯

○凡乾嘔。表證及水寒留飲。與陰寒內拒。治

各不同。其聲濁惡而長。有胃虛。氣逆。停飲。虛

寒。熱。死生之辨

○凡傷寒。邪未入府。或其人本虛。故攻其熱

必噦。言胃虛不能食。人誤用寒藥。或飲冷水

所致。理中湯。加丁。附。渴而小便不利者。加桂

苓

○傷寒而腹滿。視其前後。知何部不利。利之

則愈。此熱氣壅鬱。上下不通。而噦也

○有潮熱時々噦。小柴胡湯。加茯苓。後與大

柴胡。嘔噦手足逆冷。橘皮。半夏湯。若胸滿虛

煩。橘皮竹茹湯

○胃氣寒者。理中湯。加吳茱萸

○噦不止。橘皮半夏湯。橘皮竹茹湯。去竹茹。

加乾姜。桂心。通草

○凡噦而二便不通者。屬實熱。厥逆自利為

虛寒。兼嘔逆者。為停飲。設非此三種。則為胃

之氣垂絕之候。多難治。若有疝瘕動氣。又當

別論不可忽也

●噫氣 胸中氣不交通也。靈樞曰。寒氣客

於胃。厥逆從下上。復出於胃。則噫氣

○傷寒汗下後。噫氣不除者。旋覆代赭石湯

●呃逆 氣上逆而為吃忒也。或為欬逆者

誤也。按欬逆上氣。為欬。嗽氣逆。非呃逆也。以

呃逆為噦者。亦非也。噦者其聲濁惡而長。呃

逆者纔發咽喉。則遽止。呃々然連續數聲。而

短促不長。有因胃熱失下。濁氣不得下降。逆

上而作。脈必應指有力。證必內實便閉。口渴。

此非真嘔也。當下之。大棗氣湯。便軟者。生姜瀉心湯。胃虛有熱者。橘皮竹茹湯。胃中有痰飲而作。氣口脈必弦滑大於人迎。橘皮半夏湯。有因誤服寒涼。或飲冷水。水停心下。胃中虛冷而作。脈必結代。橘皮竹茹湯。去竹茹。加乾姜。桂心。通草。名橘皮乾姜湯。不應加丁香。五六粒。平素胃虛少食者。加姜汁。炒焦白朮。二三錢。或附子理中湯。此為交水。勿疑代脈死證也。

○若往來寒熱而嘔者。是邪將入裏。裏不納。邪逆上衝。激而然也。此屬少陽。以小柴胡和之。不應加黃連。乾姜。桂枝。

○若氣自臍下。直衝於胸。噎間。呃逆者。此為肝腎虛寒之極。而挾陰火上衝。其脈必沉細。知不在胃也。病既下虛。內已伏陰。或誤用寒涼。遂至冷極於下。迫其相火上衝。而為呃逆。真氣欲盡也。輕則附子理中。加柿蒂。姜汁。重則四逆湯。加丁子。沉香。面赤者。急投菴活附子散。亦有得生者。

菴活附子散 治腎虛肝火上逆。呃逆陰躁。

菴活

半高

附子

炮半

茴香

微炒

木香

一作丁香

乾姜

炮各

一錢

右為末。每服二錢。入鹽一捻。水煎微溫服。

○病人煩躁。自覺甚熱。他人以手捫其肌膚。則冷。此無根失守之火。散亂而為熱。非實熱也。乃水極似火。陰極似陽之假熱。誤用涼藥。下咽則斃。急宜附子湯。加姜。桂。丁。沉。下黑錫丹。或菴活附子散。溫之。呃逆漸止者。可愈。服藥不効者。難已。

○畜血。腹大青筋。發呃者。不必治。呃。代抵當湯。每服加人參一錢。熟附子五分。乾漆灰二分。或桃核養氣。加參。附。乾漆灰。更據此。九死一生之候。非此不能奪。

○凡久病而見呃逆者。此真氣已衰。不治。呃逆。脈散。舌短。灰黑及頭汗。不得尿。與大便自利。而腹滿者。皆不治。

●腸鳴。邪氣內搏其飲。則為腸鳴。雖有寒熱之不同。無不因積飲所致。下後身熱不除。心下痞。腹中雷鳴。下利者。瀉心湯。選用若腹。痛便秘。勢劇當下者。小棗氣湯。加茯苓。半。木香。姜汁。虛加人參。腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆。

滿嘔吐者。附子粳米湯

●欬嗽。悉屬於肺。故傷寒中風暴嗽。皆為表證。非虛勞久嗽。裏證之有藏府。傳次不同也。

○傷寒欬嗽。為肺寒停飲。及邪傳半表半裏。亦有陰寒內結者。

○如水與表邪相合而欬。則乾嘔發熱悸。小青龍湯

○裏澀合水動肺而欬。則身涼脇下引痛。十棗湯水與裏相合而欬。則腹痛自利。四肢疼重。真武湯

○邪傳半表。將入於裏。而欬。則寒熱胸脇脹滿。小柴胡。去參。加枳。桔

○陽邪傳裏而欬。則四逆泄利。下重。四逆散加枳。桔。橘紅

○有少陰發熱而欬。則脈沉無頭痛。麻黃附子細辛湯

○有陰寒內結而欬。則自利腹痛。四逆湯加五味。子細辛

○太陽陽明合病而欬。則身熱腹滿。自利。葛

根湯

○陽明少陽合病而欬。則嘔而腹滿。小柴胡加葛根

○凡外感風寒。欬嗽發熱。頭痛鼻流清涕者。必先發散為主。若寒鬱熱邪欬嗽。則痰唾如膠。金沸草散加減

○熱邪傷肺欬。必咽腫腫痛。萎蕤湯加減

○大抵外寒欬嗽。當以汗解。然又有不可汗者。經曰。欬而小便利及數。不可發汗。發汗則四肢厥逆。又欬而發汗。蹇而苦滿者。并宜小建中湯。若脈散者。為心火淫於肺金。鬼賊相刑。必死也

●喘。形寒飲冷。則傷肺。故氣上衝而喘也。有邪氣在表而喘。則心腹濡而不堅。外證發熱脈緊。身疼痛。冬月麻黃湯。餘時越婢湯。邪氣外盛。壅遏清道。使氣不利而喘。雖經汗下。亦可發之

越婢湯

麻黃<sup>六兩</sup> 石膏<sup>半斤</sup> 生姜<sup>三兩</sup> 大棗<sup>十五枚</sup> 甘草<sup>二兩</sup>  
右五味。以水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。

煮取三升。分溫三服。○惡風者。加附子一枚。風水。加朮四兩。

○惡風自汗。發熱而喘。桂枝湯。加厚朴。杏仁。麻黃杏仁甘草石膏湯。治汗下後。汗出無

大熱而喘。

麻黃四兩 杏仁五十箇 甘草二兩 石膏半斤  
綿裹

右四味。以水七升。先煮麻黃。減二升。去上沫。

內諸茶。煮取二升。去滓。溫服一升。

○誤下。脈促。汗出而喘。葛根黃芩黃連湯。

○發汗後。飲水多者。必喘。五苓散。

射于麻黃湯。欬而上氣。喉中水雞聲者。此水

飲支塞肺道也。此湯主之。

射于三錢 麻黃四錢 細辛一錢 紫菀一錢 欬冬花各三錢

五味子各二錢 半夏各二錢 生姜三片 大棗二枚

右以先煮麻黃。去沫。內諸茶。煎成。去滓。分三

服。

○有邪氣在裏而喘。必心腹脹滿。內實不大。

便外證自汗。短氣潮熱。脈實大。大棗氣。加厚

朴。杏仁。

○有水氣上衝而喘。必欬悸乾嘔。小青龍湯。

小腹痛。小便不利。去麻黃。加茯苓。

○凡陰證厥逆。脈沉細而喘促。無汗者。可治。

四逆湯。加五味子。細辛。若發熱。脈沉而喘。麻

黃附子細辛湯。

○凡喘。慎不可用升麻。用之則愈喘。即內傷

勞役。氣虛發喘。當用補中益氣者。芍非清陽

下陷。亦須煨葛根代之。

○諸喘為惡。故非輕也。華元化曰。盛則為喘。

言肺中邪盛。而腎虛也。所以陰證發喘。尤為

惡候。斷喪之人。腎氣上乘而喘。急用腎氣丸。

雜以黑錫丹。導火歸元。然多不效。加以動息。

搖肩。戴眼。直視。汗出。厥逆者。立斃。大抵邪壅

上盛。正氣欲脫。必至喘。

●短氣。似喘非喘。呼吸短促。而不相續。為

實。少氣。不足以息。為虛。當隨證治之。

桂枝二越婢一湯。表證不解。其人面色緣々。

正赤。煩躁不安。不知痛處。而短氣。脈濇者。

桂枝 芍藥 甘草各一兩 生姜二兩

大棗四枚 麻黃八錢 石膏二十四兩  
碎綿裹

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去

上沫。內諸菜。煮取二升。去滓溫服。

○汗吐下後。元氣虛弱。脈微氣不相續者。大

建中湯

四逆加人參湯 陰證。脈沉遲細弱。手足厥逆。

口鼻難以布息者。宜此湯。

四逆湯。加人參一兩。

○陽明病。內實潮熱。不大便。腹滿短氣者。三

姜氣湯。選用。

○渴欲飲水。水停心下。短氣妨悶者。茯苓甘

草湯。小便難者。五苓散。

○乾嘔短氣。心中懊懣者。梔子豉湯。

○短氣而胸腹脹滿。脈沉者。是氣滯。沉香降

氣散。方見氣門

○大抵心腹脹滿。按之鞭痛。而短氣者。為裏

實。若心腹濡而不滿。為表邪。若少氣不足以

息。脈微弱者。為虛。此大法也。

●氣逆 氣自腹中。時逆上衝也。太陽病下

之後。其氣上衝者。此引邪內犯。而裏不服邪

也。可與桂枝湯。方用前法。不上衝者。此裏已

受邪。不可與之。

瓜蒂散 病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈微

浮。胸中痞鞭。氣上衝咽喉。不得息。此胸中實。

此湯宜吐之。

瓜蒂 一分熬黃 赤小豆 二分

右二味。各別搗篩為散。已合治之。取一錢匕。

以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取

汁。和散溫頓服之。不吐者。少々加。得快吐乃

止。

茯苓桂枝白朮甘草湯 脈微者。不可吐。吐之

則心中逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發

汗則動經。身為振々搖。此湯主之。

茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 二兩 甘草 二兩

右四味。以水六升。煮取三升。去滓分溫三服。

○厥陰氣上撞心。此寒熱錯雜之。烏梅丸。黃

連湯。主之。

烏梅丸 方見喪門

○病如虛羸。少氣。氣逆上衝。欲吐者。竹葉石

膏湯。

○有動氣。誤發汗。氣上衝而熱者。紫胡桂枝

湯二者皆正氣虛而邪氣逆也

●渴 傷寒邪氣在表則無渴邪氣傳裏則熱耗津液是以能消水也法曰身熱為熱在表引飲為熱在裏故傷寒熱病本末身涼不渴及小便不黃脉不數者未之有也

○夫渴者熱傷津液於內故欲引飲以助陰祛熱也熱甚則多飲而旋飲旋渴胃虛則但欲熱湯而畏寒飲若陰盛虛陽上迫而為假渴則渴不能飲或飲不能嚥若強飲一二口頓即吐

○三陰熱證俱有煩渴脉浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽明自利而渴屬少陰至於厥陰消渴飲水不止則熱之甚

○太陽表邪傷肺水飲不散乾嘔發熱喘嗽而渴小青龍湯去半夏加括蕒根

○熱邪傳裏則煩渴引飲而脉數小便不利為犯本五苓散

○陽明經病壯熱自汗鼻乾目疼煩渴自利葛根湯若有病內實蒸蒸潮熱燥渴飲水大便閉者三葉氣湯選用

○少陽脉弦口苦咽乾發熱而渴心煩喜嘔而渴脇滿脇痛而渴心下痞滿而渴往來寒熱而渴並宜小柴胡去半夏加括蕒根舌上胎白而渴去芩半加葛根乾燥更加括蕒根表未解腹滿便悶用大柴胡湯

○凡先不渴服藥汗茶而渴及先嘔後渴者皆為欲解先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯兼眩悸嘔噦赤茯苓湯

赤茯苓湯 治傷寒停水嘔噦

赤茯苓 人參 陳皮各一 白朮姜汁拌  
半夏姜汁 川芎各五 生姜三片

右水煎不拘時服

○凡發汗吐下後口燥咽乾而渴此津液衰少腎水不升虛火上炎也竹葉石膏湯

○下利脉數而渴飲不能多者防圍血白頭翁湯

○凡傳次陰經熱證口燥咽乾心下鞭痛急下之若直中陰經寒證口不燥咽不乾而喉中自渴不能飲脉沉者急溫之故少陰病心煩自利而渴脉沉小便色白者此下焦虛寒

故飲水自救也。真武湯。若面赤煩躁，身反熱而口渴者，此陰盛格陽也。白通加猪膽汁湯。○欬而嘔渴，小便不利者，猪苓湯。

●漱水 不欲嚥，胸中無實熱也。如陽明身熱，目疼，此熱在經，欲作衄也。犀角地黄湯。去生地，加甘艸、桂枝。若見表證，鼻衄者，為熱傷經絡，迫血妄行，慎勿輕犀角。地黃湯當詳衄血例治。

○若無表證，腹滿按之雖痛而濡，其人善忘如狂，小便自利，大便色黑，口煩，但欲漱水，不欲嚥者，為有瘀血結於下焦，輕則桃核養氣，重則抵當湯，下盡黑物，乃愈。

○少陰病，手足冷，時々煩，但欲漱水，而不能飲，或勉強飲下，少頃復吐，或飲水而嘔，或噦逆者，皆屬內寒。四逆湯證也。厥陰下利無脈，乾嘔煩渴，漱水者，白通加猪膽汁湯。厥陰煩躁吐衄，口燥舌乾，時欲凉水浸舌，理中丸加烏梅，不時噲之，蓋無根失守之火，遊於咽嗑之間，假作燥渴，終不能飲也。或有能飲不吐者，此則熱耳。

●衄血 經絡熱盛，迫血妄行於清道也。經曰：以桂枝、麻黃治衄，非治衄也。乃欲解散，經中邪氣耳。太陽衄血，及服桂枝湯，致衄者，為欲解。若衄而成流者，少刻自解。若點滴不成流者，此邪氣在經也。若脈浮緊，身疼痛，發熱無汗者，麻黃湯汗之。三時感冒衄者，香薷散。加葱、豉，或參蘓飲汗之。蓋邪熱在表，不得汗，迫血妄行，奪其汗，則血自止。又當止血為急，不可拘執也。若脈不浮緊，身無熱者，切不可發汗。

○陽明口乾鼻燥，漱水不能嚥，頭痛目睛暈黃，寸脈數盛者，必衄。

○衄血而渴，欲飲水，水入即吐者，先服五苓散，次用竹葉石膏湯。

○誤發少陰汗，下厥上竭，口鼻耳目出血者，難治。與當歸四逆湯。衄不止者死。止而頭眩者，亦死。

○衄家不可發汗，言陰血本虛也。黃耆建中湯，誤汗動血，加犀角。

○傷寒衄血，吐血不止，誤用犀角等涼劑，致

血留心胸之分而滿痛者。一味木香。酒磨。不時呷之。

○大抵衄血吐血。脉滑小者生。脉實大者死。吐血後脉微弱者易治。若熱反盛。脉反數急者不治。

○凡衄不止。而頭汗出。身無汗。及發汗不至者。難治。

○內傷勞役大衄。陰火乘虛驟衄。及久衄不止等雜證。不在此例。

●吐血 多有在經表邪。吐血皆屬傳經裏證。以當汗不汗。熱毒入內。迫血妄行。從胃脘而出也。凡見眼閉。唇紅。神昏。語短。眩冒。迷妄。煩躁。漱水。驚狂。在識語。背寒。足冷。四肢厥逆。胸腹急滿。便黑。溺頻。皆瘀血證也。不必悉具。但見一二證。便宜犀角地黄湯。然其性大寒。能凝滯瘀血。須證諒虛實寒熱加減。虛者去地黃。加阿膠。血餘。炙甘草。童便。實者。加酒大黃。茜根。穿山甲。寒加炮薑。炙甘草。熱者。加芩連。木香。

犀角地黄湯

犀角 鎊磨 水更佳

生地黄 酒浸 搗爛

牡丹皮

白芍 各

右除地黃。水煎去滓。入地黃。更煎數沸。濾清。

加藕節汁。扁柏汁。并磨京墨。攪令黑色。服之。

○腹中有瘀血。未下。加桃仁。紅花。酒大黃。若

腹不滿。自言滿。為無熱。減地黃。二汁。加木香。

○陰虛火炎之血。則凝結。如朱漆。獨參湯。下

六味丸

○血虛而熱。雖赤不結。黃連阿膠湯

○胃虛則不甚赤而散。四君子。加廣皮。木香

救逆湯

治太陽病。脉浮數。反灸之。必驚狂。起臥不安。

咽燥吐血

桂枝 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

蜀漆 三兩

龍骨 蜀

牡蛎 五兩

右為末。以水一斗二升。先煮蜀漆。減二升。內

諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

○咽喉塞。不可發汗。發汗則吐血。黃耆建中

湯

○誤發少陰汗。動血者。當歸四逆湯

○本虛損吐血。入復。感寒嗽血。黃耆建中湯。



輕者。只用桔梗湯。加葱豉。

○凡嘔吐血水多者。為肝藏久傷。或胃敗所致。多不可治。

○虛損內傷吐血。詳各門。

●唾膿血 吐血雖主於火。然有虛實之殊。至唾膿血。無不因邪熱鬱發所致。服桂枝湯吐者。其後唾膿血也。此非特酒客輩。素多濕熱。蘊積而然。每見春溫誤行汗下不解。多有此變。宜葶藶苦酒湯下奪之。

●熱入血室 衝為血海。即為血室。衝脈得熱。則逼血下行。男子亦有是證。不獨婦人也。○凡血滯不行。則脈乍滿乍數。或沈或伏。若血熱交併。則洪盛。血虛則芤虛。中有瘀則芤中帶弦。此一定法也。

○如陽明證下血。讖語。此為熱入血室。但頭汗出。當刺期門。隨其實而瀉之。澱然汗出。則愈。如欲用藥。小柴胡合犀角地黄湯。熱甚神昏者。生地黄連湯。稍加酒大黃。微利之。以有瘀血。故頭汗也。

生地黄黃連湯 治婦人血風崩漏燥熱不除。

循衣撮空。閉目不省人事。

生地黄 酒浸

當歸

川芎

各三錢

白芍

酒洗

黃連 酒蒸

黃芩 酒炒

山梔

姜汁炒黑

防風

酒潤

右水煎。徐々呷之。脈實者。可加酒大黃。

○婦人中風。往來寒熱。經水適來。即斷血結在裏。為實證。故刺期門以瀉之。不善刺者。以小柴胡去參。加桃仁。丹皮。歸尾。穿山甲。以消之。

○婦人中風。寒熱。經水適斷。血結。如瘡狀者。此言經行未盡。而適斷。雖有結。未為全實。小柴胡。加當歸。丹皮。生地。涼之。

○婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則讖語。如見鬼狀者。此言經行不斷。則熱不留結。勿謂讖語。而誤用硝黃。犯其胃氣。刺動營血。犯其中焦。柴胡和解。犯其上焦。但不妄犯熱。隨血散。自愈也。

○血弱氣盡。邪正相搏。結於脇下。默々不欲食。邪高痛下。而嘔者。小柴胡湯主之。

●畜血 傷寒太陽病。當汗不汗。則瘀熱在裏。血結也。大抵胸脇小腹鞭滿。以手按之痛。

小便不利。乃氣滯不行。而為溺悶。若乾嘔。致引脇下痛者。為水飲。五苓。十棗證也。若小便自利。大便黑亮。其人如狂者。為蓄血。桃核養氣。代抵當湯。選用。

己下。脈數不解。消穀善飢。六七日不大便者。此有瘀血。抵當湯。

○若產後感冒。或停食。瘀血不行。腹脹喘逆。此血化為水也。下瘀血湯。不應急加人參。乾漆。灰。

下瘀血湯 治瘀血

大黃 一兩

桃仁 二十枚

蟅蟲 二十枚

熬去足

右為末。煉蜜和作四丸。以酒一升。煮一丸。取八合。和滓頓服之。衄血下。如豚肝。

○陽明病。其人善忘。大便黑。胸中痛。不可近者。為蓄血也。犀角地黄湯。加大黃。然溘膩如漆者。為蓄血。若黑燥如煤者。為燥血。非蓄血也。○蓄血證。舌胎有邊白。中黑而極薄潤。必無乾躁焦黃者。以血屬陰。無大實故也。內傷。雜證。蓄血。不在此例。

●動氣 築々然跳動。見於臍之上下左右

也。以其人脾氣素虛。水結不結不散。即發動氣。狀如奔豚。但動氣時散奔豚則固結不散也。又病人素有痞積。亦為動氣。皆不可汗下。誤下則腹滿拘急。身雖熱。反欲蹶臥。無論左右上下。通宜甘草乾姜湯。加茯苓。桂心。或理中。去朮。加桂。苓。痛甚。加吳茱萸。附子。以朮閉氣。桂泄奔豚也。

○誤汗動氣。則氣逆上衝。或心中大煩。目暈欲嘔。引飲則吐。或骨節痛。通宜五苓散。去朮。倍桂枝。茯苓。或柴胡桂枝湯。減參。朮。加苓。橘。緣參。朮。益氣。苓。橘。散氣。

○凡傷寒。動氣。必須審問。非脈可知也。

●振 森然若寒。聳然振動。皆責為虛寒也。振近於戰。而其勢稍輕。戰則鼓慄而戰。振則虛而不爭。但聳動耳。蓋由發汗吐下太過。致損血氣。虛極而作也。

○傷寒吐下後逆氣衝胸起。則頭眩身振々。動搖者。茯苓。桂枝。白朮。甘草湯。

○太陽病。發汗不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身潤動。振々欲擗地者。真武湯。

●戰慄 陰陽爭勝。故身為之搖也。邪氣外與正氣爭。則為戰。邪氣內與正氣爭。則為慄。戰者身戰寒聳。正氣勝故得汗而解也。慄者心慄鼓頷。而身不戰。陰氣盛。正虛不能勝邪。遂成寒逆也。

○有傳經戰慄。脈實便秘者。大柴胡湯。

○傷寒夾冷食。而內懷寒逆。不得解者。甘草乾姜湯。表邪勢盛。而戰五積散。陽虛不能作汗而慄。再造散。始病無熱而慄。手足逆冷者。理中湯。背惡寒者。附子湯。誤發汗而慄。四逆湯。加人參。

○壞證寒慄。正氣虛極也。十全大補。人參養營。大建中湯。選用。

○傷寒六七日。或十餘日。戰汗不當用藥。大法血隧熱壅。須用硝黃。氣隧寒滯。必用桂附。陰陽之用不同。有形無形故也。

●肉瞤筋惕 非常々有之。經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。發汗過多。津液涸少。陽氣偏枯。筋肉失其所養。如魚失水。故惕々然動。瞤々然跳也。

○發汗過多。厥逆筋惕肉瞤者。真武湯。若惡寒。去芍藥。增附子。惡熱。減附子。倍芍藥。

○素有動氣。誤行發汗。筋肉振跳者。理中湯。加桂附。茯苓。

○素常失血之人。經脈失養。時々筋惕者。大劑溫補自愈。若不因汗下。始病便見此證者。必元氣久虛。或失血房勞後。及新產感冒。致有是證。若誤用表藥。必無生理。

●瘈瘲 瘈者筋脈急而縮也。瘲者筋脈緩而伸也。此證多屬虛風。蓋風主動搖。故爾傷寒汗下後。傳變此證。病勢已劇。能用去風滌熱之劑治之。間有生者。大率過汗經虛發瘈。不殊。古人悉從小續命。加減。殊不知。壞病變見此候。皆是脾虛生風之象。雖有六經形證。斷不可復用表藥。惟大建中湯。加減。為當。有熱去桂附。茯苓。加芍連蠅。稍之類。

○若瘈瘲戴眼。反折汗出如珠。為太陽絕。又四肢攣習動而不止。似瘈瘲而無力。抽搐者。為肝絕也。

●怫鬱 乃陽氣蒸越於頭面。聚而不散。故

緣々而赤。緣々者。有時不赤。有時忽赤。若有所因。而愧赧之狀也。

○傷寒發汗不徹。或覆蓋不周。或早揭衣被。致陽氣怫鬱在表。面色緣々正赤。躁煩。不知痛處。桂枝二越婢一湯。

○若腹滿潮熱。脈洪大而數者。因大便不通。火氣炎上。而作赤色。大柴胡湯。

○汗吐下後。胃中虛冷。外氣怫鬱而畏寒。厥逆脈微者。理中湯。外有微熱。加桂枝。內寒甚者。加附子。

○若下元虛人。誤下傷陰。陽氣發越。而身熱目陷。手足逆冷者。不治。

○戴陽。面赤如微酣之狀。陰證冷極發躁。面赤脈沉細。為浮火上衝。水極似火也。凡下虛憊之人。陽浮於上。與在表之邪相合。則為戴陽。已戴於頭面。而不知者。更行表散。則孤陽飛越。危殆立至矣。節庵立法甚妙。以人參附子等藥。收拾陽氣。歸於下元。而加葱白。透表以散外邪也。至於傷風誤用麻黃重劑。發汗亦有戴陽煩躁者。與傷寒無異。總由平素

下虛。是以真陽於上越耳。

○下利清穀。裏寒外熱。脈微欲絕。面赤咽痛者。通脈四逆湯。加葱白。

○下利清穀。脈沉遲。面少赤。白通加豬膽汁湯。

○大抵陽邪在表之怫鬱。必面合赤色。而手足自溫。若陰證虛陽上泛而戴陽。面雖赤。足脛必冷。不可但見面赤。便以為熱也。

●四逆。手足逆冷。四肢溫也。厥逆者。四肢有時自溫。有時冰冷也。然自熱而至逆。逆而厥。皆傳經之邪也。

○少陰病四逆。或欬。或悸。或小便不利。或腹中滿痛。或泄利下重者。四逆散。若手足厥冷。大便秘。小便赤。脈沉而滑。小養氣湯。

○若初病便厥冷。四逆而脈沉者。當從陰寒例治。

○又始本陽證發熱。因誤服寒冷過多。或汗下太過。致變四逆者。當從壞證例治。

●足冷手不冷。下焦衛氣不溫也。外感而夾寒食傷於太陰。身熱足冷。或頭痛。或腹痛。

此胃中陽氣不得下通也。甘草乾姜湯。理中。五積選用。甚至有臍下結痛。不可按。及下白膿者。此燥屎內結。大腸液傷。而下也。改用消導利氣藥一劑。後與調理。

○有下元素虛之人。病傷寒中風。惡寒發熱。但陽縮足冷者。當從夾陰例治。

●厥 逆冷之極。周身氣逆。手足厥冷是也。蓋諸陽起於四肢。厥為陽氣鬱伏可知。

○厥逆。雖有寒熱不同。無論傳經直中。俱屬陰經。皆不可發汗。少陰證但厥。無汗而強發之。必動血。

○夫陽厥者。先是三陽經感寒。起於頭痛發熱。惡寒。已後傳進三陰血分。變出四肢厥冷。乍溫。大便燥實。譫語發渴。揚手擲足。不惡寒。但惡熱。脈來沉滑而數。重按有力。此皆傳經熱厥。外證雖厥冷。內則熱極耳。蓋因大便失下。血氣不通。故手足乍冷乍溫。唇與爪甲青紫。此熱極反兼水化之義。大柴胡。小柴氣。四逆散。選用。

○肢體厥冷。惟心胸有熱。大便秘者。解毒湯。

涼膈散。最當

○陰厥者。三陰經受寒。初起無身熱。頭痛。便惡寒。四肢厥冷。直過肘膝不溫。唇與爪甲青黑。欲引衣踈臥。二便清利不渴。或腹痛泄利。清穀。或凜慄。面如刀刮。或口吐涎沫。或乾嘔。呃逆。脈來沉細無力。直中陰經寒厥。理中。四逆。附子湯。選用。

○若陰極似陽。格其虛陽於外。厥逆煩躁。面赤戴陽。虛陽上膈。則渴欲飲水。而不能嚥。脈來數疾無倫。按之全無。此為虛陽發露。通宜白通。通脈。四逆。溫之。

○傷寒壞病。多有厥逆煩躁者。不獨陰極也。當分陰傷陽傷。用藥最為切用。陰傷。則宜滋補。先天真陰。兼清血中之熱。陽傷。則宜溫養。後天胃氣。兼助下焦真陽。貴在臨證活法。不得如陰厥陽厥倒治也。

○痰厥。手足逆冷。脈乍緊。心下滿而煩。飢不能食。瓜蒂散吐之。

○食厥。手足逆冷。上部有脈。下部無脈。急作法。操吐之。

○傷寒厥而心下悸者。當先治水。茯苓甘草湯。後治厥。小柴胡湯。

茯苓甘草湯

桂枝<sup>二兩</sup> 茯苓<sup>三兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 生姜<sup>三兩</sup>

右四味。以水四升。煮取二升。去滓分溫三服。

○吐利厥逆。煩躁欲死者。吳茱萸湯。

○少陰脈不至。厥冷昏沉。如死人狀者。名曰

屍厥。宜從陰毒治之。

○厥逆下利。反驟能食。而脈不至。或散疾無

倫者。為除中。不治。

○凡厥逆。惡寒。蹇臥。煩躁。下利。不知人者。皆

惡候也。藏厥。虵厥。治例別具本條。

●蹇臥。身蹇而手足不伸也。凡人冬月獨

寢。則蹇曲不伸。天氣稍暖。則手足舒暢。安有

蹇臥之理。故一見倦臥。即屬陰寒可知。然太

陽經表邪。未化。為熱及發熱之初。惡寒未罷。

亦有蹇臥者。故凡見頭痛發熱。諸陽證。即為

太陽無疑。

●唇甲青。色之青者為寒。赤者為熱。以寒

中於裏。則血脈凝滯。不能營行於外。所以唇

爪青黑也。若熱毒流入於裏。而為熱厥。則唇

甲亦青。但青中必帶深紫。與陰寒之青黑不

同。試觀產婦以舌青。驗子死。唇青。驗母死。則

知青黑為陽氣竭絕。不得與青紫渾稱也。

●咽喉乾痛。非大熱則為大寒。治之一誤。

死生立判。如太陽病。誤下誤汗。亡陽漏風。及

熱傳陽明。熱傳少陽。熱傳少陰。寒中少陰。種

種不同。不可驟以為熱盛也。

○夫咽者。胃之門。熱邪傳入陽明。則咽但乾

而不痛。若熱毒熱盛。亦有燥渴引飲而痛者。

但須以表熱裏實。分經府。而汗之。

○陽明病。頭眩能食而效。必咽痛。茯苓桂枝

白朮甘草湯。

○若六七日。不大便。熱蒸頭痛。面熱咽痛者。

調胃養氣湯。

○若脈弦脇痛。而見口燥咽乾。則屬少陽。

○有汗下後。虛煩口燥。咽乾。竹葉石膏湯。冬

月小柴胡。去半夏。加括蕒根。

○有太陽病下之。若脈浮緊者。必咽痛。此邪

熱仍在膈上也。小建中。加桔梗。

○有大汗不止。亡湯漏風。而咽痛。脉反沉緊者。此陽虛而陰氣上乘也。桂枝加附子湯。白朮附子湯。選用。

白朮附子湯

白朮兩 附子三枚 甘草二兩 生姜三兩 大棗十二枚

右五味。以水六升。煮取二升。去滓分溫三服。○有表邪傳少陰經。而咽痛者。以其經上循喉嚨故也。其脉必數。而有力。其證必躁渴。引飲。便溺悶澀。短赤。急當下奪。以泄其熱也。○少陰病。咽痛。四逆。泄利下重者。四逆散。○若口燥咽乾。而渴。腹脹不大便。或下利。純清臭水者。急下之。大承氣湯。

半夏散及湯

治風熱挾飲。上攻少陰。欬而咽痛。

痛

半夏洗去溼水

桂枝

甘草各等分

右三味。各別搗篩。已合治之。白飲和服。方寸匕。日三服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煎三沸。下火冷。小勺噉之。苦酒湯。前症陰邪上結。咽瘡聲不出者。

半夏十四枚洗為塵末

雞子一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味。內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀鐮中。安火上。令三沸。去滓。少少含噉之。不差更作三劑。

○若直中陰經。而咽喉驟痛。不腫不渴。始病無發熱。頭痛脉來沉緊而細。其證嘔吐清水。瀉利清穀。便溺清利。或躁極悶亂。渴不能飲。脉來疾數無倫者。此寒氣客於少陰之經。虛陽上逆之候。陰故暴。陽即不暴耳。四逆湯。附子湯。急溫之。

○少陰病。下利清穀。裏寒外熱。脉微欲絕。喉痛面赤者。通脉四逆湯。加葱白。桔梗。○若腎水本虛。而龍火盛。必挾涎飲於上。所一發。即腫痛閉塞也。急破破出血。湧泄痰涎。後以六味丸。酌許。濃煎牛膝。麥冬。五味湯。調化類服。

○凡陽邪上逆。而咽痛。宜甘寒以解其熱。并噲蜜煎黃蘗。以佐之。陰寒閉塞。而咽痛。當辛溫以散其結。并蜜煎附子。以佐之。

●失音不語。失音者。語而聲音不揚也。雖有寒熱之殊。皆屬少陰經證。亦有因肺氣受

傷者。以肺腎本為子母。子傷而母氣亦傷。故雖主於肺。而實不外乎腎也。至於不語。則神識昏憤。又當歸之於心。亦有因邪鬱陽明者。以陽明為心之子。陽明邪實。則經絡不能流通。致火熱薰灼。心肺所以神昏。即中風喉瘖。舌瘖亦不外乎此也。

○有寒客少陰。咽痛失音。脉沉。背惡寒者。附子湯。若發熱脉沉。麻黃附子細辛湯。

○傷寒誤用辛熱。發散太過。而肺燥失音。六味丸。加麥冬。五味。

○誤用苦寒。斂肺聲瘖。貪水欲衄者。文蛤散。即麻黃杏仁甘草石膏湯加文蛤姜枣

文蛤散

文蛤 五兩

右一味。為散。以沸湯。和一錢匕。服湯用五合。○傷寒暴瘖。與虛勞久病聲啞不同。蓋虛勞吐血失音。不久必死。若肺絡受傷。而啞者。雖數年不愈。亦不死也。

○傷寒口噤不語。有五。有身熱自汗。神昏不語。又手冒心者。此汗多傷營。心神失養也。當

溫養藥中兼調管氣。使微汗。表裏和自愈。

○有陽明存實。胃氣不能上通。而不語者。調胃兼氣湯。下之。

○至於瘖病口噤。不能言。暴怒氣厥。不能言。具各本條。

●喉痺 熱毒陷於厥陰也。傷寒而至喉痺。邪氣深矣。蓋厥陰為陰中之陽。最易發熱。龍火每挾毒邪。涎飲。痺着於少陰之經。以陰從陰。故陰中火發。必發於喉。火性上炎。故也。

○凡厥逆發熱。熱多寒少。或發癰膿。或唾膿血。或咽痛喉痺者。皆熱邪有餘之候。雖傷寒。與溫病。熱病。天行。病大頭。及雜證。濕痰。鬱火。等。驟發之。喉痺種々不同。而為陰火亢害。則一。其治法。皆可默悟矣。

●頭眩 頭旋眼黑也。或言眩眊。眩運。眩冒者。似是而非。眩為眼黑。眊為眼花。運為轉運。冒為昏冒。皆少陽證也。靈樞云。上虛則眩。下虛則厥。眩雖為虛。而多有屬風者。蓋風主運動故耳。

○傷寒口苦。目眩者。此少陽表邪傳裏。表中



陽虛故也。小柴胡湯

○吐下後。虛煩。痞滿。氣上衝。胸起則頭眩。此陽虛也。陽明病。頭眩不惡寒。能食而厥。此水飲也。並宜茯苓桂枝白朮甘草湯

○諸逆發汗。轉劇。言亂目眩者。不治。失頭眩。種々皆真氣衰奪。痰因火運所致。未有因實而致眩者。故仲景治頭眩。皆用溫經補陽之藥。至如少陰下利止。而頭眩時々自冒者。不治。此虛極而脫也

● 鬱冒 鬱。為鬱結。冒。為昏冒。如物蒙罩其首。若霧靄中。恍惚不清。較之眩運。尤重。世謂昏迷是也。經言。諸虛乘寒。則為厥。鬱冒不仁。此寒氣乘虛。中於人也。故鬱冒不仁者。當以附子湯。加乾姜。溫之

○太陽病。先下之不愈。仍復發汗。表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈者。汗出表和。故也。若不得汗。桂枝人參湯。下虛脈微。少加附子

○太陽病。重復發汗。陽虛耳聾。而又手自冒者。慎勿誤用小柴胡。宜大建中湯

○又病人。以叉手冒胸。循衣摸床。讖語昏冒。不知人事。此心火上炎。逼肺。肺氣不能自持。所以神昏不可誤認風證。節庵升陽散火湯

人參 酒拌二錢 多至五錢

白朮 二錢 生用

茯苓 一錢 五分 桂酒拌

陳皮 五分 多至一錢

麥冬 二錢 炙

當歸 一錢

芍藥 一錢 五分 桂酒拌

陳皮 五分 多至一錢

麥冬 二錢 炙

柴胡 七分

黃芩 一錢 酒炒

生姜 三片

大棗 三枚

右水煎熱服。無時取微汗。○痰。加半夏。便燥。讖語。加大黃。泄瀉。加升麻。倍白朮

○新產惡露不行。鬱冒。詳本門

● 不仁 為不柔和。內經謂之肉苛是也。以其血氣虛少。不能周流於身。為邪氣所伏。是以肥體頑麻。不知痛癢。厥如死屍。而且鬱冒也。脈浮。桂枝麻黃各半湯。脈數。甘草乾姜湯。桂枝人參湯。脈虛。十全大補湯。大建中湯。○若脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。為命絕

● 心悸 築々然怔忡。不能自安。其證有三。一者氣虛而悸。一者汗下後悸。一者停飲而悸也

○汗下後。正氣內虛。邪氣交擊。而悸。較之。氣虛尤甚。

○停飲者。由飲水過多。水停心下。心為火。惡水。不能自安。而為悸也。

○傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯。  
○寒熱往來。小便不利。心煩喜嘔而悸。小柴胡湯。

○傷寒。脈結代。心動悸。灸甘草湯。  
○少陰病。四肢逆冷。而心中悸者。四逆散。加桂苓。

○大陽病。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯。

○發汗後。其人臍下悸。欲作奔豚。茯苓桂枝甘艸大棗湯。

○大陽病。發汗不解。仍發熱。心下悸。頭眩身軀動。振々欲擗地者。真武湯。

○太陽病。小便利者。以飲水多故。心下悸。茯苓桂枝甘艸白朮湯。小便利者。必苦裏急。豬苓湯。

○飲水多。水停心下。悸而惕々不安者。茯苓

甘草湯。五苓散

○凡停水而悸。心下怔忡。或厥者。雖有餘邪。必先利水。免致內瀆。而成自利外瀆。而腫脹也。

○驚惕 心中惕然動悸。皆火迫吐下所致。如太陽病加溫鍼必驚也。

○又太陽病。脈浮宜以汗解。妄以火迫之。必驚狂。起臥不安。救逆湯。

○火逆下之。因燒鍼。煩躁而驚狂者。桂枝甘草龍骨牡蛎湯。

○少陽有三禁。妄加吐下。邪犯少陽之本。而驚煩胸滿。小便不利。讖語身重。不可轉側者。柴胡加龍骨牡蛎湯。

○不得眠 陰虛則盡夜不得眠。陰盛陽虛。則嗜臥不欲起。亦有至夜安靜。而晝日煩躁。不得眠者。此汗下後。暴傷其陽氣所致也。

○傷寒邪熱傳裏。陰為陽擾。所以眠臥不寧。蓋陽主動。動則使人煩心。不得眠。若邪氣在表。必無熱邪內擾之理。故少陰雖有煩心不眠。皆以傳經熱證。而非直中陰寒。陰主靜。靜

則多眠。安有反不得眠之理。

○不得眠有數證。皆為陽盛。切禁溫劑。惟汗吐下後。虛煩脈浮弱者。因津液內竭。則當從權。用真武湯。溫之。此太陽壞病治例。而非少陰寒之謂也。

○如下之後。復發汗。盡日煩躁。不得眠。夜而安靜者。用乾姜附子湯。亦是暴傷津液之故。非陰證也。

○又太陽病。二三日。不得臥。但欲起。心下結。脈微弱者。用理中湯。亦是因寒飲在胸中。所以宜溫。而不宜下。下之利不止。其外此皆不可用溫也。

○汗下後。虛煩不得眠。梔子豉湯。  
○胃中有燥屎。大熱錯語。喘滿神昏。不得眠。大棗氣湯。急下之。

酸棗仁湯

汗下後。亂夢。心煩。乏氣。狂言。不得眠。此湯主之。

酸棗

知母

茯苓

川芎

甘草

右水煎。臨臥溫服。

○表邪失汗。傷陰身大熱。善忘時驚悸。乾嘔錯語。呻吟。不得眠。犀角地黃湯。

○五六月大便不行。腹脹不鞭。按之不痛。舌乾微胎。而渴者。炙甘草湯。

○少陰病得之。二三日已上。心煩不得眠。黃連阿膠湯。欬而嘔。心煩不得眠。猪苓湯。

○中氣虛。而寒痰沃膽。時覺怔忡。晝夜不得眠。溫膽湯。

溫膽湯

見不得臥。

○傷寒壞病。久不愈。常不得眠。或心脾氣血素虧。而驚悸不寧。不得眠。諸藥不効者。大劑獨參湯。並用送下養正丹。

○差後不得眠。竹葉石膏湯。

●多眠。衛氣晝則行陽。夜則行陰。行陽則指。行陰則寐。蓋陽虛陰盛。則目瞑多眠。若始病無表證。而見畏寒。嘔泄。知病不在陽分。而為直中陰寒。無疑。惟風邪深入。而見頭痛。發熱。神昏。多眠者。方為表證。則宜解表為先。若得汗後。脈沉細身涼。嗜臥者。此陽邪去。而陰氣自復。可不藥而愈也。設胸滿脇痛。風熱內

攻而喜睡者。小柴胡加桔梗枳殼

○少陰病始得之。但欲寐。尺寸俱沉。細微弱者。四逆湯

○少陰病欲吐不吐。或欲嘔不嘔。心煩多寐。自利而渴。小便色白者。真武湯。若復煩熱。不得臥者。難治

○凡脈微細欲絕。或躄臥。惡寒。向壁。或身重。逆冷。皆屬少陰。宜附子湯

○凡胃中有熱者。亦欲多眠。但神昏氣麤。而大熱絕不似少陰之倦臥足冷

● 吐厥 雜病吐蚘。責於熱。傷寒吐蚘。責於

寒。殊不知皆是胃虛邪盛。寒熱錯亂所致。所以仲景烏梅丸。證 辛熱苦寒。補瀉并用。而

獨不用甘草者。蓋蚘聞甘即起。聞酸即止。聞苦即定。見辣則頭伏而下。設不知此。純用辛

熱之藥。則吐逆轉劇。誤用純苦之藥。則微陽頭絕。危殆立至也。金匱又有甘草粉蜜湯。絕

用甘味者。此又治久病胃虛。不得食而吐病之藥。不可因此礙彼也

○有初見表證。即吐蚘者。此必夾食所致。但

與二陳湯中倍生姜。烏梅。加細辛。川椒。紫蘓。廣皮。藿香之類自安。 ○少陽寒熱往來。嘔

而吐蚘者。三瀉心湯。黃連湯。選用

○若腹滿不大便。熱甚昏憤。而吐蚘者。當用大柴胡。去大棗。加黃連。烏梅。微利之

○厥陰病。消渴。氣上撞心。飢不欲食。食即吐。蚘。蓋中焦寒極。而無根失守之火。浮於上焦。

故能消水。宜連理湯。用烏梅肉粉丸。川椒湯服。若大便難者。加酒製大黃。蜂蜜。微利之用。

丸不用湯者。取滓入蟲口也

○吐上膈。煩躁昏亂欲死。兩手脈沉遲。足冷便秘者。多難治。若蚘色赤而活。或多者。屬胃熱。猶可治之。蚘色白而扁者。屬胃敗。必不治也

○凡人胃脘忽痛忽止。身上忽熱乍涼。面上乍赤乍白。脈條亂候靜。口中吐沫不食者。便是吐厥之候

● 藏厥 胃中陽虛。不能生化脾土。則脾藏氣衰不運。不運則水穀不化。胃氣不運。經脈不通。故周身皆冷而厥也

○傷寒脉微而厥。至七八日。膚冷。其人躁無  
暫安時。此為藏厥也。附子理中湯急溫之。

●狐惑及蠱。皆蟲證也。傷寒失汗不解。多  
日傳變。三蟲求食。則為狐惑。蓋腹中有熱。入  
食無多。腸胃空虛。故三蟲求食。而蝕入存藏  
也。金匱云。狐惑之病狀。如傷寒。默默欲眠。目  
不得閉。臥起不安。蟲蝕於喉。為惑。上唇有瘡。  
蝕於陰。為狐。下唇有瘡。不欲飲食。惡聞食臭。  
其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部。則聲啞。甘  
草瀉心湯。又云。脉數無熱。微煩。默默。但欲臥  
汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目  
四眦黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散。  
蝕於下部。則咽乾。苦參湯洗之。蝕於肛者。雄  
黃導之。近世通用。黃連犀角散。加槐子。桃仁。  
煎服。

赤小豆當歸散

赤小豆

三升浸水  
芽出曝乾

當歸 十兩

右為散。漿水服。方寸匕。三服。

黃連犀角散

黃連

一匙五分  
酒蒸

犀角

生者鎊  
三錢

木香

五分

烏梅

右水煎。去滓溫服。

●百合病 即痿證之暴者。以肺熱葉焦。氣  
化不行。致小便不利。又肺為百脉之總司。故  
通身經脉廢弛。所以百脉一宗。舉身皆病。無  
復經絡傳次。皆由大病虛勞之後。藏府不調  
所致。其證似寒無寒。似熱無熱。欲食不食。欲  
臥不臥。口苦小便赤。藥入即吐利。脉微數。尿  
則頭痛者。六十日愈。頭不覺痛。但淅然惡寒。  
四十日愈。尿則快然。但頭眩者。二十日愈。百  
合地黃湯。隨證加減。蓋取百合之清肅肺氣。  
以利水道。則周身之熱自化耳。

百合地黃湯

百合

七枚

生地黃汁

一升

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。  
更以泉水二升。煎取一升。去滓內地黃汁。取  
一升五合。分溫再服。中病勿更服。大便當如  
漆。○發汗後。去地黃汁。加知母。下後去地黃  
汁。加代赫。滑石。吐後。去地黃汁。加雞子黃。病  
變發熱者。用乾百合。滑石。為散。飲服方寸匕。  
日三服。一月不解。變成渴者。以百合一升。水

一斗漬之。一宿熱以洗身。洗已食煮餅。勿鹽豉。洗後渴不瘥者。以括萋根。牡蛎等分。為末。飲服方寸匕。日三服。

●陽縮 夾陰傷寒。身熱頭痛。足冷陽縮。及三陰中寒。陰盛格陽。煩躁面赤。陽縮入腹者。皆真陽內餒。不可與厥陰經熱極囊縮比例而推也。治法詳夾陰三陰例中也。

○陰陽易。女勞復。陽縮入腹。舌吐出者。不治。●舌卷囊縮 傷寒傳至厥陰。邪熱內伏。陽氣不得外通。所以經脈縮急。反而有似陰寒之狀。以肝主諸筋故也。故凡舌卷縮。從三陽熱證。傳至厥陰。而見此證者。乃肝氣燔灼。木受火困。而不得舒縱。為熱極危殆之候。男子則囊縮。婦人則乳頭縮也。指掌以囊縮。用小兼氣。然必脈實。便秘。口渴。煩滿之極。方可下之。若脈浮下利者。宜當歸四逆湯。脈細厥寒者。加吳茱萸。

○若始病無熱。便厥冷無脈而見。此證乃厥陰虛寒。內則經脈失養。而引急不舒。外則肢體蹇曲。而下部不溫。乃肝氣垂絕之候。急用宜四逆湯。加吳茱萸。肉桂。溫之。并灸關元。氣海。及葱熨法。

○傷寒食鬱中宮不化。久而變熱。痰聚胸中。則聲音不清。舌短強鞭。而囊不縮。宜調中飲。○又寒疝往々。有囊縮。罽丸引急。而舌不卷者。四逆湯。加吳茱萸。茴香。

●直視搖頭 直視者。目上瞪而不能動也。經曰。直視搖頭者。心絕。狂言目反直視者。腎絕。直視喘滿者死。若戴眼反折。汗出如貫珠。不流者為膀胱絕。反折。言目珠左右不定也。戴眼。謂黑睛反視不下也。皆不治。

○瘕病直視。搖頭者。非心絕。風主動搖故也。○若目中不了了。猶能視物。但半昏不見。此非直視也。讖語不大便者。宜大養氣湯下之。○亡血家。發汗直視不能駒。是誤汗傷其血。故皆急不能卒視。當大補氣血為主。不可使以為死證也。

●遺尿 小便自出。而不知也。

○陰證下體。逆冷遺尿者。即死。

○若病久脈和。身體肌膚柔澤者。此膀胱虛。

寒之極也。附子湯。加益智。沉香。補骨脂。

○汗下後不解。陰虛火動。而遺尿者。以葦汗虛表。肺金氣傷。加之膀胱津少。不能約制也。生脉散。加黃耆肉桂。

●循衣撮空。皆為死候。而仲景又云。循衣摸床。直視。識語。大黃氣湯下之。脉弦者生。瀉者死。小便利者可治。詳此證。非大實。即大虛。當審其因。察其脉。參其證。而分治之。實而便秘。大黃氣湯瀉之。虛而便滑。獨參湯補之。厥逆加附子。若亡血者。又當與生地黄黃連湯也。

●絕汗。胃中陽衰。不能溫養分肉。營衛失職。而然也。傷寒環口。顰黑。柔汗發黃者。脾絕。陰毒面青黑。額上手背冷汗不止者。營衛絕。皆死。大抵氣絕則汗出。如珠。着身不流。氣散則汗出。如油。喘而不休。皆是絕證。若虛極冷汗。淡汗不止。皆非吉兆也。

●勞復。大病新差後。氣血尚虛。餘熱未盡。宜安臥靜養。設或早起勞動。則血氣沸騰。而發熱為勞復矣。非但強力遠行也。梳頭沐浴。則動氣。憂愁思慮。則傷神。况過用力乎。諺云。諸勞皆復。御女者死。諸食皆復。犯酒最劇。酒色之害。甚矣哉。

○傷寒之傳。自表至裏。有次第焉。勞復則不然。見其邪氣之復來也。必迎而奪之。不待其傳也。經言大病差後。勞復者。枳實梔子湯。○傷寒差後。更發熱者。小柴胡湯。脉浮以汗解之。脉沉實者。以下解之。

○起居不時。虛熱躁渴。喘嗽氣乏者。竹葉石膏湯。去半夏。石膏。加京棗。名千金勞復麥門冬湯。

○身熱食少。無力。補中益氣湯。○大抵勞復。食復二證。醫識得秘妙。則不致張皇。若先病七日汗出。今復發。亦七日汗出。先十四日汗出。今亦十四日方解。若疫證三四次。復發。三四次。戰汗不為慮也。

○食復。土虛不能勝穀氣也。經云。熱病少愈。食肉則復。多食則遺。此其禁也。

枳實梔子鼓湯。治食復病已差。尚微煩。不了者。以虛不勝穀氣。故令微煩。損穀則愈。若

有停滯宜此湯加大黃

枳實三枚 梔子十四枚 豉一升

右三味以清漿水七升空煮四升內枳梔煮取二升下豉更煮五六沸去滓分溫再服覆令微似汗

○若關脈洪大煩渴譫語腹痛不大便或發熱大柴胡下之虛弱微熱理中湯溫之

○大病新差飲酒必復以酒味辛熱助其餘邪熱毒故也脈弦大者小柴胡加葛根黃

連烏梅若脈洪大者竹葉石膏或小劑黃連解毒湯

●女勞復 犯房勞而復者為女勞復犯者

多死其候頭重不舉目中生花腰背疼痛少腹裏急絞痛或憎寒發熱陰火上衝頭面開

熱心胸煩悶者必用燒裨散以韭根一大把鼠糞百餘粒煎湯調下虛極熱盛者節庵道

遙湯調服若腹急痛脈沉逆冷者當歸四逆湯加吳茱萸調服仍以吳茱萸升許酒拌炒

熨小腹若手足攣拳陽結入腹脈離根者不可救

燒裨散

右取婦人中裨近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈

婦人病取男子裨糞燒灰

●陰陽易 新差與婦人交而婦人反病者

為陽易婦人病新差與男子交而男子反得病為陰易此近世所分古人總謂之陰陽易

也男子則陰腫少腹絞痛婦人則裏急腰膝內痛頭重不舉目中生花有時陰火上頭面

關熱胸中煩悶甚者手足攣拳百節解散男子陽縮入腹婦人痛引陰中皆不可治必舌

吐出而死如無死證可治者用燒裨散以五苓散加韭根鼠糞煎服熱甚者以逍遙湯調服總欲使邪火從小便中泄去也

逍遙湯 治陰陽易

人參二錢 知母一錢 黃連五分 甘草一錢

滑石六錢 生地一錢 柴胡一錢 犀角一錢

竹茹五分 韭根一把 生薑三片 大棗三枚

右水煎去滓溫服入燒裨散末一錢五分調服有粘汗出為效不汗再服小水利陰頭腫



即愈

●遺熱 傷寒差後。半月十日以來。終不惺。惺錯語少神。或寒熱似瘧。或煩熱頰赤。脈來浮數而軟。此先前發汗未徹。餘熱留在心包也。奉議節庵。俱主知母麻黃湯。即麻黃湯中。去杏仁。而加知母。黃芩。芍藥也。余嘗用竹葉石膏湯。加麻黃治之。更捷。若寒熱如瘧。小柴胡。倍人參。為當。

●發頤 傷寒汗出不徹。熱遺少陽。結於耳後。或耳下其形鞭腫者。名曰發頤。見之速宜消散。緩則成膿為害也。連翹敗毒散。

連翹敗毒散

菴活 前胡 柴胡 甘草 川芎

午房子 荊芥 防風 連翹 紅花

升麻 歸尾 穿山甲

右水煎。去滓溫服

○若脈浮數。能食者易治。若沉緊。或牽革。反大發熱不能食者難治。腫連面上者。必加白芷。葱白。以通陽明之經。若大便燥實。加酒大黃。外用赤小豆末。雞子清調敷。慎不可用寒

涼敷藥。若發即隱下。不能起發者。真氣內乏。毒邪內陷。最危之兆。即用十全大補湯之類。亦多不救。

●喜唾 病新差後。口中喜唾不止者。此少火氣衰。中土不溫。不能約制津液也。理中圓。加益智仁。以收攝之。

●差後浮腫 大病後。腰以下至足腫。而重者。有水氣也。牡蛎澤瀉散。急攻之。輕者只用五苓散。加大腹皮。牡蛎。但不可延緩。緩則上支胸脇難救矣。但面腫而足不腫者。為胃虛。養胃湯。去草菓。加防風。但足腫而重者。為脾弱。當節其飲食。用補中益氣湯。溫補之。勿拘下腫為水。不辨虛實。而混治也。

牡蛎澤瀉散

牡蛎 澤瀉 括蕒根 蜀漆洗去腥

葶藶 海藻洗去鹽 商陸根熬各等分

右七味。異擣下篩為散。更入臼中治之。白飲和服。方寸匕。小便利。止後服。日三。

脫方

桂枝二麻黃一湯 主治大要。同桂麻各半湯

桂枝一兩十

芍藥六兩

甘草一兩二

生姜六兩

大棗五枚

麻黃六兩

杏仁十六

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。

麻黃附子甘草湯

少陰病得之。二三日。此湯

微發汗。以二三日無裏證。故微發汗。

麻黃二兩

附子一枚炮

甘草二兩炙

右三味。以水七升。先煮麻黃。一兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

柴胡桂枝乾姜湯

傷寒五六日。已發汗而復

下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。此湯主之。○傷寒六七日。發熱微惡寒。肢節煩痛。微嘔。心下支結。外證未去者。柴胡桂枝湯主之。

柴胡半斤

桂枝

乾姜

黃芩

牡蠣各三

括蔞根四兩

甘草二兩

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。微煩。復服。汗出使

愈。

柴胡加芒硝湯

傷寒十三日不解。胸脇滿而

嘔。日晡所發潮熱。已而復微利者。知醫以圓藥下之。非其治也。潮熱者。實也。宜此湯。

柴胡半斤

黃芩

人參

甘草各三兩

半夏半斤

生薑三兩

大棗十二枚

芒硝六兩

右八味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。內芒硝。再煎。取三升。溫服一升。不解。更服。

半夏瀉心湯

心下滿而不痛者。此為痞。

半夏半斤

乾薑

甘草炙

人參

黃芩各三兩

黃連二兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

赤石脂禹餘糧湯

下利與理中。利益甚。理中。

治中焦。此利在下焦。此湯主之。

赤石脂

禹餘糧各一斤

已上二味。以水六升。煮取二升。去滓。三服。

梔子甘草湯

梔子豉湯證。而少氣者。主之。

梔子十四枚

香附子四合

甘草二兩

右三味。以水四升。先煮二物。得二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分為二服。溫進一服。得吐者。止後服。

梔子生薑湯 梔子豉湯證而嘔者主之

梔子十四枚 香豉四合 生薑

右三味以水四升先煮二物得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服

梔子乾薑湯 傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

梔子十四枚 乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服

桔梗湯 少陰病二三日咽痛者可與甘草湯

不差者與桔梗湯甘草湯 甘草二兩 右一味以水三升煮取一升半

桔梗二兩 甘草二兩

豬膚湯 少陰病下利咽痛胸滿心煩者主之

豬膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服

陽毒陰毒

○陽毒者面赤斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治

活人陽毒升麻湯 治虛熱勢盛不能化者

升麻 犀角各二錢半 射干 黃芩各二錢 人參 甘草各一錢

水煎溫服取汗

○陽毒一二日間誤用辛熱發汗或誤吐下壯熱頭項痛躁悶不安或狂言罵詈妄言妄見或口唾膿血面生錦紋或舌卷焦黑鼻如烟煤或咽喉腫痛下利黃赤六脈洪大而數人參白虎湯

○咽喉痛者 犀角玄參升麻甘草等分煎服

○熱毒大盛時狂時昏 口噤咬牙藥不得下先用水一盒用絹裹指蘸水漬牙候牙關放寬狂亂稍定方與服藥 三黃石膏湯

○脈洪大者 黃連解毒湯

○夏月熱甚狂躁悶亂不安 脈洪數者用新汲水或黃連水青布四五尺作摺絞搭病人胸前熱即易之須臾得睡効睡即去之

○陰毒之為病。面目青。如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。

甘草二錢 當歸一錢 雄黃五分 鼈甲一錢五分

右水煎溫服。即升麻鼈甲湯。去升麻。蜀椒者者也。

○陰寒極甚。反大熱亦。曰陰毒。大熱躁渴。四肢厥逆。脈沉細而疾。或尺中部短。而寸口大。額上冷汗不止。六七日後。胸前手足。發出淡紅小斑。雖盛夏。禁用涼藥。附子理中湯。甚則身重。眼暗疼。額上冷汗。嘔噦呃逆。或瓜甲青。或腹絞痛。或面赤足冷。厥逆躁渴。身發青黑斑。口鼻灰色。舌黑而卷。莖與囊皆縮。六脈沉細而遲。或伏而不出。或疾至七八至。已上不可數者。急用葱餅於臍上。熨之。隨用

附子散

附子炮七錢五分 桂心 當歸

白朮各半兩 乾姜炮 半夏各二錢五分

生姜三片。水煎溫服。暖覆取汗。人行十里計。未汗再服。四逆湯。加人參。白朮。芍藥。茯苓。用之熨之。手足不和暖者不治。

感冒

芎藭散

感冒。惡寒。發熱。骨節疼痛。無汗。或嘔逆。人迎脈緊盛。

紫蘓 柴胡各二錢 川芎 葛根

枳殼 桔梗 陳皮 半夏

茯苓各一錢 甘草七分 生姜三片 大棗一枚

右水煎熱服

參蘓飲

感冒。惡寒。發熱。痰喘咳嗽。

陳皮 枳殼 桔梗 甘草各五錢

木香 半夏 紫蘓 葛根

前胡 人參 茯苓各七錢 易簡方不用木香

右十一味。每服四錢。水一盞半。生姜七片。棗一箇。煎至六分。○初咳。加杏仁。棗白。久嗽。加五味。烏梅。○頭痛。加川芎。細辛。○妊娠。去半夏。加香附。

○夾食感冒。氣口脈緊盛。亦有滑數者。夾寒。食滯滯。或人迎沉小。不似外寒。或人迎極短小。氣口極弦細。其人自言。傷食受寒。服發散。兼消導之藥。一二劑。脈反浮大也。

**藿香正氣散** 治傷寒頭痛增寒壯熱上喘咳嗽  
 ○四時不正之氣夾食及瘴濕霍亂吐之  
 ○私曰紫蘓者惟發皮膚表邪藿香運轉脾  
 以自內發之此湯雖無夾食而亦寒疫之要  
 劑也

藿香一錢 白朮霍亂轉筋 換木山 五分 厚朴 白芷痰食氣滯 換木香 各一

陳皮各八分 半夏一錢五分 口渴去之 茯苓 桔梗各一

大腹姜湯炮腹 脹用之 各一錢 自汗去之 紫蘓各一錢 自汗去之 甘草五分 嘔吐去之

薑棗水煎○大腹皮乃傳寫之誤古方用蒼  
 朮○太陽加羌活防風陽明加葛根葱白少  
 陽加柴胡半夏天氣未熱加桂枝佐羌活○  
 腹痛加芍藥寒腹痛加肉桂○食不化米穀  
 加麩麥魚肉加草菓○心下痞加枳實青皮  
 ○時氣憎寒發熱加柴胡葛根○口渴小便  
 不利合五苓散○心腹絞痛加木香○頻欲  
 圍不通加枳殼○外寒重去白朮加蒼朮羌  
 活內傷重加砂仁神麩○尸厥飛尸卒厥此  
 即中惡之候也因冒犯不正之氣忽然手足  
 冷肌膚栗起頭面青黑精神不守或錯言妄  
 語牙緊昏不知人頭旋暈倒此卒厥客忤鬼

擊吊死入廟登塚有此疾以蘓合香丸灌之  
 俟蘓以此湯加木香南星殊驗○飲酒而傷  
 風發熱吐逆加葛根烏梅

不換金正氣散 治時氣不正感冒夾食寒疫  
 濕疫若四方人不服水土宜服之

厚朴 蒼朮 藿香 陳皮

半夏 甘草各等分

薑棗水煎○頭痛加川芎白芷○寒腹痛加  
 乾姜肉桂○咳嗽加桔梗杏仁○無汗加紫  
 蘓葛根○潮熱加柴胡黃芩○嘔逆加丁香  
 砂仁○身體痛加麻黃桂枝羌活芍藥之類  
 ○兩足浮腫加木瓜大腹五加皮○声啞加  
 石菖肉桂○時氣加香豉唯瘟疫禁用

香蘓散 治四時瘟疫傷寒○感冒非時六經  
 不分者主之

香附浸姜汁 勿炒 紫蘓各二 陳皮一兩 甘草半兩

水煎或入姜葱○頭痛加川芎白芷名芎芷  
 香蘓散○陽明風熱頭痛如擘加石膏葱白  
 ○自汗加桂枝芍藥○無汗加麻黃葛根○  
 發熱加柴胡黃芩○咳嗽加桔梗五味或半

夏杏仁○咽膈不和。加桔梗○胸膈痞。加枳殼。半夏○飲食不化。加砂仁。青皮○嘔吐惡心。不止。加丁香。半夏○夾食。夾氣。胸膈脹滿。壯腹痛疼。頭痛身痛。發熱。加烏茶。川芎。麻黃。羌活。枳殼。名行氣香薷散。

升麻葛根湯 治大人小兒。時氣溫疫。頭痛發熱。肢體煩疼。○鮮利陽明經。發熱斑疹。○寒暄不時。人多病疫。乍暖脫衣。感冒邪氣者。主之。

升麻三錢 葛根 芍藥 甘草各二錢

右水煎○一方。各用等分。芍藥酒製○發斑。加犀角。熱甚。更加黃連。玄參。虛。更加人參。○頭痛。加葱白。○咳嗽。膈熱。加桑白。黃芩。薄荷。○無汗。加麻黃。○咽痛。加甘。桔。○發斑。丹毒。加玄參。

金沸草散 秋時感冒。咳嗽。

旋覆花 麻黃 前胡各七分 荆芥一錢

半夏 甘草 芍藥各三分

右生姜三斤。大棗一枚。水煎。

小青龍湯 見傷寒 治冬時感冒咳嗽。

消風百解散 前症兼濕者。宜此湯。

荆芥 麻黃 陳皮

蒼朮 白芷 甘草各等分

生姜烏梅水煎。

加味白朮澤瀉散 酒客濕熱。素盛。痰飲結聚。中外。最易傷風。其證身熱。鮮隨汗出。如浴。惡

風少氣。

澤瀉 白朮生各五錢 黃耆三錢 葛根

防己 羌活 麻黃各五錢

水煎熱服。取汗肥盛濕熱多者。導痰湯。加羌活最當。

○有接內偶感微風。藏於腎經。則內風與外風相召。極易傷風。其證面腫。然腫。不能正。偃。偃則咳。小青龙湯。去麻黃。加杏仁。甚則加附子。先去客邪。次用 真武湯。治本。然後更以腎氣丸。調理。

八解散 治感冒飲食勞倦者。

六君子湯加藿香一兩。厚朴二兩。

○天時寒暖。偶因脫露。謂之傷風。私曰。非時。寒。疫。寒。暖。脫。露。謂之傷。其證必效。嗽。自汗。清。風。二者總謂之感冒。

涕發熱。頭痛。春月宜芎藭散加減。夏月宜葛根葱白湯。兼暑者。消暑十全散。秋月宜金沸散。冬月桂枝湯。效甚而喘有水氣。小青龍湯。

葛根葱白湯

川芎

葛根

芍藥

知母

各一圭五分

葱白覆

生薑二片

水煎

增損葛根葱白湯 治感冒頭痛

本方去知母。加甘草。大棗。

葱白香豉湯

連鬚葱白七莖

香豉一合

生薑一兩

水煎

傷風與傷熱相似。傷風則人迎浮大。咳嗽自汗。鼻流清涕。痰必從口中嗽出。發散則愈。傷熱則氣口軟大。咳嗽自汗。鼻乾。痰結。咽腭腫痛。痰從腭咯出為異。不可發散。宜辛涼清肺為主。萎蕤湯。去麻黃。川芎。加前胡。薄荷。傷風而復傷熱。必加躁煩。宜萎蕤湯。倍菴活。石膏。

萎蕤湯

治風溫。欬嗽。及冬溫發熱。頭眩咽乾。

舌強

萎蕤一圭五分

石膏二圭

白薇

麻黃

川芎

葛根

菴活

甘草

杏仁

青木香各一圭

水煎

感冒惡寒。發熱。頭痛甚。脈沉而細數。敗毒散。加倍肉桂。方見時疫。

神効沃雪湯

傷寒感冒。四時初發。總司

蒼朮

乾姜炮

甘草炙

厚朴姜

芍藥

乾葛各四兩

水煎。加半夏亦好。

溫病

風溫。溫疫。冬溫。溫毒。溫瘧。

溫病之發。必大渴煩擾。胸滿口苦。不惡寒。惡熱。脈氣口反盛於人迎。雙解散。去硝。黃。加葱豉。欲下者。用本方。

雙解散 治溫熱病表裏大熱

防風

麻黃

薄荷

川芎

連翹

當歸

芍藥生

大黃酒洗

芒硝各半兩

石膏

黄芩酒洗 桔梗各一兩 甘草二兩 白朮姜汁 荆芥各五分

山梔各兩 滑石三兩

右為散。每服三錢。加生姜三片。水煎去滓。温服。

○温病更遇於風。為風温。前方主之。

麻黃升麻湯 温病誤發其汗。為風温者。麻黃

升麻湯。去麻黃。升麻。乾姜。白朮。

麻黃二兩 升麻二兩 當歸一兩 知母一分 葶藶十八銖

石膏 白朮 乾姜 芍藥 天門冬

桂枝 茯苓 甘草各六銖

右十三味。水煎。

●風温。風痰結聚於肺。故汗下兩難。若發熱

頭眩。咽喉乾痛。舌強痞滿者。葶藶湯主之。

無大熱而渴者。括蕒根湯主之。熱不解。用

敗毒散主之。寒熱而渴者。小柴胡湯。加

葶藶。桔梗。惡寒發熱。小柴胡。去人參。加括

蕒根。石膏。渴者。去半夏。加括蕒根。

括蕒根湯 治風温無大熱而渴

括蕒根一兩 石膏二兩 葛根一兩

防風 人參 甘草各五分

水煎熱服

●温疫者。温病將發之時。或發之後。更感時

行疫氣。其證渾身壯熱。昏々不爽。相傳染盛

於春夏。此證多作渴。小柴胡。去半夏。加石膏

知母。躁熱不識人。輕則涼膈散。見熱病。重則

雙解散。大便泄瀉。黃連解毒湯。見時疫。表裏

俱熱。亦涼膈散。

嘔血者。生犀飲。見時疫。便實。加大黃。便滑。用

黃土。虛。加鹽水炒人參。

內外熱極盛。三黃石膏湯。見時疫。外熱甚。用

麻黃。內熱加大黃。

●冬温者。冬時非節之暖。不正之氣。人感

之而病者。名曰冬温。其證必心煩嘔逆。咽痛。

身熱。頭痛。或咳嗽。自汗。或頭重。面腫。但始先

咽痛。後必下利。陽脉浮滑。陰脉濡弱。治法與

傷寒大異也。陽且湯。加桔梗。葶藶。

陽且湯

桂枝湯。加黃芩。

若寒停結。或誤用寒涼藥食。則寒邪外鬱。温

邪中結。內伏。加入乾姜一味。以散邪。咽痛



甚者。合甘草湯。○下利。合茯苓甘草湯。○欬。合桔梗湯。○先受冬温。更加嚴寒外。則外證。雖惡熱。煩燥。而仍畏寒。欲近衣者。加麻黃石膏。○下利。陽且湯。加葛根。茯苓。不應。葛根黃連黃芩湯。

○冬温。誤用辛温發汗。而發斑。成温毒。升麻葛根湯。加犀角。玄參。若熱毒陷入於裏。心下煩悶。嘔逆咳嗽。甚則身體俱赤。狂亂躁渴。咽喉腫痛。狂言下利。而發斑。最為危候。斑如錦紋。身熱煩躁。而無燥結者。黃連解毒湯。○躁悶狂妄。而無汗者。三黃石膏湯。○自汗煩渴。而發斑。人參化斑湯。○煩熱錯語。不得眠。白虎合黃連解毒湯。○斑不透。犀角大青湯。斑透熱不止。本方。去黃芩。加人參。生地。柴胡。發斑熱毒。熱甚咽痛心煩。狂言。悶亂。犀角黑參湯。雖大便不通。勿用下劑。惟宜犀角地黃湯。斑色紫者為危候。黃連解毒湯。合犀角黑參湯。若斑色黑而平下。坑爛。脈虛小。自利者。不治。其失於汗。夾食陰斑。詳本門。

○温病七八日。或十餘日。前熱未除。重感寒。

忽然寒熱交作。變為温瘧。其證胸脇滿煩。渴而嘔。微寒者。去人參。半夏。加括蕒根。石膏。○無寒但熱。其脈如平。骨節煩疼者。白虎湯。加桂枝。

○發熱 凡春時發熱。頭痛煩渴。飲水為伏氣發温。

○頭痛 温病熱病。時行疫癘。初起頭痛。不可用表劑。宜黃芩湯。白虎湯。加葱。豉。或葛根葱白湯。以治外。涼膈。雙解。達原。承氣。加葱。豉。薑。棗。合內外而治之。裏氣一通。頭痛自愈。

○頭脹 冬温。陽且湯。風温。萎蕤湯。

○無汗 温病熱病。無汗。黃芩湯。白虎湯。三黃石膏湯。選用。

○自汗 温病誤服表劑。大汗出。煩渴不解。脈洪大者。白虎湯。

○盜汗 温病熱病。得汗後。大熱除。而盜汗出。小柴胡。去人參。半夏。加橘皮。

○懊懺 温熱病。懊懺。為熱毒蘊畜於膈上。涼膈。解毒。選用。口燥。呻吟。錯語。不得眠。五苓散。合黃連解毒湯。

○發斑 温熱病。胃熱發斑。錯語。神昏熱甚。而下證未全者。黃連解毒湯。加犀角。黑參。大便秘者。涼膈。合五苓散。去桂。加滑石。未經下。而胃熱發斑者。白虎加人參湯。熱勢盛者。合黃連解毒湯。

○自利 冬温發熱。咽痛自利。心煩。陽且湯。加桔梗。茯苓。

○温病發熱而渴。小便赤澀。大便自利。脈浮者。五苓散。去桂。加黃芩。脈沉。豬苓湯。温熱內甚。而自利不止者。黃連解毒湯。

○下利 温熱毒邪內盛。而利不止。黃連解毒湯。躁悶狂乱者。三黃石膏湯。

○嘔吐 温熱病嘔吐者。火惟上炎也。無問表裏通。涼膈散。嘔吐煩渴者。白虎湯。

○欬嗽 温病熱病。欬嗽。黃芩湯。白虎湯。并加蘆根。竹葉。若煩悶。則涼膈。雙解。選用。

○渴 冬月發熱。頭疼二三日。即咽痛而渴。名曰冬温。陽且湯。加萎蕤。桔梗。

○温病發熱。而渴。黃芩湯。加括蕤根。蘆根汁。若有暴感客邪。加葱白。香豉。

○唾膿血 冬温誤用辛甘發汗不解。復大下之。致胃氣虛寒。邪伏陰中。而見寸脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。唾膿血者。麻黃升麻湯。萎蕤湯。選用。或增損而用。

○戰慄 温病發戰。涼膈。兼氣。加姜。棗。下之。必大汗而解。

○瘕瘕 風温被火。微黃煩驚。時發瘕瘕者。萎蕤湯。加減。

○沸鬱 温病。面赤。煩躁。沸鬱。飲水沸鬱。小柴胡。去半夏。加括蕤根。

犀角大青湯 治斑出大盛。大熱心煩。狂言悶亂。

犀角<sub>二錢</sub> 大青<sub>二錢</sub> 黑參<sub>五分</sub> 升麻 黃連

黃芩 黃蘗 山梔<sub>各一錢</sub> 甘草<sub>八分</sub> 右水煎。熱服無時。○本方。去芩。連黃芩湯。

黃芩<sub>三兩</sub> 甘草<sub>二兩</sub> 芍藥<sub>二兩</sub> 大棗<sub>十二枚</sub> 右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。温服一升。加半夏。生姜。名黃芩半夏湯。

熱病

交夏至後。炎暑司令。相火用事。人有發熱。身疼。不惡寒。而但惡熱。而渴者。為熱病。○温病。熱病之脉。或浮緊者。乃重感不正之暴寒。寒邪束於外。熱邪結於內。○温病熱病之脉。多在肌肉之分。而不甚浮。且右手反盛於左手。其左手盛。或浮者。必有重感風寒。否則非温熱病。自是非時之暴寒耳。然温病之發。因暴寒者居多。熱病之發。兼暑暘者為甚。面垢為遺尿。治法凉膈散。合天水散。

凉膈散

連翹 梔子 黄芩 薄荷 大黃酒

芒硝各二錢 甘草五分 大棗一枚 葱白一莖

水煎。○凡熱病。表熱多。裏熱少。凉膈除葱。一錢。天水散二錢。裏熱多。表熱少。凉膈散二錢。天水散一錢。表裏俱熱。凉膈。天水。各一錢五分。表熱極盛。裏有微熱。身疼頭痛。或嘔。或眩者。亦用二方各半也。皆不可欠葱白。○甚者。大柴胡。合大兼氣。若更不解。不可復用峻攻。

小柴胡湯。合黄連解毒湯

白虎湯

熱病。中熱。難為辨別者。此湯主之。或白虎加人參湯

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合

水煎。米熟湯成。加人參。白虎加人參湯

●無汗 熱病發狂。有汗者生。無汗者死

●盜汗 三陽合病。目合則汗。熱病。白虎湯。

傷寒。小柴胡湯

●讖語 三陽合病。讖語面垢。遺尿。白虎湯

●小便不利 熱病脉洪大。自汗出。舌乾。飲

水。小便不利者。白虎加人參

●渴 熱病渴。欲飲水。口乾舌燥者。白虎湯。

皆微惡寒者。加人參。○熱病汗下後。煩渴欲

飲水者。少々與之

●戰慄 熱病發戰。白虎合解毒。有裏證者

凉膈雙解下之

●沸鬱 熱病煩渴。引水面赤。白虎加人參

湯。內實不大便。凉膈雙解。選用。下後熱不解。

或解半日許。復熱面赤者。黄連解毒。人參白

虎。選用

●厥 熱病厥逆。不大便而腹滿。背惡寒。脉浮滑者。白虎湯。沉滑者。承氣湯。

●失音不語 熱病瘖啞。不能言者。此熱毒鬱發表裏。上下不通也。當與白虎。涼膈等。熱服汗之。得汗即甦。無汗則死。

時疫

時疫。其始先陽氣鬱伏。凜々惡寒。甚則四肢厥逆。既而陽氣鬱發。中外皆熱。發即昏々。不爽。壯熱自汗。發渴。

○服藥從外解者。或發斑。或戰汗。狂汗自汗。盜汗。其從內陷者。胸膈痞悶。腹痛燥結。熱結膀胱。傍流。協熱下利。或嘔吐惡心。讖語。舌胎。○感之輕者。舌上白胎亦薄。熱亦不甚。亦不數。是不傳裏。

○感之重者。舌上胎積粉。或舌根先黃。漸至中央。邪漸入胃。或舌上純黃色。兼見裏證。此邪既入胃也。

人參敗毒散 初病。惡寒發熱頭痛。此湯主之。

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡

川芎 茯苓 桔梗 枳殼各一錢 甘草半錢

右姜煎

六神通解散 前症。躁熱不得汗

麻黃酒 石膏 滑石 黃芩各二兩

蒼朮四兩 甘草二兩

右姜煎。○節庵。加羌活。川芎。葱白。香豉。

十神湯 前症。頭痛如破。宜此湯

升麻葛根湯。合芍。並香薷散。加麻黃。

獨活散 前症。兼瘴癘。脚膝疼軟。宜此湯

獨活 羌活 細辛 麻黃 防風

枳殼 蔓荊 菊花 黃芩 人參

茯苓 甘草二兩 石膏二兩

右生姜。薄荷。水煎。此皆為表證多者。立方也。若一病。便壯熱無寒。多汗神昏。嘔逆痞滿者。涼膈散。見熱病。雙解散。見溫病。三黃石膏湯。見後黃連解毒湯。同上。

三黃石膏湯 治汗下後不解熱。當三焦便滑溺瀉

黃連 黃芩 黃蘗酒 山梔二十枚 石膏五錢

麻黃一錢 香豉一合 生姜三片 葱白三莖

右地漿水煎。○脉數。便秘。上氣喘急。舌卷囊

黃連解毒湯

治內外熱劇

縮者去麻黃香豉加大黃芒硝。搗法加細茶

涼膈散

生犀飲

時疫初起眩暈嘔血

犀角一錢 蒼朮麻油炒 川連一錢

右水煎去滓入金汁攪服○大便結加大黃

○渴加栝蔞根○虛加鹽水炒人參○表熱

去蒼朮黃土加桂枝黃芩便膿去蒼朮倍黃

土加黃栢便滑以人中黃代金汁

○瘟疫發熱一二日舌上白胎如積粉早服

達原飲一劑午後舌變黃色隨現胸膈滿痛

大渴煩躁此邪毒傳裏也前方加大黃下之

煩渴少減熱去六七午後復加煩躁發熱通

舌變黑生刺鼻如烟煤此邪毒混合三焦復

淤到胃急投大承氣傍晚大下至夜半熱退

次早胎刺如失此一日之間而有三變數日

之法一日行因其毒盛傳變亦速用藥不得

不緊設用緩劑必死無救常見瘟疫二三日

即死者皆此類也

○舌胎 如積粉或純黃色或黑色大兼氣

湯或大兼氣合黃連解毒湯

○白胎未可下若外見下證涼膈散去芒硝

○下後 脈空浮而數按之豁然如無白虎

○下後 脈數而浮仍當汗解宜白虎湯若不

得汗脈證不改者加人參湯

○裏熱甚而無燥結脈數而沉或面赤或眼

赤或乾嘔或下利黃連解毒湯

○小便秘塞 少腹脹滿至夜發熱與導赤

五苓不効者大兼氣湯

○疫邪在胸膈 滿悶心煩喜嘔腹不滿欲

吐不吐欲飲不飲欲食不食此邪熱與痰飲

結聚胸中也宜瓜蒂散吐之

○頭脹者白虎湯主之

○項強 天行時氣發熱。至晚則腰脊痛。頭項強。身重。輕則涼膈。重則雙解。并加葱白。香豉。

○煩躁 溫熱病。時疫。溫疫。表裏俱邪。三焦大熱。煩躁。大渴者。白虎解毒涼膈雙解兼氣三黃石膏。選用。

○讖語 溫熱病。及時疫。誤用表藥。熱傳三焦。讖語。悶亂者。三黃石膏湯。加大黃。下之。

○發狂 溫病。熱病。時疫。熱毒內盛。脈大。腹滿。便秘。發狂者。並宜兼氣。合黃連解毒湯。若脈浮。兼表證者。涼膈雙解。三黃石膏。或大兼氣。加姜棗。皆能發汗。解表。凡溫熱。時行。發狂。得汗者。生。不得汗者。死。脈小。厥逆者。不治。

○發斑 時疫發斑。憎寒壯熱。頭疼骨節痛。拘急滿悶。初出尚有表證者。白虎湯。

○發黃 溫毒。時行。發黃。茵陳蒿湯。兼黃兼斑者。茵陳蒿。草龍膽。犀角。升麻。等分煎服。名茵陳犀角湯。

○短氣 溫熱病。及時疫。多有短氣。但溫熱表證。舌赤甚。時疫表證。則白胎如屑。黃芩湯。

白虎湯。達原飲。為主。若至胎黃。及焦黑色。用涼膈雙解。解毒兼氣之類。無論溫熱。時疫。皆可選用。

○渴 時疫。舌上白胎。而渴。白虎湯。舌根漸黃。至中心者。涼膈散。雙解散。甚則合解毒兼氣。下之。舌上胎黑。而潤。渴不能飲者。必嘔血。犀角地黃湯。加大黃。

○衄血 時疫熱病。通宜白虎湯。加藕汁。茅根汁。童便。

○頭痛 時疫初起。葛根葱白湯。以治外。涼膈雙解。達原兼氣。加葱豉。姜棗。合內外。而治之。

○盜汗 時疫下後。盜汗不止。身有微熱。宜小柴胡。去人參。半夏。加橘皮。

達原散 治時疫初起。犯募原者。

黃芩 芍藥 知母 厚朴 各一錢

檳榔 甘草 秀 生姜 一斤 大棗 二枚

右水煎。日三。夜二服。

人中黃散 治疔瘡。瘡溫。

人中黃 一兩 雄黃 辰砂 各一錢

右為散每服二錢薄荷桔梗湯下日三夜二服

人中黃丸 治瘟疫諸熱毒

大黃三兩 人中黃 蒼朮炒 桔梗 滑石各二兩

人參 黃連酒洗 黃芩酒洗 防風去 香附一兩

右為末神曲糊丸清熱解毒湯送下二三錢

清熱解毒湯 治溫疫大熱

黃連酒洗 黃芩酒洗 芍藥酒洗 生地

人參各五錢 石膏雞子大碎 羌活 知母各三錢

甘草一錢 升麻 葛根各三錢 生姜二兩切

右水一斗煮取五升每服一升日三夜二服

黃龍湯 治失下循衣撮空虛極熱盛不下必死者

大黃三四錢 芒硝二錢 厚朴一錢

當歸二錢 甘草一錢 人參一錢

生薑五片 大棗一枚

右水煎將成加桔梗一撮再煎三沸熱服

○疫屬中一種大頭天行病此證乃濕熱在高巔之上所以必多汗氣蒸初覺增寒壯熱體重頭面腫甚目不能開上喘咽喉不利舌

乾口燥

普濟消毒飲 治天行大頭溫蒸多汗

柴胡 黃連 黃芩 玄參 連翹

鼠粘子炒 升麻 白芷 甘草生

桔梗 馬勃各一錢 僵蚕炒 板藍根如無者

為末水煎○節庵用柴胡黃連黃芩連翹鼠

粘桔梗川芎羌活防風荆芥射干姜汁竹瀝

甘草名芩連消毒飲茶雖異而効不殊○額

上面部嫩赤而腫或壯熱氣喘口乾舌燥或

咽喉腫痛不利其脈數大者此屬陽門加石

膏○若內實熱甚者加酒大黃○若發於耳

之上下前後并額角傍腫者此屬少陽也或

寒熱往來口苦咽乾胸脇滿悶加柴胡括萎

根脈實便秘加酒大黃利之○若發於頭腦

項下并耳後赤腫者此屬太陽也荆防敗毒

散熱甚去參加芩連○三陽經俱受邪并發

頭面耳鼻宜消毒飲

荆防敗毒散

即人參敗毒散加牛房子薄荷各一錢 防風一錢

○蝦蟇瘟 則兩頤頰下腫小柴胡去人參

半夏加羌活防風荆芥薄荷桔梗馬勃或荆防敗毒散

○四時疫厲天行大頭并宜人中黃散輕者只用芩連甘草煎成頓服不効加鼠粘子芒硝微利之不必大劑攻毒也

夏暑濕熱氣蒸多發此宜消暑十全散加荆芥防風馬勃一二劑可愈

夾食

凡傷寒感冒溫熱病時疫多有夾食夾痰等證若宿食傷脾則氣口濇滯不調傷胃則滑實流利亦有遲滑及止促者若宿食在上脘并人迎亦滑盛若宿食已歸大府則氣口雖浮大而按之必滿也若脈來滑盛胸滿痞悶嘔逆氣麤者冬宜調中湯餘時芎藭散藿香正氣散

調中湯

蒼朮炒 陳皮 半夏 芍藥酒 桔梗

甘草 枳殼 羌活 白芷 藿香

砂仁各一分 川芎七分 麻黃 桂枝各五分 生姜

水煎溫服

○夾食 氣口反濇滯伏結或始雖浮大而按之漸虛小其證身熱足冷或腹痛或頭痛但胸膈滿悶時發躁煩者其人元氣素虛堅韌之物因結中宮陽氣不得下通故但足冷而手不冷也可用五積散去取頭痛陽邪上鬱也甘草乾姜湯加葱豉以通其陽腹痛者陰氣下結也枳實理中湯加熟附子以通其陰若曾服過峻利藥消導太過致自利厥逆痞滿不除者桂枝人參湯若曾誤下而熱邪內陷愈加脹滿壯熱不止者小陷胸湯合枳實理中湯若過汗傷血小便秘濇者枳實理中湯加歸芍或真武湯加當歸

○陰虛之人 傷寒與傷食皆難用茶為不治之候小建中湯肉桂酒製生芍藥厚朴汁製甘草加枳殼桔梗砂仁熱除後六味丸減地黃加沉香砂仁

○中氣虛者 更兼感冒停食則補中益氣湯用桂枝酒製黃耆砂仁汁製甘草枳實汁製生白朮熱服微汗為効



○惟氣口脉大。而按之瀋滯。或取小瀋。而久按愈有力。大便五六日不行。臍下按之痛者。當用大棗氣湯。下之。凡傷寒。夾食。既久。痰飲固結。屢大棗氣湯。不効者。黃龍湯主之。

○温病。熱病。時疫之夾食。無論表裏證。日數多少。并宜涼膈散。加消導茶。

○食積不化。類傷寒。發熱惡寒。但氣口脉不和。而惡食。吞酸噯氣。腹滿欲吐不吐。嘔逆痞悶。不換金正氣散。加神麴。山查。草菓。乾姜。黃連。枳實。木香。

夾痰

凡夾痰。與夾食相似。更宜審諦。無論風寒。温熱。内熱等證。必增嘔逆眩暈。風寒夾痰。則欬嗽氣逆。温熱夾痰。則令人昏眩痞悶。内傷夾痰。則令人吐逆妨食。但外感風寒。則寸口脉浮滑。發熱頭痛。咳嗽自汗。宜金沸草散。及芎藭散。温病熱病。夾痰。則關脉浮盛。痞悶穀鼻。涼膈散。雙解散。内傷夾痰。則氣口脉滑。而濡。欬吐涎飲。宜二陳湯。加生白朮。虛人。六君子。

加香砂

○凡人中脘。有停痰留飲。亦令憎寒發熱。惡風自汗。喘欬胸膈滿悶。氣上衝。不得息。有似傷寒。但身不疼。項不強。為異耳。若涎多者。隱隱頭痛。清痰亦隱々腹痛。然止發不以其時。目睛微定。眼胞上下如煤色。是也。其脉左手和平。關濡滑。或寸口伏匿。但宜小柴胡湯。去參。加茯苓。橘皮。二陳湯。隨證上下加引經茶。要以分尋出路為主。

○至於痰迷心竅。如崇者。與傷寒陽明發狂相似。但口中吐涎沫。胸腹按之不痛。辨之。宜加味導痰湯。加減。

加味導痰湯

本方。加人參。白朮。黃連。黃芩。枳實。仁。桔梗。大棗。竹瀝。姜汁。若痰熱而粘。去參。朮。痰冷而清。去芩。連。年力壯盛。先用稀涎散。後服此湯。

○凡外寒夾痰。脉不浮。不宜大發其汗。如香薷散。藿香正氣散之類。宜用之。

夾水

風寒傷人也。肺先受傷。不能行其水液。停留於心下。為咳。為喘。及乾嘔發熱等證。小青龍湯主之。若失治。則心下鞭滿。引脇下痛。乾嘔短氣。十棗湯。若更失治。則成協熱利。腰以下重。足脛浮腫。小便不利。輕則五苓散。加防已。重則牡蛎沢瀉散。少陰病小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。或咳。或嘔。真武湯主之。此又腎虛不能制水也。

夾血

其人素有內傷。跌撲。停經血。及暴怒傷肝。皆有瘀積。因傷寒。溫疫等證。發動痼疾。謂之夾血。必有痛處。定而不移。治宜察其部分。消息微甚。用某。

○又跌撲打傷。一時不覺。過數日。寒熱乃作。有似傷寒。脈常堅強。最忌細瀼。脇痛少腹痛。手不可按。甚至昏迷不省。少頃復甦。乃瘀血上衝所致也。其人大便或秘。或黑。輕則香

穀散。重則桃核菴氣湯。加炮川山甲。最破瘀積。更加柴胡。當歸。若瘀積在經絡。當歸活血湯。在胃口。犀角地黄湯。

香穀散

治虛人。畜血暴起。胸脇或少腹作痛。

香附三錢 枳殼三錢 青皮 陳皮 烏藥

赤芍 莪朮各一錢 紅花 甘草生二分

右水酒各一盞。煎成去滓。加童便空心服。不應。加延胡。川山甲。有外感表邪。去青皮。加桂枝。菴活。防風。

當歸活血湯

治夾血。如見崇狀。

當歸三錢 赤芍酒 生地酒浸別 桂心各一錢

桃仁五十箇同乾漆灰 茯苓 枳殼

柴胡各八分 乾姜炮 紅花二分

右除地黃。水煎去滓。入地黃煎數沸。臨臥加陳酒服之。不應。加穿山甲末五分。又不應。加附子三分。有實熱。難用附子者。須與酒大黃錢許。同用。

○前證更兼寒食。停滯中脘。或腹中作痛者。枳實理中湯。輕則加姜汁。炒黑山查肉。重則乾漆灰二三分。

○又或脫衣開毳兼風寒。有表證者。必先解表。然後治血。如欲發汗。宜桂枝湯。芎藭散等。并加當歸附子桂心。甚則加延胡索。莪朮。不得行。麻黃湯。青龍湯。亦不得用寒涼止血之劑。蓋血得熱則行。得寒則凝。瘀結不散。必發熱如狂。效喘嘔逆。若發汗太過。誤觸瘀血。則或嘔或泄。或發呃逆。俱活血。則嘔泄呃逆自止。然則攻血藥中。必用乾漆。炒黃連。非此化熱。則血不得散也。若嘔泄之血。其色紅紫而散者可治。色如敗衄而凝。結成塊。多兼血水。此正氣已脫。邪不能留。又或如污泥。而粘膩不斷。臭穢異常者。此真氣已敗。與濁腐同下也。

○至當汗不汗。大陽邪內結。則為畜血。與夫邪氣在經。而為衄血。熱邪在胃。為吐血。及諸失血家。淋家與婦人經水適來適斷。俱不可發汗。發汗則動血。又三陰無熱。不可強責其汗。責則必動其血。名下厥上竭。為難治。血脫則陽氣竭於上。陰氣厥於下也。即用當歸四逆湯。多不可救。

夾氣

有奮力鬪毆之人。脫衣露體。觸犯風寒。謂之夾氣傷寒。今人但知用理氣藥。不知兼有夾血。夾食。其證惡寒發熱。肌骨疼痛。胸膈脹閉。氣逆喘呼。若其脈浮緊。則宜輕劑發散。兼理氣寬胸。局方香薷散最宜。有食則加枳殼。厚朴。痰加半夏。茯苓。寒嗽加菴活。桔梗。傷熱效加萎蕤。薄荷。頭痛加川芎。白芷。四時不正之氣。加藿香。甚則芎藭散主之。

○若脈弦緊。或有伏結。為積血在內。當用破血。利氣藥。香穀散之類。有食不妨。用溫中消導。正氣散之類。

○若但鬱悶不得發泄之人。偶感風寒。或發伏氣。或傷暑熱。或兼內傷。但隨證用。但暑兼開鬱理氣。不可行破血消導也。

冒雨

若遠行遇雨。則寒濕之氣。先從汗孔。襲入背俞。况雨氣通於腎。雖有發熱。頭痛。欬逆等證。

解表藥中。必先通於少陰之經。而兼開發肺氣。細辛。羌活。在所必用。所以推神木湯為主。又須時令寒暄。元氣盛衰。加減。始為合劑。

神木湯 治內傷冷食外感寒邪

羌活 蒼朮<sup>各三錢</sup> 川芎 白芷<sup>各錢半</sup>

細辛<sup>五錢</sup> 甘草<sup>一錢</sup> 葱白<sup>二莖</sup> 生姜<sup>三片</sup>

右水煎。熱服。覆取微汗。

○若冒雨而更加之以風。則風濕相搏。一身盡痛。當與除風濕羌活湯。或小建中湯。加黃耆。白朮。羌活。防風。

○濕襲陽明而發熱。則茯苓桂枝白朮甘草湯。

○大抵此證。雖當盛暑。亦忌寒涼。若遇嚴冬。稍用麻黃。附子。飢後則加白朮。飽後則加橘皮。半夏。勞役傷氣。而冒雨涉水。發熱喘咳。則宜補中益氣湯。加細辛。乾姜。

○水寒之氣。傷肺而喘咳不止者。又以小青龍湯。加減陽虛。去麻黃。加附子。白朮。

### 遭風溺水

遭風溺水。最忌熱酒火烘。惟宜溫煖覆蓋。蓋原其溺水之時。必多驚心。腎受傷。雖有發熱。頭痛。骨節疼痛等證。解表藥中。必兼通心腎。在冬月。麻附細辛湯。或小青龍湯。加生附子三五分。蓋麻黃發汗。通心。附子溫經。通腎。細辛徹表裏邪。稍加茯苓。半夏。以開豁。若在夏月。五苓散。加硃砂。熱服一半。探吐。更服一半。或脈浮表證多者。五苓散。合小柴胡湯。或五苓散。合羌活勝濕湯。或暴怒悲號。投河躍。香薷散。加撫芎。烏藥。木香。有跌傷。加桃仁。當歸。桂枝。○若曾犯房室。而遭風覆溺。及冒雨涉水。傷腎而病。身熱足冷者。皆當參夾陰例治之。

### 夾陰

房室不謹之後。感冒風寒。及恣意乘涼。觸犯風露。勞役傷精而病者。謂之夾陰。其證亦發熱頭痛。胸膈痞悶。若陰火上乘。則面赤而足脛逆冷。蓋陽病必頭痛。陰病必足冷。故發熱煩渴。而躁亂不寧。真陽不能下通於陰分。故足不能熱。而陽道痿縮也。脈大而虛。按之微。

或見虛狂而頃之即止。終不反聲高詈罵也。在傷寒寒疫猶可治。在時行疫癘百不一生。此證小柴胡之類。不勝黃芩之陰寒。四逆之輩。不勝附子之雄悍。只宜小建中湯。黃耆建中湯加減。

黃耆建中湯

小建中湯

○尺中弦數而多虛火。面赤戴陽者。小建中湯中用人參汁製之。甘草。牡丹皮汁。合酒製之。芍藥。若不應加附子汁製。黃連。黃耆。葱白。香豉。

○春夏感冒。夾陰。通用黃耆建中湯加減。與陽虛之可用溫補者。不同也。

內傷類傷寒

春深長夏之時。多有勞力感寒。內傷之證。與外感證相似。內傷亦發熱。頭痛畏寒。惟門戶隙中賊風最惡之。若在大風處。反不惡。畏寒得暖則解。雖寒熱間作。而不齊。出言懶怯。口淡無味。腹中不和。手心大熱。而手背不熱。兩

脇俱熱。蓋內傷自內達表。先少陽也。若外感風寒之證。頭疼發熱無休止時。寒熱齊作。而驟發不止。寒雖近火不除。出言重濁。鼻中氣麤。一身盡熱。蓋外寒自表入裏。先太陽也。然溫熱亦自內達表。先見少陽證。腋下熱。而脇滿。驟然發熱如火。大渴煩躁引飲。頭面目舌俱赤。喘麤氣盛。絕不似內傷。面目萎黃。唇舌淡白。短氣力怯等證也。內傷氣口脈虛大。外感入迎脈緊盛。溫熱則氣口脈洪盛為異耳。若內傷夾外感。則人迎脈緊盛。而氣口虛大。其證發熱惡寒。頭痛自汗。五心煩熱。遍身骨俱疼。宜補中益氣湯。加桂枝。無汗。加羌活。若陽氣不得下通。而足冷者。去升麻。易葛根。少加熟附子。羌活。

○外感多於內傷者。黃耆建中湯。加羌活。防風。若顱腫。目疼。眉稜骨痛。加葱豉。微汗之。

○負重作勞之人。內傷飲食。外感風寒。且素多畜血者。其證渾身壯熱。頭痛骨節痛。胸脇痞滿。或痛。六脈洪盛。重按却無力。或弦緊急。

強。嘔逆不食。或泄痢。或便秘。以外感寒解表。則正氣愈衰。以溫補茶理脾。則助邪轉盛。並宜五積散加減。但此輩多有食積痰傷。胃脘結滯者。慎不可用白朮。宜加桃仁。當歸等茶。六七日大便不行者。大柴胡微利之。若少腹痛。而小便利者。為血畜下焦。桃核兼氣湯。下盡黑物。然後調理。

虛煩類傷寒

諸虛煩熱。與傷寒相似。一虛一實。不可不察。其虛煩發熱。亦惡風自汗。心中溫々欲吐。憤憤無奈。但脈不浮緊。頭不疼。身不痛。為異耳。然虛火上炎。亦微々頭痛。時々開熱。但時發時止。與外感不同。蓋虛煩脈雖大而數。按之必虛微無力。當以甘溫補其中。補中益氣湯。少加炒黃柏。以滋腎水。兼進地黃丸可也。大抵陰虛必生煩躁。

○心中悸而煩者。虛也。先煩而悸者。熱也。先悸而煩者。小建中湯主之。傷寒病後虛煩。竹葉石膏湯。嚴冬者。十味溫膽湯。誤用涼

藥。虛煩愈甚。而躁渴者。急用五苓散。加人參

既濟湯

治上盛下虛。煩躁自利。手足冷者。

竹葉石膏湯。去石膏。加熟附子。

參胡三白湯

治傷寒過經後。脈不解。或屢下。

熱不解。脈虛數而煩者。

人參二錢 柴胡三錢 白朮三錢 芍藥酒

茯苓各一錢 生薑三片 大棗三枚

水煎。溫服。營衛不和。去柴胡。加桂枝。口乾心煩。加麥門。五味。心下痞。加黃連。枳實。不得眠者。加竹茹。

參胡溫膽湯

治虛煩不得眠。或發熱痞悶。脈

虛而嘔者。

人參 柴胡 茯苓 橘皮各一錢

甘草六分 半夏 枳實各一錢 生薑三片

水煎

十味溫膽湯

參胡溫膽湯。去柴胡。加熟地。酸棗。遠志。五味子。若膽寒肝熱。而煩悶不安者。當加入竹茹。芍藥。

酸棗仁湯。見傷寒。治汗吐下後。表解無熱。但

虛煩不得眠

脚氣類傷寒

脚氣為病。亦令人頭痛發熱。肢節疼痛。甚則嘔逆便秘。有似傷寒。但初起於脚膝熱腫。或屈弱不能動移。為異耳。

赤膈黃耳類傷寒

赤膈者。胸膈而疼痛發熱頭痛。或胸膈赤腫發庖者。屬少陽風熱。宜荊防敗毒散。去人參。加芩。連。犀角。

○表證已退。大便燥結。涼膈散。半表半裏。小柴胡。去人參。加枳實。桔梗。又宜稜。鉞。刺。腫處。出血。以瀉其熱毒。則易愈。

○黃耳者。耳中策々痛。而耳輪黃。風入於腎也。卒然變惡寒。發熱。脊強脊直如瘕狀。屬大陽類傷寒也。宜荊防敗毒散。去參。則小續命湯。去附子。加白附子。蔓荊。殭蚕。天麻。苦參。或骨碎補。磨水。滴耳中良。

中寒

夾一陽後。天令大寒。有卒然倒仆。昏不知人。手足逆冷。或口吐白沫。嘔清水。唇青面黑。口鼻氣微冷者。為中寒。其人腠理踈豁。一身受邪。難分經絡。無熱可散。胃氣大虛。

附子理中湯

人參 白朮 甘草 乾姜等分 附子一枚半  
右水煎溫服。甚則白通湯。通脈四逆湯。劇則霹靂散。火焰散。

霹靂散

治陰盛格陽。躁渴欲飲水。而不能嚥。附子為末用五分 真臘茶一匙五分  
右分二服。煎去滓。蜜少許。放令服之。須臾躁止。得睡。汗出瘥。

火焰散

硫黃 附子生 臘茶二兩  
右為細末。同艾葉五錢。酒調攤新瓦上。將瓦撥起。無令着火。候烟盡。研細。每服二錢。酒一盞。煎七分。有火焰起。勿訝。如吐更服。候心熱。其病瘥。三服不瘥。勿治之。

○中寒身受肅殺之氣。口食瓜菓冰冷物病者。脉必沉細。手足冷。息微。身倦。身熱亦不渴。倦言語。此言夏月中寒。大順散方見中暑冷香飲子。或附子理中湯。

冷

香飲子 治中暑夾陰腹痛瀉利

附子生 草菓

橘紅

甘草

各

生薑

五片

水煎

○醫門法律。用茶次叙。用乾姜附子湯。以勝陰復陽。其次前菓中。加當歸。肉桂。兼理其營。其次前茶中。更加人參。甘草。兼調其氣。二三劑後。覺其清陽在躬。運動頗輕。更加黃耆。白朮。芍藥。平補而後。有頑痰留積經絡。但宜甘寒。助氣開通。

霍亂

霍亂吐利。與傷寒吐利不同。傷寒吐利。為邪氣所傷。雖吐利而不撩亂。霍亂吐利。是飲食所傷。必暴煩躁擾而撩亂也。又有內不和。加之頭痛。發熱吐利。是霍亂兼傷寒也。此證雖屬脾胃。亦主肝腎。有陰陽寒熱之不同。凡冬

月外感寒氣。內傷冷物。鬱竭停滯不化。嘔逆泄瀉。霍亂。脉沉細。或伏者。屬太陰。理中湯。臍上有築々動氣者。加桂。苓。厥逆惡寒。加附子。○脉雖沉細。而轉筋。煩躁發熱者。當作熱治。大抵霍亂。一毫口渴。轉筋者。即係熱證。惟四肢逆冷。下利清穀。惡寒不渴者。方為寒證也。○夏月霍亂吐瀉作渴。暑胃苓湯。見泄瀉加半夏。藿香。面赤口渴。加炒川連。三時飲食後觸冒暴寒。成此證者。藿香正氣散。見感冒。若吐利轉筋。為風木行脾。平胃散。見傷食。加木瓜。

胃令湯 見泄瀉

治暑食相搏

藿香正氣散 見感冒

治寒食相搏

○夏秋感冒。吐瀉霍亂。六和湯。為要藥。

六和湯 見暑

治風寒暑食諸交見

○身熱煩渴。氣喘喘悶。或吐瀉厥逆躁擾者。此傷暑霍亂。宜香薷飲。沉冷服。甚則手足厥逆。少氣。身面爪甲皆青。六脉俱伏。而吐出酸穢。瀉下臭惡。便溺黃赤者。此火伏厥陰也。為熱極似陰之候也。急作地漿水。煎竹葉石



膏湯誤作寒治必死

香薷飲見暑治因暑邪霍乱吐利者

竹葉石膏湯見暑治暑熱極甚霍乱吐利者

○夏秋霍乱多食冷水瓜果所致宜木香藿

香陳皮厚朴藜蘆生姜四肢重著骨節煩痛

此兼濕也二朮二苓厚朴枳殼陳皮沢瀉七

情鬱結宜烏茶香附木香厚朴枳殼陳皮紫

蘆以上三方第一方者因傷寒飲食霍乱吐

利第二方者前證兼濕第三方者交氣霍

利吐

○熱多而渴者五苓散寒多而不渴者理中

湯渴不能飲小便不利者二湯合此秋冬春

法雜夏月因權用之

○若吐逆下利心腹卒痛為寒食內結金匱

大建中湯主之嘔逆下利而頭痛發熱者小

建中湯主之此二方冬月霍乱

金匱大建中湯見積聚

○憎寒壯熱頭痛眩暈而霍乱吐利者為

風痰夾攻藿香正氣散主之有此證四時通用

○嘔逆頭痛發熱背惡寒煩躁面垢而齒

燥者為風暑內薄消暑十全散夏月外感甚

○嘔逆腹痛泄瀉或寒熱如瘧為暑食相兼

十味香薷飲或六和湯虛者十味香薷飲不虛者六和湯

○吐逆下利而煩渴引飲為鬱熱留滯五

苓散合益元散

○夏秋之間因伏暑而霍乱吐利煩躁或腹

痛自汗六脉雖沉手足雖冷不可用熱茶宜惟

加減香薷飲如果脉弱陽虛腹痛喜得温按泄瀉

不臭穢者來復丹又有吐瀉後熱伏於內外

則水冷六脉沉細欲絕湯茶不下或發呃逆

此火氣奔上然也其口渴以凉水與之則不

吐矣後用香薷飲加黃連麥冬通草等茶服

之其脉漸出者湯茶不下反用涼水則不吐此其候生

○吐瀉不止元氣耗散病勢危篤或水粒不

入口或口渴喜冷或惡寒戰慄手足逆冷或

發熱煩躁揭去衣被內虛陰盛不可以其喜

冷去被為熱宜理中湯甚則四逆湯加食鹽

少許若暴瀉如水周身汗出盡冷脉弱不能

言語急投漿水散並冷服

漿

水散見暑

○若冒暑伏熱腹痛作瀉或利或嘔者木瓜

吳茱萸食鹽同炒煎湯溫服

○凡胎前產後霍亂另詳本門

○心腹脹痛欲吐不吐欲瀉不瀉煩躁悶

亂俗名攪腸痧此土爵不能發泄火熱內熾

陰陽不交之故也古法有鹽煎童便非常用

之降火且兼取其行也一法以鹽湯探吐并

用鹽填臍中以艾灸二七壯屢効

○如欲吐不吐欲利不利上下不通腹滿痛

而頭痛發熱者桂枝大黃湯主之此乾霍亂

多死

桂枝大黃湯見傷寒

### 中暑

夫暑者相火行令也夏月人感之自口齒入

而傷心胞絡之經其脈多虛或浮大而散或

弦細乾遲汗出當風閉其汗孔即風與汗濕

留泊肌腠則虛而弦細或虛風不作鬱熱表

虛仍自汗出者脈必乾遲也統而言之虛分

而言之弦細乾遲證與熱病相似首宜以脈

辨之熱病之脈必盛中暑之脈必虛

○几平人偶然中暈身熱皆惡寒面垢自汗

大渴引飲煩躁悶亂痰逆惡心胸膈不快或

吐瀉轉筋小便秘澇者此內外皆熱即有昏

憤困倦指頭微寒并宜五苓散見傷寒合益

元散

益元散或名天水散六一散

滑石六錢

甘草一錢

右極細末用清調

○如避暑深堂起居不時而汗出煩躁面垢

背微惡寒手足微厥甚則灑然毛聳以腠理

開則灑然寒若腠理閉則熱而悶矣乃包結

之火不能勝時火故反微惡寒也或於陰涼

處坐臥表虛不任風寒往々身認外感誤與

表藥重絕元氣惟宜清暑益氣湯

○咳嗽發熱盜汗不止脈數者熱在肺經

宜清暑益氣湯

○傷暑用清暑益氣湯暑傷於氣兼挾風

熱乘虛而傷其形也

○傷暑或復傷濕或傷生冷而外熱內寒則

先治其內溫中消食藿香正氣散之屬次治其外清

暑補氣。而以理脾為主。則清暑益氣湯。若暑傷元氣。而發熱喘嗽。短氣精神不固。以致脾胃違和。飲食不進。身重無力。則當用參朮調中湯。或者

清暑益氣湯

黃耆一分 人參 白朮 蒼朮 升麻

橘皮各五分 神麴炒 甘草炙 當歸 麥冬

黃栢各三分 五味九粒 葛根 沢瀉 青皮各二分

水煎服。去蒼朮升麻。神麴葛根。沢瀉青皮。各近制清暑益氣湯。

參朮調中湯

瀉熱補氣。止嗽定喘。和脾胃。進飲食。并治氣虛勞嗽如神。

白朮五分 黃耆四分 桑白皮 甘草炙

人參各三分 陳皮 地骨皮 青皮

麥冬 茯苓各二分 五味子二分

水煎

香薷飲

香薷一斤 扁豆 厚朴各半斤

水煎服。加黃連四兩。剉。生姜汁同研。炒黃色。名黃連香薷飲。或云香薷飲與馬齒見。

反

○腹痛水瀉者。胃與大腸受之。香薷散。惡心者。胃中有痰飲也。香薷飲。下消暑丸。

○伏暑大熱水瀉。黃連香薷飲。

○香薷辛淡。辛能發散。淡能滲泄。乃解表利水之劑也。氣虛胃弱。食少體倦人。勿輕用。

○脾氣虛弱。汗多而惡寒者。十味香薷飲。

○傷氣困倦。身有微熱。頭重吐利。小便赤澀。十味香薷飲。

○傷暑用十味香薷飲。風熱濕雜合而傷形氣。

十味香薷飲

香薷 人參 黃耆 白朮 茯苓

甘草 扁豆 橘皮 厚朴 木瓜各一分

水煎。欲令作汗熱服。令利小便冷服。○伏暑。

去黃耆。加黃連。藿香。沢瀉。

○行人農夫。於日中勞役得之。此熱傷陽也。必苦頭痛發熱。汗出肌層大熱。而渴。乃天

熱外傷元氣。宜益元散。白虎湯。竹葉石膏湯。

選用

○農夫田野。及慣力役之人。過受燔灼。頭角額痛。發熱。大渴引飲。脉洪汗大泄者。急作地漿水。煎蒼朮白虎湯。若老人。不可用寒藥者。竹葉石膏湯。稍加熟附子。温服之。又老人平昔陰虛多火。不可用温蒸者。白虎湯。加人參竹葉。為當。

○中暈 用白虎湯。熱傷形之治也。用人參白虎湯。兼傷無形之氣。

白虎湯見熱病

○避暑於涼亭水閣。此暑傷陰證。必頭痛身形拘急。肢節疼痛。而煩心。肌膚大熱無汗。脉浮緊。此為陰寒所遏。使周身陽氣。不伸越。宜消暑十全散。偏表則變香薷飲。為消暑十全散。

香薷 二錢 扁豆 厚朴 木瓜 橘皮 一作半夏

甘草 茯苓 藿香 蘓葉 各一錢

水煎

六和湯 若暑熱之時。過傷飲食。泄瀉嘔吐。霍亂者。宜六和湯。偏裏則變香薷飲。為六和湯。  
半夏 砂仁 杏仁 人參 甘草 各一分

茯苓 藿香 香薷 厚朴 各四分  
姜棗水煎

○日間冒暑經營 夜間露臥門窗。此先感暑而後感寒。去衣則凜。著衣則煩。或鼻流清涕。或寒熱如瘧。六和湯。加菴活。無汗。加紫蘓。嘔吐。加藿香。兼食。加草豆蔻。砂仁。

○冒暑作勞 乘汗冷浴。身痺如鍼刺。間有赤腫處。或發水泡者。六和湯。加蒼朮。荆芥。防風。甚則加桂。若身熱頭痛。躁亂不寧。或身如鍼刺。此熱傷肉分也。白虎。加蒼朮。虛加人參。○若外既受寒。內傷生冷冰水。腹中泄瀉。霍亂吐逆。藿香正氣散。

大順散 冒暑伏熱。引飲過多。及恣噉瓜果。生冷致脾胃受濕。而腹痛嘔瀉。水穀不分。脉來沉緊。或沉微。

甘草 乾姜 各五分 杏仁 桂 各一分

右先將甘草。用白砂炒。入姜。却下杏仁。炒過篩合桂。為末。每服三錢。沸湯調下。

○暑氣攻裏。腹內刺痛。小便不通者。生料五苓散。加木香。小便血者。導赤散。加辰砂。

○伏暑霍亂。腹痛泄瀉如水。身熱足冷者。五苓散。下來復丹。

○冷水澡浴。致暑濕相搏。一身盡痛。自汗發熱者。五苓散。加羌活。吐瀉。五苓散。合藿香正氣散。或不換金正氣散。

○冒暑縱飲。及飲冷酒。引暑入腹。大熱而小便如血。五苓散。減桂。加黃連。

○自汗過多。風犯汗孔。則身體重痛。四肢麻。脊煩疼。或渴。或不渴。小便黃濇。此風鬱汗濕與暑相搏也。宜六一散。加葱豉。兼驚加辰砂。小便不利。合五苓散。或去桂。并煎服。探吐。令汗出則愈。

○脾胃虛損人。上焦之氣不足。暑濕之氣鬱蒸。則四肢困倦。精神短少。兩脚痿軟。癱於動作。言語昏々。嗜臥頭痛而重。心胸痞悶。骨節無力。氣促似喘。非喘。其濛々如煙霧中。早晚之際。發寒厥。日高之後。復發熱如火。乃陰陽氣血不足也。若四肢灼熱。為陰虛發熱。四肢水冷。為陽虛寒厥。以脾主四肢故也。清暑益氣湯。或清燥湯。

清燥湯

益氣湯。或清燥湯。

清暑益氣湯。去葛根。青皮。加黃連。伏苓。柴胡。

○若遠行勞役。大熱而渴。則陽氣內伐。熱舍於腎。為水不勝火。發為骨疼。若龜勉勞形。發熱煩渴。口鼻氣促而喘。至日晡之際。病必少減。若認陽明中暈。誤用白虎必死。此脾胃大虛。元氣不足也。脾胃一虛。病證百出。惟補中益氣。去升麻。加麥冬。五味子。茯苓。沢瀉。黃栢之類。補益中。兼清解。而漸愈。不似中暈之即能平復也。

○倘人迎脈弦。氣口脈大。而欬嗽鼻流清涕。目疼額與眉稜骨痛。選奇湯。見頭痛最効。

漿水散

冷。腹痛極瀉利。脈沉弦。冷香飲子。

漿水散。前症甚則霍亂吐利。通身冷汗不止。脈伏或脫者。急用救之。庶可十全一二。

附子

乾姜

甘草

肉桂

各五分

半夏

醋制

良姜

各二分

右用漿水。水煎去滓冷服。○虛熱喘乏。加入參汗多。加黃耆。五味子。

○中暑 用生脉散。暑傷無形之氣。用消暑丸。上盛之濕泛濫。而為痞滿。用益元散者。下盛之熱。阻滯而為溺澀。

生脉散

人參 五錢 麥冬 三錢 五味子 二錢

右用長流水煎服

消暑丸

半夏 一觔 甘草 生 茯苓 各半觔

右為細末。姜汁和丸。無雜生水。每服二錢。不拘時。沸湯送下。

○治暑之法 以去濕熱。清心。利小便為主。氣傷。補真氣為要。

○若腹滿 身重。難以轉側。口不仁而面垢。識語遺尿者。此熱病兼渴也。白虎湯主之。

○若熱病因暑而發。治從熱病例。蓋伏邪必從少陰。發出心包。而入陽明。與陽明中暈不異。總屬白虎證治。不必辨其是熱其是暈。

○酷暑道途中 卒然暈仆。為暑風卒倒。此熱毒湧痰壅塞也。一切不可用冷。得冷則死。急為熱土。熨中。而仍使更濕於臍腹中。并搗姜蒜絞汁灌之。立甦。

竹葉石膏湯

竹葉 二把 石膏 一觔 半夏 半斤 人參 各三兩

甘草 二兩 麥冬 一升 粳米 半升

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓。內粳米煮米熟湯成。去米。溫服一升。日三服。

來復丹

治上盛下虛。裏寒外熱。及伏暑泄瀉如水。

煇硝 一兩 硫黃 一兩 同研為末。磁器內。漫火炒。柳木攪之。不可猛火。以傷藥性。研極細。

大陰元精石 研水吞二兩。如無真者。以青鹽代之。

五靈脂 酒洗。去砂石。定曬乾。用二兩 青皮 陳皮 各二兩

右為末。醋糊丸。桐子大。每服三十九。空心米湯下。

龔氏人參白虎湯

治中暈。即中熱。舌燥生胎刺。

人參 五分 白朮 陳皮 各七分 茯苓

芍藥 香薷 麥冬 梔子 各一錢

石膏 知母 各半錢 扁豆 八箇 甘草 五分

濕溫 濕

八十四

右剉剉蓮肉十箇。烏梅一箇。水煎服。○熱極遺尿。加黃柏。○腹痛嘔噦。吐瀉飽悶。不可用石膏。○煩燥。加辰砂。酸棗仁。

二香散壽世保元治外感風寒暑濕。內傷飲食生冷。

藿香正氣散。加香薷。扁豆。

春澤湯濟世全書治伏暑發熱。煩渴引飲。小便不利。

五苓散。加人參。柴胡。麥門冬。燈心。

一方本草經流治傷氣倦怠。

生脉散。加白朮。

濕溫

其人傷濕。因而中暑。名曰濕溫。兩脛逆冷。胸滿。頭目疼重。妄言多汗。脉陽濡弱。陰小而急。及煩湯引飲者。蒼朮白朮湯。

濕

濕在外者。當微汗。薏活勝濕湯。在下在內者。當利小便。五苓散。

○濕從外者。關節疼重。頭痛體痛。腹脹煩悶。

昏不知人。或四肢倦怠。腿膝腫痛。身重浮腫。大便泄瀉。小便黃赤。薏活勝濕湯。若一身盡痛。為風濕相搏。除風濕。薏活湯。肢體煩痛。頭重鼻塞。或見泄利。或下清血。為風木之邪。內干濕土。神朮湯。濕毒下血。大便泄瀉。四肢沉重。升陽除濕。防風湯。若腰已下重着。為濕滯經絡。滲濕湯。

○用薏活勝濕湯者。上盛頭項之濕也。用除風濕。薏活湯者。無項之濕也。用神朮湯者。下血泄瀉。用升陽除濕。防風湯者。腰以下重着。薏活勝濕湯。治風濕上衝。頭痛項似拔。腰似折。

薏活 獨活 防風 川芎

藁本 蔓荊 甘草各一 生姜二片

水煎溫服。○寒濕腰以下重。加附子。防己。

○身重腰沉々然。加黃柏。蒼朮。○無頭痛。去蔓荊。加蒼朮。

除風濕。薏活湯。治風濕相搏。一身盡痛。日晡發熱。

薏活 防風 藁本各一 升麻八

神

柴胡 蒼朮各一 生姜二片  
水煎。空心熱服。覆取汗。

蒼朮 藁本 川芎 羌活各一 白芷

甘草 細辛各五分 生姜三片 葱白二莖

右九味。水煎熱服。○血色必清。稀而不鮮明。

升

升陽除濕防風湯即升陽防風湯 治風濕。發泄。及腸

風滯下便血。

防風錢 蒼朮 白朮

茯苓 芍藥各一 生姜二片

水煎熱服。取微汗。○陽陷於下。則成飧泄。濕犯於上。則令頭痛。清濁倒置而然。故用風藥。以勝濕也。然風木之病。稍加桂枝。甘草。監製其功。尤捷。

滲

滲濕湯 治濕滯經絡。腰下重着。而痛。

理中湯。去人參。加蒼朮。茯苓。橘皮。丁香。生姜。大棗。

○然病有傷中之不同。傷濕者。足太陽膀胱經也。前段諸症中濕者。足太陰脾經也。或足少陰腎經。傷膀胱。則煩渴引飲。小便不利而腫脹。

除

除濕湯 平胃散加半夏。茯苓。白朮。藿香。生姜。大棗。

腎

腎着湯 治腰以下重着。而痛。

理中湯。去人參。加茯苓。即金匱甘

○傷濕而兼感風。則眩暈嘔逆。煩熱惡風。不欲去衣被。或額上微汗。或身體微腫。汗漬衣。濕當風坐臥。多有此證。麻黃杏仁薏苡甘草湯。或羌活勝濕湯。已得汗而發熱不去。敗毒散。見時疫加蒼朮。防已。

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治風濕一身盡痛。發

熱日晡。所劇者。

麻黃湯去桂枝加薏苡

五積散 傷濕又兼風寒。則拳攣掣痛無汗。慘

慘治之。

五苓散 傷膀胱與膀胱經不同。傷膀胱者。同也。意著脾。則不能屈伸。大便多滯。此醇酒厚味

水濕等所傷。濕從內中也。除濕湯。著腎則腰

疼身重。小便不利。此醉臥濕地。或下體濕衣

所傷。濕從外中也。腎著湯。濕盛身疼。小便不

利。體重。五苓散。加羌活。腰痛。腎著湯。身痛。

五苓散。加羌活。



蒼朮各五錢 桔梗各五錢 麻黃 枳殼 陳皮各五錢

厚朴 乾姜各五錢 半夏 茯苓 甘草各五錢

白芷 歸身 芍藥 川芎 桂枝各三錢

右為末。每服四五錢。加生姜三片。葱白三莖。

水煎去滓。熱服。溫覆取微汗。○表邪甚者。去

茯苓。芍藥。加香豉。○陰寒脈細。去茯苓。芍藥。

加熟附子。○逆氣乾嘔。加吳茱萸。虛加人參。

○無血病者。去芍藥。歸身。不效。嗽去桔梗。無頭痛。

去白芷。有汗。去麻黃。

○風濕脈浮。身重汗出。惡風。防己黃耆湯

防己黃耆湯 治風濕相搏。客在皮膚。關節疼

痛。腰已下疼重。脈浮自汗惡風

防己 黃耆各五錢 白朮一錢

甘草炙八錢 生姜四片 大棗二枚

右六味水煎。熱服。後當如行皮中。腰以下如

冰。後坐被上。又以一被遶腰下。溫令微汗差。

桂枝附子湯 風濕相搏。身重煩疼。不能自轉

側。不嘔不渴。脈浮虛而澹者

桂枝四兩 附子三枚 生姜三兩 甘草二兩 大棗十二枚

右五味。以水六升。煮取三升

○骨節煩疼。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯

甘草附子湯 治風濕大便堅小便自利

白朮 附子各六錢 桂枝二兩 甘草

水煎溫服

茵陳蒿湯 脈滑數小便赤澀。引飲自汗。為濕

熱。身黃橘子色。而小便不利。腹微滿者。

茵陳五兩 梔子一兩 大黃二兩

右三味水煎。熱服。微利。黃水去為度。未越三

日。再服

○小便不利而渴。五苓散。煩熱小便不利而

渴者。桂苓甘露飲

桂苓甘露飲 治溫熱病。小便不通。煩渴引飲。

五苓散。加寒水石。石膏。滑石

○濕熱相搏者。或因暑。清熱滲濕湯

清熱滲濕湯 治夏月濕熱痿困。煩渴泄瀉。溺

赤

黃蘗三兩 蒼朮 白朮 茯苓

沢瀉 黃連各一錢 甘草炙五分 竹葉十片

水煎熱服。小便利為効。○老人虛人加肉桂少許。氣虛喘乏。加人參。脈虛合生脈散。內傷生冷。加炮姜。

●肩背沉重疼痛。上熱胸膈不利。及遍身疼痛者。屬外因濕熱。當歸粘痛湯。其人陰虛多火。加之走精者。濕襲精竅也。虎潛丸。或粘痛湯。加龜版。白朮。牡蠣。濕熱屬裏者。則水腫小便不利。當與五苓散。神芎丸。輩。分輕重以泄之。後用實脾之劑。調理若夫陰水腫脹。別詳水腫本門。

當歸粘痛湯 治濕熱走注。遍身骨節煩痛。胸膈不利。足脛赤腫重痛。

羌活 甘草 黃芩 茵陳 酒炒各一

人參 苦參 酒洗 升麻 多汗易黃 葛根

蒼朮 自汗易挂 歸身 各六分 白朮 防風 下腫易防已

知母 痛熱易黃 猪苓 沢瀉 各八分 生姜 一片

水煎熱服。此濕熱疼腫之聖方。不赤不腫痛為寒濕。禁用。虎潛丸 見瘰。神芎丸 見水腫。

●濕家但頭汗出。項背強。欲得被覆。向火胸滿。小便不利。舌上加胎者。此丹田有熱。胸中有寒也。宜黃連湯和解之。若誤下。額上汗出。微喘。小便有利者。陰陽上下俱脫也。又下之。額上汗出。而小便反秘者亦死。若頭汗而小便如常。手足溫者。陽氣雖逆。陰氣猶未至。暴脫。白朮附子湯救之。若下之利不止。雖無額汗喘逆。此陰氣下脫。亦死也。

黃連湯 見傷寒

白朮附子湯 治風濕相搏。骨節煩痛。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡

風不欲去衣。或身微腫。白朮 二兩 附子 錢 甘草 錢 生姜 二兩 大棗 十二枚

水煎溫服。○中濕風濕。何以別之。山澤陰雨。薰蒸之氣。胃襲之者。名為中濕。此脾與腎受濕也。其證

一身盡痛。如薰香。脈來沉緩。治之以燥勝濕。兼利小便。若汗出當風。濕氣鬱閉於腠理。此膀胱與胃受濕也。其證惡風不欲去衣。肢節疼痛。脈來浮濇。治之以風藥勝濕。兼取微似

汗。此大法

○凡夏月之濕。多為濕熱

燥

燥在外。則皮膚皴揭。在上。則咽鼻生乾。在中。則水液衰少而煩渴。在下。則腸胃枯涸。津不潤。而便難。在手足。則痿弱無力。在脈。則細瀋而微。此皆陰血為火所傷。法當治以甘寒滋潤之劑。甘能生血。寒能勝熱。

○燥在上。則必乘肺經。故上逆而效。千金五味子湯。若內外合邪者。千金麥門冬湯。

千金五味子湯 治傷燥。咳唾中有血。牽引胸脇痛。皮膚乾枯。

五味子五分

桔梗

甘草

紫苑茸

續斷

竹茹

桑白皮蜜炙各一錢

生地黄二錢

赤小豆一根

右九味水煎。空心服。秘旨。加白蜜一匙。

千金麥門冬湯 治大病後。火熱乘肺。咳嗽有血。胸膈脹滿。上氣羸瘦。五心煩熱。渴而便秘。

麥門冬二錢

桔梗

桑白皮蜜炙 半夏

生地黄

紫苑茸

竹茹各一錢

麻黃分七

甘草分五

五味子十粒

生薑一片

右十一味。水煎。空心服。

○致燥之由。皆緣經脈阻滯。非續斷不能通之。故五味子湯用之。傷寒大病後。餘邪蘊釀。為火而乘於肺。非麻黃不能開之。故麥門冬湯用之。痰凝氣結。非半夏不祛之。

○風熱心煩。脾胃熱壅。食不下者。千金地黃煎。積熱煩渴。日晡轉劇。喘咳面青。能食便秘者。生地黄煎主之。

地黃煎 治風熱心煩。效喘便秘。脾胃熱壅。食不下。

生地黄汁

枸杞子汁二味酒搗各取汁

荆瀝

竹瀝各半升

真酥

生薑汁各一合

人參

天門冬各一兩

白茯苓八錢

大黃酒蒸

梔子蜜汁以黑各五錢

右十一味。以後五味為細末。入前六汁內。調方寸匕。再服。漸加以利為度。

生地黄煎 治積熱煩渴。日晡轉劇。喘咳面赤。能食便秘。

歲艱 知母 茯神 括萎根

地骨皮各三兩 石膏兩 生地黄汁二升

麥門冬汁 白蜜各一升 生姜汁二合 竹瀝六合

右咬咀。以水一斗二升。先煮諸藥。取汁三升。

去滓。下竹瀝。地黄。麥冬汁。緩火煎至四升。下

煉白蜜。姜汁。再煎數沸。初服三合。日三。夜一。

加至四合。夏月為散。收姜汁。竹瀝。焙乾。蜜丸

服。煎膏尤妙。

○燥於下。必乘大腸。故大便燥結。然須分

邪實。津耗。血枯。三者為治。邪實則大煩渴。躁

悶。腹脹。通幽湯。潤燥湯。清涼飲。四順清涼散。

麻仁丸。大腸風秘。血燥。潤腸丸。加郁李仁。防

風。名潤燥丸。潤而下之。能食熱盛。可用猪膽

導法。津耗者。屢欲便而不可得。圍飲了而

不了。便出。仍是大塊。異功。加二冬。沉香。用麻

仁。搗水煎服。兼嚼胡麻仁之類。外用蜜煎導

法。或削陳醬瓜。導之亦可。血枯。嘔逆。食不下。

大便如粟。生料六味丸。加肉苁。桃仁。搗水煎

服。或生料六味丸。去山茱萸。加生何首烏。當

歸。煎服。兼食人乳。酥蜜之類。老人氣血俱耗

渴者。固本丸。作膏。若至嘔逆不食。便如羊矢。不可治矣。

通幽湯 治大便燥結便出堅黑

當歸五分 升麻三分 桃仁泥一錢 甘草生炙各五分

紅花火炒 熟地黄 生地黄各二錢

水煎將成。用菜汁磨攪。柳五分。調入熱服。

潤燥湯

通幽湯。加麻仁。大黃。各一錢。

清涼飲 治上焦積熱。肺氣不化。口舌乾燥。

黃連 黃芩 薄荷 黑參

當歸 赤芍各一錢 甘草各五分

水煎。入生白蜜一七。熱服。大便便秘。結加酒蒸

大黃

四順清涼飲 治血熱便秘。脈實者。

當歸 赤芍 甘草 大黃酒蒸各錢半

水煎。入生白蜜一七。熱服。

按清涼飲。治上焦燥熱。故用薄荷之辛散。四

順清涼飲。主下焦燥結。故用大黃

麻仁丸 治脾約大便燥結

厚朴姜汁炒 芍藥 枳實炒各二錢

燥

大黃罌

麻仁泥

杏仁炮各

九十

右六味為末。煉白蜜。丸梧子大。飲服五十九日三服。以利為度。

潤腸丸 治大腸風熱血秘

麻仁

桃仁別研各

薤活

當歸各半

大黃綠塔水浸濕 紙裏煨半兩

皂角仁

秦艽各半兩 一作防風

除二仁別研。外為細末。蜜丸梧子大。每服五十丸。食前溫酒下。○加郁李。防風。名潤燥丸。

固本丸 治老人津血俱虧。效逆便秘

天門冬

麥門冬各八兩

人參四兩

蜜丸酒下。四錢熬膏。尤宜食少便秘。禁用。

●燥在血脉 多見風證。本無所畏也。燥本

火氣之餘。故以滋燥養榮湯。治外。大補地黃

丸。治內。潤燥養陰為第一義。火熱亢甚。津液

耗竭。不能榮養百骸。手足痿弱。不能收持。反

似痺濕之證。養陰茶中。必加黃藥。以堅之。若

誤作風證。則殆矣。

滋燥養榮湯 治血燥皮膚皴揭。筋攣爪枯。

四物湯。去川芎。加生地。黃。秦艽。防風。黃連。

甘草。

大補地黃丸 治積血枯槁。燥熱

四物湯。去川芎。加生地。黑參。黃藥。知母。乾

山菜。山茱萸。枸杞。肉蓯蓉。蜜丸。每服六七

十丸。空心鹽湯。臨臥溫酒下。

●燥有內外諸證。不能盡述。其在皮膚。則

毛皴揭。在大腸。則脾約。便難。在肺經。則乾欬

痰結。在肺藏。悲愁欲哭。證雖各異。而脈之微

細。瀆小則一。間有虛大。數疾。浮乳等之狀。以

意察之。重按無有不瀆。不細不微者。

### 火

凡人一身。只陰陽二氣。陽氣生發。陰氣皆和

為血。陽氣不足。陰氣皆化。為火矣。陰虛火動

者難治。八味丸。桂附之類。虛火可補。如保元

湯。參耆之類。實火可瀉。如解毒。三黃類。

八味丸。見虛損。保元湯。全。解毒湯。見時疫。

伊尹三黃湯名公。名火。齊湯。金匱。名瀉。心湯。 治三焦實熱。煩

躁便秘。

黃連酒煮

黃芩酒炒

大黃酒浸 等分

麻沸湯二升。漬之。須臾絞去滓。分溫再服。麻

沸湯白水空煎。鼎沸如麻也。古方惟降火藥用之。

○凡火盛之者。不可驟用寒涼。必兼辛散。如瀉陰火升陽湯升陽散火湯

瀉陰火升陽湯 治火鬱發熱

補中益氣湯。去白朮。當歸。橘皮。加羌活。蒼朮。黃芩。黃連。石膏。早飯後大溫服

升陽散火湯 治胃虛過食寒物。抑遏陽氣於脾土中。畏寒發熱。火鬱則發之也

升麻葛根湯。加羌活。獨活。人參。柴胡。防風。

生甘草。○氣壯脈實。火盛類狂者。可用硝黃正治。如虛火盛。而狂亂。以生姜湯。從治之。若投以

硝黃正治。立危。○一切壯火狂陽。痰氣上衝。膈膜。流入心包。諸藥不效。內外熱熾者。和劑紫雪。可以平之。積熱咽腫。口舌生瘡。煩燥妨悶。水漿不下。

碧雪主之

紫雪方茶見類方志之部

碧雪全上見邊之部

朴硝煎 好餅丹石藥。毒迅發。壯熱不已者。千金朴硝煎

○凡氣有餘。便是火氣。從左邊起者。肝火也。

佐金丸。當歸龍薈丸。從臍下起者。陰火也。八味丸。黑錫丹

佐金丸 治肝經鬱熱。吐酸綠青黃水。

川黃連齋 吳茱萸一兩同黃連煮乾

為細末。米飲糊丸。梧子大。每服四五十丸。

空心中。白朮。陳皮湯。或加味道遙散。作湯送下。

當歸龍薈丸 治肝經積熱。時發驚悸。搐搦神

志不寧。頭目昏眩。咽膈不利。腸胃燥結。躁擾

狂越等證

三黃丸。加當歸。龍膽。蘆薈。梔子。青黛。木香。麝香。蜜丸。淡薑湯送下

八味丸 見虛損

黑錫丹 治氣虛上逆。遂成痞塞。而疼者。

沉香 附子 胡蘆巴 陽起石

肉桂各半 藿香 破故紙 肉豆蔻

金鈴子 木香各一 硫黃與黑錫 黑錫各二

右為末。酒糊圓。如梧桐子大。每服三四十圓。

空心姜鹽湯送下

○五志過度。喜怒悲志不節。正氣亢鬱。變而為火者。於爵門求之。此治火之大畧也。

○脈盛滿指為實大。或炎膈上。即為心肺之火。或迫中宮。即為脾胃之火。或結下焦。即為小腸膀胱之火。分其部位。推之。隨其微甚。而調之。

○若弦細而數疾。按之益堅。真陰耗竭。虛陽飛越之兆。久病得之。百不一生。惟元氣急脫者。猶可峻補以斂固之。

○火鬱中焦。惡寒戰慄。則有六脈小匿者。此火氣鬱伏。灰燼不得發光舒燭。反兼寒水勝已之化也。

○熱結胃口。欬吐痰血。亦有寸口滑實者。熱遺下焦。淋溺痛多。有尺內洪滑者。皆胃中濕濁下滲之候。終與火無預也。

○當知火盛之脈。浮取雖洪。盛滑疾。中按則軟弱不堅。重按則豁然中空。尋之脈見指傍。舉指濳々然。如輕刀刮竹之狀。方是無形之火象。若中宮有物阻礙。則關上屈而出。膈

上有痰凝滯。則寸口屈曲而上。總謂之鈎。如阻滯則無屈曲之象矣。若洪盛而中按重按益實。指下纍々如循貫珠。薏苡子狀。者皆有形之濕熱。蘊積於經脈之中。不當於火門求治也。

黃連湯

附子

治心火舌上生瘡。或舌上腫燥

裂。或舌尖出血。或舌硬

黃連 梔子 生地 當歸 麥門冬

芍藥 薄芎 犀角 甘草

右水煎

中風

卒中暴仆。先用蘇合香圓。醒後。隨證用茶。

○陰中多見脫證。急用利氣丹。經以三生飲。加人參。竹瀝。姜汁。

○卒中。痰涎壅盛者。宜吐之。用稀涎散三

四錢。溫水調灌。不大嘔吐。但微々令涎。自口

角流出。即蘇。或橘紅一味。大劑煎湯灌。即吐

虛甚者。惟用參。著。竹瀝。挾寒者。加桂附。

○元氣素弱。或遇勞役嗜欲。卒然厥仆。手

必撒口必開宜用大劑參耆。

●中寒卒倒。昏不知人事。手足厥冷。或口

吐白沫。嘔逆清水。唇面青黑。口鼻氣微冷。脉

微細。或無。為中寒。治之。

●中暑。無故卒倒。昏不知者。用熱土熨臍

中法。

●醉飽過度。或感風寒。忽然厥逆。口不能

言。肢不能舉。此名食厥。審問醉飽。以姜鹽湯

探吐。

●尸厥腹痛。不知人。卒然悶亂。此卒中天

地戾氣。用附子一枚。人參三兩。酒煎三服。灸

百會四十九壯。丹田氣海三百壯。艾炷大棗

豆。

●暴厥脉伏。不省人事。莫辨陰陽。急用熱雞

子法。

●暴怒氣厥。不知人事者。蘇合香丸

三生飲

南星一兩 烏頭半兩 附子半兩 木香二錢

姜煎。薛已。加人參一兩。

利氣丹 閱甫翁自製 治痰涎忽壅盛而氣絕氣

中中氣等急證皆正可用之

人參二錢 南星炮一錢 川烏頭半錢

附子半錢 木香二錢 辰砂一錢

右細末。煉蜜為丸。梧桐子大二三粒。生姜煎

湯送下。此即澹寮方。順元散也。加人參。辰

砂。以丹棗備倉卒。凡氣厥。氣中。中風等證。卒

然運倒。痰涎上衝。則必宜用此。小兒驚風尤

宜。

○醒後 凡中風醒後。有表證者。小續命湯

省風湯

前症。痰涎盛。脉數有熱者。

陳膽星一錢五分 防風一錢 生半夏

黃芩 生甘草各七合半 生姜十片

水煎

大省風湯

痰涎嘔吐。而脉沉。厥冷者

陳膽星三錢 防風 獨活 生附子各一錢

全蠍 生甘草 生姜

水煎。不効。重用三生飲

小續命湯

麻黃 桂枝 當歸 人參

乾姜 甘草各三錢 芍藥 防風



黃芩各一錢四分 芍藥

防已各一錢

熟附子七

杏仁三十枚 生姜五片

大棗一枚

水煎。○有汗惡風。倍桂枝。芍藥。○無汗身熱。不惡寒。去附子。倍甘草。加石膏。知母。○有汗身熱。不惡風。倍桂枝。黃芩。加葛根。○無汗身熱。身熱。不惡風。倍附子。乾姜。○有汗無熱。畏寒。脉涼。脉沉細。倍附子。乾姜。○有汗無熱。畏寒。脉沉。倍桂枝。附子。甘草。○肢節攣痛麻木不仁。脉緩。加羌活。連翹。右易老。加減法。

●偏枯 左癱右瘓。左半身不遂。或傷血。致目昏。耳憤。頭眩。乏力。四物湯。加羌活。肉桂。防風。紅花。桃仁。生薑。病久氣虛。宜參耆三聖散。

參耆三聖散

治風中血脉。左半肢癱。口目左

喎

當歸

肉桂

人參各等分

為散。每服五錢。去滓。早暮各一服。

千金附子散

右半身不遂。四肢無力。痰涎壅盛。或一臂不遂。時復轉移一臂。

麻黃附子細辛湯。加乾姜。桂心。人參。防風。芍藥。羚羊角。為散。水煎。加竹瀝。日服一劑。効。

●下半體疼重更弱。

甄權防風湯 治偏風。

防風 芍藥 白芷 牛膝 狗脊

草薢 白朮各三錢 羌活 葛根 附子外臺作

杏仁各六錢 薏苡仁 石膏 桂心各九錢 麻黃一兩

右生薑。一兩半。水煎。分三服。并鍼風池。肩髃。

曲池。支溝。玉樞。陽陵泉。巨虛下廉。各一。凡七。

穴。一劑覺好。更進一劑。即鍼一度。九劑。九鍼。

即愈。灸亦得。

○偏風 其脉沉細。是風痰在上。焦竝宜導。

痰湯。加羌活。白朮。不應六君子湯。加當歸。寒加桂心。熱加竹瀝。

○半身不遂 口眼喎斜。手足戰掉。語言蹇澀。明頭風。從外。身熱無汗。惡寒。小續命湯。加減。自汗不宜服。然又有病發左半。口往右喎。

者。蓋大筋短縮。筋屬肝。肝病故左半身不遂。舌筋亦短。而蹇於言。左畔小筋弛長。故從口。

者。治宜從右引左。大理。右半脾胃之氣。以連。

出左半之熱。痰虛風。當以四君子。加羚羊角。柴胡。姜汁。竹瀝。冬月。稍加炮姜。熟附子。以從。

治

○半身不遂而多汗。神昏。痰涎上湧者。大劑參耆。神中益氣。十全大補。人參養營。大建中。選用

○半身不遂。骨節離解。口面喎斜。便利無度。麻黃附子湯。加桂心。乾姜。芍藥。然身半以上。俱無恙。身半已下。軟弱麻痺。小便或瀉。或遺此足三陰虛證也。地黃飲子。慎不可用燥濕攻痰。若果痰盛。星香散。二陳湯。濕盛。薏苡仁湯。兼氣虛者。六君子湯。兼血虛者。大秦朮湯。酒濕為病。作痺證。口眼喎斜。半身不遂。渾似中風。舌強不正。當瀉利濕熱。不可風治而汗之也。

地黃飲子

治腎氣不上交於心。舌瘖足痺。

熟地三兩

巴戟酒浸

肉蓯蓉 山茱萸

石斛

附子炮

茯苓 石菖蒲

遠志

肉桂

麥門各一兩 五味子五錢

共為鹿末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄苛七葉。水煎。日二服。服無時。

星香湯

治中風痰涎潮塞。不省人事。服熱茶

不得者

南星姜

木香姜

生薑姜

大秦朮湯

水煎。服無時

四物湯。加秦朮大。生地。羌活。獨活。防風。細辛。茯苓。白朮。白芷。黃芩。甘草。一有石膏。

薏苡仁湯

治中風濕痺。關節煩疼。不利。

薏苡二兩

芍藥

當歸各半

麻黃

桂各八分

蒼朮一錢

甘草分

生薑七片

水煎無時。若自汗。加石膏。煩熱疼痛。加酒黃蘗。厥冷拘急。加熟附子。

●口眼喎斜者。口喎灸地倉。目斜灸羨泣。苟不効。灸人中。古方用大秦朮湯。今改用十全大補湯。

○口眼喎斜。須分左右。邪盛則急。正虛則緩。左急者。屬血中有邪。舒筋三聖散。加姜。棗。病久氣虛者。參耆三聖散。

舒筋三聖散

當歸

肉桂

延胡索等分

水煎

○右急者。屬氣分受邪。八味順氣散。去青皮。加羌活。又法。桂枝三兩。酒煎。膿液。以布漬之。

八味順氣散 治類中風。虛脹。喘逆。

○口眼喎斜。一臂不仁。千金附子散。

四君子湯。加青皮。橘皮。白芷。烏棗。為散。每服四五錢。水煎溫服。

○口噤不開者。皂莢。乳香。黃耆。防風。煎湯薰之。然須大湯液。如蒸。如霧。乃得力耳。

○風邪乘虛。入其筋。則攣。故令口眼喎斜。牙關急。而口噤。秦朮升麻湯。風寒客於會厭。卒然無音。虛則地黃飲子。痰則滌痰湯。實則涼膈散。加犀角黃連。一法。南星。半夏。為末。擦其牙齒。爵金。藜蘆。搗鼻。

秦朮升麻湯

升麻湯。加秦朮。人參。桂枝。白芷。防風。葱白。

滌痰湯 治類中風。痰迷心竅。

導痰湯。加菖蒲。人參。竹茹。

●痰涎壅盛。宜先吐之。稀涎散。後用星香。

二陳。導痰之類。挾虛。用參。耆。竹瀝。挾寒。加桂附。姜。汁。上盛下虛。痰涎壅盛者。六君子。加南

星。木香。送黑錫丹。

●語言蹇澀。心脾二藏受風邪。舌強不得

語者。獨活散。四肢不收。手足躄曳。腎虛。而腎經與胞絡。內絕不通於上。則瘖。腎脈不上。循喉嚨。挾舌本。則不能言。二經不通於下。則瘖

厥矣。急宜地黃飲子。庶可挽回一二。

●如脾土不足。痰涎壅盛。而蹇澀者。是痰火壅塞上竅。氣虛不能上。則舌機不轉。宜六君子。加南星。木香。菖蒲。遠志。枳實。竹茹。

●口眼喎斜。不能言。遇風則四肢拘急。脈浮而緊。此手足陽明經虛。風所乘。秦朮升麻湯。

●口瘖不能言。足痿不能行。屬腎氣虛弱。名曰瘖也。地黃飲子。

●卒然暈倒。口喎斜。口角流涎者。氣虛挾痰也。六君子。加天麻。姜汁。竹瀝。

●血弱舌痿。不能言。手足不能舉。十全大補湯。

●風熱上壅。痰盛不能言。涼膈散。加菖蒲。遠志。辰砂。

●驚痰堵塞。舌本強硬。語言不清。正舌散。加

薄荷

●舌麻。語澀。不能言。省風湯。加沉香。

●脾緩舌強。半身不遂。資壽解語湯。脉虛

無力。加人參。茯苓。白朮。

●心血衰少。得之於暑者。祛風定志。

●血衰心失滋養。語不出。叩之不應。十全大

補湯。加菖蒲。遠志。

●痰迷心竅。昏憤口噤。不能言。滌痰湯。有

熱。加芩。連。姜。汁。竹瀝。

●舌瘖。脉洪。口角流涎。喜笑不休者。導痰

湯。加白朮。芩。連。竹瀝。姜。汁。

●肥人。舌根強硬。作濕痰治。瘦人作心火

治。雖病久。正虛。不可純用補藥。壅滯經絡中

之痰火。若飲食如常。但失飲不語。俗呼啞風。

小續命湯。去桂。附。加菖蒲。真中心經。啞不能

言。口開面赤者。必死。勿治。

●角弓反張者。風氣乘虛。入於諸陽之經。

則腰背反折。攣急如角弓。宜小續命湯。加減。

或倉公當歸湯。見痺門。更參瘕證。治之。

●四肢不舉。脉緩大有力。而四肢不舉者。

土太過也。當瀉其濕。胃苓湯。脉細小無力。而

不用者。土不及也。補中益氣湯。隨證加減。瘦

人血枯。筋急。土旺風淫者。四物湯。加鈎藤。秦

朮。防風。肥盛色白。痰多者。六君子湯。加秦朮。

天麻。竹瀝。姜。汁。

●麻瞽不仁。虛風之證。能食麻。牙關引搐。

目內蠕動。升麻胃風湯。見下。麻痺不仁。鼻額

間痛。唇口頰車。髮際皆痛。口不可開。言語。飲

食。妨礙。左額頰上。如糊急。手觸之則痛。此足

陽明經。受風。氣血凝滯。不行。犀角升麻湯。見

一切風氣攻注。四肢骨節疼痛。遍身頑麻。手

足癱換。言語蹇澀。無汗。烏茶順氣散。十指。并

面麻瞽。乃氣虛風襲。補中益氣。去白朮。當歸。

橘皮。加白芍。五味。麻督體軟。癢起白屑。乃脾

氣不榮。補中益氣。加地黃。芍藥。風濕相搏。手

足麻痺者。千金排風湯。手足麻瞽。膈塞體痛。

寒熱眩暈。成為寒熱也。千金解風散。

烏茶順氣散

治暴中風。氣攻注。遍身麻痺。語

言塞澀。口眼喎斜。喉中氣塞。有痰聲。

麻黃 橘皮 烏茶 各三兩 僵蚕 一枚 川芎

枳殼

甘草

白芷

桔梗

乾姜

炮五

右十味為散。每服半兩。加生姜三片。大棗一枚。水煎熱服。吳氏曰。初病邪氣實者。宜之。

千金排風湯見下

千金解風散見下

●表虛自汗者。虛風傷衛。而汗出者。黃耆建中湯。陽氣虛。加附子。若兼寒熱者。小柴胡湯。氣虛。補中益氣湯。每夜發熱。自汗。為血虛。當歸補血湯。酒客。多濕熱。入兼房勞。汗出。中風下體多汗。不能勞。衣常濡。口乾善渴。十全大補。加熟附。防風。黃蘗。沃瀉。凡中風自汗。而小便少者。不可以茶利之。既已自汗。則津液外亡。小便應少。若利之。使營衛枯竭。無以制火。煩熱愈甚。當俟熱退汗止。小便自利。且此證。屬陽明經。大忌利小便。

●神氣昏冒者。虛火妄動。挾痰。氣逆衝心。主被障。所以昏不知人。須大劑人參。芎。歸。兼柴胡。梔子。審係中在心包。而非中府。閉證而非脫證。牛黃丸。虛人六君子。加星。香。菖。遠。竹。瀝。姜。汁。若狂言語亂。精神恍惚。痰涎壅盛。導痰湯。加芩。連。竹。瀝。姜。汁。

●遺尿不禁者。

脾虛下陷。而膀胱不約者。

補中益氣湯。加益智。腎虛不能攝者。地黃飲子。若卒中有此兼諸惡證者。為腎絕。不治。

●不治諸證。

髮直。吐沫。搖頭。上攛。魚口。氣粗。直視。眼小。目瞪。喉聲如鋸。面赤如粧。汗出如珠。循衣摸床。神昏不語。頭面手足。爪甲。青黑。大吐。大瀉。吐血。下血。其脈堅急。躁疾。短瀆者。不治。

●脈

浮緩。中風之本脈。兼緊則多表邪。兼大則多氣虛。兼遲則多虛寒。兼數則多虛熱。兼滑則多痰濕。皆可治之。脈惟兼瀉者。為脈不應病。多為危兆。以痰證。脈瀉。為正氣虛衰。經絡閉滯。難於搜滌也。所以中風之脈。最忌伏瀉不調。尤忌堅大急疾。

稀涎散

治中風卒倒。痰涎壅盛者。脈氣虛微。禁用。

豬牙皂角

四條去皮弦子

白礬

一兩半生

每用三字。溫水灌下。未甦。以頃再用。○一方。用巴豆六粒。去皮膜。研壓去油。入礬中。鎔化。待礬枯。為末。和牙皂末。拌勻。每用酒五分。吹

入鼻中

蘇合香圓

局方

治傳屍殞殞。心腹卒痛。僵仆

不省一切氣。屬寒證

蘇合香

別研白

安息香

無灰酒熬水飛

薰陸香 別研

龍腦香 別研

丁香

麝香 別研勿經

青木香

白朮 沉香

香附 炒

烏犀角

鑄屑別

右十一味。為末。逐一配勻。諒加煉白蜜。和劑

分作五十九。別以硃砂一兩。水飛為衣。蠟護

臨用。剖開。并花水。生姜湯。溫酒。化下一丸。

原方。尚有白檀香。草撥。訶黎勒。三味。因大瀉

燥。故去之。取諸香。開寒閉。僅用犀角。為寒

因寒用之嚮導。

正舌散

治驚痰。堵塞竅隧。肝熱生風。舌強不

正。

蠍尾 去毒。煮。醋

茯苓 一兩。姜

為散。每服二錢。溫酒調服。并擦牙齒。日三度

○面赤。倍蠍尾。加薄荷半兩。每服四錢。水煎

熱服。取汗効。

資壽解語湯

治中風。脾緩舌強。不語。半身不遂。

防風

天麻 爛切。姜

附子 炮。各一

杏仁 炒。研。二

羚羊角 鑄 觀挂

羌活 各八

甘草 各五

水煎。入竹瀝半杯。姜汁數匕。服無時。脉虛。如

人參。

升麻胃風湯

治胃風。能食。手足麻。瞽。目。瞶。面腫。

升麻 當歸

白芷

葛根 各六

蒼朮 制八

麻黃 藜蘆

羌活

草豆蔻

蔓荆子 各四

柴胡 黃蘗 姜製

甘草 各五

生姜 三 大棗 一枚

水煎。食遠服。

犀角升麻湯

治風熱。頭面腫痛。頰上如糊。咽

喉不利。

犀角 鑄三

升麻 一

防風

羌活 各一

白芷

黃芩

白附子 各六

甘草 各四

水煎。食遠服。

千金解風散

治風。成為寒熱。頭目昏眩。肢體

疼痛。手足麻痺。上膈壅滯。

人參 二兩

麻黃 一兩

芎藭

獨活

細辛

甘草

為散。每服四五錢。入生姜五片。薄荷七葉。水

煎服。

古今錄驗續命湯

治中風。非身體不能自收。并治但伏不得臥。效逆上氣。面目浮腫。

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏

乾姜 甘草 各一錢 芎藭 一錢 杏仁 三十枚

右九味。水煎。溫服。千金。無人參。有防風。黃

芩。芍藥。

千金排風湯

治中風。肢體煩疼。皮膚不仁。

續命湯。去人參。石膏。乾姜。加防風。芍藥。白

朮。茯苓。獨活。白蘚皮。生姜。

附方

一方 治卒中。并麻痺。攣動。欲為中風。

稀薺草。燒存性。和勻蝦蟆脂。白湯送下。

○或傳云。口眼喎斜。因寒濕五積散主之。有

因疝氣者。必見腹內青筋。牽引。三和散主之。

痺

行痺者。走注無定。風之用也。經言。病在陽者。命曰風。在陰者。命曰痺。陰陽俱病。命曰風痺。

越婢加朮附湯

依本方。加白朮四錢。附子一錢。

○輕則 羌活。防風。當歸。葛根。赤芍。甘草。威靈仙。蒼朮。黃蘗。

○病久大虛。宜大補氣血。

○痛痺者。痛有定處。乃濕氣傷腎。腎不生肝。

肝。風挾濕。流走四肢。肩髃疼痛。拘急。烏頭湯。加

加羌活。官桂。

金匱烏頭湯

麻黃 六錢 黃耆 姜汁和 芍藥 酒炒各

甘草 炙一錢 川烏頭 一枚。以蜜一升。煎取五合。即出烏頭。

右除烏頭。以水三升。煮取一升。去

滓。內蜜煎中。更煎之。分二服。不知盡服。○服

後。啜熱稀粥。助其作汗。乃解。

千金附子湯

此湯主之。身體痛。如欲折肉。如錐刺刀割。

附子 一枚 芍藥 桂心 甘草

茯苓 人參 各一兩 白朮 二錢

右七味。以水八升。煮取三升。分二服。

●著痺者。痺著不仁。經曰。衛氣虛則不仁

且不用。靈樞云。衛氣不行。則為麻木。東垣治

麻木。必補衛氣。而行之。渾身麻木不仁。或左。

或右半身麻木。或面。或頭。或手臂。或脚腿。麻木不仁。並神効黃耆湯。

神効黃耆湯

治氣虛耳目不明

保元湯用黃耆二錢。人參。甘草。各一錢。加白芍一錢。蔓荊子二分。橘皮五分。

皮膚間麻木。此肺氣不行也。去蔓荊。倍黃耆。加防風。○肌肉麻。營氣不行也。去蔓荊。加桂枝。羌活。防風。○手足麻痺。臂痛不能舉。多眠昏冒者。支飲也。氣口脉滑。指迷茯苓丸。脉浮者。二陳湯。加桂枝。枳殼。桔梗。

指迷茯苓丸

二陳湯俱見痰飲

○若手麻。乃是氣虛。十指麻。乃是濕痰。死血。手指麻。木。是氣不行。有頑痰。死血也。導痰湯。加烏菜。蒼朮。

導痰湯

見痰飲

○風吹手足。痠疼而腫。是寒濕。桂枝附子湯。見傷寒

○因於風者。百節走痛。烏菜順氣散。加羌活。南星。蒼朮。

烏菜順氣散

見中風

○因於濕者。天陰即發。身體沉重痠疼。除濕蠲痛湯。

除濕蠲痛湯

蒼朮 白朮 羌活 茯苓

澤瀉 陳皮 甘草

水煎。入姜汁。竹瀝。各數匕。熱服。取微汗効。○在上痛。加桂枝。桔梗。在下痛者。加防己。木通。多汗。加黃耆。防風。○自汗身重。防己黃耆湯。見濕門

○寒濕。不可屈伸者。烏頭湯。見上。活絡丹。見漆痛。選用。并外摩風膏。

摩風膏

治風毒攻注筋骨疼痛

草麻子 川烏頭 乳香 右以豬脂研成膏。烘熱塗患處。以手心摩之。覺熱如火効。

●因火者。五苓散。見傷寒。加酒芩。黃蘗。竹瀝。姜汁。

當歸粘痛湯

見濕 因溼熱者。肢節痛疼。肩背

沉重。胸膈不利。下注足脛痛腫。當歸粘痛湯。

犀角散

熱毒。流入肢節疼痛。患處必熱。千金



犀角散

犀角 鑄二兩

羚羊角 鑄二兩

前胡

黃芩

梔子仁

大黃

升麻 五味並姜汁拌炒

射干 酒炒黑各四兩

豉一升

右九味為散。每服五錢。水煎。食後熱服。

○血瘀者。芎。歸。桃仁。紅花。威靈仙。煎成。入麝少許。

○血痺者。邪入於陰也。經云。人卧則血歸於肝。汗出而風吹之。血凝膚者。為痺是也。黃耆桂枝五物湯。

黃耆桂枝五物湯 治血痺。身體不仁。如風狀。

桂枝湯。去甘草。加黃耆等分。

○晝輕夜重。加當歸。

附子丸 見膝痛 痺而身寒。如從水中出者。屬寒溼。

○血氣凝滯。手足拘攣。疼重。風寒溼。三氣雜至者。改定三痺湯。

改定三痺湯 治風寒濕氣合病。手足拘攣。

人參 黃耆 酒炒 白朮 當歸 川芎

白芍 茯苓 各一錢 甘草 炙 桂心 防己

防風 烏頭 炮各五分 細辛 三分 生姜 三分 紅棗 二枚

水煎。不拘時熱服。

○周痺者。真氣不能周於身。故周身痺痛。用蠲痺湯。見臂痛。行痺上半身甚。用烏某順氣散。下半身甚。用虎骨散。見腰痛。痛痺。用烏頭湯。著痺。用除濕蠲痛湯。不應。補中益氣湯。見內傷。加熟附子。羌活。蒼朮。黃蘗。

○有痺遍身走痛無定。二陳湯。加羌活。風化。稍。姜汁。糊丸。

安腎丸 見虛損 痺在骨。安腎丸

羚羊角散 筋痺。肢節束痛。羚羊角散

羚羊角 鑄二兩 肉桂 附子 炮各半兩 白芍 一兩

獨活 防風 各七錢半 川芎 一兩 當歸 一兩

為散。每服四五錢。入生姜三片。水煎。食遠熱服。

人參丸 治脉痺。大熱。經脉不利。痺在脉。

人參 麥門 茯神 龍齒 煨 石菖蒲 遠志 黃耆 各一兩 當歸 半兩 地黃 二兩

為末。煉白蜜丸。梧子大。每服五七十九。食前。清米飲。醇酒。任下。

○痺在肌肉。神効黃耆湯。  
 ○痺在皮。越婢湯。加羌活。細辛。白茯苓。  
 ○痺在腸。吳茱萸散。

**吳茱萸散** 治腸痺。寒溼。內搏。腹痛脹急。大便  
 瀉。

吳茱萸 肉豆蔻煨 乾姜炮黑 甘草炙各五錢  
 砂仁炒 神麴炒 白朮炒各一兩 厚朴

陳皮 良姜各三錢

為散。每服三錢。食前臨卧。各一服。米湯送下。  
 ○痺在胞。腎瀝湯。虛寒。茯苓丸。虛寒甚者。已  
 戟丸

**腎瀝湯** 治胞痺。溺瀆不通。蘊積為熱。小腹急  
 痛。

麥門 桑白皮蜜酒炙 犀角鎔各一錢 杜仲鹽酒炒  
 桔梗 赤芍 木通各半 桑螵蛸二錢半

水二盞入。羊腎二枚。去脂膜。竹刀切片。入竹  
 瀝少許。同煎至一盞。空心頓服。

**茯苓丸** 治胞痺。小腹膀胱。按之內痛。若沃以  
 湯。瀆於小便。上為清涕。

赤茯苓一兩 細辛 澤瀉 肉桂各五錢

紫苑茸二兩 附子炮三錢 生地黃一兩 牛膝酒浸一兩

山茱萸錢 乾山茱一兩

為末。蜜丸。梧子大。每服五七十九。食前米飲  
 臨卧温酒送下。

**巴戟丸** 治胞痺。虛寒。臍腹痛。溲數不利。睡則  
 遺尿。

巴戟去魯 生地酒焙各兩半 桑螵蛸切破炙 山茱  
 肉苁蓉酒浸 山茱萸肉 兔絲子酒煮各一兩 附子炮  
 肉桂各五錢 遠志甘草湯泡去骨四錢 石斛去根八錢 鹿茸一對酥炙

為末。煉白蜜丸。梧子大。每服三五十九。空心  
 臥時。米飲温酒。任下。黃絲湯尤妙。

●寒痺。宜以蜀椒。乾姜。桂心。各四兩。醇酒五  
 觔。絮四兩。布五尺。馬矢火煨。一伏時。將絮布  
 曝乾。收。盡灸熱慰之。

●著痺不移。脰肉破。身熱脉瀆不治。

●痛風。而痛有常處。其痛上赤腫灼熱。或渾  
 身壯熱。此欲成風毒。宜敗毒散。見時疫如肢  
 節痛。須用羌活。去風濕。亦宜用之。

●肥人肢節痛。多是淫痰流注。宜導痰湯。  
 ●瘦人肢節痛。是血枯。宜四物湯。加羌活。

防風

●老人性急作勞。患兩腿痛。動則痛甚。或血痢用瀉藥。惡血流入經絡。隧道而變痛風。並宜四物。加桃仁。陳皮。牛膝。生甘草。煎入生姜。研潛行散。有瘀積。加酒熱服。并刺委中血。然非二三十貼。不効。

潛行散

治溼熱。足膝腫痛。

大補丸。用姜汁拌炒數次。

為末。每服錢半。空心醇酒下。

●壯年人。性躁兼嗜厚味。患痛風。攣縮。此挾痰與氣證。導痰湯。加牛膝。枳殼。通草。桃仁。煎入生姜。研潛行散熱服。

●溼熱痰火。死血滯於經絡。四肢麻痺。或癢輕而新者。可以緩治。久而重者。必加烏附。驅逐痰溼。壯氣行經。大便阻滯。必用大黃。

●遍身骨節疼痛。肢節如槌。晝靜夜劇。如虎嚙之狀。乃痛風之甚者也。必飲酒當風。汗出入水。遂成斯疾。寒則倉公當歸湯。千金大棗湯。防已湯。

倉公當歸湯

治賊風口噤。角弓反張。成瘓。

麻黃附子細辛湯。加當歸。防風。獨活。水酒和煎。

千金大棗湯

治歷節疼痛。

麻黃附子甘草湯。加黃耆。姜。棗。日三服。汗之。

防已湯

千金。治歷節。四肢痛。如錐刺。

防已黃耆湯。去黃耆。大棗。本方中。防已。白朮。生姜。各四錢。甘草三錢。加桂心。茯苓。各四錢。烏頭一枚。去皮熱。人參二錢。以苦酒和水。日三夜一服。當覺焦熱。痺忽々然。慎勿怪也。若不覺復服。以覺乃止。

○熱則千金犀角湯。當歸粘痛湯。加姜汁。炒黃柏。

○掣者為寒。腫者為濕。汗者為風。三氣雜至。傷於血脉之中。衛營滯滯不行。故痛。用虎骨。犀角。沉香。青木香。當歸。羌活。桂枝。秦艽。牛膝。骨碎補。桃仁。甘草。水煎。

○歷節風毒攻注。骨節疼痛。發作不定。烏茶順氣散。不應。五積散。四肢疼痛。其人短氣。脈沉為留飲。導痰湯。加減。

○脉大而濡為痺。脉急亦為痺。右寸沉而遲。瀆為皮痺。左寸結而不流利。為血痺。右關脉舉按皆無力。為肉痺。左關弦緊。而浮沉有力。為筋痺。肺脉微。為肺痺。心脉微。為心痺。○凡一身盡痛。傷寒。霍亂。中暑。陰毒。溼痺。痛痺。皆有體痛。其流連難已者。於左求之。○寒而痛。痛處常冷。或如溼狀。甘草附子湯見濕。

○內傷勞倦。兼風濕相搏。一身盡痛。補中益氣湯。如羌活防風蒼朮。

○濕熱相搏。肩背沉重疼痛。上熱胸膈不利。遍身上下沉。重疼痛。當歸粘痛湯。

○風溼相搏。一身盡痛。陰溼中。汗出懶言。四肢困倦。乏力。走注疼痛。乃下焦伏火。不得泄。而躁熱。常微汗出。而熱不解。麻黃復煎湯。

麻黃復煎湯

治風溼倦怠。常微汗出。

麻黃去節一錢

用水三盞。先煎令沸。去上沫。至二盞。入下項藥。

黃耆五錢

白朮

人參各半

柴胡

防風

羌活

黃蘗薑汁炒

生地黄各一

甘草生二分

杏仁五分

杏仁皮去

右十味。入麻黃湯中。煎至一盞。卧時半饑熱服。不可飽。服後微汗為度。不可過汗。則熱不止。而煩擾不寧也。搥鼓湯解之。

●身體拘急。皆屬虛寒。與寒濕風濕。小續命湯隨證。加減。

●發寒熱。而周身作痛。胸脇痞悶不舒。肝血虛。而鬱火用事也。逍遙散。見虛損。加羌活。挂枝。小便不利。加山梔。丹皮。

●天暑衣厚。則腠理開。汗出邪留於分肉之間。聚沫則為痛。六和湯。加羌活。

●遍身皆痛。如勞證者。十全大補。見虛損。去白朮。熟地。加羌活。附子。

●下體痛。宜分利小便。五苓散。二妙散。主之。

二妙散

治身半已下。溼熱疼重而腫。

大補丸

改用薑汁製散次淨加茅山蒼朮去皮切碎

為散。姜汁調。每日空心。溫酒送下。二錢。○本方。加肉桂。各三妙散。

●下體腫痛。脈浮自汗。惡風。防已黃耆湯。見水腫。溫覆汗之。痛而大便不通者。厚朴七物湯。見傷寒。

●因濕痰濁血。流注為痛。若在下焦。道路深遠。非烏附。不能下達。少加引經用之。

●肢節腫痛。痛屬火。腫屬溼。蓋為風寒所鬱。而發動於經絡之中。溼熱流注於肢節之間。而無已也。先宜微汗以散之。故羌活。桂枝。肢節痛之要藥。

●身體疼痛。及重者溼也。五苓散汗之。如風溼相搏。一身盡痛。加羌。防。升。柴。蒼朮。藁朮。風能勝濕故也。

●環跳穴痛不已。可防生附骨癰。掘地成坑。以火煨赤。沃以小便。赤體坐其上。以被圍繞下體。使熱蒸。膝理開。血氣暢則愈。

●几遍身疼痛。脈弦小。或豁大。為氣虛損。附方

劉寄奴

能治痺痛。加主方効。

一方 治手足疼痛。或腫。或風毒。

丁香 乾姜 良姜 益智

陳皮 三稜 莪朮 槓榔

右漬沸湯服。後將滓水煎服。

痿

凡人自覺兩足熱如灸。自足踝下。上衝膝腿。且痿弱軟痛。能行而不能久立。脈濡而數。乃陰虛而挾溼熱也。虎潛丸不應。以加附子。骨痿不能起於牀者。金剛丸。

虎潛丸 治下體痿弱。

大補丸。三兩加龜版。熟地。各三兩。知母。牛膝。各二兩。白芍。芩。瑣陽。虛脛骨。當歸。身。各一兩五錢。炮姜半兩。淳酒為丸。侵晨。淡鹽湯下三錢。痿而厥冷。加熟附子。半枚。

金剛丸 改定

川草薺以酒浸去 杜仲以酒浸去 肉蓯蓉酒浸去

兔絲子酒煮搗 巴戟肉酒煮各 鹿胎一具

右為細末。鮮紫河車。隔水熬膏。搗和為丸。梧子大。每服七十九。空心。參湯米湯。臨臥溫酒下。脾虛少食。大便不固者。加人參二兩。乾山茶三兩。精氣不固者。更加山茱萸肉二兩。

○經言。骨痿者。生於大熱也。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。腎者水藏也。今水不勝火。則骨枯而水虛。足不任身。發為骨痿。此溼熱成痿。多發於夏。令人骨乏無力。故治痿。獨取陽明。東垣獨行其秘。而用清燥之劑。主清暑益氣湯。見暑○屬溼痰者。手足軟弱。脉沉滑。兼腰膝麻木。或腫。二陳湯。見痰飲。加二朮。菴活。黃蘗。竹瀝。姜汁。

○黑瘦人。脉濡弱。或左脉大而無力。行步艱難。或兼盜汗。陰虛等證者。是血虛有火。四物湯。見婦人。加牛膝。肉桂。黃蘗。菴朮。

○陰血衰弱。不能養筋。筋緩不能收持。故痿弱無力。補血榮筋丸。氣虛痿弱無力。四君子湯。加菴朮。黃蘗。肉桂。黃耆。

補血榮筋丸 治肝衰筋緩不能自收持。

肉苁蓉酒制 兔絲子酒煮 天麻煨各二兩 牛膝酒洗四兩

鹿茸酒浸 熟地黃六兩 木瓜薑汁 五味子各一兩

為末。蜜丸。梧子大。每服七十九。空心參湯。米湯。臨臥。溫酒送下。

○肥白人。脉沉緩。或滑。惡心。胸膈不利。屬氣虛。有痰。六君子湯。見痰飲。加菴朮。黃蘗。竹瀝。姜汁。

○兼食積。即氣口弦滑。腹脹惡食。是積妨礙脾氣。不得運於四肢。導痰湯。加檀。麴。防己。木瓜。

○挾死血者。脉沉澹。或弦而按之則扎。為惡血流於腰膝。或因產後。或跌撲傷損。而得者。不可作虛治。

○足痿弱不收。為痿厥。有二。一屬腎與膀胱經。恐懼不解。則傷精。精傷。則骨瘦痿厥。精時自下。是腎傷精脫也。都炁丸。見虛損。審係陽虛。八味丸。見虛損。

○三陽為病。發寒熱。下為痲腫。及為痿厥。喘痛。是膀胱在下。發病也。五苓散。見傷寒。一屬脾溼傷腎。經云。凡治痿厥。發逆。肥貴人。膏梁之疾也。腎著湯。見腰痛。加草薢。又云。秋傷於溼。上逆。欬。為痿厥。小青龍湯。見傷寒。去麻黃。加菴活。

○腎虛之人。六七月之間。溼令大行。濕熱

相合痿厥之病大作脉沉濡而數。小水赤澀。或作腫痛。腰以下痿軟不能動。行走不正。兩足欹側。清燥湯。見暑。

○伸不能屈。屈不能伸。腰膝腿脚腫痛。行步艱難。安腎丸。見虛損。

○目中流火。視物昏花。耳鳴耳聾。困倦乏力。寢汗憎風。行步不正。兩脚欹側。臥而多驚。腰膝無力。腰以下消瘦。加味虎潛丸。老人痿厥。累用虎潛丸。不愈。即於本方。加附子立愈。蓋附子反佐之力也。

加味虎潛丸 治痿濡而厥。

於本方。去知母。加人參。黃耆。山茱。枸杞。各二兩。五味子一兩。

○又有脚膝痿弱。下尻管皆冷。陰汗臊臭。精滑不固。脉沉數有力。此為膏粱厚味。所致火鬱於內。逼陽向外。即陽盛拒陰。滋腎丸。見虛損。苦寒下之。肥盛蒼黑人。足膝痿軟。皆屬溼熱。潛行散。見痺。二妙散。同上。誤用溫補必殆。

麻 與痺證參看

營衛滯而不行。則麻木如坐。久倚著。壓住一處。麻不能舉。理可見矣。麻則屬痰虛。木則全屬溼痰死血。一塊不知痛癢。如木然。是也。

○脉沉滑。體厚人。屬痰與溼。二木。二陳。少佐羌活。獨活。桂枝等。風菴一二味。兼參耆補氣。

○脉微弱。或弦大。無力。病久體羸者。屬氣虛。補中益氣湯。加熟附子一片。夏月。對生脉散。或清燥湯。

○一塊不知痛癢。陰寒益甚。或日輕夜重。脉濡而芤。或弦。痰挾死血。宜活血行氣。二陳。加芎。歸。桃仁泥。紅花。牛膝。韭汁之類。大便見黑。而不作瀉者。小劑桃核菴氣湯。微利之。

○十指麻木。屬胃中溼痰死血。二陳。加二朮。桃仁。紅花。少加附子。行經。

○溼熱下流。兩脚麻木。或如火燎者。二妙散。見痺。加牛膝。為丸。不應。少加肉桂。

○東垣治閉眼。則渾身麻木。開眼則漸退。久而方止。晝減夜甚。為陽氣衰。而溼伏陰分也。三痺湯。去烏頭。加蒼朮。黃蘗。又合眼則麻。開眼則即不麻。近火。則頭旋。眩暈者。風氣下陷。

於血分不得升越而作也。三痺湯。見痺去烏頭。加菴活麻黃。

○凡婦人素有鬱悒者。當舒鬱。逍遙散。加補氣行溼茶。

○張璐王先生。目閉。則神昏。晝甚夜重。為痰火堵塞心竅。治之。案詳本書。

攣

內經言。攣皆屬肝。肝主筋故也。有熱。有寒。有虛。有實。熱攣者。經所謂。肝氣熱。則筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。六味丸。加牛膝。當歸之類。○因濕者。首如裹。濕熱不攘。大筋緜短。小筋弛長。緜短為拘。弛長為痿。先搗瓜蒂散。次與菴活勝濕湯。

○虛邪相搏。則筋脉拘急。五積散。○血虛。則筋急。增損四物湯。見虛損。○劇勞。筋脉拘急。疼痛少眠者。黃耆丸。更於暖室中。近火。按摩為佳。

黃耆丸

治劇勞。經脉拘攣。疼痛少眠。

黃耆

人參

熟地

茯苓

山茱萸

薏苡仁

各一兩

酸棗仁

炒

菴活

當歸

枸杞子

各半兩

羚羊角

鎊

挂心

防風

遠志

各半兩

煉白蜜丸。梧子大。每服五七十九。半饑時。溫酒下。

○虛風襲於經脉。手足拘攣。屈伸短縮。腹痛。爪甲唇俱青。轉筋。不思飲食。甚則舌卷。囊縮。

木瓜散

治筋脉拘攣。縮急。唇青面白。爪甲疼

痛。

木瓜

酒浸之

虎脛骨

酥炙

五加皮

當歸

桑寄生

如無續斷代之

酸棗仁

炒

人參

栝子仁

黃耆

各一兩

甘草

炙

為散。每服四五錢。姜五片。水煎。去滓熱服。

○拘攣癱瘓。口目喎斜。骨節疼。痿行步不正者。舒筋三聖散。見中風。

續斷丸

治風寒濕痺。筋攣骨痛。

續斷

姜酒炒

牛膝

姜酒炒

川草薺

姜汁炒

防風

兩半

川烏頭

炮

煉白蜜丸。彈子大。醇酒細嚼。一丸。



○誤汗漏風。筋攣縮急，宜桂枝湯，倍桂枝。加歸附。

### 痙

痙以有汗無汗辨剛柔。又以厥逆不厥逆辨陰陽。

○剛痙無汗惡寒。項背強，脚攣急，手足攣。口噤，咬牙，仰面，閉眼，甚則臥不著席。脈來弦長急，葛根湯見傷寒。

○柔痙自汗惡風。四肢不收，閉眼，合面，或時搖擗。脈來遲濡，弦細，桂枝湯加括蕒根。

○血虛之人發痙，或反張，或手足攣，或但左手足動搖，十全大補湯加釣藤、蠅尾。

○風熱痰壅發痙不省，或手足攣，或只右手足動搖，祛風導痰湯本方加羌活，防風，白朮，姜汁，竹瀝。

○痙病胸滿，口噤，咬牙，脚攣急，臥不著席，大便堅者，大承氣湯。

○一邊牽擗一眼喎斜者，屬少陽，及汗後不解，乍靜乍亂，直視，口噤，往來寒熱，小柴胡湯。

加桂枝，白芍。

○足三陰經俱手足厥冷，筋脈拘急，汗出不止，項強，脈沉，厥陰則頭搖，口噤，蒼附湯，加當飯，肉桂。

○太陰則四肢不收，木附湯，加甘草，生姜。○少陰則閉目，合面，參附湯，加甘草，乾姜。古法用附子散。

○通治三陰諸痙，多汗，去川芎，獨活，加黃耆，當歸。

○賊風，口噤，角弓反張，成痙，倉公當歸湯。見痺。

### 附子散

治陰痙

木附湯，本方二味，各用一兩，加桂心，川芎，獨活，各半兩，為散，每服三四錢，姜豈湯煎服。

### 痙

痙者，筋脈拘急也。痙者，筋脈縱也。俗謂之攣。大抵發汗後失血，後產後，瘧疽潰後，氣血津液過傷，不能養筋而然。與筋惕肉瞤，顛振相

類分氣血緩急兼補養為治庶有生理

○癰瘰自汗 少氣脈急按之則減小者心

氣虛也辰砂炒香散見瘦血

○若氣盛神昏筋攣脈滿大此心火之旺也

導赤散加苓連山梔茯神犀角

○若體倦神昏不語 脈遲緩四肢欠溫者

脾虛生風歸脾湯加鈎藤菴活

○若寒熱往來目上視搖頭脈弦急者肝熱

生風加味道遙散加桂枝

○熱傷元氣四肢困倦 手指麻木時々癰

瘰補中益氣湯去白朮加白芍五味

○暑風搐搦如小兒驚風狀緣先傷於暑毛

孔開而風乘之局方香薷飲加菴活防風黃

蒼

續命煮散

治風虛昏憤不自覺手足搐搦口

眼闔動或渴或自汗

四物湯加人參甘草桂心遠志防風獨活

細辛葛根荆芥半夏為散每服一兩加生

姜三片水煎通口服多汗去葛根加牡蛎

○瘰疽膿水過多 金瘡出血過多及嘔血

衄血下血後或虛弱人誤汗誤下氣血津液

受虧而致此者大劑保元湯加芎歸鈎藤兼

生陰血則陽火自退不應六君子芎歸鈎藤

以補脾土故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多

患之乃虛家也無風可逐無痰可消當大補

脾土為急若陽氣脫陷者補中益氣湯加桂

姜陽氣虛敗者十全大補湯加姜附亦有得

生者然筋搐顫掉肢體惡寒脈微細人皆知

為虛也是為真象至於脈大無力發熱煩渴

是為假象惟當固本為善若無力搐搦戴眼

反折汗出如珠俱不治○產後陰血去多

有癰瘰詳婦人門

○癰瘰之脈 虛微緩弱者可治弦緊急疾

者難愈在暴病得之為風痰及肝火襲於經

脈之象即久病見之亦屬痰火乘虛肆虐之

兆凡新病得之脈滿大數實者搜滌風痰最

為要著久病得之補中寓搜在所必需設久

病而脈實滿暴病而脈虛微法無可療之機

顫振

顫振。與瘰癧相類。瘰癧則手足牽引而或伸或屈。顫振則但振動而不屈也。亦有頭動而手不動者。蓋木盛則生風。生火上衝於頭。故頭為顫振。若散於四末。則手足動而頭不動也。

瀉青丸 見下血治諸風掉眩。皆屬於肝木。若肝實熱。

六味丸 見虛損治肝虛熱。

逍遙散 加人參。白朮。鈞藤。肝虛弱宜此湯。

導痰湯 加竹瀝。挾痰宜此湯。

○脾胃虛弱。六君子湯。加芎。歸。鈞藤。衛虛。

多汗惡寒。加黃耆二錢。附子五分。脾虛補中。

益氣湯。加鈞藤。

平補正心丹 治心血虛少驚悸顫振。

龍齒 煨通紅醋淬水吞淨一兩形如筆架

遠志 甘草湯去骨 人參 各一兩 茯神 酸棗仁炒各一兩

栢子仁 歸身 石菖蒲 各一兩 生地 二兩一作熟地

肉桂 山萸 兩半 五味子 半兩 麥門冬 去心兩半

硃砂 另研水吞淨半兩

煉白蜜九梧子大。硃砂為衣。每服三五十丸。

○心氣虛熱而振。本方去肉桂。山萸。麥冬。五味。加琥珀。牛黃。黃連。名琥珀養心丹。

○心虛挾痰而振。本方去龍齒。肉桂。山萸。麥冬。五味。加琥珀。川芎。膽星。麝香。甘草。為秘方補心丹。

○腎虛而行步振掉者。八味丸。十補丸。選用。

○實熱積滯。可用汗吐下法。戴人。治馬隻手足振掉。若線提傀儡。用湧法。出痰數升而愈。此必痰證。痰脈而壯實者。不可不知。

○顫振之脈。小弱緩滑者可治。虛大急疾者不治。間有沉伏瀆難者。必痰溼結滯於中之象。凡久病脈虛。宜溫補。暴病脈實。宜峻攻。若久病而脈反實。大。暴病而脈反虛弱。決無收功之理。

脚氣

脚氣之病。初起甚微。飲食如故。人多不覺。惟卒然脚膝屈弱。或腫。或不腫。或頑痺。或緩從。或攣急。皆是溼邪為患。其腫者為溼。不腫者為乾。脚氣。脚氣發。必身痛發熱。大類傷寒。不

可妄用傷寒等藥。若卒起脚弱。或少腹不仁。或轉筋嘔逆。或腹痛下利。或二便秘瀉。或驚悸妄錯。但兩脛腫赤。便作脚氣治。

○脚氣初發。一身盡痛。或肢節腫。便溺阻。隔。此屬溼熱。先以羌活導滯湯導之。後以當歸粘痛湯除。見濕若寒溼者。宜五積散。

羌活導滯湯

小兼氣湯。羌活。獨活。防已。當歸。加拱脚。牛膝。木瓜。

麻黃附子細辛湯

加桂枝。白朮。治冷痛惡風。

千金烏頭湯

與理門之烏頭湯別方也。治風冷。脚痺疼痛。寧弱不可屈伸。

烏頭

細辛

蜀椒

甘草

秦艽

附子

桂心

芍藥

乾姜

茯苓

防風

當歸

獨活

大棗

右十四味。以水一斗二升。煮取四升。分五服。

千金獨活湯。脚氣冷痛。或時洪熱。不可屈伸者。宜此湯。

獨活

當歸

防風

茯苓

芍藥

黃耆

葛根

人參

甘草

乾姜

附子

黑豆

右十二味。以水五升。清酒一升。煎服。

○暑勝者。煩渴身熱。或水泡瘡。脉洪。清燥湯。

○三陽經受熱毒。氣流脚蹠上。焮赤腫痛。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。敗毒散。加蒼朮。

○三陰經受寒溼。著於脚膝上。枯瘦色淡。少腹不仁。腹急疼痛。上氣喘急。八味丸。加沉香。

○脚氣。嘔逆惡心。畏食。生料平胃散。加木香。大便秘。加煨大黃。

○脚氣注蹠。成孔。至下半日疼甚者。此脚氣流成漏也。以人中白火灸。敷瘡口良。

○凡脚氣。至於枯瘦而熱者。屬陰虛。瘦弱而寒者。屬陽虛。當作本證治之。○凡脚氣諸方。大抵宜加牛膝。

○脉浮弦起於風。濡弱起於溼。洪數起於熱。遲瀼起於寒。沉而伏。毒在筋骨也。指下瀼瀼不調。毒在血分也。夏暑脚膝冷痛。其脉陽濡陰弱。溼溫也。脚氣多從暑溼得之。

半夏湯。治脚氣入腹衝胸。氣欲絕者。

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

半夏 桂心 人參

乾姜二錢

附子

甘草

細辛

蜀椒各一

各一

右八味。水煎。分溫三服。初服稍稍進。恐氣衝上。拾塞不得下耳。

木通散

治脚氣遍身腫滿喘逆煩悶小便不利

木通

紫蘇

豬苓各一

桑白皮姜汁拌炒

檳榔

赤茯苓各二

為散。每服半兩。入生姜五片。葱白五莖。水煎去滓。空心熱服。

小檳榔湯

治脚氣腫滿

半夏二錢

生姜

桂枝

檳榔各二

右四味。以水三合。煎取一合半。或加茯苓。大

大檳榔湯

治同證。

檳榔三錢

生姜三錢

橘皮

吳茱萸

紫蘓

木瓜各一錢

右六味。以水三合。煎取一合半。

木茱散

治脚氣氣急

木瓜

吳茱萸等分

右細末服之。或水煎。

○脚氣之發。浮大。肩背。手腕。頸項。疼痛。或腰股。脚膝。脇肋之間。升降走痛。

主方

敗毒散加防已。牛膝。桂心。乳香。

○溼脚氣。夜半後。甚痛。

鹽制白朮十兩酒制炒黃蘗五兩桂心一兩

右三味。細末。方寸匕。白湯送下。

○與前方無効。則宜與此方。

陳皮

白朮

桂心

茯苓

人參

黃耆

當歸

赤芍

地黃

細辛

防已

牛膝

蘓子

白芷

乳香

甘草各等分

水煎

○凡脚氣腫滿病源。此緣風溼毒氣。搏於腎經。腎主水。今為邪所搏。則腎氣不能宣通。水液。水液不傳於小腸。致水氣擁溢。腑臟浸漬。皮膚。故腫滿也。

千金翼温腎湯

主腰脊膝脚浮腫不隨

茯苓

乾姜

澤瀉各二

桂三兩

右以水六升。煮取二升。分三服。忌酢物生葱。

崔氏五烏湯 療脚氣遍身腫方

黑豆

二大升以水一斗 煮取五升

棗

一握切 棗柳二枚

木瓜

茯苓各二

右五味。將四物。以前豆汁浸。經宿。煮取二升。絞去滓。添酒二合。內棗中。隨多少。服之。

杉木湯

杉木

一畝 水煎。浸捋脚。去腫滿。大驗。忌

浸上。自踝下。浸捋之。

疝

大抵疝之為證。受熱則緩縱不收。受寒則牽引。受溼則腫脹累垂。虛者亦然。三者之間。分其熱多。熱少。而為施治。在血分者不移。在氣分者多動。往々有左丸偏脹。而移於右丸者。亦有右丸偏脹。而移左丸者。若積年痛發。不脹大。而不能動移者。方是血分之病。屢發屢更其處。當是厥陰風木為患。腫極而不甚痛者。當是太陰溼土為患。又上引者。宜用桂枝。吳茱萸。茴香。等辛熱治之。下墜者。宜用川棟。

黃蘗。蒼朮。香附。苦燥治之。痛處熱。而不欲人按者。溼熱也。痛處寒。而喜人按者。寒積也。以此明辨。萬無差誤矣。

○凡疝因寒溼者。五積散。加延胡索。小腹痛。加茴香。吳茱萸。腹筋。或陰囊攣急。三和散。加治疝菜。

○丹溪。單九連。小腹急痛。或有形。或無形。或有聲。或無聲。皆以為經絡有寒。收引痛。不知始於濕熱。壅遏在經。又感外寒。濕熱被鬱。不得疎散。故作痛。若只作寒論。恐為未備。當用枳實。桃仁。山梔。吳茱萸。山查。生姜。溼勝。或癩疝。加荔枝核。痛甚。加鹽炒大茴香。痛處可按者。加桂。此亦前人未備之旨也。

○古方治疝。多用溫劑。丹溪獨用涼劑。然更有寒熱兼施者。如烏頭。梔子湯。治疝痕。少腹緩急。痛處按之則減。因其人素有溼熱。外束寒邪。故用黑山梔。川烏頭。等分為末。姜汁糊丸。川烏治外束之寒。梔子治內鬱之熱。殊有奇効。元氣衰弱者。加人參。白朮。佐以木香。砂仁。

烏頭拖子湯

治瘕少腹緩急痛處按之即減。

川烏頭

童便浸炮去皮

拖子

姜汁炒黑各三錢

水煎空心放冷服

○臍下急痛。周身皆痛。小便數而清。諸脉洪緩。獨腎脉弦急無力。此邪客於腎。名曰腎疝。酒煮當歸丸。凡疝氣帶下皆厥陰風木之病。全蝎治風之要藥。川棟苗香皆入小腸。當歸延胡活血止痛。疝氣帶下皆寒邪積聚於小腸。總當化為熱。非附子不能開之。丁香木香為引導也。若有瘀血結滯為痛。又當以桃仁赤芍藥。

酒煮當歸丸

治寒束熱邪疝瘕諸痛及婦人帶下瘕聚。

當歸

附子炮

苗香

各一兩

川棟

酒煮

各一兩

各一兩

各一兩

右四味以酒三升。煮酒盡炮乾。入後四味。丁香。木香。各三錢。延胡索。醋炒一兩。全蠍十四枚。滾醋泡去鹹。共為細末。酒糊丸。梧子大。每服五七十九。至百丸。  
○衝疝者。氣上衝心下。二便不通。乃寒濕之邪。固結於內。鬱積為熱。加以客寒觸之。而

發。天台烏茶散。加鐵鏽水。調服。甚則禹功散。加炮姜枳實青皮下之。

天台烏茶散

治疝瘕少腹引辜丸而痛。

烏茶

木香

苗香

青皮

良姜

枳實

川棟子

大者三枚。酒浸煮。去皮核。取淨肉。同巴豆二十粒炒。去巴豆。

為散。每服二錢。溫酒調服。痛甚者。姜汁酒送下。

○衝疝。歲久不除。漸成衝心。疝氣證。與蟲脹無異。誤用攻伐。脹必轉劇。惟辛溫捷運。度為合宜。然亦取效良難。至於調理。尤宜詳慎。每見食填中脘。濁陰之氣上逆。頃刻告變。業嘗見之。此與衝心。脚氣不殊也。

○孤疝者。卧則入腹。立則出腹。仲景陰孤疝。氣偏者。大小時々上下。蜘蛛散主之。若寒東熱邪。疝瘕攻痛。酒煮當歸丸。

○癰疝者。少腹控卵。腫急絞痛。辜囊腫大。如撈撻甚者。與身齊。而不作痛。中藏穢液甚多。此溼邪也。最難治。但覺微痛者可治。桂苓丸。見痰飲加蒼朮。厚朴。黃柏。川烏。

○水疝。腎囊腫痛。陰汗如流。囊如水晶。小

桂苓丸  
圭二兩  
苓三兩

腹內。按之作声。得之飲酒。使內。更感風寒。淫留囊中。所致。五苓散。換蒼朮。加棟實。藥皮。  
 ○木腎。則陰丸腫大。作痛。頑痺結硬。皆欲內戕。腎經虛憊。溼熱。凝滯。其間。故頑痺。結硬腫大。作痛。二妙散。加肉桂。吳茱萸。半夏。枳實。生薑。○荊芥穗一兩。朴硝。蘿蔔。各二兩。葱七莖。煎湯淋洗。

寶鑑當歸四逆湯

厥逆者。厥氣上衝心腹。

肝經素有火邪。加以寒氣外射。宜此湯。

當歸半錢 附子炮 肉桂 茴香 延胡

柴胡各 芍藥 茯苓各 次瀉 川棟肉各

水煎。空心稍涼服。若陰疝牽引小腹。痛房勞痛不可忍者。此肝經素虛。挾熱。而外挾風寒也。烏頭梔子湯。加葱白二三莖。煎成入紅酒調服。痛定。用八味丸。加茴香。

○偏墜初起。香橘散加穿山甲。或穿山甲。茴香。二味為末。酒調下。乾物壓之。患又茶之不効。或一核縮入。以腹痛不可忍。用手按捺方得還舊者。木香棟子散。外用牡蛎灰。良姜等分。為末。唾津調塗。腫大一邊。須臾如火熱。

痛即安

香橘散

茴香 鹽水炒五錢 藜香 鹽水炒

橘核 去殼研壓去油 山楂 炒各二兩

為散。每服三四錢。溫酒調服。

木香棟子散 治偏墜久茶不効。屬溼熱者

川棟子 三十枚同巴豆三十粒炒去巴豆 川草薺 莖

石菖蒲 一兩 青木香 一兩

荔枝核 二十枚 茴香 炒取淨末六錢

為散。每服二錢半。入麝香少許。空心鹽酒送下。

○瘕疝。脾傳之腎。少腹寬熱。而痛出白。即巢氏之瘕疝。子和之筋疝也。丹溪所謂。內鬱溼熱者。與此相似。龍膽瀉汗湯。去生地。加橘核。桃仁。吳茱萸。

○陰虛偏墜。一味敗龜版。為末。茴香湯。或溫酒調服。不應風入厥陰也。加醋炒蝦梢三分。

○小腸氣者。小腸經為病。小腹引辜丸。連腰背而痛。蓋小腸虛。則風冷乘間而入。厥而



上衝肝脉。控羣丸。上而不下。痛衝心肺。病名控羣。天台烏棗散。

喝起丸 小腸氣。及腎虛腰痛者。宜此湯。

杜仲 鹽水炒 補骨脂 炒

懷香 鹽水炒 川草薺 各一兩

右為細末。入連皮胡桃肉三十枚。青鹽半兩。

同研如泥。入煉白蜜。丸如彈子大。空腹細嚼。

二丸。溫酒送下。臥時再服二丸。

○若溼熱內澀。小便不通。為膀胱實熱。

加味通心散 治小腸疝痛。水道不通。

瞿麥穗 一兩 木通 梔子仁 酒炒

黃芩 連翹 甘草梢

川棟肉 各五錢 車前 各五錢 肉桂 三錢

為散。每服五錢。加燈心二十莖。竹葉十片。水煎服。

○膀胱氣者。膀胱經為病。小腹腫痛。不得小便。是也。

五苓散。加川棟子。葱白。茴香。煎成入鹽。火熱服。

○疝因食積為患者。必因飲食而發。痛處有

立効散 治疝因食積作痛。

山楂肉 醋浸炒 川棟肉 酒浸 懷香 鹽水炒

枳實 炒 蒼朮 酒浸去粗皮炒 香附 醋炒

山梔 姜汁炒 青皮 醋炒各半兩 吳茱萸 去開口者三考

為散。每服五錢。加生姜三片。水煎。

○疝因瘀血為患者。必因奔馳受寒而發。痛處手不可附。按之則痛如錐。酒煮當歸丸。

去丁香。加桃仁。

九味蟠葱散 治疝因風寒溼氣。羣丸腫痛者。

延胡 二兩 肉桂 五錢 乾姜 炮二錢

丁香 一錢 茯苓 六錢 甘草 三錢

蒼朮 酒炒 檳榔 羌活 各三錢

為散。每服五錢。入連髮葱白二莖。水煎食前熱服。

○疝急痛者。用黃蘗酒炒為君。醋炒青皮。

延胡索。益智。桃仁。為臣。蒼朮。香附。茴香。俱鹽

水炒為佐。附子。甘草。為使。研末作湯。服後一

痛過。更不再作。

○七疝痛。不可忍。灸大敦穴。須用厚蒜辨

觀不可貼肉。貼肉則傷指甲。

從七壯。

○一腫肺氣不化。膀胱為熱邪所滯。而小便不通。小腹與睪丸脹痛。一味沙參。大劑煎服。肺氣化。而小便通。一服即愈。但小便不閉者。不可服。

○寒疝。用茴香一觔。生姜二觔。搗絞自然汁。浸一夜。收盡。入青鹽二兩。炒燥為末。酒九空心酒。或葱湯。下二錢。

○小腸疝氣。四制香附。鹽炒茴香等分。為末。空心酒下三錢。

○婦人陰腫。堅硬。青橘皮一觔。炒燥為末。分二分。絹包焙熱。熨頻々易之。

○疝氣入湯。致逼上升者。此奔豚證也。宜辨之。

○脈數而弦者。當下其寒。脈緊大而遲者。必心下堅。脈大而緊。陽中有陰也。可下之。○脈弦急搏。皆疝。弦數宜清熱。弦緊宜溫經。兼浮緊宜兼汗。兼實宜兼下。弦細為寒溼。弦濡為溼熱。

熨法

鹽半斤。炒極熱。以故帛包。熨痛處。

退疝散

檳榔

石榴皮

陳皮

甘草

水煎。○兼風邪。加羌活。獨活。脇拘攣。加枳實。牽引陰囊。睪丸腫痛。或偏墜。加皂葉。陰乾。合半。用生則二三分可也。或回春神効湯加皂葉。

五積散

大便如常。加石榴皮。檳榔。大便秘結。加杏仁。桃仁。

烏頭桂枝湯

治寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺。諸藥不能治者。

烏頭

五箇用蜜一斤煎減半去滓

桂枝

本方煎湯以五合解之

右每服二合。不知。即服三合。其知者。如醉狀。得吐者。為中病也。若自汗出。脈沉弦者。止用烏頭煎。

三白散

治膀胱蘊熱。濕熱相乘。陰囊腫脹。大小便不利。

白牽牛

二兩

桑白皮

炒木通

白朮

陳皮

各半兩

右末。每二錢。姜湯調下。空心服。

復元通氣散

舶上茴香 川山甲蛤粉炒各二兩 陳皮

牽牛末炒 玄胡 甘草炒各一兩

木香一兩半

右細末。每一大錢。熱酒食前調下。

丹溪方 定疝氣疼痛速効

山查子小者名棠棣子唐棠同音吳郡山

枳殼 山梔子 唐棣子查子

吳茱萸過皆炒 荔枝核各等分

右末。用長流水調下。一二錢。空心服。

又方 治陽明受濕熱傳入太陽。惡寒發熱。小

腹連毛際。結核悶痛不可忍。

梔子炒 桃仁炒 枳殼炒 唐棣子各等分

右末。於砂鉢內入姜汁。用水一鍾。盪起熱服。

陰縱陰縮并筋疝

陰縮。謂前陰受寒。入腹內也。本虛。四逆湯。加人參。肉桂。枳實。發熱者。黃耆建中湯。加熟附子三五分。挾食。枳實理中湯。熟附五七分。面赤戴陽。稍加黃連三四分。  
○陰縱者。謂前陰受熱。挺縱不收也。小柴

胡加酒黃柏。溼熱。龍膽瀉肝湯。見脇痛

○筋疝者。莖中作痛。筋急縮。或作癢。或腫。或筋緩不收。白物如精。隨溺而下。此腎不虛。而肝經溼熱火旺也。龍膽瀉肝湯。

眩暈

外感六淫。內傷七情。皆能眩暈。然無不因痰火。而作。諺云。無火不動痰。無痰不作暈。須以清火豁痰為主。而兼治六淫之邪。無不愈。

三因芎辛湯。見頭痛。治風寒在腦。或感溼邪。頭

眩重痛。欲倒。嘔逆不定。

○冒雨。或中溼。眩暈。嘔逆。頭重。不食。前方

去細辛。芽茶。加半夏。茯苓。

○惡風眩暈。頭旋眼黑。惡心見風。即復作者。

半夏蒼朮湯。見頭痛。

○風虛眩暈。多痰。導痰湯。加天麻。

○腎氣素虛。而逆者。

八味丸料。加沉香。天麻。或沉香降氣湯。下

養正丹。見藥方。國字類方。不應。八味丸。

川芎茶調散。見頭痛。治風熱眩暈。眼掉。

二陳湯

痰火眩暈。加白朮、川芎、天麻。有熱。

更加山梔、黃芩。七情鬱而生痰。亦令頭眩。

鬱悒之婦女輩。有之。加木香、丁香、白朮、砂仁。

○早起眩暈。須臾自定。乃胃中老痰使然。

青礞石丸。鎮墜。後用理中湯調理。

○痰結胸中。眩暈。惡心。

牙皂末。和鹽湯。探吐。吐定。服導痰湯。

○勞役過度。眩暈發熱者。

補中益氣湯

加天麻。兼嘔吐。六君子湯。氣

虛而喘。加黃耆。陰虛火炎痰盛。少加熟附

子。煎成。加姜汁。竹瀝。

○因虛致眩。雖定後。面常欲向火。欲得暖手

按者。陽氣不足故也。附子理中湯。

○淫欲過度。腎與督脉皆虛。不能納氣。歸源

使諸逆奔上。而眩暈。六味丸。加沉香。鹿茸。名

香茸八味丸。見虛損。

○肥白人。眩暈。清火降痰為先。而兼補氣。茶

○黑瘦人。眩暈。滋陰降火為要。而兼抑肝

之劑。

○胸中有死血。作痛而眩。飲韭汁酒。良。

○左手脉數熱多。脉滑有死血。浮眩為肝風。右手滑實。痰積。脉大是久病。虛大是氣虛。

頭痛

因風而痛者。抽掣惡風。或汗自出。因暑而痛

者。或有汗。或無汗。皆惡熱。而耳前與額脹痛。

因溼而痛者。頭必重。遇陰天尤甚。因痰飲而

痛者。亦昏重而痛。憤々欲吐。因寒而痛者。絀

急惡寒。因氣虛者而痛者。遇勞則甚。其脉大。

因血虛而痛者。痛連魚尾。善驚惕。其脉芤。或

沉數。頭痛自有多因。而古方每用風茶者。蓋

高巔之上。惟風可到。味之薄者。陰中之陽。自

地升天者也。在風寒溼者。固為正用。即虛與

熱者。亦假引經耳。

○上熱頭痛。目赤。下寒足斲為甚。大便微秘。

既濟解毒湯

治上熱下寒。大便秘。

三黃湯。加甘草。桔梗。柴胡。升麻。連翹。當歸。

○大寒犯腦。內至骨髓。則頭痛齒亦痛。

羌活附子湯

治大寒犯腦。厥逆頭痛。齒亦痛。

麻黃一錢

黃耆一錢

蒼朮制五

羌活七分

絀音屈  
多音  
多音

防風

升麻

甘草

附子

白芷

僵蚕

黃柏

酒炒各五分

水煎去滓。食後溫服。有嗽。加佛耳草五分。

吳茱萸湯。見傷寒治頭痛乾嘔吐涎沫。

當歸四逆湯。見傷寒治風氣循風府而上。則為

腦風。項背惡寒。腦戶極冷。

小建中湯。加當歸。童便。治因發散茶太過。痛

轉劇。

選奇湯

風火相煽。額與眉稜骨俱痛。

宜此湯

羌活錢半防風一錢黃芩酒炒甘草炙生薑一片

水煎去滓。食後稍熱。緩々服之。冬月。去黃芩。

加香豉三錢。葱白二莖。如痛連魚尾。為血

虛。加黃耆三錢。當歸一錢。日晡發熱。為血熱。

加白芍一錢五分。目赤。加菊花。鼻塞。加細辛。

夏月。近火痛劇。為伏火。加石膏三錢。頭風疼

熱不止。加石膏。麻黃。不應。屬血病也。加川芎。

芽茶。

六君子湯。加鈎藤。羌活。防風。川芎。當歸。菊花。治。

徇蒙招尤。目瞋耳聾。肝虛風動。

○頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生。或勞役  
動作。則痛。此氣虛火動也。補中益氣湯。加川  
芎。蔓荊子。

○胃熱火炎。動作則痛。煩渴引飲。面赤。便  
秘者。川芎茶調散。加酒芩。連。梔子。石膏。熱盛  
脈實者。酒大黃末。五錢。濃茶調散。

川芎茶調散。治久風化火。頭痛及偏正頭風。

川芎

白芷

羌活

防風

荊芥

薄荷

甘草

香附

為散。食後茶調服。二錢。日三服。婦人產後。豆

淋酒服。輕者三服。重者五七服。効。

○血虛頭痛。連魚尾。四物。加人參。細辛。蔓

荊。

○有徵瘡毒發。頭痛。頰下左右。如蚯蚓徐  
行入耳。頂上起疔瘡。塊冷則痛甚。山牛湯。不  
應。作結毒。治之。

山牛湯。治徵瘡。頭痛不止。

土茯苓

忍冬

防風

天麻

黑參

辛荑仁

川芎

黑豆

芽茶

水煎溫服若結毒頭痛諸藥無效

○頭與腹俱痛有五。身毒頭痛則與腹俱

痛一味香附煎成。放涼服。傷酒傷溼亦有頭

腹俱痛。但傷酒食則兼嘔逆眩暈。外臺散

飲加煨葛根見痰飲傷溼則腹隱々痛重不

能舉。恙活勝濕湯。外用瓜蒂散。搐鼻有不伏

水土。頭腹俱痛者。藿香正氣散。有瘡毒入腹

頭與腹俱痛者。黃連解毒湯。加臘茶。

○有頭痛止則腹痛。腹痛止則頭痛。此屬

脾陰血虛。胃中有火。隨氣輒下。輒上而然。芎

歸。芍藥。黃連。木香。不應。加童便。香附。葱白。

○脈浮滑為風痰。易治。短瀼為虛難治。浮

弦為風。浮洪為火。沉細或緩為溼。寸弦曰頭

痛。寸口脈浮。中風發熱頭痛。

○偏正頭風。久而不愈。乃挾痰涎。風火鬱

過經絡。氣血壅滯。甚則目昏。脈緊小。二便秘

瀼宜及其血。以開鬱解表。逍遙散。偏左加黃

芩。偏右加石膏。葱豉。豉甚合。越鞠。兼溼。瓜蒂

散。搐鼻。兼風火而發。選奇湯。加石膏。葱白。芽

茶。夜甚。加酒芍藥。或川芎茶調散。加細辛。甘

菊

○凡怒則大陽穴作痛者。先用小柴胡。水

茯苓。山梔。後用六味丸。常服。以滋腎降火。永

不再發。

○凡頭痛。必吐清水。不拘冬夏。食薑即止者。

此中氣虛寒。六君子。加當歸。黃耆。木香。炮姜

○煩勞則頭痛。此陽虛。不能上升。補中益

氣湯。加蔓荊子。

○頭風。宜熱蒸者多。間有挾熱。而不勝熱

劑者。消風散。見咳嗽。或川芎茶調散。加酒黃

芩。輕者。只用姜汁。收入陳茶葉內。煎服。汗出

即愈。此屢有驗者。凡風熱頭痛。並宜用之。與

選奇湯不殊。

半夏蒼朮湯 治素有風證。目澀頭痛。眩暈。胸

中有痰。兀々欲吐。如居煖室。則微汗出。其證

乃減。見風其證復作。當先風一日痛甚。至其

風日則病少愈者

升麻 柴胡 薑本各五

茯苓 神麴姜汁炒 蒼朮泔制

半夏各二 生薑十片 甘草各四

水煎食遠稍熱服。此方即柴胡半夏湯。  
○溼熱頭痛。遇風即發。選奇湯加柴胡。黃連。名清空膏。不拘偏正。並用。

清空膏 治頭風溼熱。上盛。遇風即發。

羌活三兩 防風三兩 甘草半 黃芩三兩

黃連一兩 柴胡一兩 川芎五錢

共為細末。每服五錢。盛盞內以茶清半盞。調勻。隔湯煮如膏。臨臥湯送下。此即選奇湯。如下三味。

○偏正頭風作痛。痛連魚尾。常如牽引之狀。發則目不可開。眩暈不能擡舉。芎辛湯。每服全蝎五箇。覺上膈有熱。川芎茶調散。如片

芎辛湯 治熱厥頭痛。  
川芎一兩 細辛半兩 白芷一兩

甘草六分 生姜五片 芽茶撮

水煎。食後熱服。有熱。加酒黃芩一錢五分。不應。更加生石膏三錢。烏頭二分。胃虛者。去白芷。易白朮。使邪無內賊之患。兼犯客邪。加葱白。香豉。產婦。用豆淋酒煎服之。

○痰溼頭痛。其人嘔吐痰多。發作無時。停

痰上攻所致。導痰湯加減。或合芎奇湯尤妙。

○寒痰厥逆頭痛。三因芎辛湯。一切偏正

頭風攻注。屬虛寒者。大追風散。

三因芎辛湯 治寒厥頭痛。

川附子去毒 川烏頭去毒 天南星姜湯泡

乾姜去毒 細辛連用 川芎各一

甘草發半 生姜七片 芽茶一撮

水煎。放涼。臥時服。面赤戴陽。加葱白二莖。童便半杯。不應。更加酒炒黃連三分。

大追風散 治一切頭風攻注。屬虛寒者。

川烏炮 防風 羌活 川芎各一兩

全蝎去毒醋 地龍去土 南星炮 天麻煨各

荆芥 甘草炙 僵蚕炒黃 石膏煨各

為散。每服二錢。臨臥茶清調服。

○局方。多白附子。白芷。各五錢。乳香。沒藥。草

烏雄黃各一錢五分。

玉真丸 腎氣厥逆頭痛。四肢逆冷。胸膈痞悶。

多痰者。

硝石 硫黃二味同 石膏生 半夏湯泡

為末。姜汁和神麴丸。食後姜湯下。二三十丸。

虛寒甚者。加鍾乳粉。

○腎藏陽虛人。素有頭風。發動則挾溼熱上攻。頭面腫脹。項後兩向筋緊作痛。甚則牽引腰脊。其脈虛細。而數千金大三五七散。拜用金匱頭風摩散。慎不可用清熱。敗毒等茶。

大三五七散

治頭風眩暈。口喎。目斜。耳

聾。及八風。五痺。癱瘓。脚氣。緩弱。

天雄三枚炮去皮臍

細辛三兩

山茱萸

乾姜炮各五兩

防風

茯苓各七兩

右為散。每服二錢。食前溫酒調服。

○本方去細辛。乾姜。防風。茯苓。加薯蕷小三五七散。局方無天雄用熟附子三枚

頭風摩散

治大寒犯腦。頭痛。

大附子一枚炮

鹽等分

為散。沐後以方寸匕。摩痛處。

○風痰頭痛。發時面頰青黃。暈眩目不欲開。癩言身體重。兀々欲吐。此欲成頭風也。二陳湯。加膽星。天麻。蠍尾。

○痰厥頭痛。兩寸脈滑而弦。眼重頭旋。惡心煩。亂吐清水。氣短促。心神不安。語言顛倒。目

不敢開。如在風雲中。頭疼如裂。身重如山。胸滿嘔逆。四肢厥冷。半夏白朮天麻湯。

半夏白朮天麻湯

治痰厥頭目眩。

黃柏姜汁炒

乾姜炮三

澤瀉

天麻煨切

黃耆姜汁炒

人參

蒼朮滑制

神麴

白朮各錢半

半夏炒

橘紅

麥蘗各七分

茯苓八分

生姜三片

水煎稍熱。食遠服。○有肥白氣虛多痰人。卒然頭痛。脈沉細。四肢厥逆。痰吐涎星。香湯。加生附子。

星香湯見中風

○熱厥頭痛。數年不愈。雖當嚴冬。猶喜風寒。其痛便止。畧近溫煖。稍見烟火。其痛便甚。或為灸火。或為熱茶所致。宜選奇湯。加川芎。柴胡。黃連。生地。當歸。黃蘗。知母。荆芥。芽茶。

寶鑑石膏散

治風熱伏於血分。治加以寒邪

外鬱。即痛劇熱甚。

石膏生碎

麻黃去節泡

何首烏生晒

葛根各七

為散。每服四五錢。入生姜三片。芽茶一撮。水煎服。取效。春夏麻黃量減。



○溼熱頭痛。脈數而濡。或兩寸脈沉伏而數。身重肢節痛。或四肢面目浮腫。此證多見於酒客。宜散溼熱。二陳。二朮。酒芩。羌防之類。不已。用透頂散。搐鼻取涎。隨左右搐之。涎出即安。

**透頂散** 治偏正。夾腦風。一切頭風。遠年近日者。皆効。并治鼻塞。不聞香臭。

細辛 三錢 瓜蒂 七枚熬 丁香 七粒  
糯米 七粒一作赤小豆 龍腦 半分 麝香 一分

前四味。杵為細末。入腦麝同研。置小口鐘中。緊塞鐘口。令患人含清水。隨左右搐一豆大許。於鼻中。良久涎出即安。不愈三日後再搐。

**丹方** 頭風。不拘偏正皆効。後發漸輕。再發再服。蛇脫灸脆。細末每服一錢。葱豉煎數沸。和滓熱服。或加全蝎末三分。每發輕者一服。重不過二服也。

○偏頭風者。其人平素先有溼痰。加以邪風襲之。久而鬱熱為火。或左右痛相移。或久而喪目。先以川芎茶調散吐之。吐訖。可服川芎薄荷。等辛涼清上。搜風之劑。

○偏頭風。亦先風一日即發。溼痰與火。伏於頭中。雖夏月。常欲包裹。越婢湯加減。溼熱加泔制蒼朮。黑豆制川烏。火加姜汁炒山梔子。左加酒芩。右加姜汁煨石膏。溼熱甚。連目腫者。加酒大黃。有邪風。加細辛。川芎。

○婦人頭風。兼白帶。甚者。用白蜀葵花七朶。去蒂。川芎。當歸。各一錢。蘄艾。八分。水酒各煎成。乘熱。先薰後服。

○頭風兼嘔涎者。白槿樹花。陰乾。灸脆為末。每服三錢。熱酒調服。

○頭風諸藥不効。用大附子一隻。切片同菘豆一升。煮熟。去附子。但服菘豆汁。

○偏頭風。左屬風者。則浮腫。荆芥。薄荷。屬血者。則疼熱。川芎。當歸。右屬痰者。必體肥。蒼朮。半夏。屬熱者。則必形瘦。黃芩。石膏。產後須倍用芎。歸。遇寒即痛者。屬寒伏於腦。用金匱頭風摩散。

**薰法** 治偏頭風。不問新久。

用川芎半兩。晚蚕沙二兩。殭蚕如患者。年歲之數。以水五碗。煎至三碗。就沙鍋中。以

厚紙糊滿。中間錢大一孔。取茶氣蒸痛處。每日一次。雖年久者。不過三五次。永不再發。

附方

大陽散 上池院秘方 風寒頭痛。如破。諸茶不効。

荆芥 香附炒 石膏生 白芷

右等分。為細末。白湯送下。

一方 治宿疾頭痛。因氣血壅滯者。

白雞冠火 大 川芎 黑豆

竹葉 女竹各半 古錢 自三文至七文 甘草

右六味水煎。

○真頭痛。且發暮死。此方能救之。

魁蛤。殼身共火燒。細末和水。貼頭。初貼處。處痛少退後。貼一偏。

心痛

諸心痛者。皆手少陰厥氣上衝也。有熱厥心痛者。身熱足寒。痛甚則煩躁而吐。額上自汗。其脉洪大。知為熱也。先越婢湯汗之。次用金鈴子散清之。

金鈴子散 治熱厥心痛。或作或止。久不愈。

金鈴子 即川棟子酒 延胡索 醋炒 等分

為散。每服三錢。溫服調下。

○有火實心痛者。因受時氣。卒然發痛。大便秘。久而注悶。心腹高起。按之愈痛。不能飲食。急以涼膈散利之。不應。為食積痰飲留結也。煮黃丸。水煮金丸。選用。

煮黃丸 治心胸腹脇。痰食痲痺。脹急冷痛。但

屬熱結。唇口燥渴。小便赤澀者。禁用

雄黃 研二 巴豆 去良心熬 并淨二錢

入白麪二兩。研勻。滴水為丸。梧子大。滾漿水。煮十二丸。以浮為度。濾入冷漿水內。沉冷。每服一丸。涼茶下。逐時服之。一日服盡。以微利為度。不必盡劑。

水煮金丸 治食積痰飲結聚。年久不散。

煮黃丸。去巴豆霜。加南星。半夏各一兩。天麻。五錢。如前法製。每服五十九。淡姜湯。送下二錢。

○寒厥心痛者。手足逆。而通身冷。汗出。或大便利。而不渴。氣力微弱。其脉沉細。急以朮附

湯溫之。寒厥暴病。非急病也。朝發夕死。當急救之。久痛非寒。暴痛非熱。不可不察。

○九言心痛。都屬胃脘。丹溪云。外受者。當溫散。內受寒者。當溫利。病久屬鬱。則熱。用山梔。為熱菜之嚮導。必佐以生姜汁。多用台芎。開之。或二陳。加川芎。蒼朮。倍加姜汁。炒山梔。如痛甚者。加炮姜。為從治之法也。

○外吸涼風。內傷冷物。寒客於胃。則卒然而痛。二陳。加草豆蔻。乾姜。吳茱萸。日久發熱。加姜汁。炒川連。山梔。

高良姜湯

心腹絞痛如刺。兩脇脹滿。

高良姜

厚朴 姜汁

當歸

桂心

生薑

三片

右五味水煎溫服。若一服痛止。不須更作。虛人。加芍藥。半夏。甘草。人參。乾姜。蜀椒。黃耆。

水當

○脈實堅。按之心下滿痛者。為實。大柴胡湯。○脈弦數者。是水尅土也。治之以小建中湯。取芍藥味酸。於土中瀉水。如脈沉細。是水尅侮土。治以理中湯。取乾姜味辛。於土中瀉水。○大寒客於心胸作痛。嘔逆不能食。腹中

寒氣上衝。痛不可按者。金匱三物大建中湯。見積聚上散濁陰寒氣。下安。

○寒氣作痛。綿々不絕。無增減。附子湯。加草豆蔻。厚朴。見傷寒。

○風冷邪氣。入乘心絡。或府藏暴感寒氣。上乘於心。卒然心痛。或引背脊。經久不差。

崔氏烏頭丸

治風冷邪氣。入乘心絡。或府藏

暴感寒氣。卒然心痛。或引背脊。經久不差。

附子

炮去

皮

川烏

炮去

皮

赤石脂

各三

蜀椒

去開口者

桂心

乾姜

炮各

二兩

右六味。杵為細末。煉白蜜。丸梧子大。每服三九。冷酒下。覺至痛處。痛即止。若不止。加至五六九。以和為度。若早服無所覺。至午再服三九。若久心痛。每且三九。加至十九。劑終不發。忌猪肉。生葱。

○凡心痛。脈沉而遲者。易治。堅大而實。浮大而長。滑者。難治。

○因冷積痰氣。而痛者。理中湯。去人參。加苓。半。丁香。木香。白豆蔻。或四七湯。加木香。肉桂。痛而氣上急者。薤子降氣湯。去前胡。加木

香。痰涎壅盛而痛。小半夏茯苓湯。加枳實。間進半硫丸。見大便不通。

○鬱痰作痛。或因恚怒。勞力。酒食。而發。發則自下逆衝而上。後必作寒熱。以爵。必從少陽而發出於外。其脉必數其熱與痛。忽重忽輕。其證多渴。而大便秘。宜清中蠲痛湯。

清中蠲痛湯 治中脘火鬱。作發即寒熱。

山梔 姜汁炒黑 一錢五分 乾姜 炮三

川芎 童便 浸切

黃連 姜汁炒 一錢五分 橘紅 各五分

香附 醋炒一 錢五分

蒼朮 童便浸去皮切 晒麻油拌炒五分

神麴 姜汁炒 一錢

生姜 三片 大棗 一枚 擘

水煎。食前熱服。

○痰積作痛。脉滑而實。惡心煩滿。時吐酸水。此因氣滯。礙其道路。不得運行而作痛。清中湯。加香附。蒼朮。南星。滑石。木香。海石之類。如痰甚者。加白螺螄殼。煨過一錢。

清中湯 治胃熱作痛。

黃連 姜汁炒 一錢 山梔 姜汁炒 一錢

陳皮 茯苓

半夏 姜汁炒 各二錢 草豆蔻 研

甘草 炙各 七分 生姜 三片

水煎。食前熱服。

○停飲惡心。煩悶時吐黃水。腹中轉々有聲而痛。胃苓湯。

○胸痛短氣者。水氣在臍府也。輕者五苓散。重者。子和法取之。有痰。二陳湯。加姜汁。胸痺參考。

○氣鬱脉沉伏。或結。或弦。胸中氣壅。攻刺脹痛。沉香降氣散。

○中氣虛。按之則痛定。二陳加炮姜。不應。理中湯。病久。服耗氣茶。太過。脉大。或數無力。亦為中氣虛。六君加炮姜。

○心膈大痛。發厥嘔逆。諸茶不納者。趁勢以鷲羽翎。探吐痰盡而痛愈。

○凡按之痛減者為虛。宜酸收。不宜辛散。○心痛屬火。不時舉發者。山梔姜汁炒黑。少加炮姜甘草。一服立愈。

○平日好飲熱酒。致死血於胃口。作痛。脉必瀋。或乾。飲下作呃。口中作血腥氣。手拈散。加桔梗。開提其氣。胃氣虛人。不能行其茶力者。加人參二三錢。用相反之味。激其性。以搜血也。壯盛者。代抵當丸。加乾漆。灰。虛弱人。四

物湯。加桃仁。穿山甲。桂心。蓬朮。赤降香。煎服。  
手拈散。治中脘。死血作痛。好飲熱酒人。多此。

延胡索 五靈脂酒研 草薺 沒藥等分

為散。每服三錢。不拘時。熱酒調服。或用熬熟  
砂糖。作丸。溫酒。送下七十九。

○卒中惡。心痛。用苦參一兩。酢煮頓服。老  
弱者。分二三服。

○若脈微欲絕。手足逆冷。肉桂一兩。水煮分  
三服。効。

○喪痛。鶴蝮一味為末。蜜丸。蜜湯下四五  
十九。慎酒肉。取有形滓。以入喪口也。

○胃脘痛。吐喪。曾服打積菜不愈。是中氣  
傷。當調中氣為主。

○喪痛。面有白斑。唇紅能食。或口中沫出。  
當以祛喪法治之。

○因虺作痛。有必休止。令人吐虺。動故也。  
用川椒。烏梅。黃連。攪。煎服。

○膈上隱々作痛。坐不得臥。而吐臭穢痰  
涎。當作肺癰治之。

○膈間腫痛。不能飲食。但喜飲水。或咽腫。

人迎盛而氣口緊者。當作胃癰治之。胸痺參

○心疝者。腎氣逆上攻痛。必從臍下上。升。

小便難。此名心疝。生韭汁。和五苓散。以茴香  
煎湯下。或有疝氣衝心。而痛者。當於疝門求

治。亦有脚氣攻心。而痛者。則於脚氣門求治  
可也。

○心瘥者。因胃口熱。食消易。故瘥。素問。謂  
之食瘥。為痰火鼓動所致。亦類中消。小半夏

茯苓湯。加枳實。胃中蘊火而瘥。二陳。加川連。  
或五苓散。加辰砂。亦有病瘥。呷姜湯數口。或

進乾姜溫劑。而愈。膈上停寒。中有伏飲。見辛  
熱。則消也。

○脈心脈微急為痛。短而數。心痛。瀯則心痛。

脈浮大弦長者死。沉細者生。胃脈微滑。為痰  
飲。滑實。為宿食。沉緊。為冷積。沉瀯。為氣滯。數

為火。浮為風。弦為血。忽大忽小。為喪也。

附方

小草丸本草治心痛。胸痺。逆氣。膈中飲不下。

遠志

桂心

蜀椒

乾姜

細辛 各三兩

附子 二分

百一之三

為末蜜丸。如梧子大。先食米汁。下三丸。日三。不知。稍益。以知為度。禁猪肉。冷水。生葱菜。胸痺急痛。如錐刺。不得俛仰。自汗出。或徹背上。不治。或至死。生薑。及根五升。洗搗汁。服之愈。

腹痛

綿々而痛無增減。欲得熱手按。及喜熱飲食。脈沉遲者寒也。

理中湯。加肉桂。香砂。

○用溫茶不効。痛愈甚。大便秘者。微利之。

平胃散。加藿香。半夏。紫蘇。木香。大黃。○虛人。人參。養胃湯。見瘡。

○時痛時止。熱手按而不減。脈洪數者。熱也。

二陳湯。加厚朴。枳實。芩。連。山。梔。

○腹中水鳴。乃火擊動其水也。

二陳湯。加芩。連。木香。枳實。木通。虛人。六君子。加香砂。猪苓。沢瀉。

十味香薷飲 治感暑而痛。瀉利并作。

胃苓湯。見泄瀉。治感溼而痛。小便不利。大便澹泄。

○如腹中常有熱而痛。此為積熱。調胃養氣湯下之。

○因客寒作痛者。脈必弦緩。

小建中湯。加炮姜。○兼氣鬱。脈沉者。更加台芎。蒼朮。香附。

○因熱作痛。脈必數疾。

二陳湯。加芩。連。芍。茶。痛甚。稍加炮姜。從治之。若時痛。時止。口乾。惡心。頭眩。或瀉黃沫者。火也。前茶。勿用炮姜。加大黃。微利之。

○脈沉結。或伏。必腹痛。痛引兩脇。及肩背。皆不得俯仰者。氣滯也。

二陳湯。加川芎。木香。枳殼。香附子。不應有血也。加蓬朮。穿山甲。

○七情內結。心腹絞痛。不能飲食。時作時發。即欲死。七氣湯。諸七氣選用。

保和丸。見傷食。治食積作痛。

○喪痛者。懊懷作痛。上下不定。痛有休止。

或有塊梗起。痛則嘔吐清水。當從臍積治之。  
○因疝瘕致痛者。必引罌丸。或小腹有一條梗起。宜從疝治。

玉樞丹 腹痛門 因觸穢致痛。得熱湯飲。轉劇者。是臭毒攻逆也。別詳本門。

### 小腹痛

小腹痛。五六日大便不通。按之堅滿。遠臍攻痛。小便雖利而黃赤。其脈實有力。為府邪實結而痛。

大棗氣湯

○因津血枯澇而結者。其脈雖數而不甚旺。麻仁丸。見大便閉通幽湯。見燥

○無故而大便不通。少腹微滿而痛。尺脈雖數。而必微弱者。

蜜煎導主之。夏月可用猪膽導。

○熱結膀胱。其證溺閉不通。按之雖滿。而不甚堅。彈之有聲。激指其脈數。盛有力。而煩渴引飲者。晝甚五苓散。夜劇猪苓湯。

○血結膀胱。而腹滿。其證善忘如狂。或渴

欲漱水不能飲。或喜熱飲。不能多。小便清利。或反倍於平時。或數欠而不清。大抵邪結膀胱。陽分熱邪傷血。雖有畜血。其人真陰不虛。則小便自清。尺脈必盛。

代抵當丸

○若小便反倍於常時者。為邪據下焦。真陽外亡之候。代抵當丸。去硝。減黃。倍桂。加熟附子五六枚。

○若緣醉飽入房。強力忍精。而致少陰與任督受傷。血結陰分者。此真陰虧損。必致小便澇數。脹滿如淋。

○生料濟生腎氣丸。紅酒煎服。

○婦人經行之時。交合受傷。時々不淨。而少腹滿者。此衝脈受傷也。

十全大補湯。倍肉桂。

○有塊絞痛。喜熱按。此氣血虛。而有瘀積也。

當歸生姜羊肉湯。加肉桂。具茱萸。茯苓。芍藥。不應加人參。

○本來下元虛人。勉力勞役。而致受傷。畜

血小腹滿痛者。此肝經受傷。其滿必偏見於左傍也。調肝散代抵當丸。審微甚。選用可也。

調肝散 治鬱怒傷肝。腰痛小腹偏左。結痛。

半夏二兩 棘桂 木瓜 當歸 川芎

牛膝各五 細辛 石菖 酸棗炒 甘草炙

為散。每腹四錢。生姜五片。棗二枚。水煎熱服。

○右傍偏滿痛者。此必飽食奔馳。脾陰下溜。食積痰膩。留結也。當於積滯門求之。

○脈 陰弦腹痛。細小緊急。皆為腹痛。更滑

為痰飲。弦為冷食。陰弦或緊。宜溫。沉弦滑實。

可下。沉伏者。為氣滯。細小緊急。腹中刺痛。尺

脈緊。臍下痛。弦急。小腹痛。尺脈伏。癥瘕痛。

○腹中窄狹。肥人。乃是溼痰留滯。氣不升

降。當行氣燥溼。越鞠丸。平胃散為主。瘦人。乃

是陰虛火旺。薰蒸藏府。逍遙散。佐金丸。降火

開鬱為主。肥人腹中。輒々有聲。須作痰治。二

陳二朮。氣虛者。加人參。

○當臍痛。為腎虛。任脈為病。六味丸。加龜

板灰。

○傷寒陽脈瀯陰脈弦。法當腹中急痛。此本

虛。受寒小建中湯和之。

### 脇痛

傷寒少陽脇痛。用小柴胡湯。硬滿。加薄桂。不

大便。加枳殼。兼胸脇滿痛。加枳。枳。若不因傷

寒。而脇痛。身體微熱。枳殼煮散。蓋枳殼為治

脇痛菜。諸方皆用之。

枳殼煮散 治欬引脇下痛。

枳梗湯。加枳殼。細辛。川芎。防風。葛根。生姜。

紅棗。

○寒氣引脇下痛。枳實理中湯。戴復菴曰。

腹內諸般冷痛。枳實理中湯。加減。作無限用。

○脇痛而氣喘。分氣紫蘊飲。增損流氣飲。

見瘕滿選用。

### 分氣紫蘊飲

二陳湯。去半夏。加紫蘊。桑白皮。大腹皮。桔

梗。五味子。食鹽。

○脇痛而吐血者。此熱傷肝也。小柴胡。去半

夏。黃芩。加丹皮。鼈甲。

○兩脇腫痛。或腹痛。或小便瀯滯者。屬溼熱。



龍膽瀉肝湯 治肝經溼熱。腋脇滿痛。小便赤澀。

柴胡稍 澤瀉各半 車前 木通

當歸稍 龍膽各八分 生地黃二錢 生姜三片

水煎。食遠熱服。

此本導赤散。加柴胡。龍膽之屬。入肝以瀉溼熱。

○脈弦痛在左。屬肝火。宜柴胡。山梔。當歸。

青皮。芍藥。不已。加吳茱萸。炒川連。甚則加酒

炒龍膽。如果肝氣實。當歸龍薈丸。見火

柴胡疎肝散。見嘔血 治因怒傷肝。肝氣鬱甚。

○氣滯作痛。兩手脈沉伏。或弦。痛引胸脇。

不得俛仰屈伸。二陳湯。加枳殼。香附。木香。

○左脇痛者。木實也。抑青丸。火盛者。佐金

丸。見吐酸從治之。有畜血。偏著左脇。而痛者。

復元活血湯。見畜血

抑青丸

黃連。吳茱萸。二味等分。同煮乾。揀去吳茱

萸。取黃連。焙燥。一味為末。滴水為丸。每服

四五十九。空心沸湯。臨臥陳酒送下。

○右脇痛。乃悲傷肺氣所致。推氣散。加桔

梗。或只用川芎。枳殼。二味作湯服之。

推氣散 治右脇疼脹。不食。

片子姜黃 皮極細者真 枳殼

肉桂各五錢 甘草各五錢 為散。每服二三錢。加姜棗水煎。去滓溫服。

大黃附子湯 脇下偏痛。發熱其脈緊弦。此

寒也。以溫下之。

大黃兩 附子二錢 細辛二錢

右三味水煎。

○兩脇走痛。脈沉弦而滑。乃溼痰流注。在

脇下。導痰湯。加白芥子。枳殼。香附。木香。甚則

控涎丹。見痰飲 導而下之。

神保丸。見傷食 食積寒痰。流於脇下痛。若

錐刺。手不可近。諸茶不効者。神保丸。

○食積脇痛。發寒熱。痛引心下。惡心惡食。

必有一條扛起。右脈必滑。二陳。加香砂。枳木

麴。扑。查芽。甚則加吳茱萸。制川連。

○結積痰癖冷痛。煮黃丸。見心痛

○氣弱人。脇下痛。脈弦細。或緊。多從勞役怒

氣得之。六君子。加木香。芎。歸。桂心。

○肥白人。氣虛發熱。而脇痛。用參。蒼。柴胡。黃芩。枳殼。木香之類。甚則加桂。

○瘦弱人。陰虛寒熱。脇下痛。多怒。必有瘀血。宜桃仁。紅花。柴胡。青皮。丹皮。鱉甲之類。甚則加大黃。

○欬嗽引脇下痛。為水飲停畜。小青龍湯。脇下硬滿引痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒。有時頭痛。心下痞者。十棗湯。

○乾欬引脇下痛。發寒熱。為鬱結所致。道遙散。見虛損。若脇下塊痛。乃過飽勞力所致。道遙散。加木香。丹皮。青皮。

○死血作痛。日輕夜重。或手後熱。脉短瀼。挑核。養氣湯。見傷寒。易肉桂。加穿山甲。鱉甲。青皮。不應。加熟附子一片。跌撲痛。亦宜上方。

○凡內傷脇痛。不止者。生香油。生蜜一杯。和勻服。一二次即止。

○房勞腎虛之人。胸膈脇助。多隱令微痛。乃腎虛不納氣。氣虛不能生血之故。宜補骨脂。杜仲。牛膝。補腎。當歸。熟地。和血。及七味丸。

調理。

○季脇痛。經云。冬脉不及。則令人心懸。如病饑。眇中清。脊中痛。少腹滿。小便變。又足少陽之筋。引脇外。轉筋。膝不可屈伸。膈筋急。引髀。後引尻。即上乘眇。季脇痛。按季脇痛。無不因腎虛者。加減八味丸。腎氣丸。選用。

○腋下腫痛。少陽溼熱留薄。則腋下腫痛。小柴胡。加煆芎。枳殼。實人。去參。加草龍膽。體肥痰盛。加白芥子。有痰飲搏聚。而痛者。加味導痰湯。見夾痰。加柴胡。為嚮導。

○脉雙弦者。肝氣有餘。兩脇作痛。弦數有力。為肝盛有餘。弦數無力。為肝虛有火。弦少細。為飲。脉沉。為氣。浮弦。為風。弦小而弱者。為陽虛。沉細。為陰虛。

腰痛

風痛者。脉浮。或左。或右。痛無定處。牽引兩足。小續命湯加減。

○寒痛者。其腰如冰。其脉必緊。得熱則減。得寒則增。乾姜附子湯。加肉桂。杜仲。外用摩

腰痛兼風寒者。五積散熱服微汗之。

○內畜風熱痛者。脈必洪數。口渴便閉者。先用小柴胡去半夏加蒼活續斷黑豆若大便閉者用大柴胡微利之。

○溼痛者。如坐水中。腎屬水。久坐水溼。或著雨露以致腰下冷痛。脈必弦緩。小便自利。故天陰頭必重。滲溼湯。腎虛由臥濕地。流入腰脚。偏枯冷痺疼重。千金獨活寄生湯。兼風溼者。改定三痺湯。見痺如挾寒溼。并用摩腰膏。虛寒甚。而挾溼者。木附湯。挾溼熱者。蒼活勝溼湯。合二妙散。見痿。腎氣虛寒。而受寒濕。腰痛不得立。用燒羊腎主之。此千金法也。

獨活寄生湯 治風痺腰脚疼重。

四物湯加獨活桑寄生杜仲牛膝細辛秦朮茯苓桂心防風人參甘草○古今錄驗無寄生有續斷肘後無寄生人參甘草當歸有附子產後腹痛不得轉及脚脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯。

摩腰膏 治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者。

附子 川烏 南星各二 蜀椒 雄黃

樟腦 丁香各五分 乾姜 麝香一分

右為末。蜜丸。彈子大。每用一九。生姜自然汁化開如糜。蘇手掌上烘熱。摩腰中痛處。即以煖帛束定。以頃其熱如火。每日飽後用一九。世本無蜀椒。有殊誤。

燒

羊腎右細末。內羊腎中。炙之。熱服之。

○閃挫痛者。跌撲損傷肝脈搏緊而長。兩尺實。忽然不可俯仰。復元通氣散。不效必有惡血。復元活血湯。見畜血。

○氣滯而痛。脈沉弦。或伏結。初起烏茶順氣散。不應。八味順氣散。

○痰注而痛。脈滑或沉伏。動作便有痰。或一塊作痛。導痰湯加香附烏茶枳殼。脈實加大黃。

○肝氣不條達。睡至黎明覺則腰痛。頻欲轉側。曉起則止。宜柴胡疎肝散。見嘔血。或二妙散加柴胡防風。即東垣蒼朮湯。

○腰痛如以帶束引痛。此屬帶脈為病。用辛味橫行。而帶脈之結。甘味舒緩帶脈之急。

調肝散見小腹痛

○腰痛牽引足膝。青蛾丸。加歇尾。最妙。以補腎兼補肝。

青蛾丸局方治腎虛腰與季脇痛。

補骨脂炒香

杜仲鹽酒炒斷絲各四兩

右二味為末。連皮胡桃肉三十枚。青鹽去砂土淨。一兩。同搗成膏。稍入煉白蜜和丸。彈子大。每服一丸。空心溫酒化下。

○兩腰痠癢。乃熱邪深入。血脉久閉之故。桃核兼氣。多用肉桂。以加熟附行經。但痛者。可治。痿廢而不痛者。不可治也。

○諸般腰痛。皆由腎虛。若兼六淫。須除其邪。如無他證。腰肢痿弱。隱々作痛。身體疲倦。脚膝痠軟者。總屬腎虛。然須分寒熱主治。脈細而軟。或虛浮。力怯短氣。小便清利。屬陽虛。火衰。腎氣丸。加肉苁蓉。補骨脂。巴戟。鹿茸之類。脈大而軟。或細數。小便黃。屬陰虛。火炎。六味丸。如龜版。當歸。杜仲。續斷之類。

○腰痛者。尚有寒濕傷損之異。腰痠悉屬房勞腎虛。惟有峻補。男子用青蛾丸。或

八味丸。加補骨脂。杜仲。有熱去附子。加五味。

走精。用六味丸。去沢瀉。加鯨膠。沙苑。蒺藜。五味子。大便不實。加肉果。補骨脂。山茶糊。代蜜。婦人用六味。加杜仲。續斷。有滯去熟地。加艾附。經候不調。加當歸。阿膠。

○腰軟者。溼氣襲於少陽。經絡之中。則為腎著。金匱用甘姜苓朮湯。一名腎著湯。見溼後世更名腎著湯。或滲溼湯。選用。斷喪太過者。八味丸。腎虛風襲。腰背痠痛。安腎丸。見虛

○腰膝痛。寒溼。流注於足少陽之經絡。則為腰膝痛。蓋腰乃膽經之所過。因受寒濕。結滯於骨節而痛。滲溼湯。去橘紅。加肉桂。有痰滯經絡。導痰湯。加減。若腎肝伏熱。用姜汁炒黃柏。酒防已。以加肉桂。若腰膝連脚膝。曉夜疼痛者。腎虛風毒乘之也。用虎骨散。加補骨脂。若人腎虛腰痛。連膝痛者。二至丸。

虎骨散

虎骨

敗龜版裝

當歸

川草薺

牛膝各二兩

川芎

肉桂

羌活各二兩

為散。每服四錢。空心溫酒調下。亦可用蜜丸。

温酒服之。  
二至丸 治老人腎虛腰痛。屈伸。頭旋。眼黑。下體痿弱。

附子炮

桂心一兩

杜仲鹽酒炒

補骨脂以各二兩

鹿茸酥炙

麋茸酥炙各一具

右為細末。青鹽半兩。熱酒中化。去砂土。入鹿角膠一兩。糊丸。如梧子大。每服七十九。空心醇酒。同胡桃肉一枚。細嚼送下。惡熱去附子。加肉蓯蓉一兩。敗龜版一兩。倍杜仲。補骨脂。○脉大為肝腎陰虛。尺沉為腎藏陽虛。浮緩為虛風。弦細為寒濕。或弦。或瀯。為瘀血。或滑。或伏。為痰飲。沉弦而緊為寒。沉弦而細為溼。沉弦而實。為閃肭。若腎虛。及盛怒傷志。則腰失強。不能轉搖者死。

### 肩背痛

肩背痛。不可回顧。太陽氣虧。不行也。

### 通氣防風湯

補中益氣湯。去白朮。當歸。加防風。羌活。藁本。黃柏。白豆蔻。青橘皮。若面白脫色。短

氣者。勿服。宜道遠散。火鬱熱盛。外陽散火湯。形氣虛甚者。十全大補湯。

羌活勝濕湯。見濕。肩背痛脊強。腰似折。項似拔。此足太陽經氣不行也。宜此湯。

○風寒汗出。中風。肩背痛。小便數而欠者。

風熱乘其肺。而肺氣鬱甚也。當瀉風熱。

消風散。去殭蚕。蟬脫。加桔梗。枳殼。

○寒熱少氣。不足以息。而肩痛。小便遺失者。補中益氣湯。加麥門。五味子。

○溼熱相搏。肩背沉重。而痛。當歸粘痛湯。

○當肩背。一片冷痛。背脊疼痛。古方神保丸。

愈者。此有寒積。有因寒飲伏結者。近効白朮附子湯。見溼。亦有因痰氣留伏者。指迷茯苓丸。

○素有痰飲。肩背作痛。導痰湯。

○有腎氣不循故道。氣逆挾脊而上。致肩背

痛者。沉香。肉桂。茯苓。牛膝。茴香。川椒。青鹽。或

觀書對奕。久坐而致脊背痛者。補中益氣。加

羌活。防風。

○肥人喜植。而痛快者。屬痰。宜除溼化痰。

兼補脾胃。六君子。加木香。

○瘦人多。是血少。氣虛。宜養血清火。聖愈湯。見虛損。

○背痛。須加羌。防。引經。肥人。少佐附子。瘦人。佐苓。連。丹皮。

○有素虛人。及病後房勞後。婦人產後。經行後。心膈間痛。或牽引乳脇。或走注肩背痛。並宜十全大補。隨證加減。

○脉寸口脉促上擊者。肩背痛。洪大為熱。浮大為風。沉而滑者。背脊痛。必有寒飲伏結也。

通氣散

治風熱求肩背痛。

防風

藁本

羌活

獨活各八分

黃芩酒炒

黃連姜汁炒各一匙

虛加人參。水煎溫服。

倍末丸

治五癆飲證。

乾姜炮

肉桂去皮各半斤

白朮炒一

右蜜丸。梧桐子大。每服三十九。空心米飲下。

參合湯

治背脊心一點痛。

陳皮

半夏

茯苓

烏藥

枳殼

姜蚕

川芎

白芷

麻黃

桔梗

乾姜煨半

紫菀

香附

蒼朮

羌活各等分

甘草

右剉。生姜水煎。

一方

治肩背痛。

二陳湯。加葳靈仙。

脊痛脊強 尻痛

項脊常熱而痛者。陰虛也。六味丸。加麋茸。常寒而痛者。陽虛也。八味丸。加鹿茸。有腎氣攻背。而項筋痛。連脊。髀不可轉移者。此地氣從背。而上入也。椒附散。

椒附散

治項背強痛。不可以顧。

附子一枚去皮臍炮

為散。每服二錢。用川椒三十粒。生姜七片。水一盞。煎至七分。去椒。入鹽一字。空心熱服。有熱。加羌活一撮。面赤戴陽。加葱白一莖。火炎頭痛。洪熱。加臘茶一撮。

○太陽經脊痛。項強。腰似折。項似拔。羌活勝濕湯。脉緊為傷寒。麻黃湯。沉緩為風溼。五苓散。換蒼朮。桂枝。加羌活。

○打撲傷損。從高墜下。惡血在太陽經中。腰脊痛不可忍。地龍湯。

地龍湯 治痰積太陽經中。腰脊痛不可忍。

地龍 屠乾 肉桂各五分 桃仁十粒 羌活二錢

獨活 甘草二錢 黃柏酒炒 各二錢 麻黃六分

蕪木八分 當歸稍 五分 水煎。食遠服。

○尻痛。乃足少陰與督脉所過之處。兼屬厥陰。若腎虛者。六味丸加肉桂。不愈加鹿茸。肥人屬溼痰。二陳合二妙。有因死血作痛者。當歸芍藥牡丹。桃仁。延胡。生牛膝。穿山甲。肉桂之類。清理之。不應加地龍。生附子。

### 臂痛 手痛 手氣

臂痛。為風寒溼所搏。或因飲液流入。或因提挈重物。皆致臂痛。有腫者。有不腫者。除飲證外。其餘諸痛。宜五積散。蠲痺湯。選用。虛人必加人參。以助藥力。

○若坐卧為風溼所搏。或睡後手出被外。為寒所襲。而痛者。五積散。審知是溼痺。經絡血凝。氣滯作痛。蠲痺湯。

○挈重傷筋。以致臂痛。宜和氣調血。十全大補湯。

○痰飲流入四肢。肩背痠疼。兩臂軟痺。導痰。加水香。片子姜黃。姜制白朮。若作風治誤矣。

○中腕留伏。痰飲臂痛難舉。手足不能轉移。指迷茯苓丸。

○丹溪治臂痛。以二陳湯加酒炒黃芩。蒼朮。

○手痛屈不伸者。薏苡仁湯。見中風。伸而不屈者。其病在筋。近効白朮附子湯。十味別散。選用。

○手氣者。手腫痛。或指掌連臂膊痛。悉屬風熱。校痰。

蠲痺湯 治風濕相搏。身體煩疼。手足冷。四肢沉重。

當歸 赤芍 黃耆 姜黃片子 二枚

羌活各五分 甘草各一錢 生薑三片 紅朮二枚

水煎熱服。無時。

○薄桂味辛淡。能橫行手臂。引調氣血。茶至痛處。片子姜黃。能引至手臂。惟溼痛最妙。

○有腫痛時常脫節者。此屬溼痿。倍用薯  
木。乃効。

十味對散

治溼痺。周身疼痛。

十全大補湯。去人參。甘草。加附子。防風。

腿痛 大股痛

腿痛血虛者。足不任地。行則振掉。脉細弱。  
六味丸。加巴戟。續斷。杜仲。鹿茸。

○血寒者。經急。脉沉。喜湯。火嚴冬尤甚。

舒筋三聖散。見中風。

○溼者。兩腿隱々痛。或麻。督作腫。身沉重。

肢節疼痛。惡風。不欲去衣。脉浮濇。或浮細。除

風。溼。菴活湯。脉沉。白朮。附子湯。肥人。導痰湯

加減。

○濕熱者。痛自腰膝。以至足脛。或上或下。

或紅。或腫。小便赤濇。脉濡大而數。

當歸粘痛湯。見溼。

○流注者。鬱痰留於腰脇。有塊。互換作痛。

惡心。頭眩。脉沉滑。或弦。

二陳湯。加菴活。白朮。

○陰虛者。肌體羸瘦。足心及脛熱痛。左尺

細數。或兩尺數。盛。虎潛丸。去橘皮。加肉桂。

○陽虛兩足浮腫無力。大便瀉。小便短。火

痛不能動。左尺虛大。兩尺浮遲。脾與命門俱

虛。先用補中益氣湯。加桂。附。後用八味丸。

○腎虛風襲。則下體痿弱。骨節疼痛。喘欬

失精。腰腹腿脛俱痛。尺中浮大而數。安腎丸

見虛損。

○大股痛。痛而喜按者。肝腎虛寒。而溼氣

痺著也。四助丸二方選用。痛不可按。敗血也。

肉桂湯。或舒筋三聖散。酒調服。婦人產後多

有此證。宜加穿山甲。桃仁。虛人十全大補湯。

加附子。穿山甲。

○溼熱者。痛處必腫。而沉重。不能轉側。二

妙散。加菴活。升柴。木草之類。或除濕湯。溼

湯選用。

四助丸

寒熱而腫痛者。須防發癰。

木瓜

天麻

肉蓯蓉 酒洗 去腐

牛膝 各一

附子 炮二

虎脛 并掌骨 一具 酥炙

上四味以醇酒五升浸。春五夏三。秋七。冬十



日取出焙乾切片曝燥同附子虎骨為細末用浸茶酒打糊為丸梧子大每服五七十九食前鹽湯臨卧時用浸茶酒送下浸茶酒完以陳酒服之如無虎脛骨隨前後左右用掌骨亦可

川芎肉桂湯 治宿於塞濕地血凝腰脇痛不能轉側

羌活 藜蘆 川芎 當歸

甘草 肉桂 蒼朮 獨活

防風 漢防已 酒洗 桃仁 七ヶ研

水酒各一升煎八合食遠服

膝痛 足跟痛 足心痛

膝脛痛在筋骨者。多挾風熱則屈不伸而腫。二妙散加羌活升柴兼陰虛者則熱而不腫。虎潛丸或二妙加牛膝肉桂。

獨活寄生湯 治因臥溼地流入脚膝痺弱疼重

當歸粘痛湯 治夏月溼熱沉重而痛

○痛在骨者。多兼寒飲重而屈伸不利常

如拭不乾狀。附子丸川芎肉桂湯。活絡丹。鐵彈丸。選用。虛寒挾風溼而痛。虎骨四筋丸。如肝腎虛熱。筋骨痿弱。顛掉而痛。鹿茸四筋丸。○足跟痛 陰虛者。則足脛時熱。而足跟痛。六味丸。加薑版肉桂。陽虛者。則不能久立。而足跟痛。八味丸。

○挾溼者。必重著而腫。換骨丹。史國公茶酒。

○肥人溼痰流注。導痰湯。加木瓜。草薺。防已。虛人用補中益氣。十全大補。並加附子。為引。○足心痛。足心及踝骨熱疼者。為腎虛溼著。命門火不歸經。腎著湯。下八味丸。

○肥人。多溼痰流注。足心作痛。但久坐臥起則痛。甚行動則緩。宜腎著湯。合二妙散。慎不可用補腎。及血葶。助其陰。愈增其劇。

張氏醫通纂要卷之一終

