

新編
皇朝通志
卷之四
地理志

武庫
132
4



70

75

80

85

90

95



明武
132
4



60

65

70

75

80

85

90


95

惡寒

惡寒者。雖當夏月。若遇風霜。欲得重綿。時
覺凜凜戰慄。如喪神守。此熱伏於裏。而反覺
自冷。實非寒也。或曰。往往見有服熱藥而愈
者何也。曰。病熱之人。其氣炎上。彰為痰飲。抑
遏清道。陰氣不升。病熱尤甚。積痰得熱。亦為
暫退。熱勢助邪。其病益深。或曰。寒勢如此。誰
敢以寒涼藥與之。非殺而何。曰。古人遇戰慄
之證。有以大羹氣湯。下燥屎而愈者。惡寒戰
慄。明是熱證。但有虛實之分。

○有衛氣虛表。不能實表分肉。而惡寒者。有
上焦之邪。隔絕管衛。不能升發出表。而惡寒
者。有酒熱內鬱。不得泄而惡寒者。背惡寒。是
痰飲。身前寒。屬胃。掌中寒者。腹中寒。魚上白
肉有青紋者。胃中有寒。理中丸。表虛惡賊風
上焦不通。陽氣抑遏。而皮膚分肉。無以溫之。
故寒慄。升陽益胃湯。開發上焦。以升陽明出
外。溫之也。

○外感內傷。傷食。溼痰火鬱。皆有惡寒。非



獨陽虛也。若脈浮緊頭痛拘急身疼微惡寒熱起是外寒。審時令輕重發散之。脈緩弱或氣口虛大按之無力兼見倦怠手心熱是內傷元氣證。補中益氣湯加桂附二三分以行參芪之力且益陽氣也。

○脈弦滑。惡心頭痛飽悶溢酸是內傷宿食。從傷食治。或脈來潛伏腹滿煩熱喘促是冷食結滯於內也。當與溫消。枳實理中湯。審係肉食加炮黑山檀一二錢。脈滑或沉。周身疼痛而惡寒者屬溼痰。乃痰在上焦。過絕陽氣而然。肥人多此。宜二陳加二朮。羌防少佐桂枝。甚者先吐之。

○惡寒非寒。不戰而慄。從火鬱治。火鬱湯。若鬱遏陽氣於脾土。令人惡寒者。升陽散火湯。
○背惡寒。脈浮大而無力者。為氣虛。○脈弦數。寒熱兼作。乃瘡腫之候。須問身中。有無腫處。

○大抵惡寒證。除陽虛外。屬表證者多。乃表中陽氣不得發越而然。須辛散之。

○惡寒家不可過覆近火。寒熱相搏。脈道沈伏愈令病人寒不可過。但去被撤火。兼以和管之。某自然不惡寒。婦人惡寒尤不可近火。寒氣入腹。血室結聚。鍼某所不能治矣。

背惡寒

背為陽位。背上惡寒。陽受病而陰邪充逆也。其病有七。一者。暴中陰寒。四肢厥冷。而背惡寒。脈必沉細。附子湯溫散之。一者。素稟陽衰。而背上常微畏寒。脈來微弱。八味丸溫補之。一者。熱邪內伏。煩渴引飲。而背惡寒。脈多沉滑。或此伏匿。此火鬱於內也。熱病初發多此。白虎湯解散之。一者。中暑暈熱亦多有背惡寒。人參白虎湯。清暑益氣湯。按證清解之。一者。溼痰內鬱。肢體疼重。而瘡悶。頭汗。其人必肥盛。其脈或緩滑。或潛滯滑。則指迷茯苓丸。加膽星。瀋則苓桂朮甘。飲。痰加半夏廣皮。可分解之。一者。瘀血內滯。而頭汗目黃。小便清利。大便溏黑。小腹偏左。或左脇中脘有疼處。脈必關尺弦緊。或帶疝狀。桃核承氣湯。犀角

地黃湯。隨上下虛實清理之一者。無故脈數。而背惡寒疼重。寒熱者。為發癰疽之兆。高梁多此。不可疑似。而遲延難療。

振寒

振寒。六脈弦細而瀋。按之空虛。此大寒證。亦傷精氣。黃耆建中湯。若真陽虛。則但寒慄耳。不作振也。或兼風寒。則振。桂枝加附子湯。○灑灑振寒。當瀉陽明熱者。白虎加人參湯。竹葉石膏湯。

戰慄

寒慄者。由火盛似水。實非兼有寒氣也。以大兼氣湯下之。多有燥屎下後熱退則寒慄愈矣。若陽虛則但畏寒。陽虛則振寒戰慄。○亦有暴感寒邪。惡寒脈伏。而戰慄者。麻黃湯散之。

寒熱

寒熱如瘧。表裏不和者。小柴胡湯。為主茶

至夜轉甚者。加丹皮山梔。日晡虛勞寒熱不除者。柴胡四物湯。小柴胡湯合加味逍遙散。

○脾病。則血氣俱不寧。寒熱往來。無有休息。故脾病如瘧狀也。元氣虛人。遇勞即發寒熱。此元氣下陷之故。或勞力而發寒熱。腿縫中結核作痛。謂之勞發。俱宜補中益氣湯。

○病寒熱間作。腕後有斑三五點。鼻中微血。兩脈沉瀋。胸膈四肢。按之殊無大熱。此脾胃氣虛。而挾微邪。理中湯。去人參。加茯苓。煨葛根。

○鬱怒而發寒熱。逍遙散。

○內傷。瘧疾。寒熱。各具本門。傷寒寒熱。不在此例。

發熱

身盡熱。先大陽也。從外而之內。為外傷。

○手足不和。兩脇俱熱如火。先少陽也。從內而之外者。為內傷。

○傷食令人頭痛脈數發熱。但左手脈平和。身不疼痛是也。

○人迎氣口俱緊盛。或舉按皆實大。發熱而惡寒。腹不和而口液。此內外俱傷也。

○夏月火乘土位。溼熱相合。病多煩躁悶亂。四肢發熱。或身體沉重。走注疼痛。皆溼熱相搏。而不伸。故致熱也。

○發熱身疼。而身如薰黃者。溼熱也。

○一身盡痛。發熱日晡所劇者。風溼也。

○汗出而身熱者。風熱也。

○身熱脈弦數。戰慄而不惡寒者。瘧瘧也。

○中脘有痰。令人憎寒發熱。惡風自汗。寸口脈浮。胸膈痞滿者。有類傷寒。但頭不疼。項不强為異。

○虛煩與傷寒相似。身熱脈不浮緊。不惡寒。但熱而煩。頭不痛。

○脚氣為病。大便堅。脚膝兩脛腫痛。或枯細者。當其發時。亦發熱。憎寒。嘔惡。有似傷寒也。

○春夏之交。發熱而渴。或微惡寒。右手脈來數盛者。溫病也。

○身熱頭疼。自汗多眠。陽脈浮滑。陰脈濡

滑者。風溫也。

○夏月大熱而渴。脈盛者。熱病也。

○夏月脈虛身熱。而喘乏者。傷暑也。

○四肢發熱。口舌咽乾。煩躁悶亂者。心與小腸之火乘脾土之位。脾主四肢。為諸陽之本。脾熱故四肢發熱。

○每日晡時。憎寒壯熱。脈數盛而有痛處者。癰毒之將發也。

熱

治熱。須辨真假。夫真熱則發熱。惡寒。脈數有力。按之更實。燥口渴。大便燥。小便赤澀。或利臭穢。發言壯厲。不欲近衣者是也。親乎表者。宜發散。親乎裏者。宜通泄。假熱亦發熱。要寒而足必不熱。脈大而虛。按之微弱。身雖熾熱。不躁不渴。或見虛狂。躁渴而不能引飲。發過頃之即止。終不及聲高。詈罵者也。

○雜病發熱。陰虛於下也。經云。陰虛則發熱。夫陽在外。為陰之衛。陰在內。為陽之守。精神外馳。嗜慾無節。陰氣耗散。陽無所附。遂致

浮散於肌表間。而發熱也。實非有熱。當作陰虛治。而用補養之法可也。

○丹溪論晝夜發熱。晝輕夜重。口中無味。為陽虛。午後發熱。夜半則止。口中知味。為陰虛。陽全陰半。陽得以兼陰。陰不得以兼陽也。至於或晝或夜。或作或止。不時而發者。此脾胃氣血俱虛。火氣不寧之證。不可拘於晝夜之候也。陽虛責在胃。陰虛責在腎。蓋饑飽傷胃。勞役則兼傷脾。陽氣虛矣。房勞傷腎。竭力則傷肝。陰血虧矣。

○腎虛火不歸源。遊行於外而發熱者。煩渴引飲。面目俱赤。遍舌生刺。兩唇黑裂。喉間如爛火上衝。兩足心似烙。痰盛壅盛。喘急氣促。脈洪大。而數疾無倫。按之微弱者是也。法當導火歸源。誤用寒涼必殆。即或知其本虛。而用補益。不辨陰虛陽虛。漫投參朮。則陽愈盛。而陰愈虛。壯熱轉增。八味桂附之屬。愈不敢施。不得已。用知藥。芩連。折之。必至燥渴咽痛。腹痛泄瀉而死。

○凡暴熱不止。脈滑數或洪盛。皆為實熱。

宜隨表裏。孰輕重。而清理之。或脈雖沉。而按實堅者。為裏實。必用苦寒奪之。若熱久不止。脈來虛數無力。服調補藥不應。飲食無味。或至夜煩渴。或反加乾欬者。此必陰血受傷。當以血藥調其陰。則陽熱自化。

○脈數為熱。浮數表熱。沉數裏熱。無力虛熱。有力實熱。滑數心下結熱。緩而滑為熱中。牢為脾胃盛熱。若發熱而脈反沉細。或數疾無力者。病脈相反也。死。病熱有火者生。心脈洪是也。浮而濇。濇而身有熱者死。熱而脈靜者難治。脈盛汗出不解者死。脈虛熱不止者死。脈弱四肢厥。不欲見人。食不入。利下不止者死。

潮熱

潮熱者有作有止。若潮水之來。不失其時。一日一發。若日三五發者。即是發熱。非潮熱也。有虛有實。惟傷寒日晡發熱。乃胃實別無虛證。其餘有潮熱者。當審其虛實。若大便堅濇。喜冷畏熱。心下輻然。睡臥不著。此皆氣盛。所

謂實而潮熱也。涼膈散。大柴胡輩下之。若胃氣消乏。精神憔悴。飲食減少。日漸尪羸。病雖斃去。而五心常有餘熱。此屬虛證。宜逍遙散。小柴胡等加減。有每遇夜身發熱。病人不覺。早起動作無事。飲食如常。既無別證。可疑。只是血虛陰不濟。朝用加味道遙散。暮用六味丸。不應用當歸補血湯。加減八味丸。
○有潮熱似瘧。胸膈痞塞。背心疼痛。氣弱脈弦。服補藥不効者。此屬飲證。隨氣而潮。故熱亦隨飲而潮。於痰飲門求之。
○氣口脈滑。內有宿食。常暮發熱。明日復止者。於傷飲食門求之。

上熱下寒上寒下熱

熱發於上。陽中之陽邪也。熱發於下。陰中之陽邪也。寒起於上。陽中之陰邪也。寒起於下。陰中之陰邪也。脈經云。陽乘陰者。腰以下至足熱。腰已上寒。施子改湯。吐以升之。陰氣上爭。心腹滿者死。陰乘陽者。腰已上至頭熱。腰已下寒。桂苓丸。見痰飲利以導之。陽氣上爭。

得汗者生。若雜證上熱下寒。既濟湯。見虛煩類傷寒兼大便秘。既濟解毒湯。見頭火不歸源八味丸。上寒下熱。五苓散。送滋腎丸。虛陽下陷者。加減八味丸。

外熱內寒外寒內熱

皮寒而燥者。陽不足。皮熱而燥者。陰不足。皮寒而寒者。陰盛也。皮熱而熱者。陽盛也。仲景云。病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。黃芪建中湯。汗之。病人大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。越脾湯發之。若雜證外熱內寒者。理中湯。飲之。外寒內熱者。火鬱湯散之。

厥

其人陽氣衰。不能滲榮其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足為之寒也。附子理中湯。
○其人必數醉。若飽以入房。氣聚於脾中。腎氣日衰。陽氣獨勝。故手足為之熱也。加減八味丸。

○陽氣者煩勞則張精絕。碎積於夏。則使人
煎厥。目昏不可以視。耳閉不可以聽。清暑益
氣湯。

○陽氣者大怒則形氣絕。而血菀於上。使人
薄厥。犀角地黃湯。

○二陽一陰發病。名曰風厥。地黃飲子。

○骨痛爪枯。為骨厥。兩手指攣急。屈伸不
伸。爪甲枯厥。身立如椽。為肝厥。此皆內虛。氣
逆。竝宜八味丸。

○喘而咳。狂走登高為陽明厥。此為邪實。
兼氣湯下之。

○厥而腹滿。不知人。卒然悶亂者。皆因邪
氣亂。陽氣逆。是少陰腎脈不至也。名曰尸厥。

卒中天地戾氣使然。急以二氣丹二錢。用陳
酒煎。如覺焰硝起。傾放盆內。蓋著溫服。人行
五里許。又進一服。不過三服即醒。若膏梁本
虛之人。用附子一枚。人參三兩。酒煎。分三次
服。拜灸百會穴四十九壯。氣海丹田三百壯。

身溫灸止。艾炷止許。菜豆大。粗則傷人。暴厥
脈伏。不省人事。莫辨陰陽。急用雞子三枚。煮

熟乘熱。開豆大一孔。襯粗紙一層。亦開孔。對
當臍。令熱氣透達於內。即蘇。然後按脈證療
之。如連換三枚。不應不可救矣。

○脈沉微不數。為寒厥。沉伏而數為熱厥。
沉細為氣厥。芤大為血虛。浮滑為痰。弦數為
熱。浮者外感。脈至如喘。名曰暴厥。寸脈滑而
沉。為氣滑。為實。實氣相搏。血氣入藏。唇口身
冷死。如身和汗自出。為入府。此為卒厥。

二氣丹 治伏暑傷冷。二氣交錯。中脘痞結。或
瀉或吐。

硝石 硫黃等分
右為細末。銀石器內。炒黃色。再研細。糯米糊
丸。梧子大。每服五七丸。新汲井花水下。不應
更服。

氣

七氣所致。三因方論最詳。喜怒憂思悲恐驚。
謂之七氣所傷。有少痰在咽喉間。如綿絮相
似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

似。咯不出。嚥不下。竝四七湯為末。煉蜜和姜
汁為丸。噲化及局方烏沉湯。諸七氣湯。分虛

實選用。

四七湯

全匱即半夏厚朴湯

治氣結成痰。狀如破絮。或

如梅核。結在咽喉。咯不出。嚥不下。中脘痞滿。

氣鬱不舒。惡心嘔逆。一切鬱證。初起屬實者。

二陳湯。去橘皮。甘草。烏梅。加紫蘇。厚朴。

烏沉湯

治一切冷氣。及婦人血氣。攻繫

心腹。撮痛。

烏茶

沉香

人參各一兩

甘草炒五

右四味為末。每服半兩。入生姜三片。煎成入

食鹽一字。熱服。

七氣湯

治七情鬱結於中。心腹絞痛。服

寬膈破氣茶。轉劇者。投此即効。

人參三錢

三錢

甘草錢

肉桂一錢至

錢半

半夏一錢至

錢半

生姜七片

右五味。水煎空心服。○千金加吳茱萸。名奔

氣湯

深師七氣湯 治七氣為患。氣寒血熱。嘔瀉痞

滿

七氣湯加乾姜。吳茱萸。枳實。橘皮。桔梗。芍

芍藥。乾地黃。黃芩。

三因七氣湯

治七氣致病。嘔逆痞悶。腹脇脹

痛。

七氣湯。加厚朴。芫蕪。茯苓。橘皮。蘇葉。大棗。

指迷七氣湯 治七情相干。陰陽不得升降。氣

道壅滯。攻衝作痛。

七氣湯去人參。易觀桂。加香附。青皮。陳皮。

桔梗。蓬朮。藿香。益智仁。大棗。

大七氣湯 治積滯癥瘕。結聚。隨氣上下。心腹

疝痛。小腹脹滿。二便不利。

指迷七氣湯。去半夏。姜棗。加山稜。

○盛怒成疾。面色青黃。或兩脇脹滿。沉香降

氣散。木香調氣散。或四七湯。枳殼。木香。虛人

加人參。菖蒲。

沉香降氣散

治一切氣滯。胸膈不舒。婦

人經癸不調。少腹刺痛。

沉香錢

甘草錢

砂仁炒四

香附童便浸微

右四味為散。每服二錢。入鹽一字。沸湯調服。

木香調氣散 治氣滯。胸膈虛痞。嘔逆刺痛。

白豆蔻

丁香

木香

檀香各二

藿香

甘草各八分

砂仁四

右為散。每服二錢。入鹽一字。沸湯調如稠糊。晨夕各一服。或滴水為丸。服二錢。

本方加入參。白朮。茯苓。山萸。橘皮。青皮。葶澄。茹。各育氣散。治虛寒腹痛。進飲食。

○肥人氣滯。必有痰。以二陳。加蒼朮。香附。燥以開之。

○瘦人氣滯。必有火。宜蘓子。山梔。當歸。芍。藥。丹皮。降以潤之。

○老人胸膈氣滯。痞滿不舒。或作痛或不。能食。脈數實滑大。當作虛治。慎宜理中丸。或。六君子加香附。砂之類。氣不歸源。補骨脂為。主。白朮。沉香。佐之。

○一切冷氣。及血氣攻擊。心腹撮痛。局方。烏沉湯。最捷。婦女性多偏。屬陰氣易於動。如。痞悶脹痛。上澀心胸。或攻築脇肋。腹中結塊。月水不調。或眩暈嘔吐。往來寒熱。一切氣候。先用逍遙散。或蘇子降氣。沉香降氣。四磨。六。

磨選用。

蘇子降氣湯 千金本名紫蘇子湯 治脚弱上氣。

凡痰涎壅盛。肺滿喘嗽。

七氣湯。去人參。加蘇子三錢。橘紅一錢。當。歸。前胡。厚朴。各五分。大棗一枚。

四磨湯 治一切氣塞。痞悶不舒。不時暴發。

沉香

烏茶

檳榔

人參

右等分。酒磨各約半錢。入鹽一字。沸湯點服。或磨上三味。倍用人參煎湯。入鹽調服。

六磨湯

四磨湯。加枳殼。木香。

按四磨湯。雖用人參。實為散氣之峻劑。蓋。沉。烏。茶。得。人。參。助。之。其。力。愈。峻。服。後。大。便。必。有。積。沫。下。後。即。寬。若。六。磨。更。加。破。氣。二。味。下。氣。尤。迅。

○氣從左邊起者。肝火也。氣刺痛。皆屬火。當降火。茶中加枳殼。氣鬱不舒而痛者。木香。調氣散。憂而痰鬱。導痰湯。加香附。烏茶。因死。血而痛者。桃仁。紅花。歸頭。食積寒痰。流入脇。

下。背脊刺痛。諸藥不効者。神保丸。久患氣結。諸藥不能開者。先服沉香化氣丸三五服。以開其結。後用六君子。送降氣散調之。暴怒氣厥不省人事。蘇香合丸。

沉香化氣丸

治食積痰氣。痰痞脹妨食。

大黃酒蒸

條芩各二兩

人參

白朮各三兩

沉香五錢另研

右將前四味。剉碎用姜汁竹瀝。七浸七曝。候乾為末。和沉香末。再研神麴糊丸。水飛朱砂為衣。曬乾勿見火。每服二錢。淡姜湯送下。小兒量減。

○諸氣為患。須分暴病久病。暴怒傷陰。陽氣獨亢。氣厥不省者。可用辛香破氣。以通陰閉。若久抱抑鬱。氣不宣通。營衛不和者。又當辛溫散以調營衛。始為合宜也。

○枳殼利肺氣。多服損胸中至高之氣。青皮瀉肝氣。多服能損真氣。木香調諸經氣。瀉肺。能使上焦之氣下達。陰火上衝。禁用砂仁醒脾氣。而能上升。然後滯氣得以下通。白豆蔻。能溫肺氣。而使下行。然後陽氣得以上達。

香附。快氣。陳皮。泄逆氣。烏菴。紫菴。川芎。能散氣。使濁氣從汗散也。厚朴瀉胃氣。前胡下氣。推陳擯榔。瀉至高之氣。能使濁氣下墜。後重有積者宜之。藿香馨香。上行胃氣。沉香升降諸氣。腦麝散真氣。蘇子杏仁。下氣潤燥。氣滯有火者宜之。豆蔻。丁沉。檀麝。俱辛熱。能散鬱氣。暴鬱者宜用。稍久成火者忌之。稟壯氣實。氣不順而刺痛者。當用枳殼。烏菴。不已加木香。若肥人氣刺痛。二陳加厚朴。枳殼氣虛脈微弱者。即當用異功散。加枳殼木香。
○下手脈沉。便知是氣。其或沉滑。氣兼痰飲。沉極則伏。瀆難治。皆由大氣鬱滯不舒。以故脈頭沉伏。大都沉實有力。則宜辛散。沉弱少力。則宜溫養。氣主煦之。總不離乎辛溫散結也。

三和散

治五藏不調。三焦不和。心腹痞

悶。脇肋腫脹。風氣壅滯。肢節煩疼。頭面虛浮。手足微腫。腸胃燥澀。大便秘難。雖年高氣弱。并可服之。又治背痛有妨飲食。及脚氣上攻。

脇腹滿悶大便不通。

檳榔麩畏煨甘草

木香

陳皮

白朮各三分

大腹皮炙焦羌活

紫蘓

木瓜

沉香各一兩

右為鹿末每服二大錢水一盞煎至六分去滓溫服不計時候。○醫學原理三和飲治濕氣脹浮腫宜踈壅滯之結氣而痞等症自消。白朮腹皮各二兩羌活川芎茯苓木瓜各一兩。檳榔陳皮紫蘓八錢木香沉香甘草各五錢。○一方川芎一錢半羌活紫蘓木瓜大腹皮沉香各五分陳皮檳榔木香白朮各四分無甘草或加砂仁生姜燈心。

分心氣飲

治男子婦人一切氣不和多

因憂怒思慮怒氣傷神或臨食憂感或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食并

皆治之。

大腹皮

赤芍

木通

半夏

桑白

赤茯苓

肉桂

甘草

陳皮

青皮

羌活各一兩

紫蘓四兩

右為鹿末每服二錢水一盞生姜三片棗二枚燈心五莖同煎至七分。○回春方木通官桂茯苓半夏各三錢半桑白大腹青皮陳皮各五錢紫蘓二兩羌活五分甘艸二錢半赤芍三錢生薑三片棗一枚燈心一團或加枳殼檳榔香附治氣百病水氣面目浮腫加猪苓澤瀉車前木通葶藶麥門冬。○一方紫蘓二錢青皮陳皮大腹桑白羌活各五分茯苓半夏芍藥木通官桂各二錢甘艸二錢半。

快氣湯

治一切氣結心腹脹滿胸膈噎

塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解不思飲食。

砂仁

甘艸

香附各三錢

桔梗

陳皮各一錢

右用水二盞生薑三片煎至一盞溫服。

懸癖方救急

櫻皮四錢 山梔子二錢香
右二味細末以酒飲薄茶三服計令醉

鬱

九寒熱往來似瘧非瘧惡寒惡熱嘔吐吞酸
嘈雜胸痛肢痛小腹痛悶頭暈盜汗等證以
逍遙散出入加減此對證之方無不獲效倘
一服即愈少頃即發或半日或一日又治之
愈頻愈甚此必下寒上熱之假證此方不宜
投當改用溫補之劑如陽虛四君子加溫熱
茶陰虛以六味地黃丸作湯加溫熱茶甚者
又須寒因熱用少冷茶從之用熱茶冷探法
○鬱證多緣於志慮不伸而氣先受病故
越鞠四七見氣始立也鬱之既久火邪耗血
豈蒼朮香附輩能久服乎是逍遙歸脾繼而
設也然鬱證多患於婦人思想無窮所願不
得皆致病為證不一或發熱頭痛者有之喘
嗽氣乏者有之經閉不調者有之狂癲失志
者有之骨蒸勞瘵者有之蠱疽生蟲者有之

火炎失血者有之治法總不離乎逍遙歸脾
佐金見火降氣烏沉七氣等方但當考究新
久虛實選用加減出入而可也

越鞠丸

治諸鬱痞悶

香附童便 蒼朮麻油 撫芎童便

山梔姜汁 神麴炒香

滴水為丸菜豆大每服百丸白湯下陰虛多
火禁用○香附理氣鬱蒼朮開溼鬱撫芎調
血鬱梔子治火鬱神麴消食鬱總以理氣可
為主若溼鬱加白朮茯苓熱鬱加青黛黃連
痰鬱加半夏海石食鬱加枳實山查血鬱加
桃仁肉桂氣鬱加木香砂仁此因病變通之
大略也

火鬱湯 治火鬱不舒凜々惡寒不止

升麻湯 用生甘草加柴胡防風葱白

二妙散 治身半已下溼熱疼重而腫

黃蘗改用姜汁 蒼朮去皮切 等分

本方加肉桂名三妙散

四烏湯 血中氣滯小腹急痛

四物湯 加烏棗香附甘艸

○脈多沉伏。或結。或促。沉或瀯。瀯在肝腎。則見於左。瀯在心脾。則見於右。氣血食積痰飲。一有留滯。則其間脈必因之而止瀯矣。但當求其有神。何害之。有所謂神者。胃氣也。

附方

六爵湯

解諸爵。清火化痰。順氣開胸膈。

香附童便

蒼朮 泔製

神麴 炒

連翹 炒

山梔 炒

陳皮

貝母

川芎

枳殼 炒

蘓梗

茯苓 各一

甘草 五分

水煎服。○有痰。加南星半夏。○有熱。加柴胡黃芩。○血爵。加桃仁紅花。○濕。加白朮羌活。○氣。加木香枳榔。○食積。加山查砂仁。

痞滿

天地不交而成痞。此脾之清氣不升。而下溜。胃之濁氣不降。而上逆。當用補中益氣。加豬苓澤瀉。蓋升麻柴胡。從九地之下。而升其清氣。豬苓澤瀉。從九天之上。而降其濁氣。即所以交痞。而為泰矣。

○諸痞塞及噎膈。乃痰為氣激而上。氣為痰膩而滯。痰與氣搏。不得流通。宜連理湯。乾姜黃芩黃連人參湯。見傷寒黃連湯。諸瀉心湯。見傷寒。

連理湯

治胃虛挾食。痞滿發熱。

理中湯。加黃連。茯苓。

○氣滯痞脹。用五膈寬中散。不應。丁沉香透膈湯。

五膈寬中散

治七情鬱結。痰氣痞塞。遂成五膈。

厚朴 姜汁炒

甘草 炙

木香 五錢

白豆蔻 三錢

為散。每服三錢。加生姜三片。水煎入鹽一字。和滓服。

丁香透膈湯

五膈寬中散。加丁香。沉香。半夏。草蓂。人參。白朮。香附。砂仁。生姜。大棗。水煎服。青皮陳皮。神麴。

○諸痞塞脹滿。胸膈不利。或氣上逆。或腹疼痛。宜指迷七氣湯。見氣胃虛加參朮。氣

痞滿

二百十五

滯加木香。大便秘。加檳榔。面目浮腫。加蘓葉。四肢腫。加木瓜。虛痞局方七氣。見氣局方烏沉湯。最妙。

增

損流氣飲。治鬱怒暴痞。面目浮腫。心腹脇滿。二便秘瀉。四肢脹大。

半夏

赤茯苓

陳皮各一

甘艸各五分

蘓葉

香附

檳榔大便瀉若去之

木香

大腹皮

枳殼

桔梗各七分

人參一分五分

肉桂

厚朴姜製各八分

生姜七片

紅棗二枚擘

水煎熱服。按十六味流氣飲。以二陳加入破氣藥。雜合成劑。施之藜藿。往々克應。遂為各方。其木香流氣飲。依傍局方七氣。金匱四七。似覺彼善於此。然亦雜亂無章。至於分心氣飲。分氣紫蘇飲。皆彷彿流氣風斯愈下。今止取木香流氣。刪其蘓葉。以為存半之意。○膈上諸般冷氣。嘔逆不食。不問痞塞痛且與姜汁探吐。然後用藥。痰飲尤宜。○邪氣為痞。宜用疎劑。若氣不順。逆上為

痞此乃虛痞。愈疎而痞愈作。宜於收補中。微兼疎通之意。不可用香劑。古人治瀉後膈痞。用理中丸。即此意也。

○痞塞諸藥不効。大便不通。脈數實者。小陷胸湯。見傷寒。三黃湯。見火。甚則寶鑑木香

檳榔丸。通利之。若肥人痰痞。風秘大便不通者。御棊院木香檳榔丸。

寶鑑木香檳榔丸。治一切滯氣。心胸腹脇痞滿。大小便瀯滯不快。

木香

檳榔

枳殼炒

青皮炒

陳皮炒

廣茂煨

黃連各一兩

黃蘗炒

香附醋炒

大黃酒蒸

牽牛

腹滿便秘用黑者。喘滿膈塞。用白者。取頭末。各二兩。

滴水為丸。豌豆大。每服三五十九。至七十九。

食遠姜湯送下。以利為度。○本方。去陳皮廣

茂香附黃連黃蘗大黃牽牛。加杏仁半夏皂

角郁李仁。蜜丸。姜湯下五十九。即御棊院木

香檳榔丸。專主痰痞。風秘。寶鑑方。治氣痞熱

痞。各有攸宜。

○肥人心下痞悶。內有溼痰也。二陳湯。加

枳實芩連。然不若小陷胸湯。尤捷。

○瘦人心下痞悶。乃鬱熱在中焦。三黃加枳實。以導之。心下痞。而寒熱不除者。小柴胡加枳桔。

○如飲食後。感冒風寒。飲食不消。或食冷物。而作痞悶。宜溫中化滯。二陳加縮砂紫蘇。藿香。或平胃。加藿香草豆蔻之類。

○虛人停滯不散。心下痞。或寬或急。常喜熱物者。枳實理中湯。

○老人。虛人。脾胃虛弱。轉運不及。飲食不化。而作痞者。九味資生丸。飽悶常嚼一圓。或六君子。加香砂。山楂。麩麥。

九味資生丸 治老人食難克運。

四君子湯。本方參朮。各三兩。茯苓一兩半。炙甘草半兩。加橘紅檀肉神麩各二兩。川黃連。白豆蔻。各三錢半。煉白蜜丸服。○古方止此九味。後人更加桔梗。藿香。各半兩。澤瀉三錢半。扁豆蓮肉各一兩。薏苡三兩。山棗麥芽芡實各一兩半。醉飽後。細嚼彈子大一丸。淡姜湯下。則酒食易化。健脾胃。

胃。消食止瀉。調和藏府。滋養營衛。饑時服之。即飽。飽後食之。即饑。茶雖繁簡不同。而功效不異。因而存之。

○胸中氣塞。短氣。橘皮枳實生姜湯。見胸痺類。○有酒積雜病。過下傷脾。虛不運作痞。養胃兼和血。參朮歸芍。兼升柴。稍佐陳皮枳殼之類。

○大怒後成痞。或痰中見血。或口中血醒。氣。是瘀血。丹皮。紅麩。香附。桔梗。降香。紅花。蘇木。山楂。麥芽。童便。甚則加大黃。桃仁。泥。

○有痰挾瘀血。成窠囊作痞。脈沉瀯日久不愈。多鬱人。悲哀過度有之。宜從血鬱治。桃仁。紅花香附。丹皮。韭汁之類。

○舉世治中滿痞脹。不問虛實。咸禁甘。艸。殊不知。古人所謂。中滿勿食甘者。指實滿而言也。若自覺滿。而外無腹脹之形者。當以甘治之。

○痞與脹滿。有輕重之分。痞則覺痞悶。而外無張急之形也。

○脈弦急而滑。驟然胸中痞悶。乃肝氣與

食滯而成。為實。脈弦。或沉弦。或濇。或虛大無力。氣口為甚。此日久脾胃受傷。或過服剋伐藥所致。為虛。胸膈痞悶。而寸口脈沉滑。或遲滑者。為有停滯。

枳實消痞丸 治右關脈浮弦。心下虛痞。惡食懶倦。開胃進食。

枳實

黃連錢各五

乾生薑錢二

半夏錢三

厚朴製各四兩

人參錢三

炙甘草錢二

白朮錢三

茯苓

大麥麩各二

右同為細末。水浸蒸餅為丸。每三五十丸。溫水下。按已上二方。並半夏瀉心湯加減法也。內有枳朮湯。四君子。五苓。平胃等。利濕消痞。補虛之藥也。

宣明檳榔散 治傷寒陰證下後成痞滿而痛。按之軟虛。

檳榔

枳殼等分

右為末。每服三錢。煎黃連湯調下。

快中丸

治食滯痞悶積聚

麥芽七

枳實六

厚朴四

木香

檳榔各三

青皮

陳皮

白朮各三

右八味糊丸。兼治食滯之痢疾泄瀉。但枳實宜用和產

檳榔

陳皮

厚朴

莪朮

青皮

香附

三稜

神麴

山查

地膚各十

麥芽七

蒼朮

宿砂

木香各五

右十四味水糊丸

如仙丸 積聚。疝氣。蟲積。食積。屬熱者

白朮二十

陳皮

檳榔

神麴

麥芽

青皮

莪朮

三稜

龍膽各十

黃連

胡黃連

使君子

金鈴子各八

木香四

右十四味醋糊丸

腹滿

腹脹諸證。雖屬寒者多。屬熱者少。然世治脹。喜用辛溫散氣之藥。即使溼熱作脹。亦必

賴辛溫之品以散氣。氣散則脹滿亦寬。但須以去溼熱之茶為主。而兼辛溫為引導則可。然又有火盛陰虛熱。乘血分者。其腹雖脹而不可甚大。按之益堅。小便黃赤。大便秘澀。至夜則微熱。其脈數實而細小。不可誤作食積治。蓋消導則陰愈傷。去溼則津愈涸矣。宜用極苦極寒之茶。如當歸龍薈丸。見火或四物湯。加胡二連。蘆薈用醋製。可一服而效也。

○有氣虛不能裏血。血散作脹。必其人大便不堅。或時結。或時澹。澹則稍減。結則漸加。小便清利。甚則渾白如泔。其脈緩大而滯。氣口益甚。慎不可辛溫耗散。宜四君子去白朮。加木香。沃瀉當歸芍藥。以固其氣中之血。

○有血虛不能斂氣。氣散作脹。其人煩熱便燥。小便黃數。其脈浮數而弦。人迎尤甚。慎不可用苦寒傷胃。茶宜四物湯。去地黃。加黃耆。肉桂。甘草。煨姜。以和其血中之氣。

○外因六氣成脹。藿香正氣散
○內因七情成脹。沉香降氣散
○憂思過度。致傷脾胃。心腹膨脹。或喘促

煩悶。腸鳴。氣走。漉漉有聲。大小便不利。脈虛而澹。局方七氣湯。

○濁氣在上。則生臌脹。生姜瀉心湯。加木香厚朴。

○脾胃不溫。不能腐熟水穀。而脹。附子理中湯。

○腎藏虛寒。不能生化脾土。而脹。濟生腎氣丸。見虛損

○中滿腹內堅硬如盤。不能坐臥。大小便瀉滯。上氣喘促。面色痿黃。通身虛腫者。此寒熱錯雜。膠固於中。營衛血氣凝滯於內也。分消湯。分消丸。詳寒熱多少。或加減用之。諸七氣選用亦可。

中滿分消湯 治中滿寒脹

半夏 一匙

厚朴

黃連

黃蘗 上四味 但製

川烏 炮

乾姜 炮

吳茱萸 淨用開口者炒

草豆蔻 炒研

木香

人參 各五分

茯苓

澤瀉 各一分

生姜 五片

右水煎。稍熱食前服。大忌房勞。生冷。炙博。酒。

麪糟醋。鹽醬等物。○身熱脈浮喘滿。有表證。加麻黃五分。血虛至夜煩熱。加歸身黃芪各五分。陽氣下陷。便溺赤澀。加升麻柴胡各三分。脾胃虛寒。飲食不磨。去黃蘗。加益智仁。華澄茄。青皮各二分。

中滿分消丸 治中滿熱脹

厚朴 半夏

黃芩 枳實

乾生薑 茯苓

沢瀉 人參

黃連 二味同炒

白朮 二味同炒

猪苓

甘草 炙

湯浸蒸餅為丸。梧子大。每服百丸。食後沸湯下。○脾胃氣滯。食積脹滿。加陳皮砂仁五分。經脈溼滯。加腹皮。腿臂痛不可抬者。加片子姜黃一錢。肺熱氣不行。溺秘喘渴者。加知母三錢。○東垣分消湯丸。一主滯溫中散滯。一主清熱利水。原立方之旨。總不出內經平治權衡。去苑陳莖。開鬼門。潔淨府等。方下所指寒脹。乃下焦陰氣逆滿。爵過中焦陽氣。有似乎陰之象。故棗中雖用烏頭之辛熱。宣布五陽。為辟除陰邪之嚮導。即用連藥之苦寒。

以降泄之。苟非風水膚脹脈浮。證起於表者。孰敢輕用開鬼門之法。以鼓動其陰。覆四塞乎。熱脹用黃芩之輕揚。以降肺熱。則用猪苓沢瀉。以利導之。故專以淨府為務。無事開鬼門。宣布五陽等法也。

○氣口脈緊滑。惡心飽悶。口乾內熱者。是食積積實導滯丸。見傷飲食。

○飲食奔走。或跌撲凝血不散。或婦人血聚。而成腫脹。腹上有青紫筋。腹中按之疼。脈來弦澀。當作畜血治之。

○怒甚氣逆。腹脹滿。兩手脈弦。青皮。陳皮。木香。山梔。柴胡。枳殼。歸尾。桃仁。芍藥。薄荷。

○嗜酒之人。病腹脹如斗。前後洩便俱有血。用利棗轉加其脈數而澀。此得之濕熱。傷脾陰。不能統血。胃雖受穀。脾不輸運。故成痞脹。當理脾氣祛溼熱。兼養血之劑。如枳實黃連。半夏茯苓。當歸芍藥。阿膠。烏梅。砂仁之類。白芍。烏梅。收脾陰。黃連。枳實。瀉脹滿。歸膠補管血。芍藥。去涎飲。砂仁。醒脾氣也。倘觸動平昔所畜之溼熱。脹滿逆上喘急者。多砂下利。

不止者亦死。
 ○脈來緩大者。屬氣虛。弦數屬血熱。氣口緊盛。或滑。為停滯。濡滑為溼熱。弦細為肝邪乘脾。人迎浮弦。風氣內乘。弦細而數。陰邪上逆。若虛大無根。為脾胃氣衰。沉細短濇。為腎藏氣絕。

水腫

水腫有陰陽之辨。陽水者。脈息浮數。遍身腫。煩渴小便赤濇。大便多秘。急宜疏鑿飲。禹功散。濟川散。神芎丸。神祐丸。選用。

疏鑿飲

治水氣通身浮腫。煩躁喘渴。小便不利。

利

沢瀉

商陸

赤小豆

菴活

大腹皮

椒目

木通

秦艽

茯苓

檳榔各七分

生姜三片

水煎頓服

禹功散

治陽水腫。便秘脈實。初起元氣未傷者。

黑牽牛頭末四兩

茴香炒

木香各一兩

為散。每服二錢。加生姜自然汁調。如稀飲服。

濟川散

治水腫脹急。大便不通。大實大滿證。

大黃

牽牛頭末

郁李仁各一兩

芒硝

甘遂各半兩

木香三錢

為散。每服二錢。入生姜自然汁。和如稀糊服。此乃下水積之峻藥。火熱沸爵。水液不能宣通。停滯而生溼熱。在陽不去。則化氣而為脹。在陰不去。則化積成形。

神芎丸

治水腫。外內俱實者。

大黃

黃芩各二兩

黃連半兩

滑石

牽牛頭末各四兩

川芎

薄荷各半兩

滴水為丸。每服五七丸。至十五丸。臨臥溫水服。溼熱腰脇腫滿。加甘遂一兩。遍身走注疼痛。加白芥子一兩。久毒熱腫腹痛。加芒硝一兩。關節不利。加菴活一兩。腸胃結滯。加郁李仁一兩。腰腿沉重。加商陸一兩。○本方去黃連。川芎薄荷。名導水丸。戴人取伊尹三黃丸。變為神芎丸。每令病人至夜。先服百餘丸。結

以瀆川散投之。五更當下。種々病出。投下少許。再以和膈菜服之。以利為度。有五日一下者。三日一下者。病輕者一二服止。重者五六度方愈。是擒縱緩舒之妙。臨病製宜。非可言論。自非老年諳練。有大負者焉。敢效諸行事耶。○詳方後云。每服五七丸。至十五丸。乃峻茶緩攻之成法。此言每令病人。先服百餘丸。急乘元氣未滿。為之迅掃。各有至理。不可以此礙彼也。

神祐丸

治陽水腫脹。大小便秘。

大戟

芫花

甘遂各一兩

大黃二兩

黑牽牛頭末四兩

輕粉一錢

右為末。紅棗肉為丸。初服五七丸。日三服。漸加快利為度。加青皮陳皮木香檳榔各半兩。名舟車神祐丸。已屬蛇足。更加乳香名除溼丹。風斯愈下。

○陽水腫

小便不通。危急且夕者。沉香琥珀丸

珀丸

沉香琥珀丸

治血結。小腹青紫筋絆。喘急脹滿。

琥珀另研

杏仁一作桃仁

蘇木

赤茯苓

澤瀉各五錢

葶藶隔紙

郁李仁去皮各一兩

防己酒洗各五錢

沉香另研

陳皮

防己酒洗各五錢

麝香一錢

蜜丸。菴豆大。每服四五十丸。加至百丸。空心人參湯下。

三白散

陽水腫。陰囊腫脹。二便不通者。

白牽牛頭末二兩

桑白皮姜汁炒

白朮生用

陳皮

木通各一兩

為散。每服二錢。空心淡姜湯送下。

○然驟發便劇。元氣未衰者。可用上法。若病後脾虛發腫。只宜輕劑投之。如六君子。五苓。理苓之類。俱可應用。

理苓湯

治胃虛食滯。喘腫浮腫。小便不利。

理中湯。合五苓散。

○陰水腫者。脈沉遲。或細緊。遍身腫。不煩渴。大便自調。或溇泄。小便雖少。而不赤。瀆實脾散加減。

實脾散

治陰水腫。宜此先實脾土。

白朮炒黑

附子炮

乾姜炮

茯苓

木香

木瓜

草蓂仁

厚朴

大腹皮

甘草炙五錢

為散。每服四錢。加生姜五片。棗一枚。水煎服。璠王先生曰。此因腎中真陽衰微。何方中不用肉桂。若有滯氣。厚朴尚可暫投。大腹子之開泄大便。斷乎不可妄用。

○陰水腫。小便頻數者。濟生腎氣丸。小便有時不赤。晚則微赤。陰本陽標。未可據用溫補。先與五苓散。清理其標。次與復元丹。

復元丹

治脾腎俱虛。發為水腫。

附子

炮二兩

白朮

炒黑

肉桂

吳茱萸

揀去開口者炒

木香

川椒

炒去汗

茴香

厚朴

厚朴

姜製各一兩

澤瀉

肉果

煨各半兩

茯苓

一兩五錢

為末。陳米飲糊丸。梧子大。每服五七丸。紫蘇湯。或砂仁湯。送下。

○陰陽結邪。多陰少陽。為石水。越脾加木湯。發之。

○腎肝并沉。為石水。真武湯溫之。

○小便涓滴不通。諸茶不應。急用金液丹。竈心赤土。煎湯送半錢。

金液丹

局方

治陰極發躁。厥冷脈伏。凡甲唇

青。水腫脈伏。小便不通。陰結畏寒。大便秘。

明淨硫黃五兩。研細水飛。入煬。盛罐內。水調赤石脂末。封口鹽泥。通身固濟。候乾。三足釘。釘於地。將罐放釘上。漫火燒。養七晝夜。再加頂火。用炭十觔為度。候冷。取出研細。每末一兩。用蒸餅一兩。打糊。為梧子大。每服二三十丸。溫白湯送下。陰極冷甚者。服百丸。

○誤用峻利。小便不通者。理苓湯和之。

○經云。結陽者腫四肢。四肢為諸陽之本。陽結則不行其陰。故為之肢脹。五苓散分利。

○水腫暴發。脈浮。喘滿。欬逆。煩熱者。小青龍湯。上熱戴陽。下虛足冷。小青龍去麻黃。加

肉桂熟附子四五分。

○面目四肢浮腫。屬溼熱。五皮散。初起脈實氣盛。五子五皮散。

五皮散

治溼熱。積於脾經。面目四肢浮腫。

水腫

二百三十三

五加皮

地骨皮

大腹皮

生姜皮

茯苓皮等分

為散。每服五錢。水煎熱服。

五子五皮湯

治前症初起。脈實氣盛。

五皮散。加紫蘘子。萊菔子。香附子。車前子。

葶藶子。○一方無香附子。多大腹子。加生

姜煎服。

○面獨腫而氣急。蘘子降氣湯煎成。磨沉香調服。

○有一身惟面與足腫。早則面甚。晚則足甚。蘘子降氣湯。合除溼湯。各半貼和服。

○右半邊腫甚者。肺胃中有積滯也。導氣為先。大忌琥珀。爵金。蘘方木。五靈之類。

○左半邊腫甚者。肝腎間有瘀血也。散血為要。大忌胃苓。非特蒼朮性燥。能阻滯惡血。

即白朮亦須生用。生則有逐溼散血之功。而無壅滯之患。

防已茯苓湯

治皮外四肢腫而聶々動者

防已

黃耆各三錢

甘草一錢

肉桂三錢

茯苓六錢

水煎溫分三服。

○感溼而腫者。

其身雖腫。而腰已下至脚

尤重。防已黃耆湯。加黑黃牛尿。輕者除溼湯。加木瓜大腹皮。

○因氣為腫者。脈必沉伏。而腫滿喘急。增損流氣飲。見痞滿

葶藶木香散

治大腹水腫。喘脹大小便秘者。

五苓散。加葶藶木香。木通。滑石。甘草。

○不服水土而腫者。胃苓湯。

○病後腰脚浮腫。為有水氣。胃苓湯。加黃連。

○因患瘡。用乾瘡茶太早。而致身腫。上半身甚者。羌活勝溼湯。加升麻。白芷。蘘葉。下半身甚者。五苓散。換茅朮。加木瓜。大腹皮。

○婦人經水先斷後。至四肢浮腫。小便不通。通身皆腫。此血化為水。名曰血分。此病乃

七情乖違。脾胃虧損。不能統攝而成。最難治。日用歸脾湯。下椒仁九一九。

椒仁丸

椒仁炒

甘遂

續隨子去皮即千金子

水腫

二百二十四

附子炮

郁李仁去皮

黑牽牛頭末

五靈子酒研去

當歸

吳茱萸揀淨湯

延胡索各五

芫花醋炒

蛇青十枚去翅

膽礬

白砒各一

石膏三

為末。麴糊丸。豌豆大。每服一九。空心橘皮湯下。

○若先小便不利。後至身面浮腫。經水不通者。血為水敗也。名曰水分。用歸脾湯。送葶歷丸七九。其經脈不通。而化為水。流走四肢。悉皆腫滿者。亦曰血分。其證與水腫相類。而實非水。歸脾湯。送人參丸十五丸。

葶歷丸

治先因小便不利。後至四肢浮腫。名曰水分。

甜葶歷隔紙

續隨子去皮各

乾葶末一兩

為末。煮紅棗肉為丸。梧子大。每服七九。煎篇蓄湯。送下。大便利者禁用。

人參丸

治月經不利。血化為水。四肢浮腫。名曰血分。

人參

當歸

大黃酒蒸

藿麥穗

赤芍藥

赤茯苓

肉桂各二

苦葶歷熬

為末。煉白蜜丸。梧子大。每服十五丸。空腹米飲下。

○水腫死證。見一即危。傷肝唇黑及腫。傷心缺盆平掌無紋。傷脾臍突。傷腎足底平。傷肺背平肩聳。如卵縮向上。陰囊無縫。及莖腫腐者死。大便滑泄。水腫不消者死。加以喘滿。雖暴病亦必不治。泄後腹脹而有青筋者死。鼻扇。目青。耳焦。面黑。破眼。脫肉者死。期迫矣。先起於四肢。後歸於腹者死。先起於腹。後散於四肢者。可治。如肺氣不能下行。兩足腫潰。而小水全無。腹中之痛不可名狀。以手揉左。則痛攻於右。揉右則痛攻於左。當臍揉熨。則滿腹俱痛。叫喊不絕。利水敷臍之藥。俱無効。無可治。

○開鬼門之劑。麻黃。羌活。防風。紫胡。葱白。白及。柳枝煎。

○潔淨府之劑。澤瀉。木通。防已。葶歷。茯苓。猪苓。秋石。代鹽。

○去苑陳莖之劑。商陸。大戟。芫花。牽牛。

○宣布五陽之劑。附子。肉桂。乾姜。吳茱萸。

○血腫之劑。琥珀。磁石。劉寄奴。蘇木。

○丹方。治水腫。用竈心赤土升許。燒紅。乘

熱。以陳三白酒。或火酒淋。澄清。空腹食之。愈

血腫。紅酒淋服。虛人用伏龍肝煎湯。每日煮

粥食之。

○水腫。小便不通。諸茶不効。用車前草葉

搗爛。絞自然汁一盞。入燒酒半杯。頓熱。空心

通口服。不過七日効。病久虛極。不勝開泄者。

用薏苡四兩。湯泡數沸。頓熱服。即通。勿過熟。

過熟即不効。

○赤豆煮湯。代茶良。鯉魚重筋許者。和冬瓜

葱白煮汁食。鯽魚亦佳。鱧魚作羹。用醋勿用

鹽。而千金水腫。蒜醋皆忌。以其性味之濁也。

而血腫尤忌。綠頭鴨。或白鴨。同赤豆煮汁。空

腹食之。切忌鹽醬入口。病必轉甚。

○脈沉主水。沉而滑。浮而遲。弦而緊。皆水腫

水病。腹大。脈實大者生。浮虛者死。水病腹閉。

其脈沉實弦者生。沉細虛小者死。水病一身

悉腫。瀉利厥逆。脈沈實者。急溫之。虛大者死。加以喘迫。此為命絕。

杏子湯

治風水虛脹。脈浮。發其汗。即已。

麻黃湯去桂枝。

又易簡杏子湯。用小青龍。如人參。杏子仁。

附方

吳茱萸湯

選奇方曰。治一切浮腫。及水氣等。

又曰。一名祇殼茯苓散。治一切水腫。手足頭

面悉腫。喘息并一切體腫。百一撰方云。治一

切浮腫水腫。道濟方曰。治腹急蟲脹。

吳茱萸

枳殼

白朮

赤茯苓

姜水煎。○此茶能利大小便。減腹痛。

勻氣散

治水腫諸茶不効。愚云。因氣者歟。

白朮

烏茶

天麻

人參

沉香

白芷

青皮

甘草

紫蘇

木瓜

各三分

姜棗水煎。

○治腫脹。諸茶不効。方

轉

右以味噌。或將醬。煮食之。

水腫通藥

治十種水病不瘥。垂死者。救急易方

鴨青絲頭雄一隻

右細切。和米煮極熟。化粥食。

又方 救急易方

鯉魚一尾重一斤

右和冬瓜。葱白。煮食之。

治水腫方

四十歲以上之腫脹。最効。和方

常山蟲

右細末一錢許。入主方煎用之。元氣衰弱者。倍之。常山蟲。大強元氣。

藥湯方

此湯治腫氣脹滿。或痢疾。婦人腰痛。

瘀血帶下等。男子筋骨腹脹。息急。倭方

覆葉

忍冬

桑葉

馬鞭艸各等分

右入袋煎去滓。一日兩三度。或五度浴之。夏月一七日。湯不腐。冬月二七日。湯不腐。

又方 消腫 倭方

洋莖

右煎取居風呂浴之。

嘉禾散

治身半以下水腫。

○男女治有腫氣者。倭方

人參

大黃

木通

檳榔

茯苓各一分

黑豆一分

甘草五厘

右七種水煎男女俱一切腫氣用之。無上方也。

鼓脹

夫脹滿皆脾胃之氣虛弱不能運化精微。致水穀聚而不散。清氣下降。濁氣填滿。胸腹溼熱相蒸。遂成此證。小便短濇。其脈膠固。難以治療。用半補半瀉之法。健脾。順水。寬中為主。不可過用猛烈。反傷脾胃。再後脹。不可治也。宜分消湯。分消丸。隨寒熱虛實。加減治之。○脹滿得之未久。或脹或消。腹皮稍軟。不洩不喘。隨治隨愈。若臍心凸起。利後脹亦急。久病羸乏喘急。不得安者。名曰脾腎俱敗。無愈期。效嗽失音。青筋橫絆腹上。及爪甲青。卒腫頭面蒼黑。嘔吐。頭重。上喘。下泄者。皆不治。

○畜血成脹。腹上青紫筋見。或手足有紅縷赤痕。小水利。大便黑。金匱下瘀血湯。不應抵當丸。去水蛭。加樗雞作丸。空腹日進梧子大三丸。血下止後服。輕則散血消脹湯。

散血消脹湯 治血脹小便多。大便溏黑光亮

歸尾一錢五分 五靈脂 觀桂

烏茶 甘草各六分 木香各六分

川芎一錢二分 半夏 蓬朮八分

紫蘓三分 砂仁一錢 生姜五片

水煎。食前溫服。

○肥白人。腹脹多是溼痰。二陳。六君。平胃。

五苓參酌。

○瘦人腹滿。是熱。用炒川連。厚朴。白芍香

附。

○婦人血腫煩躁。漱水不飲。噤神昏善忘。

小便多。大便黑。散血消脹湯。虛人血蟲琥珀

人參丸。或因產崩血虛。或瘀血不散。亦成腫

脹。其人必脈瀯。面黑不可作水溼治之。

琥珀人參丸 治血蟲

人參 五靈脂各一兩 琥珀

肉桂 附子生各五錢 赤茯苓

川芎 沉香 穿山甲煨各三錢

為末。濃煎蘓方汁為丸。每服二錢。早暮溫酒各一服。

○此人參與五靈脂並用。最能瀉血。血蟲之的方也。

○腹脹便血。其脈大。時絕者死。

○腹大脹四末清。形脫泄甚。上氣喘息者死。

○腹脹誤用攻葦。暫寬復脹者死。

○先脹於內。後脹於外。小便赤瀯。大便秘結。氣色光亮。聲音高爽者。實也。木香。沉香。砂

仁。枳實。厚朴。蒼朮。大腹皮。以治脾。桑皮。葶歷

殼。薤子。桔梗。枳。橘。以治肺也。木通。防已。茯

苓。車前。沢瀉。猪苓。以利小便也。麻黃。防風。薤

活。葛根。以發汗也。如氣壯能食。年少新病者。

大黃。芒硝。皆可應用。

○先脹於外。後甚於內。小便淡黃。大便不實。氣色枯白。語言低怯者。虛也。參。苓。白朮。陳

皮。甘艸。以補脾也。人參。黃耆。桔梗。苡仁。以補

肺也。沉香。枳殼。木香。以理氣也。桂。苓。澤瀉。猪苓。白朮。以利小便。升麻。柴胡。以開鬼門。如虛甚多寒者。桂。附。姜。萸。俱宜取用。

○金匱腎氣丸。益火消陰。脈沉者。誠為切要之茶。然必小腹脹極。後旁及於上者。為宜。○小建中湯。於土中瀉水。必脈浮而弦強者。乃為合劑。亦須脇下脹急。而後旁及於中者。方可投之。

○脹而木虛證實。攻補兩難者。丹方用陳香櫞。去穰。人溺。白堊。煨過。水腫用通草湯。氣腫用砂仁湯。血腫濃煎。上牛膝湯。虛極用人參湯。每日空腹二錢。此方能散積滯。而不大傷元氣也。

○脹而虛實莫辨。宜用火酒熱飲。覺辣喉者。屬實熱。當進苦寒燥溼。攻堅之劑。若飲熱火酒。如啜冷水者。屬虛寒。參。朮。姜。桂。須大劑。頻投方可救援。

金蟾散

治一切實脹。用大蝦蟇一雙。以砂仁推滿腹中。鹽泥固濟。煨令紅透。烟盡去泥。研末。陳酒下三錢。拜治小兒疳積腹脹。米

湯下一錢。

○腫脹服藥。最忌鹽醬糟物。愈久欲食。須

用開鹽醬法。用大鱧魚一箇。破開入五苓散。放瓦上。對合上下。俱用火灸。黃焦存性。為末。加麝香少許。空心姜棗湯服之。水腫亦然。惟火脹。不忌鹽醬。如色枯槁。肢體消瘦。單腹脹急。而塊壘不平者。皆屬火脹。此非水腫。無慮助腎水之邪也。若脈弦細瀼。雖能飲食。終亦亡。火腫候服金匱腎氣等茶。急投連鑒。金鈴。白芍之類。仍用桂附少許。為熱因熱用之。嚮導。疾可挽回。若喘瀉肢枯。脈無胃氣者。不救。

○脈弦為肝尅脾胃。脈實則脹。此屬實。關上脈虛。即脹滿。此屬虛。洪數為熱脹。遲弱為陰寒。浮為虛滿。緊為中實。虛數不可治。實大浮洪易治。沉微細小者。難痊。盛而緊大。堅以瀼。遲而滑。皆脹滿多熱。脈浮大。腹脹為逆。發熱不休。成寒熱如瘧。皆不可治。腹大脹四肢冷。泄瀉。不及一時而死。腹脹便血。脈大時絕。為逆脹。而上則喘咳。下則泄瀉。脈浮大沉細。皆不治。

積聚

五積六聚。隨氣上下。發作有時。心腹疔痛。上氣窒塞。小腹滿大。小便不利。大七氣湯。用鐵落飲煎。服。形羸氣弱者禁用。

○有飲癖結成塊在脇腹之間。病類積聚。用破塊菜。多不効。此當行其飲。六君子。合五苓散。最妙。更加旋復。前胡。枳實。白芍。即海藏五飲湯。若在膜外者。宜導痰湯主之。何以知其飲。其人先曾病差。口吐涎沫。清水。或素多痰者是也。

○又多飲人。結成酒癖。肚腹積塊。脹急疼痛。或全身腫滿。肌黃。食少。大七氣湯。紅酒煎服。

○腹中似若瘕癖。隨氣上下。未有定處。二陳。加當歸。杏仁。桂心。檳榔。名散聚湯。若氣作痛。遊走腹間。攻刺上下。如雷鳴。或已成積。或未成積。宜木香通氣散。

木香通氣散 治寒氣成積。腹痛堅滿。不可忍。

木香 戎鹽 三稜

厚朴姜製一兩 枳實炒 甘草各三錢

乾姜炮 蓬朮煨各二錢

為散。每服三錢。食前淡姜湯調下。

○肉積妨礙飲食。四味阿魏丸。

四味阿魏丸 治肉積發熱。

山檀姜汁炒一兩 連翹仁 黃連姜汁炒各五錢

為末。另用阿魏一兩。醋煮糊丸。麻子大。每服二十九。至三十九。食前沸湯下。脾胃虛人。六君子湯下。

○石瘕。和血通經湯。不應見睨丸。虛人十全大補湯送下。

和血通經湯 治婦人寒。客胞門。月事不來。結

為石瘕。及一切血結成積。

當歸 熟地黄 蘇木各一兩

三稜炮 廣茂炮 木香

貫衆 肉桂各八分 紅花三分

血竭五分

食前紅酒煎服。忌醋生冷之物。

阿魏麝香丸 治腸覃。諸積痞塊。

阿魏酒煮五錢 麝香一錢 雄黃三錢

野水荊花子四兩

神麴炒

人參

白朮生各一兩

肉桂五錢

右為散。每服三錢。用烏羊即葶三箇。去皮搗爛。和棗。早晚各一服。砂仁湯過口。

見覘丸 治寒氣客下焦。血氣閉塞。而成石瘕。腹中堅大。久不消者。

附子炮去皮臍四錢

鬼箭羽如無。鱖魚甲代之。肥人瘵。開鬼白。南星代之。

紫石英各三錢另飛

沢瀉

肉桂

延胡索

木香

檳榔二分五分

血竭一錢五分另研

京三稜五錢

大黃三錢。剉。用酒同三稜浸。一宿。焙。

右十三味。除血竭。桃仁。外。同為末。入另研二

味和勻。紅酒打糊丸。如桐子大。每服三十九。淡醋湯下。食前温酒亦得。虛者去水蛭。三稜

加人參一兩。當歸五錢。虛甚用十全大補湯送下。

○伏梁環臍而痛。金匱三物大建中湯加

桂苓。

大建中湯 治胸中大寒。嘔吐不能食。及少腹

冷積作痛。

乾姜四錢

人參三錢

蜀椒半合

水煎去滓。內膠飴半杯。微火再煎温服。如炊頃。少飲稀粥一升。後更服。當一日食糜温覆之。

○息積氣逆。而不妨於食。內服三因化氣

散。外用良方阿魏膏。熨貼。一切痞積竝効。

阿魏膏

地黃。活。獨活。黑參。觀。桂。赤芍。穿山甲。炮。生。花。槐。柳。枝。各三錢。土。水。黃。白。芷。天。麻。各五錢。紅。油。二。兩。煎。去。滓。入。乳。髮。雞。子。大。一。握。再。煎。真。

鷓鴣丸

鷓鴣。一。雙。水。洗。淨。子。六。兩。白。朮。二。兩。阿。魏。一。兩。神。曲。一。兩。當。歸。一。兩。橘。紅。一。兩。甘。草。各。五。錢。蜜。一。兩。

阿魏化痞散

阿。魏。一。兩。當。歸。一。兩。橘。紅。一。兩。甘。草。各。五。錢。蜜。一。兩。

陰陽攻積丸

治寒熱諸積

吳茱萸

川烏

茯苓

沉香另研

琥珀另研

延胡索

巴豆霜另研

乾姜炮

黃連薑汁炒

延胡索

琥珀另研

沉香另研

為末。皂角四兩煎汁糊丸。菜豆大。每服八分。

加至一錢五分。姜湯下。與脾胃茶間服。○六

君子。去木。倍苓。加肉桂。當歸。米飲糊丸。或朝

服增損六君。夕用攻積丸。或攻積一日。六君

二三日。隨人強弱而施。但初服未嘗不應積

勢向衰。即當停服。所謂衰其大半而止。專力

補脾可也。

○諸蟲積聚。時定時發。十年二十年不瘥者。千金耆婆萬病丸。悉主之。

○好食茶葉成癖。面黃少力者。川椒紅二兩。茶葉一兩。為末。飛羅麩炒香。打糊為丸。茶清。送下三十九。

○血積。桃仁。穿山甲。乾漆。大黃。蝨蟲。瘀血。蓬朮。瓦礫子。

○痰積。半夏。南星。白朮。枳實。礞石。硝石。風化硝。白芥子。老痰。海石。蛤粉。

○水積。大戟。甘遂。芫花。芫花。酒積。乾葛。神麴。砂仁。荳蔻。黃連。乾姜。甘遂。牽牛。

○茶積。姜黃。茱萸。椒。姜。癖積。三稜。蓬朮。巴豆。大黃。

○肉積。山查。阿魏。硝石。蟲積。雄黃。錫灰。檳榔。雷丸。蕪荑。使君子。

○鶴蟲。瘡積。桃仁。鼈甲。草果。腸覃。瘰肉。其始生也。大如雞卵。稍益大。

至其成。如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。

○石瘕。生於胸中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。衄以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。此其候也。

○奔豚病。從少腹起。上衝咽喉。發作欲死。復還止。皆從驚恐得之。奔豚湯主之。

○癖者。僻也。內結於隱僻。外不得見者。脈來細而附骨者積也。積脈堅強者生。

虛弱者死。沉而有力為積。沉緊為寒積。脈弦而牢積聚。弦而伏者。腹中有瘕。不可轉也。不治。小沉而實者。胃中有積聚。不下食。食即吐。

脈沉重而中散者。因寒食成瘕。脈左轉而沉重者。氣瘕結在胸中。右轉出不至寸口者。內有肉瘕也。

秘傳莪朮丸附方

馬鞭草 散管莖 莪朮 各等

山椒 少許

右水煎服

貼方 急救易方

大黃

朴硝各一兩

為末。用大蒜。研膏和勻。貼患處。以帛縛定。外以熱物擊之。乾則易之。

秘方磨積圓。倭方。治小兒一切疳虫。食傷。吐瀉痢疾。

沉香

丁子

小人參和產火焙

木香

黃連生

莪朮煨

黃蘗生。香。色。黑。炒。各一兩。

右為丸。或煉蜜

積聚奇方

秦皮一味

右煎服。必成虫出下。○愚曰。熱積尤可用之。大寒茶也。

傷飲食

傷食之證。胸膈痞悶。吐逆噯酸。噫敗卵臭。畏食。頭痛。發熱。惡寒。但氣口脈大於人迎。身不痛耳。宜豁痰運脾。二陳。加枳朮。麴蘗。山查。香附之類。挾氣脈沉。加木香。青皮。

平胃散 治胃中宿食不化。藜藿人宜之。

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草各三兩

生姜三片。水煎溫服。

○停食感冒。芎藭散。加消導茶一二味。食滯中宮。胸膈痞悶。噯氣發熱。頭痛。有類外感。藿香正氣散。若七八日不大便。口乾煩躁。臍上硬痛。枳實導滯丸。

枳實導滯湯 治傷溼熱之物。痞悶不安。

枳實炒三錢

白朮炒黑五錢

茯苓三錢

黃芩酒炒二錢

黃連姜汁炒三錢

沢瀉炒二錢

大黃酒蒸一兩

神麴炒四錢

生姜三片

水煎食遠服。

此枳朮丸。合三黃湯。而兼五苓散之製。以祛溼熱宿滯也。

木香化滯湯 治因憂氣。食溼麩。結於中脘。

發熱。腹皮底微痛。心下痞滿。不思飲食。食之不化。常常痞氣。

半夏

甘草

草豆蔻研各一錢

柴胡

木香

橘皮各六分

枳實炒

當歸各四分

紅花一分

生姜 五片

水煎食遠稍熱服。

保和丸

治積痞滿消瘦發熱。

山楂肉

姜汁泡二兩

半夏

姜汁炒

橘紅

炒

神麴

炒便血用紅麴

麥蘖

炒去殼

茯苓

各五錢

連翹

萊菔子

黃連

姜汁炒各五錢

為末水泛為丸。每服二錢。茶清送下。

按保和丸中。麥蘖傷腎。萊菔子傷胃之氣。恐

非丸劑所宜。久服之品。當易枳實。香附子。功

用不殊。○虛加白朮二兩。名大安丸。

○食滯心下。初起不可用驟苦寒。必兼辛

散。二陳。平胃消導之。及枳實。白朮。青皮。陳皮。

山檀。麴蘖之類。以食得寒則凝。得熱則腐也。

日久成積發熱者。加姜汁炒川連。連翹之屬。

清利之。若以成糟粕。日久生熱。燥結不行。方

可用承氣輩攻下之。如冷物停滯作吐。二陳

湯。加炮姜。白豆蔻。蒼朮。厚朴。神麴。藿香之類。

甚則廣茂。巴豆之屬。若冷食停畜。心腹暴痛

作脹。當用紅丸子。備急丸。溫下之。痰飲結聚。

穀不得入。冷痰宿食。在上脘者。用白散湧吐

之痰食已消。中焦未和。不思飲食。或吐。或瀉。

倦怠面黃。按之心下飲。脾胃受傷也。六君子。

加木香。砂仁。燥渴。七味白朮散。

紅丸子

治宿食冷積作脹。

荊三稜

炒

蓬莪朮

煨

青皮

炒

陳皮

炒

乾姜

炮等

為末。陳酒麴糊丸。梧子大。礬紅為衣。每服三

五十九。食前沸湯下。小兒減量。

○老人虛人易於傷食。或彭脹痞悶。或腹

痛作瀉。當消補兼施。宜九味資生丸。見痞滿

常服之。若口淡思食。而見食不甘。食過則壓

兼惡。心胸膈不快。胃虛挾痰。飲也。六君子加

枳實。香砂。若不思飲食。食不尅。食後反飽。脾

虛不能健運也。枳實理中丸。

○病後飲食不調。中脘隱隱作痛。有時得

食則已。有時得食轉加。此胃中火燎作痛。得

食以壓其勢。故痛少安。若飲食稍過。氣不能

轉其食。故痛轉加。連理湯。加沉香。

○醉飽過度。或感風寒。或著氣惱。以致填

塞胸中。胃氣不行。忽然厥逆昏迷。口不能言。

肢不能舉。此名食厥。若誤作中風中氣治之必死。宜煎姜鹽湯探吐之。風寒者。藿香正氣散。氣滯八味順氣散。吐後別無他證。只以蒼朮。白朮。陳皮。厚朴之類調之。如遇此卒暴之病。必須審問明白。或方食醉飽。或飲食過傷。但覺胸膈痞悶。痰涎壅塞。氣口脈緊盛者。宜作食滯治之。

○傷諸肉食。用草菓。山查。挾外風寒。山查須用姜汁炒。黑則不酸。寒收斂。兼能破血和傷。消導食積。更速。

○傷麪食。炒萊菔根子。傷麪筋。搜子等物。諸菜不能消化。俱用本物。拌綠礬。燒灰。砂糖酒下二三服効。

○傷糯米粉。食炒酒菜。或酒麪。砂糖調淡姜湯服。

○傷索麪。用杏仁炒黑。研如脂。砂糖拌。姜湯服。

○傷生冷果菜。宜木香。砂仁。炮姜。肉桂。○傷蟹腹痛者。丁香。紫蘓。生姜。

○傷蛋滿悶。姜汁。蒜泥。

○傷肉生魚膾。必用生姜。草果。炮黑山檀。積久生熱。口乾噫氣。炒川連。及消導茶。

○傷酒。葛花解醒湯。或五苓散。加人參。草豆蔻。傷酒食積。發熱者。麪藥丸。腹滿虛脹。合燭氣丸。不應。神保丸。酒癥丸。並加酒炒黃連。胃氣虛者。上法俱不可用。惟獨參湯。助其胃氣。立歟神驗。

葛花解醒湯 治傷酒。嘔吐胸痞。小便不利。

葛花 白豆蔻 砂仁炒各一錢

青皮炒 神麪炒 沢瀉

乾姜各五分 白木炒八分 人參

橘紅 茯苓 猪苓各四分

木香一分

水煎服。但得微汗。則酒溼去矣。

麪藥丸 治酒積成癖。腹脇滿痛。後便積沫。

神麪炒 麥蘖炒去壳 黃連半兩同巴豆七粒炒去巴豆

為末水泛為丸。梧子大。每服五十九。食前姜湯下。○酒積下白沫。加炮姜二錢。下鮮血。倍

黃連。下瘀血。加紅麪。

燭氣丸 治肝氣乘脾。腹脹。

燭氣丸 治肝氣乘脾。腹脹。

胡椒一兩

蝎尾

去毒滾醋泡去
鹽炒香半兩

神保丸 治心胸腹脇脹痛大便不通宿食不消。

煨氣丸加木香二錢五分巴豆霜二分半本方中胡椒用二錢五分蠟用全者七枚為末湯浸蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五丸空心姜湯醋湯沙糖湯任下。

酒癥丸

治酒癖腹痛下積沫遇酒即吐

蠟梢

不去毒
十五枚

雄黃

油煎
皂大

巴豆

十五粒
不去油

為末白麴二兩半滴水丸如豌豆大候稍乾入麩炒香每服二三丸溫酒下茶清亦可。

枳木丸

治脾不健運飲食不化。

枳實一兩

白木二兩

荷葉裹米燒飯為丸米湯下七八十九。

○脈氣口浮大。按之反濡者有宿食也。氣口脈緊寒食停滯胃中溫消而下之。氣口脈沉緊而細冷食傷脾溫補兼消之。兩手脈皆模糊不清此宿食結滯胃氣不行急下奪之。傷食脈有滑瀦之異脾虛不能鼓運胃虛不能熟腐故其脈不滑而瀦甚則模糊不清矣。

若人迎緊盛而氣口滑者停食感冒也。

治一切魚毒傷

藁吾

和名津波葉生搗汁或陰乾煎服。
或加平胃散等主方。

消菌毒

鹽阿志魚背鱗一味煎服或加平胃散。

傷香麪

枇杷葉湯加橙皮一錢。

消香麪飽食

虎甘草生汁單服一名獅子茸
和名香下

傷糯餅

不換金正氣散加神麪砂仁。

治一切魚毒

連錢草陰乾細末白湯送下生汁亦可也。

枇杷葉湯

治食傷大腹痛。

藿香

木香

莪朮

吳茱萸

各中

肉桂大

枇杷葉大

甘草少

右漬沸湯服。欲吐加比留母草。○此方類

方多皆見經驗方

一方 藿香大

益智

木香各中

主治服法同上。

治一切食傷。由津理葉燒存性。白湯送下。
加減平胃散 治食傷胃熱痰喘胸噎塞。

蒼朮

陳皮

厚朴各四

甘草

香附各三

縮砂二

神麴

葛根

枳實各三

石膏一

麥冬二

姜煎

不能食

病人脈緩。怠惰四肢重著。或大便泄者。此溼勝也。胃苓湯。

○病人脈弦。氣弱自汗。四肢發熱。或大便泄瀉。不食皮毛枯槁。髮脫。黃芪建中湯加減。

○病人脈滑。氣口盛於人迎。或滯滯不調。其人痞滿。嘔逆不食。此有宿食。保和丸。枳朮丸。消導之。

○病人脈虛。氣弱脾胃不和。或兼惡心不食。六君子湯。枳實理中湯選用。有痰用導痰湯。

○虛而有痰。用人參四兩。半夏一兩。姜汁浸一宿。曬乾為末。麩糊丸。食後生姜湯下。

○服補脾皆不效。授以二神丸服之。頓能進食。五更瀉尤宜。

○惡食有虛實之分。實則心下悶痛。惡食口苦。二陳加黃連。枳朮。虛則倦怠。色痿黃。心下軟。異功散。加砂仁。木香。有痰惡心。六君子加香砂。

○饑不欲食。此證有二。一屬胃中虛熱。六君子加姜汁炒附。連。一屬陰火乘胃。六味丸加赤桂。五味。○又熱病後。餘熱未盡。脈虛洪不實者。人參白虎湯。

○胃主出納。脾主運化。故不食。皆為中土受病。然胃之土。體陽而用陰。脾之土。體陰而用陽。胃實則痞滿氣脹。胃虛則飲食不甘。胃熱則饑不欲食。胃寒則脹滿不食。胃津不布。則口淡無味。胃中火盛。則消渴易饑。有痰則惡心嘔涎。脾虛則食後反飽。脾津不藏。則口甘畏食。脾挾肝熱。則吞酸吐酸。此皆中土受病也。至於腎藏陽虛。不能腐熟水穀。又當歸

重於命門。火為土母故也。

泄瀉

瀉水而腹不痛者溼也。升陽除溼湯。見溼或胃苓湯。

胃苓湯

治飲食停積。浮腫泄瀉。脈證俱實者。

平胃散。合五苓散。生料煎服。

平胃本。平胃氣墩阜。若因脾土之虛。不能消運。又須藉參苓。如養胃之類。然復有土衰。不能分利。而成腫脹。且氣壅不勝。參朮。難合理中者。乃合五苓。以健運水土。與正氣散。假蘇藿。以散客邪。兩不移易之定例也。

○飲食入胃。輒後便完穀者。氣虛也。香砂六君子。或枳實理中湯。

香砂

六君子湯。治氣虛。痰食。氣滯。

六君子湯。加木香。砂仁。烏梅。

○腹痛。瀉水腸鳴。痛一陳。瀉一陳者。火也。黃芩芍藥湯。

○痰留於肺。大腸不因。或時瀉。或時不瀉。或多或少者。痰也。脈必弦滑。其人神色不瘁。

二陳加蒼朮。木香。或探吐之。更佳也。

○腹痛甚而不瀉。瀉後痛減者。食積也。保和丸消導之。

○餐泄者。史記名迴風。水穀不化。溼兼風也。風邪于胃。木來賊土。清氣在下。升陽除溼湯。若飲食下噎。而輒出不留者。死。

○溼泄者。汚積粘垢。溼兼熱也。黃芩芍藥湯。加香連。

○驚溼者。中寒糟粕不化。色如鴨糞。所以澄徹清冷。小便清白。溼兼寒也。附子理中湯。

○洞泄者。即名濡泄。體重軟弱。瀉下多水。溼自盛也。胃苓湯。

○水液去多甚。而轉經血枯。故筋急也。升陽除溼湯。

四柱飲

治滑泄者。久下不能禁。溼勝氣脫。

人參 一兩

茯苓

附子 炮

木香 煨各五錢

右為細末。每服四錢。入生姜五片。大棗一枚。煎如稀糜。入鹽一字調服。

六柱飲

治滑脫不止。瀉利完穀。

四柱飲。加訶子。肉豆蔻減半。

○熱瀉糞色赤黃。彈響作痛。糞門焦痛。糞出穀道猶如湯。煩渴小便不利。五苓散瀉水多者。亦必用之。若去桂即不效。

○寒瀉腹脹泄注。食即嘔吐。理中湯。加升麻肉桂。訶子。

○食久窘迫。大便色白。腸鳴切痛。脈沉遲。身冷不渴。溲清。附子理中湯。加肉果。

○夏暑暴瀉如水。周身疼痛。汗出脈弱。少氣甚者。加吐。此名緊病。漿水散。

○盛暑逼於外。陰冷伏其中。非連理湯不可。氣虛而瀉。四君子湯。加升柴。肉果。訶子。

○傷食泄瀉。必噯氣如敗卵臭。保和丸。虛者。治中湯。加減。

○積滯泄瀉。腹必絞痛。方泄者是也。平胃散。加磨積茶。

○傷酒泄瀉。葛花解醒湯。

○痰瀉。則頭暈惡心。胸腹迷悶。或時瀉甚。或時不瀉。二陳湯。加海石。香附。星香。芩。連。姜。汁。調神麴糊丸服。

○早起泄瀉。或時有血。午後便結糞。能食。能飲。此是酒積作瀉。二陳湯。加炮姜。酒炒川連。紅麴。陳酒麴糊丸。烏梅湯。下有血去半夏。加麝少許。晨夕各一服。

○日間無事。將晡腹膨。一夜腸鳴。而不得寬泰。次早洞泄。此名頓瀉。是脾虛溼盛也。胃苓湯。加木香。

○氣泄。腸鳴失氣。胸膈痞悶。腹急而痛。瀉則腹下稍安。須臾又急。亦有腹急氣塞。而不通者。此由中脘停滯。氣不流轉。水穀不分所致。木香調氣散。見氣。

○水瀆入胃。名為溢飲。滑泄。渴能飲水。水下復泄。泄而大渴。茯苓甘草湯。五苓散。并灸大椎三五壯。立已。乃督脈之病也。

○泄而口渴。引飲小便短濇。此為津液內亡。錢氏白朮散。

○腎水不足之人患泄。或過服分利之劑。而渴者。加減八味丸。失治必小便不利。水腫脹滿等證。成矣。

○凡大便泄。服理中湯。小便不利。大便反

泄。不知氣化之故。本肺不傳化。以純熱之藥治之。是以轉泄。少服則不止。多服則愈熱。所以不分。五苓散。加人參。灸甘草。名春澤湯。

○瀉後腹熱。脈滑堅者屬實。當與消導。不應是食積發熱也。加香。連更不應。加大黃。微下之。

○瀉而經年不止者。屬寒積。備急丸。神効。○泄瀉惡心欲吐。或水土不伏。或感山嵐瘴氣而瀉。藿香正氣散。

○脾胃虛弱。內挾風冷。泄瀉注下。水穀不化。臍下疔痛。腹中雷鳴。乃積寒久利。腸滑不禁。木香散。若茶與食。入口即瀉下者。名直腸瀉。難治。本方加人參。白朮。用伏龍肝湯煎服。木香散。治虛寒滑泄不止。

甘草 乾姜各二兩 附子

丁香 木香 肉桂

藿香 訶子 赤脂各一兩

右為散。每服三錢。陳米湯下。世本無乾姜。多當歸。

○憂思大過。脾氣結而不能升舉。陷入下焦。而成泄瀉者。逍遙散。去歸。加升麻。木香。或

越鞠。枳朮。和服。不應。補中益氣湯。加木香。

○久瀉。穀道不合。或脫肛。乃元氣下陷。大腸不行。收令而然。補中益氣湯。加訶子。肉果。五味。烏梅肉。為丸。或四君子。加防風。升麻。

○老人道運不及。而膨脹作瀉。九味資生丸。加木香。善飲者。澤瀉。肉桂。

○凡瀉多因於溼。分利小水為上。若老人氣虛下陷。又宜風藥以勝之。如補中益氣。加羌防之類。或升陽除溼湯。升舉脾胃。所謂下者舉之。溼寒之勝。以風平之是也。大瀉氣脫而不知人。口眼俱閉。呼吸欲絕。急灸氣海穴。大進參附輩。溫補之。遲則不救。

○五更瀉。是腎虛。失其閉藏之職。其瀉每在五更。必洞泄二三次。八味丸。以補其陰。則腎中之水火既濟。而開闔之權得宜。又有用六味丸。加沉香。砂仁。以山茱末。打糊代蜜。為丸而愈者。有用六味丸。加遠志。益智。兼調脾胃而愈者。有用六味丸。七分。雜二神丸三分。服之而愈者。有用二神丸。加五味。山茱肉。桂。茴香。陳米。飲糊為丸服者。亦有屬酒積。食積。

者。蓋一日進取之物。至此時皆下大府。而急奔也。但食積之瀉。其腹必脹滿。瀉後則頓減。瀉下皆是稀糞。酒積瀉下都是稀沫。或有兼血積者。與腎瀉之純清水。液迴乎不同也。審係何積。即以何積治之。

○虛損嗽且泄。理中丸加五味子。以治下泄異功散。加細辛。以治上效。

○脈經云。脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入。是謂五虛。死其漿粥入胃。泄注止。則虛者活。泄而脈大者難治。大便赤辨。瀉泄脈小者。手足寒難已。瀉泄脈小手足溫者。易已。○脈經云。洩注。脈緩時小。結者生。浮大數者死。又洞泄。食不化。脈微小。留連者生。緊急者死。脈滑按之虛者。必下利。腎脈小甚為洞泄。脾脈小為泄瀉。○仲景云。下利十餘行。脈反實者。死。腹鳴而滿。四肢清。脫形泄甚。不及一時而死。下則泄瀉。上則吐痰。不已為上下俱脫。

附方

益中散 大人小兒俱治。妙方。

白朮

茯苓

陳皮各三錢

芍藥五錢

蓮葉二錢

乾姜一錢

右細末。白湯送下。

劉艸窓方治泄瀉如神

蒼朮炒三錢

陳皮去白

防風唐各一錢

右糊丸。如菉豆大。○久泄。加升麻六分。

痢

初起時便見膿血者。宜調氣和血。氣分茶必不可少。若但見白膿。宜調氣消積。不可用血茶引邪入於血分。必變膿血也。

○白痢初起。裏急後重。類欲登園。及去而所下無多。終起而腹中復急。皆溼熱凝滯所致。胃苓湯加木香。砂仁。

○血痢初起。腹痛逆迫。或脈數大。身有微熱者。先與小建中湯和之。有肉桂伐肝。和營。最捷。膿血稠粘。勢甚。不可遏者。黃芩。芍藥。延胡。木香。砂仁。腹痛少加肉桂。以和之。血積稠厚。可用黃連。若畧見少血。或稀痰者。不可便用苦寒。戕犯胃氣。為害不淺也。

○凡血色紫黯。屢服涼藥。而所下愈多。作冷痢治。故血色如猪肝。如紫草。如莧菜汁。非炮姜不治。理中湯去參。加肉桂。木香。肉果。烏梅。

○純下血。而血色鮮濃厚者。此心脾伏熱也。大黃黃連瀉心湯。有食積者。枳木丸。加厚朴。黃連。木香。延胡索。赤痢初起。宜延胡散。散血積。小兒八歲。以內者。作食積治。

○風入腸胃。純下清血。或溼毒下血。胃風湯。加枳殼。荊防。

○風入腸胃。下痢青綠雜色。神木湯。

○下痢腹痛異常。脈沉而緊。無熱證者。先以姜桂之類。溫之。後理積滯。

○裏急。致圍。反不能即出者。氣滯也。疏通為主。重則小承氣。輕則黃芩芍藥湯。

○裏急。頻見汚衣者。氣脫也。補中益氣湯。去當歸。加木香。

○溼熱。下利後重。升陽除溼湯。

○虛滑而後重者。圍後不減。以得解愈。虛故也。養藏湯。

養藏湯 治泄痢膿血。有如魚腦。後重脫肛。臍

腹痛。

人參

白朮煨焦各半

肉桂

訶子

木香

肉豆蔻

罌粟殼蜜炙五分

右七味水煎。分二次。忌生冷魚腥。溼麪。油膩

等物。夜起不寢者。加附子五分。不應加一錢

○白痢初起。但腹痛後重。不能食。小便却

清利者。為虛寒。二陳湯加炮姜。焦朮。厚朴。木

香。砂仁。能滌除痰積。宜加用之。

○後重本因邪。壓大腸墜下。是以用大黃

輩。此實也。若久痢後重不除。此脾氣下陷之

故。宜升柴以升提之。檳榔。枳殼。皆當禁用。

○若肺氣鬱在大腸。腹痛後墜。理氣藥中。

須加桔梗。以開之。亦有積已去。而過食厚味。

生冷。後後重者。健脾兼消導為主。

○痢如膠凍。或如鼻涕。或魚腦。此為冷痢。

先用木香。焦朮。豆蔻。砂仁。厚朴。次用理中湯。

加木香。更加訶子。粟殼。

○下痢脈遲緊。腹痛未欲止。當溫消之。枳

實理中湯

○下痢清白。手足厥冷。腹痛不止。附子理中湯。

○積久冷痢。少腹痠痛。結滯不爽。及下久連年不止。千金溫脾湯。冷痢。去甘草。加桂心。倍香附。人參。熱痢。去桂心。加大黃一錢。姜。附。人參。各減一錢。

溫脾湯

治積久熱痢。赤白。

大黃四錢 人參 甘草

炮姜各二錢 熟附子一錢

右五味水煎溫服。○冷痢。去甘艸。加桂心三錢。倍人參。姜。附。減大黃一錢。

○久痢不瘥。雖所下漸減。而津血枯槁。肛門澇滯者。千金羊脂煎。潤之。羊脂本經。專主下利。脫肛。腹中絞痛。而世罕知用。惜哉。○暴下積日久不止。附子湯。

附子湯 治暴下積日久不止。

熟附子 阿膠各三錢 酸石榴皮一枚

龍骨煨過水吞 甘艸炙 烏茶炒各一錢

炮姜六分 黃連姜汁炒黑 黃芩各七分

右九味。加粳米一撮。水煎分溫三服。

○久痢虛冷滑脫。脈細皮寒。少氣畏食。不能言。或時發虛熱者。附子理中湯。加肉桂。肉果。訶子。

○下痢臍下攪痛。桃花丸。下痢。久脫虛冷。白帶。大桃花湯。熱痢。二三年不止者。厚朴湯。久痢所食之物。皆不化。四肢沉重。肌肉消盡。椒艾丸。

桃花圓 治冷痢臍下攪痛。

乾姜 赤石脂煨等分

右二味。蜜丸。豌豆大。服十九。日三服。加至二十九。

大桃花湯

治下痢久脫虛冷。白帶。腹痛。

赤石脂 乾姜 當歸

龍骨煨 牡蠣煨各六錢 附子炮四錢

芍藥炒 白朮 人參各三錢

甘艸炙二錢

右十味水煎分三服。○膿稠。加厚朴。嘔。加橘皮。

厚朴湯

治二三年熱痢不止。

厚朴

乾姜

阿膠

各四

黃連 六錢

石榴皮

艾葉

各五

右六味。水煎日再服

椒艾丸

治久痢完穀不化肌肉消盡

蜀椒 三百粒

烏梅 二百箇

熟艾 一觔

乾姜 三百

赤石脂 煨 二百兩

右五味。椒姜艾下篩。入石脂淨末。梅著米下蒸熟。去核。合搗蜜和丸。梧子大。服十九。日三服。不應加至二十九。不瘥。加黃連。

倉廩湯

治下痢發熱。自汗脈弦者。是伏邪所發。法當從表解散。倉廩湯。有一方。長幼相染者。謂之時疫痢。

人參敗毒散。加陳蒼米一撮

○一種陰虛痢疾。切戒攻積之藥。凡見痢下。五色膿血稠粘。滑泄無度。發熱煩渴。臍下急痛。至夜轉劇。而惡食。或下鮮血者。便屬陰虛。急宜救熱存陰為主。如駐車丸。阿膠丸。歸連丸。阿膠梅連丸。千金黃連湯。黃連阿膠湯。白頭翁加甘草阿膠湯等方。選用。

駐車丸

治陰虛下痢。發熱膿血稠粘。及

休息痢。

阿膠 三兩

黃連 炒黑

當歸 各兩半

右四味。搗篩。醋煮阿膠。為丸。梧子大。每服四五十丸。晝夜三服。米飲下。

阿膠丸

治冷熱不調。傷犯三陰。腹痛下膿血

阿膠

黃連 炒黑 各二兩

當歸

乾姜 炮 各一兩

木香

黃芩

赤石脂 醋 煨 水 各一兩

龍骨 醋 煨 水 各一兩

右為末。米飲丸。梧子大。每服三十九。晝二。夜一服。米飲下。

歸連丸

治陰虛下痢。五色及孕婦。噤口赤痢。

阿膠 二兩

黃連 炒黑

當歸 各一兩

黃芩

黃蘗 炒黑 各半兩

蘄艾 半兩

右內除膠艾。為細末。以醋二升。煮艾至一升。去滓。入膠烱化。為丸。菉豆大。每服六七十丸。晝夜三服。米飲下。

阿膠梅連丸

治陰虛下痢。五色至夜發熱。

阿膠

黃連 各三兩

當歸 一兩五錢

炮姜 一兩

黃蘗 炒黑

赤芍

赤茯苓

烏梅 炒 枯 各一兩五錢

醋煮阿膠為丸。梧子大。每服三五十九。晝夜三服。米飲下。

黃連湯

治赤白痢。

阿膠 三錢

黃連

當歸 各錢半

炮姜

黃蘗 炒黑

甘艸 各錢一

石榴 錢半

右除阿膠。水煎去滓。內膠烱化。溫分三服。

黃連阿膠湯 見傷寒

○下痢。至夜發熱。煩渴引飲。為津液受傷。內水虧損。燎原之火。自焚。不得不引外水以濟急。切不可用香燥之藥。錢氏白朮散。加烏梅。

○下痢失氣者。當利小便。陰氣前通。則陽氣自化矣。五苓散。加木香。利仍不止。以訶子。厚朴。橘皮等分。丸服。

○下痢大孔痛。宜溫之。黃耆建中湯。加木香。當歸。

○痢後大便秘澀。裏急後重。數至圜而不能便。或必有白膿。此為氣虛下陷。慎勿利之。但舉其陽。則陰自降矣。補中益氣湯。加防風。

○下痢後。裏急後重不除。風邪傷衛。衛氣不行也。非三奇散不愈。

三奇散

治痢後下重。

枳殼 生一兩

黃耆 二兩

防風 一兩

為散。每服二錢。米飲調服。

○盡注毒痢。血如雞肝。心煩腹痛者。茜根丸。虛人理中湯。加黃連。烏梅。不應。用烏梅丸。見喪。

茜根丸

茜根

升麻

犀角

地榆

當歸

黃連

枳殼

白芍 等分

為細末。醋煮紅麴丸。梧子大。空心米飲。下七十九。

○下痢遍身浮腫。五苓散。用生朮。肉桂。加升柴。

○痢後虛浮。六君子。加木香。肉桂。

○初痢膿血稠粘。勢甚。宜下者。一味大黃。酒蒸為丸。赤多用溫酒。下百丸。白多用淡姜湯。下七十九。以奪其勢。然後調理則愈。

○冷熱不調。下痢赤白。兼冷食積者。連

理湯。加枳實。砂仁。

○下痢乾嘔者。胃虛而寒熱錯雜也。外其室

黃芩湯。

黃芩湯

治乾嘔下痢。

黃芩

人參

乾姜 各一兩

桂枝 三錢

大棗 十二枚

半夏 二兩

右六味。以水七升。煎取三升。溫分三服。

戊巳丸

治先煎白痢。後變膿血者。及溼熱泄

痢腹痛不止。

佐金丸。加白芍六兩。神麩粉丸。空心米湯。

砂仁湯。蘄艾湯任下。

○先煎白痢。後變鮮血者。四物湯。去地黃。加

炮姜。灸甘草。木香。

○先煎膿血。後變赤白青黑。腹痛倍常者。

駐車丸。

○先煎膿血。後變白沫白膿者。補中益氣。

加炮姜。赤石脂。

○下痢日百度。精神委頓。及不痛者。此邪

氣勝正氣。微不能鼓激也。難治。

○有患痢。晝夜不及數度。而反發熱。心下痞

悶。不能食。而嘔。其有晝夜不止百度。反脈靜

身涼。而能食。何也。曰痢之邪。客於下焦。由橫

連竟傳大腸。原無反熱之理。以中焦無病。雖

下痢無度。不礙飲食。惟邪發於中焦。由橫連

入胃。以胃受病。自不欲食也。

○九風寒。傷於營衛之中。則為瘧。飲食傷

於腸胃之內。則為痢。而世有瘧後痢。痢後瘧

者。此則表氣不固。邪氣內犯而致也。若瘧邪

發泄已盡。必無復為痢疾。皆由元氣下陷。脾

氣不能升舉。故風寒暑溼。得以襲入。而為痢。

又有痢後似瘧。非瘧乃陰陽兩虛。陽虛則惡

寒。陰虛則發熱。故寒熱交戰似瘧也。又有瘧

痢齊發。瘧止而痢甚者。皆是脾胃之氣虛陷

所致。宜先與黃耆建中。加木香厚朴之類。

次與補中益氣。加姜桂。若服後痢減。而瘧作。

此陽氣得補。而與陰爭也。再與補中益氣。少

加桂。附。助陽祛陰。則愈。

○凡久痢。年高。人。與產後病後諸瘡。疔。及瀉

後作痢。慎不可用攻伐之劑。急宜醒脾崇土。

補中益氣。加炮姜。木香。有血。加烏梅。芍藥。

○下痢六七日。經盡。當有結糞。若至十三日再經。結糞不出者。此胃氣告匱也。慎不可更與攻剋之劑。惟培養正氣。庶有生機。

○下痢以胃氣為本。胃失生長。故惡物而不欲食。但得思食。無分何物。與之遂獲愈者。此胃氣勝故也。

○凡痢下。如魚腦。或如猪肝。皆半死半生。下如塵腐色。大孔開。如竹筒不收者。或如屋漏水。或純下鮮血。及如赤豆汁。唇如硃紅者。皆不可治。

○痢不納食。俗名禁口。如因邪留胃中。胃氣伏而不宣。脾氣因而滯滯者。香連枳朴茯苓之屬。

○熱毒衝心。頭疼心煩。嘔而不食。手足溫緩者。甘草瀉心湯。見傷寒去大棗。易生薑。此證胃口有熱。不可用溫茶。

○如陽氣不足。宿食未消。噫而不食。枳實理中湯。加砂仁。陳皮。木香。豆蔻。或山查。麴蘖之類。

○肝乘脾者。戊己丸。加木香。肉桂。

緩字
疑暖字
之誤

○有水飲停聚者。心下必悸動不寧。五苓散。加姜汁。

○有炎氣衝者。黃連解毒湯。去黃蘗。加枳殼。木香。

○有胃虛挾熱。而嘔逆者。連理湯。

○有積穢太甚。惡氣薰蒸者。大黃黃連瀉心湯。加木香。

○一方。以藕汁煮熟。加糖霜。頗服。兼進多年陳米糜。調其胃氣必效。此即石蓮之意也。

○休息痢。此證多因飢滯大早。積熱未盡。加以調攝失宜。不能節食戒慾。所以時止時作。補中益氣。加肉果。木香。吞駐車丸。亦有陰虛多火。不能勝任升柴。木香。白朮。者。只用駐車丸。加人參。肉桂。烏梅之類。有積。可加枳實。

炮黑查肉。有服。補中益氣散。服不應。反下鮮紫血塊者。此久風成殞泄。風氣通於肝。肝傷不能藏血也。三奇湯。倍防風。加菴葛。升柴。其一切利水。破氣茶。皆為切禁。

○燒蟲痢。其證腹大。皮膚黃粗。循循戚戚。然得之於塞溼之氣。菴葛不發。化為蟲。此九

蟲之一。其形極細。胃弱腸虛。則蟻蟲乘之。或
養或從穀道中溢出。倉公以芫花一撮主之。
烏梅丸。黃連犀角散。亦主之。然蟲盡之後。即
用六君子。加犀角。黃連。烏梅肉。丸服以補脾
胃。兼清溼熱。庶不再發。若一味攻蟲。愈攻愈
盛。漫無止期。

○痢後風。因痢後不善調攝。或多行。或房
勞。或感風寒。或受溼氣。致兩脚痿軟腫痛。用
大防風湯。

大防風湯 治邪襲足三陰。腿膝疼痛。及痢後
脛膝痛。鶴膝風。附骨疽證。但赤熱焮腫者。禁
用。

四君子湯。去茯苓。加當歸。附子。黃耆。牛膝。
杜仲。熟地。白芍。川芎。羌活。右姜棗水煎。

○痢後變成痛風。皆調攝失宜所致。補中
益氣。加羌活。續斷。虎骨。

○痢後呃噦。此乃胃氣虛寒之極。最為惡
候。急宜橘皮乾姜湯主之。

○下痢而渴。誤食冷物水果。而噦者。理中
湯。加丁香十五粒。枳蒂五枚。水煎熱服。兼寒

橘皮湯
各三錢
多一錢
石六味
水煎

熱往來者。小柴胡加丁香。血痢嘔噦。而渴。心
煩不得眠。小便不通者。猪苓湯。白痢嘔噦。用
五苓散。以中有肉桂。可通逆氣也。

○脈 下痢。白沫初起。脈小滑。能食者易治。
洪大急疾。四肢厥冷者難治。久痢脈微弱小
細者即愈。數實。或大無根者危。下痢膿血。初
起脈小滑。或弦軟。身不熱者易治。數實滑太。
而身熱者勢雖甚。猶或可治。若先不熱。五六
日後反發熱。脈大者必死。久則宜訖。遲虛細。
不宜數。盛滑實。或身熱不止。口噤不食者皆
死。久痢脈結代。反驟能食。為除中者必死。大
抵下利之脈。初起雖實大。不妨。六七日後。最
忌強盛。凡下利脈浮。身熱作風治。脈沈身重。
作溼治。下利為腸胃病。雖頻逆而能食則吉。
若噤口痢。初起脈數實可治。久利而反不能
食。脈見有餘者死。惟小弱流痢者。當作胃虛
治之。

○胃中先傷冷物。以致胃寒。不能遊溢精
氣。上輸於脾。脾即不能散精。以上歸於肺。則
津液留滯於胃。即為胃家積。其證嘔逆。惡心。

其狀色如桃膠。而不臭。右關脈沉細。而緊。宜厚朴。木香。乾姜。肉桂。吳茱萸。虛人可用附子。理中湯。非大小腸積可比也。

○痢色黑者。分為二種。如焦黑之黑者。熱極反兼勝已之化也。黃芩芍藥湯。下香連丸。如漆黑之光者。此瘀血凝久而然也。桃核承氣湯。

香連丸

治下痢赤白相兼。白多於赤者。

佐金丸如法製過。去吳茱萸。加木香一兩。醋糊丸。每服五十九。米湯砂仁湯任下。

附方

和中湯

芍藥大

厚朴

枳殼

青皮

藿香各半

砂仁

木香

乾姜各半

甘草少

水煎。○熱去則減芍藥。後重止則去枳殼。虛加參朮。或加肉桂。臨病進退之。

○痢有用小柴胡湯。鼻中黑者。宜之。

○外感甚。則用敗毒散。頭痛甚外感也。頭痛腹痛俱甚者。加青皮。又腹痛愈。又發。休止。

久不愈諸藥無效。敗毒散加青皮。

治疫痢一方

香薷散。加木槿葉。陰乾三分。

治禁口利

用王瓜藤。連莖葉。經霜者。曬乾燒存性。出火毒。用香油調臍中。即効。

牛扁丸倭方

治一切痢疾甚妙。

牛扁和名ケンシセウコ一名野カヘリ也云

右黑霜糊丸。菜豆大。每服二十圓。以白湯送下。

赤白雞身丸

治赤白痢

白雞冠花

赤雞冠花

身伊羅各等分

右糊丸。菜豆大。以丹為衣。每服五丸。白湯送下。

○下痢以澁藥止之。氣急浮腫者。敗毒散合承氣湯用之。小便通而愈。又以山萸生炒

黑三制。細末。以白湯送下。小便通而愈。治痢疾後重。窘迫甚腹痛。

白木二錢

芍藥

茯苓半錢

陳皮一錢

乾姜五分

延胡索五錢

甘艸一錢

右細末。白湯下

瘧

大法。先熱後寒者。柴胡桂枝湯。先寒後熱者。小柴胡湯。多熱但熱者。白虎加桂枝湯。多寒但寒者。柴胡桂姜湯。雖多寒但寒。脈洪實者。當作實治。不得便用桂姜。雖多熱但熱。脈虛軟者。當作虛治。不得便用白虎。寒多熱少。或飲食易饑。惡心吐痰。入參養胃湯。熱多寒少。口苦咽乾。小便赤澀。或傷食成瘧。清脾飲。勞役所傷。飲食失節。成瘧則虛弱自汗。補中益氣。加半夏。瘧疾自汗。日甚不能止。此表虛不能衛護也。人參實衛湯。加桂枝。

柴胡桂枝湯

治太陽少陽合病併病。

小柴胡湯。加桂枝芍藥。

人參實衛湯。治瘧自汗不止。

保元湯。加白朮芍藥。初發。加桂枝。久瘧。加

烏梅。

○風瘧。自感風而得。惡風。自汗煩躁。頭痛。

風陽邪也。故先熱後寒。宜半夏柴胡。羌活。紫

蘇。細辛。生姜。

○寒瘧。暑月乘涼。沐浴自感寒而得。無汗

惡寒。攣痛面慘。寒陰邪也。故先寒後熱。宜羌

活。紫蘇。桂枝。柴胡。草果。厚朴。

○暑瘧。亦名癘瘧。但熱不寒。裏實不泄。煩

渴而嘔。肌肉消燂。小柴胡。加香薷。黃連。竹葉

盛暑發者。白虎湯。虛者。加人參。秋冷後發者。

小柴胡湯。此肺素有熱。陰氣先絕。陽氣獨發。

故但寒不熱也。

○溫瘧。由冬受寒。非時之邪。伏藏骨髓之

中。至春夏溼熱氣蒸。而發。發則先熱後寒。或

但熱不寒。春用小柴胡。夏用白虎加桂枝。以

邪熱盛。故不惡寒。而便發熱。熱發於表之後。

正氣內虛。反微似畏寒之狀。非惡寒也。

○牝瘧。邪伏於腎。溼瘧。則久受陰溼。而邪

伏太陰。皆但寒不熱。宜蜀漆散。邪伏血分。

多寒少熱。慘慘振振。柴胡桂姜湯。

○勞瘧。大渴。柴胡去半夏加栝蒌湯。

○汗出溼浴。身體重痛。肢節煩疼。寒熱而嘔

逆者。亦屬溼瘧。胃苓湯。加羌活。柴蘇。

○食瘧。因飲食不節。中脘生痰。加以風氣

乘之。故善饑而不能食。食而支滿。腹大善嘔。實者。二陳。加枳殼。草果。

○因饑飽勞役。而發日久不止。脈虛者。理中湯。加枳實。青皮。

○素有陰虛勞嗽。或因瘧成勞。但於調理本茶中。稍加桂枝。姜棗。可也。不可純用祛風。豁痰茶。若表邪勢盛。可用小建中。黃耆建中。為主。後與生料六味丸。加桂枝。鼈甲。

○凡瘧發於午前。是陽分受病。易愈。發於午後。陰分受病。難愈。瘧發日晏。為邪氣下陷於陰分。必用升。柴。發其邪。仍從陽分而發。補中益氣湯。加桂枝。瘧發日發。為邪氣上越於陽分。宜因勢利導之。小柴胡。加枳。桔。

○夜瘧。俗名鬼瘧。此邪入血分。宜升散血脈之邪。千金內補建中。加升。柴。生首烏。脾胃素虛人。補中益氣。加首烏。桂枝。芍藥。內補建中湯。見產後。

○瘴瘧。山嵐溪澗之毒。須用祛瘴。滌痰之茶。為主。夏秋之間。浴門闔境。皆是也。其證

壯熱多汗。而渴。宜達原飲。時疫

○煩熱大渴。有表證。桂枝白虎湯。

○識妄狂悶。涼膈散加草果寒熱便秘。大柴胡湯。

○虛人發散後。熱不止。人參敗毒散。

○有勞證似瘧者。寒熱與瘧無異。但口苦。嘔吐清水。或苦水。面青。脇痛耳鳴。脈瀼。逍遙散。倍柴胡。加吳茱萸。川連。

○痢後發瘧。邪從少陽。循經外泄也。小柴胡。去黃芩。加桂枝。或補中益氣。倍升。柴。升散則愈。

○瘧後不喜食。四肢倦怠。面色痿黃。六君子。加山查。黃連。枳實。

○久瘧不止。元氣虛弱者。用人參。常山各五錢。剉碎。微火同炒。去常山。只以人參煎湯。未發前服。屢驗。

○瘧發四五遍後。曾經發散者。何首烏散。壯實者。可用七寶飲。至夜熱不止。而脈實。邪盛者。此邪干血分也。常山飲。截之。

何首烏散 治瘧積滯去後。寒熱不止。至夜尤

甚。

生何首烏碎五錢

青皮

陳皮

甘草炙各一錢

生姜七片

大棗三枚

水煎。露一宿。侵晨熱服。○多汗而渴。加知母。

烏梅。○虛人腹痛。加人參。厚朴。木香。

七寶飲 治一切實瘡。服調理藥。

厚朴

常山醋炒

檳榔

陳皮

青皮

草果各一錢

甘草炙七分

生姜七片

水酒各半煎。露一宿。侵晨熱服。一方多半夏一錢。大棗一枚。

常山飲 治瘡發晡時。至夜熱不止。脈實邪盛者。

常山醋炒

檳榔

青皮炒

甘艸

當歸各一錢

穿山甲煨八分。世本作木通。

黑豆四十粒

生姜七片

水酒各半煎。露一宿。侵晨熱服。

○形盛氣虛人。多溼痰發。則多惡寒。日久

不已。脈軟而沈滯滑。用補中益氣。加芩。半。兼

用熟附子。二三分。

○瘡發已久。遍治無功。度無外邪。亦無內

滯。惟人參一兩。生姜一兩。加桂枝少許。冬月

無汗。稍加麻黃。發前五更時。溫服。取微汗。必

止。甚者連進三日。無不愈者。愈後亦易康復。

此方不特虛人久瘡。治三日瘡更宜。夜發則

加當歸。首烏。然發嚴冬之時。有屢用此方。及

補中益氣不効者。必待仲春。仍用前藥。加桂

枝。汗之即愈。

○瘡三日一發。初起發於夏秋者。宜用二

陳。去橘皮。加生朮。檳榔。常山。逐去痰癖為先。

稍加穿山甲。以透經絡。至於暑結營分。又當

以香薷。鼈甲。茯苓。半夏。甘草。當歸。生姜。大棗

祛暑為要。而前藥為無益也。若元氣大虛。祇

用補正。宜六君。加草果。烏梅。名四獸飲。兼本

經引使茶。若元氣下陷。日發漸晏者。補中益

氣湯。大劑參。朮。姜。棗。為治。如常山。檳榔。山甲。

草果。皆為戈戟矣。

四獸飲 治瘡疾。胃虛中。挾痰食。

四君子湯。加半夏。橘皮。草果。生姜。烏梅肉

水煎。清晨熱服。

○瘡母者。頑痰死血。食而結為癥瘕。鼈甲

煎丸。或小柴胡。加鼈甲。蓬朮。桃仁。俱用醋製

其鼈甲用栗灰湯煮糜爛入棗尤効。病氣俱實。癰母丸。虛人久癰時止時發。芎歸鼈甲飲。不應脾虛也。急用補中益氣。加鼈甲。少食痰悶胃虛也。四獸飲。加鼈甲。當歸。蓬朮。肉桂。虛人癰母。必用補益。蓋緣治之失宜。邪伏肝經。而脇下有塊。仍寒熱時作。不可以癰積治之。每見急於攻塊者。多致不救。

鼈甲煎丸 見國字類聚方

癰母丸 治癰痞結於左脇硬痛。

青皮 神麴

麥芽 各一兩四味俱炒 鼈甲 三稜

蓬朮 即蛤粉各五錢 海粉 即蛤粉各五錢 香附 二兩五味俱醋煮

紅花 三錢

神麴糊丸 梧子大。每服七十九。空心滾湯下。

芎歸鼈甲飲 治勞癰久不止。或暫止復來。

四物湯。去地黃。加茯苓。半夏。橘皮。鼈甲。烏梅。寒多。加草果。熱多。加柴胡。胃虛。以食加

人參。白朮。汗多。加黃耆。甘草。 一方。多青皮。

○久癰不愈。必有滯滯。須鼈甲消之。如無

滯滯。只宜補益。

○癰脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之。瘥。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

附方

補中益氣湯 癰五三發後用此方截。

寒多者。加炮姜。如參芪之數。熱多者。用帶皮生薑。如數。仍加青皮。檳榔。草果。烏梅。如其人無積滯者。只加半夏。黃芩。

一方 五八霜燒。存性糊丸。凡發日之晨。冷水送下。

○癰母。在左股便毒處。而狀細長。青皮能治之。

○凡食啖生冷。鹹藏魚肉。肥膩。中脘生痰。皆為食癰。其狀若飢。而不能食。食則中脘嘔逆。腹痛。

七味清脾湯 治脾癰。并因癰。而垂攻心胸。

厚朴 烏梅 半夏 青皮

良姜 各二錢 草果 一錢 甘草 五分

右入姜棗煎。未發前併三服。○癰欲發時有

差上胸。是當虫。先用九味清脾湯。退熱而後。七味清脾湯。加檳榔。可服發日五更。必有奇效云。

關前驅邪湯

桂枝三錢 乾姜一錢 蒼朮一錢半 半夏一錢
附子七分 甘草

生姜煎服。○膈腸衝逆。加枳榔一錢。○小便短少。加茯苓。倍桂枝。○大便不鞭。加白朮。砂仁。肉蔻。各一錢。○寒去。熱獨發者。腎水虛。脾陰弱。加鼈甲。知母。

醫門法律二木柴胡湯

白朮 蒼朮 柴胡
葛根 陳皮 甘草

姜煎。○表邪甚。加紫蘇。藿香。○熱多。寒少。加黃芩。芍藥。○寒多。熱少。加桂枝。乾姜。○痞滿。加枳實。厚朴。○小水短少。加茯苓。○嘔噦。加藿香。砂仁。半夏。○熱甚。頭痛。加川芎。乾石膏。○口渴。加石膏。知母。麥門冬。○有食積。加神麩。○麥芽。枳實。各一錢。黃連五分。○痰盛。加半夏。南星。枳實。各一錢。黃連。黃芩。各六分。

四物苦練柴胡附子湯

治瘧腰痛甚者。四物湯。加苦棟皮。柴胡。附子。

人參截瘧飲

治再發。

四君子湯。加厚朴。當歸。青皮。黃芩。知母。草果。常山。鼈甲。柴胡。烏梅。桂枝。

九味清脾湯

加檳榔。良姜。知母。酒肉桂。右生姜水煎。一宿露用之。此世間謂。越後州病瘧者多。故言越後瘧。以此方截之。即効。愚云。此方兼積者。每々有經驗。○凡健者瘧。發午時。大熱之證。是陽明胃經瘧也。雖用何劑。難截也。

主方

柴胡 黃芩 半夏 甘草是小柴胡也

檳榔 厚朴 白朮 烏梅

草菓以上五味。瘧湯之意也。 藜朮 蒼朮以上四味。大陽勝於經也。 蒼朮 蒼朮 蒼朮

防風 赤茯苓 木通以上四味。海瀝。 猪苓

山梔心熱 黃連脾熱 石膏胃熱 枳殼

枳實 青皮浮肝經濕。若世者可去之。但得水也。此口傳。

右二十三味水煎。○服法。自發日朝。到午前。

服三貼許。截後不可用人參養胃湯之類。用之則必再發也。唯可用此方。弥截後去石膏。枳實。黃連之類。可用之。調理者以平胃散。不換金等可進食矣。

黃瘧

色如橘子黃。身不痛。乃瘧病也。色如熏黃。一身盡痛。乃溼病也。

○瘧分為五。黃汗。黃瘧。穀瘧。酒瘧。女勞瘧。

○黃汗者。其證兩脛自冷。從腰已上必汗出。下無汗。腰體弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此為黃汗。宜黃耆桂枝五物湯。見痺。晝熱加防風。夜熱加當歸。食少加白朮。茯苓。

○黃瘧。有乾。有溼。乾者肺燥也。小便不利。四肢沉重。渴而引飲。梔子蘘皮湯。見傷寒。溼黃者。脾溼也。小便不利。四肢沉重。似渴不欲飲者。麻黃連軀赤小豆湯。見傷寒。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯。見溼。渴者茵陳五苓散。

○穀瘧者。食畢即頭眩。心中怫鬱不安。遍身發黃是也。小柴胡湯。去參加白朮。炮姜。膽草。枳實。二便秘者。茵陳蒿湯。胃瘧。食已如饑。胃熱消穀。面黃瘦。胸滿。脇脹。小便秘赤。補中益氣。加豬膽汁。炒川連。酒黃蘗。沃瀉。

○酒瘧者。身目發黃。腹如水狀。心下懊懣。而熱不能食。時時欲吐。足脛腫。小便黃。面發赤斑。此因饑中飲酒。大醉當風入水所致。梔子大黃湯。酒瘧下之。久久為黑瘧者。前方去大黃。合犀角。地黃。不應。去地黃。加桂心。桃仁。穿山甲。

梔子大黃湯 治酒瘧。心中懊懣。或熱痛。

梔子豉湯。加枳實。大黃。

○色瘧者。身黃。額上微黑。小便利。大便黑。此因房事過傷。血畜小腸發黃。故小腹連腰下痛。大黃附子湯。去細辛。加肉桂。若神思困倦。頭目昏重。脾氣不運。大便不實者。四君子湯。下硝石礬石丸。

○陰黃者。厥冷脈沉。或服寒涼過多。變為陰黃。因過食寒物。而成四肢皮膚皆冷。心下

痞鞭。眼濇不欲開。自利倦臥。茵陳附子乾姜湯。或茵陳四逆湯。加白朮。冷食不化。腹中結痛。去甘艸。加枳實。白朮。草豆蔻。小便不利。加桂苓。沃瀉。

茵陳附子乾姜湯 治陰黃脈沉細。

四逆湯。去甘草。用熟附三錢。炮姜二錢。加白朮二錢。豆蔻。枳實。半夏。茯苓。沃瀉。橘紅。各八分。茵陳蒿一錢。生姜五片。

○有瘀血發黃。大便必黑。腹脇有塊。或脹脈沉。或弦。大便不利。脈稍實而不甚弱者。桃核兼氣湯。見傷寒。下盡黑物則退。

○食勞疳黃。俗名黃胖。夫黃瘰者暴病也。疳黃者宿疾也。至有久不愈者。溫中丸。棗礬丸。然此僅可治實人及田家力作之輩。若膏粱柔脆之人。未可輕試也。戴氏云。食積發黃。量其虛實。而下之。其餘但利小便。小便清利則黃自退。

○目黃而身不黃。煩渴引飲。越脾加朮湯。桂枝二越脾一湯。選用。

○脈沉渴。而欲飲水。小便不利者。皆發黃。脈

洪大。大便利而渴者死。脈微小。小便利不渴者生。九黃家。候其寸口。近掌無脈。口鼻氣冷。並不可治。瘰毒入腹。喘滿者危。九年壯氣實。脈滑便堅者易愈。年衰氣弱。脈虛濇。而便利者難痊。

呃逆

呃逆。有虛。有實。有火。有痰。有水氣。不可專作寒論。蓋傷寒。發汗吐下後。與瀉利日久。及大病後。婦人產後。有此證。皆屬脾胃大虛。若因痰水停積心下。或因暴怒。氣逆。痰厥。或傷寒熱病。火下。則皆屬熱也。夫水性潤下。火性炎上。今其氣自下衝上。非火而何。大抵治法。虛則補之。虛中須分寒熱。如因汗吐下後。誤服寒涼過多。當溫補之。如脾胃陰虛。火逆上衝。當平補之。挾熱當涼補之。若實者。如傷寒失下。地道不通。因而呃逆。當寒下之。如痰飲停高。或暴怒氣逆。痰厥。此等必形氣俱實。別無惡候。隨其邪之所在。涌之。洩之。清之。利之。○胃虛。木挾相火。直衝清道。而上者。異功散。

散加肉桂甚則加黃藥附子送六味丸。

○吐利後胃氣虛寒者理中湯加附子丁香柿蒂吐利後胃虛熱者橘皮竹茹湯吐見呃

呃逆嘔吐多者屬胃虛有痰半夏茯苓生薑

兼食結痰積則膈間飽悶枳木半夏生薑

○平人飲熱湯及椒姜即呃者此胃中有

寒痰死血也用韭汁童便下越鞠丸虛人用

理中湯加蓬朮桃仁痰加茯苓半夏蓋呃逆

皆寒熱錯亂二氣相搏使然故治亦多用寒

熱相兼之劑如丁香柿蒂並投之類試觀平

人冷呃令其思想則止思則脾火氣乘而胃

氣和

○呃逆雖多有厲火者然病後久虛發呃

皆屬於寒宜用半夏一兩生薑一兩水煎熱

服或用丁香數十粒滾水泡服或理中湯加

枳殼茯苓半夏不應加芩蒿丁香若胃中寒

甚呃逆不已或復嘔吐丁香煮散或附子粳

米湯見傷寒加炒川椒丁香

丁香煮散與局方不同治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香三七粒建蓮肉去心二粒上去滓

生姜七片

黃秫米半合

水一碗半煮熟去姜啜粥

○暴怒呃逆神昏吐涎此肝火逆上防有

血積膈間若按之痛者藕汁麻油服少頃即

探吐之不痛者陳皮二兩煎湯探吐之

○產後呃逆最為惡候急灸期門左穴艾

炷如小豆大宜服四逆加人參湯卷活附子

散或桂心五錢姜汁三合和水煎服

卷活附子散 治胃冷呃逆

附子半兩

乾姜二錢

卷活

茴香各半兩

木香一錢

每服二錢入鹽一字水煎微溫服

○呃逆雖有手足厥逆大便必堅定屬火

熱下之則愈其聲低怯而不能上達於咽喉

或時鄭聲雖無厥逆定屬虛寒苟非丁香附

子必無生理又有始熱終寒者始本熱邪因

過用苦寒寒鬱其熱遂至呃逆急宜連理湯

加姜半主之五六日大便不通者削薑姜導

之若真陽素虛人誤用苦寒通其大便必致

熱去寒起多成不救後有飲熱飲冷大便澹

黑者屬瘀血。若飲熱則安。飲冷則呃。雖有背惡寒。手足冷。大便溏等證。此屬溼痰肥人多。此須推瘀血痰飲例治之。

附方

一方

双豆燒存性。白湯送下。或生細末下

一方

柿實一味煎服。或加主方。勝於柿蒂。

一方

生白朮唐細朮一錢 辰砂水飛一匙

右剉甘子抄許。搽舌。

○呃逆甚。諸藥不効至。

半夏二三錢水煎。入姜汁服之。即半夏生薑湯

嘈雜 噉氣

嘈雜與吞酸一類。皆由肝氣不舒。木挾相火。乘其脾胃。則穀之精微不行。濁液攢聚。為痰為飲。其痰亦從木氣化酸。肝木搖動中土。故中土擾々不寧。而嘈雜如饑狀。每求食以自救。苟得少食。則嘈雜少止。則復作。蓋土虛不

禁木所搖也。故治法必當補脾運痰。土厚載物。則風木自安。不必用伐肝之劑。六君子湯為尊。茶火盛作酸。加吳茱萸。川黃連。若不開。當補土。務攻其痰。又久而虛。必變反胃。泄瀉。痞滿。眩暈等病矣。

○嘈雜 或食後腐化酸臭。心中煩雜者。

保和丸見傷食

○溼痰氣滯。不喜飲食者。保和丸二錢。越

鞠丸一錢和服。

○脈洪大者火多。三陳加姜汁。炒山梔。川

連。滑大痰多。導痰加芩。連。山梔子。

○脈弦細。身倦怠者。六君子加燕窩。蒼朮。

姜汁炒。山梔。不應。合佐金丸。又有用消尅菜。

過多。饑不能食。精神漸減。四君子加白芍。菜。

陳皮。姜汁。炒川連。

○心懸懸如饑狀。欲食之時。勿與飲食。常

以枳朮丸三分。抑青丸。見腹痛一分和服。

○中脘有飲。則嘈。有宿食則酸。故常噉宿

腐氣。逆燕酸水。亦有每晨吐酸水數口。日間

無事。膈常如酸熱者。皆中宮不清所致。越鞠

九。合佐金丸。最妙。

○婦人悒鬱。多有此證。逍遙散。下佐金丸。見火。

○腎肝陰虛。不能納氣歸元。而作嘈雜噯氣。痞滿。脈必瀦弱。服補中二陳諸藥。不効者。臨卧用四神丸加川連。侵晨用六味丸加沉香。

○噯氣者。皆屬胃中窒塞氣。不宜通。上迫而出也。然有飲食大過。噯出如敗卵氣者。則當審所傷何物。而消導之。亦有胃弱。不能尅化而然者。此宜兼補兼消。不可純用尅伐也。○噯者。胃中津氣枯槁。則噯。若平時飲食常餽者。為反胃之漸。不可不知。

噯氣 并諸逆上衝

靈樞云。寒氣客於胃。厥逆從下上散。復出於胃。故為噯。○保命集云。噯者胸中氣不交也。仲景云。噯氣不除者。旋復代赫石湯主之。則知噯氣。中氣不治。土不制水。水飲上泛。故用旋覆半夏。以散痰飲。人參甘草姜棗。以溫

胃氣。代赫。以鎮墜逆氣。而引人參力。下行也。若老人噯氣。乃胃中虛寒。痰逆而然。止宜理中丸。溫助胃氣為主。或加枳實香附。砂仁之類。助其消化。雖然真氣已衰。即使調理得宜。終不能過五年矣。

○氣逆上衝。火氣炎上故也。經云。逆氣象陽。凡氣逆。必證象陽盛。面赤脈洪。當以法降其逆。乃愈。若以氣象陽盛。而用寒藥攻之。則不救矣。氣上衝。咽不得息。有聲不得卧。調中益氣湯。加吳茱萸。觀厥氣多少用之。如夏月有此證。為大熱也。炒川連知蘖。少加肉桂為末。酒丸服二錢。多飲湯。少時以美膳壓之。使直至下焦。以瀉衝脈之逆也。蓋逆者寒熱之氣逆。而不順也。當隨四時寒熱溫涼以制之。厥陰氣上衝心。咽不得息。治法見傷寒厥陰病條。

○載復菴云。虛炎之證。陰陽不升降。下虛上盛。氣促喘急。宜蘓子降氣湯。下黑錫丹。

嘔吐

治嘔吐以二陳湯為主。如氣滯者加白豆蔻、砂仁、熱吐加黃連、冷涎吐加丁香、氣升嘔加沉香、氣不和加木香、入姜汁少許。

○食頃即吐者。半夏、生姜煎服。食入即嘔。橘皮、生姜煎服。食已則吐。橘皮、半夏、生姜煎服。

○食久而吐為反胃。脈沉無力。理中湯。或三物大建中湯。去乾姜。加白朮、桂心、橘皮。脈滑而實。且食暮吐。暮食且吐。此下焦實。半夏、大黃等分。為末。姜汁和丸。微利之。

○嘔吐穀不得下。小半夏湯。

○逆氣心中煩悶。氣滿嘔吐。小半夏湯。加桂心。少氣。加甘草。

○胃虛者。惟宜益胃。推揚穀氣而已。忌用辛瀉。故服小半夏湯。不愈者。服大半夏湯立愈。

大半夏湯 治胃反嘔吐。

半夏姜製 人參三錢 生姜三片

以水和蜜。揚之二百四十遍。煮茶溫服。○久寒胸膈逆滿不能食。吳茱萸湯。加桂心。

半夏、甘草、小麥酒煎。

○寒吐者。喜熱惡寒。肢冷脈細而滑。用理中湯。加枳實。或二陳。加丁香、炮姜。並須微溫與服。

○熱吐者。喜冷惡熱。煩渴。小便赤澀。脈洪而數。二陳。加梔、連、竹、茹、枇杷葉、葛根、姜汁、蘆根汁。

○怒中飲食。嘔吐胸滿。膈脹關格不通。二陳湯。加丁、沉、木香、砂仁、厚朴、神麴。更不効。有瘀血也。當從畜血例治。

○中脘素有痰積。遇寒即發。俗名冷涎泛。宜丁香、豆蔻、砂、乾姜、陳皮、半夏、生姜、白芥子。○嘔痰而致礙者。乃寒痰逆悶。謂之痰厥。姜附湯。加白朮、半夏、細辛。

○痰滿胸喉。粥茶到口即吐。先用生姜湯。下黑錫丹。以鎮墜之。候茶可進。則以二陳。加朮、砂仁、厚朴、姜汁。虛加人參。

○有一等肝火逆證。亦嘔而不食。但所嘔者。或酸水。或苦水。或青藍水。惟大小便不秘。亦能作心痛。此是火鬱木鬱之候。木鬱達之。

火鬱發之。須用芎藭。連濃煎湯。細々申之。再服道遙散。

○脾胃本虛。機關不利。不能運化而水到咽管。輒便嘔出者。六君子湯。加砂仁。炮姜。使中央之樞軸。轉機關。利自不嘔。

○丹溪云。凡嘔家。禁服瓜蒌實。桃仁。菜菔子。山梔子。一切有油之物。皆犯胃。凡茶中帶香茶。行散方効。

○乾嘔。胃中虛冷。或停水飲之。故胃虛宜溫胃。理中為主。

○乾嘔者。胃中虛冷。或停水飲之。故胃虛宜溫胃。理中為主。停水宜橘皮半夏湯。小便不利。加桂心。茯苓。胃虛不食。加人參。肺胃有水。喘咳上氣。小青龍加減。胃虛濁氣上逆。吳茱萸湯。

橘皮半夏湯 治積氣痰痞。飲食嘔吐。不止。

二陳湯。去茯苓。甘艸。烏梅。用半夏。橘皮。各半兩。生姜汁半合。

○乾嘔屬虛熱者。橘皮竹茹湯。虛寒橘皮乾姜湯。甚去通草。加丁香。附子。寒熱錯雜者。

去甘艸。加丁香。柿蒂。

橘皮竹茹湯 治胃虛乾嘔。

二陳湯。去半夏。茯苓。烏梅。用橘皮三錢。甘艸一錢半。生姜半兩。加竹茹三錢。人參一錢。大棗三枚。

橘皮乾姜湯 治乾嘔吐逆。涎沫而噦。

七氣湯。去半夏。加乾姜。橘皮。通草。

通草橘皮湯 治傷寒後。胃熱嘔噦。

通草 二錢 橘皮 貳半 粳米 一合

生蘆根汁半合

右四味。水煎熱服。不瘥更作。

○傷寒後嘔噦。及胃或乾嘔。食不下。千金蘆根飲子。

蘆根飲子

通草橘皮湯。去通草。橘皮。加竹茹。生姜汁。

○春夏時行。傷寒。寒傷胃。胃冷變哕者。千金用橘皮。桂心。葛根。各二兩。白茅根一升。水煎服。有熱者。去桂心。

○乾嘔。聲相連者為實。攻熱為主。若半時一声者為虛。溫補為主。如腹滿。不尿。脈數。頭

汗。目瞪者。死在旦夕。

○千金云。凡服湯。嘔逆不入腹者。先以甘草一兩。水煎服之。得吐。消息定。然後服餘湯。便不吐也。凡嘔者。多食生姜。此是嘔家聖藥。○脈。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者。死。脈陽緊陰數。為吐。陽浮而數。亦吐。寸緊尺瀋。胸滿而吐。寸口脈數者。吐。緊而瀋者。難治。緊而滑者。吐逆。脈弱而嘔。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。病人欲嘔。吐者。不可下之。嘔吐大痛。吐出色如青菜色者。危。

●漏氣者。身背熱。肘臂牽痛。其氣不續。膈間厭悶。食入則先嘔。而後瀉。名曰漏氣。風熱閉其腠理。上焦之氣。慄悍滑疾。遇開即出。經氣失道。邪氣內著。故有此證。千金麥冬理中湯主之。肥盛多痰。澤瀉湯主之。

麥門冬理中湯 治漏氣。上焦熱。腹滿不欲飲食。食則先嘔。後瀉。身熱痞悶。

- 麥門冬去心 白朮各五 甘草炙 茯苓各二
- 人參 橘皮 蓴心 萎蕤各三
- 芦根一握 竹茹一團雞子大 生姜四 陳米一合

右十二味。水煎溫分日三服。

澤瀉湯

治上焦飲食下胃。胃氣未定。面背身中皆熱。名曰漏氣。

- 澤瀉 半夏 柴胡 生姜各三
- 桂心 甘草各一 茯苓 人參各二
- 地骨皮五 石膏八 竹葉一把 蓴心五

右十二味。水煎溫服。日三。

●走哺者。下焦實熱。其氣內結。不下。必糟粕。而於濁。反蒸於胃。故二便不通。氣逆不續。嘔逆不禁。名曰走哺。人參湯主之。

人參湯

- 人參 黃芩 知母 萎蕤
- 茯苓各三 白朮 梔子姜汁炒黑 陳皮
- 芦根各四 石膏煨八

右十味。水煎溫服。日三。準繩多

○食已暴吐。脈浮而洪。此上焦火逆也。宜橘皮。半夏。枳殼。桔梗。厚朴。檳榔。茯苓。白朮。氣降則火自清。吐漸止。乃以人參為茶補之。○下閉上嘔。亦因火在上焦。宜枳殼。桔梗。陳皮。厚朴。檳榔。子。大黃。木香。微利之。

●嘔苦者。邪在膽經。木善上乘於胃。吐則逆而膽汁上溢。所以嘔苦也。宜吳茱萸黃連茯苓澤瀉生姜。

○邪在膽。逆在胃。膽液泄。則口苦。小柴胡湯。

○胃氣逆。則嘔苦。吳茱萸湯。

●中酸者。溼熱。鬱積於肝。肝火逆上。伏於肺胃之間。候食入胃。被溼鬱遏。不得傳化。故作中酸。所謂曲直作酸是也。佐金丸。見火服空心白朮陳皮湯。或加味逍遙散作湯。送下。○吞酸噯腐。多屬脾虛木旺。證多面色痿黃。胸膈不利。舉世好用清氣化痰之藥。多致大便不實。食少倦怠而危。當用六君子。加炮姜。木香。吳茱萸。脾腎俱虛。六君子。加肉豆蔻。補骨子。中氣虛弱者。理中湯。加吳茱萸。鬱火。連理湯。不應補中益氣湯。加木香。炮姜。送佐金丸。中氣虛寒。必加附子。或附子理中湯。無有不愈。

○凡中酸。不宜食粘滑油膩者。謂氣不通暢也。宜食疏淡諸物。使氣通利。

○吐酸者。當平肝扶胃。逍遙散。服佐金丸。若宿食滯於中脘。平胃散。加白豆蔻。藿香。砂仁。神麴。

○嘔水者。渴欲飲水。水入即吐者。名曰水逆。五苓散。氣虛四君子。去甘草。加枳殼。橘皮。生姜。不應。六君子。換赤茯苓。用伏龍肝煮湯。澄清。代水煎茶。

○吐沫者。胃中虛寒。不能約束津液。故吐涎沫。宜六君子。加益智。生姜。或理中湯。加益智。以收攝之。

○吐虵者。有寒。有熱。有寒熱交錯。寒則手足厥逆。吐出之虵色淡白者。理中湯。加烏梅。黃連。蜀椒。甚則虵死而形扁者危矣。熱則虵色赤而多。且跳動不已。安虵丸主之。寒熱交錯。則病者靜。而復時煩。得食而嘔。虵聞食臭。其人當自吐虵。烏梅丸。見裏主之。大抵吐虵。寒熱交錯者多。方中都。用川椒。黃連。烏梅。之類。蓋虵聞酸則靜。得苦則安。遇辣則伏。而不動也。若誤服消尅。及攻喪諸藥。不應。甘草粉蜜湯主之。

安蛇散

烏梅肉三錢 黃連

檳榔各一 胡粉

蜀椒

藿香

為散每服三四錢水煎如糊空腹服之差即止

附方

嘔吐飲食湯茶共不入者

鼠尾草一錢煎服吐止後隨證施茶。或加主方最好。

一方

仙人杖加主方甚效。

一方

平胃散加黃連山梔吳茱萸。

一方

治吞酸。

赤螺燒

細末白湯送下。

○凡上吐下瀉者有用四逆湯證也。然煎服則無效。為散服則即效。

膈噎反胃

噎膈大都屬熱。反胃大都屬寒。然亦不可拘

也。脈大有力。嘔吐酸臭。當作熱治。脈小無力。嘔吐清水。當作寒醫。色之黃白而枯者為虛寒。紅色而澤者為實熱。能合色脈。庶乎無誤。此證之所以疑難者。方欲健脾胃理痰。恐燥劑有妨津液。方欲養血生津。恐潤劑有礙於中州。審其陰傷。火旺者。當以養血為先。脾傷氣虛者。當以溫補為主。此皆虛實陰陽之辨。臨證之權衡也。

○每飲食入胃便吐出涎沫如雞子白。蓋脾為涎。脾虛不能約束。故涎沫自出。非人參白朮訶子益智仁不能攝也。此證宜六君子加減。挾寒脈遲細者。加肉桂附子。挾熱脈滑數者。加枳實黃連。若噎而聲不出者。加五味子。竹茹。喉中有一塊。食物不下者。痰氣也。加海石。訶子。膈間作痛。多是瘀血。歸尾。桃仁。韭汁。童便。甚者。加大黃微利之。

○千金方。治胸中久寒。嘔逆氣上。飲食不下。結氣不消。用五噎丸。若飲食不得下。手足冷。上氣欬逆。用五膈丸。

五噎丸

乾姜

蜀椒

吳茱萸

桂心

細辛各一兩

人參

白朮各二兩

橘皮

茯苓各一兩

附子一枚

右為細末。煉白蜜丸。梧子大。酒服十五丸。日三服。漸加至三十九。

五膈丸

麥門冬三兩 甘草三兩 蜀椒

遠志肉

桂心

細辛

乾姜炮各一兩

附子一枚

人參三兩

右為細末。煉白蜜丸。彈子大。先食含一九。細細燕之。喉中胸中當熱。茶丸稍盡。再含一九。日三服。夜二服。七日愈。

五噎丸者。以肝氣上逆。胃氣不下。而嘔噎。五膈丸者。以腎氣不蒸。肺胃槁。而不納也。

○血槁者。地黃。麥冬。煎膏。入藕汁。人乳。童便。芦根汁。桃仁泥。和勻。細細呻之。

○因火逆而噎。梨汁。藕汁等分。熬膏。蜜收。不時噙熱嚥之。有痰。加竹瀝。

○因七氣致病。而中挾冷熱食積。胃氣不和。而噎膈者。諸七氣湯選用。

○食物下咽。屈曲自膈而下。梗塞作微痛。

此汚血在胃口也。用四物湯。加韭汁。姜汁。竹瀝。童便。馱尿。牛羊乳。蜂蜜煎膏。潤利之。後以

代抵當丸下之。若火盛作嘈痛者。忌姜汁。胃虛欲嘔吐者。忌韭汁。犯之必轉劇。

○有冷積結滯者。用先理中。加川烏頭。蜀椒。川連。巴豆霜。皂莢末。蜜丸。涼水送下十五丸。

暫服五七服。後以四君子。加黃耆。橘紅。砂仁。調理。如大便燥結。不時進開關利膈丸。以微導之。

開關利膈丸

寶鑑。名人。參利膈丸。

治腸胃壅滯。噎膈不通。大便結燥。

木香

檳榔

人參

當歸酒

藿香

甘草

枳實炒各一兩

大黃酒蒸

厚朴姜製各二兩

滴水為丸。梧子大。每服三五十九。食後米飲下。

○脈有至死不變者。以胃中痰飲。溼熱膠固。脈常和軟。然細案之。必兼弦象也。

○反胃係真火式微。胃寒脾弱。不能消穀。

朝食暮吐。暮食朝吐。或一兩時而吐。或積至一日一夜。腹中脹悶不可忍。而復吐。雖曰脾胃虛寒。然致病之由。必有積滯於內。千金反胃初起。用金匱茯苓泔瀉湯。去白朮。換乾姜。加人參。橘皮。大黃。昔竹茹。得利。去大黃。為胃虛反食下喉便吐之主方也。

茯苓泔瀉湯 治胃反吐而渴。欲飲水

五苓散。去豬苓。加甘草。生薑。家秘加

○若吐出原物。酸臭不化。此飲食入胃。既抵胃之下脘。復返而出也。理中湯為主。甚則加丁。附。川連。若服數而邪熱不殺。殺乃火性上炎。多升少降。應與異功散。加沉香。川連。歸芍。生地。

○食物之後。冷涎不已。隨即反出。或心腹覺疼。藿香安胃散。或六君子湯。加丁香。藿香。藿香安胃散 治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐不腐。

藿香 橘紅各半 丁香三錢 人參一兩

為散。每服二錢。生薑三片。水煎溫。食前和滓服。

○咽喉阻塞。胸膈滿悶。暫用香砂。枳。朴。以開其結滯。然破氣藥過多。中氣因而不運。異功散。加香。砂。使氣旺。自能運化。

○氣滯痞塞實痛。平胃散。加藿香。砂仁。

○胃虛中氣不運。而噎塞者。四君子湯加黃耆。橘紅。砂仁。

○反胃而渴。欲飲水。金匱茯苓泔瀉湯。千金去白朮。生薑。加半夏。小便不利。桂苓丸。加半夏。泔瀉。甘草。生薑。作湯服。虛人反胃多渴。七味白朮散。

○反胃食入。一日半日。吐出如故。乃胃氣虛弱。而有痰。不能消化。隨氣逆上也。二陳。加丁香。藿香。雞內金。虛加白朮。炮姜。

○大便燥結。久閉不通。似屬血熱。不可頻攻。止可清熱潤燥。小製湯丸。漸次加之。關局自透。服利膈丸。然服通利之劑過多。血液耗竭。轉加閉結者。宜用人參固本丸。料煎膏。時時服之。

○胃反上氣。食即吐出。屬熱者。千金用芦根。芎根。等分煎服。不應。加竹茹。生薑。

○反胃倦怠無力，垂死者。以人參一二兩，濃煎加姜汁，頓服。屬寒者，加桂附少許。下焦虛寒，不能生土，食久反出，用附子一枚，切去尖上一片，鏤成一孔，入丁香四十九粒，仍將切下者掩上，紫定，搗取生姜自然汁，煮熟焙乾為末，每用一匙，置舌上，徐徐以津唾送下。若煩渴，則頻與糜粥，忌油膩生冷。虛甚者，加人參一兩，駕馭之。

○鬱悒失意人，或孤寡初起，自當舒鬱，道遙散，久之必兼補養，歸脾湯。

○命門火衰，不能生土，食久反出，其脈沉遲，八味丸加丁，沉間進黑錫丹。

○精衰，不能蒸騰於上，咽喉閉塞，水穀難進，強食則吐者，六味丸加肉桂，五味不應，加沉香、砂仁。

○有陽虛不能統運，嘔逆便秘，用人參、大黃、附子，攻之即通，然真氣竭者，終不可救。

○瘀血在膈，阻滯氣道而成者，代抵當丸，作芥子大，服二錢，去枕仰臥，細細嚥之，但飲熱湯，及椒姜輒呃者，即瘀血也。

○反胃而胸中嘈雜不寧，或作或止，其人懊懷，面上有白點者，作臌積治之。

○丹法，用陳香櫟一枚，去殼，入生姜汁，拌生附子末一兩，以姜滓溼紙裹煨，栗透焙燥，為末，每服五七分，至一錢，濃煎獨參湯服之。

○反胃初愈，切不可與粥飲，每日與獨參湯，少加陳米煎服，旬日後，方可小試稀糜。

○脈數無力為血虛，脈緩無力為氣虛，數而有力為有熱，數而滑疾為有痰，緊而滑者寒飲上逆，小弱而瀉，血虛胃反，寸緊尺瀉，其人胸滿，不能食而吐，吐止者為下之，故不能食，設言未止者，此為胃反，故脈微瀉。

附方

一方

仙人草

三四月取之蒸四兩

沉香一兩

右為細末，蕎麥糊●丸，楊梅皮末為衣，隨意與之。

一方

二陳湯，加保羅貝，生桑寄生，丁子，人參，沉香。

右為丸用兼灸京門。

一方

地膚子四分

茯苓二分

人參少

郭公燒存性少

甘草少

右為一貼水煎

一方

大和艸一味水煎服。

一方救急易方

治噎食痞塞

獨活

硃砂

乳香

龍骨各一分

木香五分

蜈蚣一箇

桑虫一箇

右別將蜈蚣桑虫瓦上焙乾與前茶五味同和一處為細末作一服用酒送下後喫白乾餅極効。

○反胃因脾胃虛者六君子湯加當歸縮

砂仙人杖

○氣血兩虛者八物加仙人杖縮砂。

閱甫利膈湯

治膈噎。

半夏二錢

山梔子四錢

熟附子一錢

甘草少

右生姜二片水煎服此方半夏下氣附子散

邪。梔子解鬱。此三味名利膈湯。百發百中妙方也。然不早治則無救。至翻胃津液竭則盧扁何得活哉。

關格

陰陽易位。病名曰關格。多不可治。若邪氣留著而致者。猶可治之。舌上白胎。而水醬不下。曰格。格則吐逆。熱在丹田。小便不通曰關。關則不得小便。必用吐以提其氣之捍格。不必在由痰也。鹽湯探吐。并以牙皂湯浴其小腹。及陰。或以鹽熨臍中俱妙。有痰宜吐者。二陳湯探吐之。吐中便有升降。有中氣虛不運者。補氣茶中升降。先以四君子。換參蘆探吐。後用人參散。栝子仁湯。調理。

人參散

治胃虛津枯。關格吐逆。

人參五錢至二兩

麝香半分至一分

冰腦三釐至半分

為散水煎和滓分二三次溫服

此雲岐子治噎膈胃反關格不通九方之一。用獨參湯峻補其胃。稍加腦麝以發越其氣。得補中寓瀉之至訣。乃肥盛氣虛痰窒中脫。

及酒客溼熱。鬱痰固結之專劑。以中有腦麝。善開結利竅散鬱也。若瘦人津枯。不能出納。而大便秘結者。即以此方。去腦麝。加蘆根汁。竹茹。未嘗不為合轍也。

栝子仁湯 治胃虛關格。脈虛微無力。

人參各半 白朮 茯苓 陳皮各一錢

甘草各三 栝子仁研二 麝香一字 生姜五片

水煎去滓。入麝調服。

此雲岐第二法。取用異功。加栝仁。麝香。其法稍平。而胃中津枯。大便艱澀者。宜亦加蘆根汁。竹茹。或竹瀝俱妙。

○脈沉細。手足厥冷者。既濟丸。勞役後氣虛不運者。補中益氣湯。加木香。檳榔。

既濟丸 治關格。脈沉細。手足厥冷。

熟附子二兩 人參三兩 麝香少許

為細末。米飲糊丸。梧子大。每服十九。至三十丸。米飲下。

此雲岐第三方。用參附。加麝香。單刀直入。以破中下焦之結。茶雖峻而用法最緩。不可不詳此義。而擅改作湯也。

○心脾疼後。小便不通。皆是痰隔於中焦。氣滯於下焦。二陳。加木通。枳殼。服後探吐之。寒在上。熱在下。黃連湯。桂枝。易肉桂。熱在上。寒在下。生料八味丸。加牛膝。車前子。○關格不通。不得尿。頭無汗者。可治。有汗者死。

嘔

河澗為火化。傷風有嘔為輕。金匱有中寒家。清涕善嘔之說。此亦屬肺寒。宜用溫肺之品。治之。

不能語

因病不能語者。惟中風。傷寒。暴病有之。一婦暴怒傷食。膈脹嘔逆不止。醫誤認風邪。而與表藥。遂昏憤目瞪不語。呼之不省。其脈六部潛伏。知為痰因氣閉所致。本當因勢利導。探吐。以通其竅。緣病家畏其吐劇。與導痰湯。加菖蒲。遠志。一啜。使能語言。更與前藥。加檳榔。鐵落。得下而安。此證。橘皮濃煎。亦可探吐。

參蘆濃煎亦可。灌姜汁。竹瀝亦可取吐。

身重

身重多屬於溼。除溼。滲溼。冒苓之類。虛人補中益氣。加羌。防。茯苓。沢瀉。

○風溼脈浮。身重汗出惡風者防已黃耆湯見溼。

○夏月中風溼。身重如山。不能轉側。消暑十全散。加羌活。蒼朮。

○身重。無非溼證。多歸重於脾土。為脾病是矣。又腎為水藏。腎虛則邪水用事。故又主腎虛。至於肝虛。亦令人體重煩冤。蓋肝虛則不能勝土。土無風氣。亦必鬱熱上蒸。而為病矣。然肝則重於煩冤。脾則重於腫重。腎則重於痿弱。不可不辨。

蟲

諸蟲。小兒最多。大人間有。其候心嘈。腹痛。嘔吐涎沫。面色痿黃。眼眶。鼻下有黑。嗜食米紙。茶葉。泥炭之類。沉沉默默。欲眠。微有寒。治

宜隨證用方。

○心腹中痛。上下往來。發作有休時。喜涎出者。蟲也。

烏梅丸 治蛇厥。

理中湯。去白朮。加烏梅。黃連。黃蘗。附子。蜀椒。桂枝。細辛。當歸。以苦酒漬烏梅一宿。蒸之。五升米下。飯熟去核。搗成泥。與蜜杵丸。先食。飲服十九。日三服。稍加至二十九。禁生冷。滑物。臭食等。

○胃脘交痛。發歇有時。痛發則吐涎沫。金匱九痛丸 蟲門

九痛丸 治九種心痛。

附子三兩 炮 生狼牙灸香即 狼毒芽 人參 吳茱萸開口者 泡七次

乾姜各一兩 兩生 巴豆熬并淨 一錢

右六味為末。煉白蜜丸。梧子大。溫酒送下。強人三丸。弱者二丸。日三服。兼治卒中惡腹脹痛。日不能言。又治連年積冷流注。心胸痛。

○狐疑善惑者。妙効丸見類方

秦川剪紅丸 治蟲積為患。噎膈反胃。不能食。

雄黃油煎 木香各五 檳榔 三稜煨

蓬朮煨

貫衆

椒紅各一兩

大黃酒蒸兩半

乾漆煨令烟盡三錢

神麴糊丸。菜豆大。每服五十九。五更用雞湯送下。

化蟲丸

治蟲積。肚腹常熱。

鶴孔即天名精子炒

檳榔子

苦楝根各一兩

胡粉炒半兩

白礬一錢五分

為末。米飲糊丸。梧子大。一歲兒五丸。大人七八十九。酸漿水入麻油少許。和勻。送下。清米湯亦可。痛時用蜀椒湯。調化服。

集効丸

治蟲積。四肢常冷。

木香

鶴孔

檳榔

訶子肉

燕蕒仁炒各五錢

大黃二兩

熟附子

炮姜各三錢

烏梅肉十四枚

煉白蜜丸。梧子大。每服三十九。食前陳皮湯下。婦人醋湯下。孕婦勿服。

萬應丸

治腹中諸蟲。血積。

黑牽牛頭末

大黃

赤檳榔各一兩

白雷丸醋炒

木香

沉香各半兩

右將牽牛一處為末。檳雷木黃一處為末。沉

香另自為末。以大皂莢。苦楝皮。各四兩。煎汁。泛丸。如菜豆大。每服四五十丸。至百丸。小兒減量。孕婦忌服。

遇仙丹

治膈上痰氣蟲積。

白牽牛頭末生一兩炒一兩

白檳榔一兩

茵陳

三稜醋炒

蓬朮醋炒

大皂莢去皮弦子。醋炙淨末。各三錢

沉香另未。分見火五錢

為末。醋糊丸。菜豆大。每服四五十丸。五更時。茶清送下。天明當有所下。有積去積。有蟲去蟲。小兒減量。孕婦忌服。

○穀道生瘡。蟲蝕癢痛。膠艾箱歸湯。外用雄黃兌法。隨證取用。無不克應也。

膠艾箱歸湯

治蟲蝕肛門癢痛。

阿膠

當歸

青箱子各六分 艾葉一把

右四味。水煎。分三服。

雄黃兌法

雄黃半兩

桃仁一兩

青箱子

黃連一兩

苦參一兩

右五味為末。綿裹。如枣核大。內下部。

○血入於酒。則為酒齧。血凝於氣。則為氣齧。

敗血雜痰則為血痰。掉頭掉尾。上侵胃脘。食入脂膜。或附脇背。或隱胸腹。惟蕪荑炒煎服之。然必兼養胃。養血。理中。乃可殺之。若徒用雷丸。錫灰。不能去也。

○治蟲之茶。必夏月易奏效。

○痔漏中蟲。蝕下部。肛盡穿腸者。取蝦蟇青背者一枚。入蘆會一錢。用生雄雞脛骨二莖。入滿。雌黃並用鹽泥固濟。燒存性。合和為散。入腦麝。硼砂各少許。再研極細。先以猪蹄甲三枚。胡葱七莖。煎湯日洗。紙撚裏乾吹下部孔內。令深入。外以黑膏蓋之。日吹一次。以管盡為度。

○凡奇怪病。除痰血外。百治不効者。即是

蟲為患。視其經絡虛實。參脈證。消息治之。

○蟲在肝。令人恐怖。眼中赤壅。在心。心煩發躁。在脾。勞熱四肢腫急。在肺。欬嗽氣喘。醫者不察。婦人陰蝕瘡。詳婦人本門。

番沙

番者。感惡毒異氣。而驟發黑沙。此病起漠北。

流入中原。故以番沙目之。其證卒然昏倒。腹痛而色黑脹。不叫不味。如不急治。兩三時即斃。有微發寒熱。腹痛麻脊。嘔惡。神昏者。或澀澀汗出。或隱隱發斑。此毒邪熾發於表也。亦有發即瀉利。厥逆腹脹。無脈者。此毒邪內伏。不能外發也。所患最暴。多有不及見斑而殂者。初覺先將紙撚。點焯頭額。即以蕎麥焙燥去殼。取末三錢。溫湯調服。重者少頃再服。即安。蓋蕎麥能鍊腸胃滓穢。降氣寬胸。而治濁滯。為沙毒之蒂。倘蕎麥一時難得。或服之不應。香薷散。加薄荷。荊芥。辛涼透表。次則辟邪為要。梔子豉湯。加牛旁。生甘艸。解毒安內。表熱勢甚。黃芩湯。加連翹。木通。分利陰陽。如見煩擾腹痛。脈來數疾。急投涼膈散。以竹葉湯。生薑。熱劇神昏。雖合三黃湯。不可救。煩渴引飲。遺尿速清。陽明。白虎湯。加葱豉。使毒從表化。以上諸法。在未經誤茶。庶可挽回一二。

○此病。與瘴癘相似。瘴癘則觸冒山嵐瘴氣。此則觸冒惡毒異氣。與時疫癘不殊。但時行則浴門闔境傳染。此則一人驟感。死於一

日半日之間。不似時行之可以遷延數日也。又此病與伏氣相似。伏氣發溫。熱毒自裏達表。此則一身驟感異氣。無分表裏藏府。亦不似中寒暄暑。本虛不勝寒暑之病也。又此病與揮霍撩亂相似。霍亂是客邪。與水穀之氣相併。此則正氣暴逆。不能與邪相亢也。又此病與關格相似。關格是上下不通。病純屬裏。此則兼有斑沙表證也。大畧與臭毒相類。然臭毒所觸穢氣。此則觸冒惡毒。較之疫癘尤劇。初起昏憤不省。脈多沉匿。或潭潭不清。勿以腹痛足冷而與溫茶。

臭毒

臭毒俗名發沙。皆由中氣素虧之故。蓋脾胃之所喜者香燥。所惡者臭溼。今脾胃真氣有虧。或素多溼鬱。所以不能主持。故臭惡之氣得以直犯無禁。發則腹痛不能飲食。或上連頭額。俱痛。或下連腿及委中。俱痛。甚至有欲吐不吐。欲瀉不瀉。或四肢厥逆。面青脈伏。或遍體壯熱。面紫脈堅。此平昔火衰。火盛之

別也。有痛死不知人。少間復蘇者。有腹痛不時上攻。水漿不入數日。不已者。欲試真否。但與生黃豆嚼之。覺香甜者。即臭毒。覺腥者非也。

治方 用香附一味。童便浸晒為末。停湯以頓服四五錢。立効。或越鞠丸。沉香降氣散亦可。

○又脾虛挾火。兼犯穢氣。則心腹擾痛。上下不通。俗謂之乾霍亂。近世謂之絞腸痧。以穢氣在外。固結不散。火邪在內。攻擊不開。故證最為急。

治方 鹽湯和童便服之。最上之法也。

中毒

○自死食六畜肉。中毒。大豆煮汁。飲數升。

○食牛肉。中毒。狼牙燒灰。取方寸匕。水服之。

○食犬肉。不消。堅滿腹脹大。渴如狂。杏仁一升。合皮研煮。分溫三服。利下肉片。大驗。

○食漏脯。中毒。生韭汁服之。

○在器中密蓋不泄氣者。謂之鬱肉。食之傷人。燒狗屎末。方寸七。水調服之。

○食毒箭射鳥獸。中毒。以大豆煮汁。及鹽服之。

○食魚中毒。面腫煩亂。橘皮煮汁。停冷服之。

○食膾多不消。結為癥病。厚朴。大黃煮汁。服之。或馬鞭草一味。搗汁飲之。

○食雞鯁中毒。以蘆根煮汁服之。

○食蟹中毒。紫蘊煮飲之。

○食諸菌。中毒。及食楓樹上菌。而笑不止。土漿飲之。

○釣吻與芹菜相似。誤食殺人。甘艸煮汁飲之。通除諸菜毒。

○中石茶毒。白鴨屎。人乳解之。

○中雄黃。防已解之。

○中砒毒者。煩躁如狂。心腹攪痛。欲吐不吐。清油。或糞清灌之。私曰。人中黃亦可。

○中巴豆毒者。其人大瀉。或吐。煩渴。急以黃連煎湯。或甘草湯。冷飲。

○中大黃毒者。泄瀉不止。腹中寒痛。先用姜湯。熱飲。次以理中湯。理胃。祛寒。

○中大戟。菖蒲解之。

○中甘遂毒。大豆煮汁服之。

○中半夏。南星毒者。其人喉間麻痺。急用姜汁。并飲甘草湯。

○中芫花毒。防已。防風。甘草。解之。

○中蜀椒者。人尿。地漿。冷水。解之。

○中葶藶毒。甘草藍汁。解之。

○中烏。附毒者。必煩悶。唇裂。血流。頭重。如斗。甘草湯。解之。

○中伏火丹砂。則毒歸心。其舌灰黑。脹大。童子小便飲之。次以金汁。及人中黃解之。

○夏秋間。誤食停宿之物。中有蜈蚣蛇蟲等毒。則心腹膨悶。雄黃磨水。細飲。或玉樞丹磨服亦可。

○蜀椒閉口者有毒。誤食戟人咽喉氣欲絕。急以地漿水解之。

○中河豚毒。急取蘆根汁服之。輕則清油多灌。

○中蠶毒。乾姜。山查。煮汁飲之。

○中漆毒。生蟹搗汁塗之。
 ○誤吞蜈蚣。胸腹絞痛。先飲生雞血。須臾以清油灌吐。其蜈蚣滾在血中同出。繼以雄黃細研水調服。
 ○誤吞水蛭。鹽梅水灌之。則化。
 ○一切藥毒。不問草石。始覺。便以葱豉。生麥門冬。煮取汁服之。
 ○馬嚙人。及踰人。毒腫熱痛作瘡。馬鞭梢鼠屎燒灰。猪膏塗之。
 ○牛馬嚙人。及馬骨刺傷人。竈灰淋汁熱漬。數易汁。勿令瘡爛。
 ○馬血入瘡中。婦人月水。或入糞塗之。
 ○食蠶中毒。乾姜山查煮汁飲之。誤食蛇穴中蟹蠶。令人頭旋目眩。腹痛而死。急磨玉樞丹救之。凡蟹重一觔外者。大毒。食之殺人。
 ○治諸食中毒。磨犀角汁飲之。無不治也。或苦參酒煮服之。

腸鳴

內經腸鳴有五。一曰。脾虛則腹滿腸鳴。飧泄食不化。枳實理中湯。加木香。二曰。中氣不足。腸為之苦鳴。六君子湯。加木香。三曰。邪在大腸。腸中雷鳴。氣上衝胸。半夏瀉心湯。四曰。土鬱之發。腸鳴而為數後是也。平胃散。加木香。半夏茯苓。五曰。熱勝少陰在泉。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝胸。葶藶木香散。
 ○腹中寒氣雷鳴切痛。胸腹逆滿嘔吐。附子粳米湯。
 ○胃寒泄瀉腸鳴。升陽除湿湯。加半夏。益智。各五分。生姜。大棗。和煎。
 ○腹中鳴者。病本於胃。乃火激動其水也。二陳。加芩。連。山。梔。不應。用。胃。苓。湯。加。減。
 ○肺移寒於腎。為涌水者。按腹不堅。水氣客於大腸。疾行則鳴濯濯。如囊裏漿水之病也。葶藶丸。加木香。

大便不通

○大便不通。有胃實。脾虛。風秘。氣秘。痰秘。冷秘。熱秘。實秘之分。臨證所當細察詳問也。

○胃實而秘。善飲食。小便赤澀。麻仁丸。見傷寒

○脾虛不能運化。倦怠懶言。補中益氣。倍升。柴。當歸。煎成。調生蜜。麻油。清氣一升。濁氣自降。有脾虛下秘者。以此湯。下麻仁丸。

○風秘者。風入大腸。傳化失職。羸活。防風。蘇子。枳殼。麻仁。杏仁。皂角。煎服。潤腸丸。見燥

○氣秘者。氣不升降。穀氣不升。其人多噎。枳殼。沉香。蘇子。檳榔子。烏茶。陳皮。煎服。降氣散。四磨。六磨。選用。

○痰秘者。痰飲溼熱阻礙。氣不升降。頭汗喘滿。胸脇痞悶。眩暈腹鳴。半夏。茯苓。木香。檳榔。枳實。橘紅。香附。白芥子。姜汁。竹瀝。不應。加大黃。黃連。甚則控涎丹下之。

○冷秘者。六脈沉遲。面白或黑。凝陰固結。胃氣閉塞。腸內氣攻。腹中喜熱惡冷。藿香。厚朴。姜。桂。枳殼。陳皮。生薑。煎服。半硫丸。熱茶多秘。惟硫黃性緩。而通。冷茶多泄。惟黃連厚腸止泄。如陰寒秘結。當與陽茶。冰冷服之。然數

服之。中間與清潤茶。一服不令結秘。若病本虛寒。標頭躁熱。亦宜助陽茶。中少加苦寒茶。以去熱躁。躁止勿加。

半硫丸局方治高年冷秘。虛秘。及痲痺。冷氣。

硫黃醋煨。柳木。提碎研。 半夏湯泡。晒乾。為末。

右二味等分。用生薑自然汁調蒸餅糊。杵數百下。丸如梧子大。每服十五丸。至二十九。空心無灰酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。

○熱秘者。六脈數實。面赤口乾。身熱腸胃脹悶。時欲得冷。或口舌生瘡。二腸熱結。蘇子。黃芩。生地。芍藥。杏仁。枳殼。煎服。潤腸丸。或四順清涼飲。見燥

○虛秘者。不能飲食。小便清白。或年高。或病久。或脾津枯血少。歸身。熟地。從蓉。參。耆。沉香。松子仁。桃仁。麻仁。蜂蜜。或麻仁。枳殼。當歸。人參。蜜丸服之。

○瘦人血枯火秘。通幽湯。見燥煎成。入蜜服之。

○老人津枯。婦人產後去血過多。及發汗利小便。病後血氣未復。虛勞骨蒸。皆能作秘。惟

當益氣補水養血。不可用硝黃。巴豆。牽牛等。
○有一種大便不通。腹中脹悶。求通不得。頻
頻登廁。努力大過。虛氣被掙下注。肛門裏急
後重。時不可忍。氣逆嘔惡。渴而索水。飲食不
能。呻吟不絕。欲與通利。則氣已下脫。欲與升
提。則氣已上逆。嘔惡難堪。人參。枳殼。當歸。煎
服。加陳香櫟皮。尤效。

○腎藏血虛。大腸風秘。生何首烏。搗自然
汁一盞。和白蜜頓熱服之。六味丸。加蜜調服
亦通。固本丸。作膏常服亦妙。

○命門火衰。開闔失職者。肉苁蓉宜之。然須
丸服。若作湯亦必為吐。

○丹方。生何首烏兩許。頓煎服之神應。若
暴病。熱邪固結。及中有雷滯者。禁用。以其純
陰味澀。無養正祛邪之力也。

○失血之後。煩渴大便不通。一味生地黄
搗汁服之。

○大病後。不得寐。大便不通。一味熟棗仁。
搗水去滓。煮粥。頻食。血枯燥結。恒用熟地黄
蜜煎常服。或熬膏亦佳。

○又老人血枯便閉。用生地黄。當歸身。鮮
首烏各四兩。廣皮一兩。熬膏頓服。半小杯。不
過三五次效。

○實秘者。能飲食。小便赤澹。枳實。檳榔。木
香。砂仁。蓬朮。大黃。皂角。皮之屬。氣滯腹急。大
便秘澹。六磨湯。加大黃。

○諸秘服茶不通。或虛人畏服利茶者。宜
蜜煎導。其猪膽導法。非傷寒邪熱。不可輕試。
○傷寒邪熱入裏。用硝黃。急下之。如雜病。緩
以度之。

○診陽結。脈沉數。或促。陰結。脈遲伏。或結。老
人。虛人。便秘。脈多沉伏。而結促不勻。若見雀
啄者。不治。

附方

一方 奇々妙々可秘云 蘇合香圓。加巴豆。
一方 草麻子末。和蜜薄紙裹。入孔門。

大小便不通

脾胃氣滯。不能轉輸。加以痰飲。積阻礙清道。
大小便秘澹不快。二陳湯。加升柴。二朮。數服。

能令大便潤而小便長。

○溼熱痰火結滯。脈洪盛。大小便秘赤。肢節煩疼。涼膈散。小承氣湯。選用。

○陰囊腫脹。二便不通。三白散。見水腫。

○大小便俱不通。小腹膨脹。乃膀胱溺滿。支撐迴腸。故并大便不得出。用二陳湯。倍茯苓。澤瀉。木通。先利小便。迴腸得通。而大便隨出矣。

○風閉。用燒皂角。成末。粥清調下。或燒湯。蒸下部良。

○冷閉。用連根葱一二莖。帶土。生姜一塊。淡豆豉二十一粒。鹽二匙。同研爛。作餅。烘熟。揜臍中。以帛紫定。良久於餅上灸之。

○熱閉。用田螺搗爛。加麝香一分。冰片半分。入臍中。以帛束之。如人行十里即通。

○肥人素多痰飲。溼熱結聚。因病每致大小便不通。腹滿不食。氣逆喘急。熱盛不得不下。有屢下不得通利者。有再三下而始通者。有下之遂利不止者。大抵溼熱素盛之人。大便不行。日數雖多。結糞甚少。所下不過溏糞。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

垢膩。甚至驟下不可遏者。多有熱去寒起。正氣隨脫。即變呃逆之證。以此本屬溼熱。溫補仍助本病。苦寒徒乏胃氣。每至不可救藥。若始先知其溼熱痰積。用導痰湯。多加姜汁。竹瀝。下滾痰丸。甚則下控涎丹。方為合法。若遲則溼熱上湧。勢劇。胃中津液盡變濁穢。雖有合劑。不能取效也。凡大便不通。而腹中雷鳴者。下之。必無結糞。蓋肥人下後。多有脫泄不止之虞。瘦人汗後。每多乾熱不止之患。不可不知。

小便不通

氣分熱渴。而小便閉。或黃。或濇者。黃芩清肺飲。

黃芩清肺飲 治渴而小便不利。

梔子豉湯。去豉。用炒黑山梔。加黃芩等分。熱服探吐之。不應。香豉一撮。

此方妙用。全在探吐。以提其上。則肺氣立清。若服而不吐。不特綿延。不能克應。縱或小瘥。苦寒之性。留薄於內。大傷氤氳之氣。得不為

之預慮乎。

○血分熱。小便閉而不渴者。滋腎丸。不應併中焦亦有熱也。加連。檳。甘草等分煎服。

○陰虛血熱人。渴而小便不通。或澹痛。淋瀝者。切禁五苓燥劑。宜導赤散。

導赤散 治小腸實熱。小便赤澹。

生地黃

五錢

木通

甘草稍

各一錢

竹葉

一握

右四味水煎熱服。溺血辰砂五分。一方冬燈草。一方冬車前。

○津液偏滲於大腸。大便泄瀉。小便澹少。或水停心下。不能下輸膀胱。五苓散。滲泄之。

若六府客熱。轉於下焦而不利者。用益元散以清之。若氣迫閉塞。升降不通者。二陳湯。去半夏加木通。滑石。柴胡。升麻。以提之。

○汗出過多。小便赤澹。此五內枯燥。慎勿用利水之劑。生肌散。加黃耆。當歸。若右寸脈獨數大。小便點滴而下者。此金燥不能生水。氣化不及州都。生肌散去五味子。易大劑紫苑。可。一服而愈。

○小便不通。腹下痛悶難忍。如覆碗者。為實。亦分在氣。在血。氣壅於下者。四磨。六磨。選

用。血汚於下者。代抵當丸。

○有火虛者。非與溫補劑。則水不能行。如金匱腎氣丸。元氣下陷。而水道不通者。補中益氣湯。加木通。車前。升清。以降濁也。

○小便不利。審是氣虛。獨參湯。少加廣皮。如神。

○凡小便不通。用獨蒜塗臍法。以獨囊蒜一枚。梔子三枚。鹽少許。搗爛。攤紙貼臍。良久即通。未通。塗陰囊上。立效。或用食鹽半觔。炒熱布包熨之。天行熱病。小便不通。用蚯蚓泥升許。以水浸澄清。渴即與飲。不應。地龍數枚。同蘆根。搗汁飲之。

○閉瘡者。溺閉不通。淋瀝點滴也。惟肝與督脈。三焦。膀胱主之。經云。膀胱之胞。薄以濡得酸。則蹇縮。約而不通。水道不行。故瘡又膀胱不利為瘡。不約為遺溺。蓋實則閉瘡。不取膀胱俞者。蓋膀胱但藏溺。其主出溺者。皆從三焦及肝與督脈也。閉瘡者。合而言之。一病也。分而言之。有暴久之殊。蓋閉者。暴病。為點滴不出。俗名小便不通是也。可用疏通利竅

之劑甚則用吐法以提其氣。補中益氣。二陳。五苓。俱可探吐也。瘡者久病。為溺瘡淋瀝。點滴而出。一日數十次。名淋病是也。惟宜滋養真陰。兼資氣化。如六味。生脈之類。亦可用。若疏泄利氣之藥。皆為戈戟矣。夏秋熱傷瘡閉。以滑石調水飲之即通。但陰虛泉竭者。禁用。附方

一方

蛭蟪研爛和醋。自臍下。至前陰上。塗之甚妙。此方外夷傳。

一方

川芎 白芍 茯苓各三分 木通一分 水煎服。

一方

鼠尾草一味煎服。

利水丸

車前子煎膏 滑石十錢 木香二錢 椒目四錢 右三味為末。和車前子為丸。椒目大。每服十丸。不効加至二十丸。

小便黃赤

小便黃赤有四。一屬肝熱。二屬胃熱。三屬肺熱。四屬腎虛。

○汗多而小便亦濇。夏月多有此證。盛暑時汗既多。膀胱閉濇。則水不運下。四君子。合五苓散。或五苓。合生脈。或生脈。合保元。或消暑丸。用清燥湯。見暑。

○有小便赤短。體倦食少。缺盆痛。此脾肺腎依俱虛也。補中益氣湯。下六味丸。滋其化源自愈。誤用滲利必危。已經分利。或病後有此。屬脾肺氣虛。不能施化。補中益氣。加麥冬。五味。

○尺脈數大。陰火上炎。而小便赤少者。六味丸。加麥冬。五味。

○肝熱者。頻欲解而赤濇痠痛。時覺凜凜。或發寒熱。六味丸。多加牛膝。脈盛氣實。龍會丸。

○胃熱者。口中乾淡引飲。肌膚壯熱。竹葉石膏湯。膀胱熱甚者。滋腎丸。

小便不禁

小便頻數 遺溺

王節齋曰。小便不禁。或頻數。古方多以為寒。而用溫瀦之藥。殊不知。陰虛屬熱者多。蓋火邪妄動。水不得寧。故不能禁。而頻數也。是以老年人多頻數者。是膀胱血少。陽火偏旺也。治法宜滋腎水真陰。補膀胱津液為主。而佐以收瀦之劑。六味丸。加麥冬。五味之類。不可用溫藥。

○戴氏曰。小便多者。乃下元虛冷。腎不能攝水。以致滲泄。宜八味丸。生料鹿茸丸。若小便常急。偏數雖多。而所出常少。放了復急。不瀦痛。是非淋證。亦有小便畢少頃。將謂已盡。忽再出些少。多因從忍尿。行房事而然。宜生料五苓散。加阿膠。吞加減八味丸。

○小便不禁而淋瀝瀦痛者。此真陽不固而下滲也。固脬丸。不應用加減桑螺散。晝甚者為陽虛。補中益氣。加熟附子。夜甚者為陰虛。八味丸。

固脬丸

治虛寒小便不禁。

兔絲子

酒浸一宿煮爛。搗碎作餅。焙乾。二兩。

茴香

去子。一兩。

附子炮

桑螺蛸

破開。酥炙。

戎鹽

各半。兩。

為末。乾山茶末糊丸。梧子大。空心酒下五十丸。

加減桑螺蛸散

治陽氣虛弱小便頻數或遺溺。

桑螺蛸

三十枚。酥炙。

鹿茸

一對。酥炙。

黃耆

三兩。蜜酒炙。

麥門冬

去心。二兩。半。

五味子

半兩。人參。

補骨脂

炒。鹽酒。

厚杜仲

鹽酒炒。各三兩。

為散。每服三錢。空心羊腎煎湯調服。并用紅酒。細嚼羊腎。或羊腎湯泛為丸。空心酒下三錢。

縮泉丸

○脬氣不足。小便頻數。晝甚於夜。縮泉丸。益智仁

去鹽。煨。

烏茶

等分。

為末。酒煮乾。山茶糊丸。梧子大。每服五七十丸。空心。淡鹽湯送下。

○或時清利過多。或時頻數赤瀦者。舊用革藓分清飲。多不應。改用加減八味丸。効。若夜起小便多者。八味丸加五味子。

○數而少。為實熱。宜滲之。五苓。減桂。加滑石。甘草。數而多。色白。體羸。為真陽虛。升氣少而降氣多。須補右腎相火。八味丸。加補骨脂。鹿茸。

○病後服苦寒。茶泄利。茶大過。小水不禁。或如稠泔色者。加減八味丸。

●小便頻數。勞而益甚者。屬脾氣虛弱。補中益氣湯。加山茶。五味。若小便瀆滯。補之益甚者。乃膀胱熱結也。赤芍。赤茯苓。黑山梔。生甘草。木通。滑石。淡竹葉。目白睛黃。加茵陳。有血加當歸。延胡索。脈滑數。盛。加大黃二錢。芒硝一錢。大便通。小便亦利也。其脾肺氣燥。不能化生者。黃芩清肺飲。

○膀胱陰虛。陽無以生者。滋腎丸。腎與膀胱俱虛。或肺氣不化。水泉瀆數者。六味丸。加麥冬。五味。

○若小便瀆滯。或莖中痛。屬肝腎溼熱。龍膽瀉肝湯。

●遺溺。經云。督脈生病為遺溺。肝所生病

為遺溺。膀胱不約。為遺溺。仲景云。下焦不歸則遺溺。天寒則腠理閉。氣澀不行。水下流於膀胱。則為溺與氣。故多溺而寒也。至於不禁之甚。非八味丸。固浮丸。加減桑螵蛸散不効。然亦有熱客腎部而遺尿者。經曰。淫氣遺溺。痺聚在腎。此係熱證。其證發熱。作渴。或時閉澆。或時自遺。或陰挺不能約制。午前小劑補中益氣。加黑山梔。午後大劑生料六味丸。加五味子。常服自効。

○夏月暑病遺尿者。白虎加人參湯。一服即應。

○有先因病淋。服利菴太多。致溺不禁者。補中益氣湯。少佐熟附子。

○有所傷損。汚血。畜於胞中。亦令遺失。鹿角屑。灸黃為末。和桃仁泥等分。酒調三錢。

○效而遺溺。屬膀胱。茯苓。甘草。艸湯。不應五苓散。

○小兒胎中受冷。遺尿。一味補骨脂炒研。臨卧紅酒調服。即不遺。

○孕婦及產後遺尿。見本書婦人門。

赤濁白濁 白濁 筋疝

濁之為證。莖中熱痛如火灼刀割。澀溺自清。惟竅端時流穢濁如膿。淋瀝不斷。初與澀溺不相混濫。時醫不知其故。多以利水之劑。雜投不已。因而憎劇者。往往有之。蓋出敗痰腐者。十中六七。出溼熱下注。脾虛下陷者。十常三四。必先補中氣。兼升舉之。而後分其藏府。氣血赤白。虛實以治。與夫他邪所傷者。固在瀉熱補虛。設腎氣虛甚。或火熱亢極者。則不宜純用寒涼。必反佐治之。達人觀變耳。色如泔。或如腐花。腐漿。而馬口不乾者。為溼。色黃赤。而馬口乾掩者。為火。此皆為濁。胃中溼熱下流也。又濁而清者。為溼。痛者。溼熱也。有溺時結塊阻滯作痛。塊中蓄水泡者。此必醉酒使內。酒溼乘虛。襲入精竅也。

○粘膩如膠。或心動輒遺。或溺後遺下者。皆精病與濁無干。

○肥人白濁。白帶。多是胃中溼熱濁痰下流。滲入膀胱。謂之便濁。與腎絕不相干。○雖弱

後便出濁塊。却不牽膩。用二陳。加川草薺。澤瀉。姜汁。炒黃蘗。濁物中有水泡者。二陳。倍半夏。加猪苓。沃瀉。滑石。麝香。赤小豆。竹瀝。姜汁之類。赤者去半夏。加琥珀。延胡。赤芍。椿根皮。

○若腎虛。淫火易動。精離其位。而成精濁者。其精牽膩如膏。雖不便溺。亦常有之。用九龍丹。收攝之。若忍精不泄。流入竅隧。而患白濁。用五苓散。赤濁用猪苓湯。並加麝香少許。小便頻數。莖中痛。調下益元散。赤者少加硃砂。晝甚者。屬上焦燥熱。氣化不行。益智。烏茶。皆不可用。清心蓮子飲。虛者妙香散。見澀血二方選用。

清心蓮子飲 治心包火旺。小便赤澀梗痛。

生脈散。加黃芩。地骨皮。車前。茯苓。黃耆。蓮子。此用生脈散。合黃芩清肺。而兼導赤之製。其旨在於心包火炎。上灼於肺。熱傷氣化。不能生水。故用生脈。救肺之燥。以滋上源。則肺知本無熱。皆緣受火之淫。而致熱傷氣化。安可復用黃芩。以伐其肺乎。曷不竟用生脈合導

赤全方。豈不源流同清。理明辭暢乎。即或不
然。不妨削去木通。仍用茯苓。蓮子。以存清心
之意。至於局方。又以保元為主。乃去五味。加
入甘艸。益失滋肺上源之旨矣。

○心經伏暑。而赤濁者。五苓散減桂。合生
脈散。

○肥人溼痰成濁。二陳加二朮。黃蘗。神麴。

○黑瘦人。脈洪數。五心煩熱。頰赤唇乾。小便
赤濁。龍膽瀉肝湯。見腹痛。

○曾見白濁人。服涼茶不效。一味生白果
即愈。

○脾虛下陷者。補中益氣湯。加半夏。茯苓。
○有小便如常。放流濁物。兩尺脈沉弱。足膝
痿弱。白濁頻數。凝白如油。光彩不定。漩脚澄
下。如膏糊。六味丸。加草薢。麥冬。

○莖中大痛。便赤口渴。脈來滑數者。宜與
清熱利水。津液自行。四苓散加生地。麥冬。苓
梔。知檉之類。

○丹方。治白濁用枸杞一錢五分。兔絲子。
車前子。韭子。各一錢。蓮子去心。二十一粒。入

獾豬尿。浮內。煮一伏時。加葱酒。啜汁并食。豬
浮蓮子。連服二三次。効。

○白淫者。一時流放白水。火鬱故也。加味
逍遙散。

○小腹急痛。便溺失精。澁出白液。桂枝加
龍骨牡蛎湯。脾風傳腎。小腹痛。寃熱出白液。
名曰蠱。左傳以喪志。名為蠱。病乃真元不守
也。當歸內補建中湯。加黃耆。

○筋仙者。莖中作痛。筋急縮。或作癢。或腫。或
筋緩不收。白物如精。隨溺而下。此腎不虛。而
肝經溼熱。火旺也。龍膽瀉肝湯。

○脈大而瀉。按之無力。或微細。或沉緊而瀉。
為虛。動滑為實。尺脈虛浮。急疾者。皆難治。遲
者易治。

淋

諸淋所發。皆腎虛而膀胱生熱也。水火不交
心腎氣鬱。遂使陰陽乖升。清濁相干。畜在下
焦。故膀胱裏急。膏血砂石從水道出焉。於是
有淋瀝不斷之狀。甚者窒塞其間。令人悶絕。

凡小腸有氣則小便脹。小腸有血則小便澀。小腸有熱小便痛。制劑之法。並宜流行滯氣。疏利小水。清解熱邪。其於平調心火。又三者之綱領焉。心清則小便自利。血不妄行。最不可用補氣之藥。氣得補而愈脹。血得補而愈澀。熱得補而愈盛。水竇不行。加之穀道閉遏。未見其有能生者也。雖然腎氣虛弱。囊中受寒。而成淋澀者有之。其證先寒慄而後澀血。蓋冷氣與正氣交爭故也。又有胞系轉戾不通者。其證臍下急痛。小便不通。凡強忍小便。疾行走馬。或忍入房。使水氣逆上。氣迫於胞。故屈戾而不得舒張也。胞落則殞。

○石淋者。臍腹隱痛。小便難痛不可忍。漉如砂石。或黃赤。或渾濁。色澤不定。正如湯瓶久受煎熬。底結白碱。宜清其積熱。滌其砂石。如麥冬。葶藶。木通。葵子。滑石。車前。連翹。瞿麥。知母。瀉痛甚者。為膀胱畜血。加琥珀。肉桂。大黃。辛溫以散之。加葵子。茯苓。專治石淋之聖藥。紫雪又佳。

○勞淋者。遇勞即發。小便淋瀝而不斷。有

脾勞腎勞之分。勞於脾者。補中益氣。加車前。沃瀉。勞於腎者。六味丸。加麥冬。五味。

○血淋者。雖主實主血。而與小腸為表裏。然須看血色。分冷熱。色鮮紫者。為小腸實熱。小腸熱甚。而血滲胞中。與漉俱下。大劑生牛膝為主。兼車前。山梔。生地。紫苑。犀角。桃仁。蘆根汁。生藕節汁。血虛而屢熱者。用生地黄三兩。黃芩。阿膠。各半兩。栢葉少許。水煎服之。此千金法也。若色瘀淡者。屬腎與膀胱虛冷。生料六味丸。加肉桂。蘆根搗。水煎。候冷服。若兩尺脈沉弦而數。必有瘀血停蓄。犀角地黃湯。加紫苑牛膝。若琥珀。麝香。當歸。川芎。單解。木通。白朮。香燥破血利水耗氣之類。切禁。

○氣淋者。氣化不及。州都胞中氣脹。小腹滿堅。溺有餘瀝。宜沉香。肉桂。茯苓。沃瀉。佐以木通。瞿麥。葵子。山梔。石葦。之類。實則氣滯不通。臍下妨悶。加香附。木香。不應。加硝黃。溺後疼痛。去石葦。木通。瞿麥。葵子。山梔。加秋石。生甘州梢。藕汁。氣淋服利水藥。不能通者。沉香降氣。四磨湯選用。

○膏淋者。儼若脂膏。或便中有如蛭蝓之狀。此名肉淋。乃精溺俱出。精塞溺道。故便欲出不能而痛。宜茯苓。秋石。沉香。海金沙。沢瀉。滑石。如不甚痛者。須固瀼其精。慎勿誤與通利。鹿角霜。肉蓯蓉。兔絲子。蓮鬚。芡實。山茱之類。或桑螵蛸。兔絲子。等分。沢瀉減半。蜜丸服。以六味丸。合聚精丸。調補之。

○冷淋者。寒氣客於下焦。水道不宜。滿於胞內。淋瀼而白。先發寒慄。而後便數成淋。宜金匱腎氣丸。加鹿茸。沉香。戴氏云。進冷劑愈甚者。此是冷淋。牛膝。半煎。湯。加鹿茸少許。下八味丸。冷淋小便閉瀼。數起不通。竅中苦痛。憎寒凜々。或因煩渴飲水過多。水積胞中不行。生附子散。不應。用括萋。瞿麥湯。

生附子散

生附子

滑石各半

瞿麥

半夏湯泡七次

木通各七

為散。每服三錢。姜七片。燈心二十莖。水煎入鹽半匙。空心冷服。

括萋瞿麥丸

治小便利。有水氣。口渴腹中

冷。

括萋根二兩

茯苓

薯蕷各三兩

瞿麥穗一兩

附子一枚

右五味為末。煉白蜜丸。梧子大。飲服三十丸。日三服。不知。增以小便利。腹中温為知。

○熱淋者。心肺蘊熱。不能滋其化源。小便赤瀼如血。而少煩渴引飲者。導赤散。加黃芩。躁熱不渴者。滋腎丸。或淡竹葉煎湯。調辰砂益元散。

○凡人服金石大毒。以助入房。敗精流入胞中。及飲食痰積滲入者。則皆成淋。或忍精不泄。停凝作痛。而致淋者。木通。車前子。牛膝。沢瀉。茯苓。滑石。甘草。或湯丸俱有效。有膏梁太過。食積成痰。流注為淋。宜尿浸山查。川連。丹皮。海石。玄明粉之類。

○小便艱瀼如淋。短而不作痛者。虛也。六味丸。加鹿茸。肉蓯蓉。如莖中不痛。而癢者。此屬精虛。八味丸。

○小便淋瀝。莖中痛不可忍。相引股下痛者。參苓琥珀散。

參苓琥珀散

人參

延胡索

各五

丹皮

一作柴胡

茯苓

川棟子

煨去皮核

琥珀

各二

沃瀉

當歸梢

甘草梢

生各三

為散。每服四錢。長流水煎。去滓熱服。日進二服。

○有五苓散不効者。用生料鹿茸丸却愈者。此下元虛冷之故也。

○胞痺。小便淋瀝瀦痛。腎虛膀胱積熱也。腎瀝湯。見痺。

○胞痺不得小便。小腹痛。若沃以湯。則小便雖瀦。而畧通者。此膀胱虛寒也。茯苓丸。見痺。虛寒甚者。已戟丸。見痺。

○老人精氣已衰。猶不絕慾。小便淋瀝。小腹脹閉。而牽引穀道。或溺血梗痛。腎氣丸。加牛膝。

○熱極成淋。莖中痛。五苓散桂。減大半。加滑石。木通。生甘草梢。

○口苦咽乾。小便赤瀦。或欲成淋。清心蓮子飲。

○伏暑成淋。五苓和益元散。虛人生脈散。不時服之。

○小便自清。後有幾點血者。五苓加牛膝。熟地。紫苑。

○有因怒而致淋者。非青皮。沉香。山梔。木通。不能已也。

○有因思慮而成淋者。歸脾湯。和五苓散。並進。

○汗多而小便痛。暑月常有之。盛暑冷飲既多。上停為飲。外發為汗。津液不通。小腸閉塞。五苓散。加人參。甘草。名春澤湯。

○老人氣虛下陷成淋。補中益氣。加水通。沃瀉。以升麻柴胡。升九地之陰。木通。沃瀉降九天之陽。

○心脾血虛。歸脾湯。辰砂妙香散選用。

○淡秋石。治血淋。莖中熱痛。降火最捷。但元氣下陷。小便多者。禁用。

○血淋服諸菜不効。一味薏苡根搗汁服之。

○血淋。每日用黃蘗絲二兩。煮湯飲七日必

効。留絲煨灰存性。蜜丸服之。并主婦人血崩。又生雞子。每日清晨。沸湯調服。

○牛膝三兩。煮成入麝香少許。頓服。名地隨湯。此治血淋要劑。但淋久不止。元氣虛陷者。為切禁。且虛人能損胃氣。及崩淋下血不止者。皆不宜服。以其滑精故也。

○朴硝雪白者。治痛淋殊効。每服二錢。血淋用冷水下。氣淋木通湯下。石淋炒研用溫水下。

○石膏煨火。同琥珀。滑石。乃石淋之要藥。然須質壯初起者宜之。

○老人絕欲太早成淋。生菜豆水浸。搗汁服之。然不若淡秋石搗水飲之。其効如神。一切淋濁。屬實熱者。應手効。稍涉陰虛。甚於砒鴆。不可不慎。

○診少陰脈數。婦人則陰中生瘡。男子則氣淋。盛大而實者生。虛小而僭者死。

遺精

夢與人交接為夢遺。相火之強為患。不因夢

感而自遺者。為精滑。心腎之傷居多。

○因思想無窮。所願不得。而為白淫者。治法有五神氣浮遊。宜補中益氣湯。加菖蒲。下

硃砂安神丸。

○思久成痰。迷於心竅。宜先服四七湯。以豁其痰。後用猪苓丸。威喜丸調之。

猪苓丸

治肥人溼熱傷氣。遺精便濁。瀉痛

半夏

破如豆大。取淨二兩。

猪苓

去黑皮。切片。以米糊。裹。晒乾。為末。淨二兩。

先以猪苓末一兩。同半夏炒。勿令焦。放地上。出火氣。取半夏為末。打糊同炒。過猪苓為丸。

梧子大。候乾。更以猪苓末一兩。同炒微裂。甃罐收貯。空心淡塩湯下。三四十丸。未申間。溫酒再下一服。

威喜丸

治溲溺如甜。瀉痛夢泄。便濁屬

火鬱者。

蜂蠟

白茯苓各四兩

右以茯苓為小塊。如骰子大。用猪苓二兩。煮汁一升。去滓。煮入茯苓。汁盡。晒乾為末。溶蠟為丸。如彈子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐下。以小便清為度。忌米醋。尤忌怒氣勞力。

○思想傷陰。八味丸。去附子。加酒黃蘗。以滋養之。

○用心太過。心不攝腎。以致失精者。遠志丸。

○因思慾不遂。則耳聞目見。其精即出。名曰白淫。辰砂妙香散。

○色慾過度。下元虛憊。滑泄不禁。六味丸。

加鹿茸。五味。龍骨。

○失精夢泄。亦有因鬱火而得。故壯年火盛。多有流溢者。若虛冷用熱劑。則精愈失。

滋腎丸。加生地。茯神。杏仁。菖蒲。

○夢遺為肝熱膽寒。以肝熱則火淫於外。不

內守。故多淫夢失精。或時心悸。肥人多此。宜

清肝。不必補腎。溫膽湯。加人參。茯神。杏仁。蓮

肉。

○遺精腰疼。六味丸。加杜仲。五味。兔絲。菴

蓉。中年以後。還少丹。

還少丹。治老人。心脾腎三經精血不足。精髓

不固。

厚杜仲炒 川牛膝酒浸 巴戟天肉

山茱萸肉去膏 肉苁蓉酒浸 白茯苓各二兩

遠志肉甘草製 五味子 楮實子各二兩

乾山茱 枸杞子 熟地黃各四兩

石菖蒲 茴香益水炒

煉白蜜同紅棗肉為丸。梧子大。每服五七十

丸。清晨鹽湯。卧時溫酒送下。○精滑。去牛膝

加續斷。二兩。即打老兒丸。

○精氣不足。吸々短氣。遺精盜汗。脩生鹿茸

丸。

○斷喪太過。滑泄不禁。兼心脾氣虛。飲食少

進者。金鎖玉關丸。加參。薯。

金鎖玉關丸 治心腎不交。遺精白濁。

芡實 蓮肉去心 藕節粉 白茯苓

乾山茱等 石菖蒲 五味子減半

為末。金櫻子熬膏代蜜。搗二千下。丸如梧子

大。每服五十丸。饑時醇酒米湯任下。

○脾腎俱虛。敗精失道。精滑不固者。九龍

丹。去當歸。加草薢。五味。然不若萃仙丸尤妙。

所謂敗精失道者。非敗精不泄。而有所畜滯

也。以精竅屢開。不能閉塞。失其常度。而流溢

不止。故宜止儲之劑。

九龍丹 治斲喪太過。敗精失道。滑泄不禁。

枸杞子 金櫻子 蓮鬚

蓮肉 芡實 山茱萸

當歸身 熟地黄 白茯苓

為末。酒糊丸。梧子大。每服百丸。或酒。或鹽湯下。

經進萃仙丸 康熙癸酉。太常伯王人宦進。

沙苑蒺藜 八兩。淘淨。隔紙。微焙。取末。四兩。

山茱萸 酒蒸。去核。取淨。四兩。 芡實 四兩。同。

白蓮藥 四兩。酒洗。曬乾。 枸杞子 四兩。

克絲子 酒浸。蒸爛。搗。二兩。 川續斷 去芦。酒洗。二兩。

覆盆子 去蒂。酒浸。九蒸。九晒。取淨。二兩。 金櫻子 去淨。毛。子。二兩。

右九味。共為細末。以所留蒺藜粗末。同金櫻子熬膏。入前細末。拌勻。再加煉白蜜為丸。如梧桐子大。每服八十九丸。漸加至百丸。空腹淡鹽湯送下。

○小便過多。而便後常有滑精者。補中益氣湯。下縮泉丸。痛而小便頻數者。禁用。縮泉以益智壯火。烏菴耗氣。非陰虛多火人所宜。○遺精莖中癢。而水道不禁。是陽虛有火。加

減八味丸。

○脾虛不能隄水。水虧不能制火者。聚精丸加參。朮。芡實。蓮鬚。五味。常服。

○大抵夢遺。多是陰虛。火氣用事。苟非確係陽虛。桂。附。鹿茸等。助陽之藥。慎勿輕用。非確係氣虛。參。朮。遠志之輩。益氣之味。不可漫施。觀夢遺必在黎明。陽氣發動之時。其陰虛陽擾可知矣。

○凡身有熱。而脈洪滑。皆因於熱。犀角。山梔。麥冬。茯神。竹葉。木通。豬苓。生地。蓮肉。

○凡屬鬱滯積熱等證。貴在疏泄。醫者不知。但用固瀉。反增其疾。宜滋腎丸。豬苓丸。清利之藥。肥盛之人。遺濁。滾痰丸。下之最妙。

○脾胃溼熱之人。及飲食厚味太過。與酒客輩。痰火為殃。多致不夢而遺泄。宜二陳湯加二朮。厚朴。黃檗。升柴。清升濁降。脾胃健。而遺滑止矣。

○仲景治失精夢交。少腹弦急。脈虛遲。或乾動微緊。用桂枝龍骨牡蛎湯。及手足煩熱。咽乾口燥。或悸或衄。此陽上升而不降陰。獨

居內而為夢。用小建中湯和之。此世俗之所昧也。

○遺精之源有三。有斲喪太過。腎氣不藏。無夢而遺者。當益精以壯火。如鹿茸丸。安腎丸。聚精丸。九龍丹。金鎖玉關丸之類。有勞心太過。心腎不交。酣臥而遺者。當實脾土。以隄水。如歸脾湯。妙香散。遠志丸。補中益氣湯。珠砂安神丸之類。有思想無窮。所願不得。妄夢而遺者。當瀉火以寧水。如滋腎丸。咸喜丸。本事豬苓丸。清心蓮子飲之類。三者其源各異。若當清利而反補。滋患愈甚。當補瀉而反清利。陽氣愈微。當升補而反滋陰。元氣愈陷。不可不求其故而施治也。

交腸

交腸之病。大小便易位而出。或因醉飽。或因大怒。遂致藏氣乖亂。不循故道。法當宜吐。以開提其氣。宜五苓散。加木香。以探之。肥盛多痰者。二陳湯。加枳實。木香。以探之。使闕門清利。得司必別之職。則愈矣。

○石頑曰。交腸證。雖見於方書。而世罕見。綠石。詹石。匠之婦。產後五六日。惡露不行。腹脹喘滿。大便從前陰而出。省其故。緣平昔酷嗜烟酒。所產之兒。身軟無骨。因而驚駭。遂患此證。余以芎歸湯。加菘朮。肉桂。炒黑山查。一服。惡露通而二便如常。又小兒四歲。新秋患血痢。而稀糞出於前陰。作冷熱不調。為食積治。與五苓散。服香連丸。二劑而愈。又一女十三。體肥痰盛。因鄰居被盜。發熱頭痛。嘔逆而青。六脈弦促。而便溺易位。此因驚氣亂痰。襲竅端所致也。與四七湯。下礞石滾痰丸。開通痰氣而安。

痔 漏

痔證之方不一。東垣雖分溼熱風燥四治。大都不離蕩滌瘀熱之茶。如蝟皮。皂角。檳榔。大黃。桃仁之類。在所必用。兼風毒。則加羌防。升柴。甚則麻黃。藜蘆。汗之。兼燥氣。則加秦朮。當歸。黃耆。溼勝則加蒼朮。黃蘗。沃瀉。茯苓。兼熱甚則加芩。連。郁李。生地。膿血則加甲片。歸尾。

酒痔則加枳。橘。木香。紫蘓。食積則加黃連。枳實。麩。癖。痛極則加乳。沒。血多則加髮灰。氣虛則加參。耆。血虛則加膠。艾。

○血痔諸菜不應。石煤。槐花。空心烏梅湯服之如神

○諸痔欲斷其根。必須枯菜。當實其竅。必戒房勞。百日方妙。凡治內痔。先用通利菜。蕩滌臧府。後以喚痔散。填入肛門。其痔即出。欲用枯痔散。先以護痔膏。圍護四邊好肉。然後上之。上枯菜後。色黑堅硬裂縫。則以落痔湯洗之。脫落後孔竅不收者。以生肌散摻之。至於於穿腸久漏者。另有胡連追毒丸。黃連閉管丸。主之。諸痔及五癭六瘤。凡帶小而頭大者。俱用煮線方。

喚痔散 治內痔不出。

草烏頭生用一錢 刺蝟皮燒存性一錢 枯礬五錢
食鹽炒三分 麝香五分 冰片三分

為散。先用溫湯洗淨。隨用津唾調菜三錢。填入肛門。片時即出。去菜。上護痔膏。

護痔膏

白芨 石膏 黃連各三錢 冰片

麝香各二分

為細末。雞子清入白蜜少許。調成膏。護四邊好肉。方上枯痔散。如痔旁肌肉堅者。不必用此。

枯痔散 凡痔瘡突出。即用此菜。

白礬二兩 蟾酥二錢 輕粉四錢
砒霜一兩 天靈蓋青鹽水浸煨赤清
水內煨七次四錢

共研極細末。入小新鐵鍋內。上用磁碗蜜蓋。塩泥封固。炭火煨至二炷香。待冷取茶研極細末。鉛罐收貯。每日上午。葱湯洗淨。用津唾調捻如錢厚。貼痔上令著。以薄綿紙按輭掩上。捲束其菜。不使侵好肉上。若內痔。至晚再換一次。至六七日。其痔枯黑堅硬。住菜待其裂縫自落。換落痔湯洗之。

落痔湯一名起痔湯

黃連 黃礬 黃芩 大黃 防風
荆芥 梔子 槐角 苦參 甘草各一兩
朴硝五錢

右作三服。用水煎洗。待痔落之後。搽生肌散。

生肌散

如痔傍肉不赤腫。枯黑即落。不必用此。

乳香

沒茶

海螵蛸

黃丹

赤石脂

龍骨

血竭

熊膽

輕粉

冰片

麝香

珍珠

為極細末。鉛罐收貯。早晚搽二次。膏掩漸斂而平。

胡連追毒丸

治痔漏不拘遠年近日。有漏通腸。汚從孔出。先用此丸追盡膿毒。

胡黃連

刺蝟皮

麝香

為末。陳米爛飯為丸。麻子大。每服一錢。食前

溫酒下。服後如膿水反多。是藥力到也。勿懼

之。俟膿水將盡。服黃連閉管丸。

黃連閉管丸

胡黃連

穿山甲

石決明

槐花

為末。煉白蜜丸。麻子大。每服一錢。晨昏各一

服。米飲下。至重者四十日愈。如漏之四邊有

硬肉突起者。蟹繭二十枚。炒末和入藥中。治

遍身諸漏皆效。

煮線方

治癭瘤及痔根細者。

芫花

壁錢

用細白扣線三錢。同上二味。用水一碗。盛貯

小磁罐內。緲火煮。至湯乾為度。取線陰乾。凡

遇前患。用線一條。大者用二條。雙扣繫於根

蒂。兩頭留線。日漸緊之。其患自然紫黑冰冷

不熱為度。輕者七日。重者十五日。後必枯落。

後用珍珠輕粉。韶粉冰片為散。收口至妙。

○洗痔法。用生蚌。劈開取水點。即用煮湯。薰

洗。效。痔嫩赤腫痛。以真熊膽。研水點之。腫痛

自消。

○一方用大蝸牛一箇。去殼。生銀杏肉一枚。

同研爛。入冰片半分。研勻點上。即收漏。

○漏近則常淡紅。或微腫。或小核。久則上

而槁白。內而黑爛。滯臭惡臭生焉。治法宜補

氣生血。外以黑附子為末。唾津和作餅。如錢

厚。以艾灸之。隨漏大小作炷。但灸微熱。不可

使痛。乾則易。困倦則止。來日再灸。直至內平

為效。須補茶常服。

○丹方。以鰾膠一味。炒研為散。日用一錢匙。

砂糖調服。服久痔自枯落。

○漏瘡孔中多有惡穢之物。以露蜂房白芷。並苦參煎湯。無風處薰洗。日三次良。

洗痔消腫方

戴菜一名魚腫草

苦楝根

朴硝

馬齒莧

瓦礫花各一兩

用水十碗。煎至七八碗。先薰後洗。諸痔腫痛。可消。故附錄之。

附方

痔經驗之方

升麻

荆芥

紫根

羌活各二兩

當歸

川芎

芍藥

大黃

木通各一兩

甘草少

右水煎服

一方

諸痔通用

無花菓一錢

熟地黄二分

甘州一分

右水煎服。無花菓。七月未熟時採之。輪切千。剝生用。或痔養生茶。採葉細末。久服下血亦治。

治內痔下血

柿黑燒

右塩湯送下

又方

神馬草霜

甘州末少

右白湯送下

○治痔大便後血出不止。并走血。

十全大補湯加黃芩

脫肛穀道痒痛

產育及久痢。用力過多。小兒氣血未壯。老人氣血已衰。故多患此疾。是氣虛不能約束。禁固也。大劑補中益氣湯為主。升麻須用醋煮。○瀉利後。大腸氣虛。肛門肛出不腫不痛。屬氣血虛。補中益氣。加伏龍肝。赤腫有痛。宜兼涼血祛風。加羌活。防風。芍藥。裏急下重。有膿血。加木香。烏梅散。見傷寒。外用朴硝煎湯。○大腸熱甚。而脫。升麻湯。加羌活。防風。芍藥。連。○腸風下血。而脫。人參胃風湯。見下血。○老人虛人。用力過度。而脫者。十全大補湯。○腸胃燥滯。大便秘結。努掙大過。因而脫肛者。人參固本丸。見虛損。加槐角。涼補以潤。

之。
○有腸頭作癢。腹中有畏。丈夫因酒色過度所致。大腸者傳道之官。腎者作強之官。蓋腎虛則泄母氣。肺虛則大腸不收。故成脫肛。治法內服黃連犀角散。外用朴硝煎湯洗之。

○大腸虛而挾熱。肛門紅腫。槐花。槐角等分。羊血拌。炙熟為末。以酒送下。

○大腸受熱。則赤腫。受寒。則白滑。皆能脫出。當審其因證。寒者以香附。荊芥。胡葱煎湯洗之。熱者以五倍子。朴硝。白礬煎湯洗之。風熱以荊芥。薄荷。朴硝煎湯洗之。

○緋赤腫痛。不可用熱湯薰洗。尤忌五倍子等酸瀋收斂。湯氣蒸發。則愈腫愈痛。宜熊膽磨水點之。或出螺去掩。入冰片少許。埋地一宿。化水點之。

○病勞人。脫肛。骨肉相失。聲散。嘔血。陽事不禁。夢寐交侵。呼吸不相從。晝涼夜熱者死。唾膿血者亦死。其肛不數而有根蒂。及頰不赤者生。

小兒脫肛。鼈頭燒灰塗之。

●穀道癢痛。多因溼熱生。畏。欲成痔瘻。宜雄黃入艾綿燒烟薰之。

○治穀道。赤腫或癢。或痛。用杏仁搗汁膏傳之。或炒令黃。以綿蘸塗穀道中。

○外臺治下部。畏。齒。桃葉一斛。蒸之。令極熱。內小口器中。坐定薰之。畏立死。

○治肛門腫痛。用木鼈子肉四五枚。研極細。沸湯泡洗。另用少許。塗患處。

附方

治脫肛奇方

香附	荊芥	茯苓	黃耆
大黃 <small>各中</small>	白芷	芍藥	白木 <small>各小</small>
人參	沉香	木香	甘草 <small>各少</small>

右煎服

又方

胡椒 <small>一兩</small>	山梔子 <small>炒</small>	石榴皮 <small>炒各五分</small>	五倍子 <small>二分</small>
----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

右細末糊丸。每日六十九。白湯送下。

汗

陰虛者陽必痿。故發熱自汗。當歸六黃湯。陽虛者陰必乘。故發厥自汗。黃耆建中湯。甚者少加附子。營血不足自汗。黃耆建中湯。加當歸。甚者加熟地。衛外之陽不固。而自汗。耆附湯。脾中之陽衰微。而自汗。朮附湯。腎中之陽浮遊。而自汗。參附湯。

當歸六黃湯 治榮血虛熱自汗

三黃湯。去大黃。加黃蘗。黃耆。生地黄。熟地黃。當歸。汪石山去黃蘗。藥加薄荷。

參附湯 治脾腎陽虛厥逆自汗

朮附湯。去朮。加人參一兩。

耆附湯 治元陽衰弱虛風自汗

朮附湯。去朮。加黃耆一兩。炒蜜酒

○身冷自汗。陰躁欲坐泥中。脈浮而數。按之如無。此陰盛格陽。真武湯冷服。

○肺氣虛者。因其皮毛。玉屏散。

玉屏散 治衛虛自汗。易感風邪。用此補脾實衛。

黃芪 六兩 防風 二兩 白朮 四兩

右為散。每服四五錢。加姜棗煎服。

○脾虛。壯其中氣。補中益氣湯。

○心虛者。益其血脈。當歸補血湯。

○肝虛者。理其疏泄。逍遙散。

○腎虛者。助其封藏。都氣丸。

○火氣炎上。胃中之溼。亦能作汗。可用涼膈散。

○脾胃不和。外挾風溼。身重汗出。羌活勝

溼湯。

○風溼相搏。時自汗出。防己黃耆湯。

○惡風自汗。桂枝湯。

○又有漏風。一名酒風。不論冬夏。額上常

有汗出。此醉後當風所致。經曰。有病身熱。解

情汗出如浴。惡風少氣。病名酒風。治之以澤

瀉。木各十分。麋啣五分。合以三指撮。為後飯

又曰。飲酒中風。則為漏風。漏風之狀。多汗常

不可以單衣。食則汗出。甚則身汗喘急。惡風

衣常濡。口乾善渴。不能勞事。先宜五苓散。熱

服取汗。後與黃耆建中。加白朮。沃瀉。

○汗出日久。用參耆朮附等茶。不効。汗乾仍

熱。此風邪伏於經絡。暫與參蘇飲。病已止服。

此反治也。

○汗出不止。名曰亡陽。以附子理中湯加黃耆。外用溫粉撲之。

○痰證汗自出。痰消汗自止。二陳加桂枝。枳。桔。香附。貝母。

○多汗惡風。食則汗出如油。久不治。必成消渴。玉屏散。少加煨牡蠣。

○病餘氣血俱虛而汗。服諸汗藥不應。用十全大補湯半劑。加熟棗仁五錢。若胸膈煩悶。不能飲陰藥。生脈散。加黃耆二錢。當歸六分。熟棗仁三錢。一服即驗。

○別處無汗。獨心胸一片有汗。此思傷心也。其病在心。名曰心汗。歸脾湯。倍黃耆。

○汗出而喘甚者不治。○汗出而脈脫者不治。○汗出身痛甚者不治。○汗出髮潤。至顛者不治。○汗出如油者不治。○汗出如珠者不治。○汗出如膠。膠粘如珠之凝。及淋漓如雨。揩拭不及者。皆不可治。

●盜汗 男子平人。脈虛弱微細者。善盜汗出。蓋平人脈虛弱微細。是衛虛不能鼓其脈氣於外。所以不能約束津液。當衛氣行陰。目瞋之時。血氣無以固其表。腠理開則汗醒。則行陽之氣復散於表。則汗止矣。名曰盜汗。亦名寢汗。此屬水虛。與傷寒邪在半表。不同。先與當歸補血湯。加炒棗仁半兩。數服後。與都炁丸。調補之。酒客睡中多汗。此溼熱外蒸也。二妙散。加白朮。防風。牡蠣。

○血熱盜汗。當歸六黃湯為專藥。虛人多加參耆。減芩。連身熱加地骨皮。肝虛加棗仁。肝實加龍膽草。煩心加竹葉。辰砂。麥冬。脾虛去芩。連。加白朮。白芍。

○傷寒。陽明少陽證盜汗。柴胡葛根湯隨證主治。溫熱。三陽合病。目合則汗。白虎湯。

●頭汗。頭為諸陽之會。額上多汗而他處無者。溼熱上蒸使然。或畜血結於胃口。迫其津液上逆所致。

○畜血頭汗出。劑頸而還。犀角地黄湯。

○頭汗小便不利而渴。不能飲。此瘀畜膀胱也。桃核養氣湯。

○胃熱上蒸。額汗發黃。小水不利者。五苓

散加茵陳甚則茵陳蒿湯微利之。

○傷寒脇痛耳聾寒熱口苦頭上汗出劑頸而還屬少陽。小柴胡加桂枝芍藥和之。九

頭汗服和營衛遂溼豁痰理氣散瘀藥或發寒熱下體得汗者為營衛氣通日漸向愈之

機也。

○食滯中宮熱氣上炎亦令頭汗。生料保和丸倍用姜汁炒川連。

○病後產後悉屬陽虛誤治必死傷溼額上汗出下之微喘者死下後小便不利者亦死。

傷寒陰毒等證額汗見緒論。

●手足汗。脾胃溼熱傍達於四肢則手足

多汗熱者二陳湯加川連白芍冷者理中湯加烏梅弱者十全大補去芎加五味子。

●陰汗。陰間有汗屬下焦濕熱龍膽瀉肝湯加風茶一二味風能勝濕也。或當歸龍薈丸及二妙散俱効。陰囊濕者以爐甘石煨過撲之蜜陀僧末亦佳。

●半身汗出。夏月止半身汗出皆氣血不充內挾寒飲所致偏枯及夭之兆也。大劑十

全大補湯。人參養營湯。大建中輩。加行經豁痰藥治之。若元氣稍充即間用小續命湯一劑以發其表。或防已黃耆湯加川烏以散其溼。此證雖屬血虛慎不可用四物陰藥以其閉經絡故也。

●汗之源不一。有因於衛氣疎者有因於營氣熱者有因於營衛不和者。蓋風邪干衛則腠理疎營氣乘表虛而外泄則自汗。治當散邪為急宜從仲景桂枝湯建中輩。遲則營氣外亡邪氣內入必變府實潮熱矣。又宜三

養氣選用。此皆外感自汗也。若鬱熱內蒸亦必從空竅發泄。或從腸胃下奔。或從皮毛外

達則鬱熱得散。然外泄輕於下奔。蒸熱勝於乾熱。以此驗營衛之枯與不枯也。當從內傷

虛損例治之。至於邪正交加非汗不解。故少

陽挾熱或為盜汗。或腋汗。服汗須知從陰陽

交互時及陰陽交互處發泄者皆陰陽不和。

半表半裏證。小柴胡逍遙散皆合劑也。及手

挾風邪痰溼之類亦多有之。至如頭汗或為

溼熱上攻或為瘀血內結亦屬陰陽不和。其

於陰汗。股汗。又為肝家溼熱下滲之微驗。豈可一槩施治乎。

○汗家腠理疎豁。其脈必緩。兼浮。則為風。兼滑。則為痰。兼大。則為熱。兼弱。為衛虛。兼芤。為失血。兼遲。為氣虛。兼細。為陰虛。經云。肺脈軟而散者。當病灌汗。肺脈緩甚。為多汗。尺瀦脈滑。謂之多汗。病風人。脈緊數浮沉有力。汗出不止。呼吸有聲者死。不然則主病氣。

虛煩

虛煩類傷寒者。詳於傷寒門宜參看。

○肝虛。腎虛。脾虛。皆令人體重煩冤。是知煩多生於虛也。

○大法津液去多。五內枯燥而煩者。八珍湯。加竹葉。棗仁。麥冬。見虛損。

○營血不足。陽盛陰微。而煩者。當歸補血湯。下硃砂安神丸。或生脈散。加歸地。棗仁。竹茹之屬。

○腎水下竭。心火上炎。而煩者。大劑生料六味丸。少用肉桂。為引導。

○肥人虛煩不眠。為飲。溫膽湯。

○大病後有餘熱。嘔吐欬逆。虛煩不安。竹葉石膏湯。

○五心煩熱。口乾唇燥。胸中熱悶。千金竹葉湯。

竹葉湯

竹葉

小麥各三

知母

石膏各一

茯苓

黃芩

麥門

人參五錢

生姜二兩

括蕒根

半夏

甘艸各三

右十二味。以水一斗二升。煮竹葉。小麥。取八升。去滓。內棗。煮取三升。分三服。老幼分五服。

○虛煩。懊懣。顛倒不安。梔子梔湯。不應加犀角。黑參。

○久病餘熱不止。虛煩不安。臥寐不寧。六味丸。加棗仁。

○煩而小便不利。五苓散。加辰砂。滑石。

○煩而嘔。不喜食。金匱橘皮竹茹湯。見嘔吐。胎前產後。諸煩。見婦人本門。

煩躁

凡傷寒溫疫等證。有煩躁。詳於本門。

○煩者。胸中煩為內熱也。躁者。身體手足躁擾。或裸體不欲近衣。或欲投井中。為無根之外熱。急以附子理中四逆姜附輩熱藥治之。若誤認為熱。投以涼藥。則周身之火得水則外走。頃刻喘汗外脫而死也。

○獨煩不躁者。多屬熱。惟悸而煩者。為虛寒。獨躁不煩者。多屬寒。惟火旺脈實者。為熱。

○凡表證不得汗。內外皆熱。而躁亂不寧。取汗則定。

○裏實熱鬱。大便不通。無論傷寒雜證。心神不安。脈數實有力者。下之則定。

○火客心包。或酒客膏粱。上焦不清。令人煩躁。宜芩連山梔等。涼藥為君。稍以炮姜為使。甚則涼膈散下之。

○汗下後熱不止。而發狂煩躁。面赤咽痛者。此熱乘少陰之經也。葶藶苦酒湯。煩燥門。

循衣摸床

循衣撮空摸床。多是大虛。不問雜病傷寒。以大補之劑投之。多有得生者。許學士謂。肝熱風淫。未疾。故手為之。循衣撮空。其人必讖語妄言。經謂。肺入火為讖。妄是也。

○海藏云。婦人血風證。因大脫血崩漏。或前後失血。因而枯燥。其熱不除。循衣撮空摸床。閉目不醒。揚手擲足。搖動不寧。錯語失神。脈弦浮而虛。內燥之極也。生地黄黃連湯主之。生地黄黃連湯。治失血後。燥熱癰瘕。脈數盛者。

四物湯。換生地。加芩連。山梔。防風。

○熱極神昏。十餘日不大便。腹脹喘滿。氣麤鼻乾不潤。上下通躁。脈沉實而滑。急宜涼膈。兼氣下之。若熱乘肺金。氣虛不能主持。又手冒心。循衣撮空。讖語昏沉。不省人事。節菴升陽散火湯。小便利者可治。不利者不治。

節菴升陽散火湯。姜棗煎。一名撮空散火湯。

逍遙散。以茯神。代茯苓。加人參。麥門。陳皮。黃芩。

○按涼膈。兼氣氣茶也。自外而入內者用之。

生地芩連湯血蒸也。自內而至外者用之。升陽散火湯。氣虛火乘蒸也。內外合邪者用之。三方俱治不大便者。

○病人手循衣縫。譫語者。不可治。病人陰陽俱絕。掣衣摸空。妄言者死。撮空服藥。氣下之後。脈弦者生。牆者死。

健忘

健忘俱責之心腎不交。心不下交於腎。濁火亂其神明。腎不上交於心。精氣伏而不靈。火居上則因而為痰。水居下則因而生躁。躁擾不寧。是以健忘也。治法心氣不足。妄有見聞。心悸跳動。恍惚不定。千金茯神湯。見悸

○思慮過度。病有心脾者。歸脾湯。按虛痰者。加姜汁。竹瀝。精神短少。人參養營湯。送遠

志丸。見驚

○痰迷心竅者。導痰湯。加木香。

○上虛下熱。天王補心丹。見悸

○心火不降。腎水不升。神明不定。而健忘。六味丸。加五味。遠志。

○心氣不定。恍惚多忘。四君子。去白朮。加菖蒲。遠志。硃砂。等分。蜜丸。服。心氣不足。精神恍惚。少睡。夜多盜汗。怔忡健忘。辰砂妙香散。見渡血。痰積於內。而善忘如狂。代抵當丸。

驚

夫驚。雖主於心。而肝膽脾胃皆有之。驚是火熱燥動其心。心動而神亂也。

○若因內虛。故觸事易驚。或卒然聞響。大聲目擊異物。遇險臨危。皆使人有惕惕之狀也。驚則氣亂。鬱而生火。生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣。或自汗。或眠多異夢。隨即發覺。並宜溫膽湯。加熟棗仁。如遠志丸。妙香散。驚門平補正心丹。顛振龍齒清龜散。皆可選

用。臥多驚。驚。口中有聲。溫膽湯。下遠志丸。多驚。壓。遺。瀉。補。膽。防。風。湯。加。菴。活。桂。枝。此。下。焦。風。茶。行。經。也。若。氣。鬱。生。痰。而。驚。悸。不。眠。者。四。七。湯。加。茯。神。遠。志。石。菖。蒲。

遠志丸 治因事有所大驚。夢寐不寧。神不守舍。

遠志

甘草湯炮去骨

石菖蒲

茯神

茯苓

一作棗仁

人參

龍齒

酸煨各一兩

硃砂

五錢水浸一牛為衣

煉白蜜丸。梧子大。硃砂為衣。每服五十九。空心沸湯。臨臥溫酒送下。精髓不守者。加五味子半兩。陽事不舉者。加山萸。萸肉各一兩。肉桂半兩。自汗不止者。倍棗仁。加黃耆一兩。

補膽防風湯

治膽虛風襲驚悸不眠。

防風

人參

細辛

甘草

茯神

獨活

前胡

川芎

各八分

生姜

紅棗

二枚擘

水煎去滓熱服。○卧多驚魘遺洩者。本方加羌活。桂枝。膽寒者。去川芎。前胡。加熟棗仁。遠志。肉桂。白朮。有痰。加半夏。白朮。天麻。

○大抵驚則神出於舍。舍空則痰飲乘虛襲入。其神不得歸焉。亦有肝虛風襲之者。本事方。治卧則魘夢飛揚。驚悸多魘。通夕不寐。先用獨活湯。見類方。數劑後。用珍珠母丸。見類方。神效。蓋因肝藏本虛。虛風內襲。所以魘遊無定。肝藏魘者也。風氣水飲。乘虛襲入於肝。是以魘不寧。而飛揚。若離體狀。若作心血虛治。

必時上升。豈非肝藏受困之驗歟。二方非明本殆。此證最易愠怒。小怒則驚悸轉劇。虛火不盛生風。木槁生火之理。不能識其奧妙。不能用以建功也。
○脈寸口脈動為驚。驚者其脈止而復來。其人目睛不轉。不能呼氣。

悸

悸即怔忡之謂。心下惕惕然跳。築築然動。怔忡忡忡。本無所驚。自心動而不寧。即所謂悸也。心虛而停水。則胸中滲漉。水既上乘。心火惡之心不自安。使人有怏怏之狀。常築築然動。是則為悸。蓋水衰火動。則為煩。原病式曰。水衰火旺。必煩渴引飲。水停心下。而為悸也。
○心下悸。有氣虛。血虛。屬飲。屬火之殊。夫氣虛者由陽氣內微。心下空虚。內動為悸。心氣不定。五藏不足。甚者憂愁悲傷不樂。忽喜忘。驚悸狂眩。千金定心丸。見癩千金茯神湯。或六君子。加遠志。菖蒲。或瘦人。膝下有悸。吐涎沫。而顛眩。此水也。宜五苓散。

茯神湯 治心虛神氣不寧。煩熱驚悸。

茯神 赤小豆各一兩 人參各一兩

菖蒲半兩 赤小豆四十粒

右五味以水一斗煮取二升半分三服。

○血虛者。由陰氣內虛。火妄動。歸脾湯。加丹參。麥冬。

○停飲者。水停心下。侮其所勝。心主畏水。不能自安。故惕惕而動。半夏茯苓湯。茯苓甘

艸湯。或二陳湯。加白朮。豬苓。沢瀉。

○有表邪。挾飲。半夏麻黃圓。小青龍湯。選用。

半夏麻黃圓 治寒飲停蓄作悸。脈浮緊者。

半夏姜汁炮 麻黃去節

右二味為末。蜜丸如小豆。飲服三十九。日三服。

○火旺者。因水不能制火。故時悸時煩。跳動不寧。天王補心丹。不應六味丸。加五味。麥冬。遠志。

天王補心丹 治心腎虛耗。怔忡不寧。

生脈散。加熟地。茯苓。茯神。遠志。菖蒲。黑參。

丹參。栝子仁。天門冬。百部。當歸。杜仲。桔梗。

甘草。蜜丸。硃砂為衣。空心龍眼紅棗湯。下二三錢。

○有邪氣攻擊而悸者。宜審其何邪。而後治之。營衛涸流。脈來結代者。必補氣益血。灸甘草湯。

○因痰飲而悸。導痰湯。加棗仁。有時作時止者。痰因火動也。溫膽湯。加川連。

○有臍下悸動。腎氣上凌也。五苓散。加辰砂。

○有所求不遂。或過誤自悔。懊懷嗟吁。獨語書空。若有所失。溫膽湯。加人參。栝子仁。

○胸中痞塞。不能飲食。心中常有懽愛。居暗處。或倚門後。見人則驚避無地。此卑慄之病。藿香正氣散。虛者。人參養營湯。

○有真心跳。乃血少非驚悸也。又或夢中如墮岩崖。或睡中忽自身體跳動。此心氣不足也。歸脾湯。下硃砂安神丸。見內傷。

○肥人多屬痰飲。瘦人多屬血虛。與陰火上衝。

○夫悸之證狀不齊。總不外於心傷。而火動。火動而生涎也。若夫虛實之分。氣血之辨。痰與飲。寒與熱。外感六淫。內傷七傷。在臨證辨之。

○脈沉細屬飲。結代者虛而有飲。虛弱者屬氣虛。沉數者為血熱。尺中弦緊為腎氣凌心。寸口脈動而弱動則為驚。弱則為悸。

恐

恐者似驚悸而實非。忽然心中恐懼。如人將捕之狀。屬腎本藏而傍及他藏。治法則有別焉。治腎傷者。宜補精髓。六味丸。加枸杞。遠志。治肝虛者。宜養陰血。六味丸。加棗仁。龍齒。治陽明者。壯其氣。四君子。加木香。治心包者。鎮其神。遠志丸。加硃砂。琥珀。犀角。頭眩而恐。脈弦無力。屬膽虛。六君子。加紫胡。防風。當歸。兼進加減八味丸。膽虛目暗。喉痛數唾。眩目。五色所障。夢見爭訟。恐懼面色變者。補膽防風湯。見驚。

○勞心思慮傷魂者。羸瘦善恐。夢寐不寧。一

味鹿角膠酒溶多服効。

○腎藏陽虛善恐。八味丸。

不得臥

多臥 怠惰嗜臥

不寐有二。有病後虛弱。有年高入血衰不寐。有痰在膽經。神不歸舍。亦令人不寐。虛者六君子。加棗仁。痰者靈樞半夏湯。

半夏湯

治痰飲客於膽府。自汗不得眠。

半夏五合姜汁泡 秫一升

右二味。以流水揚之萬遍。煮秫米取湯。內半夏煮去滓。飲一盃。日三。稍益以知為度。

此靈樞方也。後世方書以此湯。加入黃連。遠志。生地。棗仁。乾生姜。仍用流水煎服。

○虛勞煩熱不眠。酸棗仁湯。或酸棗仁一兩。炒研水煎。絞汁下米二合。煮糜以生地五錢。搗汁入。更煮過。時時服之。

○大病後。虛煩不得眠。竹葉石膏湯。

○水停心下。不得眠。茯苓甘草湯。

○婦人肥盛。多鬱不得眠者。吐之。從鬱結痰火治。大抵膽氣宜靜。濁氣痰火擾之。則不

眠溫膽湯。用猪膽汁。半夏麴。加柴胡三錢。炒棗仁一錢五分。立效。蓋驚氣健忘。失志心風不寐。皆是痰涎沃心。以致心氣不足。若涼心大過。則心火愈微。痰涎愈盛。惟以理痰順氣為第一義。導痰湯加石菖蒲。

溫膽湯 治心膽虛怯。觸事易驚。多汗不寐。乏力。皆由寒涎沃膽所致。

二陳湯。用橘紅。加枳實。竹茹。紅棗。

○有寐中覺魂魄飛蕩。驚悸通夕不得安眠。是肝虛受邪也。其人易怒。魂不歸肝。是以飛揚。獨活湯。見類珍珠母丸。同上次第服之。

○喘不得臥。以喘法治之。蕪子。橘紅。甘草。桔梗。竹茹。

○厥不得臥。以脚氣法治之。牛膝。丹皮。木通。沉香。觀桂。

○虛勞咳嗽形脫。不得臥。不可治。

煩不得臥。諸茶不効者。施子豉湯。下硃砂安神丸。不應。益元散。加牛黃。更不應。虛火用事也。補中益氣湯。下硃砂安神丸。間進六味丸。恒服方効。有病久餘熱不止。久不得臥者。

六味丸。滋其真陰。自然熱止。安臥。

○脈數滑有力。不眠者。中有宿滯痰火。此為胃不和。則臥不安也。心下硬悶。屬宿滯。半夏。白朮。茯苓。川連。枳實。

○病後及汗下後。與瘡瘍。不得眠。屬膽虛。

人參。茯苓。棗仁。陳皮。麥冬。圓眼肉。為主。有火脈數。口乾。加知母。川連。竹茹。心煩。炒黑山梔。

○平人不得臥。多起於勞。心思虛。喜怒恐驚。是以舉世用補心安神茶。鮮克有効。曷知五志不伸。往往生痰飲。飲聚於膽。則膽寒肝熱。故魂不歸肝。而不得臥。是以內經用半夏湯。滌其痰飲。則陰陽自通。其臥立至。一少年因恐慮。兩月不卧。服安神補心茶。無算。與溫膽湯。倍半夏。柴胡。一劑卧。又有遺精。煩擾。不得卧。與六味丸。料加棗仁。數服而安。寢如常。更有一人。瘡瘍久不收斂。而不得卧。瘍醫不能療。用大劑十全大補而安。

●多卧。經云。卒然多卧者。邪氣客於上焦。上焦閉而不通。已食若飲湯。衛氣久留於陰。而不行。故卒然多卧焉。

○膽虛不眠寒也。酸棗仁一兩炒為末。醇酒調服。膽實多卧熱也。酸棗仁一兩生。為末。茶清調服。

●嗜卧。東垣云。脈緩怠惰。四肢不收。或大便泄瀉。此溼勝。胃苓湯。

○食入則困倦。精神昏而欲眠者。脾虛也。六君子。加麩。麥。山查。

○時值秋燥。怠惰嗜卧。兼見肺病。灑淅惡寒。不嗜食者。此陽氣不伸也。升陽益胃湯。

怒

怒屬肝膽經。生鐵落飲。見狂大小柴胡。疏肝。四七。四磨。越麩。七氣。沉香降氣等。皆治善怒致病之藥。

○丹溪治怒方。香附末六兩。甘草末一兩。和勻白湯調下二錢。日再服。

悲

凡肺燥悲愁欲哭。宜潤肺氣。降心火為主。生肌散。二冬膏。并加姜棗治之。未嘗不隨手而

効。

喜笑不止

河間云。喜笑者皆心火之盛也。五行之中惟火有笑。昔人治笑不休。口流涎。用黃連解毒湯。加半夏。姜汁。竹瀝。而笑止。

○張子和治一婦。喜笑不止已半年矣。以塩塊二兩。燒令通赤。放冷研細。河水煎服。探吐出熱痰五升。次服降火之劑。不數日而笑定。○一婦病氣厥。笑哭不常。人以為鬼祟所憑。診之六脈俱沉。胃脘必有積。遂以二陳湯導之。吐痰升許而愈。此痰積類祟也。

讖妄

讖。多言也。心熱則多言。妄。虛妄也。神志失常。常如見鬼。神虛病痰。病有似鬼祟。宜清神湯。見狂。或平補鎮心丹。見類方。去肉桂。山茶。五味。加琥珀。膽星。麝香。大便不通。心腹脹滿刺痛。口噤氣急者。此為實。涼膈。養氣。選用。若為邪祟治之。以金石。必死。○產後讖妄。見婦人

本門。

癲

癲之為證。多因鬱抑不遂。佗僚無聊所致。精神恍惚。語言錯亂。或歌或笑。或悲或泣。如醉如狂。言語有頭無尾。穢潔不知。經年不愈。皆由鬱痰鼓塞心包。神不守舍。俗名痰迷心竅。安神豁痰為主。先以控涎丹。見痰飲涌出痰涎。後用安神之劑。

○怒動肝火。風痰上盛而發癲狂。導痰湯加芩。連。菖。遠。煎成入硃砂。沉香磨汁。調服。

○言語失倫。常戲笑。不發狂者。心虛也。定志湯。加姜汁。竹瀝。膈間微痛者。兼有痰血。加琥珀。鬱金。

定志丸

治言語失倫。常發狂。

人參

茯神各三兩 石菖蒲

遠志

甘草湯泡去骨各二兩

右四味為末。蜜丸。梧子大。飲服七十九。亦可作湯服。○血虛加當歸。有痰加橘。半。甘草。生姜。

○因思慮而得者。先與稀涎散。後用歸脾湯。加辰砂末調補之。

○心經畜熱。或時發躁。眼鼻覺熱者。定志丸。加芩。連。麥。牛黃。實者。涼膈散。加川連。麥冬。菖蒲。

○癲病語言錯亂。神氣昏惑者。千金防已地黃湯。

防已地黃湯

治癲癩語言錯亂。神氣昏惑。

防已一錢

甘草

桂心

防風各三錢

生地黃四錢

生姜汁三匕

上四味。酒浸一宿。絞汁。銅器盛之。地黃另咀。蒸之。如斗米飯久。亦絞取汁。并入姜汁。和分三服。

○因思慮妄想不遂。致神不守舍而妄言妄見。若神崇所憑。初起用半夏茯神散。數服自愈。若日久為湯茶所泊。神出舍空。非大劑獨參湯。加姜汁。竹瀝。填補其神。不能克應。

半夏茯神散

治癲妄。因思慮不遂。妄言妄見。神不守舍。初病神氣未衰者。用此數服効。

癩狂

三百七

半夏

茯神

各一兩

天麻

膽星

遠志肉

棗仁

炒

廣皮

烏茶

木香

礞石

煨各八錢

右為散。每服三錢。水一盞煎數沸。入生姜汁數匙。空心和滓服。

○有病癩人。專服四七湯而愈。蓋氣結為痰。痰飲鬱閉其神識也。

○癩疾既久。動生疑。面色痿黃。或時吐沫。默默欲眠。此蟲積為患。妙功丸。見喪

○若癩哭呻吟。為邪所憑。非狂也。燒蠶紙。酒水下方匙。

狂

狂之為病。皆由阻物過極。故猖狂剛暴。若有附。妄為不避水火。罵詈不避親疎。或言未嘗見之事。非力所能。病反能也。上焦實者。從高抑之。生鐵落飲。

生鐵落飲

治狂妄不避親疎。

鐵落

用生鐵。火燒赤。沸。砧上。取之。有花粉。紛墜地。取汁。許。用水二斗。煮取一升。入下項藥。

石膏

二兩

龍齒

白茯苓

防風

各半兩

黑參

秦艽

各一兩

為粗末。入鐵落汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升和勻。溫服二合。日三服。

○陽明實則脈伏。大兼氣。去厚朴。加鐵落飲。以大利為度。在上者因而越之。來蘇膏。或戴人三聖散。湧吐。其病立安。後用洗心散。涼膈散調之。

來蘇膏

治遠近風癩。心病風狂。牙關不開。痰涎潮塞。

涎潮塞。

皂角

二兩。大挺。不蛀者。去皮。弦子切。

用酸漿水二升。浸透。搽汁。砂鍋內。以文武火熬。用槐柳枝。攪熬。成似膏。茶攤夾紙上。陰乾。如遇病人。取掌大一片。用溫漿水化在盞內。將小竹管盛茶。挾病人坐定。微擡起頭。以茶吹入左右鼻孔內。良久。扶起。涎出為効。啜溫鹽湯一二口。其涎即止。思雞魚。生硬。溼麩等物。

三聖散

治溼痰壅塞。

瓜蒂

炒微黃

防風

各二兩

藜蘆

半兩

為散。每服四五分。以蘆汁三盞。緩火熬至一

盡去滓。澄清放溫。徐徐服之。以吐為度。不必盡劑。

洗心散

治心經積熱。痰盛口舌生瘡。不

大小便。

麻黃連節一兩

當歸二兩

大黃酒拌麴裏三兩

白朮生用

芍藥

荊芥各一兩

甘草炙二兩

為散。每服三四錢。生姜三片。薄荷七葉。水煎去滓。溫服。或茶清調服三錢。○又方無白朮。芍藥。荊芥。甘草。多生地黄二兩。黃連。木香。各五錢。

○形證脈氣俱實。當湧吐兼利。勝金丹。見類方一服神效。雖數年狂癡。無不克應。但不可誤癩癩之證。

○非哀動中則傷魂。魂傷則狂妄不精。不精則不正。當以喜以勝之。以溫茶補魂之陽。龍齒清魂散。

○喜樂無極則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存。當以恐勝之。以涼茶補魄之陰。清神湯。肺虛喘乏。加沙參。胃虛少食。加人參。肝虛驚恐。加

羚羊角。

清神湯

治心肺虛熱。痰迷膈上。

黃連

茯苓

酸棗仁生研

石菖蒲

栝子仁

遠志肉各錢半

甘草炙五分

姜汁少許

竹瀝半杯

水煎食遠服。

肺虛加人參一錢。肺熱加沙參二錢。痰壅加半夏。南星各一錢。橘紅。括蕒霜各六分。

○熱入血室。發狂不識人。小柴胡。加犀角。生地黄。挾血如見祟狀。當歸活血湯。加酒大黃。微下之。肝盛多怒。狂妄者。鍼大敦。在足大指上。屢驗。

癩

丹溪主痰與熱。以星。半。芩。連。為主。熱多者。涼

膈散。加川連。麥冬。以泄之。痰多戴人三聖散

以吐之。如驚者。東垣安神丸。以平之。可下者。

以養氣湯下之。然後用安神平肝之劑。歸牛

黃。硃砂。青黛。柴胡。川芎之類。

○心熱痰迷心竅者。清神湯。見狂

○病久而成窠囊。窠囊日久。必至生蟲。妙功丸。見多神效。

○既與行痰滌熱。癩證已愈。然須防其再發。宜十全大補加棗仁。遠志。麥冬。稟氣素虛者。鹿角膠。經年常服六味丸。加遠志。沉香。亦不可缺。

○風癩驟發。項強直視不省人事。此肝經有熱也。或有咬牙者。瀉青丸。合導赤散。治之。如病發者。可用輕粉。白礬。代赫石。發過米飲調下。重劑以鎮之也。

○若起於眇者。四七湯。加木香。南星。發時用前菜。下靈砂丹。不得臥。用養正丹。多嘔。下黑錫丹。痰多者。導痰湯。加木香。竹瀝。

○癩病書發。灸陽蹻。宜補中益氣。加益智。夜發。灸陰蹻。宜六味丸。加鹿角膠。丹礬丸。見類。

○治五癩諸證方。用黃丹一兩。白礬二兩。銀確中煨通紅為末。入臘茶一兩。不落水。豬心血為丸。菴豆大。硃砂為衣。每服三十九。茶清送下。久服其涎。自便出。服一月後。更以安神茶調之。久患氣虛。痰氣壅塞。須防卒變。不

可安許以治也。凡見目瞪如愚者不治。治之亦必無功。

○脈浮滑洪數為風癩。細弦微緩為虛癩。浮為陽癩。沉為陰癩。虛弦為驚。沉數為實熱。沉實弦急者不治。

眼畧

羌活勝濕湯 治目疾一切風熱表證。

羌活 五分

白朮 一錢

川芎

桔梗

枳殼

荆芥

柴胡

黃芩 各八分

白芷 六分

防風 五分

細辛 二分

薄荷 三分

甘草 四分

水煎食後熱服。世本無細辛。有獨活。

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛。一切裏證。

梔子仁

荆芥

大黃

甘草 等分

為散每服四五錢水煎熱服。白睛赤痛宜用之。風輪赤痛不可用。

洗肝散 治風毒上攻。暴赤腫痛。

薄荷

當歸

羌活

防風

山梔

甘草 各一兩

大黃 酒蒸 二兩

川芎 八錢

為散每服三錢。沸湯調。日二三服。

皂莢丸

治外內一切障膜。醫嫩不宜鍼撥者。此丸與生熟地黃丸並進。

蛇蛻

酥炙七條

蟬蛻

元精石

穿山甲炮

當歸

白朮生

茯苓

穀精草

木賊

白菊花

刺蝟皮

蛤粉炒

龍膽草

赤芍

連翹

各兩半

獾猪爪

三十枚蛤粉炒

人參一兩

川芎

半兩

共為細末。一半入牙皂十二挺。燒存性和勻。煉白蜜丸。梧子大。每服一錢五分。空心食前。杏仁湯送下。一半入仙靈脾即淫羊藿一兩。每服三錢。用猪肝三片。批開夾茶煮熟。臨卧細嚼。用原汁送下。

生熟地黃丸

治肝虛目暗。膜入水輪。內外諸障。

生地黃

八兩

牛膝

酒蒸各四兩

熟地黃

十二兩

石斛

塩水炒

菊花

去蒂六兩

菴活

枳殼

各二兩

防風

杏仁

湯泡去皮

蜜丸

梧子大。每服五七十九。以黑豆三升。炒令烟盡。泮好酒六升。每用半盞。食前送下。湯亦可。或用生雞肝。搗爛為丸。尤妙。

龍膽散

治肝經濕熱目赤腫痛

黃芩

犀角

木通

車前

黃連

黑參

梔子

大黃

芒硝

各錢半

龍膽草

淡竹葉

各八分

黃檗

酒炒黑五分

水煎食後分二次熱服。

耳

風虛耳聾。排風湯。見中風。桂星散。

桂星散

治風虛耳鳴。

辣桂

川芎

當歸

石菖蒲

木通

麻黃

去節另為末各一兩

細辛

木香

一作全蝎

甘草

各五分

白蒺藜

南星

白芷

各兩半

為散每服四錢。加葱白一莖。蕪葉五片。水煎去滓。食前服。一方加全蝎去毒三錢。

腎藏風虛黃耆丸兼氣虛去附子加人參肉桂

肉桂

黃芪

酒炒

白蒺藜

炒去刺

菴活

各一兩

附子

一枚生去皮臍

為末用羯羊腎一對去脂膜勿犯鐵酒煮搗

爛絞汁。糊丸。梧子大。空心塩湯。臨臥温酒下五十九丸。

○肝腎虛火。薑蠍散。

薑蠍散

治腎虛氣塞耳聾。

全蠍四十九箇去螫。水泡去醜。以糯米切生薑四十九片。置蠍再焙。至姜焦為度。去姜。

為細末。三五日每日先服黑錫丹。見後一服。臨服某時。夜飯半饑。隨其酒量。勿令大醉。服已熟睡。勿叫醒。令人輕輕喚。如不聽得。濃煎葱白湯一碗。令飲五更耳中聞百十攢笙響。自此得聞。

○風熱耳聾。犀角飲子。

犀角飲子

治風熱上壅。耳內骨腫。脹痛流膿。

犀角屑

木通

石菖蒲

甘菊

黑芥

赤芍

赤小豆炒

甘菝灸

生姜三片

水煎不拘時熱服。

○厥聾。經云暴厥而聾。偏閉塞不通。內氣暴薄也。復元通氣散。見畜血。去白牽牛。加全蠍。石菖蒲。川芎。葱白。吞養正丹。見眩暈。

○凡耳聾。皆當調氣。肝氣逆則頭痛。耳聾頰腫。四物湯加肉桂。吞龍薈丸。降火。復元通氣散調氣。

○耳聾有溼痰者。滾痰丸下之。

○耳聾面頰黑者。為精脫腎虛。燒腎散。

燒腎散

治腎虛耳聾。

磁石煨赤醋淬。去淨一兩。

附子一枚炮。去皮臍。

蜀椒炒去汗取。椒紅半兩。

巴戟肉一兩。無鹽。

為散。每服一錢。用豬腎一枚。去筋膜細切。葱白。鹽花和勻。裹十重溼紙。於塘灰中煨熟。空心細嚼。温酒送下。以粥壓之。十日効。

○耳聾多恐者。為肝虛。温膽湯。下養正丹。

○外治通神散。草麻丸。

通神散

治一切耳聾。

全蠍炮

地龍

蟋蟀各三枚。

明礬生半。枯半。

雄黃各五分。

麝香一字。

為散。每用少許。葱白蘸茶。引入耳中。閉氣面壁。坐一時許。三日一次。

草麻丸

治久聾。

草麻仁二十粒。

皂角煨取肉五分。

地龍大者二條。

全蝎二個

遠志肉

磁石煨飛

乳香各二錢

麝香少許

為末。鑄黃蠟為丸。塞耳中。

一方 用地龍三枚。塩少許入。同入葱管内。化水滴耳中。三五日効。

一法 用磁石豆大一塊。陵鯉甲三片。燒存性。綿裹塞耳中。口銜生鐵少許。耳中如風雨聲。即愈。

○耳鳴經云。耳者宗脈之所聚也。胃中空則宗脈虛。虛則下溜。脈有所竭。故耳鳴。又云。液脫者。腦髓消。筋痿耳數鳴。凡此皆耳鳴之屬虛者也。經云。太陽所謂耳鳴者。陽氣萬物盛上而躍。故耳鳴也。又云。厥陰之脈耳鳴頭眩。又云。少陽所至為耳鳴。治以冷寒。此皆耳鳴之屬實者也。

○王汝明曰。耳鳴如蟬。或在左。或在右。或時閉塞。世人作腎虛治不効。殊不知是痰火上升。鬱於耳中而鳴。鬱甚則閉塞矣。平昔飲酒厚味。上焦素有痰火。清痰降火為主。大抵此證先因痰火在上。又感惱怒而得。怒則氣上。少

陽之火客於耳也。若腎虛而鳴者。其鳴不甚。其人多慾。當見虛勞等證。

○喻嘉言曰。凡治高年腎氣逆上而耳鳴。當以磁石為主。以其重能達下。性主下吸。不能制肝木之上吸。便以地黄。龜膠。羣陰之藥輔之。五味。山萸之酸。以收之。令陰氣自旺於木官。不上觸於陽竅。由是空曠無礙。豈更艱於遠聽哉。丹溪取通聖散。治飲酒過度而耳鳴。亦無確見。惟滾痰丸一方。少壯用之多効。以黃芩。大黃。沉香之苦。最能下氣。礞石之重墜。大約與磁石相似也。

○薛立齋云。若血虛有火。用四物。加山梔。柴胡。若中氣虛弱。補中益氣。加山梔。丹皮。若因怒便聾。而或耳鳴屬肝膽氣實。小柴胡。加芎。歸。山梔。若午前甚者。陽氣實熱也。小柴胡。加黃連。山梔。若午後甚者。陰血虛也。四物湯。加白朮。茯苓。若腎虛火動。耳中閃閃然。是無陰也。加減八味丸。

○腎虛耳中潮聲。蟬聲無休止。時妨害聽聞者。當墜氣補腎。正元散。下黑錫丹。間進安腎

正元散

紅豆炒 乾姜炮 陳皮去白各三錢 人參
 白朮 甘草炙 茯苓姜汁去皮各二兩
 肉桂 川烏炮去皮各半兩 附子炮去皮尖 山萆姜汁浸炒
 川芎 烏茶去木各壹兩 乾葛各壹兩 黃耆各壹兩
 每服二錢。水一盞。姜三片。棗一枚。鹽少許。煎七分。食前溫服。

黑錫丹

治真元虧。德陽氣不固。陰氣逆衝。
 沉香 附子 胡蘆巴 陽起石
 肉桂各半兩 藿香 破故紙 肉豆蔻
 金鈴子 木香各一兩 黑錫 硫黃與錫結
 砂子各二兩
 右為末。酒糊圓。如梧桐子大。每服三五十圓。空心姜鹽湯送下。

安腎丸

肉桂去麋皮不見火 川烏炮去皮臍各拾陸兩 桃仁碎炒
 白蒺藜炒去刺 巴戟去心 山萆去根
 茯苓去皮 肉蓯蓉酒浸 石斛去根
 草薺 白朮 破故紙各肆拾兩

右為末。煉蜜圓。如梧桐子大。每服三十圓。空心溫酒鹽湯任下。

四生散

治腎風上攻。耳鳴。目癢。昏花。
 白附子 黃耆 獨活 白蒺藜等分
 為散。每服二錢。用豬腎。批開入茶溼紙裹煨。熟稍入鹽花。細嚼溫酒送下。

○耳腫痛。屬少陽相火。犀角飲子。加腦麝為丸。經云。少陽之勝耳痛。治辛寒是也。

○耳內痛生瘡。用鼠粘子。連翹。歸。芍。芩。連。甘。桔。生。地。桃。仁。黃。耆。柴。胡。草。龍。膽。之。類。

○耳溼腫痛。用涼隔散加菴活。荆芥。外用龍骨。黃丹。等分。枯礬減半。加麝少許。吹入。或龍骨。黃丹。乾燕脂為末。亦佳。或用五倍子燒灰。同枯礬吹之。

○耳疹者。耳生瘡。屬少陽三焦。或足厥陰肝。肝經血虛風熱。或怒動肝火而致。若發熱。痛。屬三焦厥陰。風熱用柴胡清肝散。梔子清肝散之類。慎不可專治其外。復傷氣血也。有

因腎虛風熱作癢。空傷成瘡。六味丸。加白茯苓。

柴胡清肝散

治怒火憎寒發熱。肝膽風熱瘡。

癢。

小柴胡。去半夏。姜。棗。加山梔。川芎。連翹。桔梗。

梔子清肝散

治寒熱股痛。耳內作癢。生瘡。

柴胡

梔子炒黑

牡丹皮各一兩

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子

甘草炙各五分

為散。每服五錢。水煎去滓。半饑熱服。

○耳中癢。腎家有風。四生散。每作時服。二三劑即瘥。

三劑即瘥。

○耳膿者。溼熱聚於耳中也。復元通氣散。

如前加減。外以五倍子。全蠍。枯礬。為末。入麝

少許。吹入。或橘皮燒灰存性。入麝少許。先以

綿拭耳內。膿淨吹之。如壯盛之人。積熱上攻。

耳中出膿水不瘥。涼膈散瀉之。

○耳中聾。耳鳴耳聾。內有汚血。外用菜菔

搗汁。研麝少許滴入。餘法與耳聾。相參治之。

○喪入耳中。將生姜擦猫鼻。其尿即出。取尿

滴耳中。喪即出。或用炒芝麻枕之。喪亦出。

○耳中有物。不可出。以弓弦或錢串繩。剪令

頭散。蘸好膠著耳中。使其物黏之。徐徐引出

鼻

其宗氣走於鼻而為鼻。夫宗氣者。胃中生發

之氣也。因饑飽勞役。損其脾胃。則管運之氣

不能上升。邪塞孔竅。故鼻不利而不聞香臭

也。麗澤通氣湯。時值寒月。必須發散。或加麻

黃。細辛之類。於升麻湯內。春夏可用葱白白

芷之屬。佐以枯芩。蘓葉。多加桔梗。為舟楫。庶

或成功。已經發散。未得全開。脈洪有力。口乾

鼻燥者。以辛涼清之。酒芩。梔子。薄荷之屬。仍

佐荊防。升芷。不可驟用寒涼也。

麗澤通氣湯

治久風鼻塞。

羌活

獨活

防風

升麻

蒼朮

去皮切麻油拌炒

葛根

各八分

麻黃

連節四分

川椒

四分

白芷

一錢

黃耆

一錢半

甘草

七分

生姜三片 大棗二枚 葱白三寸

水煎食遠服。冬月倍麻黃。加細辛。夏月去獨活。加石膏三錢。忌一切冷物。及風涼處坐臥。
○鼻為肺竅。肺家有病而鼻為之不利也。有寒有熱。暴起為寒。久鬱成熱。寒傷皮毛。氣不得利而壅塞。熱塞清道。氣不宣通。先以葱白。白芷。香豉。羌防。紫蘊。細辛。辛黃之屬。表散後。以酒炒芎。連姜汁。炒黑山梔。生甘草。石膏。薄芎。川椒之屬。清火自愈。

○近世以辛黃仁。治鼻塞。不聞香臭。無問新久寒熱。一槩用之。殊不知辛黃。陽氣虛衰。不能上透於腦。致濁陰之氣。上干清陽之位。而窒塞者。固宜辛黃之辛溫香竄以通達之。若溼熱上蒸。蘊釀為火。而窒塞者。非山梔仁之輕浮清涼。不能開發也。至風寒暴窒。重則麗澤通氣。輕則葱白。香豉。細辛。羌活。薄芎。荆芥之屬。隨寒熱輕重而施。可不審權度而混治哉。

○鼻塞不聞香臭。或遇冬月多塞。或畧感風寒便塞。不時舉發者。世俗皆以為肺寒。而用解表通利辛溫之茶不効。殊不知此是肺經素有火邪。火鬱甚。故遇寒便塞。遇感便發也。治當清肺降火為主。而佐以通利之劑。若如常鼻塞不聞香臭者。再審其平素。只作肺熱治之。清金。瀉火。消痰。或丸茶噙化。或末茶輕調緩服。久服無不効也。若其平素原無鼻塞舊證。一時偶感風寒。而致窒塞聲重。或流清涕者。作風寒治。

○薛立齋云。前證若因饑飽勞役所傷脾。生發之氣不能上升。邪害孔竅。故不利而不聞香臭。宜養脾胃。使陽氣上行。則鼻通矣。補中益氣加辛黃。山梔。

●鼻艱。肺氣注於鼻。上榮頭面。若風寒客於頭腦。則氣不通。久而鬱熱搏於津液。濃涕結聚。則鼻不聞香臭。遂成艱。芎藭散。外用千金搗鼻法。

芎藭散 治鼻艱

川芎	檳榔	辣桂	麻黃
防已	木通	細辛	石菖蒲
白芷 <small>各一兩</small>	木香	川椒	甘草 <small>各半兩</small>

為散每服三四錢。生姜三片。蘇葉一撮。水煎去滓熱服。

搐鼻法 治鼻鼈。

通草

細辛

附子

右三味等分為末。蜜和綿裹少許。內鼻中。○又方加甘遂用白雄大膽丸。涕瘥。

或瓜蒂黃連赤小豆為散。入龍腦少許。吹鼻中。水出當火即通。不應非火也。乃濕也。瓜蒂。煎芦。皂莢。為散。入麝腦少許。吹鼻中。去水以散其溼。

○鼻鼈。鼻出清涕也。風寒傷皮毛。則腠理鬱閉。宜疎風清肺。香薷散。加川芎。蜀椒。細辛。辣桂。訶子。不應非風也。乃寒也。辛夷散。去木通。防風。藁加桂。附。蔓荊。訶子。白朮。

辛荑散

治鼻塞不聞香臭。涕出不止。

辛夷仁一兩

細辛三錢

藁本七錢

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

為散。每服二錢。食後茶清調服。

○如血與涕俱出。謂之鼻衄。宜和營降火。

當歸內補建中湯。加香豉。宜便。長棗。後以一味丸。合生脈調之。

○鼻塞腦冷。清涕出。千金搐鼻法。

○鼽鼻。鼻中癢內。不得息。用礬石。煎芦。吹之。

○鼻淵。鼻出濁涕。即今之腦漏是也。陽明伏火所致。宜風茶散之。辛荑散。加蒼。甘。薄。芎。夏。月。加黃芩。石膏。不應非火也。膈上有濁痰。溼熱也。雙解散。加辛荑。

○鼻淵。鼻鼈。當分寒熱。若涕濃而臭者。為淵。屬熱。清涼之茶散之。若涕清而不臭者。為鼈。屬虛寒。辛溫之劑調之。

○鼻中時時流臭黃水。甚者腦亦痛。俗名控腦砂。用絲瓜藤近根。三五尺許。燒存性。為細末。酒調服即愈。

○鼻淵腦漏。用生附子。為末。煨葱涎。和如泥。夜間塗湧泉穴。

○鼻癢。肉上焦積熱。當久而生。有諸中而形諸外。必內服清火茶。利膈茶。宜涼膈散。加減。須斷酒厚味。韓氏云。富貴人。鼻中肉贅。鼻

不可近。痛不搖。束手待斃者。但以白礬末。加阿魏。腦麝。少許。吹其上。頃之。化水而消。內服勝溼瀉。肺之茶。此厚味擁熱。蒸於肺門。如雨霽之地。突生芝菌也。

○瘰肉與鼻痔。大同小異。痛極而不下垂者。為瘰肉。此血熱勝也。阿魏為血積之嚮導。白礬為滌垢之專茶。兼腦麝以開結利竅也。鼻痔則有物下垂而不痛。乃溼熱勝也。治法是胃中有食積。熱痰流注。內服星半。蒼朮。酒洗芩。連神麴。辛荑。細辛。白芷。甘草。消痰積之茶。外用膽礬。枯礬。辛荑仁。細辛。杏仁。為散。入腦麝少許。雄黑狗膽。或猪脂和研。綿裹內鼻中。頻換自消。

●鼻中生瘡。用雄黃。白礬。瓜蒂。細辛。為散。搗鼻若鼻中窒塞不通。用苦丁香。母丁香。赤小豆。為散。吹鼻中。皆外治良法也。

●鼻瘡。內甘露飲。見口。加犀角。胡連。柴胡。虛加人參。外用黃礬。苦參。檳榔。為末。猪脂調敷。或青黛。槐花。杏仁。輕粉。枯礬。研敷。

●鼻疳蝕。內用椿根。葱白。豆豉。川椒。以清

泔水三升。和醋一杯。煎成。入塩少許。服。有惡物下即効。用草烏。燒灰。麝香等分。研極細。以少許。傳瘡上。

○鼻乾無涕。宜犀角。黃耆。木通。杏仁。麥冬。甘草。升麻。葛根。桑皮。石膏。硃砂。積熱加牙硝。大黃。

●鼻痛。風火鬱於上。則痛初宜升麻。葛根。葱白。白芷。散之。有氣道壅塞而痛。宜川芎。葛根。甘草。苦梗。山梔。薄荷。姜。棗。葱白。痛久服茶不應。時痛劇。時向安。或兼兩顧紫赤。此為溼熱瘀滯。宜犀角。連翹。山梔。丹皮。赤芍。生甘草。之類。

○肺受風。面枯色。頰時赤。皮膚乾燥。鼻塞乾痛。此為虛風。白蘚皮。麥冬。茯苓。杏仁。桑白皮。白芷。細辛。石膏。煎服。

●鼻赤。俗名酒齶鼻。乃血熱入鼻也。多飲酒人。邪熱薰蒸。肺竅。伏留不散。故見於鼻。或肺素有風熱。雖不飲酒。其鼻亦赤也。宜用枇杷葉。拭去毛生。煎濃湯。候冷調消風散。食後臨臥服。或服瀉青丸。或同姜汁炒黑山梔。杏

仁泥等分。蜜丸服之。并用白塩時時擦之。外治以生白礬。硫黃。玄明粉等分為散。入麝香少許。擦或硫黃。輕粉。杏仁。為散。臨臥時。以津唾調塗。外治數方見本書。

●鼻紫黑。諸陽皆聚於頭。則面為陽中之陽。鼻居面之中央。而陽明起於額中。為至清至精之分。多酒之人。酒氣薰蒸。面鼻得酒。血為極熱。熱得血冷。為陰所搏。結滯不行。故先紫後黑。當用山梔子仁。姜汁浸炒黑二兩。入乾姜炮黑二錢。連翹仁一兩。為末。蜜丸。臨臥燈心湯服二錢半。以清肺家血中之熱也。

附方

治鼻中生瘡

竹葉黃耆湯主之。○凡鼻邊。陽明經所經。瘡類屬熱者。此方活妙也。

口

脾熱則口甘。肝熱則口酸。心熱則口苦。肺熱則口辛。腎熱則口鹹。胃熱則口淡。

○口甘者。此五藏之溢也。名曰脾瘴。蘭香

飲子。脈弦滑兼嘈雜。屬痰火。滾痰丸。此指實火而言。

○平人口甘。或渴。或小便亦甜。而獨俱屬土中溼熱。脾津上乘。久之必發癰疽。斷厚味氣腦。服三黃湯。加蘭葉。白芍。生地。燥渴甚者。為腎虛。日服加減八味丸。可保無虞。

○中消脾液上乘。口甘者。蘭香飲子。老人虛人。脾胃虛人。脾胃虛熱。不能收斂津液。而口甘者。當滋補脾氣。補中益氣。去升。柴。加蘭香。煨葛根。

○膽虛氣上溢。而為之口苦。龍膽瀉肝湯。或小柴胡。加麥冬。棗仁。不應。本方川連。龍膽。○口酸。肝膽實熱也。佐金丸。加神麴。草龍膽。

○口辛。肺氣上溢也。生脈散。加桑白皮。地骨皮。黃芩。

○口鹹。腎液上乘也。六味地黃。加五味。烏鰂骨。

○口淡。為胃熱而有虛實。實則甘露飲。加藿香。病後胃虛口淡。六君子。黃耆。當歸。

甘露飲

治胃中客熱煩躁。口臭咽瘡牙

宜口臭。

天冬

麥冬

生地

熟地

茵陳

枳殼

黃芩

石斛

甘草

枇杷葉各等分

水煎

○口瀉。肝邪逆於肺。氣虛火旺也。黃芩。葛根。防風。薄荷。括萎。茯苓。

●口瘡。經云。膀胱遺熱於小腹。膈腸不便。上為口糜。蓋小腸者。心之府也。此舉邪熱之一端耳。心屬君火。主五藏六府之火。故諸經之熱。皆應於心。心脈布舌上。脾脈布舌下。二經之火為病。皆用當用寒涼施治。但有涎者。兼取其涎。若元藏虛冷。上攻頭熱。足冷口瘡。用附子理中湯。連理湯。併用當歸。附子。蜜煎含嚥。有用生附子末。塗脚心。

○胃中有熱。脈洪大而實者。服涼膈散。金花丸。并用黃蘗一味。蜜炙含之。忌犯酒醋犯之難愈。

金花丸

黃連解毒湯為末。蜜丸服之。

○好飲酒人。多有此證。五苓散。導赤散。相和治之。

○服涼茶不愈者。此酒色過度。勞役不睡。舌上光滑而無皮。或因憂思損傷中氣。虛火及上無制。必用理中湯。甚者加附子。并用蜜煎附子嚥之。

○口瘡甘草半寸。白礬錢許。含化津嚥。

○口瘡久不愈。以五倍子末摻之。或煎湯漱。或煎湯泡白礬。蓋酸能收斂也。

○口瘡甚者。含焰硝。硼砂。勿開口。并用南星末醋調貼足心湧泉穴。以引熱下行。

○又方。五倍子一兩。蜜炙。黃蘗。滑石各半兩。銅綠三錢。麝香少許。為末摻之。

●舌瘡口破疼痛。以巴豆半枚生研。和米飲一豆大。拌和貼印堂。對額間約半刻許。覺紅就去。不可泡起。小兒減半。隨即痊愈。

○下虛土盛。致口舌瘡。宜用鎮墜之茶。以蘓子降氣湯。或塩湯下養正丹。

●口臭。年高水弱。奉養大過。厚味及食補。

陽菜。口糜臭不可近。甘露飲。加犀角。茵陳。及濃煎香薷汁含之。徐徐嚥下。口中如膠而臭。知母。地骨皮。桑皮。山梔。麥冬。甘草。食塩煎湯。膏下。壯盛之人。涼膈散。甚佳。痰壅氣濁而臭。宜塩湯探吐之。

舌

心開竅於舌。心火盛則舌乾。或破。脈洪實有力者。黃連瀉心湯加減。

黃連瀉心湯

即傷寒論大黃黃連瀉心湯也

○右脈虛大。四肢倦怠。而舌瘡破不愈者。補中益氣湯。

○口舌唇疼。有瘡皆心火炎盛。涼膈散。

○舌瘡風熱。口中乾燥。舌裂生瘡。甘露飲。見口

○酒客膏梁。積熱內盛。上焦痰實。舌脹腫。涼膈散瀉之。須脈實有力。氣壯乃宜。

○舌強硬如豬脬。以鍼刺舌兩邊大脈血出即消。勿刺中央。令人血不止。此病人多不識。失治則死。

○凡舌腫。舌下必有如蟲形。有頭尾。可燒針烙頭即消。

○上焦痰熱壅渴。熱挾相火。則病速而危。毒氣結於舌下。復生一小舌。名曰子舌。脹大而強。無小舌者。名木舌。脹大都痰火為患。緩者用辛涼利氣化痰茶。重者砭去其血。即平。勞心不睡。口舌破者。自當安神養心。作心虛治。

○心之本脈係於舌根。脾之絡脈係於舌傍。肝脈絡係於舌本。少陰脈係舌本。風寒傷於心脾。憎寒壯熱。齒浮舌腫痛。金沸散。見感冒。漱口吞一半。吐一半。

○經驗方。治舌脹大塞口。不能飲食。用真蒲黃一味。頻刷舌上。甚則加乾姜末。從治之。若能服茶。即以川連一味。煎濃汁。呷之。以瀉心火。甚者加乾姜。從治。

○舌上有竅。出血不止。炒槐花末。搽之。○病熱極者。多舌出血。有病愈而血不止者。煨人中白和水片。搽舌即止。

○舌暴脹大出外。蓖麻子油。蘸作搽。燒烟

薰之即消。
○七情所鬱。則舌脹滿不得息。宜舒鬱清

上焦。外用川烏。南星。乾姜末。貼手足心。

○心熱則裂而瘡。木舌重舌。宜三黃丸。火

及生蒲黃末。搽之。

○舌出不收。心經熱甚。及傷寒熱毒攻心。與傷寒後不調攝。往往有之。宜珍珠末。冰片。

火煨人中白敷之。

○舌暴腫出口。用巴豆霜。以紙卷。內鼻中。舌自收。此取辛烈。開竅散火。引毒流散之意。

與小兒口疳。貼額同法。

○平人舌上稠黑。胎垢拭之不淨。經久不退。且口甜氣穢。便是胃脘發癰之候。與傷寒暴病。府邪內實。迥異。急宜涼膈散。下之。

齒

溼熱甚而痛者。兼氣湯下之。

○上下牙痛不可忍。牽引入腦。或喜寒惡熱。脈數有力。涼膈散。酒蒸大黃。瀉之。

○大腸熱。而齒齦腫痛者。清胃散。見齒

火鬱而痛者。越鞠丸解之。

○腎經虛而痛者。六味丸。加骨碎補。腎經虛寒而痛者。八味丸。加細辛。

○屬風熱者。羌獨。荆防。芎辛。薄荷。生地之類。水煎漱。不愈。茵陳散。

茵陳散 治齒齦赤腫疼痛。及骨槽風熱。

茵陳 連翹 荆芥 麻黃

升麻 羌活 薄荷 僵蠶各五

細辛二錢 大黃 牽牛頭末各一

為散。每服三錢。先以水一盞煎沸。入茶攪之。急傾出。食後和滓熱服。

○風毒及熱壅上攻。牙齦痛。或齦縫有紅肉。弩出。消風散。見效。嗽臨卧半漱。半服。

○風寒入腦者。羌活附子湯。見頭痛。

○牙痛用清涼茶。更甚者。從治之。草撥。川椒。薄荷。細辛。龍腦。青鹽。為末。擦之。

○得熱而痛。得涼則止者。小茱氣湯。加甘草。川連。

○凡齒痛。遇勞即發。午後甚者。皆脾胃虛熱。補中益氣湯。下六味丸。

○若齒齲腫痛焮赤。顯頰此胃經風熱。犀角升麻湯。見中風

○善飲者齒痛。顯頰焮腫。此胃經溼熱。清胃散。加葛根。

○因服補胃熱茶。致上下牙痛。不可忍。牽引頭腦。滿面發熱。大痛。乃手陽明經中熱甚。而作。其齒喜冷惡熱。清胃散。加藳香。寒熱皆痛。當歸龍膽散。上邊痛倍升麻。下邊痛倍白芷。

當歸龍膽散 治齒痛寒熱身疼。

升麻 麻黃 生地黄 當歸稍

白芷 草豆蔻 草龍膽 黃連

羊脛骨灰等分

為散。每用少許。擦牙疼處。良久有涎吐去。

○胃中溼熱大甚。口臭不可近。牙根痲蝕。血出。乃恣食肥甘美酒所致。清胃散。加茵陳。香薷。少佐白豆蔻。先以熟大黃。瀉一二次。使胃中溼熱去。而齒自安矣。

○腎虛牙浮而痛甚。則憎寒壯熱。如欲脫之狀。小安腎丸。還少丹。間進黑錫丹。

○有房慾惱怒。牙即動搖長出。服補腎清胃茶。俱不効者。此腎火邪盛也。宜酒黃蘗三錢。青鹽升麻各一錢。且漱且嚥。以攝之。或生地黃兩許。骨碎補三錢。同細辛一分。秦椒七粒。酒水搗畧煎。入青鹽少許。如上且漱且嚥。服之良。

○牙疳腫腐作痛。人中白。青黛。冰片。玄明粉。為散。搽之。小兒好食糖霜生疳。治之不愈者。以石蜜不時嚼之。糖因煎煉而助溼熱。石蜜不經火熬。其性本寒。故能化疳。專取同氣之相感也。

○齩蛙數年不愈。當作陽明畜血治。桃核承氣。為細末。煉蜜丸。如桐子大。服之。好飲者。急此屢服有效。

○局方引涎止痛方。川椒。露蜂房。微炙。等分為末。水煎入鹽少許。乘熱頻漱。冷即吐出。或用蟾酥。銀硃。搽和為丸。如菜菔子大。每用一九。搽患處。便不疼。至三九。吐濃涎。數口即愈。

○又用不蛀皂角一莢。去皮子。於皂子處安

巴豆一粒。塩泥固濟。燒灰研細末。用刺耳子抄許。填入蛀孔內。白芷細辛煎。或溫米醋。漱出蟲。自愈。或用食塩之滴。滴漱二三次。以攝其虛陽。其痛即止。但可暫。以其能損齒也。

○牙齒動搖。還少丹常服。或六味丸。加骨碎補。陰虛內熱者。甘露飲。外用五倍子散。烏髮散。長春牢牙散。

五倍子散

治牙齒為物所傷。動搖欲落。

川五倍子為末

乾地龍微焙為末等分

先將生姜擦牙齦。後以茶敷之。七日不得嚼硬物。用骨碎補濃煎。時時漱之。如齒初傷。欲落時。以膏擦。貼齒槽中。至齒上。即牢如故。

烏金膏

治牙齒動搖。髮鬚黃赤。用此即齒牢。髮黑。

生姜半兩搗取自然汁留滓待用

生地黄一觔酒浸一宿。將汁留滓待用

大皂莢不蛀者十挺。刮去黑皮。將前二汁和。蘸皂莢。文武火炙乾。再蘸。灸汁盡為度。

右將皂莢。同地黃。淨入磁罐內。煨存性為末。牙齒初搖。用茶擦齦。如鬚髮黃赤。以鐵器盛茶末三錢。湯調過三日。將茶汁蘸。擦鬚髮。臨臥時用之。次早即黑。三夜一次。其黑如漆。不

傷鬚髮

長春穿牙散

烏鬚髮去牙風除口氣

升麻 川芎

細辛 白蒺藜

甘松 丁香

五倍子 皂礬

青塩各半兩 訶子肉

沒石子各三錢 麝香五分

為散。早暮擦牙。次以水漱吐出。洗鬚髮。

○齒間肉壅。口不能開。水漿難入。以牙硝煎湯漱之。一法用皂白二礬湯漱之。一法用五倍子煎湯漱之。一法以熱醋漱之。

○骨槽風。生於耳前顙頰。痛引筋骨。寒熱如癢。牙關緊閉。不能進食。不待腐潰。而齒便脫落。此風毒竄入。骨槽所致。初則堅硬難消。

急宜灸。其外鍼刺齒齦。以泄其毒。用冰硼藥。明粉為散。吹搽。內服降火化痰消腫之劑。

久則瘡口難合。非參。著歸。芍。補托。兼肉桂。冬。味之類。不能破結斂肌。治法外科正宗頗詳。

瘍醫宜參究之。若腐腫不消。虛熱不退。形焦體削者。不治。

唇

唇燥則乾。熱則裂。風則潤。寒則揭。若唇腫起白皮。皴裂如蠶繭者。名曰繭唇。有唇腫如繭。如瘤者。或因七情火動傷血。或因心火傳脾。或因厚味積熱傷脾。大要審本證。察兼證。清胃氣。生脾津。或兼滋腎。則燥自潤。火自降。風自息。腫自消。若患者忽畧。治者不察。妄用消熱清毒藥。或用茶線。結去反為齩花敗證。

○腎虛唇繭。時出血水。內熱口乾。吐痰體瘦。六味丸。去萸。加麥冬。不應用。加減八味丸。

○肝經怒火。風熱傳脾。唇腫裂。或患繭。柴胡清肝散。見耳。

○胃火血燥。唇裂為繭。或牙齦潰爛作痛。清胃散。見齒衄。

○風容於脾經。唇裂無色。犀角升麻湯。見中風。去白附子。加枳殼。石解。

○婦人常怒。肝脾受傷。多有此證。逍遙歸脾。小柴胡。選用。

○唇燥口乾。生瘡。年久不愈。外用椒欖燒灰。研末。豬脂調塗。

○治唇緊裂生瘡。青皮。燒灰敷之。

○唇者肉之分也。唇反者肉先死。唇青者。為筋死。

○唇青有二。若唇與爪甲俱青。而煩渴引飲者。為熱伏厥陰。竹葉石膏湯。若唇青厥冷。而畏寒。振振欲仆地者。為寒犯少陰。真武湯。唇淡為脫血。宜十全大補輩。唇赤帶黃色。為脾熱。黃芩芍藥湯。唇赤而腫厚。濼々然者。雖曰心火亢盛。實脾胃中有溼熱。當從清胃散。加減治之。

咽喉

腎水虧損。相火無制。口渴舌乾。咽腫上氣。咽乾及痛。內熱面赤。痰涎湧上。尺脈必數。而無寐。須用六味丸。加麥冬。五味。大劑作湯服之。又有色欲過度。元陽虧損。無根之火。遊行無制。客於咽喉者。須八味腎氣丸。大劑煎成。冰冷與服。

○乳鷺。鑿喉。二種不同。腫於喉兩傍者。為雙鷺。腫一邊者。為單鷺。治法用鷺翎蘸米醋。攪喉中。去盡痰涎。後以鷺翎探吐之。令着實。

一咯。咯破喉中紫血。即潰。或玉樞丹。見腹痛磨服。毒甚不散者。上以小刀。刺出紫血即愈。古法有刺少商穴甚好。刀鍼刺血。急則用之。然但腫不痛者。切不宜用。蓋有形而無痛者。陽之類也。當峻補其陰。若刺之必反傷陰血。必死。

纏喉風證。先兩日。頭目眩暈。胸膈緊塞。氣息短促。驀然咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。飲食不下。痰毒壅盛。為纏喉風。其證最急。又有兩塊結於喉傍。甚則大如雞卵。氣塞不通。痰鳴不止者。為鎖喉風。其證更劇。慎勿破。急用土牛膝。選粗者兩許。勿經水。勿犯鍼。折斷搗汁。和米醋半盞。雞翅毛蘸。攪喉中。牙關緊閉者。蘸攪兩腮自開。開後喉中頻攪。以通其氣。若喉兩傍有塊者。涎出自消。後以人中白煨過。入水片少許。吹喉中。日吹一吹。不過三四日愈。或硼砂丹。用之可湧去頑痰。或荔枝草。搗汁和醋含漱。或天名精搗自然汁。鷺翎掃入。去痰。或用馬鞭艸搗汁灌漱。倘腫塞不得下者。灌鼻取吐。以奪其勢。然不若土

牛膝汁最捷。若兩塊奏合。喉中痰鳴。懸壅上縮不見。氣塞不通。神丹不可救矣。用土牛膝醋攪。後以拇指擦其脊上七節兩傍。知疼者易已。甚者以膝。其當背上。以手抄兩脇下。向上板兩缺盆。令胸前凸起。則氣上而得上泄。若涎出後涕淚稠粘者。風熱也。無涕者風寒也。胸中有結塊者。宿食也。隨證治之。此證難係時毒邪氣。多有因跌撲飲食停滯而起者。宜用荊防。甘桔。連翹。牛蒡。薄荷。黑參。山查。內解其毒。蓋山查能消食散血。破結塊中火。與消風散中。厚朴同意。

○又有喉痛忽愈。毒攻胸膈。痛不可忍。氣促身熱。不能臥者。貝母醋炒。升麻。黃茶子。乾桑葚。黑參。生甘草。蜜丸。噙化。七日以後。毒深喘甚。手足指甲紫者。難治。吹茶紫口。蛤蜊七枚。撒攪。核七枚。文火煨過。研細。入枯礬一錢。以大青魚膽一枚。置鍾內。晒乾。再加膽汁。三膽為度。加水片吹之。然須戒茶百日。後無復發之虞。

○一切喉痺腫痛。及重舌木舌等證。烏龍

膏。急者惟刺血。最為上策。

烏龍膏 治一切纏喉急證。

皂莢二挺去皮弦子碎。滾水三升。泡一時許。按汁去滓。砂鍋內熬成膏。入好酒一合。攪令稠。入下項藥。

百草霜 煇硝 硼砂

人參另為極細末。各一錢。

右四味拌勻。入白霜梅肉一錢細研。入皂莢膏內。以少許雞翎點喉中。湧盡頑痰。却嚼甘草二寸。嚥汁吞津。若木舌先用青布蘸水揩之。然後用茶。

硼砂丹 治纏喉風熱喉痺。

硼砂生研 白礬生研各一錢 西牛黃

人瓜甲焙脆研各一分

為極細末。以爛白霜梅肉三錢。研糊分作四丸。噙化。取湧頑痰立効。

○咽喉腫痛。作渴飲冷。大便秘結。六脈俱實。涼膈散下之。

○喉痺脈浮。惡寒發熱。多是暴寒折熱。表邪熱盛。非但寒涼某食。能凝閉毒邪。即硼砂。

白礬。白梅等。酸收之品。及膽礬點喉。俱不可犯。惟當輕揚開發其表。以泄火毒。急破患處。

并刺少許出血。最為要訣。

○走馬喉風。若有頭痛發熱。先與一味香豉濃煎。加葱涕探吐。後用荊防。牛旁。甘。桔。連翹。薄荷。犀角之類。如口不開者。以牙皂末吹鼻取嚏。方可下藥。

○鎖喉風證。有用牙皂煎湯。涌吐頑痰。每至皮毛脫落。大傷胃氣。甚至激動其痰。鎖住不能吐出。頃刻立斃者。其走馬喉痺。有用巴豆綿裹塞鼻。每至燉發其毒。不可不慎。

○乳鴛。用硼砂。白梅。應手獲効。然性最辛烈。雖假酸收。終是以火濟火。每令不時舉發。人皆未省其故也。

○時氣咽腫。普濟消毒飲。去芩。連。苦寒之味。熱服。以散表為先。

○喉痺傳染。是疫癘。荊防敗毒散。隨證加減。

○陰虛欬嗽。久之喉中痛者。必有肺花瘡難治。桔梗湯送都氣丸。切勿用冰片吹點。證劇不勝湯茶者。日用雞子生。調米飲。沖服稍緩其疼。終亦必亡而已。

○脾肺有熱虛火上壅咽喉生瘡。本事利膈湯。

利膈湯

治脾肺積熱咽喉生瘡。

薄荷葉

荊芥穗

防風

桔梗

人參

牛蒡子

甘草等分

水煎不抱時緩々服。

如口瘡甚而多痰聲者加殭蠶壯熱脈實去

人參加黑參犀角山豆根。

○咽腫服涼茶及甚者宜用姜汁。

○咽中如有灸瘻或如梗狀痰火客於上焦也半夏厚朴湯。

○懸壅腫痛不可飲食黑參升麻大黃射干甘草煎服。

○咽痛諸藥不効者此非咽痛乃鼻中生紅絲如髮懸黑泡如瘦珠垂掛咽門致飲食

不入杜牛膝根洗淨入好醋三五滴同研汁就鼻孔滴入絲斷珠破即安。

○懸壅痛不下食即會厭垂長而懸壅塞妨礙飲食者燒鹽箸蘸點之。

○乳鷺紅腫不消杜牛膝根研爛用乳點納鼻中。

●諸硬在喉當審何物以所勝制者治之。

如麤鷓撇攪治魚硬狗涎治骨硬鷺涎治縮芒鴨涎治螺螄硬磁石治鐵硬水銀灰治金銀硬要在變通。

○諸物硬塞芋蕪根杵爛丸如彈子大將所硬物煎吞下。

○吞釘鐵金銀銅錢等物用煆銀確中炭為末銀匠油槽內油調服即出并多食肥肉助其潤下。

○錢硬芋蕪生多食効或加茨茹汁不應

用羊胛骨煆存性芋蕪汁調服自化。

○諸硬用蕪白煮半熟以綿縛定手執線

頭少嚙蕪白嚙度蕪至硬處便牽引硬即隨出。

○又法用絲綿一小團如上法亦妙。

面

面熱曰風兩頰赤腫其狀如癩酒調消風散。

食後服之。或用羌活。防風。升麻。白芷。牛旁子之屬。甚則涼膈散。生姜葱豉。汗之。外杵杏仁如膏。如玄明粉。硫黃。敷之。

○風熱面腫而痛。升麻湯。加犀角。黃連。白芷。川芎。薄荷。荆芥。

○風熱面腫痛。或咽喉不利者。犀角升麻湯。見中風。

○虛風證。能食麻脊。牙關急搥。目內睜動。胃中有風。故面獨腫。升麻胃風湯。見中風。

●面熱面寒。飲食不節。則胃病。胃病則氣短。精神少。面生大熱。有時火上行。而獨燎其面。鍼經云。面熱足陽明病。調胃承氣湯。加犀角。川連。

○脈數實有力。精神茂澤。升麻湯。加川連。甚者。涼膈散。

○欬逆倚息不得臥。面熱如醉。此為胃熱。上衝熏其面。桂苓五味甘草湯。加大黃利之。見欬嗽。

○左半邊面及耳熱。耳鳴。覺從少腹左脇上衝者。屬肝火。實則當歸龍薈丸。虛則加減八

味丸。虛甚地黃飲子。

○面寒為陽虛。陰寒鬱遏所致。升麻湯。加熟附子。甚者。附子理中湯。

○陽明經虛。面熱而赤者。補中益氣湯。加熟附子二三分。

○面赤為邪氣沸鬱在經。宜表不宜下。○面戴陽下虛也。傷寒用四逆湯。雜證用地黃飲子。

○面白善噎。脈緊者寒也。羌活。防風。甘草。藁本。四味。瀉足大陽。少加附子。以其脈悲恐者。更加桂。附。

○面目浮腫。或紫黑。或風刺癢疹。消風散加減。

○面上風癢。或如火丹。鼠粘子散。不應加人參一錢。數服即效。

鼠

粘子散 治面上風瘡。

鼠粘子生而半 連翹 防風 荆芥

枳殼 桔梗 蔓荊子 蒺藜炒去刺

當歸 蟬脫 厚朴各一兩

為散。每服四錢。加生姜一片。葱白一莖。水煎。

薰服。

○面部生瘡。或鼻臉赤。風刺。粉刺。百茶不効。及面上細瘡。常出黃水者。宜硫黃膏塗之。

硫黃膏

生硫黃

白芷

括萎根

鉛粉冬五分

芫青七枚

全蝎一枚

蟬脫七枚

為細末。麻油。黃臘。各半兩。熬煉離火。入諸藥末。調勻磁器。收貯久則愈妙。至夜洗面。後以少許。細々擦之。擦過即拭去。否則起皮。近眼處勿擦。三四日間。瘡腫自平。赤色自消。風刺。粉刺。一夕見効。

○上焦風熱。則面生小瘡。通聖散。脾胃虛。

或吐瀉後。面目浮腫者。脈必緩弱。或氣口虛。

大。六君子湯。加減。

○面青肝虛。面白肺虛。面黃脾虛。兩頰赤腎

虛。面如漆柴。手足少陰氣俱絕。為血先死。若

面黑而不至枯者。六味丸。

○面塵脫色。為肝木失榮。人參養營湯。

○面色忽黑。乃因臭氣所衝而成。或頭痛。

或腹痛。或嘔吐。或腹脹。一味香附末。淡鹽湯下二錢。

○面上豆根。或斑點。蜜陀僧細末。夜以

人乳調敷。

○面上雀斑。白丁香。鷹屎白。蜜陀僧。唾調

搽之。

○面上赤斑癬。鹿角灰。猪脂調塗。

○指爪破面。輕粉研細。生姜汁調敷。無癩

痕。

○腮腫。屬風熱。乾葛。甘。桔。升麻。薄荷。溼熱

脈洪大者。羌活。勝溼湯。加甘。桔。黃芩。

○疥癩。赤小豆末。雞子清調敷。并底泥。亦

得。

○三因方。凡伸欠。頰車。蹉。但開不能合。以

酒飲之。令大醉。睡中吹皂角末。搐鼻。嚏透即

愈。後以補中益氣。加骨碎補調之。

髮髮

髮黃白。治之如神

七寶美髯丹 補腎元。烏髮。延齡益壽。

赤白何首烏

重劔者各一枚。竹刀刮去皮。切作大片。同黑豆同蒸。何首烏九

次。去

川牛膝

去苗。同蒸。同切。焙。

補骨脂

八兩。無聲。為度。去芝麻。

赤白茯苓

各八兩。

免絲子

乳。蒸。赤。者。用。牛。乳。者。用。人。

當歸

酒。蒸。一。宿。隔。水。煮。二。官。香。搗。

狗杞子

成。淨。切。細。勿。見。取。淨。末。八。兩。

當歸

火。取。淨。八。兩。

狗杞子

共。為。細。末。

狗杞子

臨。臥。用。塩。湯。沸。湯。溫。酒。各。嚼。一。丸。忌。菜。菘。猪。

狗杞子

血。糟。醋。

狗杞子

○。髮。白。鬚。黃。髮。落。不。生。脈。弦。皮。毛。枯。槁。是。營。

狗杞子

衛。氣。衰。黃。蓍。建。中。下。六。味。丸。髮。脫。落。及。臍。

狗杞子

下。痛。是。脾。腎。氣。衰。不。能。生。真。陰。四。君。子。加。熟。

狗杞子

地。

狗杞子

醫通纂要卷之三畢



