



70

75

80

85

90

95



武9  
門  
卷  
132  
少山

張氏醫通纂要卷四

三河 滕烏巢 輯錄  
平安 滕主篤 校正

婦人科經侯

○飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。故心脾和平。則經候如常。苟或七情內傷。六淫外侵。飲食失節。起居失宜。脾胃虛損。則月經不調矣。若先期而至者。有因肝脾血燥。有因脾經鬱滯。有因肺經怒火。有因血分有熱。有因勞役火動。其過期而至者。有因脾經血虛。有因肝經血少。有因氣虛血弱。治法。因肝脾血燥者。加味道遙散。脾經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火者。小柴胡加生地。血分有熱者。四物湯加白术。茯苓。柴胡。丹皮。勞役火動者。補中益氣湯。脾經血虛者。十全大補湯。肝經血少者。六味丸。氣虛血弱者。八珍湯。

歸附丸

治氣亂。經期或前或後。

當歸四兩

香附八兩童便浸透服乾  
再加酒醋鹽姜四製

爲細末。醋糊丸。空心砂仁湯下三錢。

血虛加熟地八兩。虛寒加桂附各一兩。帶下

氣腥加吳茱萸蘄艾各一兩。脾下冷痛加桂

附沉香各一兩。丁香三錢。經行少腹先痛。或

血色紫黑結塊。加醋煮莪朶二兩。沉香一兩。

經後少腹虛痛。加參耆阿膠各四兩。蘄艾二

兩。經水色淡。加姜桂各二兩。人參四兩。

○曾傷胎瘀。血停留。小腹急痛。五心煩熱者。加味道逍散。

○經水有先期而來者。多屬熱。其證有二。血熱者。腹多不痛。身多熱。此火也。其色必紫。脈必洪數。四物湯中川芎減半。易生地。加條芩丹皮。香附。虛熱者。四物合保元。不應。加炮姜宣連。炒黑香附。乾嗽者。逍遙散。氣多血虛者。腹必疼。藿香正氣散。加芎歸香附。慎用涼葦。若婦人年四十餘。經水每月二三至者。此少年恣意太過。後必崩淋。

○經水後期來者。多屬寒。其證有三。血虛腹多不痛。微微身熱。間亦有痛者。乃空痛也。脈必大而無力。或浮濇濡細。宜調氣生血八物

加香附。虛則四物加參术黃蓍升麻陳皮。氣滯血虛者。四物加丹皮香附。肥盛多寒。去地黃。再加橘半茯苓。血寒脈必沉遲弦緊。歸附丸。過期色淡者。痰多也。二陳加柴胡香附肉桂。若過期兼白帶者。父煎丸加香附。若欬忌香附。逍遙散加丹皮。嗽而瀉者。養胃湯。血濇滯者。胸飽腰腹痛。醋煎散。或七氣湯加減。

○衝任虛損。少腹有寒。月水過期不能受孕者。溫經湯

四烏湯 治經水有紫黑色。腹痛者。乃氣血相併也。腹不痛者。血熱也。淡紅色者。血虛也。其

來必皆不准。腹痛者。來必皆不准。腹痛者。

當歸小 川芎小 地黃大 菖菜中

烏茶 香附子 甘草小

或加蓬朶川連。益可也。不痛者。但加川連。

增損四物湯 治前症不痛。色淡者。

當歸 川芎 菖菜大

人參中 甘草 炮姜小

礬石九 治婦人經水不利。下白物。

礬石燒過三錢

右二味蜜丸棗核大內陰中

**土瓜根散** 治瘀積經水不利。或一月再見。及陰頰腫。

土瓜根 茄菜 肉桂 廣蟲等分  
右四味爲散。酒服方寸匕。日三服。

### 崩漏

陰虛陽搏謂之崩。又云。陰絡傷則血內溢。又云。脾統血。肝藏血。崩之爲患。或脾胃虛損。不能攝血。或肝經有火。血熱妄行。或怒動肝火。血熱騰沸。或脾經鬱結。血不歸經。或悲傷胞絡。血崩下脫。治療之法。脾胃虛弱者。補中益氣加酒炒白芍。肝經血熱者。四物湯加柴胡山梔丹皮。肝經怒火。小柴胡加山梔芍藥丹皮。脾經鬱火。歸脾湯加山梔。故先哲云。凡下血證須用四君子收功。斯言厥有旨哉。若大脫血後。母以脈診。急用獨參湯。加當歸救之。其發熱潮熱。效嗽脈數。乃是元氣虛弱。假熱之脈也。尤當加用人參。此等證候。無不由脾胃先損而連肉桂。

**防風丸** 治風入胞門。崩漏下血。色清淡者。  
防風勿見

患故脈洪大。察其中有冒氣受補可救誤投寒涼之藥。復傷脾胃生氣。使血反不歸源也。○暴崩下血不止者。乃血不歸經。陰血隨陽盛之勢。妄行下漏也。身熱不痛者。逍遙散加熟地川芎。不應此血熱沸騰也。四物湯加芩連肉桂。

**防風丸** 治風入胞門。崩漏下血。色清淡者。  
防風勿見

子芩丸 爲末。醋丸梧子大。空腹葱白湯下二錢五分。  
治風熱入犯肝經。崩漏下血。色稠紫者。

條黃芩 酒炒

茯苓補心湯 爲末酒丸梧子大。空腹烏梅湯下三錢。  
面黃煩悶。五心煩熱。獨語不覺。婦人崩中面赤。

茯苓六錢

桂枝三錢

甘草二錢

紫石英碎如米粒一兩

人參

麥門冬去心各五錢

水煮日三服

大棗四枚

赤小豆一合

**小牛角腮散** 治帶下五崩下血。外實內虛之病。

牛角腮一枚燒令赤 鹿茸

禹餘糧

當歸

乾姜

續斷各二兩

阿膠三兩

烏鰌骨

龍骨各一兩

赤小豆六合

右十味爲散。空腹溫酒服方寸七。日三服。

**伏龍肝湯**

治勞傷衝任崩中去血。赤白相兼或如豆汁。躋腹冷痛口乾食少。

伏龍肝如彈子大七枚

生姜

生地黃各半兩

甘草

艾葉

赤石脂

桂枝各六錢

新絳

生用 尺許

右七味㕮咀。以水一斗。煮取三升。分四服。日

三夜一。

**旋覆花湯**

治虛風襲入膀胱。崩漏鮮血不止。

旋覆花三錢

葱

五莖

右三味水煎頓服。

旋復性專下氣。兼葱則能散結祛風。佐以繭絲專補膀胱。加以紅藍染就。深得本經散結氣之旨。

## 經閉

室女婦人諸病。以調經爲先。調經以理氣爲要。蓋氣不和。則血不流。故經閉。然其證不一。小腹疼痛。血海虛寒也。或潮熱頭目昏沉。肢體勞倦。五心煩熱。怔忡面赤。口燥唇裂。盜汗身疼者。血氣虛損也。並宜溫經湯。腹中結塊。腰腿重痛。及少腹痛如錐刺者。瘀血凝滯也。四物加肉桂蓬朮。貌本壯實。飲食減少者。胃氣不調也。蓋胃氣不和。亦令經水不調。逍遙散下歸附丸。

○經水不通而逆行者。或吐血。或衄血。或唾血。或血腥通宣。四物加韭汁。童便甚則從虛勞例。用巽順丸。烏骨雞丸治之。

失笑散

治婦人癥結少腹急痛

五靈脂

酒研澄去砂

蒲黃

炒半等分淨生半

爲散。每服二錢半。酒煎入砂糖少許。和滓服。少頃再服。瘀結腹痛。經水反多。元氣虧弱。茶力不行者。用人參二三錢調服。以擊搏之。

○婦人經閉。肥白者多瘀。去瘀經自行。二陳

加芎歸川連南星枳實生薑竹瀝稟厚恣於酒食者。平胃散加姜汁炒川連。歸尾半夏姜汁。黑瘦者多血枯。四物加參耆香附丹皮。

○經閉脈沉弱。少腹痛。屬寒結。四烏湯。芍藥用桂酒製。烏藥用附子製。

○寡婦尼姑經閉。勞也。加味道遙散加無灰酒竹瀝。

○娼妓本無經閉之理。間或有之。勞也十全大補中肉桂可用二三錢。

**蘆薈丸** 治肝疳口舌生瘡。牙齦腐爛遍體生瘡。及婦人熱結經閉。作塊上衝梗痛。

蘆薈

青黛

硃砂

另研水飛各三錢

麝香一錢

大皂莢

去皮殼一兩乾蟾子一兩同皂莢燒存性

爲細末。蒸餅糊丸。麻子大每服三十五丸。空心米湯下。

## 帶下

帶下之證。起於風氣寒熱所傷。入於胞官從帶脈而下。故名爲帶。有五色不只赤白。白帶者。屬氣虛。甚則腰痛。如虛不甚。則不痛。若氣

尅甚。則腰痛頭疼眼花。此虛證也。千金內補當歸建中湯加醋製香附。或草薢分清飲。量肥瘠選用。

**艾煎丸** 治赤白帶下。

四物湯本方歸地芍各二兩川芎一兩。加人參石菖蒲炒吳茱萸用醋炒口各一兩爲末川蘄艾四兩酒煎濃汁。入糯米糊爲丸。梧子大。每服百丸。醇酒下。更加肉桂熟附子各一兩。香附四兩。名艾附丸。赤帶多腰痛。加續斷杜仲。若肥盛蒼黑。肌肉膚堅者。爲溼熱下注。平胃散加姜製星半。酒炒芩連。

**五積散** 治婦人赤白帶下。

依本方。加香附子。小茴香。吳茱萸。

**四仙散**

治婦人白帶。

蒼术一兩酒浸去皮白芷

川芎

大附

腳色燶去皮各五錢

右爲末。每服五分。空心好酒調下。

**香术丸** 治婦人白帶。臍腹脹痛。

香附醋浸煮乾八兩

蒼术米泔浸去皮四兩

陳皮

當歸

酒洗焙各二兩

白芍

酒炒

川芎

熟地黃

姜汁酒浸焙各二兩

右爲末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三十九。空心温酒送下。

加味二陳湯 治帶下屬濕痰者。  
依本方加蒼朮。白术。升麻。紫胡。

固經丸 治帶下屬濕熱者。

黃柏酒浸炒各一兩 香附炒各一兩 山梔炒黑酒各二兩 敗龜酒各二兩

白朮 白芍酒炒各七錢 山茱萸蒸酒各二錢 貝母

椿根皮酒炒各五錢 乾姜炒各二錢 苦參五錢

右爲末。酒糊爲丸。梧桐子大。每服八十九。空心滚熟水下。

○肥人多是溼痰。越鞠丸。加滑石。海石。蛤粉。星半。茯苓。椿皮。作丸服。

○瘦人多是熱。以大補丸加滑石。海石。椿皮。龜版灰。作丸服。必須斷厚味。

○帶下脈浮惡寒。腥臭不可近者。難治。

## 妊娠門

紫蘿和氣飲 凶胎前。一切諸病。宜加減而用

紫蘿當歸各五錢 川芎芍藥各三錢 甘草

右入姜葱煎服。一方加人參。氣虛者亦可。  
 ○妊娠胎氣不和。湊上心腹脹痛。加不香。  
 嘔吐不止。是惡阻也。加茯苓。白朮。半夏。砂仁。藿香。神鞠。丁子。○胎漏下血。加熟地。阿膠。白朮。黃芩。砂仁。艾葉。糯米。○如胎漏下血。心脹痛者。先以川芎。當歸各五分。酒煎入童便。一服立止。○胎氣不固。常慣小產。預服此。以固胎元。加熟地。阿膠。黃芩。砂仁。桑寄生。白朮。糯米。○因事胎動不安。及下血。欲墜者。加熟地。人參。白朮。茯苓。黃芩。阿膠。砂仁。○欬嗽吐痰。加桑白皮。杏仁。貝母。○泄泻。加白朮。茯苓。○瘡。加枳榔。草果。青皮。良薑。半夏。茯苓。葛根。○胎痛。加阿膠。延胡。黃芩。○妊娠七八箇月。前後面目浮腫。加熟地。茯苓。澤瀉。白朮。黃芩。山楂。麥冬。厚朴。○口禁。不省人事。言語錯亂。加生地。半夏。茯苓。麥門遠。志菖蒲。竹茹。○心痛。加延胡。乳香。○腰痛不可忍。加破胡紙。茴香。杜仲。○白濁白帶。加熟地。半夏。茯苓。蒼朮。牡蠣。龍骨。○小便淋漓不通。加木通。車前子。滑石。○大便閉滯。加生地。枳實。黃連。○妊娠至九

妊娠

婦六

箇月加枳實黃芩白术砂仁名達生散。臨產驚恐氣結連日不下。加枳殼。孕後覺氣動下血。及五六箇月內常服數劑甚妙。加熟地黃芩白术砂仁阿膠。

當歸貝母苦參丸治妊娠煩熱小便難當歸

貝母去心

苦參等分

右三味蜜丸如小豆大飲服三丸。加至十九。葵子茯苓散治妊娠小便不利惡寒頭眩。

葵子

五兩向日葵子也

茯苓一兩

鯉魚湯治妊娠遍身浮腫胎間有水氣。右二味爲散飲服方寸匕日三服。

白术

茯苓

當歸

芍藥各三

橘皮一錢生姜五片活鯉魚重酌許。右六味先煮鯉魚至熟澄清取汁內菜煎汁分五服。日三夜二虛加人參一錢五分。

竹瀝湯治子煩妊娠若煩悶頭目昏重是心肺虛熱或痰積於胸。

竹瀝一盞

麥門冬去心

防風

黃芩各三

茯苓四錢

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服。不安煩悶口乾不得眠者。

白茯苓

半錢

麥門冬

去心二半錢

黃芩一錢

人參一錢

竹葉五片

粳米一撮

水煎空腹熱服肥人加半夏生姜原方無人參粳米。芎歸湯治胎漏下血不止或心腹脹一服立効。

當歸尾

川芎各五錢

右剉一劑酒煎入童便一盞同服。

膠艾四物湯一名安胎飲治胎漏下血腹痛。

當歸

川芎

白芍

熟半

阿膠

條芩

白术

砂仁

香附

艾葉少許

右剉劑糯米一撮水煎空心服。

佛手散治妊娠五七箇月因事驚恐著胎或子死腹中惡露下痛不止口噤欲絕用此菜探之若不損則痛止子母俱安若胎損即便逐下。

當歸

六錢

川芎四錢

益母草五錢

胎動

婦七

右剉一劑水煎入酒一盞再煎一沸溫服。如人約行五里再進一服。

胎動

桂心茯苓丸 治妊娠癥瘕下血胎動在於臍上。

桂心

茯苓

牡丹皮

桃仁去皮尖熬

赤芍藥等分

右五味蜜丸如兔屎大每日食前一丸不知知至三丸。

乾薑地黃散

治妊娠漏胎下血。

乾姜炮一兩

乾地黃六兩切焙

右二味爲散酒服方寸七日三服。

白薇散

治妊娠肺熱遺尿。

白薇

白芍等分

右二味爲散酒服方寸七日三夜二服。

芩木芍藥湯

治妊娠腹中滿痛。又手不得飲食。

黃芩二錢酒炒一兩

白术六錢

白芍四錢

右三味水煎分三服半日令盡微下水則易產日飲一劑爲善。

瘦胎散

卽枳殼散

治妊娠體肥胎氣不運在

黃芩酒炒一兩

白术一兩

枳殼炒七半

爲散每服二錢。饑時砂仁湯下不可多服恐傷正氣瘦弱者勿服。

○子懸

胎氣湊泊上心忽然昏暈人事不

省謂之子懸必妊娠素多鬱悶痰氣壅塞致胎不安乘其鬱火升迫心下喘脹腹痛甚則忽然仆地急宜童便灌之次以紫蘇飲加鈎藤茯苓姜汁童便將產時昏眩亦宜紫蘇飲若誤作中風治之必殆。

○子癇

妊娠體虛受風則口噤背強冒悶

不識人須叟自蘇良久復作謂之風癇亦名子癇甚則角弓反張逍遙散加羌活羚羊角棗仁鈎藤豆淋酒煎服鄭守恒云子癇一證人不易識或眩暈或冷麻重至仆地不省人事驗其平日眼目昏沉或認白爲黑認黑爲白是其漸也。

○乳泣腹啼

未產乳汁先下此名乳泣生

子多不育又有兒在腹中啼哭者因妊娠登車是其漸也。

高舉臂。脫出兒口中血乳。以此作聲。令妊娠曲腰就地。如拾物狀。或令掃地。仍入兒口。卽止。亦有胎熱不安而啼者。以黃連濃煎汁。妊娠時時呷之。

## 惡阻

四君子湯加烏菜。香附。橘皮。

衆而渴者。加橘皮。五味。生姜。○胸中憤悶。四肢沉重。怠惰不能轉舒。惡聞食氣。喜鹹而胎動不安。嘔逆不食者。理中湯加茯苓。木香。半夏。○中脘停痰。二陳湯。加枳殼。○飲食停滞者。香砂六君子湯。加枳殼。○脾胃虛弱。異功散。兼氣腦。加枳殼。砂仁。○飲食少思。六君子湯。加紫蘿。桔梗。○頭暉體倦。六君子湯。嘔吐不食。倍苓半。

半夏茯苓湯。治妊娠惡阻。心煩頭眩。惡寒汗出少食。

半夏	生姜 <small>各四錢</small>	乾地黃	茯苓 <small>各二錢半</small>
橘皮	旋覆花	細辛	人參
芍藥	芎藭	桔梗	甘草 <small>各一錢六分</small>

右十二味。水煎服。二劑。便急使服茯苓丸。令

能食便強健也。  
金生白术散。治妊娠子腫。  
白术一兩 姜皮  
橘皮  
爲散每服三錢。水煎和滓日三服。

## 臨蓐

達生散。妊娠九箇月。宜服之。

紫蘿和氣飲。去川芎。加白术。黃楊腦三枚。催生者。達生散。去芍藥。加枳殼。童便。○難產腹痛久而未產。惡露少者。雖久不妨。若連腰痛甚者。將產也。如胞水先破。惡露行盡。累日不能下者。當補養氣血。急用佛手散。加入參二三錢。入熟童便調服。或用前藥送。兔腦丸。亦妙。

芎歸湯。催生之良方也。

當歸

右二味。炒研為散。紅酒調服。

○死胎者。胎母面赤。舌青。腹中陰冷。重墜是其候也。然不若見紫黑血塊。血續至若爪甲

與舌俱青。腹中氣喘。口中臭氣者危。急令穩婆動手。以法下之。

香桂散

治子死腹中。或胞衣不下。服後片時。

如手推出。

肉桂 三錢

麝香 三分

爲散。酒煎和滓服。冬月胎死。堅鞭腹中冷。加烏頭。

○死胎腹痛。大熱脉散。五積散。加姜附。立下。若不効。平胃散。加芒硝。大必下。

●交骨不開。因元氣不足。加味佛手散。元氣不虛者。只用佛手散。若見咬牙昏暈。急以熱小便灌之。稍遲則不救。

加味佛手散

當歸 三錢

川芎 一錢

人參 自三錢至五錢

炒研爲末。紅酒調服。臨服入童便。

●傷胎 脫月。胞水不破。血先下者。此是傷胎。非產也。大劑 保元湯。加當歸。童便。最爲得力。因產行動。已傷其胎。而發熱者。多危。紫蘿飲。倍人參。

●胞乾 臨月。胞水惡露破盡。致兒乾閼難

瀆。達生散。去术。倍人參。若胞衣破久。其血已涸。元氣困憊。急用上好人參兩許。當歸二錢。煎飲盡。則再煎。

●橫生逆產 宜用手練穩婆。內服獨參湯。加當歸。童便。切勿驚怖產母。

一方

灸右足小指尖頭三炷。艾炷如小麥大

兔腦丸

治妊娠難產。催生第一神方。

麝香 取當門

明乳香 二錢半

母丁香 一錢

右爲細末。揀臘月天醫日修合。活劈兔腦爲丸。如芡實大。硃砂爲衣。蠟和收藏。待臨盆腰痛兒不能下。用白湯囫圇送下。其子立產。鬼用小者爲真。若形如兔而大者。乃僞也。誤用則不驗。卽真兔之死者亦不驗。修合時忌見雞犬。婦人孝服及諸魔物。

半產

小產

半產重於大產。蓋大產如果熟自脫。小產人生採。破其皮殼。斷其根蒂。豈不重於大產。但人輕忽致死者多。治法宜補形氣。生新血。去

瘀血未足月痛而欲產。八珍去茯苓熟地。加膠艾。蕃草。若胎下而血不止。參。蕃。术。草。膠。艾。歸。芍。之類。有熱加炮姜。茯苓。半產而心腹痛。或發寒熱。以手按之愈痛者。宜散瘀血。芎。歸。延。胡。桃。仁。香。附。丹。皮。澤。蘭。童。便。之屬。若按之則痛緩。是血虛。八珍去芍加炮姜。若痛而嘔吐作瀉。是胃虛。六君子加炮姜。凡胎氣弱。欲愈湯汗。不止急用保元湯。發熱煩躁。肉闇筋惕。十全大補湯。大渴面赤。脈洪而虛。當歸。補血湯。身熱面赤。脈沉而微。四君子加姜附。

○胎不長養 胎之長養皆賴母之脾上輸氣於其子也。脾為一身之津梁。主周身之運化。在藏為土。長養萬物。莫不由此。故胎之生發。雖主腎肝。而長養實關乎脾。所以治胎氣不長。必用八珍十全。歸脾補中之類。助其母氣。其胎自長。多有延至十二三月而產者。觀瘠薄之土。雖執不獲得沃澤灌溉。便能成實。義可見矣。亦有妊娠氣血自旺。而胎不長者。此必父氣之孱弱。又當大劑保元專補其氣。此必父氣之孱弱。又當大劑保元專補其氣。

一方 治半產後戰慄

產後

八物湯和黑糖

○血暈 產後元氣虧損。惡露乘虛上攻。眼花頭暈。或心下滿悶。神昏口噤。或痰涎壅盛者。急用熱童便主之。若血下多而暈。或神昏煩亂者。芎歸湯加人參三五錢。澤蘭葉一握。童便半盞。兼補而散之。痰合二陳加烏梅姜汁。并用鐵秤鎚燒令赤以醋沃之。或燒漆器并亂髮以烟熏之。產後因虛火載血上行而暈。用鹿茸灰為細末。好酒童便灌下。一呷卽醒。行血極快。產後昏暈嘔逆。不能飲食。此冒虛挾痰所致。以抵聖散去赤芍加炮姜。茯苓。慎不可用芎歸血茶。臍膈。其嘔逆愈不能止矣。

生神散

治產後氣沉眩暈。

蒲黃

一錢

人參三分

甘草一分

為末。白湯下。

獨參湯。和炒熟蒲黃。服之尤  
為便。

芎歸調血飲 治產後諸疾。宜加減而用之

當歸 茄菜 川芎 熟地 白朮

茯苓 陳皮 香附 甘草

右入姜枣水煎。○初產臨服。加童便一鍾。好酒半鍾同服。是能行瘀血。退熱如神。○產後昏憒不語。加荆芥。○口苦咽乾。加麥冬。○看氣惱。加木香烏藥。○發熱不止。加乾姜炒。○生腸不止。加黃耆人参。○咳嗽。加五味子杏仁。○兩脇痛。加青皮肉桂。○吐痰。加半夏貝母。○嘔吐不止。加砂仁半夏。去熟地。○盜汗自汗。加黃耆酸枣仁。○泄瀉不止。加黃耆乾姜炒。去熟地。○瘀血不行。心腹兒枕痛。加肉桂蒲黃五味子牡丹。去白朮。○去血過多。頭暈暗。加荆芥。人参乾姜炒。○胸膈脹悶。加砂仁枳實山楂厚朴。○惡露不行。加貝母牡丹皮。入童便和酒服。○小產後心服痛。去白朮茯苓。加延胡牡丹桃仁紅花青皮澤蘭。○驚悸怔忡。加遠志麥冬酸枣仁。

二味參蘿飲 治胞衣不下

人參 蘿木 各五錢

水煎入熱童便。  
○嘔吐 恶露不行。二陳湯加丁香。不應。加人參炮姜沵蘭藿香。寒者。理中湯加藿香。有因傷食者。香砂養胃湯。○面赤嘔逆欲死。曰衝肺。急用二味參蘿飲。  
○呃逆 多因胃氣虛寒之極。最為惡候。理中湯。加丁香不應。急投參附。  
○發喘 痰聲大作。此痰犯肺金也。風則金匱。旋覆湯。加甘桔。惡露未淨。加炮姜丹參。有食。加厚朴陳皮。不嗽而喘。此肺為火迫。乃真虛。異功散。加桔梗。兼外邪。加細辛。中氣虛寒。前方。加炮姜肉桂。陽氣虛脫。更加附子。腎虛不納氣歸。都炁丸。作湯。送靈砂丹。兼氣虛者。與異功散兼進。大抵產後發喘。加脉之虛大。急疾。皆不可治。○薛氏曰。瘀血入肺。面黑發喘。用二味參蘿飲。

旋覆花湯

水煎

旋覆花

葱莖

新絳 生用少許

奪命散

治產後敗血衝心。胸滿上喘。命在須臾。

血竭

沒藥各等分

酒童便各半。為湯送下。

○產後鼻衄

乃氣血逆行所致。紫蘿和氣飲入童便。荆芥灰如口鼻犯黑色而衄者。冒氣虛敗而血滯也。難治二味參蘿飲稍遲則不救。或用華蕤石散。

○口中血溢出。暴吐血嗽血。

四物湯加延胡木香炮姜。產後惡露已淨者治與平人同。

○產後暴崩下血。

大劑獨參湯和熟蒲黃末。

○兒枕痛。產後少腹痛。俗名兒枕痛。古法

用失笑散及四物湯加莪术山楂。崩中去血。赤白相兼。或如豆汁。千金伏龍肝湯能溫脾胃。涼肝血。其功如神。若惡露既去。而仍痛。四神散調補之。少腹痛。當視去血多少。如敗血凝滯有塊而痛者。醋煎散無塊者。四烏湯須看人虛實酌用。

伏龍肝湯丸

炮黑查肉一兩

熬枯黑糖三兩

右二味。一半為丸。一半為末。用伏龍肝二兩。煎湯代水。煎末二錢。送前丸二錢。日三夜二服。一晝夜令盡。氣虛加人參二三錢。以駕馭之。虛熱加炮姜肉桂茯苓甘草。兼感風寒。加葱白香豉。膈氣不舒。磨沉香汁數匙。調服。

四神散 治產後血虛。或瘀血腹痛。

四物湯去地黃。加炮姜。溫酒。調服。

○泄瀉其因有五 一者。因胎前泄利未止。產後尤甚。二者。因臨產過傷飲食。產後滑脫。一者。因新產驟食肥腥不能憇運。一者。新產煩渴。恣飲水穀混亂。二者。新產失護。臍腹臟府受冷。其致瀉之由雖異。一皆中氣虛寒。傳化失職之患。茲宜理中湯為主。食加枳實山楂。水加桂心茯苓。虛加桂附。倍參。寒加桂附。倍姜。久瀉腎虛。加桂心熟附。瘀血不行。加炮查歸身。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣虛脫之候。十有九死。惟猛進溫補之劑。庶可挽回。即有煩躁發熱。面赤脉來數大。皆虛火上炎之故。當並進桂附人參甘姜术。

芩之類。伏龍肝煮湯代水煎服。仍得効。若小便混濁如泔。或大便中有白沫。如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜補中益氣。加桂芩炮姜。升舉之。或臭水不止。加蘄艾香附吳茱萸。若兼瘀結不通。腹脹喘急。神丹不能復圖。

○產後心痛。惡血上攻心痛。為陰血虧損。隨火上衝心絡。名心胞絡痛。理中湯。加當歸。產後惡露未淨。胸腹作痛。或小便不利。琥珀地黃丸。溫之。產後心痛。大寒。嘔逆不食。千金蜀椒湯。產後心痛。嘔逆涎沫。大岩密湯。若真心痛。且發夕死。瘀血上衝。用失笑散一錢。童便調下。即定。血既散而仍痛。增損四物湯。調補之。

**千金蜀椒湯 治產後心痛大寒。**

蜀椒 <small>炒二合</small>	芍藥	當歸	半夏	甘草
桂心	人參	茯苓 <small>各二錢</small>	蜜 <small>一合</small>	生姜 <small>一合</small>

右十味。先煮蜀椒令沸。內諸藥去滓。入姜汁。蜜。禁勿冷食。

**大巖蜜湯 治產後心痛。**

乾地黃 當歸 獨活 甘草炙

芍藥	桂心	遠志	細心 <small>各二錢</small>
吳茱 <small>半合</small>	乾姜 <small>炮一錢</small>	蜜 <small>半盞</small>	

水煎去滓。內蜜。重煎。

○產後傷風。須問惡露淨否。而用藥。若未淨而少腹疼痛者。以行血理氣為先。金匱旋覆花湯。四烏湯。撰用。若惡露已淨。少腹不疼。但頭痛身熱。足冷自汗。欬嗽。黃耆建中湯。頭重香薷散。虛甚著風者。不可發散。逍遙散。去术。加桂枝得效。雖遲無失。

○產後傷寒。不可遽用小柴胡。蓋黃芩在內。停滯惡血也。宜小建中湯。增損柴胡湯。時疫柴胡四物湯。香薷散。伏氣發溫。葱白香豉湯。感冒氣食。香薷散。產後得熱病。四肢緩。而脈息和平者生。四肢冷。而脈沉濇煩熱甚。而脉洪盛者。皆死證也。

○產後乳汁。自出不止。●乃冒氣虛。宜服五味異功散。加黃耆五味子。以摑之。若乳多溝。而壯熱大渴。通乳張硬掣痛。名曰妬乳。當以

○新產兒。未能吮乳。乳汁畜結。與血氣相搏。而壯熱大渴。通乳張硬掣痛。名曰妬乳。當以

手樽去宿乳。或吮去尤妙。并以貝母桔萎實甘草節和之。

○初產因子不育。蒸乳而發寒熱。用斷乳法。以四烏湯。加炒麥芽一兩即止。不然恐內結成瘡。

○吹乳腫痛。速用桔萎實一枚。連穰搗爛。甘草節一寸。乳香一錢。煎成加溫酒服。服後側臥於床。令氣氣行。外以天南星末。醋調敷。以手揉之自散。

○乳風腫痛。宜敗毒散。乳子用後方。

桔梗根 茯苓 桔梗 大 木通 中

枳實 薤香 小 甘草

水煎

一方 治婦人盛乳汁不通者。

桔梗 半錢 蘿蔴 花粉 柴胡 各一  
通草 分 青皮 白芷 木通

赤芍 連翹 甘草 各五

水煎服。更摩乳房。

一方 治婦人虛乳汁不通者。

木通 花粉 當歸 川芎

水煎。先將葱湯洗乳房。

一方 治乳汁不通作痛者。

生地 白芍 王不留行 各等分  
當歸 花粉 甘草 王不留行 各三  
水煎 當歸 穿山甲 醋炒各五錢

當歸補血湯 產後無乳者。主之

當歸 葱白。水煎服。

膠艾湯 婦人有漏下者。有半產後因續下血。都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞阻。此湯主之。

四物湯用乾地黃。加阿膠甘草艾。清酒和水各半煎服。一方乾姜多千金無地黃芍藥。

內補當歸建中湯 治產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸々少氣。或苦少。腹中急。摩痛引腰背。不能食飲。產後一月日得服四五劑。為善令人強壯。宜此湯。

桂枝湯。桂枝易肉桂。加當歸二錢。膠飴六錢

**枳實芍藥散**

治產後腹痛煩滿不得卧。

**枳實燒令黑**

芍藥等分

右二味杵為散。服方寸匕日三服。并主癰膿以麥粥下之。

方中枳實燒黑，全是散逐瘀積故癰膿亦能主之。

**知母湯** 治產後乍寒乍熱。手足身溫心胸煩滿。

**知母** 各一錢 芍藥 黃芩 各四錢 桂心 甘草 各二錢

右五味水煎分三服。

**狼牙湯** 治婦人陰中生瘡蝕爛。

狼毒牙 一兩

右一味水煎取汁半盞。以綿纏箸頭如繭。浸湯瀝陰中。日三四遍。

**牛膝湯**

治兒產胞衣不下。

**牛膝**

瞿麥 各一兩

當歸

**通草** 各兩半

滑石 二兩

葵子 半升

右六味水煎分三服。一方無滑石有桂心一兩

**婦人科畢**

### 小兒科

三河 滬烏巢輯錄

平安 滬主篤

校正

**脈法** 小兒三歲已內看虎口食指寅卯辰三關以驗其病。脈紋從寅關起不至卯關者易已。若連卯關者難愈。若寅侵卯卯侵過辰者最劇。其脈紋見五色。如因驚必青。熱則赤。風熱鴻利色紫。當以類推之。又紋色頭而有榮糢者爲有胃氣。易治。紋色細淡而直如刀刃者。乃正氣之虛。難治。紋上另有一點如流珠者爲宿食。紋傍另有一條如絲縷者爲風痰。紋斜向內者易已。斜向指甲者難愈。三歲後則以一指轉側辨其脈。五六歲後脈六七至爲平脈。浮爲風。浮而遲爲有寒。弦急爲寒。沉濁爲傷食。伏結爲物聚。微細爲疳積。爲腹痛。浮而洪爲有熱。浮而遲爲有寒。弦急爲氣不和。促結爲虛驚。脈亂不治。

### 初生

夫小兒初生。如水之漚。以峻不可攻。古謂初

初生驚風

小兒一

離母體口有液毒。啼聲未出。急用軟綿裹指拭去口中濁穢。此固良法。次可用黃連甘草二味。甘草調中。黃連能去心竅惡血故也。

加減紅花散 治初生胎毒搐搦。或肌膚赤色。血毒小瘡。吐乳。或小便黃。大便不通。謂之血疽。因母受濕熱。或衣被大煖所致。

紅花 沉香各二分 蘿香 木香各半分

升麻

枳殼

丁香各一分

大黃

鬱金

積雪草各三分

檳榔

，

右十一味。熱湯漬之。絞去滓。分溫服。○一方。無枳殼。有連翹。青木香。桔梗。甘草。共十四味。或加入中黃。治遺毒久瘡。○一方。無枳殼。鬱金。木香。有陳皮。青皮。連翹。青木香。甘草。共十三味。○胎毒在上部。方中大黃酒蒸用。在皮膚中難發。加牛房子。裏熱甚。加黃連。欬嗽目眩。加荆芥防風。

驚風

加味敗毒散 治驚證。因時氣感冒發者。

卽人參敗毒散。加天麻地骨全蝎。僵蚕白

附子

急驚

錢氏云。小兒急驚。因聞大聲或驚而發搐。搐止如故。此熱生於心。身熱面赤引飲。口中氣熱。二便黃赤。甚則發搐。蓋熱盛生風。陽盛而陰虛也。經曰熱則生風。風則痰動。痰熱客於心膈間。風火相搏。故抽搐發動。當用抱龍丸。瀉青丸。除其痰熱。

瀉肝散 治肝經火旺。目睛頻動。痰氣上衝。或壯熱搐搦。面色紅赤。脈有力。脾胃無傷。宜瀉肝火。

川芎 茯苓 芍藥各六分 當歸  
芷胡 陳皮 枳殼 天麻各六分  
甘草 黃連酒各四分 薄荷三分  
右入生姜一片水煎。

寬氣飲 治小兒風痰壅滿。傷於氣。不能言語。

枳殼 人參 天麻 差活  
僵蚕三分 甘草減半  
右姜煎。○驚證口眼拘攣。手足搐搦。甚者。用

之屢效。

七味湯 治自初生至三歲驚證。

急驚 慢驚

小兒二

黃連 甘草生各 黃芩 青皮  
肉桂 桔梗 遠志各中

右水煎。一方無青皮遠志有陳皮白术。○一方黃連黃芩二分半陳皮白术遠志二分。肉桂七厘甘草五厘。○又此方中無黃芩。有黃檗。已上四方選用。

○凡急驚風其所因多矣。或因外邪或因胎熱或因停食或因乳母食滯或因乳母有病吃其乳發者治法各求其本而可施治也。然因胎毒發者亦多。此初生時食母穢物畜積在左脇隨時發宜用擺菜三方見下選用亢滯食乳滯在右脇又有痰積大概痞中腕上腕之間治法可用香砂平胃散香砂二陳湯。又癇證驚搐者清心抑膽湯大抵驚肝木魁脾土而內外發於熱也。其熱表發或裏下而醒矣。

### 慢驚

醒脾散 治吐瀉不止作慢驚風。脾困沉默々

不食。  
四君子湯加木香全蝎僵蚕天麻白附子姜枣煎。○一方去天麻僵蚕加南星半夏陳皮。○一方加陳皮南星丁子山茱蓮肉石菖蒲肉豆蔻砂仁名大醒脾散治內虛昏迷不醒。

鉤藤飲 治脾虛傷風身熱足冷欲成慢驚。  
鉤藤鈎 蟬蛻 防風 人參

麻黃 白殭蚕炒 天麻 蠍尾去毒各

川芎 甘草炙各 麋麝香一分另研

水煎溫分二三服。

七味白术散加細辛天麻各一 全蝎三箇 白附子八分 體裹治慢驚已作者通用之劑也。

異方銀白散 加細辛天麻各一 全蝎三箇 白附子八分 體裹治或吐或瀉見睛驚跳者。

蓮肉 白扁 茯苓各一 人參

天麻 陳米炒三 甘草一分

右姜煎此方治慢驚通用也。

六君子湯 驚風屢用祛風化痰瀉火辛散劑。不愈則為脾虛血損而可治急用此湯補脾。

胃不然。則慢驚變。慢驚風口中氣冷眠見睛。此湯加姜桂全蝎。若夾熱夾食夾痰與外感證相似。詳其因治之。慢驚脾土虛寒。此湯加烏頭蝎尾泄瀉。加炮姜木香不應。則急加附子。發搐此湯加鉤藤鈎健脾氣平肝木。或保元湯加芍藥。

○凡慢驚之證。病後或吐瀉或茶餅因傷損脾胃。肢體逆冷。口鼻氣微。手足瘺痙。昏睡見睛。此肺脾虛而肝木亢病也。故伐肝藥品可輕之。專以補肺脾。須為重諸病誤藥後。此證作則壞病也。慢妄也。壞也。自初非有慢驚證也。

## 癰

驚風三發。則為癰。云云。陽癰。身熱抽掣。啼叫仰卧。面光脈浮。○陰癰。身冷不掣。不啼。伏卧。面黯。脈沉。

清心抑膽湯見前 治陽癰。兼用丸藥。

丸藥方 諸癰通用。

荆芥 白礬各等分

右糊丸。以大辰砂為衣。○或用熊膽一味。六君子湯。加木香柴胡。治陰癰。兼用奇方丸散。或茶餌。

○凡癰證多主痰實者。二陳湯。或六味溫膽湯。加黃連姜山梔等。通用之。○此證用單味熊膽可試之。卒忽定者。皆癰發也。右用六君。二陳。溫膽等。加味之。以小劑得効者多。

## 癬疾

香橘餅子 治乳癬。食積。

厚朴半分 砂仁 神曲 麥芽各五分  
三棱三分 木香 陳皮 青皮各二分

右水煎。痞右章門邊者。乳癬。食積也。

二陳湯 治因積生熱。生痰者。

本方。加升麻葛根芍藥人參五味子。姜煎。此積腹中居處不定。

一方 治癬積。因胎毒。發者通用。

紅花 麝金 青皮 香附

陳皮 菟木

穢雪草各等分

右七味。熱湯浸之。去渣溫服。○又一方

蛇蟲 痘疾

小兒四

山蠶 紅花 青黛 右三味同上 ○

又一方。前方去青黛加鬱金。右撰用。

信弘湯 不問癬疾或瘡毒通用屢效。

和白朮 茯苓 炙木 草木 檳榔

使君子 鬱金 紅花 韭

右七味熱湯浸之去楂分溫服。

○凡癬疾。蟲積。血積。痰積。食積之五也。蟲積世多妙方。桑山保童圓磨積圖。熊膽丸之類。隨證可用之。癬疾食積等。日久則皆脾胃虛憊而生變証。以五味異功散。錢氏白朮散。參苓白朮散。六君子湯可兼用之。

### 蛇蟲

蛇蟲證。或吐或下。又令腹痛。或冬月吐乳之兒。此證多。

錢氏白朮散。加丁香三粒。此加味通用也。理中安蛇湯。治前證。冒寒甚者。即理中湯。加丁子川椒烏梅或加縮砂肉桂。可隨時宜。或加附子。

○蛇蟲證。有發熱者。七味清脾湯。或人參養

### 瘡疾

蟾蜍丸 治無辜瘡

蟾蜍

大者數枚

以番蛆三杓。置桶中。以尿浸之。將蟾活搗爛。與蛆食之一晝夜。用布袋盛蛆。置急流水中漂淨。取出瓦上焙乾。入麝少許。陳米飯丸。子大每服二三十丸。米湯或砂糖湯服之。一服虛熱退。二服煩渴止。三服鴻利愈。或用陳米炒爲粉。入糖霜作餅服之亦可。

如聖丸 治熱瘡善食腹大

史君子肉 二兩 胡黃連

川黃連

白蕪荑仁

炒各一兩乾蟾五枚煅存性

麝香

木香 肉豆蔻 砂仁

炒各三錢去油

麝香

三錢乾蟾三枚燒存性

爲末。蜜丸。菉豆大。每服五丸。十五丸。薄荷湯送下。虛者去續隨子。加姜桂參末。

疳疾

小兒五

消疳丸 治五疳。皮黃肌瘦。髮直。尿白。肚大。青筋。好食泥炭茶米之物。或吐。或瀉。腹內積塊。

諸虫作痛。

蒼术 陳皮 厚朴 枳殼 檳榔

神曲 山楂 麥芽 三稜 藝朮

砂仁 茯苓 黃連 芦薈 胡黃連

蕪荑仁 使君子

右爲末。使君子殼煎湯。泡蒸餅爲丸。如彈子大。每服一丸。清米湯化下。或以小劑爲懶藥。是攻擊劑也。虛弱者可斟酌之。

春泰飲 經驗。消疳。治疳証。或面黃。肌瘦。肚大

青筋頭大項細。

白术 和炒 茯苓 猪苓 藝朮 黃柏 半黑炒

花粉 山梔 炒各 黃連 生 檳榔 甘草 各半生

右十味。熱湯浸之。去滓分溫服。

○疳病害眼者。用蕪荑仁青葙子細末各一錢。不經水驅雞肝一具。研爛入白酒釀。飯上蒸熟食之。不過五七服必愈。

明目湯 滋眼奇方

防風 香附 白芷 猪苓

澤鴟 車前 酒制各大 荆芥 中 蘭花

金銀花 柑梗 甘草 各小

右十一味水煎。○以此湯餌鰻魚小者以車前子葉根俱之。日兩度用之。

生地黃湯 治疳眼閉合而不開

川芎 赤茯 枳殼 杏仁

黃連 半夏 天麻 地骨 各二半

生地 熟地 各五 甘草 一錢炒

右入生姜。黑豆十五粒。水煎。

○疳在內。目腫腹脹。臍突。渴利。青白。體漸瘦弱。疳在外。鼻下赤爛。頻搔鼻耳。或肢體生瘡。鼻瘡。蘭香散。諸瘡。白粉散。選用。蘆薈消疳飲 治走馬牙疳。身熱氣急。牙齦腐爛。氣味為臭。以穿腮及破唇者。

蘆薈 銀柴胡 胡黃連 玄參

牛房子 黃連 桔梗 山梔

羚羊角 石膏 薄荷 各五分 升麻

甘草 各三

淡竹葉 十斤

右水煎

參术肥兒丸

消疳化積磨擦清熱伐肝補脾

進食。殺血潤肌膚養元氣。

人參

神曲

山楂

麥芽

黃連

各三  
半

白朮

茯苓

甘草

胡黃連

各三  
半

使君子

四錢  
半

芦薈

二錢  
半

右陳倉米糊丸。篆豆大。每服二十粒。米湯下。此治癬塊發熱。王道之劑也。久服除病根。或兼餌赤蛙。或雞膽。或赤大肝。隨証宜用之。

五疳保童圓

使君子

一兩  
取臭

常山虫

霜五  
分

赤蛙

霜五  
分

海人草

霜二  
半

海蘋

霜五  
分

選赤物

右糊丸。如椒目。每服十五六丸。量兒大小。日再三服。

加減保童圓

莪木

青皮

熊膽

三稜

乾漆

丁子

木香

肉蔻

人參

各一  
半

使君子

右細末糊丸。加粟粒大。每服五丸。或十九日。再三服。○一方。有熱者。去丁子肉蔻。加黃連。合歡實二錢。

五疳散 脾胃虛冷。泄瀉腹痛不食。

白朮

人參

茯苓

各二  
半

砂仁

肉豆蔻

各七  
分

乾姜

各一  
半

甘草

火

右細末。熱湯浸和。楂服。作煎湯亦佳。○大便泄瀉不止。加附子少許。○感風寒。加肉桂。○若腸胃有虫。加使君子少計。○若晡時發熱。加黃耆肉桂。倍人參。不可用柴芩梔之類。

感冒

小兒傷風。鼻塞發熱。或痰壅發燒。多因乳母鼻吹顙門。但服惺惺散。或用葱頭七莖。生姜一斤。細切擂爛。攤紙上。置掌中。待溫貼於顙門。其邪即解。乃去其葱。却用絹綵寸餘。塗以麪糊。仍貼顙門。永無傷風之患。其餘用茶發散。與大人不異。但脾胃怯弱。所以多手足寒冷之證。故治法以照顧脾胃爲主。

惺惺散

治外感風寒。鼻塞痰嗽發熱。

四君子

加桔梗。天花粉。細辛。薄荷。生姜。

一方 治感寒有汗

八解散加羌活。川芎。荆芥。白芷。姜煎

一方 治感寒無汗

紫蘿

桔梗

人參

羌活

川芎

枳殼

茯苓

前胡

獨活

陳皮

甘草

各等分

右姜煎

## 時疫 幷諸熱

聖惠解肌湯 治時氣壯熱。頭疼咳嗽。不食。

麻黃

杏仁

赤芍

貝母

柴胡

葛根

甘草各半兩

石膏

一兩

右水煎

葛根散

治時氣煩渴。腹中痞實。

葛根

黃芩

柴胡

甘草各半兩一大黃炒一兩

右煎

羚羊角散 治夜啼。及多驚熱。心經有熱而驚

啼者用之

羚羊角

黃芩

犀角

茯神各一錢

麥門

甘草

少火

水煎

安神丸

治心經虛熱。睡中驚悸夜啼。

人參

棗仁

茯神

半夏

製各一錢當歸

橘紅

芍藥各半兩

五味子

七粒

甘草各三分

為末姜汁和丸。芡實大每服一丸。薄荷湯下。

導赤散 治小兒小腸實熱。小便秘赤。

生地黃

木通

甘草各等分

右入竹葉水煎服。○本方加人參。麥門。竹葉。燈心。名加味導赤散。治小便黃赤。口乾煩渴者。○小兒諸熱。以意可用之。多効。

## 變蒸

小兒變蒸。變者。變其情智。蒸者。蒸其血脈。大抵三十二日爲一變。每經變畢。則情智異常。全嬰方論云。變蒸者。以長氣血也。變者。上氣蒸者。發熱。輕則體熱虛驚。耳冷。骯冷。微汗。脣生白泡。三日可愈。重者。寒熱脈亂。腹疼啼叫。不能乳食。食卽吐。五七日方愈。變蒸之時。不欲驚動。當其時有熱微驚。慎不可治。及灸刺。但孰視之。若良久不已。少與紫丸微下。熱歇便止。若於變蒸之中。加以時行溫病。或非變蒸而得時行病者。其證皆相似。惟耳及尻通熱。口上無白泡。當先服黑散以發其汗。汗出。溫粉粉之熱歇便瘥。若猶不除。乃與紫丸微下之。小兒稟虛之所不免。勿藥可也。嘗見小兒變蒸發熱有痰。投以抱龍丸。卒至不救。若

胎熱 胎黃

小兒八

不熱不蒸。畧無證候而暗變者。稟氣壯實故也。

聖惠柴胡散 治變蒸經日不止。挾熱心煩啼

吐。骨熱面黃。

柴胡

甘草 炙 人參

玄參炙一兩

龍膽炒黑半兩酒

麥門冬半兩

右水煎一方無玄參。有防風。

平和飲子

變蒸三日進一服。

四君子去白术。加升麻。水煎或不換金。

藿香正氣散等亦佳。

當歸散

治變蒸有寒。而無熱者。

當歸二兩

木香

肉桂

甘草 炙 人參

右姜棗水煎。

調氣散

治變蒸吐瀉。而不飲乳。多啼。欲發慢

驚者。

人參

木香

香附

陳皮

藿香

甘草

炙一兩

右姜棗水煎。

惺芎散

治變蒸發熱。或咳嗽。痰涎。鼻塞。聲重。

白术

茯苓

人參 甘草

桔梗 細辛 川芎

分各等

右水煎去川芎。加天花粉。薄荷生姜。則惺。芎散也。

胎熱

胎熱。母孕時。因過食干熱毒物。而兒生下。身熱面赤。眼閉。口中氣熱。焦啼。燥渴。或令大小便不通。

釀乳方

生地黃二兩

次鴻一兩半

猪苓

赤茯

天花粉各二錢

茵陳

甘草

各半

右水煎而令乳母絞去宿乳。服此湯。須臾而令兒吃乳。

一方 治小兒胎熱症  
甘草二錢 黑豆二錢 竹葉五錢  
右燈草水煎。頻々進子母。可俱服。

胎黃

胎黃。皆母因受熱傳胎。兒生下。而遍體面目。皆黃。而狀如黃金色。身上壯熱。大便不通。小便如橘子汁。不思乳食。啼哭不止。後方主之。

**地黃湯**

胎驚 痰欬 腹痛

小兒九

生地 赤芍 川芎 當歸 天花粉

猪苓 沢瀉 赤茯 苜陳 甘草各等分

右水煎。食前乳母服。并略滴些少。與兒口中。

**胎驚**

胎驚。胎婦調適。因常乖。而飲食嗜慾。忿怒驚  
懼。有所觸。則胎必感之。或外挾風邪。有傷  
胎。故子乘母氣。而生下。即病也。其眉間氣色  
紅赤鮮碧者可治。若點而青黑者。不治。虎口  
指紋曲入裏者可治。反出外者不治。

**青金丸**

人參 天麻 白附 膽星各二分 茯神二分

青黛一本 甘草灸一  
半 朱砂半分 麝麝香一字

右細末。煉蜜丸。鈞藤。皂莢子煎湯。下之。

**鎮驚散**

治胎驚。

朱砂 牛黃少許

右取猪乳汁。調稀抹。而入口中。加麝香少許。  
尤效。

**痰欬**

**加味二陳湯**

依本方。加細辛。木香。枳殼。杏仁。

**瓜萎枳實湯**

熱燥。痰火。喘急。

**鴻白散**

清肺湯之類。與大人門。可參考。

**一方**

小兒身熱。感冒。鼻流清涕。或鼻塞。咳嗽。  
吐痰。輕者不藥。候一二日。而自愈。重者用此

方。治痰為主。輕々和解之。

白术一本

茯苓七分

桑白皮蜜炒  
七分

川芎

橘紅

桔梗

半夏各五  
分

防風

薄荷

黃芩

甘草各三  
分

右姜煎。○一劑分十貼。以水一盞。煎七分。  
右為末。每服五分。以蜜水調下。

**腹痛**

小兒腹痛體瘦。面色胱白。目無精光。手足指  
寒。口中氣冷。不思飲食。或嘔利撮口。此脾土  
虛而寒。水所侮也。益黃散。或理中丸去參加。

茯苓。○口中氣溫。手足心熱。面色黃白。目無精光。或多睡惡食。或大便酸臭。此積痛也。消積丸。甚者白餅子下之。後以白术散調補之。○下而致口渴。○腹脹而悶。亂喘滿者。白餅子。○不悶亂喘滿者。脾虛也。白术散調補之。○下而致口渴。○腹脹面四肢浮腫。肚腹愈脹。脾虛欲發驚癇者。塌氣丸溫理之。○腹中有癖不食。飲乳則吐。按之則啼。當暫用白餅子下之。○小兒病過多。脾胃虛弱。不能傳化水穀。以致四肢羸瘦。肚腹漸大。而成疳矣。六君子加乾薑。○痛連兩脇。肝木乘脾也。四君子加柴胡芍藥。○腹痛重墜。脾氣下陷也。補中益氣湯加枳實。○手足指冷。或呃逆泄瀉。寒水侮土也。六君子加炮姜肉桂。不應急加附子。○服剋削之蒸。致腹作痛。按之痛止者。脾氣復傷也。五味異功散。○腹脹喘滿。亦皆脾虛邪乘所致。東垣所謂寒脹多而熱脹少。熱者六君子加芩連枳朴。寒者六君子加姜桂吳茱萸。亦有寒熱錯雜者。瀉心湯。芩連炮姜並用。○治實。

藿香湯 治小兒腹痛

藿香 大白术 茯苓 陳皮 各中甘草

右水煎。○傷食加砂仁神麆山楂。○手足冷加乾姜肉桂。○不食。加麥芽砂仁白豆蔻。○感冒。加蘿葉葛根。○欬嗽。加桔梗杏仁桑白皮。○大便不通。加大黃桃仁厚朴。○小便不通。加豬苓沴瀉。○赤痢。加芍藥阿膠黃芩黃連。○白痢。加乾姜肉桂。○後重。加木香枳榔。○腹痛甚。加青皮莪术枳榔。○泄瀉。加厚朴芍藥肉豆蔻。○急驚加柴胡牡丹大黃。○慢驚吐瀉。加肉豆蔻黃耆天麻。○夜啼。加黃連麥門。

泄瀉

凡泄瀉。大人用胃苓湯證。不換金合四苓散。若胃寒。加乾姜。或肉桂。或木香。若有熱者。加姜炒黃連。或錢氏白术散。加豬苓。沴瀉。此大概之治法也。若寒月。虛寒甚者。理中湯。或附子理中湯加減。隨症可用之。

小兒脾胃俱傷。則嘔泄並作。傷寒熱停滯。則嘔吐出酸穢。或黃色乳。或腹痛下利者。瀉黃散保和丸選用。胃虛食不化而發熱者。六君子加黃連吳茱萸木香。○停滯已去。瀉瀉不已。理中湯去參。加茯苓赤芍。胃氣不能化食。益黃散○傷生冷腹痛。瀉利青白。六君子加砂仁木香炮姜。○傷魚肉等物。六君子加查砂仁。○瀉紅黃赤黑腸胃俱熱也。養胃湯加木香黃連。○夏秋傷熱。吐瀉色黃者。玉露散○夏秋霍亂吐瀉。手足心熱。口乾脣燥喜飲冷水者。五苓散○霍亂吐瀉。手足逆冷。喜飲熱湯者。理中湯○瀉利青白。乳食不化。額上微汗。脈沉遲而或噦逆者。由胃氣虛甚。過服慾伐。使清氣不升。濁氣不降。以致氣不宣通而作也。○瀉而噦臭吞酸。胸腹滿痛。按之益甚者。雖作瀉而所傷之物未消也。保和丸消導之。腹痛按之不哭者。乳食已消也。異功散加木香。驚瀉者肝主驚。木盛必傳於脾。脾土既衰。則乳食不化。水道不調。故泄瀉色青。或兼發搐也。亦有因乳母脾虛受驚。及怒

動肝火致兒吐瀉色青。異功六君加柴胡鈎藤鈎蟲梢之屬。實脾以寧肝膽之氣。慎勿用峻攻之藥。脾氣益虛。肝邪彌甚。甚至抽搐反張也。○母食厚味而乳熱者。清胃散○母飲燒酒而乳熱。或子母身赤。或昏憤吐瀉。丹方用錫掇盛滾水。蓋良久。取蓋上蒸氣水服之。卽解。同氣相求之義也。吐痰涎及綠水者。胃虛受冷也。吳茱萸湯。

加味五苓散 治濕瀉。濕瀉者。瀉水多而腹響雷鳴。脉細是也。

依本方加山茱萸砂仁陳皮蒼朮荊子肉豆蔻甘草。姜煎。

和瘡散 治脾癆瀉瀉。

沉香 桀榔 肉蔻 人參 使君子  
胡連 甘草 木香 薰陸 鹽甲  
右入粟米。水煎。或作丸。甚效。

### 痢

手足指熱。飲冷者。爲實熱。香連丸。手足指冷飲熱者。爲虛寒。理苓湯。若兼體重肢痛溼熱傷脾也。升陽益胃湯。小便不利。陰陽不分也。

五苓散。○溼熱退而久痢不愈者。脾氣下陷也。補中益氣湯倍升柴鴻利兼嘔。○腹中作痛者。脾胃虛寒也。異功散加炮姜木香。○變而爲瘧者。六君子加升柴。○積滯已去。利仍不止者。脾氣虛也。四君子加肉果。有寒加吳茱萸炮姜。有熱加炒黑宣連。丸服尤妙。

加味異功散。治痢病。十日二十日同事食少。

氣力弱者。

人參	白术	茯苓	當歸	芍藥
陳皮	山藥各一	砂仁七分	甘草少	

右姜棗煎。

白术和中湯。下痢不拘新久。或用芍藥湯之類。下後未愈者。用之和。

當歸	白芍	白术	當歸	芍藥
黃芩各半	甘草	黃連紅者	木香各少	陳皮

右水煎

加味四君子湯。治脾疳泄瀉。痢疾屬氣虛者。

人參	白术	茯苓	黃耆	
砂仁各半	山藥三分	甘草五分		

右棗肉水煎。○若腹痛。加炒黑乾姜。木香。烏

梅。

參苓白术散。治虛弱人。禁口痢。飲食不下。

本方。加石蓮肉。石菖蒲。各一兩。或後重加木香。

附子理中湯。加肉桂茯苓之方。治小兒痢疾總司也。初起以此湯。試寒熱虛實。治之。則萬無一失矣。此萬世不朽之方也。

## 瘧疾

小兒瘧疾。不越風食乳癖。食積痰積。挾驚挾暑。與脾虛胃弱之不同。蓋風則多寒。食則多熱。乳癖則泄瀉多哭。痰積則嘔吐喘鳴。食積則腹脹下血。挾驚則發搐。指冷。挾暑則昏睡。壯熱。脾虛則倦怠肢冷。胃虛則多渴少食。治法不離疎風消導豁痰。如小柴胡隨證加減。多寒則加羌活桂枝。多熱則加橘皮枳實。泄瀉則加厚朴神曲。嘔吐則加橘皮枳實。下血則加枳實黃連。發搐則加鈎藤羌活。昏睡則加茯苓沵瀉。脾虛則補中益氣加桂枝。胃虛

則六君子加草菓。夜發則加當歸。日晏則加升麻。若痢後瘧。瘧後痢。與夫三日瘧。及久瘧不止。俱補中益氣爲主。瘧母以小柴胡加龜甲桃仁丸服。大抵小兒肌腠疎薄。無汗者絕少。即使無汗。稍加桂枝。有汗。并加芍藥。不必用知母石膏紫蘇。卷活輩也。至於勞瘧。瘴瘧之類。小兒本無。不復贅及。其有因乳母七情六淫所致者。又當以小柴胡逍遙散之類。兼治乳母爲當。

七味清脾湯 治食瘧。嘔吐痰沫。及時行瘴瘧。不問先寒後熱。諸瘧通用。小便赤。加豬苓澤鴻 方見大人門

## 嘔吐

清胃保中湯 治熱吐。

藿香 白术 黃芩 茶子

黃連或各一錢

甘草三分

枇杷葉一錢

右入生姜三片。水煎。

一方 治虛寒。蛇蟲上衝。必吐乳食。

七味白术散

加丁子砂仁烏梅川椒乾姜

六君子湯 加姜炒黃連

治脾胃虛。熱吐。夾痰

肉桂

一方 吃乳後。或半時。或一時。而吐之者。熱吐也。見乳汁中。如交黃綠色者。此心脾熱也。

六味溫膽湯 加黃連姜山梔青皮

六君子湯。加姜炒黃連。治脾胃虛。熱吐。夾痰者。

○傳云。初生三五十日中。乳味多。則吐矣。然有胎毒者。宜用擺茶。見癬疾門。或兼虫積。或兼瘧熱者。可兼用熊膽火。又外邪表熱甚。則吐乳多。是表熱以甚也。若欲止吐。則反害多。可用藿香正氣散。吐自止矣。

## 咬牙

小兒寤寐不時咬牙及齧乳者。雖多屬驚。然所致各有不同。惟齧乳驚搐者。抱龍丸。若發熱飲水。咬哭而搐者。心經實熱也。渴心湯。睡困驚悸。合目而卧者。心經虛熱也。導赤散。面青目劄。呵欠項強煩悶者。肝經實熱也。柴胡清肝散。手循衣領及亂捻物者。肝經虛熱也。發搐目青面赤。肝經風熱也。並宜六味丸。

### 失音

舌者。音声之機也。喉者。音声之關也。小兒卒然無音者。乃寒氣客於會厭。則厭不能發。發不能下。閉闔不致。故無音也。○咽喉聲音如故。而舌不能轉運言語。則為舌瘡。此乃風冷之邪。客於脾絡。或中舌下廉泉穴所致。○舌本不能轉運言語。而喉中声嘶者。則為喉瘡。此亦風痰阻塞。使氣道不通。故声不得發。而喉無音也。大抵此證。多有稟賦不足。不能言者。有乳母五志之火。遺兒。熏閉清道。不能言者。有驚風中風。不能言者。○遺熱與津液耗者。七味白术散。清氣不升者。補中益氣湯。稟賦不足。與虛火傷肺者。地黃丸。○仰首欬嗽。肢體羸瘦。目白睛多。或兼解顱呵欠咬牙等證。悉屬腎虛。非地黃丸加鹿茸遠志。不能治也。○吐瀉後。或大病後。雖有声而不能言。又能嚙物者。非失音。乃胃氣不能上升。地黃丸與補中益氣湯兼服。

### 腹滿

香砂和中湯

除湿湯。加宿砂枳實青皮神麆山楂。

消脹散

治小兒腹脹。

蘇梗

蘿蔔子

乾葛

陳皮

枳殼各等分

甘草火許

右水煎。○食少者加白术。○腹脹實。則悶亂。喘滿可下之。其不喘者虛也。不可下。若誤下。則致脾虛。

### 龜胸背

龜背者。由兒生下。風客於脊。入於骨髓。小續命去附加防風。龜胸者。因肺受溼熱。攻於胸膈。龜胸丸。並用龜尿點其骨節。多有得愈者。蓋小兒腠理不密。風邪乘之。或痰飲蘊熱於肺。風熱交攻而致。或坐發風。入骨髓。治用上法。若稟受肝腎虛熱。六味丸。腎氣不足。八味丸。背加鹿茸。胸加龜甲。治之貴早。遲則不驗。

水腫

加味除濕湯

依本方加白芷大腹皮木瓜澤瀉

加味六君子湯

白术<sub>姜</sub>人參 黃耆<sub>各半</sub>茯苓<sub>二兩</sub>陳皮

半夏<sub>各半</sub>芍藥<sub>一錢</sub>腹皮<sub>半</sub>木通<sub>各半</sub>甘草<sub>少許</sub>

右入姜棗煎服○小便不利間入五苓散。

小便閉

通心飲 治尿赤大熱往來

木通 連翹 瞿麥 山梔

黃芩 麥門 燈心

右水煎

葱白湯 治初生不尿

葱白<sub>四散</sub> 乳汁<sub>半小盞</sub>

右同煎片時分作四次服卽通不飲乳者服之卽飲。

遺尿

膀胱者州都之官津液藏焉卧則陽氣內收腎與膀胱之氣虛寒不能約制故睡中遺尿一味補骨脂酒炒為散醇酒或益智仁煎湯送下肺脾氣虛者補中益氣加補骨脂山茱萸。

大便不利

小兒大便不通肺與大腸有熱也清涼飲○飲食夾驚及積滯不通者鴻青丸此皆治實熱例也○因乳母膏梁積熱及六淫七情鬱火傳兒爲患者清胃散加降竅清邪解鬱若兒稟賦怯弱五心煩熱作渴引飲而大便難者六味丸加二冬滋補肺腎若用大黃麻仁輩是速其咎也。

脫肛

實熱則大便秘結虛寒則肛門脫出因吐鴻脾虛肺無所養故大腸氣虛下脫也補中益氣爲主若脫出絰赤或作痛者血虛有熱也本方加丹皮芍藥甚則加川連外用槐角煎

眼

口舌耳

小兒十六

湯熏洗。○色淡不腫不痛無血此屬氣虛只用補中益氣以升舉之或加烏梅以收斂之大凡手足指熱屬胃熱手足指寒屬胃寒○小兒肛瘻或嗜甘肥大腸溼熱壅滯或溼毒生蟲而齧蝕肛門者內服肥兒丸外以雄黃銅錄爲散納肛門○因病不食蟲無養而蝕肛者爲狐惑黃連犀角散○蝕肛透內者不治。

眼

生地黃湯 治初生眼不開

生地黃 赤芍 川芎

當歸

天花粉 甘草

右六味入燈心水煎。

九味湯 治風眼。

柴胡 荆芥 防風 白芷 葛根

升麻 香附 卷活 菊花

右水煎○上眼包腫加紅花黃連芍藥下包腫加白朮

雀目藥

五靈脂 人參 黃芩 大黃

天麻

羌活

桔梗

香附

川芎各五分 木香三分 甘草三分

右為丸年數七日用。

口舌

升麻導赤散 治小兒舌上白胎鵝口。

升麻湯合導赤散煎服外辰砂白礬搽之。

甘露飲 治牙疳去血口臭齒齦腫痛齧爛。

枇杷 石斛 黃芩 枳殼 天門

麥門 生地 熟地 茵陳 甘草各等分

水煎服

白术湯 治小兒滿口白爛生瘡口糜。

五苓散合導赤散 水煎。

耳

梔子清肝散 治小兒風熱耳腫痛出膿者。

柴胡 炒梔 牡丹各一錢 茯苓 川芎

芍藥 當歸 鼠粘子各七錢 甘草五錢

右水煎。

清腎湯 小兒耳熱出汁為痒乃瘻也。腎火上炎也。

鼻下血汗病

小兒十七

防風 貝母 天花粉 黃柏炒水

茯苓 玄參 白芷 天麻

蔓荆子 半夏各五分 半草生二分半

右生姜水煎

右生姜水煎

## 鼻

立應散 治傷寒衄血不止。

蒲黃

葛根

石榴花

右為末。每一字或半錢。生地黃汁調下。

一方 治鼻衄數日不止

生地黃汁

白蜜各小盞

蒲黃一兩

右和微煖服半盞。量兒分限。煖服。

茅花湯 治衄血

茅花大一把。水煎服。若無花用根。

## 下血

衛生紫參散 療下血痛。

紫參

貫衆

石榴皮燒臭椿根皮各等分

右細末一錢。米飲調服。○腹痛。艾湯調下。  
導赤散方見時治尿血。欲加味。則依回音。清腸湯中。可加味。

牡蠣湯 治盜汗

黃耆生

牡蠣

生地黃各等分

右水煎

麥冬

黃柏

生地黃

知母湯 治盜汗屬夏月濕熱者。

右水煎。

人參

當歸各等分

右水煎溫服。

## 疝

烏芩通氣散方見前

一方 治小兒偏癩。或氣攻小腹痛。

蛇床子半兩 馬鞭草一合

沉香降氣湯方見前

右相和膏塗痛處。

丹毒 滯頤 黃疽

小兒十八

不行而致者。

本方加青皮蠍梢柴胡。

桂枝湯 治小兒強啼不止。動陰器。結聚不散。翠丸腫大者。

本方加細辛當歸木香蠍尾。

○傳云小兒偏墜証多。雖不速治。亦無害。或臍突出等証同矣。古方治小兒偏墜。用防風縮砂二味。予經驗。

## 丹毒

加味升麻湯 治丹毒壯熱氣急驚搐等証。  
升麻葛根湯。加柴胡黃芩梔子木通。

經驗外治方

地龍生僵

右頻々搘敷地龍搘敷之則如糸。

土黃散 治赤遊丹毒。

土硝

大黃各五分

右為末。調新汲水以鷄翎蘸茶頻々塗掃。

大連翹飲方見前

犀角消毒飲 治丹毒及痘後餘毒。

牛房子

荆芥

甘草各五分

犀角三分

金銀花三分

防風五分

右水煎。

## 滯頤

滯頤乃涎流出而潰頤間也。涎脾液也。脾胃虛冷。故涎自流。不能收約也。法當以溫脾為主。

溫脾丸 治脾胃虛冷而流涎。

半夏

白朮各一分

木香

殭蚕

陳皮

青皮各五分

丁香

二分

右細末。以姜汁打稀糊丸。米飲下。此方冷涎退熱利尿。又治夜啼。○此方熱涎稠粘者。主之。胃火炎上也。或瀉黃散加減之。

通心飲方見小便閉

治滯頤。通心氣。分水穀。

退熱利尿。又治夜啼。○此方熱涎稠粘者。主之。胃火炎上也。或瀉黃散加減之。

## 黃疸

初生及百日之中。半旬之內。不因病而身黃者。謂熱胎黃也。腹大食土爲脾疳。兼作渴冷。

解顱 五厘

小兒十九

飲瀉黃散。小便不利。五苓散加茵陳。大便秘。

茵陳蒿湯。病後發黃。肢體浮腫。白朮散。清便

自調。肢冷嗜卧。益黃散。身淡黃白。理中丸加

茵陳身熱膈滿肌膚面目皆黃。瀉黃散加枳殼生姜。若閉目壯熱。多啜不已。大小便赤瀉。

口中熱氣。乃妊娠厚味遺毒也。母子並服清胃散。生料地黃丸。

茵陳湯 治身熱鼻乾。汗出二便赤瀉。濕熱發黃。

茵陳六分 桑子 大黃二分

右水煎溫服。

解顱

小兒解顱。生下而顱門不合也。長必多愁少笑。目多白睛。面色㿠白。肢體消瘦。皆腎虛也。宜地黃丸。○丹溪治解顱。以八物湯。有熱加酒炒黃連。生黃芩。甘草。水煎服。外用布帛緊束。及以白芨末敷。

人參地黃丸 治解顱

人參二分 熟地黃四分 鹿茸 山茱萸各三錢

茯苓 牡丹皮 山茱萸各三錢  
右為末。煉蜜丸。以參湯研化服。或白湯隨時宜。

行遲 語遲 齒遲 髮遲

行遲。兒生至周歲三百六十日。膝成乃能行也。近世小兒多因父母氣血虛弱。故胎氣不強。骨氣軟弱。故不能行也。

虎骨圓

虎脰骨酒炙赤 生地黃 茯苓 肉桂

酸棗仁酒浸去皮炒

川芎 牛膝唐酒浸各二錢

防風 當歸

右為極細末。煉蜜圓如黍米大。用木瓜煎湯。食前服。○此方徐々用之。効難得速効。○語遲。言心聲也。小兒受胎。則其母卒有驚怖。邪氣乘心。故兒感受母氣。心官不守。舌本不通。四五歲長大。而不能言也。

菖蒲圓 治小兒語遲

人參 石菖蒲 麥冬 遠志  
川芎 當歸各二錢 乳香 朱砂各一

五軟 五硬 夜啼

小兒二十

右為極細末。煉白蜜圓如黍米大。用米飲食。遠服。○此藥平日可用之。難得速效。

○齒遲。稟受腎氣不足者。即體不強。蓋骨之所絡。而為體不足。故不能充於齒。不生也。

六味丸 徐々可用之。

芎黃散 小兒齒遲者。腎不足也。宜此方。

川芎 生地黃 山茱

當歸 白芍炒 甘草各等分

右細末。每服二錢。白湯調服。食後以此末。塗

牙齦。即生。

○髮遲。兒稟受血氣不足。不能榮於髮。故不

生。

○髮遲。兒稟受血氣不足。不能榮於髮。故不

生。

熟地各二分 茯苓 丹皮 沢瀉 牛膝

五加皮各二分 鹿茸酌炙 山茱山茱各四分

右為末。煉蜜丸。每服一錢。空心鹽湯送下。或

作煎亦佳。

五軟 五硬

五軟。頭項手足身軟。名五軟。載氏云。五軟証。

名曰胎怯。良由父精不足。母血氣衰。而得。云云。治方。益氣湯。六味九等。可選用。○五軟証。多有難治。或有為廢人者。

○五硬。仰頭硬。氣手足心堅。口緊肉硬。此陽氣不榮於四末。獨陽無陰之候。若腹筋青急者。木乘土位也。

六味丸 加麥冬五味。○五鞭証。腳手心之五心。如冰冷硬。云云。其餘証候。或胸膈痛等証。畢竟雖如是有論。多難治也。溫補劑等。亦最可撰用。

夜啼

六味散 治面青啼哭。口出氣冷。或泄瀉不乳。

人參 茯苓 白扁豆 甘草

右姜煎。或去參用。○家友夜啼加鈞藤鈞。

人參黃連散 治心經蘊熱。夜啼。

人參二分半 黃連一分半 焚甘五分 竹葉二十片

右生姜水煎

## 吃泥土

小兒吃泥土。乃脾虛胃熱所致也。面色青黃。或是蟲動也。此方皆可治。急不療。則癥症生。

清胃養脾湯 治前證

石膏

黃芩

陳皮

白朮

茯苓

甘草

胡黃連

使君子

右等分。水煎溫服。或細末而放飲食內。令兒服之。

## 打撲

蒲黃散 治小兒打撲。墜墮。血氣停滯。或敗血入腹。不作疼痛。寒熱羸瘦。黃。

蒲黃

當歸去頭

生地黃各一兩

琥珀別研

赤芍

桂心各半兩

右水煎

## 脣風—撮口

宣風散 治初生兒。脣風撮口。多啼不乳。口出白沫。

右水煎

## 脣風—撮口

全蝎

二十枚。頭尾全者去毒用酒炙

麝香一字

右同和勻。細末。每用半字。金銀煎湯。調服。

益脾散

治脣風撮口

茯苓

人參

草藥

煨。包煨。各等分

木香

濕布

甘草

陳皮

厚朴

哎各等分

蘿子

等分

右姜棗煎

千金龍膽湯

治月內脣風撮口。四肢驚掣。發

熱吐乳。及變蒸。客忤。鬼氣。驚瘡。

龍膽

炒黑。鈎藤

柴胡

黃芩

桔梗

甘草

芍藥

茯苓

各二錢半。大黃。同蟻蟬。二枚去脚足。

右為末。每服一二錢。水煎。量兒加減。加人參

當歸。佳

撮風散

治撮口胎氣夾熱。風邪入脣。因流毒心脾經。故舌強。唇青。聚口而啼声不出者。

釣藤鈎

朱砂

強蚕

鴟硝

蜈蚣

麝香二字

右為末。竹瀝調下。齒齦上有小泡子。如粟米形。急可擦破。如

甘草湯

治撮口

右水煎。以綿毬令蘸吃。令出痰涎。却以猪乳。

甘草

生二錢

噤風不乳頭瘡 小兒二十二

點入口中即瘥

### 噤風

噤風眼閉。口噤。啼声漸小。而舌上裹肉。如粟米形。不得吃乳。口吐白沫。大小便皆不通。

定命散 治初生小兒口噤不開

蟬退十四ヶ去嘴脚 全蝎十四ヶ

右細末。輕粉少許入和勻。調乳汁。煎服。

### 不乳

茯苓丸 治舌乾脣燥急欲乳不能哈乳

赤茯苓 黃連

枳殼

右等分為末。煉蜜丸。乳汁下。○蘇乳方。見前

### 頭瘡

小兒頭生肥瘡。或多生虱子。搔痒而為瘡。膿水出不止者。用之。

一掃光 治頭瘡

細茶一本同上入茶內研 水銀半分 花椒各二分

右為末。香油調塗。

一方 治小兒頭瘡。經年不瘥。  
黃連 大黃 苦參 松脂各一兩半 水銀  
黃芩 胡粉各一兩 蛇床珠十八粒 白礬五錢  
右細末。以臘月猪脂和水銀研。不拘時敷。  
一方 治小兒頭禿瘡生者。

防風通聖散 拌酒為末。再以酒拌焙乾。每服一錢。水調服。外用白灰燒紅碎入水中。乘熱洗之。更以胡荽子、伏龍肝、懸龍尾、黃連、白礬為末。調香油敷之。

### 臍瘡

小兒因剪臍。外被傷風邪。以臍瘡致不乾。

礬龍散 治臍瘡

枯礬 龍骨煅各五分

右為末。每用少許。可捲臍上。

一方 治自臍中汁出。或痛。

枯礬

右末乾敷。○又方。黃檗末。敷之。

### 痘疹

三豆湯

痘初起

小兒二十三

凡天行痘瘡鄉里正發宜預服此能活血解痘毒入門云太古無痘疹周末秦初乃有之。

赤小豆 黑豆 荟豆各等分 甘草減半

水煮熟任意七日飲之痘永不出

升麻葛根湯 治初熱壯甚疑似未明服此或

外麻葛根湯 治初熱壯甚疑似未明服此或

痘已出而表熱甚者。

升麻中乾葛大白芍菜中甘草小

姜煎加山查子牛房子尤可如熱甚加酒炒

黃芩黃連能解熱痘毒

柴胡飲 治痘瘡初起熱甚表裏俱實。

柴胡 防風 荆芥 黑參各八分

大黃一錢

黃芩

滑石各半

甘草五分

水煎不時服

加味升麻葛根湯 其或憎寒壯熱頭痛咳嗽。

鼻流清涕者多因外感不可不發散也體氣

素壯實者此方主之。

升麻 葛根 山查各大紫蘿

川芎

赤芍 牛蒡各中桔梗

防風

甘草各小

右生姜三片同煎熱服取汗。

加味參蘿飲 治前證休氣素怯弱者。

葛根大

人參

紫蘿

川芎

桔梗

前胡

茯苓

牛房子

山查各中

陳皮

半夏

甘草各小

右入生姜三片同煎熱服取汗可去半夏痘忌燥也

○傳云疑似之間虛候者用輕劑獨參湯○

又云自初歲到三四歲或六七歲疑似之間熱甚則上竄搐搦口眼喝斜等類驚風可用

赤龍丹辰砂茯神等分煉蜜或以小量獨參湯送下之若實者蘿合香圓亦可○又云疑似之間無食滯者蘿合香圓亦可○又云疑

查凡山查痘奇藥也。

見點之間見證用茱三條

初誤用葛根湯類誤表而後見點五六粒中大抵其候有三條是痘疹開始終之肝要審察

十神解毒湯 已出未出三日以前痘點煩紅煩渴欲睡臥不寧小便赤澀者此血熱也此湯主之此藥專治身發壯熱腮赤紅臉赤毛焦色枯。

當歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍

痘見點

小兒二十四

桔梗 木通 腹皮 連翹 川芎等分

右入燈心水煎。○身熱壯盛加葛根前胡。  
毒盛綿蜜加荊芥牛房子。○渴加天粉竹  
葉。○小便尿血加犀角施子。○大便黑加犀  
角黃連或桃仁。○吐血乾嘔加黃連犀角。  
發紅斑加犀角黃芩黃柏施子玄參。○小便  
赤加山梔。○小便短澁加豬苓澤瀉。○小便  
便祕加瞿麥滑石。○大便祕加枳殼前胡。○大  
便祕喘加枳殼前胡大黃。○煩躁加麥冬。○大  
花粉。○煩渴狂亂譫語加知母麥冬石膏。  
嘔吐加黃連豬苓澤瀉。○嘔加陳皮。○咽喉  
痛加甘草牛房子荊芥。○泄瀉加豬苓澤瀉。  
溫中益氣湯 已出未出三日以前痘影淡淡  
在皮下不見紅活。唇淡面白或帶青脉亦遲  
緩怠倦嗜卧不思飲食形狀靜者虛寒也。或  
治血氣虛弱送毒氣不出而驚搐狂燥者。  
人參 白朮 各五分 黃耆 生 當歸

茯苓 各六分 甘草 炙 川芎 各四分 白芷  
防風 各三分 木香 肉桂 各二分 山楂 六分

右姜棗煎服一服中病即止。

張三錫近制益氣湯 已出未出三日以前痘

影淡淡在皮下或交出紅點二三粒驚搐狂  
躁譫語診之微細數者虛爾無寒証也此湯  
主之或昏睡精神不正者以獨參湯可兼用。

人參 白朮 各二分 麥門冬

五味 陳皮 各二分 甘草

黃芩 各二分 當歸

右姜棗一片水煎。

○傳云右三條中第一條用十神解毒湯二  
三點解心熱則諸證退故動悸頭痛止小便  
快利是正面也然則痘色過赤亦能醒諸証  
退則消毒飲合甘桔湯或大力子湯可撰用。  
○第二條用溫中益氣湯或大力子湯可撰用。  
保元湯黃耆生可也肉桂木香等不可久投。  
若此證其初元氣虛寒也故用此湯雖有即  
効已痘發出而見之則過赤有毒氣者可用  
大力子湯有虛者可加參耆此方虛實俱加  
味則易用方也古代專用神効散此補瀉相  
兼方也故自古來便用雖然有專可補証有  
專可解証於此時唯投神効散到灌膿結痂。

大力子湯  
甘桔芩  
青甘  
力子湯

害多。凡活幼心法。始清解散。次調元化毒湯。清毒活血湯等方。皆自神効散。加味之。嗟呼。久吾聾以溫補究力。雖施治之。其清解方。以神効散為主。不離參耆之保元。故熱毒甚者。右劑等。其効不速也。師傳。右調元化毒湯。清毒活血湯之類。証候熱毒甚者。黃連解毒湯。加紅花生地黃。或生地四物湯。合黃連解毒湯。為擺菜。取即効。○第三條。用近制益氣湯。証全體淡白。虛寒候。而其人狂燥。而嗌渴。或淡白中。交出紅點一二粒。妄言煩躁。見陰陽錯雜。是痘毒雖輕。其人心火有餘。而有此證。近制清益湯主之。或六君子。加黃連山梔竹茹麥門。若虛甚者。無用獨參湯。此師傳經驗也。○傳云。一應有寒證。雖用附子。治其寒。則可去之。元氣虛寒。雖有効。此物痘疹。一体敵。菜也。此世間未發說。而師卓見也。屢試之。或石菜等。莫妄用。世民心法。保赤全書等。投石菜方劑多。然此格外法也。大抵為中治。佳。

起脹

起脹。痘皆發出。而後盛漿也。此時亦熱毒

甚者。清毒活血湯。或解毒湯。四物合方等用之。又淡白。而痘見虛薄者。保元湯。或千金內挖散。參歸鹿茸湯等。可撰用。○又色過赤者。痘有艷潤澤者。可用內挖散。色過赤熱毒強者。必無艷乾枯而黑焦象。最於前主方。可解毒鴻解矣。

灌膿

灌濃水化成膿時也。與起脹別無治法也。起脹佳。則灌膿不容際也。又輕症與起脹同時。而別不及筭日。雖然。言常例。則自發熱。筭三日之數也。

收膿一結痂

收膿自灌膿中。漸見到此時。元氣痘氣雖張表。自此痘根緩離生也。故此時。若感風寒。或食滯。或經穢氣。則發雜證。寒戰。咬牙等也。寒戰咬牙。俱有熱毒虛寒二證。虛寒。活幼建中湯。無用參附湯。熱毒。活幼加味四苓散。或二陳湯。加黃連山梔。多效。虛寒証。建中湯。雖究力用。有為不治証。此其痘猖蜜歟。或毒氣內殘歟。有故難奈何。

落痂

痂落雖無故。此亦依証。痂不落。而有為不治。証。此毒氣殘歟。或虛証歟。雖然。初發治法不差。則無此時患也。某方論治後詳也。

調理

痘後調理。六君子湯。益氣湯。或逍遙散。八物湯。大補湯等。隨証可撰用。

**大力子湯** 中和方。而見點出齊比。用之

大力子 桔梗 荷葉 陳皮

荆芥 川芎 蟬退 甘草

右八味水煎。有虛。加人參黃耆。

**消毒飲** 痘瘡欲出已出熱尚未解。毒氣太盛。稠蜜而成片者。急進此三四服快透消毒妙。

牛蒡子 微炒四錢

荆芥 甘草 各一錢半

防風 半錢

右水煎一方加黃芩 一錢犀角五分

**人參透肌散** 治痘瘡虛而有熱。雖出快不齊。隱皮膚間者。

人參 白朮 茯苓 當歸 荷葉

木通 蟬退 甘草 糜米 紫草 各一錢半分

右水煎溫服。

**保元湯** 治痘不起脹氣虛者。始終主之。

人參 三錢 黃耆 三錢 甘草 一錢

右水煎○吳昆加肉桂○保赤加川芎官桂白朮。名大保元湯○隨症照加減用之。

**參耆內挖散** 治氣血虛損。或風邪穢毒中觸。使瘡毒內陷伏。而不出或出。而不勻快。此藥

活血勻氣。調胃補虛。內挖瘡毒。使之盡出。易收易厭。

黃耆 人參 當歸 各二錢 川芎

防風 桔梗 厚朴 白芷

甘草 各一錢 木香 各三分

右水煎服○師傳。膿漿不充滿者。合參歸鹿茸湯。挖膿之劑。莫妙於此方。以鹿茸補血力峻。活幼云。痘色淡白。疱不尖圓。根無紅暈者。氣虛而血縮者也。必不成膿。急宜用此等方。隨症可加減。

**參附湯** 治痘疹。陽氣虛寒。咬牙寒戰。手足並冷。或吐瀉。不食。飲沸湯。不知熱。

人參 兩 附子 先一冬不應多加。更不應加至四五冬。或至等分。無妨。 右水煎服。

獨參湯 治陽氣虛弱。痘瘡不發起。不紅活。或

膿清不滿。或結痂遲緩。或痘根白色。或嫩軟而不固。或膿水不乾。時為痒。或畏風寒。

人參一兩

右姜棗水煎。嬰兒乳母亦服而可也。

十二味異功散 治寒戰咬牙。痒瘍泄瀉。裏虛。

當歸 白朮 肉豆蔻 陳皮

茯苓 附子 半夏各一錢 厚朴

肉桂各一分 人參五分 丁香三分 木香七分

右姜棗水煎溫服。○痘科鍼去厚朴。半夏加訶子。甘草。名木香異功散。凡痘至八九日。見虛寒數候。即與服之。此原兩方。或參合之。糯米一撮入之。○準繩云。如因泄利。氣虛而厥者。陳氏木香散。異功散主之。但十指頭。微寒者。四君子湯。理中湯。並加肉桂主之。○又云。凡瘡未出。而利者。邪氣併於裏。腸胃熱甚。而傳化失常也。黃芩湯主之。黃芩。芍藥。甘草。水煎。如自利。清白色者。為裏寒。理中湯主之。○又云。瘡已出。而利者。邪氣併於表。正氣方逐邪氣。主于表。而不主裏。則裏氣虛。不能停納。

豆蔻丸 治痘出氣虛吐利不止

肉豆蔻 木香 砂仁 龍骨搜過水苔

訶子肉煨 赤石脂等分 枯礬減半

水穀故亦自利也。宜從氣虛而治。九味理中湯。倍人參。加黃耆白芍菜。本方。加訶子肉蔻。茯苓。木香。藿香。甚則陳氏本香異功散。皆可用也。○

移痘丹 治痘出目中初見點時用此移之

守宮辰砂一錢陰陽各半

茯神 遠志肉各一錢

琥珀五分

為末。紫草膏和丸。黍米大。周歲兒丸。米飲下。欲移在手足。觀桂歲靈仙煎湯下。欲專移在足。牛膝木瓜煎湯下。微汗為度。再用後茶二服。

川芎 薤本 荆芥 白芷各五分

蟬蛻三分 防風八分 生姜一斤 葱白一莖

水煎溫服。○血熱者。加紫草連翹。吾吳以痘疹名世者。莫不以守宮為方。士異端局知医学正傳。聖濟總錄。衛生寶鑑。丹溪摘玄。聖惠方等。咸取入劑。豈可以方士目之耶。



生地黃五分 杏仁一分 敷冬花

陳皮各三分 甘草各二分半 麥冬七分

右水煎徐服

防風 荆芥 升麻 白芍酒炒

桂枝 牛房子 乾葛各等分

右竹葉水煎○氣虛痒甚。遍身汎破。膿血淋瀝。不能坐卧者。千金內挖散去桂倍薑加白芷去痒。

●倒靨 痘瘡能依期灌漿結痂如螺靨為吉。若膿未滿足忽然乾靨或膿成之後不痂破爛或收靨之時泄鴻膿血或空泡乾枯。或發熱昏憒或咬牙寒戰或手足並冷飲沸湯而不知熱是名倒靨由中氣不足毒從內入之故宜參耆內托散補中益氣湯保元湯選用使破者重復灌漿無處更出贈痘則正氣得補復祛出毒邪也。若服補藥不出贈痘破處不復腫灌更下膿血者不治。

○將靨之時忽然黑靨或漿未充而忽然收靨或漿雖充而一齊結疤乾紫此氣虛血熱。

因火迫而收之大速也。犀角地黃湯加紫草茸或四聖散加人參當歸。

○心煩狂躁識語便秘口渴飲水能食者此則外觸穢氣而倒靨內服奪命丹外燒熏穢散辟之。蒼朮細辛甘松川芎  
乳香降香等分燒之

●焮赤 大便不通小便如血或結癰毒身痘破裂出血乃內火熾盛失於解利急用犀角地黃小柴胡加生地黃及四順飲之類。

○薛氏云若心脾熱甚犀角地黃湯心肝熱甚小柴胡加生地黃若大便不通先用四順飲次用犀角地黃湯若色赤焮痛二便不通。

急用活命飲加硝黃若色赤焮痛惡寒發熱活命飲加麻黃若因乳母怒火加味道遙散。

○飲食 胸前稠密毒氣傷脾減食者消毒飲加黃芩山楂紫草人參。

○傷食 腹脹不食者枳木丸有痘出太多中氣暴虛不食者四君子加糯米。

○有痘起之後能食易饑者此冒大熱不久而沒生焉大便秘者四順飲加連翹牛蒡微利之不秘者芍藥湯加茯苓木通牛蒡子以

和之。

痘

## 清肺湯 治衄血

花粉

酒炒麥冬

天門

酒蒸甘草

桔梗

當歸

酒各五分

白芍

酒

黃芩

酒炒

牡丹

酒洗

知母

蜜炒各四分右生姜一片同煎一二服立止。如有髮灰入一錢調服尤妙。○髮灰無病人亂髮洗淨鹽和而黑燒清上飲 痘有口舌生瘡者或是熱毒或是虛火。當以痘色辨之。切不可槩認為實熱而純用寒涼解毒。如痘色紅紫湧盛者熱毒也。用此方主之。如痘色淡白者虛火也。用參麥清補湯主之。方見後外用赴筵散擦之。

薄荷

防風

甘草

各四分

白粉葛

牛旁

連翹

桔梗

黃芩酒炒

黃連

酒炒

花粉

酒炒

麥冬

各六分

赴筵散

薄荷葉

黃柏

各等分

細末入青黛少許和勻擦之。利咽解毒湯 痘有咽喉腫痛者首尾俱用利咽解毒湯外用玉鎖匙吹之。

山豆根

麥冬各一

玄參

桔梗

右生姜一片同煎溫服

牛房子

各七分

防風

甘草各五分

玉鎖匙

朋砂一錢

朴硝五分

姜蚕一條片腦五厘

右為細末

以竹管吹之。

參麥清補湯 痘有音啞者當細辨痘色以分順逆。若痘色紅者行漿而音啞者此氣喉有痘也是以外痘行漿時內痘亦行漿室碍氣道而音不亮也。待外痘厭面則內痘亦消而音自亮矣。此不必別加調治也。若痘色虛陷灰白而音啞者乃血氣虛弱送毒不出毒留於肺肺氣受傷以致失音此則危矣宜此湯主之。無用千金內挖散。

人參八分 麥門冬去心酒蒸晒乾一錢二分 白花粉酒蒸

生黃耆各一牛旁子 前胡各五分 焚甘草

生甘草各三分 酒炒白芍 生白芍各四分 當歸酒洗

大川芎 生地黃酒洗各三分 桔梗三分 山楂肉五分 生姜一片 龍眼肉三個 同煎溫服遇此症者此藥頻服。○又痘有咽喉噏水者順逆不同須當分辨○痘未行漿而喉先噏水此則

毒氣壅塞。其喉必痛。宜用前治咽喉方治之。

**導赤散** 痘有小便赤澁者用之。

木通 赤茯苓 麦冬各八 車前微炒

生地各四 甘草 人參各二

燈心一團如龍眼大。同煎饑時服用。此方不

効者。宜用八正散。○赤茯苓○瞿麥○萹蓄

○車前○山梔○木通各八 滑石三錢甘草四分○

水二鍾。燈心一團。煎至一鍾。食前服。○熱盛。

大便亦秘者。加大黃一錢。○本方三味導赤

散。翁仲仁云。大抵痘疹已出。正賴胃氣運其

毒氣。善攻其熱者。甚則利小便。蓋小便利。則

心火有所導引。雖不用冷菜。熱亦自減矣。熱

輕。則解其熱。蓋小熱不解。大熱必生。小熱而

利其小便。則虛損氣。故但當解熱也。利小便

之菜。導赤散為上。○萬氏云。心證毒多者。必

伏不起。譖妄飲水。煩哭咬牙。宜預解心之毒。

導赤散加黃連辰砂。師傳云。痘疹發熱已出

之間。升麻葛根湯。導赤散最為穩當。或毒伏

不起症。熱毒甚者。合黃連解毒湯。亦為當。若

誤用大寒石藥等。既無消毒之能。但求清熱。

是揚湯止沸耳。既無逐毒之能。徒伐胃氣。則冒寒肌肉斂。毒氣內陷。痘何由而出哉。

### 通用方

**補中益氣湯** 治結痂時誤犯風寒。惡寒發熱

者。○吾鼐云。其發熱稍緩。頭熱面不甚熱。手心脚心熱。手背腳背不熱。精神困倦大小便利者。虛熱也。此湯加川芎。若渴者。加麥冬。五味子。又云痂落後。有精神困倦。飲食減少。胸腹頭頂。手足心。發熱而煩渴者。內虛也。仍用此湯主之。或有雖不發熱。而倦怠嗜臥。不思飲食。或手足冷。或津液少而渴。或癰白不紅。皆內虛之候也。亦宜用此湯調治。不然恐生他症。

**十全大補湯** 治稟賦不足。血氣虛弱。而不收

厭。不結痂。或寒熱自汗。食少體瘦者。痘科鍼加連翹。白芷。金銀花。

**逍遙散** 治乳母。肝脾有熱。而欲痘厭不厭。欲落而不落。水煎。母子同服。

**起死回生散** 治痘瘡至七八日。忽然變黑。收入腹內。偏身抓破。吭喘。死在須臾。服此從新

別發出立可回生。

當歸

川芎

芍藥

生地

升麻

紅花

右半水半酒煎服。○上陷加白芷下陷加牛膝。遍身黑陷加麻黃。○脚下有黑疔至七八日用針挑去以大乙膏貼之此方活血清血。拔熱毒於表之劑也。○痘出八九日漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色不必驚恐急以上好內桂磨湯或煎湯服之立見如舊。

加味保元湯 治結痂後虛煩者。

黃耆二分

人參一本

知母

山梔各一

麥冬二分

甘草五分

右水煎溫服○結痂後有餘毒者加牛旁子。

牛旁子飲 治痂落而有餘毒覺聚藏存時又

作熱腹內疼痛。

牛旁子

前胡

黃連

黃芩

連翹

白附子

玄參

赤芍各一

羌活

防風

甘草各五分

牛旁

柴胡

當歸

赤芍

右水煎溫服

大連翹飲

結痂後發熱或煩渴者當辨其虛實寒熱調治發熱壯盛胸腹手足頭面俱熱大便秘澁小便赤澁者餘毒盛也即當解毒此湯主之若解毒遲則痂落後必發瘡毒。

連翹

牛旁

柴胡

當歸

防風各八

木通

車前

荆芥

黃芩酒炒

山梔酒炒滑石

甘草

蟬退各五分

生姜一片同煎大便秘者加酒炒大黃一錢○又有不虛而服補劑不寒而服熱劑以致發瘡者醫之誤也凡此俱此湯主之○痘出齊數日後其間有紫黑脹硬獨大而無根量者痘疔也用服三仙散珍珠散塗之

二方見類方

解毒內托散 治痘後發癰

黃耆

當歸

防風

荆芥

連翹

赤芍木通等甘草節減半

忍冬花倍用

水煎入醇酒少許服之

蟬菊散 治班痘入目或病後翳障

蟬脫

白菊花各等分

右水煎入蜜少許服之

痘 通用方

小兒三十三

熱眼丹溪方 治痘瘡傷眼。

山梔 決明 赤芍 當歸 黃連

防風 連翹 升麻 桔梗 右水煎

通明散 治痘後餘毒。眼生翳障者。

當歸 川芎 荷葉 生地 防風

葛根 菊花 蟬退 花粉各等分穀精草倍用

右水煎○眼赤腫。加黃連。山梔。翳厚。加木賊。

鴻肝散 治痘後肝經蘊熱。目痛。

當歸 川芎 防風 荆芥 白芍

甘草 黃連 木賊 菊花 蔓荆子

白蒺藜各等分 右水煎

復明散 治痘後目痛。而有紅絲翳膜。

當歸 川芎 白芍 防風 生地

荆芥 柴胡 白芷 蔓荆子各等分

右水煎。

清胃湯 治痘後牙疳。腫痛。

升麻二分 當歸三分 黃連 丹皮 生地各一分

右水煎。

犀角黃連湯 治痘後牙疳。

升麻二分 當歸三分 黃連 丹皮 生地各一分

右水煎。

馮氏天華散 治痘後失音。

天花粉 桔梗 茯苓 藝子

石菖蒲 甘草各等分 右為末用水

調半匙。在碗內外以小竹七莖。黃荆七條。縛作一束。點火在碗內煎。臨臥服。此方熱毒傷肺竅。而失音者。用此方。乃生津利竅。收肺出聲音之劑也。

射干鼠粘子湯 治痘不起。發咽喉疼腫。

鼠粘子錢半 甘草五分 射干六分 升麻四分

水煎不時服之。

紫草消毒飲 治痘疹血熱咽痛。

紫草 連翹 鼠粘子各一錢 荆芥七分 甘草

山豆根各五分 水煎不時溫服。

補肺湯 治氣虛痘毒乘肺。欬嗽不已。

黃耆 鼠粘子各一錢 阿膠八分 馬鳴鈴

甘草各五分 杏仁去皮尖七枚 桔梗七分 糯米一撮

水煎溫服。

仙方活命飲 治痘後餘毒。腫痛發熱。而渴者。

白芷 防風 没藥 赤芍 當歸

甘草 皂角刺 穿山甲 天花粉

痘 通用方

小兒三十四

乳香 貝母各一 陳皮

金銀花各三

右水酒煎服

加味消毒飲 治痘後餘毒或先服附子而熱  
毒失解。聚不散。以頭項。胸背。手足肢節。赤腫  
而為瘡毒者。

牛旁子 荆芥 甘草 防風各五分

犀角三分

金銀花三分

右水煎服

清熱消毒飲 治痘瘡餘毒及一切瘡疽陽症  
腫痛。發熱作渴者。

連翹 山梔 黃連 當歸各五分 川芎

芍藥炒

生地各六分

金銀花一本

甘草三分

活血解毒湯 治痘餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸

連翹 惡實 黃連 紫草 甘草

荳木 薄荷 川芎 木通各等分

右水煎

一方 治痘瘡餘毒未散。食穀太早。補住毒氣

牛旁子六分 犀角 白朮各三分 甘草五分

荆芥 防風 枳殼各一兩 右水煎

加減鼠粘子湯 治痘疔

鼠粘子 天花粉 知母 荆芥

山梔各六分 甘草

右竹葉。燈心。水煎。

身熱加柴胡黃芩○有痰加麥冬貝母○咽  
啞加玄參桔梗○咬牙加薄荷石膏○便祕。  
加蜂蜜玄明粉○昏憒加黃連朱砂○癰枯。  
加當歸生地黃○戀疮加蟬退川芎○痘疔  
落後氣血弱。膿水出多。生肌不能收斂者。宜  
八物湯。

三聖散 痘疔挑破而以此點之。

雄黃二分 紫草三分

右為末。用油、臘脂調。

○凡孕婦身發瘡。宜馮氏罩胎散。若胎動不安。宜獨聖。安胎二方。身熱甚。宜參蘿飲或瘡  
蠅蜜。宜十奇散。倍芍藥。當歸。減肉桂。加香附。  
烏藥。如胎已五月。則半夏。桂心之屬。俱不必  
禁。

罩胎散 治孕婦痘

赤茯 葛根 人參 桔梗 黃芩

柴胡 白朮 當歸 芍藥 赤芍

防風 陳皮 荆芥 枳殼 紫草

阿膠 糯米 白芷 甘草 川芎

砂仁 大熱加飴金

**獨聖散** 用連穀砂仁火炒去穀為末每半匙。右細切作一服水一盞半煎至一盞乾豨莶七箇野苧根七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服。

**熱湯調下** 胎動則服服後覺胎熱則安矣。吳氏云姪娠出痘胎痛者此方主之。胎痛者熱而氣滯之故也縮砂辛溫利而不滯故可以利氣可以安胎。

**安胎散**

大腹皮	人參	陳皮	白朮
當歸	川芎	香附 <small>便</small>	砂仁
紫蘿	茯苓	甘草	芍藥 <small>各等分</small>

右入燈草糯米水煎服○吳山甫云氣血熱則胎不安氣血滯則胎不安是方也人參白术茯苓甘草所以補氣當歸川芎芍藥所以養血黃芩所以清熱砂仁香附紫蘿陳皮大

腹皮所以行滯也。

○凡姪娠痘瘡者以安胎散為主加黃芩白朮天寒有表症者間用五積散去麻黃半夏厚朴姜桂換白朮赤芍赤茯加柴胡黃芩阿膠人參糯米等分○痘出不快者消毒飲○痘出後血虛者芍藥湯加芍藥氣虛者保元湯加芍藥○熱盛恐胎墮者罩胎散胎動者安胎散或單砂仁炒為末酒調服之後覺胎熱則安。

**麻疹**

麻卽疹也疹轉也出軒々然生如斧子麻出如麻亂撓為朵皆以其形而名也是亦感風寒而發生死只在三日間出則乾餘熱四五六日而全瘥矣治法以能出之為上策乾後有諸症則於各類宜治之○

○凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯潮熱甚加芩連地骨皮咳嗽加麻黃杏仁麥門石膏咳甚別用涼膈散加地骨皮桔梗○泄濁宜四苓散○便

血四苓散。合犀角地黃湯○吐衄犀角地黃湯加山梔。小便赤。加木通○寒熱似瘧。宜小柴胡湯。又柴苓湯○初起全類傷寒。但面赤中指冷為異耳。已出煩燥作渴者。解毒湯。合白虎湯○便閉三四日。小便氣防風通聖散。譖語溺閉者。導赤散。加泔者。四苓散。加車前木通○譖語如狂者。解毒湯。調辰砂六一散○煩渴作泄者。白虎湯加蒼朮。又猪苓湯○熱盛乾嘔。解毒湯○傷食嘔吐。四君子湯○夏月因暑作嘔。四苓散加人參。忌用肉豆蔻。木香姜桂之熱藥。

○ 麻症初起。已出沒。及一切雜證。與痘毒大同。但始終茶宜清涼。傳云。全休以清肺之意。可施治。雖麻喜清涼。痘愛溫暖。不易常道。虛則補。實則瀉。医生家活法。故治麻亦有血虛而用四物湯。氣虛用四君子湯。天寒傷冷。用溫中理中之茶。一時之權也。○ 麻症沒後。餘熱內攻。循衣摸床。譖語妄語。神昏喪志者死。如熱輕餘毒未除。必先見諸氣色。雖預防之。始終以升麻葛根湯為主。或消毒飲。解毒湯。隨症選用。仍忌魚

腥葱蒜之物。

**升麻葛根湯** 治麻疹初起。惡寒發熱。右姜煎。  
加紫蘿蔔白。以解肌。切忌大汗。

二仙湯 治麻疹已出。而又沒。或出不盡。心慌哭啼不止。十分危證。死在須臾。或下痢腹痛。

黃芩 茄菜各等分 右水煎服

下血。衄血。或二便閉滯。瘡疹稠密。熱渴。屏角二本。生也五分。牡丹。赤芍。

黃連	黃芩	黃柏	山梔
古水煎服。加土。又。加少。山梔。童便。			各一 分

白虎解毒湯 治麻疹已出譫語煩燥作渴者  
水煎服 女吐血血力炒山梔童便

石膏 知母 黄连 黄芩  
黃柏 山梔 甘草 各等分 右水煎

白滑毒散 麻疹初起轉者合三味滑毒  
桑白皮 地骨皮 牛房子 荆芥

桔梗 甘草 浮萍 右水泡  
加味金沸草散 麻疹初起。重者用之。

荆芥	兩	赤芍	半夏	甘草	行水	麻黃
旋覆花		前胡				
牛房子						
浮萍						

右生姜三片。薄荷三五葉。水煎。

芩連玄參湯 治疹後咳嗽。腹脹喘急。煩燥泄

瀉。声啞唇口青黑者。

黃連 黃芩 連翹 玄參 知母

桔梗 杏仁 白芍 麻黃 乾葛

陳皮 厚朴 牛房子 甘草各等分

右水煎

加味四芩散方見痘疹 麻出之時。多有自利不止者。

其毒亦因利而散。此殊無妨。如泄利過甚。則以此方與之。切忌用參术訶蔻。補滯之藥。重則令腹脹滿。而不可救。輕則變為休息痢。纏綿不已也。戒之戒之。○若有毒氣流注。而成瘍者。黃芩湯加防風枳殼。

清金降火湯 治麻疹後。乘肺金。声啞不出。或

咳或喘。

蘓梗 陳皮 黃芩酒 梔子 石膏

黃連 玄參 貝母 瓜蔞 天冬

麥冬 當歸 生地 茯苓 束白

杏仁 白芍 甘草

右生姜水煎服

十仙湯 治疹後餘毒。

柴胡 葛根 玄參 黃連 黃芩

山梔 陳皮 茯苓 枳殼 生半各等分

右生姜水煎溫服

○凡麻疹前後有熱潮不退等症。並為血虛血熱可服四物湯。發渴。加麥門犀角。○嗽。加瓜蔞仁。○有痰。加貝母。陳皮。○麻疹正出之時。雖不進飲食。但得麻疹。淡紅澤潤。真正不為害。加神曲砂仁。用。○麻疹已出之時。如色紅紫。乾燥暗晦。乃火盛毒熾。用生地。加紅花。黃芩。○麻疹已出。既過三日。不能沒者。乃內有虛熱。宜四物湯。如失血之証。加犀角汁解之。○麻疹退後。若有牙根腐爛。鼻血橫行。並為失血之証。急用本方。加茵陳。木通。犀角之類。以利小便。如疳瘡。色白者死。○孕婦出胎。胎上冲。急用苧根。艾葉。煎湯。磨生枳榔。服之。更以本方。大進之。

主篤按。享保癸酉年。初夏盛暑。麻疹流行。海內一般也。時医治法。大抵投升麻葛根湯。敗

毒十神之類。舉得効。雖然至盛暑。肺胃熱甚者。譏語煩躁。痰喘大渴。或疹毒內攻。而有至危不救者。於是自初發。發散解熱。平和劑。不能治之。到此時。浪華上月專安子。訓點干張氏。醫通麻疹門。名麻疹精要。驟刊行之。其治法以解肺胃熱為主。竹葉石膏湯去人參半夏。臨證加荊防。牛房子。玄參。或芩連等之法。而妄忌用升麻也。予做精要意。自初發。以此湯去人參。半夏。出入加減。隨手得効。是盛暑治熱病例。實白虎之應用。如響應桴。不讀張氏之書者。徒投發表。和解滋補。誤人者多。或疹後在革。至秋冬。有不復者。或有成勞熱者。嗟呼。世間雖無瞽盲。偏專我意。雖有此等書。遂捨不取之。是愚益愚者也。苟業医者。洗村學究。博涉方書。而不可不究于其淵源矣。

## 水痘

痘則紅潤形軟。總不似正痘之根窠圓淨緊束也。目見點超發灌漿結痂。止於五六日之間。其邪氣之輕淺可知。皆由風熱鬱於肌表而發。小兒肌肉嫩薄。尤多此證。當與大連翹湯解之。亦有夾疹而出者。有夾正痘而出者。若先水痘收後而發正痘。其痘必輕。夫水痘。熱二三日而出。如赤小豆大。皮薄易出。易壓。但用輕劑可解之。

## 小麥湯

羌活	滑石	甘草	地骨皮	人參
白茯	桔梗	大黃	知母	羌活
葶藶	小麥七粒	水煎		
地骨皮各等分	甘草減半			
		右水煎服		

## 羌活散

羌活	獨活	前胡	柴胡	川芎
白茯	桔梗	枳殼	人參	天麻

五絕

自縊。溺水。打撲。跌蹠。木石壓。產後血迷暈死。  
中惡。鬼擊。夜竄。心頭溫者。皆可救。半夏末。  
如豆大。吹入鼻中。或通關散。

○人中穴。及兩脚大拇指。離甲一韭葉許。各  
灸三五壯。即活。臍中灸百壯。亦効。

自縊

須安定心神。抱起緩々解下。用膝頭。或手累  
衣抵定糞門。切勿割斷繩。抱下安被卧之。刺  
雞冠血。滴入口中。一人以脚踏其兩肩。以手  
挽其頂髮。常々緊勿放之。一人以手揉其項。  
撚正喉嚨。按據胸上。數々動之。一人坐於腳  
後。裹衣抵住糞門。勿令泄氣。仍摩將臂腿屈  
伸之。若已殞。漸々強屈之。并按其腹。雖氣從  
口出。呼吸眼闊。猶引按。莫置。亦勿苦勞之。用  
蘆管四筒。取梁上塵。如豆大。入管中。却將蘆  
管。置死人兩耳鼻。用四人。各執一筒。用力吹  
入耳鼻。待其氣轉。但心下溫。無不活者。頗以  
姜湯及粥飲。含與之。潤其喉嚨。

五絕

五絕四十

溺水

溺水。凍死陷中者。安在床上。四面置活火。徐徐溫之。漿熱灰溫臍中。及中流冷更之。摩腹背。而令吐水。捻紙以穿鼻。嚏氣通。宜用桂附煎湯。

煎湯。

○溺水者。脫去濕衣。灸臍中即活。用皂莢末。綿裹內糞門。須臾水出。即活。

○陷井者。若握繩勿令放之。宜截上下。穿鼻握喉。氣未通。宜三里。三陰交。

○木石壓死。井跌磕。傷從高墜下。氣絕者。急擘開口。以熱小便灌之。

外科

癰疽 腫瘍

當審其勢之腫漫。色之赤白。與痛有微甚。毒有表裏。若腫高焮痛。便利調和。邪在表也。宜表散之。

清熱解毒湯

治瘡瘍焮腫赤痛。形病俱實。

黃連

酒炒

山梔

炒黑

連翹

當歸各半

芍藥 生地黃

各一錢

金銀花

三錢

甘草

六分

內 跖黃連湯

腫硬痛深。口乾便秘者。邪在裏

宜下之。宜此方。

木香

黃連

山梔

當歸

白芍

薄荷

檳榔

桔梗

甘草

各五分

大黃

二錢

水煎。食前服。加蜜二匙亦可。○準繩無大黃。有連翹。先喫一二服。次每服加大黃一錢。再加二錢。以利爲度。不大便秘滯者。不加大黃。

五香連翹湯 前症無表裏者。此方主之。

沉香

木香

麝麝香

丁香

各一兩

乳香

二兩

連翹

射干

升麻

獨活

桑寄生

甘草重各二兩大黃半兩木通三兩

水煎。大黃一味。隨虛實加減。

**挖裏榮衛湯** 治外無拘急。內則便利調和者。

邪在經絡。

桂枝 人參 黃耆 紅花

蒼朮 黃芩 柴胡 防風 當歸

羌活 黃芩 連翹 防風 當歸

酒水各半煎

○腫焮大痛。或麻木不痛。邪氣凝滯也。外用

隔蒜灸。內服活命飲。或歸薈飲。尤効。

**活命飲** 治一切癰毒赤腫。未成者消。已成者

潰。但漫腫色白不起。及膿出而痛不止。元氣

虛者禁用。

穿山甲 炮 白芷 防風 乳香

沒藥 貝母去心研 甘草節 赤芍 桔梗根

金銀花三錢 陳皮 皂角刺各一錢

水酒各半煎服

**歸薈飲** 治腦疽背癰。毒盛焮腫。及虛人肛門

發毒。

當歸重八錢者一隻 綿黃耆生 金銀花淨各五錢 甘草生三錢

水酒各碗半。煎至二碗。分三次熱服。一日令

盡。在上者加升麻三錢。在下者加牛膝三錢。

**四順清涼散** 治煩躁飲冷。赤痛發熱。二便不

通者。火熱內熾也。或活命飲。加大黃。尤善

當歸 赤芍 甘草 大黃酒蒸各一錢半

水煎入生蜜一匙

○微腫微痛。或不痛。陽氣虛弱也。參耆內挖

散。微點微赤。或不赤。或惡寒而不作膿。或膿

熟不潰者。陽氣虛寒也。並用千金挖裏散。

**千金挖裏散** 荆防敗毒散。加川芎。當歸肉桂。白芷。防風。桔梗。

白芍。天門冬。連翹。忍冬。生姜。

**荆防敗毒散** 治癰疽。疔腫。發背。乳瘡。諸般瘡

毒。腫痛。臙瘡。初發。憎寒壯熱。

人參敗毒散。加荆芥。防風。連翹。忍冬。去人參。

## 潰瘍

潰瘍。膿潰而腫消。痛止者為順。若膿腫痛。或

發寒熱者。氣血虛也。十全大補湯。或膿潰欲  
嘔。少食脾胃虛弱也。六君子。加炮姜。手足並  
冷者。脾氣虛寒也。六君子加姜桂。不應。急加  
附子。膿潰而仍痛。或二便秘滯者。毒未解也。  
珍加黃耆麥冬山茱萸。熱止而小便頻數。腎  
虛也。加減八味丸料。若熱不止。或腫痛反甚。  
虛熱內作也。保元湯。加清心涼血之劑。或熱  
瘡色夭白。或陷下不斂。寒氣所襲也。五味異  
功散。佐以豆豉餅。膿血過多。煩躁不安。乃亡  
陽也。急用獨參湯。尤當審其腫之軟硬。飲食  
冷熱。與膿之稠稀多少。內之赤色。青黯及瘡  
口之收儉。遲速。而投挖裏消毒。調補之劑。庶  
無變證。

○潰瘍。十宣散十全大補湯主之。氣滯加香  
附子。瘡疽已雖已見膿。根脚赤暈。反展開關。  
或不痛。或大痛。此毒氣不退。十宣散去厚朴。  
桂。倍人參。當歸黃耆。加忍冬連翹犀角括萎  
根。春末夏間。及秋初。宜加酒芩。黃連黃檗。羌  
活。

## 千金內挖散 即十宣散又名參耆內挖散

黃耆

蜜

人參

當歸

酒各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

厚朴

姜

肉桂

甘草

生各一錢

水煎。加金銀花。亦好。

竹葉黃耆湯

治癰疽。發背。諸般疔腫。表裏熱

甚。口乾大渴者。

黃耆

甘草

黃芩

川芎

當歸

白芍

人參

半夏

石膏

麥冬

各八分

淡竹葉

十片

生地

二錢

水二鍾。姜三斤。燈心二十根。煎八分。食遠服。

挖裏清中湯

治癰疽。

脾胃虛弱。

咳嗽痰氣。

不清。

飲食少思。

六君子湯。加桔梗。麥門冬。五味子。

六君子湯。

加乾姜木香。

挖裏建中湯

治癰疽。元氣素虛。或因寒涼傷

脾。損胃。飲食少思。凡食無味。或作嘔

泄瀉等症。急服之。

癰疽

外科三

六君子湯。加附子乾姜。

挖裏定痛散。治癰疽潰後。血虛疼痛。不可忍者。宜服之。

歸身 熟地黃 乳香 没藥

川芎 白芍 肉桂 栗穀泡去薦膜  
蜜炒二錢

水煎

經驗方。癰疽刺後。二三日間。十宣散。加椒皮。忍冬根。杞根三味。此三味。一切之瘡腫。排膿甚効。加味各證主方而可也。

癰疽秘方。此某小瘡。不用之癰疽難治。可用之雖不用外治愈妙。若元氣極虛者。獨參湯。無用。稻若水先生傳

沉香霜 五八牛霜 頭蟹霜各中

鹿角霜大 大黃生中 川芎大

右細末和勻。以一錢。三分之三度用之。

○凡癰疽。一切瘡腫刺後。痛甚難忍。用乳香。沒藥等分。細末和水。敷瘡外。甚妙也。

●瘡瘍作痛。當審邪之所在。證之所因。如寒熱而痛。邪在表也。人參敗毒散。

○便秘而痛。邪在裏也。清熱消毒湯加白蜜。

○腫焮而痛。血凝滯也。活命飲。

○作膿而痛者。托裏消毒散。排膿。

○脹而痛者。鍼之。

○膿潰而痛者。補之。

○氣虛而痛。四君子加歸耆。

○血虛而痛。四物湯加參耆。

○大批形傷痛。氣傷腫。不知此數者。徒以乳香。沒薑為止痛之方。則非所以為法矣。仍審五藏相勝。相兼之證而治之。後倣此。

●作嘔不止。腫瘍時嘔。當作陰虛補之。此論其常耳。

○腫赤焮痛而嘔者。熱毒甚也。活命飲。

○作膿而嘔者。血氣虛也。六君子加歸耆。

○便秘而嘔者。熱在藏也。清熱消毒湯。去生地金銀花。加檳榔木香。

○寒蒸服多而嘔者。胃氣傷也。六君子加桔梗柴胡。

○有肝氣乘脾而嘔者。有胃虛停痰而嘔者。有鬱結傷脾而嘔者。皆由脾胃虛弱。毒氣畜聚。治宜調補中氣。則正氣復而邪氣去矣。

●出血不止 瘡口出血。有因五藏相勝。陰陽不調而血不止者。有因六淫七情之氣不平。而血妄行者。

○因肝火內動。四物加山梔丹皮。

○肝經血虛六味丸。

○心虛不能統血。四物加參求丹皮酸棗仁。

○脾虛不能統血。四君子加山梔丹皮。

○肺脾氣虛。補中益氣湯。

○氣血俱虛。十全大補湯。

○腎氣不足而肝火內動。六味丸。梔子清肝散加五味。

○大凡失血過多。而見煩熱發渴等證。勿論其脈不問其證。急用獨參湯以補其氣。經云。

血生於氣。苟非參耆歸朮甘溫之藥。決不能

愈。若發熱脈大者多不治。

●肌肉不生。肌肉乃脾胃所生。收斂皆氣血所主。二者相濟以成者也。

○肥肉不生而色赤。血熱也。四物加山梔丹皮。

○肺熱內熱。血虛也。四君子加歸地丹皮。

○膿水清稀。氣血虛也。十全大補湯。

○食少體倦。脾氣虛也。補中益氣湯。

○煩熱作渴。起居如常者。胃熱也。竹葉黃耆湯。

○煩熱作渴。小便頻數者。腎虛也。六味丸。

○肉腐而不潰者。烏金膏。若肉潰而不斂者。六君子湯。外用珍珠散敷之。

○臭穢脈洪大而作渴。乃真氣虛而邪氣實也。此爲難治。大凡瘡瘍久而不愈者。元氣不足。或因邪氣凝滯於患處。苟能調補脾胃。則元氣自足。元氣既足。則邪氣自消。死肉自潰。新肉自生。而瘡自斂矣。若不保其本而槩敷生肌之劑。是反助其邪。後更潰爛耳。

●發熱不止。瘡瘍發熱。初患乃毒氣所侵。已成乃內熾作濃。已潰乃血氣虧損。不可槩行敗毒以傷元氣。

○作痛而發熱者。活命飲。

○作膿而發熱者。托裏消毒散。

○午前發熱者。陽氣虛也。補中益氣湯。

○發熱作渴。小便頻數者。腎氣虛弱也。加減

- 膿血多而熱者。陽無所附也。十全大補湯。
- 日將晡而熱者。氣血虛也。八珍湯。
- 無寐而熱者。內補黃芩湯。
- 煩躁者。血脫也。當歸補血湯。
- 自汗而熱者。胃氣虛也。四君子湯。
- 惡寒發熱者。肺氣虛也。補中益氣湯。或四君子加黃耆當歸。
- 有五藏相勝。夾食夾寒。六淫七情所致者。不能備述。臨證詳之。
- 大便不通。瘡瘍大便不通。初起則審所致之因。所見之證。而行內疏外表之法。已潰則分氣血虛實傳變之證。而用托裏滋補之法。不可泛用苦寒疎導之劑。恐復傷真氣。則腫者不能消散成膿。潰者不能生肌收斂。故丹溪云。腫瘍内外皆壅。宜托裏表散爲主。潰瘍內外皆虛。宜托裏補接爲主治者審之。
- 小便不通。瘡瘍小便不通。其因不一。當分經絡虛實而藥之。
- 潰而惡寒發熱。氣血虛也。八珍湯。手足並半夏。
- 寒熱往來。氣血虛也。十全大補湯。
- 手足不冷。乃脾氣虛弱也。四君子加升柴氣湯。
- 切不可輕用疎導之劑。復傷元氣。致腫者不能復起。發腐潰。潰者不能生肌收斂。須臨證制宜而治。庶無誤矣。
- 作渴不止。瘡瘍作渴。當分經絡所屬。及血氣虛實而治。
- 焮痛發熱。便利調和者。邪在表也。清熱消毒湯。
- 腫痛發熱。大便祕滯者。邪在裏也。涼膈散。
- 焮痛熾盛。邪在經絡也。活命飲。
- 右關脈洪數有力。胃火消爍津液也。竹葉石膏湯。
- 右關脈數無力。胃虛津液短少也。補中益氣湯。
- 飲食失度。胃氣內傷而亡津液者。參苓白

## 术散。

○膿血出多。而氣血虛弱者。八珍湯。加五味。

○稟腎不足。而津液短少者。加減八味丸。

●自汗不止。瘡瘍潰後多汗。衛虛元氣外泄。大非所宜。其稟質肥盛者。溼熱外泄猶無

大患。若形槁色枯。胸中多氣。血液衰少者。乃火熱亢極。爲害彌甚。故治肥盛之人。潰瘍多汗。則宜托裏消毒散。加減氣虛形盛者。則宜

六君子爲主。酒客則加麋銜澤鴻之屬。

○形瘦之人。潰瘍多汗。則宜保元湯。加歸芍。

或生料六味。加棗仁。救其津液。庶免火氣內燔。咽喉噎塞。煩擾喘欬之患。

○大抵潰瘍多汗。一切苦寒傷胃。膩滑奪食。

辛熱耗氣之藥。皆當切禁。

●下痢不止。癰疽潰久。瘡口不收。膿水清稀。而見泄利驚塘。皆爲脾氣衰弱之候。理中補中。四柱六柱。二神四神。並可選用。

○下痢白沫。此脾氣下陷。補中益氣。加姜桂吳萸木香之類。

○見膿血下滯。須詳血色之鮮晦。鮮者則宜

連理湯之姜連並進。以和其中。晦者則宜理中湯。稍加桂附以溫其下。赤白兼下。如瑪瑙色者。亦宜上法。倘數服不應。又當補中益氣。加辛溫之品。無升舉其陽。

○下痢清血。則加茜根。烏鰡骨。烏梅。白芍。苟非夏秋溼熱下注。則黃連厚朴枳殼檳榔。沲澦等藥。皆爲戈戟也。

## 疔

加減敗毒散 治癰疽疔疽諸瘍之初。用之宜

發毒。

防風 羌活 茄芥 金銀花 連翹

牛房子 黃連 黃芩 蒼朮

貝母 乳香 没藥 甘草

各等分

右姜三斤。葱白一根。入煎服。次化疔內消散。

化疔內消散 癰疔初起。或針。或灸。而後服之。令內消。

皂角刺 金銀花 知母 天花粉

穿山甲

白芨

各等分

乳香

甘草

各等分

芍藥 半夏

右加酒煎服。

疗瘻瘧

束毒金箍散 治疔疽鍼灸而後餘毒走散作腫者。

鬱金

白芨

白蔹

白芷

大黃 各四兩

黃柏 二兩

輕粉 五錢

菉豆 一兩

右爲細末調酥塗四邊夏月甚則調蜜水塗解毒大青湯 治疔疽鍼灸後入裏心煩譖語

攻心者。

玄參

桔梗

知母

大青葉

升麻

石膏

山梔

人中黃

麥門

木通

右竹葉十枚。燈心二十根。食遠煎服。大便結加大黃。悶亂加人糞燒。

一方 治一切疔瘻不問新舊。諸惡瘻無名毒瘡。妙効。

櫻皮

大裏面着  
木白皮

沉香

小

櫻皮 燒存性

沉香 中

黃芩

小

藿香

小

升麻

小

藿香 小

連翹

小

水煎溫服。

拔毒方

櫻皮 燒存性

蝮 燒存性

### 瘰癧馬刀氣腫痰核

柴胡清肝散

治肝膽二經風熱怒火頸項腫

痛結核不消或寒熱往来嘔吐痰水又治婦人暴怒肝火內動經水妄行胎氣不安等症

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名

日馬刀瘡

柴胡

連翹

歸尾

甘草

黃芩

牛房子

三稜

桔梗

各二分

黃連

紅花

少許

水煎稍熱服

芩連二陳湯

治瘰癧生於少陽部分項側結核外皮漫腫色紅微熱或至缺盆高骨上下。

瘰癧

外科八

發腫形長堅硬作痛。名曰馬刀。初起宜服此。

芩連二陳湯方見內科瘻門 加桔梗連翹牛房子

天花粉木香夏枯草姜煎服

加味藿香散 治氣毒瘰癧外受風邪。內傷氣鬱。以致頸項作腫。肩背強痛。四肢不舒。寒熱如瘧。及胸鬲不利。

藿香 甘草 桔梗 青橘皮

陳橘皮 茵胡 紫蘿 半夏

白术 白茯苓 白芷 厚朴

川芎 香附子 夏枯草各等分

姜棗水煎服

防風解毒湯 治風毒瘰癧。寒暑不調勞傷湊襲。多致手足少陽分耳項結腫。或外寒內熱。

痰凝氣滯者。並効

防風 荆芥 桔梗 牛房子

連翹 甘草 石膏 蘿荷

枳殼 川芎 蒼朮 知母

燈心水煎食後服

連翹消毒飲 治熱毒瘰癧。過食炙燙醇酒膏湯。以致蘊熱腮項成核或天行亢熱溼痰作

腫不能轉側者。効

連翹 陳皮 桔梗 玄參

黃芩 赤芍 當歸 桃子

葛根 射干 天花粉 紅花各一錢

甘草二分 大黃初起便燥者加之

水煎食後服有痰加竹茹一錢

補中勝毒湯 治瘰癧已破者

益氣湯加生地防風熟地芍藥連翹

山錫杖湯 治馬刀瘰癧。或過一二年破未破全効。明年春又可服三十貼許。全愈。

并良。

山錫杖五錢 青木葉陰干三錢 桔梗二錢

沉香一錢

甘草一錢

右為一貼。或為三貼。或為五貼。隨大人小兒。分量異。若非瘰癧。則無効。瘰癧雖有一核。推之底如有根。或微痛也。療核曾無痛。此某右分量。而可用五十貼許。大抵有効。雖然難得全効。明年春又可服三十貼許。全愈。

一方 治瘰癧馬刀。一切結核。

常山葉自然汁。一盞半。輕粉半盞。和勻金之。不日消散極妙。

流注 便毒

外科九

流注

夫流注者流行注住氣血虛弱人有瘀血瘀火所干外風寒爲此其初起胸連胸腹終臍中其形漫腫無頭皮色不變所發不定有脊背共。

加減小柴胡湯 初起用之宜去外邪風寒湿熱痰火

柴胡 黃芩 甘草 半夏  
人參 陳皮 茯苓 桔梗  
牛房子 連翹 防風 羅活  
右姜三片入煎服

加味太補湯 治未潰或潰不消元氣不足者  
當歸 茄菜 川芎 熟地  
人參 黃耆 貝母 連翹  
藿香 防風 陳皮 茯苓

半夏 桔梗 各等分 姜二片煎服

琥珀膏 治注

大黃 二兩 彙金 天南星 白芷 各一  
右細末用大蒜共搗打酒作膏貼之

便毒

便毒敗精五苓散利便秘加大黃寒熱小柴胡湯加沵鴻施子溼熱便難八正散龍胆鴻肝通真竒

龍膽鴻肝湯 治陰部時復熱痒及臊臭  
柴胡 沢鴻各一 車前子 木通 各五  
生地黃 當歸尾 草龍膽 分

水煎稍熱服○李氏入門有施芩治肝經溼熱或囊癰便毒下疳懸瘻腫瘍焮作痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺腫脹或出膿水

通真散 治便毒如神

牽牛 半錢 大黃 三錢 歸尾 三錢 甘草節 二錢  
白姜蚕 半錢 木鼈 三錢 穿山甲 二錢  
好酒煎早晨空心服○崇川陳氏曰治魚口便毒騎馬癰橫痃等症初起未成膿者。

便毒內挖散 治便毒痛甚欲成膿者。

黃耆內挖散 治便毒痛甚欲成膿者。  
川芎 當歸 花粉 皂角針 各一  
黃耆 各二 甘草 沢鴻 各五

便毒 楊梅瘡

外科十

水煎。潰後十全大補之類。

便毒下劑

蕎麥 六分 大黃 三錢 川芎 二分 甘草 一分

右細末分為三服用酒飲下至熟醉。

一方 下便毒奇方

山梔 二箇 鹽梅 中者二箇

右二味燒存性為末用巴豆二粒去油和勻煎茶為二服用一服得快利則止後服。

又方

牛膝 半錢 姜蚕 三分 全蝎 五箇 惡實 五分

川山甲 三分 當歸 四分 金銀花 三分 甘草 二分

水煎

敷方 便毒漸見赤色亦能散之。

大黃 生 黃檗 生

右二味等分細末和水頻塗之。

又方

芙蓉葉 陰干十紙 白芨 白 白斂 各五分

姜黃 錢 黃柏 三錢 五倍子 一錢 甘草 三錢

常山汁 見瘻瘍門

一法

右細末用忍冬葉白芷冰片利之頻塗之。

五香連翹湯治便毒有効。  
○便毒血虛有熱宜加味逍遙散。

楊梅瘡

楊梅初起通聖散去麻服後去硝黃內外已通成調理加減通聖散

加減通聖散

防風 白鮮皮 赤芍 連翹

黃芩 各八分 牛房子 一錢 金銀花 三分

山梔子 當歸 各五分 荆芥 槐花 各四分

姜蚕 甘草 各三分

水煎服○初起便秘加大黃一錢○便難加皂角三分○胃弱食少加术一錢陳皮半夏各五分○頭上多加芎八分蕤荷一分○下部多加牛膝黃檗各四分○遍身多加木通桔梗地骨皮各六分○心火加黃連腎火加玄參各四分○氣虛加參芪血虛加地黃各六分

五寶丹

治虛人結毒

韶粉 三錢銅杓內隔紙培黃

微火緩煆勿令焦黑

珍珠勿見火

滴乳粉 細末

蝦淨取琥珀勿見火另研

硃砂一錢水各

右五味杵勻湯浸蒸餅爲丸。菉豆大分作七服。弱者分十服。每服用土茯苓四兩煎湯服之。

搜風解毒湯 治楊梅瘡新久并結毒。

土茯苓 十錢薏苡仁

金銀花

防風

木瓜 木通

皂角子

白鮮皮 各五分

煎服。○經驗傳。土茯苓二錢。餘藥各五分。為一貼或二貼亦効。

○瘡毒後狂亂。茯苓補心湯加土茯苓。

○瘡毒後一身悉痛。敗毒散。

○因遺毒寒熱不言語。身痒。五香連翹湯加陳皮。

○遺毒下血。或膿血諸藥不効。五香連翹湯。

○瘡毒或遺毒痛甚難忍。治方

大白蛇 赤壁通用者

鹿茸

右二味等分燒存性。為散半寸匙許。以山梔子煎湯送下。日三用之。至七日。

疥癬

乾疥便祕清涼飲便利翹芩四物湯安肺風

面刺。樟皮散久虛腎氣丸烏荆丸

樟皮散 治肺臟風毒。遍身瘡疥及癰瘍癩痒

樟之成瘡又治頭上風刺及婦人粉刺

荆芥 杏仁各二分 甘草 半分 枳橈

樟皮 各四分

為末每二錢食後溫酒服。

古烏荆丸

川烏 二兩

荆芥穗 二兩

爲末醋糊爲丸梧子大每服二十丸溫酒下。祛風敗毒散 治風瘡疥癬。癰瘍。赤白癥風。赤遊風。血風。瘻瘍。丹瘤。及破傷風。在上部加桔梗。在下部加牛膝。

茈胡 五分 前胡

赤芍

枳殼 各五分

羌活 各八分 獨活 連翹 蒜 六分 蟬退 三分 甘草 三分

姜三片煎服。時毒去蟬加防風。

○溼疥便秘。通聖散。氣滯。復元通氣。先便利。  
爲脾虛溼熱。補中益氣加芩連芎芷。脾鬱盜  
汗歸脾劑。冒火作渴。竹葉黃芩湯煎。澁澁腹  
脹。胃苓湯。主加芩連脾肺風毒首烏痊。

何首烏散。治脾肺風毒攻冲。遍身癬疥癩痒。  
或生癰疹。搔之成瘡。肩背拘倦。肌肉頑痺。手  
足皴裂風氣上攻。頭面生瘡。又治紫癥。白癥。  
禦麻等風。

蔓荊子 藏靈仙 荊芥 防風

荳蔻草

何首烏

甘草各五分

爲末每一錢食後溫酒調下

祛熱搜風飲 治疥及膿疮瘡

金銀花 苦參君 柴胡 生地黃

黃芩

黃檗皮

黃連

荊芥臣

連翹

薄荷

獨活

枳殼

防風佐 甘草使

食遠熱服

○疥瘡因誤治。毒氣內陷。手足腫。大小便澀。  
敗毒散加猪苓澤泻木通生大黃。

### 一法 治前證

用芥細剉灌湯。和引內食。

### 癬瘡

敷方 治諸疥癬。牛皮癬。四脣頑瘡。痒痛不止。  
名并驗散。

大風子果肉四兩。擗去千瘡者別搗如泥。用指撲無瀆為度。生白礬別研細。

枯白礬

別研細各一錢二分。

輕粉

別研水銀各半錢。

障腦

別研

右五味。共一處。再研方。入楓子泥內。搗極勻。

再將臘猪脂。熬清汁六七匙。天時冷。恐乾燥。  
得數匙。和入令勻。每晚洗後擦。若患膿瘡瘍。  
輕々塗之。四五六晚全愈。  
○癬瘡渾身出。諸藥不効。神授衛生湯。去大  
黃加蒼术。

神授衛生湯 治癰疽發背。腦疽對口。丹瘤。瘰  
癧。惡毒疔瘡。濕痰流注。及外科一切瘡症。但  
未成者即消。已成者即潰。能宜熱散風。行瘀。  
活血。解毒。消腫。疎通臍腑。且藥性平和。功效  
甚速。誠外科首用方。

沉香

羞活八分

防風

白芷

川山甲土炒研

六分

麻瘡 癪風 破傷風 外科十三

金銀花 皂角刺 歸尾

天花粉各一 乳香五分 大黃酒二錢若虛

甘草節 便利者不用

水煎。病在上部。先服藥後飲酒一杯。痛在下部。先飲酒一杯。後服藥。先用荆防敗毒散。

### 驟瘡

先用荆防敗毒散發散之。次與五積散加酒洗大黃熟附子。若不効。宜用竹葉黃芩湯。

○一法 當歸粘痛湯極効

### 敷方

川蠍

右摺塗之。○敷方多見諸書

### 敷方

樟腦半兩

龍腦火

雄黃半兩

右為末。以綿布包之。浸醋以火煖之。熨癩風上。最妙。

○治白癩風

蜜陀僧大

輕粉少

右和勻。以蒼耳汁。擦之

### 癩風

○治黑癩風

丹 硫黃等分

右細末。以醋練之。敷癩風上。凡五日許敷愈。

### 癰瘡

○白瘡之方

鯽魚三兩

右去腸。以亂髮卷之為霜。

細末入雄黃一分。以麻油。敷之。

### 破傷風

桃仁湯 治從高墮下。腹中瘀血滿痛。

桃仁

蜜蟲各三

荆芥大黃

芎藭各三

當歸

桂心

甘草各二

蒲黃五兩

右九味。水煮取三升。分三服。

調營活絡飲 治失力。閃挫。或跌撲瘀結。大便不通。腰脇小腹急痛。

大黃酒浸

牛膝生

當歸尾

桃仁炒研各二錢

赤芍菜

芎藭

生地黃酒浸慈活各二

水煎食前溫服。臨服入地龍末一錢。如病久

紅花

肉桂

各五分

水煎食前溫服。臨服入地龍末一錢。如病久

破傷風

外科十四

不能取効。加生附子尖。炮穿山甲末各半錢。  
人參一錢。

當歸導氣散 治跌撲瘀血內壅喘急便秘

大黃酒浸一兩 當歸三錢 麝香三分

為散每服三錢。熱酒調。日三夜一服。

自然銅散 治跌撲骨斷

自然銅蝦通紅醋淬七次放溼土上月余用 乳香

沒藥當歸身等分

為散。每服二錢。醇酒調。日再服。骨傷用骨碎

補半兩。酒浸搗絞。取汁冲服。

乳香定痛散 治跌撲傷筋

乳香沒藥等半兩 川芎各半 白芷各半 赤芍各半

丹皮各半 生地黃各半 甘草各半

為散每服四錢。醇酒和童子小便調。日再服。

大便秘。加酒大黃。筋傷用生牛膝半兩。酒浸

搗絞取汁。冲服。

○破傷風證。因擊破皮肉。風邪襲入。而發熱腫脹。治法與感冒不異。又諸瘡潰後。風邪乘虛內襲。其候最急。往往視為尋常。致變種種。多有不可救療者。亦有瘡熱鬱結。多著白痴。

瘡口閉塞。氣難宣通。而熱甚生。或有用湯淋洗。溼氣從瘡口中入。其人昏迷沉重者。或有用艾灸火烘。火氣逼入而煩躁發熱者。但須辨瘡口平無汁者。破傷風也。瘡口邊出黃水者。破傷濕也。瘡口焮腫赤色。破傷火也。其湯火之毒。亦與破傷風無異。

○患處復加腫赤。神昏少食。不分經絡者。穿山甲一錢匙。蜈蚣末半錢匙。麝香一字。濃煎葱白香豉湯服之。患上用葱涕。調炒飛麪。塗之。

○三陽而不及三陰者。意謂風邪在三陽之經。便宜按法早治而愈。若待傳入三陰。其證已危。惟天靈蓋。蝦一錢匙。穿山甲半錢匙。麝香一字。為散。濃煎葱白香豉湯服之。

九味羌活湯 治太陽經感冒風邪

羌活錢半 防風一錢 生地黃五分 黃芩五分

川芎一分 葱白五分 生姜三分 大棗一枚

水煎溫服。覆取微汗。

芎黃湯 治破傷風便秘溺赤

破傷風

外科十五

川芎

黃芩各錢半

甘草炙一錢

葱白

四莖

香豉一合

水煎溫服覆取微汗

大芎黃湯

芎黃湯去甘草。加酒大黃三錢。羌活錢半。

左龍丸 治破傷風牙關緊急

左盤龍即鵝糞白姜桑炒

鱠膠蛤各五錢炒

雄黃一錢

爲末。飯糊丸。梧子大。每服十五丸。溫酒下。日三服。如證重不已。每茶末一錢。飯糊中加入巴豆霜五釐。每服中加一丸。如此漸加至十九。以利爲度。

張氏醫通纂要卷四終



每部須認  
此圖記

安永五丙申年春三月發行

星文堂全梓

浪華書肆

定榮堂

清石頑道人所著。医通之為書也。備探索古医方後世方。而撰之。補鴻寒溫和汗吐下之法。大備。究万世方術之淵源。清康熙帝勅登梓。既渡本邦。歷年稍久。往年謙齋先生就其書研精于連珠。蒐獵于碎金。提其要。為小冊子。題曰纂要。僕嚮因玄順先生授醫療手引草。印刻行于海內。頃又懇請纂要携歸于家。僕數世以販書為業。四方諸君子。賜顧恒蕃廣焉。凡上乘纂要閱之。贊聲洋々乎盈耳。曰於職水中之鹽味。色裡之膠青。纂医通而倍医通。實是青囊家必用。真可謂至寶。盍乞需登梓。諸僕以諸君子之言。告玄順先生。先生莞爾曰。苟為濟生之一助。則豈惜之哉。僕於是不勝雀躍。寿乎永世。而布乎四方。謹記其來由。

安永五年丙申春正月 烏飼昭書

烏巢先生著述書目并藏版医本目錄

傷寒通玄類證

全部壹冊

金匱通玄類證撰註

未刻

醫療手引艸上編中編未刻

刊行全部二冊

同續編上中下三編各二冊

近刻

同別錄

未刻

衆方規矩方解大成

全二冊

本方良醫賢達試用治驗的切之蒸方考解

張氏醫通纂要

全部五冊刊行

治療經驗內經金匱治論本邦名古屋丹

水子北山友松子等治例方考弁明治痢

詳記

和韓人參考稻若水之論并朝鮮人叢會

札諸參筆語彙錄韓參和參品類真偽弁

明

右兩書合刻全二冊

同後編附錄家授切希傳全一冊未刻

六八本艸中山氏序王全二冊近刻

医方捷經全二冊未刻

方的効方六經證治要領全一冊

中條流產書村山林益著全部十冊刊行

王機微義明劉宗厚著

全部十五冊

合本十五冊刊行

黃帝內經仲景傷寒論金匱要畧等經旨  
葵方并病門悉引證而發明於治術及後  
世折衷孫真人千金方張子和儒門事親  
王壽外臺秘要嚴氏河間東垣丹溪其餘  
諸名家之方論而錄之內經傷寒論金匱  
其外諸子之方法依附病門貫通古方後  
世方而治療有益之書也。

刪補方要好生子著

名古屋玄醫閣

全部五冊

好生子行于世回春等雜駁之書歎誤治  
療仲景傷寒論金匱之方其餘雖後世方

撰可用者頒病門百二十附二千有餘方

和漢名医方考治論載之濟生之良書也。

錦囊外療秘錄

全部一冊刊行

腫物悉圖之治方膏藥方記于詳下疳便毒

五痔楊梅瘡濕毒一切經驗之良方悉集之

錦囊妙藥秘錄明王夢蘭著

全部一冊刊行

單方古方疾病沉疴治以如神的中之要方

天文醫案三喜齋稿本

全一冊刊行

仲景全書正誤

医宗金鑑  
拔書

全一冊

藥種名寄帳

前後集有異名和各悉附之

全一冊

巖氏濟世方

巖用和名

全部二冊近刻

張氏本艸

清張路王墓

全部五冊板行

是則在於医通全本之中。本草逢原也。本

邦菜店所贍之菜。真偽并明。和菜。唐菜。能

否。悉辨之。附于卷首。

張氏醫通医按

同人撰

全部五冊未刻

本艸并明

菜能毒真偽并明

全部一冊

合類衆方規矩大成

全部一冊

副古方後世方

濕毒一切經驗良方

全部五冊合本一冊

華佗中藏經

全部五冊合本一冊

小兒活法

小兒讀陽良醫松下元真著

全部五冊合本一冊

增補燈下集

啓迪院道三先生治療効驗著明之書

全部五冊

痘疹撮要

痘瘡麻疹治療本

全部五冊

浪華書肆

高麗橋第一街藤屋號兵衛

浪華書坊

心齊橋南第四街吉文宇屋市兵衛



