

30 1

10

9


8

7

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

0



武
門
編
卷
199
2



局方發揮卷之一

元

義烏

丹溪朱震亨彥脩

撰

明

金壇

宇泰王肯堂損菴

校

局方總論

內計三十一條

和劑局方之爲書也。可以據證檢方。卽方用藥不必求醫。不必脩製尋贖。見成丸散。病痛便可安痊。仁民之意。可謂至矣。自宋迄今。官府守之以爲法。醫門傳之。以爲業。病者恃之以立命。世人習之以成俗。然予竊有疑焉。何者。古人以神聖工巧言醫。又曰。醫者意。

也。以其傳授雖的造詣雖深。臨機應變如對敵之將。操舟之工。自非盡君子隨時取中之妙。寧無愧於醫乎。今乃集前人已效之方。應今人無限之病。何異刻舟求劍。按圖索驥。冀其偶中也難矣。

或曰。仲景治傷寒著二百一十三方。治雜病著金匱要略二十有三明。歷代名方汗牛充棟。流傳至今。明效太驗。顯然耳目。今吾子致疑於局方。無乃失之謬妄乎。

予曰。醫之視病。問證已得病之情矣。然病者一身。血

氣有淺深。體段有上下。臟腑有內外。時月有久近。形志有苦樂。資稟有厚薄。能毒有可否。標本有先後。年有老弱。治有五方。令有四時。某藥治某病。某經用某藥。孰爲主治。反治。孰爲君臣佐使。合是數者。計較分毫。議方治療。貴乎適中。今觀局方。別無病源議論。止於各方條述。證候繼以藥石之分兩。修製藥餌之法度。而又勉其多服。常服久服。殊不知一方通治諸病。似乎立法簡便。廣絡原野。冀獲一兔。寧免許學士之誚乎。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲

爲方圓平直者必於是而取則焉。然猶設爲問難藥作何應處以何法許學士亦曰我善讀仲景書而知其意然未嘗全用其方局方制作將擬仲景耶故不揣荒陋敢陳管見倘蒙改而正諸實爲醫道之幸。今世所謂風病大率與諸痿證袞同論治良由局方多以治風之藥通治諸痿也古聖論風論風者百病之源流不同治法亦異不得不辨按風論風者百病之長至其變化乃爲他病又曰善行數變曰由於露風曰先受邪曰在腠理曰客曰入曰傷曰中歷陳五臟

與胃之傷皆多汗而惡風其發明風邪係外感之病有臟腑內外虛實寒熱之不同若是之明且盡也別無癱瘓痿弱卒中不省僵仆喟斜攣縮眩暈語澁不語之文新舊所錄治風之方凡十道且卽至寶丹靈寶丹論之曰治中風不語治中風語澁夫不語與語澁其可一例看乎有失音不語有舌強不語有神昏不語有口禁不語有舌縱語澁有舌麻語澁治太陽風秘秘有風熱有風虛曾謂一方可通治乎又曰治口鼻血出夫口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血

隨氣上^上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經。豈可以輕揚飛竄之腦麝佐之以燥悍之金石乎。又曰治皮膚燥痒經曰諸痒爲虛血不榮肌腠所以痒也當與滋補藥以養陰血血和肌潤痒自不作。豈可以十七兩重之金石佐以五兩重之腦麝香桂而欲以二兩重之當歸和血一升之童便活血一升之生地黃汁生血。夫枯槁之血果能和而生乎。果能潤澤肌肉之乾瘦乎。又曰治難產死胎血脉不行此血氣滯病也。又曰治神魂恍惚久在床枕此血氣虛病也。

夫治血以血藥治虛以補藥彼燥悍香竄之劑固可以劫滯氣果可以治血而補虛乎。潤體丸等二十餘方皆曰治諸風治一切風治一應風治男子三十六種風其爲主治甚爲浩博且寒熱虛實判然迥別。一方通治果合經意乎果能去病乎。龍虎丹排風湯俱係治五臟風而排風又曰風發又似有內出之意。夫病既在五臟道遠而所感深一則用麻黃二兩以發其表一則用腦麝六兩以瀉其衛而謂可以治臟病乎。借曰在龍虎則有寒水石一斤以爲鎮墜在排風

則有白朮當歸以爲補養此殆與古人輔佐因用之意合乎。臟病屬裏而用發表瀉衛之藥寧不犯誅伐無過之戒乎。寧不助病邪而伐根本乎。骨碎補丸治肝腎風虛乳香宣經丸治體虛換腿丸治足三陰經虛或因感風而虛或因虛而感風既曰體虛肝腎虛足三陰經虛病非輕小理宜補養而自然銅半夏威靈仙荆芥地龍川練烏藥防風牽牛靈脂草烏羌活石南天麻南星檳榔等疏通燥疾之藥居補劑之太半果可以補虛乎。七聖散之治風濕流注活血應痛。

丸之治風濕客腎經微汙以散風導水以行濕仲景法也觀其用藥何者爲散風何者謂行濕吾不得而知也三生飲之治外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛及痰厥氣虛大有神效治外感以發散仲景法也治內傷以補養東垣法也誰能易之脉之沉伏浮盛其寒熱表裏虛實之相遠若水火然似難同藥痰厥因於寒或能成功血氣虛者何以收救已上諸疑特舉其顯者耳若毫分縷析更僕未可盡也姑用寘之忘言

或曰。吾子謂內經風論主於外感。其用麻黃桂枝烏附。輩將以解風寒也。其用腦麝威靈仙黑牽牛輩將以行凝滯也。子之言過矣。

予應之曰。風病外感。善行數變。其病多實少虛。發表行滯。有何不可。治風之外。何爲又歷述神魂恍惚。起便須人手足不隨。神志昏憒。癱瘓顛曳。手足筋寒。眩暉倒仆。半身不遂。脚膝緩弱。四肢無力。顫掉拘攣。不語語澁。諸痿等證。悉皆治之。攷諸痿論。肺熱葉焦。五臟因而受之。發爲痿躆。心氣熱生。脉痿。故脛縱不在

輯覽

地。肝氣熱生。筋痿。故宗筋弛縱。脾氣熱生。肉痿。故渙而不化。腎氣熱生。骨痿。故足不在身。又曰。諸痿皆屬於上。謂之上者。指病之本在肺也。又曰。昏惑。曰癲癇。曰瞀悶。曰瞀昧。曰暴病。曰鬱冒。曰朦昧。曰暴喑。曰瞀懃。皆屬於火。又曰。四肢不舉。曰舌本強。曰足痿不收。養陽。作陽德。以爲倦怠。悉是濕熱內傷之病。病當作諸痿。治之何局。方治風之方。兼治痿者十居其九。不思諸痿皆起於肺熱傳入五臟。散爲諸證。大抵只宜補。

養若以外感風邪治之寧免實實虛虛之禍乎。
或曰經曰諸風掉眩皆屬於肝諸暴強直皆屬於
風至於掉振不能久立善暴僵仆皆以爲木病肝
屬木風者木之氣曰掉曰掉振非顛掉乎曰眩非
眩暉乎曰不能久立非筋寒乎非緩弱無力乎曰
諸暴強直非不隨乎曰善暴僵仆非倒仆乎又曰
瞀悶曰瞀昧曰暴病曰鬱冒朦昧暴瘡曰瞀憲與
上文所謂屬肝屬風屬木之病相似何爲皆屬於
火曰舌本強曰痰涎有聲何爲皆屬於土痰論俱

未嘗言及而吾子合火土二家之病而又與倦怠
並言總作諸痿治之其將有說以通之乎

予應之曰按原病式曰風病多因熱其俗云風者言
朱而忘其本也所以中風而有癱瘓諸證者非謂肝
木之風實甚而卒中之也亦非外中於風良由將息
失宜腎水虛甚則心火暴甚水不制火也火熱之氣
佛鬱神明昏冒筋骨不用而卒倒無所知也亦有因
喜怒思悲恐五志過極而卒中者五志過熱甚故也
又原病曰脾之脉連舌本散舌下今脾臟受邪故舌

強又河間曰。胃膈熱甚。火氣炎上。傳化失常。故津液涌而爲痰涎。潮上。因其稠粘難出。故作聲也。以屬脾。以爲胃熱。謂之屬火與土。不亦宜乎。雖然。岐伯仲景孫思邈之言。風大意似指外邪之感。劉河間之言。風明指內傷熱證。實與痰論所言。諸痿生於熱。皆合外感之邪。有寒熱虛實。而挾寒者多。內傷之熱。皆是虛證。無寒可散。無實可瀉。局方本爲外感立方。而以內傷熱證。袞同出治。其爲害也。似非細故。

或曰。風分內外。痿病因熱既得聞命矣。手陽明太

腸經肺之腑也。足陽明胃經脾之腑也。治療之法取陽明一經。此引而未發之言。願明以告我。

予曰。諸痿生於肺熱。只此一句。便見治法。大意經曰。東方實。西方虛。南方補。北方此固是就生剋言。補瀉而太經太泄。不外於此。東方木。肝也。西方金。肺也。南方火。心也。北方水。腎也。五行之中。惟火有一腎。雖有一水。居其一陽。常有餘陰。常不足。故經曰。一水不勝一火。理之必然。肺金體燥。而居上主氣。畏火者也。脾土性濕。而居中主四肢。畏木者也。火性炎上。若嗜

慾無節。則水失所養。火寡于畏。而侮所勝。肺得火邪。而熱矣。木性剛急。肺受熱。則金失所養。木寡于畏。而侮所勝。脾得木邪。而傷矣。肺熱。則不能管攝一身。脾傷。則四肢不能爲用。而諸痿之病作。瀉。南方。則肺金清。而東方不實。何。脾傷。之有。補。北方。則心火降。而西方不虛。何。肺熱。之有。故陽明實。則宗筋潤。能束骨。而利機關矣。治痿之法。無出於此。駱隆吉。亦曰。風火既熾。當滋腎水。東垣先生取黃蘖爲君。黃芪等補藥。之輔佐。以治諸痿。而無一定之方。有兼痰積者。有濕多。

者。有熱多者。有濕熱相半者。有挾氣者。臨病製方。其善於治痿者平。雖然。藥中肯綮矣。若將理失。宜聖醫不治也。天產作陽。厚味發熟。先哲格言。但是患痿之人。若不淡薄食味。吾知其必不能安全也。

或曰。小續命湯。與要略。表裏。非外感之藥乎。地仙丹治勞傷腎憊。非內傷之藥乎。其將何以議之。予曰。小續命湯。比要略少。當歸石膏。多附子。防風防已。果與仲景意合否也。仲景謂汗出。則止藥。局方。則曰。久服差。又曰。久病風陰晦。時更宜。與。又曰。治諸風。

似皆非仲景意。然麻黃防已可久服乎。諸風可通治乎。地仙丹既曰補腎而滋補之藥與僭燥走竄之藥相半。用之腎惡燥而謂可以補腎乎。借曰足少陰經非附子輩不能自達乎。八味丸仲景腎經藥也。八兩地黃以一兩附子佐之觀此則是非可得而定矣。非吾之過論也。

又觀治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣。用安息香丸。丁沉丸。大沉香丸。蘇子丸。勻氣散。如神丸。集香丸。白沉香丸。煨薑丸。鹽煎散。七氣湯。九痛溫

白丸。生薑湯。其治嘔吐膈噎也。用五膈丸。五膈寬中散。膈氣散。酒癥丸。草豆蔻丸。撞氣丸。人參丁香散。其治吞酸也。用丁沉煎丸。小理中丸。其治痰飲也。用倍丸。消飲丸。溫中化痰丸。五套丸。且於各方條下或曰口苦失味。曰噫酸。曰舌澀。曰吐清水。曰痞滿。曰氣急。曰脇下急痛。曰五心中熱。口爛。生瘡。皆是明著熟證。何爲率用熟藥。夫周流於人之一身。以爲生者氣也。陽往則陰來。陰往則陽來。一升一降。無有窮已。苟內不傷於七情。外不感於六淫。其爲氣也。何病之有。

今曰。冷氣滯氣逆氣。上氣皆是肺受火邪。氣得炎上之化。有升無降。薰蒸清道甚。而至於上焦不納。中焦不化。下焦不滲。展轉傳變。爲嘔爲吐。爲隔。爲噎。爲痰。爲飲。爲翻胃。爲吞酸。夫治寒以熟治。熟以寒。此正治之法也。治熱用熟。治寒用寒。此反佐之法也。詳味前方。既非正治。又非反佐。此愚之所以不能無疑也。謹按原病式曰。諸嘔吐酸。皆屬於熱。諸積飲痞膈中滿。皆屬於濕。諸氣逆衝上。嘔涌溢食不下。皆屬於火。諸堅痞。腹滿急痛。吐腥穢。皆屬於寒。深契仲景之意。金匱要略曰。胷痺病。胷背痛。括萎薤白湯主之。胷痺。心痛徹背。括萎薤白半夏湯主之。心下痞氣氣結在胷脇下。上逆捨心者。枳實薤白括萎桂枝湯主之。嘔而心下痞者。半夏瀉心湯主之。乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。諸嘔吐。穀不得入者。小半夏湯主之。嘔吐。病在膈上者。猪苓湯主之。胃反嘔吐者。半夏參蜜湯主之。食已卽吐者。大黃甘草湯主之。胃反吐而渴者。茯苓澤瀉湯主之。吐後欲飲者。文蛤湯主之。病似嘔不嘔。似噦不噦。心中無奈者。薑汁半夏湯主之。

乾嘔。手足冷者。陳皮湯主之。噦逆者。陳皮竹茹湯主之。乾嘔下痢者。黃芩湯主之。氣衝上者。皂莢丸主之。上氣脉浮者。厚朴麻黃湯主之。上氣脉沉者。澤瀉湯主之。太逆上氣者。麥門冬湯主之。心下有痰飲。胃脇支滿。目眩。茯苓桂朮甘草湯主之。短氣有微飲。當從小便出之。宜茯苓桂朮甘草湯。腎氣丸亦主之。病者脉伏。其人欲自利利者。反快。雖利心下續堅滿者。此爲流飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。病懸飲者。十棗湯主之。病溢飲者。當發其汗。宜大青龍湯。又宜用小青龍。

湯心下有支飲。其人若冒眩。澤瀉湯主之。支飲胃滿者。厚朴大黃湯主之。支飲不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。嘔家本渴。今反不渴。心中有支飲故也。小半夏湯主之。卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。假令瘦人臍下有悸者。吐涎沫而頭眩。水也。五苓散主之。心胃有停痰宿水。自吐水後。心胃間虛氣滿不能食。消痰氣令能食。茯苓飲主之。先渴後嘔。爲水停心下。此屬飲家。半夏加茯苓湯主之。觀其微意。可表者。汗之。可下者。利之。滯者。導之。鬱者。揚。

昌石力奇尺大
巴開拓也

乏熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之。挾濕者淡以滲之。挾虛者補而養之。何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟火。實實虛虛各將誰執。

或曰脉訣謂熱則生風冷生氣寒主收引。今冷氣上衝矣。氣逆矣。氣滯矣。非冷而何。吾子引仲景之言而斥其非。然則諸氣諸飲。嘔吐反胃。吞酸等病。將無寒證耶。

予曰五臟各有火。五志激之。其火隨起。若諸寒爲病。必須身犯寒氣。口得寒物。乃爲病寒。非若諸火病自

內作所以氣之病寒者十無一二。或曰其餘痰氣嘔吐。吞酸噎膈。反胃。作熱作火論治於理可通。若病人自言冷氣從下而上者。非冷而何。

予曰上升之氣自肝而出。中挾相火。自下而出。其熱爲甚。自覺其冷。非真冷也。火極似水。積熱之甚。陽亢陰微。故見此證。冷生氣者。出高陽生之謬言也。若病果因感寒。當以去寒之劑治之。何至例用辛香燥熱爲方。不知權變。寧不悞人。

或曰氣上升者皆用黑錫丹養正丹養氣丹等藥以爲鎮墜然服之者隨手得效吾子以爲熟甚之病亦將有悞耶

予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火出於天造厥陽者此經所謂一水不勝五火之火出於人欲氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今人欲借丹劑之重墜而降之氣鬱爲濕痰丹性熱燥濕痰被劫亦爲暫開所以清快丹毒之發偏助狂火陰血愈

滔滔他刀之切音
叨水大貌

耗其升愈甚俗人喜溫迷而不返彼此禍者滔滔皆是

或曰丹藥之墜欲降而升然則如之何則可

予曰投以辛涼行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升之有先哲格言其則不遠吾不及贅

或曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時

津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熟故

從火化。遂作酸味。非熱而何。其有積之於久。不能自涌而出。伏於肺胃之間。咯不得上。噫不得下。肌表得風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺心。肌表溫暖。腠理開發。或得香熱湯丸。津液得行。亦得暫解。非寒而何。素問言。熟者。言其本也。東垣言。寒者。言其末也。但東垣不言外得風寒。而作收氣立說。欲瀉肺金之實。又謂寒藥不可治酸。而用安胃湯加減。二陳湯俱犯丁香。且無治熱濕鬱積之法。爲未合經意。予嘗治吞酸。用黃連茱萸。各製炒。隨時令迭爲佐使。蒼朮茯苓爲主病。

確牒於葉功音

上声微病

湯浸炊餅爲小丸。吞之仍教以粗食蔬菜。自養則病易安。

或曰。蘇合香丸雖是類聚香藥。其治骨蒸癰疆月閉狐狸等病。吾予以爲然乎。

予曰。古人製方用藥羣隊者。必是攻補兼施。彼此相制。氣味相次。孰爲主病。孰爲引經。或用正治。或用反佐。各有意義。今方中用藥一十五味。除白朮硃砂阿魏。共六兩。其餘一十二味。共二十一兩。皆是性急輕竄之劑。往往用之於氣病。與暴仆昏昧之人。其衝突。

經絡漂蕩氣血如摧枯拉朽然不特此也。至如草豆蔻散教人於夏月濃煎以代熟水。夫草豆蔻性大熱去寒邪。夏月有何寒氣而欲多服。縮脾飲用草果亦是此意。且夏食寒所以養陽也。草豆蔻草果其食寒之意乎。不特此也。抑又有甚者焉。接氣丹曰。陽氣暴絕。當是陰先虧。陰先虧則陽氣無所依附。遂致飛越而暴絕也。上文乃曰。陰氣獨盛。陰氣若盛。陽氣焉有暴絕之理。假令陽氣暴絕。宜以滋補之劑保養而鎮靜之。庶乎其有合。夏食寒以爲養陽之本。何至又服。

辛香燥熱之劑乎。且此丹下咽。暴絕之陽果能接乎。孰爲是否。君其算之。

或曰。局方言。陰盛。陰邪盛也。陰邪既盛。陽有暴絕之理。子之所言。與陽氣相對待之陰也。果有陰虧而陽絕者。吾子其能救之乎。

予曰。陰陽二字。固以對待而言。所指無定在。或言寒熱。或言血氣。或言臟腑。或言表裏。或言動靜。或言虛實。或言清濁。或言奇偶。或言上下。或言正邪。或言生死。或言左右。求其立言之意。當是陰鬼之邪耳。陰鬼

爲邪自當作邪鬼治之。若陰先虧而陽暴絕者，嘗治一人矣。浦江鄭兄年近六十，奉養受用之人也。仲夏久患滯下，而又犯房勞。忽一晚正走廁間，兩手舒散，兩眼開而無光，尿自出汗如雨，喉如拽鋸，呼吸甚微。其脉大而無倫次，無部位可畏之甚。余適在彼急念，煎人參膏，且與灸氣海穴艾炷，如小指大至十八壯。右手能動，又三壯唇微動，參膏亦成，遂與一盞至半夜後盡。三盞眼能動盡一斤方能言而索粥盡五斤而利止。十斤而安。

或曰：諸氣諸飲，與嘔吐吞酸膈噎反胃等證，局方未中肯綮，我知之矣。然則要略之方，果足用乎？抑猶有未發者乎？

予曰：天地氣化無窮，人身之病亦變化無窮。仲景之書，載道者也。醫之良者，引例推類，可謂無窮之應用。借令略有加減修合，終難踰越矩度。夫氣之初病也，其端甚微。或因些少飲食不謹，或外冒風雨，或內感七情，或食味過厚，偏助陽氣，積成膈熱；或資稟充實，表密無汗，或性急易怒，火炎上以致津液不行，清濁

相干。氣爲之病。或痞或痛。不思食。或噫腐氣。或吞酸。或嘈雜。或膨滿。不求原本。便認爲寒。遽以辛香燥熱之劑。投之數貼。時暫得快。以爲神方。厚味仍前。不節七情。反復相仍。舊病被劫。暫開濁液。易於攢聚。或半月。或一月。前證復作。如此延蔓。自氣成積。自積成痰。此爲痰爲飲。爲吞酸之由也。良工未遇繆藥。又行痰。挾瘀血。遂成窠囊。此爲痞爲痛。嘔吐爲噎膈。反胃之次第也。飲食湯液滯泥。不行。滲道蹇澁。大便或秘。或溏。下失傳化。中焦愈停。醫者不察。猶執爲冷翻。思前。

藥隨手得快。至此賓主皆恨。藥久燥熱。願伺久服。可以溫脾壯胃。消積行氣。以冀一旦豁然之效。不思胃爲水穀之海。多血多氣。清和則能受。脾爲消化之氣。清和則能運。今久得香熟之偏。助氣血沸騰。其始也。胃液凝聚。無所容受。其久也。脾氣耗散。傳化漸遲。其曰虛。而積寒。非尋常草木可療。徑以烏附。佐丹劑。專意服餌。積而久也。血液俱耗。胃脘乾槁。其槁在上。近咽之下。水飲可行。食物難入。間或可入。亦不多。名

之曰噎。其槁在下。與胃爲近。食雖可入。難盡。入胃良久。復出。名之曰膈。亦曰反胃。大便秘少。若半矢。然名雖不同。病出二體。要略論飲有六。曰痰飲。懸飲。溢飲。支飲。留飲。伏飲。分別五臟。諸證治法。至矣盡矣。第恨醫者不善處治。病者不守禁忌。遂使藥助病邪。展轉深痼。去生漸遠。深可哀憫。

或曰。千金諸方治噎膈反胃。未嘗廢薑桂等劑。何吾子之多言也。

予曰。氣之鬱滯。久留清道。非借香熱。不足以行。然悉

有大黃。石膏。竹茹。芒硝。澤瀉。前胡。朴硝。茯苓。黃芩。蘆根。括蔞等藥爲之佐使。其始則同。其終則異。病邪易伏。其病自安。

或曰。胃脘乾槁者。古方果可治乎。將他有要捷之法者。或可補前人之未發者乎。

予曰。古方用大參以補肺。御米以解毒。竹瀝以清痰。乾薑以養血。粟米以實胃。蜜水以潤燥。薑以去穢。正是此意。張雞峯亦曰。噎當是神思間病。惟內觀自養。可以治之。此言深中病情。而施治之法。亦爲近理。夫

嘯病生於血乾夫血陰氣也。陰主靜，內外兩靜，則臟腑之火不起，而金水二氣有養。陰血自生，腸胃津潤。傳化合宜，何嘯之有？因觸類而長，曾製一方治中。年婦人以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿飲以防其或生蟲也。與數十貼而安。又台州治一匠者年近二十勤於工作而有艾妻且喜酒其面白其脉濇重當作三十五歲作十七歲則大而無力乃令謝去工作臥於牛家取新溫牛乳細飲之每頓盡一杯一晝夜可飲五七次盡卻食物以漸而至八九次半月大便

潤月餘而安然。或曰口乾蓋酒毒未解間飲甘蔗汁少許

或曰古方之治嘯膈反胃未有不言寒者子何不思之甚

予曰古人著方必爲當時抱病者設也。其人實因於寒故用之而得效後人遂錄以爲矜式不比局方泛編成書使天下後世之人凡有此證者率遵守之以爲定法而專以香熱爲用也雖然挾寒者亦或有之但今人之染此病率因痰氣久得醫藥傳變而成其

爲無寒也明矣。

或曰。治脾胃以溫補藥。豈非局方之良法耶。吾子其將何以議之。

予曰。衆言淆亂。必折諸聖。切恐脾胃有病。未必皆寒。觀其養脾丸。治脾胃虛冷。體倦不食。嘉禾散。治脾胃不和。不能多食。消食丸。治脾胃俱虛。飲食不下。小獨聖丸。治脾胃不和。不思飲食。大七香丸。治脾冷胃虛。不思飲食。連翹丸。治脾胃不和。飲食不下。分氣紫蘇飲。治脾胃不和。木香餅子。治脾胃虛寒。溫中良薑丸。

曰溫脾胃。奪命抽刀散。曰脾胃冷。燒脾散。曰脾胃虛。進食散。曰脾胃虛冷。不思飲食。丁香煮散。曰脾胃虛寒。二薑丸。曰養脾溫胃。薑合丸。曰脾胃久虛。蓬煎丸。曰脾胃虛弱。守金丸。曰脾胃虛冷。集香丸。曰脾胃不和。蟠蔥散。曰脾胃虛冷。壯脾丸。曰脾胃虛弱。人參丁香散。曰脾胃虛弱。人參煮散。曰脾胃不和。丁沉透膈湯。曰脾胃不和。丁香五套丸。曰脾胃虛弱。臍肭臍丸。之壯氣暖腎。鬼絲子丸。之治腎虛。金欽石斛丸。之治氣不足。茴香丸。之治臟虛冷。玉霜丸。之治氣虛。安腎。

丸之治腎積寒。麝香鹿茸丸之益氣養正丹之治諸虛。朴附丸之治脾胃虛弱。接氣丹之治真氣虛。四神丹之治五臟。沉香鹿茸丸之治氣不足。椒附丸之溫五臟。蕤柏大補丸之治元臟元氣虛。鍾乳白澤丸之治諸虛。三建湯之治氣不足甚者。類聚丹劑悉曰補脾胃溫。脾胃補腎。補五臟。補真氣而各方條下。曰舌苦。曰面黃。曰舌苦無味。曰中酒吐酒。曰酒積。曰酒癆。曰飲酒多。曰酒過傷。曰氣促喘急。曰口淡。曰舌澀。曰噫醋。曰舌乾。曰溺數。曰水道澁痛。曰小便出血。曰口

苦。嘔咽乾。曰氣促。曰盜汗。曰失精。曰津液內燥。曰氣上衝。曰外腎痒。曰枯槁失血。曰口唇乾燥。曰喘滿。曰肢體煩疼。曰衄血。曰小便淋瀝。悉是明具熟證。如何類聚燥熱。而謂可以健脾溫胃。而滋腎補氣乎。經曰。熱傷脾。常服燥熱。不傷脾乎。又曰。腎惡燥。多服燥熱。寧不傷腎乎。又曰。熱傷元氣。久服燥熱。寧不傷氣乎。又曰。用熟遠熟。又曰。有熟者寒。而行之。此教人用熟藥之法。蓋以熟藥治寒病。苟無寒藥爲之嚮導。佐使。則病拒藥。而扞格不入。謂之遠熟者。行之以寒也。

兩句同一意。恐後人不識此理。故重言以明之。今局方辛香燥熱。以類而聚之。未嘗見其所謂遠熱也。用熟而不遠熱。非惟不能中病。抑且正氣先傷。醫云乎哉。夫良醫之治病也。必先求其得病之因。其虛邪也。當治其母。實邪也。當治其子。微邪也。當治其所勝。賊邪也。當治其所不勝。正邪也。當治其本。經索矩。又謂雜合受邪病者。所受非止一端。又須察其有無雜合之邪。輕重較量。視標本之緩急。以爲施治之先後。念乃一切認爲寒冷。吾不知脾胃與腎。一向只是寒冷。

爲病耶。論方至此。雖至愚昧。不能不致疑也。吾又攷之。要略矣。諸嘔吐穀不得入者。小半夏湯主之。痘病寒熱不食。食則頭眩。心胃不安者。茵陳湯主之。身腫而冷。胷窒不能食者。病在骨節。發汗則安。心胃停痰。吐水虛滿不能食者。茯苓湯主之。中風手足拘急。惡寒不欲飲食者。三黃湯主之。下利不欲飲食者。大承氣湯主之。五勞虛極。羸瘦不能食者。大黃䗪虫丸主之。虛勞不足。汗出而悶。脉結心悸者。炙甘草湯主之。虛勞腰痛。小腹拘急者。八味丸主之。虛勞不足者。大薯

詒
羊國功音
裕上声寬

讀丸主之虛勞虛煩不得眠者酸棗仁湯主之夫嘔者胃滿者吐水者下利者惡寒者腫而冷者不能飲食者虛勞羸瘦者虛勞汗而慄者虛勞而腰痛者虛勞不足者虛勞煩而不眠者自局方之法觀之寧不認爲寒冷而以熱藥行之乎仲景施治則不然也疾者導之熟者清之積者化之濕者滲之中氣清和自然安裕虛者補之血凝者散之躁者寧之熟者和之陰氣清寧何虛勞之有也

或曰傷寒一門雖取雜方仲景之法亦摘取之矣

吾子其忘言乎

予曰傷寒之法仲景而下發明殆盡局方是否愚不必贅雖然仲景論傷寒矣而未及乎中寒先哲治冒大寒而昏中者用附子理中湯而安其議藥則得之矣曰傷曰中未聞有議其異同之者予俛而思之傷寒有卽病有不卽病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒感受其病卽發而暴傷寒之人因其舊有鬱熱風寒外束肌腠自密鬱發爲熱其初也用麻黃桂枝輩微表而安以病體不甚虛也中寒之

人乘其腠理疎豁。丁身受刑難分經絡無熟可發溫補自解此謂氣之大虛也。傷寒熱雖甚不死中寒若不急治去生甚遠其虛實蓋可見矣。

或曰脾胃二門子以局方用藥太熱未合經意。若平胃散之溫和可以補養胃氣吾子以爲何如。予曰蒼朮性燥氣烈行濕解表甚爲有力厚朴性溫散氣非脹滿實急者不用承氣用之可見矣。雖有陳皮甘草之甘緩甘辛亦是決裂耗散之劑實無補土之和經謂土氣太過曰敦阜亦能爲病况胃爲水穀

之海多氣多血故因其病也用之以瀉有餘之氣使之平爾又雖察其挾寒得寒物者投之胃氣和平便須卻藥謂之平者非補之之謂其可常服乎。

或曰調胃承氣亦治胃病謂之調者似與平胃散之平意義相近何用藥之相遠也。

予曰調胃承氣治熱中下二焦藥也經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘功在乎導利而行之以緩平胃散止治濕上焦之藥也經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲效而止。

或曰。治濕不利小便。非治也。非仲景法耶。何子言之悖也。

予曰。淡滲治濕。以其濕在中下二焦。今濕在上。宜以微汗而解。不欲汗多。故不用麻黃乾葛輩。

或曰。局方用藥多是溫補。或以爲未合中道。積熱痼冷二門。其制作其取用。吾子其無以議之矣。

予曰。張仲景言一百八病。五勞六極七傷。與婦人共三十六病。孫真人言四百四病。凡遇一病。須分寒熱。果寒邪。則熟之。果熱邪。則寒之。寒熱甚邪。則反佐。而

制之。今列病之目。僅十有餘。而分積熱痼冷兩門。何不思之甚也。要略中風。脈緊爲寒。浮爲虛。肺痿吐涎。不能飲。不渴。必遺溺。此爲肺中冷。甘草乾薑湯溫之。腹滿痛。時減如故。此爲寒。宜溫之。下利欲嚏不能。此腹中寒也。脇下偏痛。脉弦緊。此寒也。宜大黃附子細辛湯溫之。痰飲脉雙弦者。寒也。黃疸發熱煩喘。膾滿口燥。又被火劫其汗。病從濕得。身盡熱而黃。此熱在內。宜下之。下利脉數。而渴。設不差。則清膾血。以其有熟也。婦人能食病。七八日而更發熱者。此爲胃實氣。

熟宜大承氣下之。產後七八日。若太陽證小腹堅滿。此惡露不盡。不大便。四五日發熱。晡時煩燥。食則妄言。此熱在裏。結在膀胱。宜大承氣利之。安婦人或中風。或傷寒。經水適來。適斷。有寒熱。皆爲熱入血室。今局方不曾言病。而所謂寒與熱者。其因何在其。病何名。果無雜合。所受邪果無時。令資稟之當擇耶。據外證之寒熱。而遂用之。果無認假。爲真耶。果以是爲非耶。

或曰。以寒熱爲篇目。固未合經意。若其諸方果有

合乎。

予曰。以積熱爲篇目。固有可議。若諸方之制作取用。儘有妙理。吾其爲子發明前人之意。恐可爲用。方者。涓埃之助。夫紫雪者。心脾肝腎脾胃經之藥也。通中散。洗心散。表裏血氣之藥也。涼膈散。心肺脾胃之藥也。龍腦飲子。勝冰丹。真珠散。靈液丹。上中二焦之藥也。碧雪雞蘇丸。三黃丸。八正散。三焦藥也。甘露丸。心脾肝之藥也。涼膈丸。心脾胃之藥也。抱龍丸。麥門冬散。心肺肝之藥也。妙香丸。疏快腸胃。制伏木火藥也。甘

露飲心肺胃藥也。五淋散血而裏藥也。消毒飲氣而表藥也。麻仁丸氣而裏藥也。導赤丸氣與血而裏藥也。導赤散心小腸藥也。有升有降。有散有補。有滲導。有驅逐。有因用。有引經或緩之以甘。或收之以酸。或行之以香。或因之以蠟。或燥之以苦。觀其立方各有所主。用方之人宜求其意。若夫痼冷門尤有可議者。冷卽寒也。內經以寒爲殺厲之氣。今加痼於冷之上。豈非指身惡寒而口喜熱之病耶。若以此外證便認爲痼冷。宜乎夏英公之常餌烏附。常御綿帳。不知濕

痰積中抑遏陽氣。不得外泄。身必惡寒。經曰。亢則害承。乃制。又劉河間曰。火極似水。故見此證。當治以鹹寒。佐以甘溫。視標本之先後。正邪之虛實。孰緩孰急。爲之治法。何至類用烏附丹劑。僭燥之藥。抱薪救火。屠劙何異。古人治戰慄。有以大承氣湯下之而愈者。惡寒戰慄。明是熱證。亦有因久服熟藥而得之者。但有虛實之分耳。進士周本道年近四十。得惡寒證。服附子數日。而病甚。求余治。診其脉弦而似緩。遂以江茶入薑汁。香油些少。吐痰一升許。減綿大半。又與通

聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百餘貼而安。又
一色自婦人年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜啖
熟御綿多汗如雨其形肥肌厚已得附子三十餘但
渾身痒甚兩手脈沉濇重取稍大知其熱甚而血虛
也以四物湯去川芎倍地黃加白朮黃芪炒藥生甘
草人參每貼二兩重方與一貼腹大泄目無視口無
言予知其病熱深而藥無反佐之過也仍取前藥熟
炒與之蓋借火力爲嚮導一貼利止四貼精神回十
貼病全安又蔣氏婦年五十餘形瘦面黑六月喜熱
貼

惡寒兩手脈沉而濇重取似數以三黃丸下以薑汁
每三十粒三十貼微汗而安彼以積熱痼冷爲敘方
之篇目其得失可知矣

泄痢一門其用鍾乳健脾丸朝真丸駐車丸訶梨勒
丸大溫脾丸黃連阿膠丸胡粉丸桃花丸訶梨勒散。
木香散七棗湯赤石脂散養臟湯御米湯金粟湯狗
頭骨丸豆蔻丸肉豆蔻散三神丸丁香豆蔻散止瀉
丸皆用熟藥爲主治以澁藥爲佐使當爲腸虛感寒
而成滑痢者設也彼瀉痢者將無熟證耶將無積滯

耶。內經曰。春傷於風。夏爲膿血。多屬滯下。夫瀉痢證。其類尤多。先賢曰。濕多成瀉。此確論也。曰風曰濕。固不可得而通治矣。况風與濕之外。又有雜合受邪。似難例用瀉熱之劑。今方中書證有兼治裏急者。有兼治後重者。有兼治裏急後重者。此豈非滯下之病乎。今瀉痢與滯下。袞同論治實實虛虛之患。將不俟終日矣。

或曰。然則瀉痢與滯下爲病不同治法亦別。吾子其能通之乎。

予曰。經曰。暴注下迫。皆屬於熱。又曰。暴注屬於火。又下痢清白。屬於寒。熱君火之氣。火相火之氣。寒水之氣。屬火熱者二。屬水寒者一。瀉痢一證。似乎屬熱者多。屬寒者少。詳玩局方專以熱瀉爲用。若用之於下痢清白。而屬於寒者斯可矣。經所謂下迫者。卽裏急後重之謂也。其病屬於火。相火所爲。其毒甚於熱也。投以瀉熱。非殺之而何。謹按仲景之法。謂下痢脉滑。而數者。有宿食。當下之。下痢脉遲。而滑者。實也。痢爲未止。急下之。下痢脉反滑。當有所去。下之安。下痢不

東垣一書 卷一
欲食有宿食者當下之。下痢腹滿痛爲寒爲實。當下之。下痢腹堅實當下之。下痢譴語有燥矢。當下之下痢三部皆平。按之心下堅急下之。下痢已差至其時復發者此爲下未盡更下之安。下痢脉大浮弦下之當自愈。風寒下者不可下。後心下堅痛脉遲此爲寒宜溫之。脉浮大此爲虛強下之故也。設脉浮革者因而腸鳴當溫之下。痢脉遲緊痛未欲止當溫之下。痢心痛急當救裏可與理中四逆附子輩下痢大孔痛宜溫之。觀仲景可下者十法可溫者五法謂之下。

者率用承氣加減。何嘗用砒丹巴硝。决烈燥熱重毒之劑。謂之溫者率用薑附爲主。何嘗用鍾乳龍骨石脂粟殼。緊澁燥毒之劑。

或曰可下者豈非腸胃有積滯乎。不用砒丹巴硝恐積滯未易行也。吾子以爲不然。幸發明承氣之意可乎。

予曰太黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快無所留滯。積行卽止。砒丹巴硝毒熱類聚劑成丸藥其氣

歇瘡有宿食者。當下之。下痢腹滿痛爲寒爲實。當下凶暴其體重滯積垢雖行。毒氣未過。譬如強暴貪賊手持兵力。其可使之徘徊顧瞻於堂奧間乎。借使有愈病之功。其腸胃清淳之氣能免。旁損暗傷之患乎。仲景治痢可溫者溫。可下者下。或解表。或利小便。或待其自己區別易治。難治不治之證。至爲詳密。然猶與滯下。表同立方。命論其後劉河間分別在表。在裏。挾風挾濕。挾熱。挾寒。挾虛。明著經絡。隄防傳變。大槩發明。滯下。證治尤爲切要。行益。則便膿自安。調氣。則後重自除。此實盲者之日月。聾者之雷霆也。

或曰局方治法將終不能彷彿仲景之方耶

予曰圓機活法。內經具舉。與經意合者。仲景之書也。仲景因病以製方。局方製葉以俟病。若以何其能彷彿也。宋命近臣讎校方書。彼近臣者。術業素異。居養不同。專知爲醫之事哉。雖然知尊仲景矣。亦未嘗不欲效之也。徒以捧心效西施爾。觀桃花丸一方。可見矣。卽要畧桃花湯也。仲景以治便。腰血用赤石脂。完者乾薑梗米同煮作湯。一飲病安。便止。後茱萸謂病屬下焦。血虛。且寒。非乾姜之溫。石脂之澁。且重。不能

欽定四庫全書

東坡集卷之二

止血粳米味甘引入腸胃不使重滯之體少有疑滯故煮成湯夜來行易散餘毒亦無局方不知深意不造妙理但取易於應用喜其性味溫補借為止滯良方改為丸茱萸以麵糊日與三服其果能與仲景之意合也

或曰河間之言滯下似無挾虛挾寒者然乎否乎幸明以告我

予曰泄利之病水穀或化或不化並無怒責惟覺困倦苦滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或

憤乃老切音體
有形恨痛
又事物接宦

無糟粕或糟粕相混雖有痛不痛大痛之異然皆裏急後重逼迫惱人攷之於經察之於證似乎皆熟證實證也余近年涉歷亦有大虛太寒者不可不知敢筆其略以備采覽余從叔年踰五十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重頻併穀食大減時有微熱察其脉皆弦而濶似數而稍長却喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減余曰此非滯下憂慮所致心血虧脾氣弱耳遂與參术爲君當歸身陳皮爲臣川芎炒白芍藥茯苓爲佐使時暄熱甚加少黃連與兩日而

安梅長官年三十餘。奉養厚者。夏秋間患滯下。腹大痛。有人教服單煮乾薑。與一貼。痛定。少頃又作。又與。又定。由是服乾薑至二斤。八日後予視之。左脉弦而稍大。似數。右脉弦而稍大。減亦似數。重取之似緊。予曰。此必醉飽後喫寒涼太過。當作虛寒治之。因其多服乾薑。遂教四物湯去地黃。加入參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎入生薑汁飲之。至一月而安。金氏婦。年近四十。秋初尚熟。患滯下。腹但隱痛。夜重於晝。全不得睡。食亦少減。口乾不飲。已得治痢靈砂二貼矣。

余視之。兩手脉皆濇。且不匀。神思倦甚。飲食全減。因與四物湯倍加白朮爲君。以陳皮佐之。與十數貼而安。此三病者。若因其逼迫而用峻劑。豈不悞人。

或曰。局方諸湯可以清痰。可以消積。可以快氣。可以化食。口鼻既宜。胃膈亦綠。平居無事。思患預防。非方之良者乎。

予曰。清香美味。誠足快意。揆之造化。恐未必然。經曰。陰平陽秘。精神乃治。氣爲陽。宜降。血爲陰。宜升。丁升一降。無有偏勝。是謂平人。今觀諸湯。非豆蔻縮砂乾

薑良薑之辛宜於口。非丁香沉檀蘇桂之香宜於鼻。和以酸鹹甘淡其將何以悅人。奉養之家。閑佚之際。主者以此爲禮賓朋以此取快。不思香辛升氣漸至。於散積溫成熟漸至鬱火。甘味戀膈漸成中滿。脾主中州。本經自病。傳化失職。清濁不分。陽亢於上。陰微於下。謂之陰平可乎。謂之陽秘可乎。將求無病適足。生病將求取樂。反成受苦。經曰久而增氣。物化之常。氣增而久天之由也。其病可勝言哉。

或曰。舍利別。非諸湯之類乎。其香辛甘酸殆有甚

焉。何言論弗及也。

予曰。謂之舍利別者。皆取時果之液煎熬如鶴而飲。乏稠之甚者。調以沸湯。南人因名之曰煎味。雖甘美。性非中和。且如金櫻煎之縮小便。杏煎楊梅煎蒲桃煎櫻桃煎之發胃火。積而至久。濕熱之禍。有不可勝言者。僅有桑椹煎無毒可以解渴。其餘味之美者。並是嬉笑作罪然乎否乎。

或曰。婦人一門。無非經候胎產帶下。用藥溫緩。於理頗通。吾子其無忘言乎。

予曰。婦人以血爲主。血屬陰。易於虧欠。非善調攝者。不能保全也。餘方是否。姑用置之。若神仙聚寶丹。則有不能忘言者。其方治血海虛寒。虛熱盜汗。理宜補養。琥珀之燥麝香之散。可以用乎。面色痿黃。肢體浮腫。理宜導濕。乳香沒藥。固可治血。可以用乎。胎前產後虛實不同。逐敗養新。攻補難並。積塊堅癥。亦自崩漏。宜於彼者必妨於此。而欲以一方通治乎。世人以其貴細溫平。又喜其常服。可以安神去邪。令人有子。殊不知積溫成熟。香竈散氣服者無不被禍。自非五

臓能言。醫者終不知覺。及至變生他病。何曾歸咎此丹。余姪女形色俱實。以得予之遲。服此藥。背上發癰。證候甚危。余診其脉。散大而濶。急以加減四物湯。百餘貼。補其陰血。幸其質厚。易於收救。質之薄者。悔將何及。若五積散之治產後餘血作痛。則又有不能忘言者。以蒼朮爲君。麻黃爲臣。厚朴枳殼爲佐。雖有守藥。當歸之補血。僅及蒼朮三分之一。且其方中。言婦人血氣不調。心腹撮痛。閉而不行。并宜服之。何不思產後之婦。有何寒邪。血氣未充。似難發汗。借曰推陳。

致新藥性溫和。豈可借用麻黃之散。附以蒼朮枳朴。虛而又虛。禍不旋踵。卒不。用藥不思之甚。

或曰。初產之婦。好血已虧。瘀血尚留。黑神散非要藥歟。

予曰。至哉坤元。萬物資生理之常也。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥爲。飲食起居勤加調護。何病之有。誠有汚血體怯而寒。與之數貼。亦自簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。凝者行之。虛

者補之。血多者止之。何用海製此方。不恤無病生病。彼黑神散者。用乾薑當歸之溫熱。黑豆之甘。熟地黃之微寒。以補血之虛。佐以炒蒲黃之甘。以防出血之多。芍藥之酸寒。有收有散。以爲四藥之助。官桂之大辛。熱以行滯氣。推凝血。和以甘草之緩。其爲取用。似乎精密。然驅逐與補益似難。同方施治。設有性急者。形瘦者。本有怒火者。夏月坐蓐者。時有火令。薑桂皆爲禁藥。論語未達之戒。不知誰執其咎。至於將護之法。尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲

具有訓戒。胡爲以羊雞濃汁作糜。而又常服。當歸丸。
當歸建中湯。四順理中丸。雖是滋補。悉犯桂附乾薑。
僭熟之劑。臟腑無寒。何處消受。若夫兒之初生。母腹
頓寬。便啖雞子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。
展轉爲病。醫者不識。每指他證率爾用藥。寧不悞人。
予每見產婦之無疾者。必教以却去黑神散。與夫雞
子火鹽諸般肉食。且與白粥將理。間以些少石首鯉。
煮令甘淡食之。至半月以後。方與少肉。若雞子亦須
豁開淡煮。大能養胃。郤疾彼富貴之家。驕恣之婦。卒

有白帶。頭風氣痛。膈滿痰逆。口乾經水不調。髮脫體
熱。皆是陽勝陰虛之病。夫人生血氣。本自和平。曰勝曰
虛。又焉知非此等繆妄。有以啓之耶。

局方發揮卷之一

正反語錄題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋
蘇東坡題跋

