


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



133  
5

脾胃論卷之四

元

鎮州 東垣李

杲明之甫撰

明

吳郡 立齋薛

已新甫父校

○陽明病溼勝自汙論

或曰。溼之與汙。陰乎陽乎。曰。西南坤土也。脾胃也。人之汙。猶天地之雨也。陰滋其溼。則爲霧露爲雨也。陰溼寒下行之地氣也。汙多。則亡陽。陽去。則陰勝也。甚爲寒中。溼勝。則音聲如從瓮中出。溼若中水也。相家有說。土音如居深瓮中。言其壅也。遠也。不出也。其爲

溼審矣。又知此二者。一爲陰寒也。內經曰。氣虛則外寒。雖見熱中。蒸蒸爲汗。終傳太寒。知始爲熱中。表虛。云陽不在外寒。終傳寒中。多成痺寒矣。色以候天。脈以候地。形者乃候地之陰陽也。故以脉氣候之。皆有形無形可見者也。

調衛湯

治溼勝。自汗。補衛氣虛弱。表虛。不任外寒。  
蘇木 元 紅花 已上各一分 猪芩 二分  
麥門冬 四 生地黃 已上各三分 半夏 湯洗七次

生黃芩 當歸梢 已上各五分  
羌活 七分 麻黃根 黃耆 已上各一錢  
五味子 七枚

右㕮咀如麻豆大作二服。水一盞煎至一盞去粗  
稍熟服。中風證必自汗。汗多不得重發。汗故禁麻  
黃而用根節也。

○溼熱成瘧。肺金受邪論

六七月之間。溼令大行。子能令母實。而熱旺。溼熱相  
合。而刑庚。大腸。故寒涼以救之。燥金受溼熱之邪。絕

寒水生化之源。源絕則腎虧。痿厥之病大作。腰已下  
痿軟癱瘓。不能動行。走不正。兩足欹側。以清燥湯主  
之。

清燥湯

- 黃連去鬚 潛黃蘢 柴胡已上各一分  
麥門冬去心 當歸身 生地黃  
炙甘草去心 猪苓 麴已上各二分  
人參去皮 白茯苓 升麻已上各三分  
橘皮 白朮 澤瀉已上各五分

助陽和血補氣湯

治眼發後。上熱壅白。睛紅多眵。淚無疼痛而癰澀。  
難開。此服苦寒藥太過。而真氣不能通。九竅也。故  
眼昏花不明。宜助陽和血補氣。  
香白芷二分 蔓荆子三分 炙甘艸  
當歸身酒洗 柴胡已上各五分 升麻

防風已上各七分黃蓍一錢

右咬咀都作一服水一盞半煎至一盞去粗熟服入臨臥避風處睡忌風寒及食冷物

升陽湯

治一日大便三四次溏而不多。有時泄瀉腹中鳴小便黃

去柴胡

益智仁

當歸身

本橘皮已上各三分

升麻六分

甘艸二錢

黃蓍

三錢

紅花少許

右咬咀分作二服。每服水二大盞煎至一盞去粗稍熟服。

升陽除溼湯

治脾胃虛弱。不思飲食。腸鳴腹痛泄瀉無度。小便黃。四肢困弱。

甘艸

大麥蘖麪

如胃寒腹鳴者加

陳皮

猪苓已上各三分

澤瀉

益智仁

半夏

防風

神麴

升麻

柴胡

羌活

已上各五分

蒼朮

一錢

右咬咀。作二服。水三太盞。生薑三片。棗一枚。同煎至一盞。去粗。空心服。

益胃湯

治頭悶勞動。則微痛。不喜飲食。四肢怠惰。躁熱短氣。口不知味。腸鳴太便。微溏黃色。身體昏悶。口乾不喜食冷。

甘草

半夏二分

黃芩

柴胡水二太盞

人參

益智仁

白朮三分

各

當歸梢

陳皮

升麻三分

各

蒼朮一分

右咬咀。作二服。水二太盞。煎至一盞。去粗。稍熟。服

食前。忌飲食失節。生冷硬物。酒溼麪。

生薑和中湯

治食不下。口乾虛渴。四肢困倦。

生甘艸

炙甘艸一分

酒黃芩

柴胡

橘皮二分

升麻三分

人參

葛根

藁本

白朮

已上各  
五分

羌活

七分

蒼朮

一錢

生黃芩

二錢

右㕮咀作一服水二盞。生薑五片。棗三枚。擘開同煎至一盞去粗稍熱服之。食前。

強胃湯

治因飲食勞役所傷。腹脇滿悶短氣。遇春口淡無味。遇夏雖熱而惡寒。常如飽不喜食冷物。

黃芩

甘艸

已上各  
五分

升麻

當歸身

陳皮

已上各  
一錢

生薑

麴

已上各

一錢

艸豆蔻

一錢

半夏

人參

已上各

三錢

黃耆

一錢

右㕮咀每服三錢水二大盞煎至一盞去粗溫服

食前。

溫胃湯

專治服寒藥多致脾胃虛弱。胃脘痛。

人參

甘艸

益智仁

縮砂仁

厚朴

已上各

二分

白豆蔻

乾生薑

澤瀉

薑黃

已上各  
三分

黃耆

陳皮已上各七分

右件爲極細末。每服三錢。水一大盞。煎至半盞。溫服。  
食前。

和中丸

人參

乾生薑

橘紅已上各一錢

乾木瓜二錢

炙甘艸三錢

右爲細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。  
溫水送下。食前服。

藿香安胃散

藿香

丁香

人參已上各二錢五分

橘紅五分

右件四味爲細末。每服二錢。水一大盞。生薑一片。  
同煎至七分。和粗冷服。食前。

異功散

治脾胃虛冷。腸鳴腹痛。自利。不思飲食。

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘皮已上各五分

右爲麤散。每服五錢水二大盞。生薑三片。棗二枚。同煎至一盞。去粗溫服。食前先用數服以正其氣。

○飲食傷脾論

四十九難曰。飲食勞倦則傷脾。又云。飲食自倍。腸胃乃傷。腸澼爲痔。夫脾者。行胃津液。磨胃中之穀。主五味也。胃既傷。則飲食不化。口不知味。四肢倦困。心腹痞滿。兀兀欲吐。而惡食。或爲餐泄。或爲腸澼。此胃傷。脾亦傷明矣。大抵傷飲傷食。其治不同。傷飲者無形。之氣也。宜發汗利小便。以導其溼。傷食者有形之物。

也輕則消化。或損其穀。此最爲妙也。重則方可吐下。今立數方。區分類析。以列于後。

五苓散

治煩渴飲水過多。或水入卽吐。心中淡淡。停溼在內。小便不利。

桂一兩

茯苓

猪苓

白朮已上各一兩

澤瀉二兩

五錢

右爲細末。每服一錢。熟湯調服。不拘時候。服訖多飲熱湯。有汗出卽愈。

○如瘀熱在裏。身發黃。濃煎茵陳湯調下。食前服之。

○如癰發渴及中暑引飲亦可用水調服。

○論飲酒過傷。

夫酒者。大熱有毒氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。止當發散汗出。則愈矣。其次莫如利小便。二者乃上。下分消其溼。今之酒病者。往往服酒癥丸。太熱之藥。下之又有用牽牛大黃下之者。是無形元氣受病。反。下有形陰血。乖悞甚矣。酒性太熱。以傷元氣而復重。

濕之。况亦損腎水。真陰及有形陰血。俱爲不足。如此。則陰血愈虛。真水愈弱。陽毒之熱大旺。反增其陰火。是以元氣消止。折入長命。不然。則虛損之病成矣。酒。殫下之。久久爲黑癰。慎不可犯。以葛花解醒湯主之。葛花解醒湯。

治飲酒太過。嘔吐痰逆。心神煩亂。胸膈痞塞。手足戰搖。飲食減少。小便不利。

蓮花青皮去穰三分

木香五分

橘皮去白

人參去蘆

猪苓去黑皮

白茯苓已上各一錢半

神麴炒黃色

澤瀉

乾生薑

白朮已上各二錢

白豆蔻仁

葛花

砂仁已上各五錢

右爲極細末，秤和勻。每服三錢七白湯調下。但得微汗，酒病去矣。此蓋不得已而用之，豈可恃賴。日飲酒，此方氣味辛辣，偶因酒病服之，則不損元氣，何者？敵酒病也。

枳朮丸

治痞，消食，強胃

枳實

麸炒去穰一兩

白朮二兩

右同爲極細末，荷葉裏燒飯爲丸。如梧桐子大，每服五十丸。多用白湯下，無時。白朮者，本意不取其食速化，但令人胃氣強，不復傷也。

橘皮枳朮丸

治老幼元氣虛弱，飲食不消，臟腑不調，心下痞悶。

枳實

麸炒去穰

橘皮一兩

白朮二兩

右件爲細末，荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大，每服五十九。溫水送下，食遠。夫內傷用藥之大法，所貴服

東坡先生集 卷四  
乏強人胃氣。令胃氣益厚。雖猛食多食重食。而不  
傷。此能用食藥者也。此藥久久。益胃氣。令不復致  
傷也。

半夏枳朮丸

治因冷食內傷

半夏

湯洗七次焙乾

枳實

炒黃色

白朮

已上各二兩

右同爲極細末。荷葉裹燒飯爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。添服。不妨無定法。如熱湯浸蒸餅爲丸。亦可。

○如食傷寒熱不調。每服加上三黃丸十丸。白湯下。  
○更作一方。加澤瀉一兩。爲丸。有小便淋者用。

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣。消寒飲食。

木香三錢

乾薑炮五錢

枳實一兩

右爲極細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫水送下。食前。

木香人參生薑枳朮丸

開胃進食

乾生薑二錢五分

木香三錢

人參三分五兩

陳皮四錢

枳實一兩炒黃

白朮一兩五錢

右爲細末。荷葉燒飯爲丸。如梧桐子大。每服三十五丸。溫水送下。食前忌飽食。

和中丸

治病久虛弱。厭厭不能食。而臟腑或秘或溏。此胃氣虛弱也。常服則和中理氣。消痰去溼。厚腸胃。進飲食。

木香二錢

枳實炒炒一黃

炙甘艸已上各三錢半

檳榔四錢五分

半夏湯泡七次

厚朴薑製已上各一兩

陳皮八錢去白

白朮二錢一兩

右爲細末。生薑自然汁浸蒸餅爲丸。如梧桐子大。

每服三五十丸。溫水送下。食前或食遠。

交泰丸

升陽氣。瀉陰火。調榮氣。進飲食。助精神。寬腹中。除怠惰。嗜臥。四肢不收。沈困懶倦。

乾薑炮製三分

巴豆霜五分

人參去蘆

肉桂去皮已上各一錢

柴胡去苗

小椒炒去汗并閉口及目

白朮已上各一錢五分 厚朴去皮剉炒秋分加七錢

酒煮苦練

白茯苓

砂仁已上各三錢

川烏頭

泡去皮臍四錢五分

知母

四錢炒一半酒

黃連炒此一味春夏所宜秋冬去之

去鬚秋分減一錢五分

吳茱萸湯洗次五錢

水洗煨去皮弦

紫菀

去苗已上各六錢

右除巴豆霜另入外同爲極細末。煉蜜爲丸如梧桐子大。每服十九溫水送下。虛實加減。

三稜消積丸

丁皮

益智已上各三錢

巴豆

炒和皮米炒黑去米

茴香

炒

陳皮

炮

青橘皮

已上各五錢

京三棱

炮

廣茂

炮

炒麴

已上各七錢

右件爲細末。醋打麴糊爲丸。如梧桐子大。每服十九至二十丸。溫生薑湯送下。食前量虛實加減。得更衣止後服。

備急丹

治心腹百病。卒痛如錐刺。及脹滿不快氣急並治。

乏。

錦紋川大黃爲末乾薑炮爲霜出油

巴豆

泡去皮膜心研如泥

右件三味等分同一處研勺煉蜜成劑日內一杵干百下丸如大豌豆大夜卧溫水下一丸如氣實者加一丸如卒病不計時候服如婦人有孕不可服如所傷飲食在胸膈間兀兀欲吐反覆悶亂以物探吐去之

神保丸

- 治心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通氣噎宿食不消
- 木香 胡椒巴上各一錢五分 巴豆十枚去皮油心膜研
- 乾蝎七枚
- 右件四味爲末湯浸蒸餅爲丸麻子大硃砂三錢爲衣每服五丸
- 如心膈痛柿蒂燈心湯下
- 如腹痛柿蒂煨薑煎湯下
- 如血痛炒薑醋湯下

如腎氣痛。膀胱痛。茴香酒下。

如大便不通。蜜調檳榔末一錢下。

如氣噎。木香湯下。

如宿食不消。茶酒漿飲任下。

雄黃聖餅子

治一切酒食所傷。心腹滿不快。

雄黃五錢

巴豆一百箇去油心膜

白麪十兩重羅過

右件三味內除白麪八九兩餘藥同爲細末。共麪和勻用新水和作餅子。如手大以漿水煮。煮至浮

於水上灑出控旋看硬軟。搗作丸。如梧桐子大。捻作餅子。每服五七餅子。加至十餅十五餅。嚼破。一餅利一行。二餅利二行。茶酒任下。食前。

蠲飲枳實丸

逐飲消痰導滯清膈。

枳實

炒去穰

半夏湯洗

陳皮

去白上各一兩

黑牽牛

八兩內取頭末三兩

右爲細末。水煮麪糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食後生薑湯下。

感應丸

治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷。因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐瘧逆惡心喜唾頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒弊熱藥不效者並悉治之又治久病形羸荏苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘

久新積冷並皆治之

乾薑

炮製一兩

南木香

去蘆

丁香

已上各一兩五錢

百艸霜

二兩

白豆蔻

去皮三

巴豆

去皮心膜十箇油研七十

箇

杏仁

一百四十箇湯浸去皮尖研膏

右七味除巴豆粉百艸霜杏仁三味外餘四味搗爲細末却與三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾去粗更以好酒一升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩於銚

內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就  
鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩  
五錢同煎煮熟作汁和價藥末成劑分作小錠子  
以油單紙裹之旋丸服耳

神應丸

治因一切冷物冷水及漳乳酪水腹痛腸鳴米穀  
不化

丁香

木香已上各

巴豆

杏仁

百艸霜

乾薑已上各

五錢

黃蠟

二兩

右先將黃蠟用好醋煮去粗穢將巴豆杏仁同炒  
黑煙盡研如泥將黃蠟再上火春夏入小油五錢  
秋冬入小油八錢溶開入在杏仁巴豆泥子內同  
攬旋下丁香木香等藥末研勻搓作錠子油紙裹  
了旋丸用每服三五十丸溫米飲送下食前日三  
服大有神效

白朮安胃散

治一切瀉痢無問膿血相雜裹急窘痛日夜無度

又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷。并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止者。

五味子

烏梅取肉炒乾已上各五錢

車前

茯苓

白朮已上各一兩

米殼三兩去頂帶穰

醋煮宿炒乾

右爲末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心

溫服

聖餅子

治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹二錢

定粉

舶上硫黃

蜜陀僧已上各三錢

輕粉少許

右細剉爲末入白麪四錢七滴水和如指尖大捻作餅子陰乾食前溫漿水磨服之太便黑色爲效。當歸和血散

治腸澼下血溼毒下血

川芎

四分

青皮

槐花

荆芥穗

熟地黃升麻已上各一錢

白朮

已上各六分

當歸身

升麻已上各一錢

白朮

已上各六分

右件爲細末。每服二三錢。清米飲湯調下。食前。

訶梨勒丸

治休息痢。晝夜無度。腥臭不可近。臍腹撮痛。諸藥不效。

訶子

五錢去核稱

椿根白皮一兩

母丁香三十箇

右爲細末。醋麪糊丸如梧桐子大。每服五十丸。陳米飯湯入醋少許送下。五更三日三服效。

○脾胃損在調飲食適寒溫。

十四難曰。損其脾者調其飲食適其寒溫。夫脾胃太

腸小腸三焦膀胱。倉廩之本。營之所居。名曰器。能化糟粕。轉味而出入者也。若飲食熟。無灼灼寒。無滄滄。寒溫中適。故氣將持。乃不致邪僻。或飲食失節。寒溫不適。所生之病。或瀉泄無度。或心下痞悶。腹脇脹。口失滋味。四肢困倦。皆傷於脾胃所致。而然也。腸胃爲市。無物不包。無物不入。若風寒暑溼燥。一氣偏勝。亦能傷脾。損胃。觀證用藥者。宜詳審焉。

脾胃右關所主。其脉緩。

如得弦脉。風邪所傷。甘草芍藥湯。黃耆建中湯之

類或甘酸之劑皆可用之。

如得洪脈。熱邪所傷。三黃丸。瀉黃散。調胃承氣湯。  
或甘寒之劑。皆可用之。

如得緩脉。本經太過。溼邪所傷。平胃散。加白朮。茯  
苓。五苓散。或除溼滲淡之劑。皆可用之。

如得濶脉。燥熱所傷。異功散。加當歸。四君子湯。加  
熟地黃。或甘溫甘潤之劑。皆可用之。

如得沈細脉。寒邪所傷。益黃散。養胃丸。理中丸。理  
中湯。如寒甚。加附子。甘熱之劑。皆可用之。

前項所定方藥。乃常道也。如變則更之。

胃風湯

治大人小兒。風冷乘虛。入客腸胃。水穀不化。泄瀉  
注下。腹脇虛滿。腸鳴疼痛。及腸胃溼毒下。如豆汁。  
或下瘀血。日夜無度。竝宜服之。

人參去蘆

白茯苓去皮

芍藥

桂去皮

白朮去粗等分

右爲劑。每服二錢。以水一大盞。入粟米百餘粒。同

煎至七分去粗稍熱服空心食前小兒量力減之

三黃丸

治丈夫婦人子焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不美飲食下焦有熱小便赤澀太便秘結五臟俱熱卽生癰癧瘍瘻及治五般痔疾肛門腫痛或下鮮血黃連去蘆黃芩去蘆大黃已上各

黃連

去蘆

黃芩

去蘆

大黃

已上各一兩

白朮散

治虛熱而渴

人參

去蘆

白朮

白茯苓

去皮

藿香葉

去土

木香

甘艸

炒已上各一兩

乾葛

二兩

右件爲籠末每服三錢至五錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時服如不能食而渴潔古先師倍加葛根如能食而渴當虎湯加人參

服之。

加減平胃散

治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短氣。嘔噦惡心。噫氣吞酸。面色萎黃。肌體瘦弱。怠惰嗜臥。體重節痛。常多自利。或發霍亂。及五噎入痞。膈氣反胃。

甘艸

剉炒  
二兩

厚朴

去龐皮薑  
製炒香  
各三兩

陳皮

去白已上  
各三兩二  
錢

蒼朮

去龐皮米  
滑浸五兩

右爲細末。每服二錢水一盞。入生薑二片。乾棗二

枚。同煎至七分。去粗溫服。或去薑棗。帶熱服。空心食前。大鹽一捻。沸湯點服。亦得常服。調氣煖胃。化宿食。消痰飲。辟風寒冷溼。四時非節之氣。如小便赤澀。加白茯苓澤瀉。如米穀不化。食飲多傷。加枳實。如胸中氣不快。心下痞氣。加枳殼木香。如脾胃困弱。不思飲食。加黃耆人參。如心下痞悶。腹脹者。加厚朴。甘艸減半。如遇夏。則加炒黃芩。

如遇雨水溼潤時。加茯苓澤瀉。

如遇有痰涎。加半夏陳皮。

凡加時除蒼朮厚朴外。依例加之。如一服五錢。有

痰加半夏五分。

如嗽飲食減少。脉弦細。加當歸。黃耆。用身。

如脈洪大緩。加大黃芩黃連。

如太便硬。加大黃三錢。芒硝二錢。先嚼炒桃仁。爛以藥送下。

散滯氣湯

治因憂氣結中。脘腹皮底微痛。心下痞滿。不思飲食。雖食不散。常常有痞氣。

當歸身 二分

陳皮 三分

柴胡 四分

炙甘艸 一錢

半夏 一錢

生薑 五片

紅花 少許

右件剉如麻豆大。都作二服。水二盞。煎至一盞去粗。稍熱服。食前。忌溼麪酒。

通幽湯

治幽門不通。上衝吸門不開。噎塞氣不得上下。治

在幽門閉。大便難。此脾胃初受熱也。多有此證。名乏。曰下脘不通。

桃仁泥

紅花一分  
已上各

生地黃

熟地黃五分  
已上各

當歸身

炙甘艸

升麻一錢  
已上各

右咬咀都作丁服。水二大盞煎至一大盞去粗稍熟。服之食前。

潤腸丸

治飲食勞倦。太便秘澀。或乾燥閉塞。不通。全不思

食。乃風結血結。皆能閉塞也。潤燥和血疏風。自然通利也。

大黃

去皮

當歸梢

羌活  
已上各  
五錢

桃仁

湯浸去皮

麻子仁

去皮取仁一  
尖一兩  
兩二錢五分

右除麻仁另研如泥。外搗羅爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心用白滾湯送下。

導氣除燥湯

治飲食勞倦。而小便閉塞。不通。乃血澀致氣不通。而竅澀也。

滑石 炒黃

茯苓

去皮  
各二錢

知母  
細剉酒洗

澤瀉 已上各三錢

黃藥

去皮  
錢酒洗

右咬咀。每服半兩水二盞煎至一盞去粗稍熱服空心。如急不拘時候。

丁香茱萸湯

治胃虛，嘔噦吐逆，膈咽不通。

乾生薑

黃藥 已上各二分

丁香

炙甘草

柴胡

橘皮

半夏 已上各五分

升麻 七分

吳茱萸

草豆蔻 黃蓍 人參 已上各一錢  
當歸身 一錢 蒼朮 二錢  
右件剉如麻豆大。每服半兩水二盞煎至一盞去粗稍熟服。食前忌冷物。

草豆蔻丸

治脾胃虛而心火乘之。不能滋榮。上焦元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時。子能令母實致肺金太腸相輔而來剋。心乘脾胃。此大復其雖也。經云。大勝必大復。故皮毛血脉分肉之間。元氣已絕於外。又

太寒太燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引。胷中而痛。鼻息不通。不聞香臭。額寒。腦痛。目時眩。目不欲開。腹中爲寒水反乘。瘡唾沃沫。食入反出。常痛。及心胃痛。肠下急縮。有時而痛。腹不能努。大便多瀉而少秘。下氣不絕。或脇鳴。此脾胃虛之極也。胷中氣亂。心煩不安。而爲霍亂之漸。膈咽不通。噎塞極則有聲。喘喝閉塞。或日陽中或暖房內。稍緩口吸風寒。則復作四肢厥逆。身體沈重。不能轉側。頭不可以回顧。小便洩而時躁。此藥主秋。

冬寒涼大復氣之藥也。

澤瀉

一分小便數減半

柴胡

二分或四分須詳脇痛多少用

神麴

薑黃

四分

當歸身

生甘草

熟甘草

青皮

已上各六分

桃仁

湯浸去皮尖七分

白殼蠶

黃蓍

陳皮

益智仁

人參已上各八分

半夏

一錢湯炮七次

草豆蔻仁

一錢四分麥蘖麴熟爲度去皮用仁

麥蘖麴

炒黃一錢五分

右件一十八味同爲細末桃仁另研如泥并同細  
末一處研勻湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三  
五十丸熟白湯送下旋斟酌多少

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺子能  
令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸  
膈閉塞疼痛善嘔口中涎目中泣鼻中流濁涕不  
止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒  
如冰頭作陣痛目中流火視物睜睜耳鳴耳聾頭

并口鼻或惡風寒喜日陽夜臥不安常覺痰塞膈  
咽不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼  
物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺  
麻木小便數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以  
息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛  
黧黑失色男子控睾牽心腹陰陰而痛面如赭色  
食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹皮色白  
後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急有肝大痛此皆  
寒水來復火土之讐也

黑附子

炮製去皮臍

乾薑

炮爲末各三分

防風

剉豆大

郁李仁

湯浸另研如泥去皮尖

人參

已上各五分

當歸身

酒洗六分

半夏

湯泡七次

升麻

剉豆各七分

甘草

剉如豆大已上各一分

羌活

剉如豆大已上各一錢

白葵花

細剪入五朵去心

右件藥都一服水五盞煎至二盞入

橘皮

五分

草豆蔻仁

麪裹燒熟去皮

黃蓍

已上各

一錢

右件入在內再煎至一下盞再入下項藥。

生地黃

二分酒浸

黃藥

酒浸

黃連

酒浸

枳殼

已上各三分

已上四味預一曰另用新水浸又以

細辛

二分

川芎

細末

蔓荆子

已上各三分

預一日用新水半太盞分作二處浸此三味并黃藥等煎正藥作一太盞不去粗入此浸者藥需上火煎至一太盞去粗稍熟服空心又能治齎頰齒唇齶舌舌根强硬等症如神忌肉湯宜食肉不助

經絡中火邪也。大抵腎并膀胱經中有寒。元氣不足者皆宜服之。

○脾胃將理法

白粥梗米菜豆小豆鹽豉之類皆淡滲利小便且小便數不可更利。况大瀉陽氣反行陰道切禁濕麴如食之覺快勿禁。

藥中不可服澤瀉猪苓茯苓燈心琥珀通草木通滑石之類皆行陰道而瀉陽道也。如渴如小便不利或閉塞不通則服得利勿再服。

忌大鹹助火邪而瀉腎水真陰及大辛味蒜韭五辣醋太料物官桂乾薑之類皆傷元氣。

若服升沈之藥先一日將理次日腹空服服畢更宜將理十日先三日尤甚不然則反害也。

夫諸病四時用藥之法不問所病或溫或涼或熱或寒。如春時有疾於所用藥內加清涼風藥。夏月有疾加大寒之藥。秋月有疾加溫氣藥。冬月有疾加大熱藥。是不絕生化之源也。錢仲陽醫小兒深得此理。內經必先歲氣毋伐天和是爲至治又曰無違時無伐。

花又曰。無伐生生之氣。此皆常道也。用藥之法。若反其常道。而變生異證。則當從權。施治假令病人飲酒。或過食寒。或過食熱。皆可以增病。如此。則以權衡應變。治之。權變之藥。豈可常用乎。

○攝養

忌浴當風汗當風須以手摩汗孔。方許見風。必無中風中寒之疾。

遇卒風暴寒衣服不能禦者。則宜爭努周身之氣。以當之。氣弱不能禦者病。

如衣薄而氣短。則添衣於無風處居止。氣尚短。則以沸湯一椀熏其口鼻。卽不短也。

如衣厚於不通風處居止。而氣短。則宜減衣。摩汗孔。令合於漫風處居止。

如久居高屋。或天寒陰濕所遇。令氣短者。亦如前法。熏之。

如居周密小室。或大熱而處寒涼。氣短則出。就風日。凡氣短。皆宜食滋味。湯飲。令胃調和。或大熟能食。而渴喜寒飲。當從權。以飲之。然不可

耽嗜如冬寒喜熱物亦依時暫食。

夜不安寢衾厚熱壅故也當急去之仍拭汗或薄而不安卽加之睡自穩也饑而睡不安則宜少食飽而睡不安則少行坐。

遇天氣變更風寒陰晦宜預避之大抵宜溫暖避風寒省語少勞役爲上。

○遠欲

名與利孰親身與貨孰多以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之何取之輕而棄之重耶殘軀六十有五耳

目半失於視聽百脉沸騰而煩心身如衆派漂流瞑目則魂如浪去神氣衰於前日飲食減於曩時但應人事病皆彌甚以已之所有豈止隨侯之珠哉安於淡薄少思寡慾省語以養氣不妄作勞以養形虛心以維神壽夭得失安之於數得喪既輕血氣自然諧和邪無所容病安增劇苟能持此亦庶幾于道可謂得其真趣矣

省言箴

氣乃神之祖精乃氣之子氣者精神之根蒂也大矣

哉積氣以成精，積精以全神。必清必靜，御之以道，可以爲天人矣。有道者能之，予何人哉？切宜省言而已。

### 脾胃論後序

黃帝著內經，其憂天下後世，可謂厚且至矣。秦越人述難經，以證之。傷寒爲病最大，仲景廣而論之，爲萬世法。至於內傷脾胃之病，諸書雖有其說，略而未詳。我東垣先生作內外傷辯脾胃論，以補之。先生嘗閱內經所論，四時皆以養胃氣爲本。宗氣之道，內穀爲寶。蓋飲食入胃，遊溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺。冲和百脉，順養神明，利關節，通九竅，滋志意者也。或因飲食失節，起居不時，妄作勞役，及喜怒悲愉。

傷胃之元氣使營運之氣減削不能輸精皮毛經絡故諸邪乘虛而入則疚動於體而成痼疾致真氣蕭然而內消也病之所起初受熱中心火乘脾末傳寒中腎水反來侮土乃立初中末三治及君臣佐使之制經禁病禁時禁之則使學者知此病用此藥因心會道派流得源遠遡軒岐吻合無間善乎魯齋先生之言曰東垣先生之學醫之王道也觀此書則可見矣至元丙子三月上巳日門生羅天益謹序

脾胃論後序

終

