

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



新板
東垣十書目
此事難知三四
十一



圖書
133
卷 12

此事難知卷之三

元 鎮州 東垣李 崇明之 撰

明 餘杭 節菴陶 華尚文 校

太陰證

腹滿^細。咽乾。手足自溫。自利。不渴。時腹痛。脉尺寸俱沉。

太陰可汗

太陰病。脉浮者。可汗。宜桂枝湯。

太陰可溫

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜四逆輩此條雖不言脉當知沉遲而弱。

仲景理中湯丸暨易老人參黃芪湯量其輕重或溫或熱人之強弱虛實所可宜者選而用之。

太陰有可下者乎

答曰有經云本太陽湯醫反下之因爾腹滿時痛者太陰也桂枝芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯易老云此非本有是證以其錯下脾傳于胃故誤下傳。

、知可解

太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者欲愈表少裏和脉長者爲陽漸生也此一證太陰便從外感太陰病欲解時從亥至丑止也。

太陰證禁忌不可犯

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之則胸下結鞭太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也傷寒而脉浮緩手足自溫者繫在太陰小便自利。

者則不發黃。日久利益甚。必自止者。便硬乃入府傳陽明也。

腹痛部分

中脘痛。太陰也。理中。建中。黃芪湯類主之。

臍腹痛。少陰也。四逆。真武。附子湯類主之。

少腹痛。小腹痛。厥陰也。重則正陽。回陽丹之類。輕則

當歸四逆湯。

太陰傳少陰。痛甚者。當變下利不止。


雜證而痛。四物苦練湯。酒煮當歸丸。增損當歸丸之

類。

夏肌熱惡寒。脉洪疾。手太陰足陽明主之。黃芩芍藥湯。

秋肌熱惡寒。脉沉疾。足少陰足太陰主之。桂枝芍藥湯。

腹痛 腹痛者。芍藥甘草湯主之。



腹不滿者加棗。

若滿者不加。

脾虛滿者黃芪湯。

芍藥停濕

中滿者勿食甘二藥用甘引至滿所脾實。

平胃散。蒼朮泄濕。小便不利者利之。

大便秘

實痞

厚朴

枳實

大便利

虛痞

芍藥

陳皮

傷食滿者傷厥陰是以腹脹滿者皆屬木。

少陰證

少陰證口燥舌乾而渴脉尺寸俱沉疾則大承氣湯。

沉遲則四逆湯。

少陰邪入於裏上接于心與火俱化而尅金惡候或見氣死入胃脉沉細而疾疾則大承氣下之下于本與水俱化而爲寒厥逆或見身冷靜重脉沉細而遲遲則四逆湯溫之疾雖可下若疾而無力者亦不可下爲陽將盡也。

少陰證口燥舌乾而渴身表涼脉沉細而虛瀉心湯主之此有形無形之藥也。

傷寒外證全在下證大熱而脉反細小不可下瀉心

湯主之。少陰受病。身涼無汗。體沉或體輕脉沉。有頭痛不厥。麻黃附子瀉心湯主之。

走無形證

其人病身熱而煩燥不寧。大小便自利。其脉浮洪而無力。按之全無者。附子瀉心湯主之。
走有形證
其人病上吐下瀉不止。當渴而反不渴。其脉微細而弱。理中湯主之。渴而脉沉有力而疾者。五苓散主之。
少陰證發熱脉沉者。必當汗。

緩汗之。

麻黃附子細辛湯。

微汗之。

麻黃附子甘草湯。

少陰證下利辨

但色青者當下。色不青者當溫。

少陰證口中辨

口中和者當溫。口乾燥者當下。

少陰證咽喉辨

熱者甘草湯。寒者半夏湯。寒熱者桔梗湯。

通脈四逆湯

薑附加甘草爲脉沉細而遲弦。薑附以治寒，甘以緩之爲汗苦急也。其證小便自利，子能令母實。自東之北爲逆行也。

薑附加葱白爲脉沉細而遲濶。薑附以治寒，辛以潤之爲腎惡燥也。其證大便自利，冷生氣，自北而西。此亦以爲逆行也。

少陰禁忌不可犯。

脉細沉數病爲在裏，不可發汗。脉微者不可發汗。脉微弱澀者復不可下。

麻黃附子細辛湯

體沉加防已。蒼朮乃勝濕也。

體輕加石膏。知母乃勝熱也。

前後虛實圖

王 薑 傳

肺秋王

腎冬王傳

假令肺肺虛則補其母。謂肺病而補其脾也。則腎自平矣。假令肺肺實則瀉其子。謂脾病而瀉其肺也。則心自平矣。難經云。從前來者爲實邪。從後來者爲虛邪。從所不勝來者爲賊邪。從所勝來者爲微邪。自病者爲正邪。

假令心病中風得之爲虛邪。傷暑得之爲正邪。飲食勞倦得之爲實邪。傷寒得之爲微邪。中濕得之爲賊邪。

假令心病得脾脉土在火之分也。尅火之水退而不

敢至。火獨王于南方。是從前來者爲實邪也。假令心病得肝脉木在火之分也。土退而不敢至。土退而不至。則尅火之水隨木而至。是從後來者爲虛邪也。

假令肺肺虛脾母能令肺子虛也。用理中湯。非補脾也。脾中補肺也。故曰虛則補其母。以其脾爲生肺之本也。則用人參白朮之類。大經曰。滋苗者必固其根。此之謂也。

假令肺肺實肺子能令脾母實也。用瀉黃散。非瀉肺

也。脾中瀉肺也。故曰實則瀉其子。以其脾爲生肺之上源。則用梔子石膏之類。大經曰。岱下者必枯。其上者。此之謂也。

天和六脉。六甲王脉。四時平脉。合而用之。則天地人三才之道備矣。

諸經皆言大則病進者何也。

答曰。散而浮大者。心也。心主無爲。相火用事。是爲相應。以五服言之。王畿中也。以王畿言之。九重中也。君主無爲。當靜以養血。若浮大而出乎外。非其所宜也。

以王道言之。書云。外作禽荒。或不亡。經云。主不明。則十二官危矣。此散而浮大者。君主兼臣下之權。而不知反。故曰大則病進。

南政。甲已所臨之歲。司天在泉。但見君火在上者。上不應。在下者。下不應。

北政。但見君火在上。則下不應。在下。則上不應。在左。則右不應。在右。則左不應。當沉而浮。當浮而沉也。

南政以前爲左。以後爲右。君也。

北政以前爲右。以後爲左。臣也。

啓玄子云。天地陰陽。視之可見。何必思。諸冥昧演法。
推求。智極心勞。而無所得耶。

難經仲景合而爲一。

仲景先太陽。次陽明。後少陽。自無形傳有形。從外而
之內者也。仲景之所言。言天令而暴至者也。

難經先少陽。次陽明。後太陽。自有形傳無形。從內而
之外者也。故難經之言。言雜病而久疾者也。

仲景叔和合而爲一。

張仲景王叔和論弦濤圖

本古根
目表
卦
外觀
王叔和
沉陰正

仲景言弦濤爲陰。叔和言弦濤爲陽。何意大抵弦濤
東西也。以南北分之。故有陰陽之別。濤本燥火。弦本
水少。雖有南北之分。總而言之。則不離諸數爲熟。諸
遲爲寒。仲景叔和言本兩途。非相違背。合而論之。皆

是也。仲景所言。言傷寒自外而入者。叔和所言。言五臟自內而出者。

傷寒從氣而入。故仲景以弦脉爲陰。自良而之內。從外入先太陽也。位在東北。

雜病從血而出。故叔和以弦脉爲陽。自巽而之外。從內出先少陽也。位在東南。

北弦 胃中痛。寒在胃。停水滿丹田。南目赤叫呼煩躁。大腸。胃。三焦。

右 寸肺 關脾 尺命門

左 寸心 關肝 尺腎 寒。

引飲脉八九至

小腸

膽弦

膀胱

南弦

固衛之陽

桂枝人參甘草湯

理中湯

子能令母實

北

凡在右者皆受左魁。

裏

自右之左

主從客變

表 左 右
左 小腸 肺 心 辛 丁 濡 脾 己 庚 洪 緩 肝 乙 弦 膽 甲 腎 壯 膀胱 壮 壮 沉

自左之右

客從主變

此事難知

凡在左者皆尅諸右

浮尅浮

沉尅沉

表裏所當汗下

手太陰復主表證却當汗

右行陰二度肺大腸脾胃命門心包三焦

八裏主汗七表主汗

左行陽二度心小腸肝膽腎膀胱

足厥陰復主血證却當汗

仲景浮汗而沉下

右手沉實

調胃

承氣

左手沉實桃仁抵當

難經沉汗而浮下

右手浮實枳實牽牛

四順

左手浮實桃仁

四順

右手雜病是爲之表傷寒是爲之裏

左手雜病是爲之裏傷寒是爲之表

傷寒入裏見標脈則生

假令胃病下之脉浮而汗出是也

雜病出表見標脈則死

假令脾病補之。脉弦而面青。是也。
察色脉以定吉凶。

脉地也。色天也。地生天則順。天生地則逆。
假令得弦脉而面赤色。地生天也。地生天則順也。兒
扶母兮差速也。

假令得弦脉而面黑色。天生天地也。天生地則逆也。母
抑子兮退遲也。

色者陰中之陽氣也。

本乎天。

脉者陽中之陰氣也。

本乎地。

弦有浮沉

浮爲甲化

素言天

化

泄土

沉爲乙不化

難言地

不化

泄木

泄土者

梔子

黃蘖

泄木者

防風

羌活

洪浮者爲丙。便有水化。從其變也。

洪沉者爲丁。只是火化。從其常也。

鍼經

甲丙戊庚壬皆變。乙丁己辛癸不變。

東坡集

卷三

七

此事難知

雜病元無表證者不可言左手有下證只當言右手於足陽明中求之

傷寒元有表證者可言左手有下證下證者血證也當於足厥陰中求之

相合脉經

脉之相合各有虛實不可作一體觀之假令洪弦相合洪客也弦主也子能令母實也弦洪相合弦客也洪主也母能令子虛也餘藏可以類推之至于手足之經亦相合假令傷寒脉浮緊而帶洪者卽手經丙

也餘倣此假令侮所不勝者挾其勢也脉弦而入金之分非挾火之勢則不敢侵金之分

弦而帶數甲終于甲也

弦而帶洪壬終于丙也

四正脉傷之圖

庚脉沈東方也

辛脉沈

壬脉魁

浮遲南

非無故

發傷方

既無故

沈火也

流之深甲

氣傷皮膚

也方西危

脉當有神

脉之不病其神不言當自有也。脉旣病當求其中神之有與無焉。謂如六數七極熱也。脉中有力卽有神也。三遲二敗寒也。脉中有力卽有神也。熱則有神。當泄其熱則神在焉。寒則有神。當去其寒則神在焉。寒

熱之脉無力無神。將何藥而泄熱去寒乎。苟不知此而遽泄去之。將何依以生。所以十亡八九。故經曰。脉者血氣之先。又云。血氣者人之神。可以不謹養乎。不可不察其有無乎。

治病必當求責

假令治病無間。傷寒畜血結胸發黃等病諸證。并一切雜證。各當於六經中求責之。謂如發黃證或頭痛腰脊強惡寒。卽太陽證也。或身熱目疼鼻乾不得臥。卽有陽明證也。餘皆倣此。

更有手足經或一經非本家病而自他經流入者亦當求責

謂如手陽明流入足陽明是上流下也本非足經病當於手經中求之是知治足經者非也亦有下而流上者其餘諸經相貫通者皆然更有一支別流入者亦有同鄰而病者合爲表裏者鄰也亦有夫婦各相傳受者甲傳乙之類脾傳胃之類亦是皆當求責之凡言虛實皆當於子母中求責之

治病必求其本

假令腹痛桂枝加芍藥大黃桂枝加大黃何爲不只用芍藥大黃之屬却於桂枝湯內加之大抵治病必求其責知從太陽中來故以太陽爲本也又如結胸證自高而下脉浮者不可下故先用麻黃湯解表已脉沉然後以陷胸湯下之是亦求其本也至于畜血下焦血結膀胱是亦從太陽中來侵盡無形之氣乃侵膀胱中有形血也

形不足者溫之以氣精不足者補之以味謂寒傷形熱傷氣形氣能自傷也此云不足者皆太

過也。以其太過，則自傷。自傷，則不足矣。

心血

榮血

金之衛用

燥土氣類

火熱有形

渺

雜耳華水

金匱真言云。冬按蹠四時各有病者。何蓋。五臟之陽氣皆伏於腎中。動有深淺。隨行動而病。故於四時而各異也。

痛隨利減

此故藥大黃其妙也。大黃同治不只

諸痛爲實。痛隨利減。世皆以利爲下之者。非也。假令痛在表者。實也。痛在裏者。實也。痛在血氣者。亦實也。在表者汗之。則痛愈。在裏者下之。則痛愈。在血氣者散之。行之。則痛愈。豈可以利字只作下之乎。但將利字訓作通字。或訓作導字。則可矣。是以諸痛爲實。痛隨利減。汗而通導之利也。下而通導之亦利也。散氣行血。皆通導而利之也。故經曰。諸痛爲實。痛隨利減。又曰。通則不痛。痛則不通。此之謂也。

抑本

假令高者抑之。非高者固當抑也。以其本下而失之。太高故抑之而使下。若本高何抑之有。

假令下者舉之。非下者固當舉也。以其本高而失之。太下故舉之而使高。若本下何舉之有。

虛實

假令水在木之分。是從後來。從後來者爲虛邪。雖在水爲虛邪。則木本虛矣。經曰。母能令子虛。假令火在木之分。是從前來。從前來者爲實邪。雖在火爲實邪。則木本實矣。經曰。子能令母實。假令兩手脉中弦無

表證。乃東方實。也是西方肺氣大不足也。緣母虛所致也。當大補其脾。微補其肺。大泄其火。微泄其水。雜證諸論云。先調其氣。次論諸疾。况此乃本經不足之證也。難經云。東方實。是西方虛也。又云。欲泄其邪。先補其虛。此之謂也。如是之證。當以溫藥補脾。以氣藥燥劑爲用。如正氣已勝。當以泄火泄風之藥。清高涼上。勿令入胃中。此爲全治。益黃白朮半夏茯苓甘草。酒病得之。加澤瀉。手足陽明二燥用。益黃者燥濕而補其氣也。實泄黃也。泄火木泄青之類。羌活防風生

地黃黃連等分。黃芩倍之。凡用藥補。卽用各方之生數理中丸。建中湯是也。瀉卽用各方之成數。七宣元七聖丸是也。

問。兩手寸關弦疾。脾弱火勝。木旺土虧。金樂當作何治。

荅曰。不從標本。從平中治也。木標也。土本也。火中也。燦金虧土。旺木者皆火也。仲陽安神丸主之。山芋門冬益金之氣。金氣勝。則木自平。凝水石牙硝。火中添水。使變爲濕熱也。濕熱者。季夏之令也。非土而何。故

用裸砂以墜火下行。是已將退與子權行濕令也。是以弦得除。而土自王也。秋喘。加人參與丹砂等。夏則不加養氣者。加沉香。欲發汗者。臨臥先服白粥一盃。後藥之。則汗也。寒熱神少振搖。小便淋。或多或少。大便走。完穀不化。口乾舌縮。唇吻有瘡。心下痞。大渴引飲。惡乾喜濕。目花四肢無力。怠墮嗜臥。食不入。皮膚燥澀。面色黧黑。肌肉銷鑠。胸腹中急。額上汗出。此法泄火益濕。補氣脉弦浮沉同治。氣不化。小便不利。濕潤肌滑。熟蒸陰少。氣不化。

氣走小便自利燥肌燥澁爲迫津液不能停。离砂丹主之弦數者陽陷於內從外而之內也。弦則帶數甲終于甲也緊則帶洪壬終于丙也。若弦虛則無火細則無水此二脉從內之外也不宜离砂丹。

泄瀉壬血

火

火令逆行而土虛土虛則長

木乘火之勢耗脾侮所不勝弦金補土是也
木侮金當金中瀉火火退則木無所乘而退也是實則瀉其子

水

右寸得弦數脉是東方

實乃乘子勢也既瀉其

火木自虛矣以寒藥瀉

水

六月大熱之氣反得大寒之病氣難布息身涼脉遲二三至何以治之

答曰病有標本病爲本令爲標用寒則順時而失本用熱則從本而逆時故不從標本而從乎中治由治者用溫也然則溫不能救大寒之病非薑附則不可

東垣先生書
卷三
若用薑附似非溫治之不然衰其大半乃止脉反四至餘病便天冷治之足矣雖用薑附是亦中治也非溫而何經曰用熟遠熟雖用之不當然勝主可化亦其理也。

六月桂枝

大薑

秋溫

乾薑

萬薑冬熱

東南二方用麻黃謂開腠理發汗也

萬薑

涼麻

附子

西北一方用桂枝謂開腠理止汗也

萬薑涼麻附子

實實麻黃湯實調胃承氣湯實大承氣湯

表虛虛桂枝湯中虛小建中湯沉虛四逆湯

實大承氣湯

證十一十一論欵問素

此事確知

久欵不已三焦受之其狀欵而腹滿不欲食飲此皆聚于胃閨于肺使人多涕唾面浮腫氣逆也錢氏異功散主之

肺黃大腸赤石脂禹餘糧湯
湯遺失桃仁湯不止
猪苓湯分水

實實麻黃湯實調胃承氣湯實大承氣湯

表虛虛桂枝湯中虛小建中湯沉虛四逆湯

實大承氣湯

各隨藏液之湯府圖

藏液之圖

六經解

附解

黃麻附膀胱

子細遺溺

茯苓甘草湯

辛

五藏低

六府高

藥不爾

小柴胡湯

桂枝湯

附子細湯

桂枝湯

素問五藏瘧證湯之波圖

腎令入酒浙腰脊痛
宛轉大便難目睭
煦然手寒桂枝
加當歸芍藥湯

令

入

酒

浙

腰

脊

痛

腎

令

入

酒

浙

腰

脊

痛

宛

轉

大

便

難

目

睭

煦

然

手

寒

桂

枝

加

當

歸

芍

藥

湯

瘡之爲病以暑舍于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑感冒風寒而得之者邪并於陽則發熟冰水不能涼邪并於陰則發寒湯火不能溫并則病作離則病止作止故有時在氣則發早，在血則發晏淺則日作深則間日或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽一也或在四肢者風淫之所及隨所傷而作不必盡當風府也先寒而後熱者謂之寒瘡先熱而後寒者謂之熟瘡二者不當治水火當從乎中治中治者少陽也渴者燥勝也不


渴者濕勝也瘡雖傷暑遇秋而發其不應也秋病寒甚太陽多也冬寒不甚陽不爭也春病則惡風夏病則多汗汗者皆少陽虛也其病隨四時而作異形如此又有得之于冬而發之于暑邪舍于腎足少陰也有藏之于心內熱生于肺手太陰也至于少氣煩冤手足熱而嘔但熱而不寒謂之癰瘡足陽明也治之奈何方其盛矣勿敢必毀因其衰也事必大昌治法易老瘡論備矣

治當順時

夏天氣上行。秋天氣下行。治者當順天道。謂如先寒後熟。太陽陽明病。白虎加桂也。此天氣上行。宜用之。若天氣下行。則不宜瀉肺。宜瀉相火。命門則可矣。亦有內傷冷物而作者。當先調中。後定瘧形。治隨應見。乃得康寧。亦有久而不差者。當求虛實。以脉爲期。虛補實瀉。可使却疾。此之謂也。

問素

六經瘧候湯液之圖



問素問難經銅人經絡所病各異者何用鍼當從何法

荅曰。素問者。從天之六氣言也。難經者。從地之血脉言也。銅人者。從經言人也。從天而言。先氣而後血。從地而言。亦先氣而後血。從人而言。在天地之間。從地之病而言。卽地中之氣病。故血從天而病也。從天而言。先是動後所生。從地而言。亦先是動而所生之病。後也。

問寒病服熱藥而寒不退。熱病服寒藥而熱不

退其故何也

啓玄子云。熱不得寒。是無水也。寒不得熱。是無火也。寒之不寒。責其無水。熱之不熱。責其無火。經云。滋其化源。源既已絕。藥之假不能滋其真水火也。

疾有自悞

或始不早治。日數久淹。或困乃求醫。法不及用。病勢已盈。豈爲天命

病有變怪

仲景平脉法第二

及診得脉形證相應。因與服湯。食頃變大。吐下腹痛。

是爲變怪。或有舊時服藥。今乃作發。是亦謂之變怪耳。

喘論 此論當以經言邪氣盛則實。斷之

華佗云。盛而爲喘。減而爲枯。故活人亦云。發喘者氣有餘也。凡看文字。須要看得本意。盛而爲喘者。非肺氣盛也。喘爲肺氣有餘者。亦非氣有餘也。氣盛當認作氣衰。有餘當認作不足。肺氣果盛。又爲有餘。則當清肅下行。而不喘。以其火入于肺。衰與不足。而爲喘焉。故言盛者。非言肺氣盛也。言肺中之火盛也。言有

餘者。非言肺氣有餘也。言肺中之火有餘也。故瀉肺以苦寒之劑。非瀉肺也。瀉肺中之火。實補肺氣也。用者不可不知。

桔梗枳殼湯

活人書言。治痞。當知是痞。宜先用桔梗枳殼湯。非用此。以治心下痞也。審知錯。下必成痞。證是氣將暗。而過于胸中。故先用此。使不致於痞也。若已成痞。而用此。則失之晚矣。不惟不能消痞。胸中之氣反病也。先之一二字。預早之意也。先用枳殼湯。若不應。後以仲景

痞藥治之。則可。若執枳殼湯以治痞。其害亦深矣。先之一字。不可不知也。

尋衣撮空何藏所主

尋衣撮空。許學士說作肝熱風淫末疾。故手爲之尋衣撮空。此論雖然。莫若斷之爲肺熱似爲愈矣。其人必讞語妄言。經曰。肺入火爲讞言。兼上焦有疾。肺必主之。手經者。上焦也。二者皆當。其理果何如哉。天地互爲體用。此肺之體。肝之用。肝主諸血。血者陰物也。此靜體。何以自動。蓋肺主諸氣。爲氣所鼓舞。故靜得

動。一者說肝之用。一者說肺之體。此天地互爲體用。二者俱爲當矣。是知肝藏血。自寅至申。行陽二十五度。諸陽用事。氣爲肝所使。肺主氣。自申至寅。行陰二十五度。諸陰用事。血爲肺所用。

三法五治論

若五治不分邪僻。內作工不能禁。夫治病之道。有二法焉。初中末也。

初治之道。法當猛峻者。謂所用藥勢。疾利猛峻也。緣病得之。新暴感之輕。得之重。皆當以疾利猛峻之藥。

東坡一書

卷三

三

急去之

中治之道。法當寬猛相濟。爲病得之。非新。非久。當以緩疾。得中之劑。養正。去邪。相兼濟。而治之。養正。去邪者。假令如見邪氣多。正氣少。宜以去邪藥多。正氣藥少。凡加減藥法。如此之類。更以臨時對證。消息增減。用藥。仍依時令。行之無忘也。更加鍼灸。其効甚速。未治之道。法當寬緩寬者。謂藥性平善。廣服無毒。惟能養血氣。安中。蓋爲病證已久。邪氣潛伏。至深而正氣微少。故以善藥。廣服。養正多。而邪氣自去。更加以

鍼灸。其効必速。夫療病之道。有五治法焉。和取從折屬也。

一治各有五。五五二十五。治如火之屬衰于戌。

金之屬衰于辰。是也。

一治曰和。假令小熱之病。當以涼藥和之。和之不已。次用取。二治曰取。爲熱勢稍大。當以寒藥取之。取之不已。次用從。三治曰從。爲勢既甚。當以溫藥從之。爲藥氣溫也。味隨所爲。或以寒因熱用。味通所用。或寒以溫用。或以發汗之不已。又再折。四治曰折。爲病勢

極甚當以逆制之。逆制之不已當以下奪之下奪之不已又用屬五治曰屬爲求其屬以衰之緣熟深陷在骨髓間無法可出鍼藥所不能及故求其屬以衰之求屬之法是同聲相應同氣相求經曰陷下者衰之夫衰熟之法同前所云火衰于戌金衰于辰之類是也如或又不已當廣其法而治之譬言如孫子之用兵若在山谷則塞淵泉在水陸則把渡口在平川廣野當青野千里塞淵泉者刺俞穴把渡口者奪病發時前青野千里者如肌羸瘦弱宜廣服大藥以養正

夫病有中外治有緩急
在內者以內治法和之
氣微不和以調氣法調之

在外者以外治法和之
其次大者以平氣法平之
盛甚不已則奪其氣令其衰也故經曰調氣之方必別陰陽定其中外各守其鄉
內者內治外者外治微者調治
其次平治盛者奪之汗者下之

寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利

此事難知卷之三

其大太吉以平柔皆平也
其小大吉以平柔皆吉也
其中吉以平柔皆中也

此事難知卷之四

元 鎮州 東垣李 崇明之 撰

明

餘杭

節菴陶

華尚文

校

面部形色之圖

額 离心 坤胃 兌肺 乾大腸 坎腎頤

精明五色

巽膽

遺散至

震肝

艮小腸

遺散至

肺死

天元圖

七十四難曰從其首繫其數

間象

在表

五化疊元

以應望聞

肝 青 大敦 木井 腺曲泉 中衝呼
心 赤 少府 火熖 焦少衝 泌水
脾 黃 太白 土俞 火熖 苦少海言
肺 白 經渠 金經 大淵 太都
腎 黑 陰谷 水合 腐復溜 隱白
地元圖

六十八難曰元證脉合復生五象

井心下膽元

滿證

身熱

體重

節痛

喘嗽

寒逆氣

寒逆氣

榮身 心下滿小腸 元證 體重 寒熱 逆氣
俞體重 心下滿胃 身熱 元證 寒熱 逆氣
經喘欬 心下滿大腸 身熱 體重 元證 寒熱 逆氣
假令膽病 善潔面青 善怒 證得弦脉 脈合 又病心下滿
病體重節痛 證當刺又病身熱 證當刺又病心下滿
當刺又病如見善潔面青 善怒 脈又弦 又病身熱 證當刺又病
喘咳寒熱 證當刺又病如見善潔面青 善怒 脈又弦 又病
筋春刺井 夏刺榮 秋刺經 冬刺合

人元例

六十五難說合

七十二難說榮

在經木火土金水

再分七象以應切脉獨包七法

有陰陽

配合

父子

兄妹

接經

平經說象

拔源

陰陽例

陰陽者子午也謂榮合水火之稱名曰陰陽也十二經皆有之或感得父氣或感得母氣而病焉子午者

乾坤也乾坤包六子六子附乾坤也故七十難云春夏各致一陰秋冬各致一陽春夏刺井榮秋冬刺經合是各致一陰一陽之義亦謂井經近乎子午然當微瀉其井大瀉其榮微補其經大補其合或補瀉反作是寒則留之熱則疾之故微大補瀉以應春食涼夏食寒秋食溫冬食熱假令膽病善潔面青善怒脉得浮之實大沉之損小是感得父氣爲陽中之陽當於本經中瀉火補水却得浮之損小沉之實大是感得母氣爲陰中之陽當於本經中瀉水補火

配合例

七十七難曰。上工治未病者。見肝之病。則知肝當傳于脾。故先實其脾氣。無令受肝之邪氣也。假令見肝病。欲實其脾者。先於足太陰經中補土字一鍼。又補火字一鍼。後於足厥陰肝經內瀉木字一鍼。又瀉火字一鍼。

子母例

假令見肝病。滿悶淋溲便難轉筋。又見心病。煩心心痛。掌中熱而噦。當於足厥陰肝經內。木火二字各一

鍼

兄妹例已上子母兄妹名曰四針象

假令見足厥陰肝之經太過。又兼見膽之證太過。是爲兄妹。當瀉肝經內木火二字各一鍼。又瀉膽經內木火二字各一鍼。此五法乃人元法也。

接經 手足經同

內經曰。留瘦不移節而刺之。使十二經無過絕。假令十二經中是何經略不通行。當刺不通行。凝滯經俱令接過節。如刺之無問其數。以平爲期。如諸經俱虛

補十二經。如諸經俱實瀉。十二經補當隨而濟之瀉。當迎而奪之。

平經說象 七十九難

爲見諸經中無過與不及之病。而有病八十難曰。有見如入謂左手見氣來至乃內鍼。鍼入見氣盡乃出鍼。非用迎隨補瀉之法。不虛不實。不虛謂真氣未虛不實。謂邪氣未實。以此故自取其經施其法也。

拔源例

假令鍼本經病了。又於本經原穴亦鍼一鍼。如補肝經亦於肝原穴上補一鍼。如瀉肝經來亦於肝經原穴上瀉一鍼。如餘經有補瀉鍼畢。倣此例亦補瀉各經原穴。

接經補遺

又補其母亦名隨而濟之。又瀉其子亦名迎而奪之。又隨呼吸出內亦名迎隨也。

兩脇痛少陽丘墟。心痛少陰太谿。并湧泉足厥陰原穴腰痛崑崙委中出血。喘滿痰實如膠太谿。嘔噦無

度手厥陰大陵。頭痛手足太陽原。熱無度不可
正陷谷出血。○小腸疝氣痛。足厥陰太衝。百節痠
疼實無所知。三稜刺絕骨出血。○婦人血不止。刺足
太陰井。見喉閉手足少陽井。井少商手足太陰井大煩熱不
正晝夜無力。刺十指間出血。謂八關大節。眼發睛欲
出亦須大刺。婦目痛。大臂痛。刺太陽井。○頭中痛不
可忍。卒疝痛。婦人陰中痛。皆刺足厥陰井。○目痛。小
臂痛。刺少陽井。○心痛脉沉腎原穴。脉弦肝原穴。
濱脈肺原穴。緩脈脾原穴。身之前足陽明原穴。

身之後足太陽原穴。身之側足太陽原穴。灸一
身之內分爲八方。○臍已上至鳩尾。以年爲井。太
手足四分。自井爲一。榮爲二。至合爲五。之類。自膽中分四
向。○如井榮數倍之。百會爲一分。亦如膽中法。凡欲
灸者。先診其脈。若浮者。不可灸。灸之必變。
月晦前後各二日。屬坤。爲癸乙。月缺。無瀉。
月望前後各二日。屬乾。爲甲壬。月滿。無補。
初三日。至。上弦。屬震仰孟。爲庚。
上弦日。至。月望。屬兌上缺。爲丁。

月望日朔至下弦

屬巽爲風

爲辛

下弦日望至月晦

屬艮納雨

爲丙

天元圖

七十四難曰從其首繫其數間象在表五化疊元並見前圖拾遺夫天元法者謂之五化疊二當從其首繫其數首者寅方也。在人爲肝是從東方順天輪數至所主之處計從幾數却於所受病一方倒疊回去數至依前數盡處便於元受病一方穴內瀉所止之方來路穴也不得於所主之方內經中

瀉之勿悞

假令病者聞香臭二者心主五臭也入脾爲香臭從東數至所主之處所主五臭者心也東一南一計得二數却當於受病之方倒疊回去脾一心一元數二也是數至心心者榮火也當於受病之方內瀉榮火是脾經瀉火都是也或曰何以倒疊數對曰此從地出爲天輪所載右遷于天不當於所顯之處治之此舟行岸移之意也。

地元圖

六十八難曰。元證脉合復生五象。
在表間象以應望聞及肝膽各五法並見前圖。

人元法例前圖已載七象七法見前人元例後

大接經從陽引陰

足太陽膀胱經之脉出于至陰小指外側去爪甲角

如韭葉爲井金足小指之端也十呼

足少陰腎之脉湧泉足心也起于小指之下斜趣三呼
手厥陰心包脈其直者循中指出其端去爪甲如韭葉陷中爲井中衝穴也其支者別掌中循小指次指

出其端

手少陽三焦之脉起于小指次指之端去爪甲角如韭葉爲井三呼

足少陽膽之脉起于竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛三呼二十呼

足厥陰之脉起于大指之端入聚毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦穴也及三毛中十呼六呼

手太陰肺之脉起于大指之端出于少商大指內側

也。去爪甲如韭葉爲井。其支者出次指內，廉出其端。手陽明大腸之脉起于大指次指之端，入次指內側，去爪甲角如韭葉爲井。二呼中指內交。三呼

足陽明胃之脉起于大指次指之端，去爪甲如韭葉爲井。其支者大指間出其端。一呼

足太陰脾之脉起于足大指端，循指內側去爪甲角如韭葉爲井。隱白也。十呼

手少陰心之脉起于小指內出其端，循指內廉之端去爪甲角如韭葉爲井。三呼

手太陽小腸之脉起于小指之端，循指之端去爪甲一分陷中爲井。五呼

大接經從陰引陽

手太陰肺之脉起于大指端，出于少商，大指內側也。去爪甲角如韭葉爲井。其支者出次指內廉出其端。手陽明大腸之脉起于大指次指之端，入次指內側去爪甲如韭葉爲井。一呼其支者大指出其端。爲井。

足太陰脾之脉。起于足大指端。循指內側去爪甲角如韭葉爲井。隱白也。

手少陰心之脉。起于小指內出其端。循指內廉之端去爪甲角如韭葉爲井。

手太陽小腸之脉。起于小指之端去爪甲下一分陷中爲井。

足太陽膀胱之脉。出于至陰。小指外側去爪甲角如韭葉爲井。金足小指之端也。

足少陰腎之脉。起于小指之下爲井。湧泉穴也。

手厥陰心包之脉。其直者循中指出其端去爪甲角如韭葉陷中爲井。中衝穴也。其支者別掌中循小指次指出其端。

手少陽三焦之脉。起于小指次指之端去爪甲角如韭葉爲井。

足少陽膽之脉。出于竅陰。足小指次指之端如韭葉爲井。其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛。

足厥陰肝之脉。起于大指之端入聚毛之際去爪甲

如韭葉爲井。大敦及三毛中。六呼

凡此大接經。從陰引陽。從陽引陰。

東垣二十五論後錄

諸經頭痛

陽明頭痛。自汗發熱。白芷。
少陽頭痛。脈弦。往來寒
熱。柴胡。
太陽頭痛。惡風惡寒。川芎。
太陰頭痛。痰實體重。腹痛。半夏。
少陰頭痛。手三陰三陽經不流
行。而足寒逆。爲寒厥頭痛。細辛。
厥陰頭痛。項痛。脈微浮緩。欲入太陽。其疾痊矣。然亦當用川芎。甲氣。

虛頭痛。黃芪。血虛頭痛。當歸。諸氣血俱虛頭痛。
黃芪當歸。傷寒頭痛。無汗。麻黃湯。有汗。桂枝湯。
太陽經所發。陽明頭痛。白虎湯。
少陽頭痛。柴胡湯。
太陰頭痛。脉浮桂枝湯。脉沉理中湯。
少陰頭痛。脉沉微熱。麻黃附子細辛湯。
厥陰頭痛。外傷本經桂枝麻黃各半湯。嘔而微吐。吳茱萸湯。內亦病也。
易老曰。非白朮不能去濕。非枳實不能消痞。非天雄不能補上焦之陽虛。非附子不能補下焦之陽虛。
治目不能遠視。能近視。或亦妨近視。或脉風成癩。地

黃丸主之

生地黃

爆乾四兩

天門冬

湯泡去心

枳壳

炒去穰二兩

甘菊花

未開者二兩

右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。如能飲食茶清湯下。不能飲食。溫酒下。食後改熟地黃亦可。此說亦見病機門下。

治目不能近視。反能遠視。服局方定志丸。

目能遠視。責其有火。不能近視。責其無水。法當補腎。目能近視。責其有水。不能遠視。責其無火。法

當補心。補腎補足少陰。補心補手少陰。補腎。六味地黃丸加牡蠣。補心定志丸加茯苓。不能近視。晨服地黃丸。不能遠視。臥服定志丸。道手足少陰經。

固真丸

治精滑久不愈

單牡蠣不拘多少。砂鍋子內煅。醋淬七遍爲末。醋糊爲丸。如梧桐子大。每服五十九。空心鹽湯下。六脉俱弦。指下又虛。脾胃虛弱病也。食少而渴不已。心下痞。腹中痛。或腹中窄狹。如繩束之急。小便不利。

大便不調。精神短少。此藥專治大渴不止。腹中窄狹。所食減少。亦大有神効。

白茯苓去皮

陳皮去白

人參

生薑

先用滾湯掠過
焙乾各秤一兩

右同爲末。秋時減薑一半。如脉弦或腹中急甚。加甘草二錢。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。白湯化下。食前空心細嚼。白湯送下。亦可。忌生冷硬物。及怒發思慮過節。

六脉沉緊。按之不鼓。膀胱勝小腸也。或瀉利不止而

腹脹。或純便血。赤血或雜膿血。便雖多而不渴。精神短少。或面白脫色。赤此失血之故。或面黃而氣短。此元氣損少之故。且小腸者。手太陽經。丙火也。膀胱者。足太陽經。壬水也。是壬水來丙小腸之位。小腸爲王所冠。而外走也。諸手經短而足經長。兼以五行相尅論之。俱是足經。此火投于水。變爲寒證。宜溫之則愈。其與難經一證。寒熱相反。亦名曰小腸瀉。亦作洩。海藏云。此雜病。火投于水。變爲寒證。又外傷足太陽膀胱。經。左脉俱浮爲表。陽之候也。忽變爲內寒。亦旺火投。

盛水而屈內就王化脉反不浮而微沉此內病與外病俱有此火投水例非精於診脉者孰能知之

薑附赤石脂朱砂丹

生附子

半兩

生乾薑

半兩
不炮

朱砂

一兩
另研

赤石脂

一兩半
水飛

太右爲細末酒糊丸如黑豆大每服十五丸至二三十丸米飲湯下茯苓煎湯下尤妙

東垣云因看盧氏醫鏡見此一藥味數分兩同惟丹砂用伏火者及治病有差所治者小便數而不禁怔

忡多忘魔夢不已不同耳見其不同審而詳之乃得此之治法不差且泛舉之經言腎主大小便肝主小便淋溲難經云小腸爲赤腸是面赤色及便溺赤色者皆出心與小腸南方赤色顯於外也經言下焦如瀆者正謂大小便也大便爲陰爲有形乃下焦之下者也腎藏病爲腎主大使不言大腸者明子行父之道小便爲氣所化乃下之高者也謂肝主小便淋溲亦是子行父之道爲府病諸氣化者皆府諸有形血化者皆藏病所主此府言膀胱病一證俱在下焦則同

染有形無形及在府在藏有殊古俱是丹田衰敗不言及心火者以其相火化行君之令故也細分之則膀胱壬水勝丙小腸者是不傳入陰故洩血洩血利不禁爲有形質病且不傳陰則陰不病何爲有形病此爲陰之體也爲府之用也天地陰陽互爲體用以斯可見是明五臟者爲六腑所用六腑者爲五臟所用明矣是有形皆爲傳陰也夫小便不禁是膀胱不約爲遺溺此不傳陰也是丹田胞絡受寒爲壬所尅大抵諸府皆盛有形物有形病皆在府責其所來皆在

藏也用伏火丹砂者去其寒性耳治法同者以其俱在下焦補諸形火同在胞絡耳以其胞與腎相對有滙相通故也腎主大使肝主小便所治安得不殊經曰腎肝同歸一治經又云少陽主骨所生病膀胱却主筋所生病亦可知也小便不禁茯苓湯下大便有病米飲湯送下

凡臟腑之秘不可一例治有虛秘有實秘實秘者能飲食小便赤麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘者不能飲食小便清厚朴湯主之

厚朴

生薑製
三兩

白朮

五兩

枳實

麥皮炒
一兩

陳皮

三兩

甘草

炙三兩

半夏

麵三兩

右爲龕末。每服五錢水一盞半。生薑五片。棗三枚。煎至一盞空心服。

實秘者物也。虛秘者氣也。

脉中少有浮則似止。胸中元氣不及也。加

人參

五味子

麥門冬

益智仁

沉香

丁香

川芎

白荳蔻

氣血弱者不可服枳殼以損其氣也。
氣血盛者不可服丁香以益其氣也。
脉弦而虛不可損氣。脉大而實不可益氣。
氣虛則生脉散。氣實則三才丸。

地之濕氣感則害人皮肉筋脈內托散主之。以其外受也。膏梁之變足生大丁五辛之過也。七聖散主之。以其內發也。去桂枝加當歸瘡腫消者生薑自然汁調輕粉塗之。諸瘡有惡肉者膏藥內入巴豆雄黃少許。不傷良肉。止去惡肉。不惟惡瘡。若癰疽有死肉不能去。

者。自丁霜上之深則絇之淺則乾。參之以膏藥外護之大效。

上焦熱。

中焦熱。小便不利。

下焦熱。

梔子黃 經云無陽則陰無以
芩黃連 生無陰則陽無以化
芍藥黃 又云膀胱者津液之
藁大黃 府氣化能出矣

陳皮厚朴 有一身盡熱

藿香白芷

乾薑丁香肉

有一身盡寒

桂附子沉香

大頭痛論

夫大頭痛者。雖爲在身。在上。熱邪伏於已。又感天地四時非節。瘟疫之氣所着。所以成此疾。至於潰烈。膿出。而又染他人。所以謂之疫癘也。大抵足陽明邪熱太甚。資實少陽相火爲之熾。多在少陽。或在陽明。甚則逆傳太陽。視其腫勢在何部分。隨其經而取之。濕熱爲腫。水盛爲痛。治之宜早。藥不宜速。恐過其病。上見出者。爲主。爲根。治之宜早。藥不宜速。恐過其病。上熱未除。中寒已作。有傷人命矣。此疾是自內而之外。

也。是爲血病。况頭部受邪。現見於無形之處。至高之分。當先緩。而後急。先緩者。謂邪氣在上。所著無形之分。既著無形。所傳無定。若用重劑。大瀉之。則其邪不丟。反過其病矣。雖用緩藥。若急服之。或食前。或頓服。咸失緩之體。則藥不能騰升。徐潰無形之邪。或藥性味形狀。擬象服餌。皆須不離緩體。及寒藥。或炒。或酒浸。之類。皆是也。後急者。謂前緩劑已經高分瀉。邪氣入于中。是到陰部。入于中。染于內之有形質之所。若不速去。反損陰分。此中治。却爲客熟所當急也。治客

以急。此之謂也。治主。以緩先緩。謂也。謂陽邪在上。陰邪在下。各爲本家病。不從先後。錯其緩急。不惟不能解其紛。而復致其亂矣。此所以治主當緩。治客當急。謂陽分受陽邪。陰分受陰邪者。主也。陽分受陰邪。陰分受陽邪者。客也。凡所謂急者。當急去之。此治客以急也。假令少陽陽明之爲病。少陽者。謂邪出于耳。前後也。陽明者。前面大腫也。先以黃芩黃連甘草通炒剉煎。少少不住。服呷之。或一劑畢。再用大黃。或酒浸。或煨。又以鼠粘子新瓦上炒。咬咀。煎成去粗。納芒硝。

各等分亦時時呷之。當食後用。徐得微利。并邪氣已。只服前藥。如不已。再服後藥。依前次第用之。取利已。却止。如陽明渴者。加石膏。少陽渴者。加栝蔞根湯。陽明行經。加升麻葛根芍藥之類。選而加之。並與上藥相合。用加羌活荆芥防風之類。選而加之。太陽行經。長伏三脉。風癇驚癇發狂。惡人與火者。灸第三領。第九領。服局方妙香丸。以鍼投眼子。透冷水內浸少時。服之。如本方法。治弦細緩三脉。諸癇似狂。李和南。五

生丸。大凡治雜病。先調其氣。次療諸疾。無損胃氣。是其要也。若血受病。亦先調氣。謂氣不行。又氣爲之綱。夫也。夫不唱。婦不隨也。如婦人病。經先柴胡。以行經之表。次四物。以行經之裏。亦先氣而後血也。不能飲。而渴不能食。而小便黃。或遊。皆因胃氣虛而生熱。有形之物不入。火炎上。而渴。戊就癸。而化所。以小便黃。赤如棗汁。法當補胃。以錢仲陽白朮散。乾葛木香藿香等藥。治之。

上焦渴。小便自利。白虎湯。

中焦渴大小便不利。調胃承氣湯。

下焦渴小便赤澁。大便不利。大承氣湯。

六經發渴各隨經藥治之。

表熱惡熱而渴者。白虎湯。

皮膚如火燎而以手重取之不甚熟者肺熱也或目

白睛赤煩燥引飲單黃芩一物

兩脇肌熱脉浮弦者柴胡飲子。

丁身熱或日晡潮熱皆血熱也。四順飲子。

夜則行陰若發熱者血熱也。四順飲桃仁湯選而用

乏當視其有表入裏腹痛血刺腹痛中無轉失氣之類。

晝則明了夜則譫語熱入血室無犯胃氣及上三焦不治自愈若甚則四順飲子桃仁承氣湯證相似當下者用之

寅申發熱兩脇不盛亦爲柴胡證。

表裏內外俱熱者大柴胡湯。

晝則行陽氣也柴胡。夜則行陰血也四順。

治項後側少陽經中疣痘不變肉色不問大小及月

日深遠或有赤硬腫痛

生山藥

一挺去皮

草麻子

兩箇去殼

右二味研勻攤帛上貼之如聖

兩手大熱爲骨厥火分如在火中可灸湧泉三壯或五壯

立愈

治臙刃及脚膝生瘡局方虛損門黃芪丸服之則愈定癰疽死之地分

一伏兔 二腓脇 三背 四臓俞 五項上
六腦 七髡 八鬢 九頤

問三焦有幾

血海異同

手少陽三焦之經起于小指次指之外側出其端終于目銳眥足少陽膽之經起于目銳眥終足大指三毛頭至心爲上焦心至臍爲中焦臍至足爲下焦此又足太陽之別也又靈樞云臍下膀胱至足爲足三焦右手尺脉爲命門包絡同胫此包絡亦有三焦之称爲命門之火遊行於五臟之間主持於內也手三焦主持上也足三焦主持下也上中下三焦通爲一氣衛於身也爲外護既以頭至心心至臍臍至足爲

狀也。呼爲二焦有名也。以爲無狀可乎。經云。三焦者。水穀之道路也。却是有形狀。何以然。上焦者。主內而不出。中焦者。主腐熟水穀。下焦者。主出而不內。故經曰。上焦如霧。中焦如漬。下焦如瀆也。手經者。主持上也。足經者。主持下也。命門者。主持中也。爲衛者。護持外也。三焦元氣爲父之氣散也。包絡相從母也。並行而不相離。母之元氣也。故俱會于胸中。經云。膻中之分。父母居之。氣之海也。如天地之尊。不係五形。清邪中于上焦。名曰潔也。頭痛項強。腰脊痛。濁邪中于下。

焦名曰渾也。陰氣爲慄。便溺妄出。表虛裏急。上焦下。焦與中焦相混。上焦怫鬱。藏氣相薰。中焦不治。胃氣上衝。榮衛不通。血凝不流。若衛氣前通者。小便赤黃。與熱相搏。因熱作使。游於經絡。出入藏府。陰氣相通。陽氣後微。陰無所使。客氣內入。噫而出之。聲啞。音咽塞。寒厥熱壅。必然下血。陰陽俱厥。脾弱液下。下焦不闔。清便下重。便數而難。臍築湫痛。命將難全。此命門之脉。診在右手尺也。經曰。五藏不和。五液不下。當闔不闔。便溺俱脫。生氣絕矣。所以腹臍湫痛也。故曰命

將難全。前三焦自外而入。後三焦自內而出。霧不散而爲喘滿。此出而不內也。渥不利而爲留飲。留飲不散。久爲中滿。上不能內。下不能出也。瀆不利而爲腫滿。此因上內而下不出也。此三焦之所不歸也。三焦有藏而無府。在內則游行。是在血也。在外則固護。是在氣也。上焦如霧者氣也。下焦如瀆者血也。中焦者氣血分之也。下焦在臍下膀胱上口。主分別清濁。出而不內。卽傳道也。治在臍下。名曰三焦。其府在氣衝中。又云有藏無府。成氏云。血室者。血之所居也。榮衛

停止之所。經脈流會之處。衝脈是矣。衝者。奇經之一也。起于腎下。出于氣衝。並足陽明經夾臍。上行至胸中。而散爲諸經之會。啓玄子云。衝爲血海。諸經朝會。男子則運而行之。女子則停而止之。皆謂之血室。內經曰。任脉通衝脉。盛男既運行。女既停止。故運行者無積而不滿。動停止者有積而能靜也。不滿者陽也。氣也能滿者陰也。血也。故滿者以時而溢。爲之信有期也。溢動也。乾道成男。坤道成女。故運行者陽之象也。停止者陰之象也。血氣榮衛。男女皆有。內外諸和。

其脉同。脈者血之府也。故爲氣血之先。室爲藏物之舍。亦爲府也。三焦之府在氣衝中。爲男女血海之府。經又曰。有藏而無府。從無形而言之。有藏有府。從有形而言之也。清邪濁邪所傷。三焦齊病。亦同兩感經云。心包絡主之脉。出胸中下膈。歷絡三焦。其所以相與相火並行。與命門之脉同。脈于右尺中也。陳氏五運六氣後有君火二論。卽陳蓬運氣圖也

許先生論關中梁寬甫證

右脇肺部也。咳而唾血。舉動喘促者。肺脇也。發熱脉

數不能食者。火來刑金。肺與脾俱虛也。肺脾虛而火乘之。其病爲逆。如火此者例不可補瀉。蓋補金則慮金與火持。而喘咳益增。瀉火則慮火不退位。而痃癖反盛。正宜補中益氣湯也。先扶元氣。少少以治病藥。和之。聞已用藥而不獲効。意必病勢苦逆。而藥力未到也。當與寬甫熟論。遠期秋涼庶就使平復。蓋肺病惡陰陽升降浮沉。溫涼寒熱升降浮沉。則順之。寒熱溫涼。則反之。順其理。和其氣爲治之大方也。及見有證。

增損服之。或覺氣壅，間服加減枳朮丸。或有服間服加減枳朮湯數月後，庶逆氣稍回。逆氣回，則治法可施。但恐已至色青色赤，脉弦脉洪，則無及矣。

近世論醫有王河間劉氏者，有主易州張氏者。蓋張氏用藥依准四時陰陽升降而增損之。正內經四氣調神之義醫，而不知此是妄行也。劉氏用藥務在推陳致新，不使少有怫鬱。正造化新新不停之義醫，而不知此是無術也。然而主張氏者或未盡張氏之妙，則瞑眩之藥終莫敢投。至失機後時而不救者多矣。

主劉氏者，未悉劉氏之蘊，則劫効目前，陰損正氣，遺禍於後日者多矣。能用一家之長，而無一家之弊，則治法其庶幾乎。

論史副使病證

史副使病不見色脉，不能解料。然以既愈復發言之，則亦恐宜取張氏依准四時陰陽升降用藥以扶元氣。庶他日既愈而遂愈也。寬甫病候初感必深，所傷物恐當時消導不盡，停滯淹延，變生他證。以至于今，恐亦宜倣劉氏推陳致新之意，少加消導藥，於益氣

湯中庶有漸緩之期也。

圓明膏

太醫王教授傳

槐英

半斤河水四升浸二十宿熬槐英取汁二升

黃連

四兩

川芎

防風

各一兩

當歸

秦皮

各二兩

已上五味剉如菉豆大用河水六升浸一宿熬取汁三升將槐英粗并此五味粗再用水四升熬取二升通前共五升相合銅鍋內用木炭文武火熬入去蠟淨蜜四斤淨蜜法取蜜四升入鍋內微熬

勿令滾其蠟沫盡浮在面上急取下以紙覆蜜面候冷取紙蠟自隨紙去再溫蜜熱以綿濾入藥汁內同煎一時許入下項飛石一十三兩

金星石

銀星石

代赭石

菩薩石

寒水石

紫石英

雲母石

并白礬少許同搗細

玄精石

各一兩另研爲細末

黃丹

三兩研金極細

滑石

已上丁十一味相合再研水飛焙乾共得丁十三

兩研開入藥汁內。又熬一時。入後淬爐甘石二兩。

淬法

爐甘石不以多少。用木炭火煅紅。童子小便蘸。再煅紅。再淬。凡七次。以碎爲度。再研水飛焙乾淨。秤二兩。入藥汁內。又熬一時。入下項藥。

銅綠

半兩研

青鹽

半兩研

雄猪膽

七枚取汁

白丁香

一合水浸研取清汁

鷹條

三錢如上取汁用

已上藥同熬萬轉成膏。凡熬時。用槐柳枝不住手攪。勿令塵入鍋中。須於淨室內熬膏。盛入磁器中。

候冷入下項細末藥。不可熱。熱則藥力去矣。

乳香

沒藥

輕粉

蕤仁

去皮各半兩

朱砂

牛黃

腦子

血竭各一錢

杏仁

去皮半兩

南鵬砂

一錢

右件各別研令極細。

珍珠

珊瑚

紫貝

硼砂

石蠣

白礬

綠礬

朴硝各一錢

盆硝半錢

右用預粟元熟清藥汁同研極細爛攬入藥中令
為如常法點之神效。

東坡十書

南歸人

一卷

南歸人

二卷

南歸人

三卷

南歸人

四卷

南歸人

五卷

南歸人

此事難知卷之四 終

血散

卷一

血散

卷二

血散

卷三

血散

卷四

南歸人

一卷

南歸人

二卷

南歸人

三卷

南歸人

四卷

南歸人

南歸人不貲縣未竟不百懷

