

30 1

20 1

10 1

8 1

7 1

6 1

5 1

4 1

9 1

8 1

7 1

6 1

5 1

4 1

3 1

2 1

1 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

新板

東垣十書目

蘭室秘藏

三四

十五

武9
133
15



武門
133
16



蘭室秘藏卷之三

元 鎮州東垣李果明之 撰

明 吳郡立齋薛已新甫 技

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云。東風生於春。病在肝俞。在頸項。故春氣者。病在頭。又諸陽會於頭面。如足太陽膀胱之脈。起於目內眞上額交顛上入絡腦。還出別下項。病衝頭痛。又足少陽膽之脈。起於目銳眞上抵頭角。病則。

頭角額痛。夫風從上受之。風寒傷上邪。從外入客於經絡。令人振寒。頭痛。身重惡寒。治在風池風府。調其陰陽。不足則補。有餘則瀉。汗之則愈。此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴。九竅不利者。腸胃之所生。乃氣虛。頭痛也。心煩頭痛者。病在耳中。過在手。巨陽少陰。乃濕熱頭痛也。如氣上不下。頭痛癲疾者。下虛上實也。過在足少陰巨陽。甚則入腎。寒濕頭痛也。如頭半寒痛者。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。此偏頭痛也。有真頭痛者。甚則腦盡痛。手足寒至節死。不治有厥逆頭

痛者。所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦爲主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者。總其大體而言之也。高顛之上。惟風可到。故味之薄者。陰中之陽。乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛。惡風。脈浮緊。川芎羌活獨活麻黃之類。爲主。少陽經頭痛。脈弦細。往來寒熱柴胡爲主。陽明頭痛。自汗發熱惡寒。脈浮緩長實者。升麻葛根石膏白芷爲主。太陽頭痛。必有痰。體重。或腹痛。爲痰癖。其脉沉緩。蒼术半夏南星爲主。少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。

而足寒氣逆爲寒厥。其脉沉細。麻黃附子細辛爲主。
厥陰頭項痛或吐痰沫。厥冷其脉浮緩。吳茱萸湯主。
乏血虛頭痛當歸川芎爲主。氣虛頭痛人參黃芪爲
主。氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荆子細
辛。其効如神。白术半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也。青
空膏乃風濕熱頭痛藥也。羌活附子湯治厥陰頭痛
藥也。如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治。先師
嘗病頭痛發時兩頰青黃暉眩目不欲開懶言身體
沉重兀兀欲吐繫古曰此厥陰太陰合病名曰風痰

以局方玉壺丸治之更灸後谿穴即愈是知方者體
也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂
上工矣

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱頭上壅損
目及腦痛不止

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

去蘆

羌活

已上各

炙甘草

一兩

細挺子黃芩

三兩去皮剉

牛酒製

一牛炒

右爲細末。每服二錢。匕熱盞內入茶少許。湯調如膏抹在口內。少用白湯送下。臨臥。

○如苦頭痛。每服加細辛二分。

○如太陰脉緩。有痰。名曰痰厥頭痛。減羌活防風川芎甘草。加半夏一兩五錢。

○如偏正頭痛。服之不愈。減羌活防風川芎一半。加柴胡一倍。

○如發熱惡熱。而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯。加好吳白芷。

徹清膏

蔓荆子

細辛已上各一分

薄荷葉

川芎已上各三分

生甘草

熟甘草已上各五分

藁本一錢

右爲細末。每服二錢。食後茶清調下。

川芎散

治頭目不清利。

川芎

三分

柴胡

七分

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻

已上各一錢炒

熟甘草

已上各四錢五分

酒生地黃

各二錢

酒黃連

炒

酒黃芩

已上各四錢五分

右爲細末。每服一錢。或二三錢。食後茶清調下。忌

酒濕麵

白芷散

二六名鬱金散

香白芷

已上各二錢

鬱金

二錢

薄荷葉

芒硝已上各三錢

右爲極細末。口含水鼻內噙之。

石膏

已上各二錢

碧雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝已上各一錢

蔓荊子

川芎

已上各一錢二分

石膏

一錢三分

青黛

一錢五分

薄荷葉

二錢

紅豆

一箇

右爲極細末。口噙水鼻內噙之。

羌活清空膏

蔓荊子一錢

黃連三錢

羌活

防風

甘草已上各四錢

黃芩一兩

右爲細末。每服一錢。茶清調下。食後臨臥。清上瀉火湯。

答有入年少時氣弱。常於氣海三里灸之。節次約五七十壯。至年老添熱厥頭痛。雖冬天大寒。猶喜寒風。其頭痛則愈。微來暖處。或見煙火。其痛復作。五七年不愈。皆灸之過也。

荆芥穗

川芎已上各二分

蔓荆子

當歸身已上各三分

蒼术

酒黃連

生地黃

藁本

甘草已上各五分

升麻

防風已上各七分

酒黃蘖

炙甘草

黃芪已上各一錢

酒黃芩

酒知母

已上各一錢五分

羌活

三錢

柴胡五錢

細辛少許

紅花少許

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞去粗稍熱。服食後去粗稍熱。服食後。

補氣湯

服前藥之後。服此藥。

柴胡二分

升麻三分

黃芪八分

當歸身二錢 炙甘草四錢 紅花少許

右咬咀作三服。水二盞煎至一盞去粗稍熟服食後。

細辛散

治偏正頭痛，

細辛

瓦粉已上各二分

生黃芩

芍藥已上各五分

酒黃連

川芎已上各七分

炒黃芩

酒黃芩已上各一錢

炙甘草一錢

柴胡二錢

五分

右爲龜末。每服三錢。水一大盞半煎至一盞取清食後服之。

羌活湯

治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

灸甘草七分

澤瀉三錢

已上各

酒洗瓜蔞根

白茯苓

酒黃芩三錢

已上各

酒洗

酒黃連

防風

細黃芩

已上各

右爲龜末。每服五錢。重水二中盞煎至一盞取清。

右爲龜末。每服五錢。重水二中盞煎至一盞取清。

食後臨臥通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味

木香

橘皮

柴胡已上各一分

酒黃芩二分

人参

黃藥

白术

川芎

升麻已上各三分

蒼朮

麥蘖麵

當歸身

黃連已上各五分

甘草

半夏已上各七分

本黃芪一錢

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一大盞去粗稍熱服不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

生甘草

炙甘草

已上各二錢

防風

二錢五分

柴胡

升麻

酒生地黃

酒知母

已上各五錢

酒黃藥

羌活已上各一兩

右爲龜末每服五錢水二大盞半煎至一大盞半加

黃芪

二兩

蔓荆子五分。川芎三分。再煎至一盞。去粗。臨臥熟服。

半夏白术天麻湯

范天驥之內有脾胃證。時顯煩燥。胸中不利。大便不通。而又爲寒氣怫鬱。悶亂大作。火不伸。故也。疑其有熱。服疎風丸。大便行。其病不減。恐其藥少。再服七八十九丸。大便復見兩行。元證不瘳。增以吐逆。食不能停。痰睡稠粘湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促。上喘無力。以言心神顛倒。目不敢開。如

在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。余料前證是胃氣已損。復下。兩次則重虛。其胃而痰厥。頭痛作矣。與此藥而治之。

黃藥

二分酒洗

乾薑

三分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

五分已上各

炒神麴

白朮

已上各一錢

麥蘖麴

半夏

湯洗五分

右㕮咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。熱服。

食前一服而愈。此頭痛苦甚，謂之足太陰痰厥頭痛，非半夏不能療。眼黑頭旋，風虛內作，非天麻不能除。黃芪甘溫，瀉火補中，益氣升陽，除濕，補中，益氣，澤瀉茯苓利小便，導濕橘皮苦溫，益氣調中，升陽，神麴消食，蕩胃中滯氣。大麥麴寬中，助胃氣，乾薑辛熱以滌中寒。黃蘆大苦寒，酒洗以療冬天少火，在泉發燥也。

口齒咽喉門

口齒論

論曰：夫齒者腎之標，口者脾之竅。諸經多有會於口者，其牙齒是手足陽明之所過。上齦隸於坤土，乃足陽明胃之脈貫絡也。止而不動，下齦嚼物，動而不休。手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲，而喜熱足，陽明喜寒飲，而惡熱。其病不同。牙者腎之標，亦喜寒，寒者堅牢爲病，不同熟甚，則齒動，齦斷，祖脫，作痛不已。故所治療不同。也有惡熱而作痛者，有惡寒而作痛者，有惡寒惡熱而作痛者，有惡寒飲少，熱飲多。

而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒齦腫起爲痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多爲虫所齶其齒缺少而色變爲虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

羗活散

治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉齶祖脫疼痛

藁本

不生

香白芷

桂枝

已上各三分

蒼术

升麻

已上各五分

當歸身

六分

草豆蔻仁

一錢去根

羗活

一分

羊脛骨灰

二錢

麻黃

去根節

防風

已上各三錢

柴胡

五錢

細辛

少許

草豆蔻散

治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉

防風

已上各二分

羊脛骨灰

右爲細末先用溫水漱口淨擦之其痛立止

草豆蔻仁

熟地黃已上各五分

黃連已上各三分

升麻二錢五分

右爲細末同前牙痛處擦之

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風

藁本已上各三分

羊脛骨灰

當歸身

熟地黃已上各六分

草豆蔻仁

升麻

黃連已上各一錢

羌活一錢五分

麻黃不去節

草龍膽酒洗

生地黃已上各二錢

麝香散

細辛少許

右爲細末依前藥法擦之

治熱多寒少牙露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛妨食忤涼少忤熱多

熟地黃二分

益智仁半二分

當歸身

生地黃

麻黃根

酒漢防已

人參已上各三分

升麻一錢

草豆蔻少許

黃連已上各五分

羊脰骨灰二錢

麝香少許

右爲細末如前藥擦之

治蟲散 一錢白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲痛胃經濕熱腫痛

桂枝 一分

熟地黃 二分

藁本

白芷 三分 已上各

羌活 五分

吳茱萸 八分

黃連 四分 已上各

麻黃 不去節二錢五分

升麻 一錢

草豆蔻

黃芪

益智仁

右爲細末同前擦之

益智水律散

當歸

黃連 四分 已上各

白木律 二分

益智皮

熟地 五分 已上各

羊脛骨灰

升麻 一錢

治寒熱牙痛

升麻 五分

右爲細末用度如前擦之

升麻 一錢

蠍稍散

治大寒風犯腦牙痛

白芷

當歸身

柴胡

已上各二分

桂枝

升麻

防風

藁本

黃芪

已上各三分

羌活

五分

草豆蔻皮

一錢

麻黃

去節一錢五分

羊脰骨皮

二錢五分

蠟稍

少許

右爲細末如前法用之

白牙散

白芷

七分

升麻

一錢

石膏

一錢五分

羊脰骨灰

二錢

麝香

少許

右爲細末先用溫水漱口擦之妙

黃連一錢

草豆蔻一錢

已上各一分

刷牙藥

黃連一錢

草豆蔻一錢

已上各一分

麝香

一分

生地黃

酒防已

熟地黃

二分

當歸身

人參三分

已上各一分

草豆蔻皮

五分

升麻

一錢

羊脰骨灰

黃連

二錢

白豆蔻

三分

沒石子

三箇

五倍

一箇

右爲極細末如前法擦之妙

獨聖散

治一切牙痛風疳

北地蒺藜

不以多
少陰乾

右爲細末。每用刷牙。以熟漿水漱牙。外龕末熬漿。水刷牙。大有神効。不可其述。

當歸龍膽散

升麻一錢

治寒熱停牙痛

當歸良

香白芷

當歸梢

羊脛骨灰

生地黃

已上各

麻黃

草豆蔻

草龍膽

升麻一錢

黃連

已上各一錢

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙痛

藁本

二分

生地黃

熟地黃

羌活

防已

人參

三分

當歸身

益智仁

已上各四分

香白芷

黃芪

已上各五分

羊脰骨灰

吳茱萸

升麻

一分五分

麻黃

已上各

草豆蔻皮

二分一錢

右爲細末。如前法擦之。

細辛散

治寒邪風邪犯腦牙齒痛。

柴胡

白芷已上各二分

防風

桂枝半二分

升麻

藁本已上各二分

麻黃去節四錢

草豆蔻五分

當歸身四錢

細辛少許

羌活已上各一錢五分

羊脛骨灰

右爲細末。先嗽後擦之佳。

立効散

治牙齒痛不可忍。及頭腦項背微惡寒飲。大惡熱飲。其脉上中下三部陽虛陰盛。是五臟內盛六腑陽道脈微小。小便滑數。

細辛二分

炙甘草三分

升麻七分

防風一錢

草龍膽酒洗四分

○右咬咀都作一服水一盞煎至七分去粗以匙搗在口中。中燥痛處待少時則止。

○如多惡熱飲更加草龍膽一錢。此法不定隨寒熱

多少臨時加減

○若更惡風作痛加草豆蔻黃連已上各五分勿加草龍膽

牢牙散

治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活一兩

草龍膽酒洗一兩五錢

羊脰骨灰二兩

升麻四兩

立右爲細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和匀臥時

清胃散

貼在牙齦上

治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱當歸身擇細黃連如連不好更加酒制各三分升麻一錢

生地黃酒制各三分

牡丹皮五分

升麻一錢

右爲細末都作一服水一盞半煎至一盞去粗帶冷服之

神功丸

治多食肉人。口臭不可近。牙齒疳蝕。牙齦肉將脫。牙齒落血不止。

蘭香葉

如無蘿
香代之

當歸身

蘿香

用葉

木香

已上各一錢

升麻

二錢

生地黃

酒洗

生甘草

已上各二錢

黃連

去鬚擇淨酒洗秤

縮砂仁

五錢

右同爲細末。湯浸鉢餅爲丸。如棗豆大。每服一百丸。或加至二百丸止。白湯下。食遠服。兼治血崩及血崩及血下不止。血下褐色。或紫色黑色。及腸澼

桔梗湯
下血空心服米湯下。其脉洪大而緩者。及治麻术
厥氣上衝逆氣上行。妄聞妄見者。

治咽腫微覺痛聲破

當歸身

馬勃

已上各一分

白殭蠶

黃芩

已上各三分

麻黃

去節五分不

桔梗

甘草

已上各一錢

桂枝

少許

右爲龜末。作一服。水二大盞。前至一盞。去粗稍熟。服之。食遠。

又方

治口瘡久不愈者，

黃藥 不計多少真者蜜，塗其上灸黃色。

右爲細末乾，糁瘡上。臨卧忌醋醬鹽，

神驗方

治口瘡無間久新，

夜間將一丸以歷繫左右交手，揉三五十次。但遇睡覺行之。如此三五度。因濕而生者，一夜愈。久病諸般口瘡，三二夜愈。如鼻流清涕者，歷之

二丸，揉之數夜可愈。

內經云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上口爲糜。易老，五苓散與導赤散合而飲之。

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐噦胃虛寒所致，

黃藥 三分

炙甘草

丁香

柴胡

橘皮

已上各五分

升麻 七分

吳茱萸

蒼朮

已上各一錢

當歸身一錢

草豆蔻仁

黃芪

已上各二錢

右爲龜末。每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍

熱服食前

白术湯一名茯苓

半夏湯

天麻

已上各三錢

陳皮

白茯苓

麥蘖麵炒黃色

治胃氣虛弱，身重有痰惡心，欲吐是風邪羈絆於脾胃之間，當先實其脾胃。

炒神麴二錢

柴胡

已上各

半夏已上各

五錢

白术

已上各

右咬咀，每服五錢水二盞入生薑五片同煎至一大盞去粗稍熱服。

補肝湯一名柴胡

半夏湯

升麻

已上各

治素有風證，不敢見風，眼澀頭痛，眼黑胸中痰惡心兀兀，欲吐遇風，但覺皮肉緊，手足難舉，重物如居暖室，少出微汗，其證乃減，再或遇風，病即復。

柴胡

升麻

藁本

已上各五分

白茯苓七分

炒神麴

蒼朮

已上各一錢

半夏二錢

生姜十片

右爲鹿末都作一服水二大盞煎至一大盞去粗
稍熱服

吳茱萸丸一名木香利膈丸

治寒在膈上噎塞咽喉不通

木香

青皮已上各二分

白僵蚕

姜黃

澤瀉不燒鹽更宜

柴胡已上各四分

當歸身

炙甘草已上各六分

益智仁

人參

橘皮

升麻

黃芪已上各八分

半夏一錢

草豆蔻仁五分

吳茱萸已上各一錢二分麥稈麵一錢
右爲細末湯浸餅爲丸如茶豆大每服一二三十丸溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

劙血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈以三穗鍼於氣街出血立愈

黃芪一錢

麥門冬

當歸身已上各三分

生地黃

人參已上各五分

五味子十箇

右爲龜末都作一服水二盞煎至一盞去粗熱服

不拘時

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬二分

人參去蘆

當歸身三分

各

黃芪

白芍藥

甘草一錢

五味子五箇

右爲龜末都作丁服用水二盞煎至一盞去粗稍熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居太

室中臥大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附臍有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居大室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中丁證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不愈遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

麻黃桂枝湯

人參益上焦元氣不足而實其表也

麥門冬保肺氣已上各三分

桂枝以補表虛

當歸身

和血養血各五分

麻黃

去根節

甘草

補其脾胃之虛

黃芪

實表益衛

白芍藥

已上各一錢

五味子

五箇安其肺氣

右以水三盞先煮麻黃一昧令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去粗熱服臨臥只一服而愈更不再作

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多面黃眼澀多眵手麻木

葛根

已上各

羌活

已上各五錢

白芍藥

升麻

已上各二兩

炙甘草

二兩

黃芪

三兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食後溫服
○六脉弦細而濶按之空虛其色必白而天不澤者
脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱
滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

三黃補血湯

治六脉俱大按之空虛心面赤善驚上熱乃手少
陰心脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大
瀉其氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其血

牡丹皮

黃芪

補之以防血溢五錢升麻已上各一錢

當歸

柴胡

已上各一錢

熟地黃

川芎

已上各二錢

生地黃

三錢

白芍藥

五錢

右咬咀如麻豆大每服五錢水一大盞煎至一大盞去粗稍熱服食前

黃湯則愈

救肺湯

一名人參
救肺湯

陳皮

已上各五分

治吐血

蘇木

升麻

柴胡

已上各一錢

當歸梢

熟地黃

蒼朮

已上各一錢

黃芪

人參

已上各二錢

右爲麩末都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍

溫服食前

止衄血法

治鼻血久不正素有熱而暴作者諸藥無驗神法以大紙二張作八摺或十摺於水內濕置頂中以熱熨斗熨至重或一重紙乾立止

腰痛門

川羌肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小瞿露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不愈夾腰痛論中說皆爲足太陽足少陰血絡中有瘀血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脈病皆去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防已

防風已上各

炒神麴

不獨活

已上各五分

川芎

肉桂

當歸梢

炙甘草

蒼术

已上各一錢

羌活一錢

桃仁

五箇去皮尖研如泥

右㕮咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗
稍熟食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沉重如山

灸甘草二錢

羌活

防風

獨活

大黃

澤瀉

肉桂已上各二錢

當歸梢

連翹已上各五錢

酒漢防已

酒黃蘖已上各一兩

桃仁

三十箇

右咬咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一大盞去粗熱服

破血散瘀湯

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

中桂已上各一錢

蘇木

一錢五分

連翹

當歸梢

柴胡

已上各二錢

水蛭

三錢炒去煙盡別研

麝香

少許別研

右件分作二服每服酒一大盞水一大盞除水蛭麝香別研如泥前餘藥作一大盞去粗火令稍熱調二味空心服之兩服立愈

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或脰膀臂股中痛不可忍鼻塞不通

當歸梢一分

中桂

地龍已上各四分

麻黃五分

蘇木六分

獨活

黃藥

甘草已上各一錢

羌活二錢

桃仁六箇

蒼术湯

治濕熱腰腿疼痛

防風風能勝濕

黃藥

已上各一錢始得之時寒也久不愈寒化爲熱除濕止痛

遠

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服食

柴胡

二錢行經

蒼术

二錢去濕止痛

右都作一服水二大盞煎至一大盞去粗空心服

麻黃復煎散

治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而燥熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱乃濕在經者亦宜發汗况正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白术

人参

生地黃

柴胡

防風已上各五分

羌活

黃藥

已上各一錢

麻黃

去節去沫煎至三盞水入下項藥再煎

杏仁

去皮三箇

黃芪

已上各二錢

甘草

三錢

緩筋湯

活湯

治兩目如火，腫痛。兩足及伏兔筋骨痛。膝少力。身重腰痛。夜惡寒，痰嗽。頸項皆急痛。目外翳，目絲急。

食不下

熟地黃 一分

紅花

獨活 已上各二分

黃芩

生地黃

羌活 三錢

右爲麩末，都作一服。水二大盞煎至一盞。去粗食，遠服之。

生甘草

炙甘草

藁本

草豆蔻仁

當歸身

麻黃 已上各三分

拈痛湯

治濕熱爲病。肩背沉重。肢節疼痛。胸膈不利。

白术一分

人参去蘆

苦参酒炒

升麻去蘆

葛根

蒼术二錢

防風去蘆

知母

澤瀉

黃芩炒

豬苓

當歸身三錢

炙甘草

黃芩酒洗

茵陳酒洗

右咬咀。每服一兩。水二大盞。煎至一大盞。去粗食。遠

蒼术復煎散

服

治寒濕相合。腦右痛。惡寒。項筋脊骨強。肩背胛眼
痛。膝臍痛無方。行步沉重。

紅花一分

黃藥三分

柴胡

藁本已上各

澤瀉

白术

升麻五分

羌活一錢

蒼术四兩水一椀煎
二盞去粗入藥

右咬咀。先煎蒼术湯二大盞。復煎前項藥至一大
盞。稍熱空心服。取微汗爲效。忌酒濕麵。

羌活蒼术湯

治脚膝無力沉重

炙甘草

黃蘖

草豆蔻

生甘草

葛根

橘皮

柴胡半分

升麻

獨活

縮砂仁

蒼术

防風

黃芪二錢

知母

羌活

右咬咀分作二服

水二大盞煎至一大盞去粗空心

服

壯本丹

秘方

治腎虛腰痛久則寒冷此藥壯筋骨補元利小大
養丹田治腰痛之妙劑

杜仲酒炒

肉蓯蓉

巴戟

酒浸去骨五錢

破故紙盐水炒

茴香

青蓋

五錢

右爲末將猪腰子分開入藥在內縫住紙包煨熟
每一個一服用黃酒送下

加味青義丸

治腎虛腰痛或風寒中之血氣相搏爲痛

杜仲

薑汁浸炒十二個

破故紙

水淘十二兩芝麻同炒變色去皮搗乾爲末

沉香

六兩

胡桃

去皮搗另研六兩

乳香

另研各六兩

加味補陰丸

右爲末用肉蓯蓉十二兩酒浸成膏和劑搗干餘

杵丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯

任下

人參

二兩

熟地

酒浸四兩

枸杞

四兩

生地

四兩酒洗

歸身

三兩酒洗

山藥

三兩微炒酒洗

龜板

二兩浸灸酒

虎脛骨

二兩酥灸

瑣陽

二兩酒洗

兔絲子

三兩酒蒸

杜仲

二兩炒去絲

牛膝

二兩酒洗

骨碎補

二兩搗碎

肉蓯蓉

二兩酒浸

破故紙

二兩炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二錢漸加至三錢空心淡鹽湯或溫酒任下冬月加乾姜五錢

本草
對本論率二兩 肉苁蓉二兩 韶女
東勝子配蓀三兩 林朴去絲二兩 中林
鹿角一錢分二兩 肉腫骨酒浸分二兩 廣良配蓀三兩

蘭室秘藏卷之四

元 鎮州 東垣李杲明之 撰

婦人門

經閉不行有二論

陰陽別論云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風。消爲息。貴者外不治。婦人脾胃久虛。或形羸氣血俱衰。而致經水斷絕。不行。或病中消胃熱。善食漸瘦。津液不生。夫經者。血脉津液所化。津液既

絕爲熱所爍。肌肉消瘦時見渴燥。血海枯竭病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱補益氣血。經自行矣。此證或經適行而有子。子不安爲胎病者有矣。或心包脉洪數燥作時見。大使秘澀小便雖清不利。而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脉除包絡中火邪。而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸爲瘧痕爲沉也。月澀不利則月事沉滯而不利。故云爲瘧痕爲沉也。或因勞心全心火上行月事不來。安心補血瀉火經自行矣。故內經云月事不來者胞脉閉也。胞脉者屬心。

而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也。

經漏不止有三論

陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損致命門脈沉細而數疾。或沉弦而洪大有力。寸關脉亦然。皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止。其色紫黑如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脉必弦細寒作於中。中有赤帶者。其脉洪數疾熱明矣。必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來。兩脇急

縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病也不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡火之言勸諭令拒火而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣瘧論云悲哀太甚則胞絡絕者

也陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳爲脈痺此之謂也

升陽除濕湯

一云名調經升麻除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜睡卧四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二

者受邪病皆在脉。脉者血之府也。脉者人之神也。心不主令。包絡代之。故曰心之脉。主屬心系。心系者包絡命門之脉也。主月事。因脾胃虛乏。故漏下月水不調也。况脾胃爲血氣陰陽之根帶也。當除濕去熱。益風氣上伸。以勝其濕。又云火鬱則發之。

當歸 洒洗

獨活 已上各三分

蔓荆子 七分

防風

炙甘草

升麻

藁本 已上各一錢

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

已上各一錢五分

右剉如麻豆大。勿令作末。都作一服。以索淨新汲水五大盞煎至一大盞。去粗空心熟服。待少時以早飯壓之。可一服而已。如灸足太陰脾經中血海穴二七壯而已。

此藥乃從權之法用。風勝濕爲胃下陷而氣迫於下。以救其血之暴崩也。并血惡之物住後。必須黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之。於補氣升陽湯中加以和血藥便是也。若經血惡物下之不

絕尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根帶也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

黃芩

荆芥穗

蔓荆子巴上各一分

黃藥

知母

藁本

細辛

川芎巴上各二分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風巴上各三分

生地黃

當歸

巴上各五分

甘草

一錢

紅花

少許

右咬咀都作一服水三大盞煎至一盞去粗稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝膚上內廉白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉緩者是也灸三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋

下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎下煩逆渴難少腹急引陰痛股內廉痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如姪身可灸一壯

酒煮當歸丸

治癲疝白帶下症脚氣腰已下如在冰雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目

青藍如菜色目睭睭無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之極也脉沉厥緊而澀按之空虛若脉洪大而澀按之無力猶爲中寒之證况按之空虛者乎按之不鼓是爲陰寒乃氣血俱虛之極也

茴香 五錢

黑附子 炮製去皮臍

良姜 巴上各七錢

當歸 一兩

右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半同煮至
酒盡焙乾

炙甘草

苦練 生用

丁香

已上各 五分

木香

升麻

已上各 一錢

柴胡

二錢

炒黃鹽

全蝎

三錢 上各

延胡索

四錢

右與前四味藥同爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐
子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩冷物

酒濕麵

固真丸

治白帶久下不止。腰腹冷痛。陰中亦然。目中澑火。
視物。毓毓然無所見。齒皆惡熱飲。痛須得黃連細
末擦之乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病皆寒濕乘
其胞內。故喜乾而惡濕。肝經陰火上溢走於標。故
上壅而目中澑火。腎水侵肝。而上溢致目睭睭。而
無所見。齒惡熱飲者。是陽明經中伏火也。治法當
大瀉寒濕。以丸藥治之。故曰寒在下焦。治宜緩。大
忌湯散。以酒製。白石脂白龍骨。以枯其濕。炮乾薑。

大熟辛瀉寒水以黃藥之大寒爲因用又爲鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又爲之伏其所主先其所因之意又寫齒中惡熱飲也以柴胡爲本經之使以芍藥五分導之恐辛熱之藥大甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脉此用藥之法備矣

黃藥

酒洗

白芍藥

已上各五分

柴胡

白石脂

已上各一錢火燒赤水飛細研日乾

乾姜

四錢炮

當歸

酒洗

白龍骨

酒煮日乾水飛爲末

各二錢

右件除龍骨白石脂水飛研外同爲細末水煮麵糊爲丸如雞頭仁大日乾空心多用白沸湯下無令胃中停滯待少時以早飲壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物酒溼麵

烏藥湯

治婦人血海疼痛

當歸

甘草

木香

已上各五錢

烏藥

一两

香附子

二两

右咬咀每服五錢水二大盞去粗溫服食前

助陽湯

一名升陽
燥濕湯

治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如水

生黃芩

橘皮五分各

防風

高良姜

乾姜

郁李仁

甘草

已上各一錢

柴胡

三分

白葵花

七朵

右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至二盞去粗食前稍熱服

水府丹

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癰塊腹中暴痛面有黯黎黑羸瘠

硝砂

紙隔沸湯淋熬取

紅荳

已上各五錢

桂心

另爲末

木香

乾姜

已上各一兩

砂仁

二兩

經煅花藥石

研一兩五錢

班猫

一百箇去頭翅

生地黃汁

童子小便各升一百箇一臘月狗膽一枚

芫靖

三百箇去頭足一糯米丁升炒米黃去米不用

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大株砂爲衣每服一丸溫酒細嚼食前服米飲亦可孕

婦不可服

丁香膠艾湯

治崩漏不止。蓋心氣不足。勞役及飲食不節。所得經隔少時。其脉二尺俱弦緊洪。按之無力。其證自覺脅下如冰。求厚衣被以禦其寒。白帶白滑之物多。間有如屋漏水下時。有鮮血。右尺脉時微洪也。

熟地黃

已上各

阿膠六分

三分

生艾葉一錢

當歸

一錢
二分

白芍藥

已上各

川芎

右川芎爲細末。當歸酒洗剉。熟地黃丁香爲細末。艾亦剉。都作一服。水五大盞先煎。五味作一大盞。零二分去粗入膠。再上火煎至一大盞。帶熱空心服。乏。

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說。其妻經水暴崩不止。先曾損身失血。自後下次縮一十日而來。今次不正。其人心窄性急。多驚以予料之必因心氣不足。飲食不節。得之大方曰。無到彼診。得掌中寒。脈沉細而

緩間而沉數。九竅微有不利。四肢無力。上喘氣短促。口鼻氣皆不調。果有心氣不足。脾胃虛弱之證。胃脘當心而痛。左脇下縮急。有積。當脅有動氣。腹中鳴。下氣大便難。虛證極多。不能盡錄。擬先治其本。餘證可以皆去。安心定志。鎮墜其驚。調和脾胃。大益元氣。補其血脉。令養其神。以太熱之劑去其冬寒。凝在皮膚內。少加生地黃。去命門相火。不令四肢痿弱。

黃連一分

生地黃三分

炒神麴

橘皮

桂枝五分

草豆蔻仁六分

黃芪

人參五箇

麻黃一錢

當歸身一錢

杏仁研如泥五分

右㕮咀作二服。水二大盞半。煎麻黃令沸。去沫。煎至一大盞。入諸藥同煎。至一大盞。於巳午之間。食消盡。服之。一服立止。其胃脘痛。乃胃上有客寒。與大熱藥草。豆蔻丸十五丸。白湯送下。其痛立止。再與肝之積藥。除其積之根源。而愈。

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。時值七月處暑之間。先因勞役。脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡見飲食。非惟不入。亦不思食。沉懶困倦。四肢無力。大便時泄。後再因心氣不足。經脈垂下不正。惟覺氣下脫。其元氣逆上全無。惟覺心腹中氣下行。氣短少。不能言。是無力以言。非懶語也。此藥主之。

柴胡二分

炙甘草

生地黃巴上各三分

橘皮不去白

熟地黃巴上各五分

黃芪一錢五分

蒼术

泔浸去皮

當歸身

白芍藥

白朮

巴上各二錢

右十味㕮咀如麻豆大分作二服。水二盞半煎至一盞。去粗稍熟空心服之。

柴胡調經湯

治經水不止鮮紅項筋急胸膈脊骨強痛

灸甘草

當歸身

葛根

巴上各三分

獨活

藁本

升麻

巴上各五分

柴胡七分

羌活

蒼术

巴上各一錢

紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗立止。

一婦人經候凝結黑血成塊左廡有血痕水泄不止。穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三五行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遺人天殃無致邪無失正絕人

長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之即愈下之即死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者

主有形之物也。前陰者精氣之戶。下竭是病人周身之血氣常行秋冬之令。陰主殺此等收藏之病是也。陽生陰長春夏是也。在人之身。令氣升浮者穀氣。上行是也。既病人周身血氣皆不生長。穀氣又不勝其肌肉。消少是兩儀之氣俱將絕矣。既下元。陰俱脫血氣將竭。假令當是熱證。今下焦久脫化爲寒矣。此病久沉。久降。寒濕大勝。當急救之。瀉寒以熱除濕。以燥大升。大舉以助生長。補養氣血。不致偏竭。聖人立治之法。旣濕氣大勝。以所勝治之。助甲風木上升。是陷下之至治也。

益胃升陽湯

血脫益氣。古聖人之法也。先補胃氣。以助生發之氣。故曰陽生陰長。諸甘藥爲之先務。舉世皆以爲補。殊不知甘能生血。此陽生陰長之理也。故先理胃氣。人之身穀氣爲寶。

柴胡

升麻

已上各五分

灸甘草

當歸身

酒洗

陳皮

已上各一錢

人參

去蘆有根去之

炒神麴

一錢五分

黃芪

二錢

白朮

三錢

生黃芩

少許

右㕮咀。每服二錢。水二大盞。煎至一大盞。去粗稍熱。

服。

○如腹中痛。每服加白芍藥三分。中桂少許。

○如渴。或口乾。加葛根二分。不拘時候。

升陽舉經湯

治經水不止。如右尺脉按之空虛。是氣血俱脫。大寒之證。輕手其脉數疾。舉指弦緊。或澀。皆陽脫之證。陰火亦亡。見熱證於口鼻眼。或渴。此皆陰躁。陽欲先去也。當溫之舉之。升之浮之。燥之。此法當大升浮。血氣切補。命門之下。脫也。

肉桂

去皮盛夏勿用。秋冬用。

白芍藥

紅花

已上各五分

細辛

六分

人參

去蘆

熟地黃

川芎

已上各一錢

獨活根

黑附子

炮製去皮膚

炙甘草

已上各一錢五分

羌活

藁本

去上

防風已上各二錢

黃芪已上各三分

柴胡二錢

桃仁十箇湯浸去皮尖細研

右㕮咀。每服三錢。若病勢順。當漸加至五錢。每服

水三盞煎至一盞。空心熱服。

半產悞用寒涼之藥論

婦人分娩。及半產漏下。昏冒不省。瞑目無所知覺。蓋因血暴亡。有形血去。則心神無所養。心與包絡者君火相火也。得血則安。失血則危。火上熾故令人昏冒。火勝其肺。瞑目不省人事。是陰血暴去。不能鎮撫也。

血已虧損。往往用滑石甘草石膏之類。乃辛甘大寒之藥。能瀉氣中之熱。是血虧瀉氣。乃陰虧瀉陽。使二者俱傷。反爲不足虛勞之病。昏迷不省者。上焦心肺之熱也。此無形之熱。用寒涼之藥驅令下行。豈不知上焦之病。悉屬於表。乃陰證也。汗之則愈。今反下之。幸而不死。暴虧氣血。生命豈能久活。又不知內經有說。病氣不足。宜補。不宜瀉。但瞑目之病。悉屬於陰。宜汗。不宜下。又不知傷寒鬱冒。得汗則愈。是禁用寒涼藥也。分娩半產。本氣不病。是暴去其血。亡血補血。又

何疑焉。補其血，則神昌。常時血下降亡，今當補而升。
舉之心得，益而養，神不昏矣。血若暴下，是秋冬之令
大旺。今舉而升之，以助其陽，則目張，神不昏迷矣。今
立一方，補血，養血，生血，益陽，以補手足厥陰之不足。
也

全生活血湯

紅花 三分

蔓荆子

細辛 已上各五分

生地黃

夏月多加之

熟地黃

已上各一錢

藁本

川芎

已上各一錢

防風

諸陽既附，何以知乏血

葛根

二錢

羌活

已上各三錢

升麻

已上各三錢

柴胡

去苗

獨活

去苗

炙甘草

羌活

草去苗

獨活

去苗酒洗

灸甘草

柴胡

去苗

當歸身

酒洗

葛根

已上各二錢

白芍藥

去苗

升麻

已上各三錢

柴胡

七分

熱服。

當歸附子湯

治臍下冷痛，赤白帶下。

當歸 二分

炒鹽 三分

蠍稍

升麻

已上各五分

甘草 六分

柴胡 七分

黃藥少許爲一
引用上 附子一錢

乾姜良姜各一錢

右爲龜末。每服五錢。水五盞煎至一盞。去粗稍熟。服。或爲細末。酒麵糊爲丸亦可。

調經補真湯

冬後一月微有地泥水泮其白帶再來陰戶中寒。

一服立止

獨活

乾姜炮

藁本

防風

蒼术

巴上各二分

麻黃

不去節土各一錢

炙甘草

人參

去蘆各一錢

當歸身

白术

生黃芩

升麻

巴上各五分

黃芪

七分良姜

澤瀉

羌活

巴上各一錢

柴胡

四錢

杏仁

二箇

桂枝

少許

白葵花

此養去萼

右咬咀除黃芩麻黃各別外都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞零七分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

坐藥龍鹽膏

茴香三分

枯礬五分

良姜

當歸梢

酒防已

木通已上各一錢

丁香

木香

川烏炮已上各一錢五分

大龍骨

炒鹽

紅豆

肉桂五箇

厚朴三錢

延胡索五錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。縣裹留系在外。內丸藥陰戶內。日易之。

勝陰丹

主養芩

大升丸五分

爲上藥力小。再取三錢。內加行性熱藥項下。

柴胡

羌活

枯白礬

甘松

升麻二分

川烏頭

大椒

三奈子五分

蒜七分

破故紙

八分鑿同
煮鹽乾拌

全蝎三箇

麝香少許

右爲細末。依前法用。

廻陽丹

羌活

全蝎

升麻根

甘松二分

草烏頭

水蛭炒已上各三分

大椒

三柰子

草撥

枯礬

已上各五分

川烏 川七分

破故紙

炒黃鹽

爲必用之藥去之則不效

蒜

已上各一錢

蜜虫

三箇去翅足炒

右爲極細末。依前製用。臍下覺暖爲妙。

柴胡丁香湯

二奈子

川烏

七分

治婦人年三十歲臨經先腰脅痛甚則腹中亦痛經縮三兩日

生地黃二分

丁香四分

當歸身

防風

一箇

羌活

已上各一錢

柴胡

一錢五分

全蝎

一箇

羌活

已上各一錢

柴胡

一錢五分

右件都作一服

水二盞煎至一盞去粗食前稍熱

服

延胡索

苦練子

已上各二分

延胡苦練湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘖

一分爲引

延胡索

苦練子

已上各二分

附子

炮引用

肉桂

已上各三分

炙甘草

五分

熟地黃一分

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服
桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黃藥

爲引用

知母

已上各五分

肉桂一錢

艾附子

三錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠熱
服

○如少食常飽有時似腹脹夯悶加白芍藥五分
如不思飲食加五味子二十箇

○如煩惱面上如蠶行乃胃中元氣極虛加黃芪一
分人參七分炙甘草升麻已上各五分

人參補氣湯

治四肢懶倦自汗無力

丁香末二分生甘草梢炙甘草已上各三分

生地黃

白芍藥已上各五分熟地黃六分

人參

防風

羌活

黃藥

知母

當歸身

升麻

已上各七分

柴胡一錢

黃芪一錢五分

全蝎 一箇

五味子 二十箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗
空心稍熱服。

黃芪白术湯

治婦人四肢沉重。自汗上至頭際頸而還惡風頭
痛躁熱。

人參細辛 三分

吳茱萸

川芎 已上各

柴胡

升麻 已上各

當歸身 一錢

○黃藥 洒洗

炙甘草

羌活 已上各

○黃藥 洒洗

炙甘草

羌活 已上各

五味子 三錢

白术

人參 已上各

黃芪 一兩

京三棱

右㕮咀每服五錢水二十大盞生姜五片煎至一盞
去粗食前熱服。

○如腹中痛不快加炙甘草一錢汗出不止加黃藥
一錢

白术茯苓湯

治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絏於脾
胃之間當先實其脾胃

白术

白茯苓

半夏

已上各一兩

炒麴

麥蘖麵

五分炒煙

右咬咀。每服五錢。水二大盞。入生姜五片。煎至一大盞。去粗不拘時服。

增味四物湯

治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

京三稜

乾漆

炒煙盡

肉桂

去皮

廣茂

已上各等分

右爲籠末。每服五錢。水二大盞。煎至一大盞。去粗食前稍熱服。

補經固真湯

白文舉正室。白帶常漏久矣。諸藥不効。診得心包尺脉微。其白帶下流不止。叔和云。崩中日久。爲白帶漏下。時多骨木枯。崩中者。始病血崩。久則血少。復亡其陽。故白滑之物下流。不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養筋骨。以本部行經藥爲引用。爲使。以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋。

益津液。以大辛熱之氣味藥補其陽道。生其血脉。
以苦寒之藥泄其肺而救上熱。傷氣以人參補之。
以微苦溫之藥爲佐而益元氣。

白葵花去萼研爛四分陳皮五分不

生黃芩細研引人參各

郁李仁去皮尖研如泥

甘草炙

柴胡一錢

乾姜細末

人參已上各二錢

右件除黃芩外。以水三盞煎至一盞七分。再入黃芩同煎至一盞去粗空心熟服。少時以早飯壓之。

溫衛補血湯

治耳鳴鼻不聞香臭。口不知穀味。氣不快。四肢困倦。行步歌側。髮脫落食不下。膝冷陰汗帶下。喉中呴呴不得臥。口舌監乾。大息頭不可以回顧。項筋緊。脊強。痛頭旋眼黑。頭痛欠魄。

生地黃

白朮

藿香

黃葉已上各一分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

橘皮

吳茱萸已上各二分

當歸身牛二分

柴胡

人參

熟甘草

地骨皮已上各三分

升麻四分

生甘草 五分 黃芪 一錢

二分

丁香 一箇

桃仁 三箇

葵花 七朵

右咬咀作一服用水二大盞煎至一大盞去粗食前

熟服

立効散

治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

已上各一錢

右剉如豆大白紙裹定泥固炭火燒灰存性爲細

末
○如乾血氣研血竭爲引好溫酒調服加輕粉一錢
○如血崩不止加麝香爲引好溫酒調服

四聖散

治婦人赤白帶下

川烏 炮製

生白朮

已上各一錢

紅娘子 三箇

班貓 十箇

煉蜜爲丸如皂子大綿裹坐之

溫經除濕湯

十月霜冷後。四肢無力。乃痿厥濕熱在下焦也。醋心者是濁氣不下降。欲爲満也。含眼。麻木作者。陽道不行也。惡風寒者。上焦之分皮膚中氣不行也。開目不麻者。目開助陽道。故陰寒之氣少退也。頭旋眩運者。風氣下陷於血分。不得伸越而作也。近火則有之。

○ 吸黃連一分 柴胡 草豆蔻
○ 吸神麴炒木香已上各 二分 麻黃不去節
走獨活 當歸身 黃藥已上各 三分

升麻五分 羌活七分 炙甘草
人參 白朮 猪苓
澤瀉已上各 一錢 黃芪
蒼术已上各 二錢 白芍藥三錢 橘皮

右剉如麻豆大。分作二服。水二盞煎至一盞。食遠服。治肢節沉重。疼痛無力之勝藥也。

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病。診得六脈俱中。得弦洪緩相合。按乏無力。弦在上。是風熱下陷。入陰中。陽道不行。其

證閉目則渾身麻木。晝減而夜甚。覺而開目則麻木漸退。久則絕止。常開其目。此證不作。懼其麻木不敢合眼。致不得眠。身體皆重。時有痰嗽。覺胸中常似有痰而不利。時煩燥氣短促而喘。肌膚亢盛。飲食不減。大小便如常。惟畏其麻木。不敢合眼。爲最苦。觀其色脉形病相應而不逆。內經曰。陽盛。瞑目而動。輕陰病。閉目而靜。又云。諸脈皆屬於目。靈樞經云。閉目則陽道行。陽氣遍布週身。閉目則陽道閉而不行。如晝夜之分。知其陽衰而陰旺也。

且麻木爲風。三尺之童皆以爲然。細校之。則有區別耳。久坐而起。亦有麻木爲如繩縛之人。釋之。覺麻作而不敢動。良久則自己。以此驗之。非有風邪。乃氣不行也。治之當補其肺中之氣。則麻木自去矣。如經脉中陰火乘其陽分。火動於中。爲麻木也。當兼去其陰火。則愈矣。時痰嗽者。秋涼在外。在上而作也。當以溫劑。實其皮毛。身重脉緩者。濕氣伏匿而作也。時見躁作。當升陽助氣。益血。微瀉陰火。與濕通行。經脈調其陰陽。則已矣。非五臟六腑之

東坡集 卷四

本有邪也。此藥主之。

生甘草去腎熱

酒黃蘖瀉火

白茯苓除濕導火

澤瀉除濕

升麻行陽

柴胡助經

蒼朮除濕

草豆蔻仁益陽退外寒

白朮一錢

梔橘皮

當歸身

白术二錢

白芍藥

人參三錢

佛耳草

灸甘草

已上各四錢

黃芪五錢

麻黃桂枝升麻湯
治婦人先患渾身麻木，睡覺則少減，開目則已，而全愈。又治心中煩惱，遍身骨節疼，身體沉重，飲食減少，腹中氣不運轉。

木香

生薑已上各一分

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻仁

厚朴

黑附子

黃蘖已上各二分

炙甘草

升麻

白朮

茯苓

澤瀉已上各三分

黃芪

麻黃

不去
節

人參

已上各
五分

右都作一服。水二盞煎至一盞去粗食還服之。

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云。北方黑色入通腎。開竅於二陰藏精。於腎。又云。腎主大便。大便難者。取足少陰。夫腎主五波。津液潤則大便如常。若饑飽失節。勞役過度。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。伏於血中。耗散真陰。津液虧少。故大便結燥。然結燥之病。不一有熟。

燥有風燥。有陽結。有陰結。又有年老氣虛。津液不足。而結燥者。治法云。腎惡燥急。食辛以潤之。結者散之。如少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者散之。陰結者溫之。仲景云。小便利而大便硬。不可攻下。以脾約丸潤之。食傷太陰。腹滿而食不能化。腹響然不能大便者。以苦藥瀉之。如血燥而不能大便者。以桃仁酒製大黃通之。風結燥而大便不行者。以麻子仁加大黃利之。如氣澀而大便不通者。以郁李仁枳實皂角仁潤之。大抵治病必究其源。不可

一槩用巴豆牽牛之類，下之，損其津液。燥結愈甚，復下，復結極，則以至導引於下，而不通，遂成不救。噫可不慎哉！

通幽湯

治大便難，幽門不通，上衝吸門，不開，噎塞，不便燥，秘氣不得下。治在幽門，以辛潤之。

炙甘草

紅花巴上各一分

生地黃

熟地黃

巴上各五分

升麻

桃仁泥

當歸身巴上各一錢

右都作二服。水二大盞煎，至一大盞去粗調，搘榔細末五分，稍熱食前服之。

潤燥湯

升麻

生地黃巴上各二錢

熟地黃

當歸梢

生甘草巴上各二錢

大黃

桃仁泥

麻仁巴上各一錢

紅花五分

右除桃仁麻仁，別研如泥，外剉如麻豆大。都作二服。水二盞入桃仁麻仁泥煎，至一大盞去粗空心，稍熱服。

潤腸丸

治脾胃中伏火。大便秘澀。或乾燥閉塞。不通全不思食。及風結血秘。皆令閉塞也。以潤燥和血。疎風自然通利矣。

桃仁湯浸去皮尖

麻仁已上各一兩

當歸梢

大黃煨

羌活已上各五錢

右除桃仁麻仁別研如泥。外搗爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空心白湯下。

○如病人不大便。爲大便不通而澀。其邪盛者急加。

酒洗大黃以利之。

○如血燥而大便燥乾者。加桃仁酒洗大黃。

○如風結燥。大便不行者。加麻仁大黃。

○如風濕而大便不行。加煨皂角仁大黃秦艽以利乏。

○如脈澀。覺身有氣澀而大便不通者。加郁李仁大黃以除氣燥。

○如寒陰之病。爲寒結閉而大便不通者。以局方中半硫丸。或加煎附子乾姜湯。米冷與之。其病雖陰

寒之證當服陽藥補之。若大便不通者亦當下服中與。一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法。○若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯躁脉實堅亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱躁躁止勿加。

○如陰躁欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而遲此易爲辨耳知有客邪之病亦當從權加藥以去之。

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾而過振寒項額有時如水額寒尤甚頭旋眼黑目中澑火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當摩有動氣按之堅硬而痛。

青皮

去腐

酒黃連

一分

酒黃蘖

橘紅

甘草

炙

半

黃芪

人參

桂枝

白术

厚朴

柴胡

蒼朮

猪苓

已上各三分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

已上各四分不去節五錢

白豆蔻

炒麴

已上各五分

麻黃

四錢

杏仁

四箇

右咬咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去粗稍熟食遠服此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道爲上盛元氣短少上喘爲陰火傷其氣四肢瘦在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其

肝木又實其母肺金克火凌木是大勝必有大復其證善恐欠多嘆鼻中如有物不聞香臭目視睭睭多悲健忘少腹急痛通身黃腹大眼面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目眞瘡大便不通並宜此藥治之

升陽湯

一名升陽鴻濤湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各二分

生地黃

黃藥

已上三分

當歸身

甘草梢

已上各四分

蒼朮

五分

升麻

七分

黃芪

一錢

桃仁

另研十箇

右咬咀如麻豆大都作二服入桃仁泥水二大盞煎至一盞去粗稍熟食前服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢

一錢

防風

三錢

大黃

濕紙裹煨

羌活

已上各一兩

桃仁

二兩研如泥

麻仁

二兩研如泥

阜角仁

燒存性去皮一兩

五錢

其性得湯則滑濕滑則燥結自除

右除麻仁桃仁別研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃

生甘草

已上各二錢

大黃

煨

熟地黃

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上各一錢

紅花

三分

右咬咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服。

金匱要略

大頭瘡

大頭瘡者，頭皮青紫，大頭日久不消，難散，
或生麻子大無頭五十枚。自數可三兩頭瘡，
本無根，不急之，以手摩之，則快然，亦不放毒，
終

