




外科精義序

嘗聞名臣奏疏對策。多及治之。必取喙于醫。云
保身者肉而元神宜固。外而癱瘓宜防。相因之。



理也。未有元神虛而廢
濟。未有_下虞者。未有癥
得系而元神不_上斷者。
此乃_一善_二也。予又以
治之喻醫。夫_一治修而
_二治之。

外治亦_一庸_二也。夷裔_一滑_二也。
千_一之_二。內治修而外治庸。
昌_一本_二賴_三克_二。當_一尤_二而奏_三垂_二。
崇_一虞_二舜_三征_二。有_一苗_二而臻₃恭₂。
已_一是₂醫₃。有₁內₂外₃科₂而₁坐₂。

首神農掌之。爰禹作經。

寔開弟一世醫學之源。嗣

後名醫代代。推本二聖

人矣。義業其昌。未幾以

感寒。卒于御醫齋矣。

邃于醫學而於外科尤精。

予詒古人醫說之要。予

其平日治法之驗者。題

曰。外科精義。屬予訂正。

因讀之。三復而恍有所得。

焉。夫醫之為義。實難矣。

脉候雖有^各傳。而杳乎入

深。方書雖有^各傳。而艱于

對。病。兼集。欽博。互約。汰
粗。為精。皆古名家。難著。

辨脉論證。一以虛實為

據。系而用。具以驗

種。立^上以察。脈証之虛實

實其虛。其實無以^中作義也

第^タ醫少知^ナ其義。于^テ凡^ツ

癱瘓疔腫諸危症。惟一
之宗。虛實一局。守才藥而
緊以誠。之于人鮮。而為
其。以誤貼此。奉。而。不
傳。于世也。一舉止。釐上

六二。卷其起死回生。亦
帝。每屬罕。秘書修。而。攘
外。默。掌。經。母。之。神。功。原
妙。要。終。脩。脩。舉。活。人。之。妙
用。醫。人。治。園。理。因。予。異。
六三

起沉疴于床蓐而安壽

為之源者豈止是才已

哉蓋天子胞乎民物視

天下之患病疾痛殊疾

瘦瘠。又病瘻乃身皆有

以惕于中而勤其忍。
雖^庄髮膚身體苟^中う^キ以用
多^カ毛^ラ者。且求以濟^テ之^ニ。
全^フ屬^ア將^レ使^シ斯^ノ世^タ躋^リ
矣^ニ域^ミ。多^ラ一^モ不^ト樂^シ生^ジ彼澤^ニ


者。又曰。有孚惠心。疚心。短折。
之患。语云。小为良相。昂
為良医。是其功。
詎小祐也。至于先予。附
患。所謂藥蠱于未病。

此又齊夬醫方三卦外之
滌義也。循此義以治
是。則夷氣清而虜頤消。
外攘之。績怨。內修之。要
務耶。君之仁民愛物。自

尚子天壤

上
下

宣授保全郎陝西等處
醫巫局挖舉馬雲卿辨



外科精義目錄

卷之一

論瘡腫診候入式法

論榮衛色脉參應之法

論持手訣消息法

論三部所主臟腑病證

論脈證名狀二十六種所主病證

論三部脉所主證候

論三部脉所主雜病法訣

論診候肺疽肺癰法

論將護忌慎法

卷之二

論瘡疽腫虛實法

辨瘡腫淺深法

辨膿法

此根參類文去

辨瘡疽癰腫證候法

辨瘡疽善惡法

砭鎌法

貼燙法

溻瀉瘡腫法

針烙瘡腫法

灸療瘡腫法

內消法

追蝕瘡疽腫法

托裏法

止痛法

用藥增損法

療瘡腫權變通類法

論五發疽

論癰疽

論附骨疽

論陰瘡

論時毒

論諸瘡

論丁瘡腫

辨丁腫十三種形色禁忌

論瘰癧治法

論痔瘻

卷之三

漏蘆湯

化毒丹

內消丸

五利大黃湯

內消升麻湯

五香連翹湯

壯礪大黃湯

和血通氣丸

地黃煎丸

槐角煎丸

皂角煎丸

苦參丸

肺風丸

連翹散

竹葉黃芪湯

枳殼丸

五香湯

托裏黃芪湯

托裏茯苓湯

托裏當歸湯

托裏散

內托散

內補散

內塞散

香粉散

止痛當歸湯

黃芪茯苓湯

內補防風散

伏梁丸

溫經丸

木香湯腫湯

升麻湯腫湯

湯腫升麻湯

猪蹄湯

甘艸大豆湯

湯腫湯

洗毒湯

浴毒湯

何首烏散

八仙散

消毒湯

熨風散

應痛丸

黃芪丸

梔子仁湯

葛根牛蒡子湯

通氣散

白丁香散

金銀花散

皂蛤散

十香膏

犀角膏

乳香膏

白龍膏

消毒膏

磨風膏

天麻膏

善應膏

靈應膏

翠玉膏

追毒散

廻瘡錠子

射膿丸

替鍼丸

治療癰

并馬老鼠瘡

翠霞散

搜膿散

引膿散

乳香散

釣苓散

截疳散

抵聖散

青金錠子

白龍散

檳榔散

金黃散

生肌散

水澄膏

拔毒散

金露散

消毒散

卷之四

大檳榔散

天麻散

決効散

水銀膏

平肌散

神黃散

博金散

金傷散

完肌散

定血散

碧霞錠子

漏蘆湯

玉粉散

香礬散

紫金散

通耳丹

菖蒲錠子

寸金錠子

薰痔散

通靈丸

三神丸

玉芝飲子

平和飲子

玄參丸

犀角散

防風散

烏金散

沒藥膏

劉守真瘡論

必效散

烏金散

抵聖丸

應效散

白金散

如聖散

天蛾散

必効散

蛤粉散

治小兒丹瘤

治小兒疳口瘡

治破傷風

并洗頭風藥

鳥龍丸

紫參丸

萬靈丸

治眼

治吹妳

治痔瘡

洗痔

寸金丹

牙疳藥

廻瘡蟾酥錠子

乳香托裏散

四聖旋丁散

天丁散

萬應膏

治小兒面溼瘡

治赤白口瘡

治乾濕疥癬

治湯火燒燙瘡

治破傷風

治破傷

治風狗咬破傷風

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

目錄

東垣十書

目錄

上

部類卷風
部類火熱藥齊
部類寒衣藥
部類白口藥

外科精義卷之一

中醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也。脉者醫之大業也。蓋醫家苟不
明脉則如冥行索途，動致顛覆矣。夫大方脉婦人小
兒風科必先診脉後對證處藥。獨瘡科之流多有不
診其脉候專攻治外。或有證候疑難別召方脉診察。
於瘡科之輩。甘當淺陋之名。噫其小哉。如是原夫瘡

腫之生皆由陰陽不和血氣凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫于診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法略而未詳比夫諸科甚有減裂惠雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覽此則

判然可曉了無凝滯於胸次一朝臨疚診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

○論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脈中衛行脈外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於

脉故曰氣血者人之神也。脉者氣血之神也。所以治病之始五決爲紀蓋五決者五臟之色脉也。脉應於內色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉可以萬全也。凡爲醫先須調明色脉况爲瘡科若於此不精雖聰惠辨博亦不足委也。

○論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平旦爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進氣血未亂經脈未降絡脈調匀故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論內經所謂持脉

有道以虛靜爲保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦左始按寸尺別浮沉以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不調者病謂如室女尼冠脉當濡而弱嬰兒孺子之脉細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至爲平比夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以中指揣按掌後高骨骨下爲關得其關位然後齊下

兩左右二指若臂長人疎排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之下竟消息之中按消息之外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息之一類此若診得三部之中浮沉滑澁遲疾不調何病所主外觀形色內察脈候參詳處治以憲告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽略此醫之庸下也

○論三部所主臟腑病證

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若干里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲陽卽寸口也

關後爲陰，卽尺脉也。陽出陰入，以關爲界。寸主上焦，頭手皮毛關主中焦，腹及腰尺主下焦，小腹及足。此三部所主大略也。又有左右兩手三部爲之六脉也。又有人迎氣口神門所主，又各不同。蓋左手關前曰人迎，右手關前曰氣口。兩關之後一分，卽曰神門。故脈法讚曰：肝心出左肺脾出右腎爲命門，俱出尺部。魂魄穀神皆見寸口。所謂左手關前心之部也。其經手少陰與手太陽爲表裏。小腸合爲府。左手關上肝之部也。其經足厥陰與足少陽爲表裏。膽合爲府。左手

手關後腎之部也。其經足少陰與足太陽爲表裏。膀胱合爲府。右手關前肺之部也。其經手太陰與手陽明爲表裏。大腸合爲府。右手關上脾之部也。其經足太陰與足陽明爲表裏。胃合爲府。右手關後命門之部也。其經手厥陰與手少陽爲表裏。三焦合爲府。此謂六部所主臟腑十二經之義也。又脉要精微論曰：尺內兩旁則委脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹。中附上左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內以候脾。上附上右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候

實中前以候前後以候後上竟上者胸喉中事也下竟下者小腹腰股膝脰足中事也粗大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥竈疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲徇仆諸浮不躁者皆在陽爲熱其有躁者在乎陽諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在乎動一代者病在陽之脉也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身

熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脉氣少者腰瘠痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉行五動爲以大息不大不小不長不短不滑不澀不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平人

之常氣也。所以人常稟氣於胃。故脉以胃氣爲本也。正理論曰。穀入於胃。脈道乃行合靈樞經云。胃爲水。穀之海也。又曰。脈應四時。曰平。信夫。四時之脉。皆以胃氣爲本。謂春弦夏洪秋毛冬石。春之胃脉微弦。曰平。餘皆倣此。逆四時則病矣。若診婦人之脉。妊娠則慎勿亂投湯散。其婦人之脉。診得少陰脉動甚。則有子也。又曰。陰搏陽。則有子也。又曰。身汗而無脉者。卽有姪也。蓋重身者。問其月事。觀其體貌。然後主治。不可忽也。又經曰。察色。按脉先別陰陽。蓋陰陽者。天地

之道也。是以治病者必求其本。本於陰陽寒暑四時。五臟之根也。以脉言之。則浮沉也。以部言之。則尺寸也。故經云。脉者陰陽之法。以應五臟。是謂呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味。其脉在中也。以浮沉論之。則曰浮者陽也。沉者陰也。應在臟腑。則浮而大散者。心也。浮而短濶者。肺也。所以心肺俱浮也。牢而長者。肝也。按之而大舉指來實者。腎也。所以肝腎俱沉也。遲緩而長者。脾也。脾爲中州。所以脉在中也。仲景曰。大浮數動滑。皆陽也。沉濶弱弦微。皆陰也。

陽者熱也。陰者寒也。所以寒則脈來沉而遲。熱則脈來浮而數。故曰諸數爲熱。諸遲爲寒。無如此驗也。脉經曰。諸浮爲風。諸緊爲痛。諸伏爲聚。諸弦爲飲。芤者失血。長則氣治。短則氣病。濇則煩心。大則病進。浮爲在表。沉爲在裏。遲爲在臟。數爲在腑。又形壯脉細。少氣不足以息者。危。形瘦脉大。胸中氣多者。斃。形氣相得者。生。三五不調者。病。三部九候皆相失者。死。此先聖診脉之大法也。故曰凡治病則察其形氣色澤。治之無候其時也。所以形氣相得者。生。色澤以浮者。病

易已。脉從四時者可治。脉弱似滑者。是有胃氣。此皆易治也。若形氣相失。或色夭不澤。及脉逆四時。或脉實益堅。皆不可治。經所謂必察四難。而明告之。又若病熟。脉靜泄。而脉大脫血。脉實汗後。脉躁。此皆難治也。若瘡疽之人。膿血大泄。脉滑數者。難治也。凡瘡膿多。或如清泔。脉滑大散。寒熱發渴者。治之無功也。若患肺瘡者。咳嗽膿血。脉見洪滑。治之難痊矣。大凡診脉見浮數。應當發熱。而反惡寒。雖頭項拘急。四肢煩痛。或復戰慄渴甚者。但有痛處。欲發瘡腫也。

○論脉證名狀二十六種所主病證
夫脉之大體二十六種此診脉之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脉法中撮其機要翦去繁蕪載其精義

○浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太過浮^分脈然見於皮毛間其主表證或爲風或爲虛浮而大散者心也浮而短濶者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡

寒者瘡疽之謂也

○洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救治也

○滑脉之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其主或爲熱或爲虛此陽脉也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始

爲熱而爲虛也

○數脉之診。按之則呼吸之間動及六至。其狀似滑而數也。若浮而數則表熱也。沉而數則裏熱也。又曰諸數爲熱。仲景曰脉數不時見。則生惡瘡也。又曰肺脉俱數。則生瘡也。診諸瘡。洪數者裏欲有膿結也。

○散脉之診。似浮而散。按之則散而欲去。舉之則大而無力。其主氣實而血虛。有表無裏。瘡腫膿潰之後。而煩痛尚未痊退者。診其脉洪滑粗散。難治也。

以其正氣虛而邪氣實也。又曰肢體沉重。肺脉大則斃。謂浮散者也。

○芤脉之診。似浮而軟。按之中央空。兩邊實。其主血虛。或爲失血。瘡腫之病。診得芤脉。膿潰後易治。以其脉病相應也。

○長脉之診。按之則洪大而長。出於本位。其主陽氣有餘也。傷寒得之。欲汗出自解也。長而緩者。胃脉也。百病皆愈。謂之長則氣治也。

○牢脉之診。按之則實大而弦且沉且浮。而有牢堅

之意。若瘰癧結腫，診得牢脉者，不可內消也。
○實脉之診。按舉有_力而類_結曰實。經曰邪氣勝則實。久病則虛。人得此，最忌瘡疽之人得此，宜急下之。以其邪氣與臟腑俱實故也。

○弦脉之診。按之則緊而弦。其似緊者爲弦。如按弦而不移。緊如切繩而轉動。以此爲異。春脉浮弦而平。不時見則爲飲。爲痛。主寒。主虛。瘡疽論曰：弦洪相搏外緊內熱。欲發瘡疽也。

○緊脉之診。似弦而緊。按之如切繩而轉動。其主切。

○痛積癰也。瘡腫得之氣血沉濁也。亦主痛也。
○濁脉之診。按之則散而復來。舉之則細而不足。脉濁則氣濁也。亦主血虛。瘡腫潰後得之無妨也。
○短脉之診。按舉則不及本位。內經曰：短則氣病。以其無胃氣也。諸病脉短皆難治也。瘡腫脉短真氣短也。

○細脉之診。按之則緊。緊如蜘蛛之絲而欲絕。舉之如無而似有。細而微。其主亡陽衰也。瘡腫之病。脉來細而沉時直者。裏虛而欲變證也。

○微脉之診。按之則軟小而極微。其主虛也。真氣復者生邪氣勝者危。瘡腫之病潰後脉微而勺舉。自差也。

○遲脈之診。按舉來遲呼吸定息方得三至。其狀似緩而稍遲。痼疾得之則善。新疾得之則正氣虛憊。瘡腫得之潰後自痊。

○緩脉之診。按舉似遲而稱鈍於遲。仲景曰陽脉浮大而濶。陰脉浮大而濶。陰陽同等謂之緩脉。見長緩百疾自瘳。凡諸瘡腫潰後其脉濶遲緩者皆易

愈以其脉候相應是有胃氣也

○沉脈之診。舉之不足。按之方見如爛綿其主邪氣在臟也。水氣得之則逆此陰脉也。瘡腫得之邪氣深也。

○伏脈之診。比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣。

○虛脉之診。按之不足。遲大而軟輕舉指下豁然而空經。曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也。瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也。

○軟脉之診。按之貳如帛，在水中極軟而沉細。亦謂之濡。其主胃氣弱，瘡腫得之。補虛排膿，托裏。

○弱脉之診。似軟而極微。來遲而似有。仲景曰：微弱之脉，綿綿如瀉漆之絕。其主血氣俱虛，形精不足。大抵瘡家沉遲濡弱，皆宜在裏。

○促脉之診。按之則去，數來時止而復來。仲景曰：陽盛則促。主熱畜於裏也。下之則和。瘡腫脉促，亦急下之。

○結脉之診。按之則往來遲緩，時止而復來。仲景

曰：陰盛則結。經曰：促結，則生；代，則死。

○代脉之診。按之則往來動，則中止，不能自還。因而復動者，曰代脉也。代者氣衰也。諸病見之，不祥。大凡瘡腫之病，脉促結者，難治。而況見代脉乎。

○動脉之診。見於關上，無頭尾，如豆大，厥厥然，而動搖者是也。脉經曰：陰陽相搏，故謂之動。動於陽，則陽氣虛，而發厥。動於陰，則陰氣虛，而發熱。是陽生於尺，而動於寸。陰生於寸，而動於尺。不可不辨也。

○論三部脉所主證候。

○夫寸關尺者脉之位也。浮沈滑濇者脉之體也。奠位分體指文語證者診脉之要道也。脉經曰。大凡診候兩手二部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也。

○寸口脉浮者傷風也。緊者傷寒也。弦者傷食也。浮而緩者中風也。浮而數者頭痛也。浮而緊者膈上寒。肠下冷飲也。沉而緊者心下寒而積痛。沉而弱者虛損也。緩而遲者虛寒也。微弱者血氣俱虛也。弦者頭痛心下有水也。雙弦者兩脇下痛也。偏絕者不遂也。俱絕者不治也。漱漱如羹上肥者陽氣微也。連連如蜘蛛絲者陽氣衰也。

○關主中焦胸腹中事。去來徐而緩者無病也。浮者腹滿而不欲食。胃虛脹也。滑者客熱在胃也。數者熱結中焦也。沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也。弱者胃氣虛也。雖有虛熱不可大攻。須防熱去則生寒也。牢而實者腹滿嚮嚮噎塞而不通。或復大痛澀者氣逆也。芤則瀉血滴堅太實。按之不減而有力者中焦實有結伏在胃也。微浮者積熱不消。

蛇動心悸也

○尺主下焦腰腎膝脛足中事也。尺脉浮者風熱小便難也。沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也。遲者下焦寒而陰虛也。緊者臍下小腹急痛也。緩者脚弱下腫而痿痺也。弱者下冷而腎氣衰也。軟者脚不收而風痺小便難也。伏者小腹痛而疝瘕穀不化也。細者溏泄而下冷也。芤者小便澁血而下虛也。牢而小者足膝寒痺脚下隱隱疼痛也。細而急者筋攣不能行也。來而

斷絕者男子小腹有滯氣也。婦人月水不利也
○論三部脉所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脉所主雜病略而言之。脈經曰。陽邪來見浮洪。陰邪來見微細。水穀之邪來見實堅。寒癖之邪來見弦小。又曰浮而滑者宿食也。短而滑者酒病也。遲而滑者脹滿也。洪而大者傷寒也。浮而數者傷風也。浮而急者飲食不消。脾不磨也。沉而弦者寒氣結而陰痛也。浮而緩者皮膚不仁也。滑而散者癱瘓也。遲而濇者寒癥也。浮而濇者霍亂也。弱而

濇者，反胃也。緊而滑者，吐逆也。短而數者，心痛也。弦而數者，爲瘧也。緊而急者，戶遁也。實小而堅者，病在內而冷也。浮滑而緊者，病在外而熱也。短而急者，病在上也。長而緩者，病在下也。長而弦者，病在肝也。滑而洪者，病在心也。微而軟者，病在脾也。浮而濇者，病在肺也。沉而緊者，病在腎也。又訣曰：諸浮爲風，或爲虛也。諸緊爲痛，或爲積也。諸濇爲痺，諸弦爲飲，諸數爲熱，諸遲爲寒。芤則爲失血，軟則爲虛。若脈沉沉澤澤，四肢不仁者，亡祟也。或大而慄慄者，社祟也。若脉

來乍大乍小，乍短乍長者，鬼祟也。

○論診候肺疽肺痿法

夫肺者，五臟之華蓋也。處于胸中，主于氣，候于皮毛。勞傷血氣，腠理虛而風邪乘之，內感于肺也。則汗出惡風，咳嗽短氣，鼻塞，項強，胸膝脹滿，久久不瘥已成肺痿也。風中於衛，呼氣不入，熱至於榮，則吸而不出，所以風傷皮毛，熱傷血脉，風熱相搏，氣血稽留，蘊結於肺，變成瘡疽。診其脉候，寸口脉數而虛者，肺痿也。數而實者，肺疽也。肺痿之候，久嗽不已，汗出過度，重

亡津液，便如爛瓜。下如豕脂，小便數而不渴。渴者，自愈欲飲者，欲瘥。此由肺多唾涎沫，而無膿者，肺痿也。其肺瘡之候，口乾喘滿，咽燥而渴甚，則四肢微腫。咳唾膿血，或腥臭濁味。胸中隱隱，微痛者，肺疽也。又聖惠曰：中府隱隱而微痛者，肺疽也。上肉微起者，肺瘡也。中府者穴也，在雲門下一寸六分，乳肋間，動脈應手陷中，也是以候。始萌則可救，膿成則多死。若欲知有膿者，但診其脉，若微緊而數者，未有膿也；緊甚而數者，已有膿也。又內經曰：血熱則肉敗，榮衛不行。必

將爲膿。大凡肺瘡當咳嗽短氣，胸滿時睡，膿血久，如粳米粥者，難治。若嘔膿而不止者，亦不可治也。其嘔膿而自止者，自愈。其脉短而濶者，自痊。浮大者，難治。其面色當白，而反面赤者，此火之尅金，皆不可治。

○論將護忌慎法

大凡有瘡疽生，皆只如黍粟粒許大，其狀至微，人多不以爲急。此蘊大患，宜速辨之，不可自忽。若能防之於未形，理之於未成，或朝覺而夕治，求治於良醫，則必無危困矣。若因循慢忽，詢於庸醫，致令膿血結聚，

委之於命。束手待斃。不以去道遠乎。以致筋骨敗遺。
穿通臟腑死者十有八九矣。可不慎歟。蓋患瘡疽之人。托命庸醫。任意措置。危殆立至。若用良醫。則可保。
痊愈。用醫之際。不可不擇。辨之何難。若能飽讀經書。
久諳證候。湯藥熟閑。洞明色脉。性情仁善。孝義忠信。
臨事不惑。處治有決。方爲良醫。委用勿疑。然後要在。
病人自克。不可恚怒悲憂。叫呼忿恨。驕恣情性。信任。
口腹馳騁。勞役惟宜。清靜恬澹。耐煩爲宜。於患人左。
右止息。煩雜切忌。打觸器物。諸惡音聲爭辨是非。呪。

罵鬪毆。及產婦姪男。體氣不潔。帶酒腥羶。鷄犬乳兒。
孳畜禽獸。並須遠離。設或親友重意問疾者。可以預
囑。徐行低聲。欵曲伺候。禮畢躬退。勿令嗟呀驚怪。詬
舊。引其遊賞宴樂。遠別親戚。牽惹情懷。但恐病人心
緒淒愴。尤不可亂舉方藥。徒論虛實。惑亂病人。凝滯
不決。祗令方便省問。不可久坐多言。勞倦病人。深不
長便。夫侍患者。宜須壽近中年。情性沉厚。勤謹耐煩。
仁慈智惠。全在調以粥藥。無失時節。勿令於患人左右彈指。嗟咨掩淚。竊言感激。病人甚不利。便飲食之。

間忌慎非細不可不載。畜中勿食驢馬駝驃猪狗牛、殼羊等。并雜魚龜鱉蝦蟹及淹泡臭陳自死病倒之類慎勿嘗啖。飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷺雀鶴鷺鷺鷺鷺鳩鵠鴉鷄雉及能學人言者慎勿食之。野獸之中忌食獐鹿狐兔虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥菌瓠韭蒜葱薤慎勿食之。果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅輒棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸虫蛷未熟之果慎勿食之。

若其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵪鷗蔓菁薑醬瓜薺蘿蔔及黃白糧米細米稀粥軟飲若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅羹粥羹湯熟軟溫和稀稠得中製造如法勿令大飽此時猶忌饅頭蒸餅餌餉餽餉肉角煎餅及炙燙燠煆煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴登陟臺謝運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡癥平復精神如故氣力完全方無所忌百日

內慎勿觸犯之

外科精義卷之一

總

外科精義卷之二

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展。證候危惡者。須辨虛實。況夫虛者難補。實者易瀉。補瀉之法不可輕用。若或少差。利害甚大。然而虛實證多端。不可不辨。有瘡之虛實。有臟腑氣血。上下真邪各有虛實。故不同也。分而言之。則腫起堅硬膿稠者。瘡疽之實也。腫下軟慢膿稀。

者。瘡疽之虛也。瀉痢腸鳴。飲食不入。嘔吐無時。手足並冷。脉弱皮寒。小便自利。或小便時難。大便滑利。聲音不出。精神不爽者。悉臟腑之虛也。大便硬。小便澀。飲食如故。腸滿膨脹。胸膈痞悶。肢節疼痛。口苦咽乾。煩躁多渴。身熱。脈大。精神昏塞者。悉臟腑之實也。凡諸瘡疽。膿水清稀。瘡口不合聚。腫不赤。肌寒肉冷。自汗。色脫者。氣血之虛也。腫起色赤。寒熱疼痛。皮膚壯熱。膿水稠粘。頭目昏重者。氣血之實也。頭疼鼻塞。目赤心驚。咽喉不利。口舌生瘡。煩渴飲冷。睡語咬牙者。

上實也。精滑不滯。大便自利。腰脚沉重。睡卧而不寧者。下虛也。肩頸不便。四肢沉重。目視不正。睛不了了。食不知味。音嘶色敗。四肢浮腫者。真氣之虛也。腫焮尤甚。痛不可近。積日不潰。寒熱往來。大便祕澀。小便如淋。心神煩悶。恍惚不寧者。邪氣之實也。又曰。真氣奪。則虛。邪氣勝。則實。又曰。諸痛爲實。痒爲虛也。又曰。診其脈。洪大而數者。實也。微細而軟者。虛也。虛則補之。和其氣。托裏也。實則瀉之。疎利。而自導其氣。內經謂血實。則決之。氣虛。則掣引之。

○辨瘡腫淺深法

夫瘡候多端。欲辨淺深。直須得法。若不素知方論。而妄生穿鑿者。如大匠捨其繩墨。以意度量。安能中於規矩哉。嘗聞古人有言曰。多則惑。少則得。簡而論之。則瘡疽槩舉有三種。高而軟者。發于筋骨皮肉。色不相辨者。發于骨髓。又曰。凡瘡疽。以手按撓。瘡腫根牢而大者深也。根小而浮者淺也。又驗其人初生瘡之時。便覺壯熱惡寒。拘急頭痛。精神不寧。煩躁飲冷者。其患瘡疽必深也。若人雖

患瘡疽。起居平和。飲食如故。其疾浮淺也。惡瘡初生。其頭如米粟微似有痛痒。誤觸破之。卽焮展。覺有深意。速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等。取通利疎暢。兼用浴毒湯溻漬之類。若浮淺者。紙貼膏求差。以此推之。淺深之辨。始終之次者也。

○辨膿法

夫瘡腫之疾。毒氣已結者。不可論。內消之法。卽當辨。膿生熟淺深。不可妄開視其可否。不至干危殆矣。凡瘡疽。腫大按之。乃痛者。膿深也。小按之。便痛者。膿淺

也。按之不甚痛者，未成膿也。若按之卽復者，有膿也。不復者，無膿也。非膿必是水也。若發腫都軟而不痛者，血瘤也。發腫日漸增長，而不大熱時，時牽痛者，氣瘤也。氣結微腫久而不消，後亦成膿。此是寒熱所爲也。留積經久，極陰生陽，寒化爲熱。以此潰必多成瘻也。宜早服內塞散以排之。諸癰瘤疣瘻等至年衰，皆自內潰理。于年壯可無後憂也。又凡療癰疽，以手掩其上，大熱者，膿成自輒也。若其上薄皮剝起者，膿淺也。其腫不甚熱者，膿未成也。若患瘰疬結核，寒熱發渴，

經久不消者，其人面色痿黃，被熱上蒸已成膿也。至於臟腑腸胃，內瘡內疽，其疾隱而不見，目既不見，手不能近，所爲至難。可以診其脉而辨之，亦可知矣。有患胃脘癰者，當候胃脉，人迎者胃脉也。其脉沉細者，氣逆則甚，甚則熱聚胃中，而不行胃脘，而爲癰也。若其脉洪數者，膿已成也。設脈遲緊，雖膿未就，已有瘀血也，宜急治之。不爾，則邪毒內攻，腐爛腸胃，不可救也。又肺癰論曰：始萌則可救，膿成卽死，不可不慎也。久久咳膿如粳米粥者，不治，膿而止者，自愈也。又

腸癰論曰。或達臍生瘡。膿從瘡出者。有出臍中者。惟大使下膿血者。自愈也。

○辨瘡疽癰腫證候法

夫瘡疽癰腫其名甚多。載之紛紜。方書百緒。及至臨疾治之。無據。不知所以。內經曰。知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮。愚雖不才。始揣其要。而言之。熱發於皮膚之間。是以浮腫根小。至大不過二三寸者。癰也。六腑積熱騰出於外。肌肉之間。其發暴甚。腫皮光軟。侵展廣大者。癰也。五臟風積熱攻熾于肌骨。

風毒猛暴。初生一頭。如痞癟。白焦枯。觸之應心者。疽也。夫癰發於六腑。若燎原之火。外潰膚肉。疽生五臟沉澁。難療。若陶室之燧。內消骨髓。癰則易療。惟難將息而遲。瘡疽則難療。易得痊復。夫癰與瘡初生。並宜灸之。謂其氣本浮達。以導其熱。令速暢也。疽則焰不宜灸。謂其氣本深沉。須達其原也。凡瘡疽生於外。皆由熱毒蘊於內。明乎三者。腫毒丹癰可以類推矣。蓋皮膚微高起而肌厚。或痛或痒。移走無常者。謂之腫。有因風而得之者。有因風熱相搏而得之者。腫硬色

白因熟而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者久久而不消。熟勝於風若不卽治血不流通與氣乘之以成膿也。又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也。又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒。世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂之瘡瘤。凡丹瘤之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也。小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鑲針所以忌也。又頸腋之間而生核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚久

久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧。有風毒者得於風。熟毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣蘊經所成證候不同治之者亦各異矣

○辨瘡疽善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辨從來醫瘡槩舉五善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之證也。發背腦疽別有善惡之證載之於後蓋七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也。膿血既洩腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡

也。目視不正。黑睛緊小。白睛青赤。瞳子上看。三惡也。
喘麤短氣。恍惚嗜卧。四惡也。肩背不便。四肢沉重。五
惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色
敗。唇鼻青赤。面白四肢浮腫者。七惡也。動息自寧。飲
食知味。一善也。便利調匀。二善也。膿潰腫消。水鮮。不
臭。三善也。神彩精明。語聲清亮。四善也。體氣平和。五
善也。病有謐合。七惡皮急緊。而如善者。病有謐合。五
善而皮緩虛。如惡者。夫如是者。豈淺識之所知哉。只
知五善併至。則善無以加矣。七惡併至。見惡之極矣。

愚意裁之。凡患瘡疽之時。五善之中。乍見一二善證。
瘡亦回也。七惡之內。忽見一二惡證。宜深懼之。大抵
證候瘡疽之發。虛中見惡證者。不可救也。實證無惡
候者。自愈。大凡膿潰之後。而煩疼尚未痊者。診其脉。
洪滑麁散者。難療。微濇遲緩者。易痊。此善惡之證。於
診候之中。亦可知也。發背。膿疽。及諸惡瘡。別有五逆
之證者。白睛青黑。而眼小。服藥而嘔。傷痛渴甚。膊項
中不便。音嘶色敗者。是爲五逆。其餘熱渴痢嘔。蓋毒
氣入裏。臟腑之傷也。當隨證以治之。

○砭鎌法

夫上古制砭石，大小者隨病所宜也。內經謂針石砭石鎌針，其實一也。今時用鎌者，從聖濟總錄丹毒論曰：法用鎌割出血，明不可緩也。合扁鵲云：病在血脉者，治之以砭石。此舉素問血實宜決之，又氣血形志論曰：形樂志樂，病生于內，治之砭石。蓋砭石者亦東方來爲其東方之民，其病多瘡瘍。其法宜砭石。砭石之用自有證候，非止丹瘤也。但見腫起色赤，遊走不定，宜急鎌之。先以生油塗，亦上以鎌鎌之要，在決浪。

其毒然，而此法不可輕用。忌其太深，內經所謂刺皮無傷肉，以其九鍼之用而各有所宜也。砭鎌之法，雖治瘡疽，不可輕用也。

○貼燬法

夫瘡腫之生於外者，由熱毒之氣蘊結於內也。蓋腫於外有生頭者，有漫腫者，有皮厚者，有皮薄者，有毒氣深者，有毒氣淺者，有宜用溫藥貼燬者，有宜用涼藥貼燬者，有可以乾換其藥者，有可以濕換其藥者，深淺不同，用藥亦異。是以不可不辨也。若瘡腫初生，

似有頭者卽當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也。於四畔赤燃處搗生寒藥貼燎之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也。夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥艸膏之類有勢力微欲使厄瘠者敵其勇夫不亦難乎又有罷工不審逆從便用寒藥敷貼趁逐邪毒復入于內歸于肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散腫毒血脉躁通寒熱逆從斷其去就焉慎不可執方無權安能散于鬱結不成膿乎其腫皮厚者以故軟布或以紙花

子塗藥貼燎之待其藥乾換腫皮薄者卽用疎紗或薄紙塗藥貼燎之其藥未乾卽當換之若至膿潰之後卽貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼之藥水調貼之夫血脉喜溫而惡寒若著冷氣過理卽血滯難瘥矣

○湯漬瘡腫法

夫湯漬瘡腫之法宜通行表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日

不退卽須用湯水淋射之。其在四肢者，湯瀆之。其在腰腹背者，淋射之。其在下部委曲者，浴瀆之。此謂疎道腠理，通調血脉，使無疑滯也。且如藥二兩，用水二升爲劑，煎取一升半，以淨帛或新綿蘸藥水，稍熱渴其患處，漸漸喜渴，淋浴之，稍涼則急，令再換，慎勿冷用。夫血氣得寒，則凝澀；得熱，則淖澤。日用五七次，病甚者，日夜不住。或十數次，腫消痛止，爲驗。此治瘡腫，神良之法也。

○針烙瘡腫法

夫瘡疽之疾，證候不同。針烙之法，實非小端。蓋有淺有深，有遲有疾，宜與不宜，不可不辨。蓋疽腫皮厚，口小腫多，膿水出不快者，宜用針烙。癰皮薄，惟用針以決其膿血，不可烙也。如其未成，膿已前，不可以諸藥貼烙，湯瀆救療，以待自消。久久不消，內潰成膿，卽當弃藥，從其針烙。當用火針，如似火筋磨，令頭尖，如棗核樣，圓滑，用燈焰燒，須臾作炬，數搘油燒，令赤于瘡頭，近下烙之。烙不透，卽須再烙，令透。要在膿水易出，不假按抑。近代良醫，倉卒之際，但以金銀鐵錠，其

様如鍼者可通用之。實在泄其毒也。或只以木炭熟火猛燒通赤，薰油烙之。尤妙。烙後實者，撚髮爲紙，虛者以紙爲紙于綿上，薰藥綿之。上以帛攤溫熱軟粘膏藥貼之。常令滋潤勿令燥也。夫瘡疽既作，毒熱聚攻，餓其膏膜，肌肉腐爛。若不鍼烙，毒氣無從而解。膿游無從而泄。過時不烙，反攻其內。內既消敗，欲望其生，豈可得乎？嗟乎！此疾針烙取差，實爲當理。然忌太早，亦忌稍遲。嘗見麓工不審其證，淺深妄施針烙之法。或瘡深針淺，烙毒氣不得泄，以致內潰。或瘡淺烙

深誤傷良肉筋骨腐爛。或抑擦掀動，加益煩痛。或針之，不當別處作頭，或卽時無膿經久，方潰遂使痛中加痛，真氣轉傷。詳其所由，不遇良醫也。以此推之，凡用醫者不可不擇。縱常醫療之，得瘡者幸矣。

○灸療瘡腫法

夫疽則宜灸，不宜烙。癰則宜烙，不宜灸。丹癟腫毒宜溻瀉之。腫皮光軟，則鍼開之以洩其毒。治瘡之手法，追不過此。而各有所宜。故聖惠方論曰：認是瘡疽，便宜灸之。一二百壯。如菉豆許大，灸後覺似燬痛，經中一

宿乃_フ是火氣下徹，脾內熱氣被火導之隨火而出。所
以然也。若其瘡痒宜隔_フ或_フ餅子炙之。其餅須以椒姜
鹽葱相和搗爛捏作餅子厚薄如折_フ三錢以來當瘡
頭或餅子上炙之。若覺太熱即擡起又安其上餅子
若乾更換新者尤佳。若其瘡痛即須急灸壯數多爲
妙。若其膿已成者慎不可灸。即便針開之即得瘥也。
若諸瘡經久不瘥變成瘻者宜用硫黃灸法灸之。其
法硫黃一塊可瘡口大小安之別取少許硫黃于火
上燒用釵尖挑起點硫黃令著三五遍取濃水乾差

爲度。若其發背初生卽宜上餅灸法灸之初覺背上
有瘡疼痒頗異認是發背卽取淨土水和捻作餅子
徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷炙之。一炷一易
餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如錢許大日
夜不往炙以瘥爲度已上數法並依本方一一親驗
所以載之愚謂瘻醫自幼至老凡所經驗必須寫之
嘗記瘻癰惡瘡諸醫不驗者取蠅蠅剪去兩頭安瘡
口上以艾灸之七炷一易不過七枚無不效者又法
用乞火婆虫灸之同前法累驗之神效人皆祕之往

東坡一書
卷二
三
往父子不傳。又法赤皮蒜搗爛。焊作餅子。一如豆豉餅子。炙法。炙之彌佳。

○內消法

夫瘡疽丹腫之生。皆由陰陽不調。榮衛凝滯。氣血不流之所生也。古人有言曰。陽滯於陰。則生瘡。陰滯於陽。則生疽。瘡疽之生。有內有外。內生于臟腑胸腹之中。外則生于膚肉筋骨之表。發無定處。夫鬱滯之本。則因氣血不流。蒸氣不能外達。留滯而成。內熱瘡疽所生焉。若初覺氣血鬱滯皮肉結聚。腫而未潰。特可

疎滌風熱。通利臟腑。一二行徐。次諸湯湯漬。卽得內消矣。不然則治之稍慢。毒熱不散。反攻其內。致令膿血之聚也。內經謂治病必求于本。蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也。其風邪寒氣所聚也。治之宜溫熱之劑。和血令內消也。辨之有法。須認風寒。則腫硬色白。熱毒。則焮腫色赤。以爲異也。如其氣已結聚。不可論內消之法。宜用挑膿托裏之藥。此者先後之次也。

○追餌瘡疽腫法

夫瘡疽生于外。皆由積熱蘊于內。內經謂血熱肉敗。

東坡一言 卷二
榮衛不行必將爲膿，留于節腠必將爲敗。蓋瘡疽膿潰爛之時，頭小未破，瘡口未開，或毒氣不出，疼痛難忍者，所以立追餌膿之方法，使毒氣外泄而不內攻。惡肉易去，好肉易生也。若其瘡紙，其血出不止者，則未可綿于瘡上，參追餌之藥，待其熱可綿方綿。若其瘡紙之痛應心根者，亦不可以強綿之。誤觸其瘡，其燃痛必倍，變證不無不可不慎也。若瘡癧膿成未破于上，薄皮剝起者，卽當用破頭代鍼之劑，安其上以膏貼之。膿出之後，用搜膿化毒之藥，取効如神矣。若

膿血未盡，便用生肌斂瘡之劑，務其早愈，殊不知惡肉未盡，其瘡早合，後必再發，不可不慎也。

○托裏法

夫瘡疽丹腫，結核瘰癧，初覺有之，卽用內消之法，經久不除，氣血漸衰，肌寒肉冷，膿汁清稀，毒氣不出，瘡口不合，成聚腫，不赤結核，無膿外證不明者，並宜托裏。膿未成者，使膿早成，膿已潰者，使新肉早生，血氣虛者，托裏補之，陰陽不和者，托裏調之。大抵托裏之法，使瘡無變壞之證，凡爲瘡醫，不可一日無托裏之藥。

然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

○止痛法

夫瘡疽之證候不同，寒熱虛實皆能爲痛。止痛之法殊非一端。世人皆謂乳沒珍貴之藥可止疼痛，殊不知臨病制宜自有方法。蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱，則痛自止也。寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒，則痛自除矣。因風而有痛者除其風，因濕而痛者道其濕，燥而痛者潤之，塞而痛者通之，虛而痛者補之。實而痛者瀉之，因膿鬱而閉者開之，惡肉侵潰者引之。

之陰陽不和者調之，經絡祕澀者利之，臨機應變方爲上醫，不可執方而無權也。

○用藥增損法

古人用藥因病制宜，治不執方，隨病增損，療積聚補益，可用丸藥以從舊不改方，增損蓋瘡疽危要之際，證候多種，安有執方之論。固可臨時加減，以從其法。只如發背腦疽惡腫，膿潰前後虛而頭痛者，於托裏藥內加五味子，恍惚不安者加人參茯苓，虛而發熱者加地黃瓜蔞根。往來寒熱者，井潮熱者加柴胡，地

骨皮渴不止者加知母赤小豆。大使不通者加大黃芒硝。小便不通者加木通燈艸。虛煩者加拘杞子天門冬。自利者加厚朴。四肢厥逆者加附子生姜。嘔逆者加丁香藿香。多痰者加半夏井陳皮。膿多者加當歸川芎。痛甚者加芍藥乳香。肌肉遲生者加白斂官桂。有風邪者加獨活防風。心驚怯者加丹砂。口目瞞動者加羌活細辛。愚雖不才。自幼及老。凡治瘡疽。常依此法。加減用藥。取効如神。後之學者。宜細詳焉。

○療瘡腫權變通類法

夫瘡疽之病。治療多方。總而論之。各有所宜。補瀉淋渴。及敷掃貼燐鍼鎌炙烙。用之不同。蓋知其道也。舉治必效。昧於理者。利害不無嘗覓。以寒療熱。以熟療寒。古今之通論也。又有換方。療病妄製。加減以意裁之。自以爲可。殊不知病有逆從。治有緩急。法有正權。方有奇偶。用有輕重。夫醫者意也。得其意然後能變通也。達其變通者悟其道。而省其理也。則左右逢其源矣。愚雖不才。略陳萬一。嘗見治寒以熟。而寒彌甚。治熟以寒。而熟彌熾者何也。蓋不知五臟有陰陽之

性。其可_中因其類而取之也。假如心實生熱者當益其腎。腎水滋熟將自除。腎水虛生寒當補心。心火既降寒將自除。此所謂寒之而熱者取之。陰熱之而寒者取之。陽也。又寒因熱用。熱因寒用要在通其理類而已。又聞微者逆之甚者從之何謂也。蓋治寒以熱必涼而行之。治熱以寒必溫而行之。此亦欲其調和也。其間有正有權者何也。蓋病有微有甚。微者逆治理之正也。甚者從治理之權也。然爲瘡科於補鴻汙下標本逆從正權之理烏可闕而不知也。大凡治療瘡

疽之要法曰。初覺熱毒發。熱鬱結而作瘡疽。一二百宜先服五利湯。蕩滌邪氣。疎通臟腑。令內消也。古今湯法謂切剗咬咀。如麻豆大。以猛火急煎。無令過熟。欲其速利也。次有丸散。宣導血脉。漸次消磨。令緩散也。助以淋湯。調和榮衛。行經絡也。更當膏潤溫養。兼磨傅四畔貼燙之藥。順其陰陽也。追餌托裏。汗下調補。臨時製宜。淺深緩急。自有等差。男女貴賤亦當別論。晉尚書褚澄曰。寡婦尼僧。異於妻妾。雖無房室之勞。而有憂思之苦。此深達其情者也。又仲景云。物性

剛柔餐居亦異治亦不同也所以黃帝興四方之間岐伯舉四治之能况病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沉細而煩悶臓腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜卽當用托裡散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

○論五發疽

夫五發者謂癰疽生于腦背眉鬚是也大槩論之分爲三等一者疽也二者癰也三者癧也夫疽初生

如黍米大痒痛有異誤觸破之卽燃展四畔赤腫沉悶牽引脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暉侵展爛漿汁出積日不潰按之則流血者謂之發背疽也其發於腦者爲腦疽也其發於鬚眉者以類呼也又有初生其狀無頭腫濶三四十始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色浮赤而無根腫見于皮膚之間大小一二寸者癧也三者之候惟疽最重此疾初生皆曰滋味與厚衣衣

服厚暖則表易招寒。滋味過多則五臟生熱。臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯。邪氣伏留。熱搏於血。血聚則肉潰成瘡。淺則成癰。實則爲癰。深則爲疽矣。亦有因服金石發動而患此疾者。蓋由上祖曾服餌者。其毒氣流傳藥而亦患此疾者。認是疽則宜速療之。若氣實之人。急子孫此病初生。年幾未五十少壯實者可。服五香連翹湯。漏蘆湯。若年幾未五十少壯實者可。服五利大黃湯。化毒丸。取通利臍腑。一二行瘡頭上。用追毒散之類貼。溫熱膏劑。更溻腫湯。潰毒湯。淋湯。

之如此調治以待。膿成已前不可以諸藥救療。以安患者之心。慎勿惱觸。著至膿成敗潰。宜服五香湯。及內托裏散。茯苓湯。當歸托裏散之類。渴不止者。服竹葉黃芪湯。乳香散。勿爲大熱服。大黃朴硝苦寒之藥。若因服利藥而利不止者。死矣。若瘡中惡肉未退。膿水不快者。卽用追蝕之藥。或錠子。紝之。上用鹿角散。以醋熬爲糊貼之。惡肉退去。好肉漸生。卽用搜膿散。翠霞散之類。紝之。若瘡中毒氣未盡。慎勿早歛。忌早。上生肌之藥。縱得平復。必再發。其間調理次第。臨時。

制宜將護忌慎之法耳

○論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽。然而癰疽何以別之？經所謂榮衛稽留于經脉之中，則澀不行，血脉不行，則陽氣鬱遏而不通，故生大熱。熱毒之氣騰出于外，蓄結爲癰。久而不散，熱氣乘之，腐化爲膿。然而骨髓不焦枯，腑臟不傷敗，可治而愈也。何爲疽？五臟風毒積熱，毒熱熾甚，下陷肌膚，骨髓皆枯，血氣涸竭，其腫色夭堅，如牛領之皮。故命曰疽。癰者，其腫皮薄，以澤。此其

候也。癰疽之生，有內有外。內生胸腹臟腑之中，外生膚肉筋骨之表。凡此二毒，發無定處，而有常名。夫鬱滯之本，始於喜怒憂樂不時，飲食居處不節。或金石草藥之發動，寒暑燥濕之不調，使陰陽之不平，而蘊結外，使榮衛凝滯，而腐潰輕者，起於六腑浮連，而爲癰；氣行經絡而浮也。重者，發於五臟沉滯，而爲疽。氣行經絡而沉也。明乎二者，腫毒丹疹可以類推矣。

○論附骨疽

夫附骨疽者，以其毒氣深沉，附著于骨也。此疾與賊

風相類而不同。人不能辨治之悞矣。蓋附骨疽者由秋夏露卧爲冷折之。風熱伏結附骨成疽。賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹骨髓遇寒則痛甚。附骨疽痛而不能轉。初按之應骨皮肉微惡。洪如肥狀者是也。其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒。時復汗出當欲熱熨痛處卽得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也。賊風不治久而變爲彎曲偏枯所以不同也。認是賊風則服引越脾治風之劑卽得差矣。

認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散。踈下之次用內消升麻湯及湯漬膏貼之類。縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣。異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏于骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽。此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以取消矣。其次調治臨疾制宜故不復具載矣。

○論陰瘡

夫陰瘡者。大槩有三等。一者濕陰瘡。二者妬精瘡。三者陰蝕瘡。又曰。下疳瘡。蓋濕瘡者由腎經虛弱。風濕相搏。邪氣乘之。瘡痒成瘡。浸淫滌汗出。狀如疥癬者是也。妬精者由壯年精氣盈滿。久曠房室。陰上生瘡。赤腫作白。妨悶痒痛者是也。陰蝕瘡者由腎臟虛。邪熱結下焦。經絡痞澀。氣血不行。或房勞洗浴不潔以致生瘡。隱忍不醫。焮腫尤甚。袖瘡在裏。揩手無方。疼痛注悶。或小便如淋。陰丸腫痛者是也。或經十數日。潰爛血腥。肌肉侵蝕。或血出不止。以成下疳。若身體壯熱。

煩渴惡寒。宜急治之。以大豆甘草湯。瀆之。瀆毒湯等。洗浴之。服五香連翹湯。漏蘆湯等。疎之。更以截疳抵聖散。乾糲之。四畔用磨風膏溫潤之。後以將護忌慎之。渴不止者。服竹葉黃芪湯。大便軟者。宜服托裏茯苓。調治之。夫如是。則無不差矣。

○論時毒

夫時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也。其候發於鼻面耳項咽喉。赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛肢體痛甚者。恍惚不寧。咽喉閉塞。人不識。

者將爲傷寒。便服解藥。一二日腫氣增益。方悟始召瘡醫。原夫此疾。古無方論。世俗通爲丹瘤。病家惡言時毒。切恐傳染。考之于經。曰人身忽經變赤。狀如塗丹。謂之丹毒。此風熱惡毒所爲。謂之丹瘤。與夫時毒特不同耳。蓋時毒者。感四時不正之氣。初發。狀如傷寒。五七日之間。乃能殺人。治之宜精。辨之先診其脉。滑數浮洪。沉緊弦濶。皆其候也。蓋浮數者。邪氣在表也。沉濶者。邪氣深也。認是時毒。氣實之人。急服化毒丹。以攻之。熱實以不利。大黃湯下之。其有表證者。解

毒升麻湯以發之。或年高氣弱者。五香連翹湯主之。又於鼻內噙。通氣散。取十餘噏。作効。若噙藥。不噙者。不可治之。如嚏出膿血者。治之必愈。如左右看病之人。日日用噙藥。噙之。必不傳染。切須忌之。其病人每日用噙藥。三五次。以泄熱毒。此治時毒之良法也。經三四日。不解者。不可大下。猶宜和解之。服犀角散。連翹散之類。至七八日。大小便通利。頭面腫起。高赤者。可服托裏散。黃芪散。宜針鎌砭割出血。泄其毒氣。十日外不治。自愈也。此病若五日已前。精神昏亂。咽喉

閉塞語聲不出。頭面不腫。食不知味者必死之候。治之無功矣。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。嘗見龕工但云熟毒。只有寒藥。殊不知病有微甚。治有逆從。不可不審矣。

○論諸瘡

夫諸瘡之生。其類甚多種。大小方書載之。紛紛以要而論。槩舉四等。一者因於氣血稽留而結於內者。謂腸胃之中癰疽是也。二者因於氣血稽留而結於外者。謂十九癰五痔之類是也。三者不因氣血而爲

瘡。謂墮仆。并金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也。四是也。然而四等皆不難。損於肌膚。害於筋骨。不必具載。今於隨方條下。該說治證。以法附之。爲治之者。臨疾制宜。適事爲故耳。

○論丁瘡腫

夫丁瘡者。以其瘡形如丁蓋之狀者是也。古方論之。凡有十種。華元化載之五色。丁千金方說。丁瘡有三種。以至外臺祕要神巧萬全。其論頗同。然皆不離

於氣客於經絡。五臟內蘊毒熱。初生一頭四腫痛。青黃赤黑無復定色。便令煩躁悶亂。或增寒頭痛。或嘔吐心逆。以針刺瘡。不痛無血。是其候也。其候本因甘肥過度。不慎房酒。以致邪毒畜結。遂生丁瘡。內經曰。膏梁之變。足生大丁。此之謂也。其治之法。急於艾炷炙之。若不覺痛者。針丁四邊。皆令血出。以廻瘡錠子從針孔紙之上用膏藥貼之。仍服五香連翹湯。漏蘆湯等疎下之爲効。若或針之。不痛無血者。以猛火燒鐵針通赤。於瘡上烙之。令如焦炭。取痛爲効。亦紙前

錠子用膏藥貼之。經二二日膿潰根出。服托裏湯散。依常療之。以取平服。如針不痛。其人眼黑。或見火光者。不可治也。此邪毒之氣入臟腑故也。養生方云。人汗入食肉食之。則生丁瘡。不可不慎也。

○辨丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫。皆刺瘡心至痛處。又刺四邊。十餘下。令血出去。血傅藥。藥力得入針孔中。則佳。若不達裏。藥力不到。又看口中頰邊舌上。有赤黑如珠子者。是也。瘡上按之。礫痛應心者。是秋冬寒毒久結皮膚中變作。

此瘡不急療之。日夜根長流入諸脉數道如箭入身
顫掉不已。若不慎口味房室死不旋踵經五六日不
差。眼中見火光。心神昏昧。口乾心煩。嘔吐不定。宜速
治之。

○一曰麻子丁。其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微
赤多痒忌食麻子油衣布衣并入麻田中行

○二曰石丁。其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不
入肉微痛忌瓦礫搏石之屬。

○三曰雄丁。其狀炮頭黑膿四畔仰炮漿起有水出

色黃大如錢孔形高者忌房室。

○四曰雌丁。其狀瘡稍黃向裏膿亦似炙瘡四面炮
漿起心凹色赤如錢孔者忌房室。

○五曰火丁。其狀如湯火燒灼瘡頭黑膿四邊有烟
漿又如赤粟米者忌火燒烙。

○六曰爛丁。其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流
出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物。

○七曰三十六丁。其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起
赤色今日生明日生一及至十若滿二十六藥。

所不能治。未滿三十六可治。忌嗔怒畜積愁恨。

○八日蛇眼丁。其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼。大體硬。忌惡眼人看。并嫉妒人見。忌毒藥。

○九日鹽膚丁。其狀大如匙面。四邊皆赤。有黑粟粒起食鹽。大忌。

○十日水洗丁。其狀大如錢。形如錢孔。瘡頭白裏黑。膿汁出中硬。忌飲漿水。水洗渡河。

○十一日刀鎌丁。其狀濶狹。如薤葉大長一寸。左側肉黑如燒烙。忌刺及刀鎌切割。鐵刃所傷可以藥。

治不可亂攻。

○十二日浮漚丁。其狀瘡體曲圓。少許不合。長而狹。如薤葉大內黃外黑。黑處刺之不痛。黃處刺之痛。

○十三日牛拘丁。其狀肉色炮起。指不破。

右十二種丁瘡初起瘡心先痒後痛。先寒後熱。熱定則寒多。四肢沉重。心驚眼花。若大重者。則嘔逆。嘔逆者難治。其麻子丁一種。始末惟痒。初錄忌者不得觸犯。觸犯者發作難治療。其浮漚丁。牛拘丁兩種無所禁忌。縱不療亦不能殺人。其狀寒熱與諸丁不同。皆

宜將護依法治療。禁勿得觸犯。若或觸犯。脊強瘡痛極甚。不可忍者是也。又云。丁腫初發時。突起如丁。蓋故謂之丁。令人惡心惡寒。四肢強痛。一二日瘡變爲焦黑色。腫大光起。根硬刺之不覺痛。皆其候也。在手足頭面胸背骨節間。最急。其餘處則可。毒入腹則煩悶恍惚似醉。如此者三二日死矣。皆不可不速治也。

○論瘰癧治法

夫瘰癧之病。其名甚多。巢氏病源載之三十六種。千

金聖惠所論瘰癧九漏總論說。有風毒熱毒氣毒之異。瘰癧結核寒熱之殊。其本皆由恚怒氣逆。憂思過甚。風熱邪氣內搏於肝。蓋怒傷肝。肝主筋。故令筋畜結。而腫。其候多生於頸腋之間。結聚成核。初如豆粒。後若梅李核。累累相連。大小無定。初覺增寒壯熱。咽喉強痛。腫結不消者。當便服五香連翹湯。或牡礪大黃湯。疎下三兩行。於上貼十香膏。烏犀膏及用淋湯。腫湯。潰毒湯。時復淋湯。如此。救療即得消散。若未消散。可服內消丸。或皂角丸之類。漸以求差。若腫結深。

硬在苒月日不能內消者久必成膿若腫高而稍軟其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法於瘡口中用追毒蝕肉鉗子紝之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘡內經曰陷脉爲瘡留連內腠節此病也可用蒜餅子炙之然後瘡口上用紫金散翠霞散等於上紝貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無造次焉

○論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核疼痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脈腸澼滲漏衝注下部肛邊生瘻變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熟實者服諸利湯疎利臟腑及浴洗薰熨以取內消切忌酒麵辛熱房室肥膩稍縱

嗜欲腐潰膿血。或逗流溼汗。歲月已深。旁穿竅穴。卽變痔漏。卽須用寸金鏹子。三五次痊愈。若能味無味之味。五味足矣。事無事之事。百事備矣。其次服餌調節。謹慎合宜。未有不差者也。

外科精義卷之二 終

