



新
東垣十書
外科精義 三四
二冊

中武 9
133
20止



武
133
卷 20止



外科精義卷之三

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿按

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫。丹瘤癩癧。丁腫魚睛。五發癩疽。
初覺一二日便如傷寒。頭痛煩渴。拘急惡寒。肢體
疼痛。四肢沉重。恍惚悶亂。坐臥不寧。皮膚壯熱。大
便秘瀉。小便赤黃。並宜服之。姓身莫服。

漏蘆

白斂

黃芩

去黑心

外科精義

卷之三



麻黃

去節

枳實

麩炒 去穰

升麻

芍藥

甘州炙

砂硝已上各等

大黃二兩

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七沸去粗空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥

乳香

已上各五錢另研

艸烏頭

醋浸 炮製

浮石

已上各一兩燒赤醋淬七次研餘醋另放

巴豆

四十九粒去皮生用另研

右五味為細末用浮石烏頭餘醋打麵糊為丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或吐出惡為効

內消丸

治瘡腫初生及癰癧結核熱毒鬱滯服之內消矣
大効

青皮

陳皮

已上各一兩

牽牛

八兩取頭末二兩

薄荷葉

極細搗碎汁去粗用熬成膏

皂角

已上各入兩不利者去粗皮搥碎二味水一斗煮令

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用煎膏子和丸

如菉豆大每服三十丸食後荆芥茶清溫水皆可

下

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者

大黃

根

黃芩

去腐

升麻

已上各二兩

芒硝

梔子

已上各一兩二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心

稍熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃

升麻

當歸

黃芩

去腐

枳實

炒去穰

芍藥

已上各二兩五錢

甘艸

炙一兩五錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗食前

稍熱服。

五香連翹湯

如不用五香日七味連翹湯。

治證同前。

沉香

藿香葉

木香

丁香

已上各一兩

麝香

一字五味為粗末另研

連翹

射干

獨活

升麻

甘艸

寄生艸

已上各一兩

大黃

一兩五錢

右七味咬咀與前五味和勻每服五錢水一盞半。

煎至一盞去粗溫服取利為効未利則再服食前。

牡礪大黃湯

治證同前。

牡礪

木香

大黃

煨已上各等分

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分春夏露渴一宿於鷄鳴時空心服之冬月於暖處放一宿婦人重身者勿服此藥決利三兩行便勿服已上五方對證選用。

和血通氣丸

治證同前。

人參 一兩

麥門冬 去心 二兩

大黃

黃芩 去腐

黃蘗 已上各 四兩

牽牛 一斤炒香取 頭末四兩

右六味為細末，鍊蜜為丸，如豌豆大，每服二三十丸，食後溫水送下。尋常積熱之人，隔二三日服此藥，微利潤動，永不生瘡腫。如已早覺者，服之亦得內消矣。

地黃煎丸

治臟腑有熱，胸膈痰實，血氣不和，經絡祕澇，多生

瘡腫，已患惡瘡毒腫，大小便結澇。

生地黃

新者十兩，洗水浸，研如泥。

黃連 五兩

黃芩

去腐 三兩

枳殼 炒去穰

大黃 已上各二兩 五錢

人參 二兩

右除地黃煎外，並為細末，再和地黃煎，和搗入鍊蜜丸，如豌豆大，每服五七十丸，食後溫水下。素有熱之人，日服百餘丸，不發瘡瘍。年高氣弱之人，亦宜常服，清利胸膈，明目。

槐角煎丸

外科精義

外科精義

五

治瘡瘍瘰癧疥癬赤腫等瘡

天麻

川芎

甘艸 炙

黃藥子

甘菊花

人參 已上各一兩

何首烏

苦參 已上各一兩五錢

荆芥穗

防風

已上各二兩

槐角

并仁 另放

皂角

不艸者已上各四兩水一斗煮軟搽汁去粗取仁熬成膏子其皂角取肉研入膏子為用

右除皂角膏外槐仁與諸藥為細末入膏內溲和

鍊蜜為丸如豌豆大每服五十九食後竹葉湯下

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角

不艸者三十錠內十錠炮黑十錠酥炙十錠用水一斗煮軟搽汁用度

何首烏

玄參

薄荷葉

已上各四兩

右為細末與前膏子同鍊蜜為丸如豌豆大每服

三四十丸食後溫水送下

苦參散

出野夫多効方

治遍身瘡疥經年不較

苦參

蔓荆子

何首烏

荆芥穗

歲靈仙

已上各等分

右為細末每服二錢食前酒調下日進三服忌發風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁

苦參

防風

玄參

獨活

枳實

甘菊花

黃連

黃芩

大黃

已上各等分

右為細末煉蜜為丸如豌豆大每服五十丸茶酒

任下食後服

肺風丸

今體治世方

治面鼻風瘡及皴皵

細辛

旋覆花

羌活

已上各一兩

晚蠶蛾

去翅足

苦參

已上各二兩

右為細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十丸茶

酒任下不拘時

連翹散

治瘡瘍癰腫一切惡瘡疼痛煩渴大便溇泄虛熱

不寧カラ

連翹

山梔子

甘艸

防風

已上各等分

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去粗溫服

不拘時候

竹葉黃芪湯

出總錄一百三十一

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉

二兩

黃芪

當歸

川芎

甘艸

黃芩

去心

芍藥

人參

麥門冬

去心

半夏

湯洗

石膏

已上各三兩

生地黃

八兩

右為粗末每服五錢水一盞半竹葉五片生姜五

片煎至一盞去粗溫服

枳殼丸

出總錄

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼

麩炒去穢

牽牛

炒取頭末

木香

青皮

已上各一兩

甘艸

大黃

右為細末用皂角長一尺許者三錠約三兩炮燻

搥碎以好酒煮軟。採取汁熬膏稠粘。和前藥末為丸。如梧桐子大。每服三五十九。食後葱茶下。日進二服。

五香湯 出總錄

治諸瘡毒氣入腹托裏

丁香 木香

沉香

乳香 已上各一兩

麝香

三錢 嘔者去麝香加

藿香 渴加

人參 已上各一兩

右為細末。每服三錢。水一盞。煎至六分。去粗空心。

稍熱服。總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方。大同小異。大抵專治毒氣入腹。煩悶氣不通者。其餘熱渴昏昧。口燥咽乾。大便硬。小便澀者。未可與服。

托裏黃芪湯 出總錄

治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓 去皮

人參

官桂 去白

遠志 去心

麥門冬 去心

五味子 炮

黃芪

當歸 已上各等分

右為粗末。每服五錢水一盞半。煎至一盞。去粗溫服。食前。

托裏茯苓湯

防風

桔梗

芍藥

五味子

川芎

甘艸

麥門冬

去心

桂 去皮

熟地黃

已上各二兩

當歸

黃芪

茯苓

已上各一兩五錢

右為末。每服五錢水一盞半。煎至一盞。去粗溫服。

托裏當歸湯

太醫瘡科何君玉方

當歸

黃芪

人參

熟地黃

川芎

芍藥

甘艸

柴胡

已上各等分

右為粗末。每服五錢水一盞。煎至六分。去粗。食前

溫服

托裏散 出太醫瘡科成子玉方

川烏頭 炮

茯苓

已上各三兩

乾姜 炮

麻黃 去節

甘艸

已上各一兩五錢

杏仁

炒去皮尖

五味子

桂心

已上各一兩

右為粗末。每服五六錢。水一盞半。煎至一盞。去粗。食前溫服。

托裏玄參散 出總錄

主托裏止渴解熱煩渴。

玄參

人參

甘艸 炙

甘菊花 已上各等分

右為細末。每服二錢。菘豆湯調下。亦名內托散。

內托散 洪氏方有芍藥。總錄無芍藥。亦名生肉芍藥。

治癰疽潰後。內虛者。或氣弱人。初覺生瘡。瘍亦可。

服內消宜詳細用之。

當歸

芍藥

黃芪

厚朴 去皮

桔梗

防風

甘艸 炒

官桂 去皮

人參

白芷

芍藥 已上各一兩

右為細末。每服三錢。溫酒調下。或木香湯亦可。

內補散 聖惠六十一。總錄一百三十八。無川芎。

黃芪

麥門冬 去心

川芎

當歸

茯苓 去皮

人參

五味子 已上各一兩 遠志 去心

桂心 已上各五錢 甘草 炙

右咬咀每服五錢水一盞半。生姜三片棗三枚煎八分。溫服無時。

內塞散 總惠一百二十三。萬全方中。去附子。用天雄。

治疔瘻不差諸瘡

附子 二個 炮 官桂 去皮 赤小豆

甘草 炙 黃芪 當歸

茯苓 防風 白芷

桔梗 川芎 人參

遠志 去心 厚朴 已上各一兩

右為末。每服二錢溫酒調下。空心日進二服。

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱

真菘豆粉 三兩 南乳香 一兩

右為細末。每服三錢新水調下。

止痛當歸湯 出總錄一百三十一

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸 黃芪 人參
官桂 芍藥 甘艸

生地黄 已上各一兩

右為粗末。每服五錢水一盞半。煎至一盞。去粗溫服。日進三服。

黃芪茯苓湯 出總錄一百二十七

治諸瘡潰後托裏除虛熱。

黃芪 白茯苓 官桂 去皮
麥門冬 五味子 川芎 已上各一兩

右為粗末。每服五錢。生姜三片。棗一枚。水一盞半。煎至一盞。去粗溫服。食前日進三服。

內補防風散

附子 二箇炮裂去皮臍 防風 茯苓
白芷 桔梗 川芎
當歸 人參 甘艸 炙
遠志 官桂 去皮 黃芪 已上各一兩

厚朴 二兩生薑汁製 赤小豆 半斤酒浸一宿

右為細末。每服三錢。溫酒調下。

伏梁丸

出養生必用方

治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴 生姜汁製

茯苓

枳殼 麩炒去穰

白朮

荆三稜 炮

半夏 湯洗七次

人參 已上各一兩

右為細末。麵糊為丸。如小豆大。每服二十九。食前

米飲湯下。

溫經丸

出前方

治陷脉癭

厚朴 生姜汁製

官桂 去皮

白朮

甘艸 炙

乾姜 炮

木香 已上各一兩

附子 二兩醋浸炮。七次去皮臍。

右為細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。食

後飲湯下。

木香湯腫湯

治諸瘡疽始發腫焮。增長熱痛。

木香

犀角

大黃

梔子仁

升麻

黃芩

黃連

射干

黃蘗

白欽

甘艸炙

礞石

紫檀

羚羊角已上各一兩

右咬咀入生地黃汁五合如無只用生乾地黃五

兩剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝

香五錢淨帛蘸藥熱搗腫上日兩三度冷即再換

升麻湯腫湯

升麻

黃芪

防風

川芎

生地黃

細辛已上各等分

右咬咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋湯內消

如神

濕腫升麻湯出總錄淋濕條下

升麻

芒硝

黃芩

漏蘆

梔子仁

葫蘆已上各等分

右咬咀每用藥二兩水三升煎十沸帛蘸藥湯漬

腫處

猪蹄湯出聖惠方

升麻

甘艸

芍藥

葫蘆 已上各等分

右咬咀。每用藥四兩。水一斗。猪蹄一對。煮蹄軟取
出。次下藥。再煎十沸。帛蘸淋濕之。

甘草大豆湯 出聖惠方

治外陰蝕下。疝瘕瘡腫痛。

甘艸 三兩 赤皮蔥 三莖 大豆 一合

右用水三升。煮豆熟為度。用槐條一握。同煮。取清
汁。熱淋浴。冷即再溫。浸三二時為度。大効。

濕腫湯

芍藥 丹參 黃芩 去黑心

白欬 已上各等分

右咬咀。用藥五錢。水一升。煎十沸。帛蘸頻濕之。

洗毒湯

苦參 防風 甘艸 炙

露蜂房 已上各等分

右咬咀。水煮濃汁。洗瘡腫。

浴毒湯 出拾遺衛生方

治小腸風陰瘡痒痛。

木通

藁本

枳殼

管仲

白芷

荆芥

甘松

薄荷

已上各等分

右咬咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升

熱洗浴瘡

何首烏散

出秘寶生方

治遍身瘡腫痒痛

防風

苦參

何首烏

薄荷

已上各等分

右為粗末每用藥半兩水酒各一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者二日痊愈

八仙散

出衛生方

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒生瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

甘州

地骨皮

已上各等分

右為粗末每用藥二兩水二碗煎十沸去粗熱淋

濕患處

消毒湯

治百雜瘡腫悉能內消

獨活

防風

細辛

藁本

川芎

枸杞子

荆芥

漏蘆

大黃

黃芩

去腐

官桂

苦參

葳靈仙

丹參

黃芪

當歸

芍藥

茯苓

黃連

無心艸

黃蘗

麻黃

葛根

蒴藋

菊花

杜仲

地骨皮

秦皮

茵州

甘州

甘松

藿香

白芷

露蜂房

升麻

零陵香

已上各一兩

蒼朮

三兩

砂硝

五兩

菖蒲

八兩

右為粗末每用藥半兩水二升蔥三莖槐柳枝各一握同煎十餘沸去粗熱淋洗浴此藥用之如神

熨風散 出玉子子中箱集

羌活 防風 白芷

當歸 芍藥 細辛

芫花 吳茱萸 官桂 已上各等分

右為粗末作二劑赤皮蔥連鬚細切半斤同醃醋拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止而已

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮 去皮 當歸 炮 艸烏頭

黑牽牛 已上各一兩

右為細末用醋糊為丸如小豆大每服三十丸空心醋湯送下

黃芪丸

治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛痒或生疥癬

腫焮

黃芪 烏藥 茴香 炒

地龍 去土 川椒 去目 防風

川練子炒

赤小豆

白蒺藜去刺

海桐皮

葳靈仙

陳皮已上各等分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸空

心溫酒送下

梔子仁湯出普濟生靈方

治時氣頭面赤腫

鬱金

枳殼

升麻

梔子仁

牛蒡子

大黃已上各一兩

右為細末每服三錢蜜水調下

葛根牛蒡子湯

治時毒大頭病是也

葛根

管仲

甘艸

鹽豉

牛蒡子已上各一兩

右為細末每服三錢用水調下此疾近代患者傳染多致天柱治之者少得方法只云大熱必然殊不知亦有虛實表裏治之者詳其汗下吐不同太抵與傷寒頗類其中亦有可針鑱砭出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎所

宜時疾也。

通氣散

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病之人用此藥必不傳染。

玄胡 一兩 五錢

猪牙皂角

川芎 已上各 一兩

藜蘆 五錢

躑躅花 二錢 五分

右為細末每用紙捻子蘸一米許經於鼻中取嚏為効。

白丁香散

治婦人吹妳初覺身熱頭痛寒熱及胸乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脉立能自消矣。

白丁香 直者

右為細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服。

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿。

金銀花

四兩無花用苗葉嫩莖代之

甘艸

一兩

右為粗末分爲三服酒水各一盞同煎至一盞去粗溫服無時

皂蛤散

治婦人因露風邪氣外客於乳內始為吹妳積久不消以為妳癰此藥導其汁散其風邪汗出其病自然痊愈矣

皂角

不蛀者燒存性

真蛤粉

已上各等分

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核癰癰疔癩疽痔

沉香

麝香

已上各一錢

木香

丁香

乳香

甘松

白芷

安息香

藿香

零陵香

各五錢同為細末

當歸

川芎

黃芪

木通

芍藥

細辛

升麻

白欵

獨活

川椒

藁本

葛蒲

厚朴

木鱉子

官桂

商陸根

各二兩 剉碎

桃仁

杏仁

栢子仁

松子仁

各五錢

槐枝

桑枝

柳枝

松枝

各二兩 剉

沒藥

輕粉

雄黃

硃砂

雲母石

生犀角

亂髮灰

白礬灰

各二兩 研細末

真酥

猪脂

羊腎脂

各三兩

黃丹

一斤

清芝麻油

三斤

右先於木炭火鍊油香熟下二十六味剉碎藥并
 四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十
 餘沸再以新綿濾過油澄清拭鑊令淨再入火上
 煎油沸下丹用濕柳枝作篔子不住攪熬一日滴
 在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻
 再上火入雲母等粉八味輕煎令沸出火不住攪
 一食時於磁盒內密封收每用量瘡口大小緋帛
 上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服七
 丸空心溫酒送下

犀角膏

當歸

川芎

黃芪

白芷

白歛

杏仁

木鱉子

官桂

乳香

沒藥

已上各一兩

亂髮灰

五錢

黃丹

二斤

清油

五斤

右前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至杏仁白芷焦濾去粗澄清再熬油沸下丹以濕柳木篋子不住攪旋滴藥在冰中如珠不散出火

候一時辰下乳香沒藥并髮灰攪勻於磁盒內收依常法攤用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香

研

珠子瀝青

白蠟

已上各五錢

白膠香

二兩

杏子油

一斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開入油攪勻以綿濾去粗於井花水中持拔白色如銀再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法

攤用之

白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清
血脈消毒散腫通氣脈如神且可無癍痕

輕粉 五錢
另研

白薇

白芷

白歛

黃芪

商陸根

柳白皮

桑白皮 已上各
一兩

乳香 二兩
另研

定粉 另研

黃蠟 已上各
八兩

杏子油 一斤芝
麻油亦可

右七味剉油內搽浸三日於木炭火上煎令白芷

黃色瀉去粗於油中下黃蠟乳香後溶開出火再
瀉候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每
用緋絹上攤用之

消毒膏

當歸

黃芪

川芎

杏仁

白芷

白歛

零陵香

槐白皮

柳枝 嫩者

木鱉子 用仁

甘松 已上各
五錢剉

乳香

沒藥 已上各
三錢

輕粉 一錢

硃砂

硃紅 已上各五分 麝香 一分 黃丹 炒紫色

黃蠟 已上各八兩 芝麻油 一斤

右將剉藥油浸七日。木炭火上煎杏仁焦色。濾去粗。下黃蠟候溶開出火。下丹急攪百十轉。下乳香麝香硃砂等六味。不住手攪至凝。磁盒內收貯。白光絹上攤之。治證如白龍膏之類。貼面目毛髮。宜用之。

磨風膏

治頭面五發瘡腫疥癬等疾。及湯火破傷磨風止。

痛滅癩痕

白附子 白芍藥 白茯苓

零陵香 白芨 白欬

白芷 白檀 藿香

升麻 細辛 黃芪

甘艸 杏仁 去皮尖已 腦子 一分

括萎根 二兩 大括萎 去皮 二兩 黃蠟 六兩

芝麻油 一斤

右先藥十四味剉油內浸百日。於臘日慢木炭火

上銀石器內煎至白芷微黃色離火入括萋二味著火煮百沸重綿濾去粗再慢火上煉油香下削淨黃蠟溶開為度傾在磁器內收貯上糝腦子密封旋用磨風塗之

天麻膏

治疥癬赤禿手足癢皮剝起痛瘙疥瘡侵蝕痛膿汁浸淫滋蔓經久不差者

艸烏頭

釣芩根

木鼈子

用仁

天麻

藜蘆

川芎

狼毒

已上各五錢

輕粉

粉霜

已上各二分另研

臘猪脂

二兩

黃蠟

六兩

油

一斤

右前七味細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去粗上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗磨之大効善應膏 出南京寶梵院明昌六年間進方

當歸

白芨

官桂

白歛

白芷

杏仁

木鼈子仁

已上各一兩剉碎

乳香

沒藥 已上各五錢研 黃丹 二斤 芝麻油 五斤

右先將油煎到藥令白芷焦黃濾去粗再煎油沸下丹用濕柳篦子不住手攪滴在水成珠子住火入乳香沒藥攪勻以磁盒內收貯每用依常法攤用之

靈應膏 出總錄

治五發惡瘡癩癧結核乳癰
鹿角 十兩燒存性 白欬 五兩 白麥飯石 五兩燒醋淬七次
右為細末每用醋中熬如膏厚塗于上中心留

一竅以出其毒以故舊軟布攤之貼未成膿者貼即自消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳用之如神

翠玉膏

治軟癰膿水逗流愈後復發

明瀝青 四兩 銅碌 二兩 芝麻油 三錢
猓猪膽 三箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入水中用手搏搗磁盒內收貯用于緋光絹上量

瘡大小攤貼之不須再換一上便痊可自落為度
追毒散 太醫成子玉方

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂

川烏頭 炮

白乾姜 炮已上各一兩

全蝎 五錢

右為細末用少許糝瘡口中深者紙撚蘸藥紙入瘡內以膏貼之或水浸蒸餅令浸透搗去水和藥須令勻撚作錠子每用紙入瘡口中亦名毒錠子迴瘡錠子

治丁瘡大效

州烏頭 一兩

蟾酥 七厘

巴豆 七粒 去皮

麝香 一字

右為細末麵糊和就撚作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用針深刺到痛處有血用此錠子紙之上用膏貼之丁瘡四畔紙之其丁三二日自然拔出此藥最當緊用

射膿丸

治諸瘡癰膿水已成即當針開決出膿臭惡於則

其治也。若其惡於不出。欲鍼石須當開發。用此藥以射出其膿也。

白礬灰 一錢 砒霜 五分 黃丹 一字

右為末。麵糊為丸。撚作錠子。每用粘瘡頭。欲出處以膏貼之。自潰。

替鍼丸 出保生信効方

治證同前。

陳壞米末 一錢 硃砂 五分 雄雀糞 直者二枚

右為細末。粳米粥丸。如粳米樣。每用一丸粘在瘡

頭上以膏貼之。

治瘰癧并馬老鼠瘡。

銅碌 斑猫 砒霜 已上各五分

右為細末。醋糊為丸。如鼠糞大。每用時。一錠子作三丸。納於瘡口上。以膏貼之。如無瘡口。乾摻之。亦妙。

翠霞散

治百雜惡瘡去毒生肌。

滑石 一兩 銅碌 五錢 輕粉 二錢

東垣十書 卷三 外科精義 三

片腦

麝香 已上各三分

粉霜 一字

右為細末每蘸藥紙於瘡口內以膏貼之或滑石二兩各二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不較惡瘡

白芷 一兩

芎藭 二兩

白芍藥 三兩

輕粉 三錢

右為細末每用乾摻瘡口上瘡口深者紙之

引膿散

治證同前

瘡癩狼毒

釣苓根

無心艸根

白丁香 已上各五錢 麝香 一字

右為細末如前法用治之

乳香散

治證同前

白乾姜

苦丁香

艸烏頭 已上各五錢

釣苓根

狼毒

乳香 已上各一兩

右為細末每用乾糝之或唾調作錠子紙入瘡內

東垣十書 卷三 外科精義

即愈。

釣苓散

陳官寶方

治證同前。

井鹽 一兩

無心艸

乾姜 已上各二兩

釣苓根 三兩

右為細末。每用乾糝之。或唾調少許塗在膏上。就貼之。

截疔散

治年深疔瘻瘡大效。

蜜陀僧

白欽

白芨

黃丹 已上各一兩

黃連 五錢

輕粉 一錢

腦子

麝香 已上各五分

右前四味為細末。後四味別研極細。和勻為散。每用或糝或紙瘡口中以膏貼之。

抵聖散

治耳中膿。經年不愈。及驢涎馬汗攻焮瘡瘍骨疽疔瘻等瘡。

白礬灰 一兩

烏魚骨 三錢

乳香 二錢

乾胭脂
 輕粉 已上各五錢
 麝香 五分
 右為細末。或糝或絛。以膏貼之。如有耳膿者。用一
 字。絛耳中。

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快者。及多年疔瘻瘡愈而復發。
 白丁香
 銅青
 硃砂
 粉霜
 輕粉 已上各五分
 麝香
 龍腦 已上各一字
 右為細末。麵糊為丸。搥作錠子。每用絛入瘡口中。

膿水出快

白龍散

主生肌止痛。及耳中卒然大痛。
 寒水石 四兩燒半白研
 烏賊魚骨 研
 滑石 已上各一兩研
 鵬砂 三錢
 輕粉 一錢
 右為細末。每用乾糝耳中痛者。油調如糊。滴絛於
 耳中。痛立止。

桃紅散

主斂瘡。生肌肉。定血。僻風邪。

滑石

四兩

寒水石

燒二兩

小豆粉

一兩

乳香

輕粉

已上各一錢

右為細末。每用乾糝。血不正者。和燈州貼瘡口上。以帛封之。

檳榔散

治久患惡瘡肌肉遲生

木香

黃連

檳榔

已上各等分

右為細末。每用乾糝之。

金黃散

出九籒衛生方

主消腫散毒生肌止痛

黃連

大黃

黃芪

黃芩

黃蘗

鬱金

已上各一兩

甘艸 五錢

龍腦

伍分 另研

右為細末。入龍腦研勻。若治濕毒丹腫。新水調掃。赤上。或蜜水調。如稀糊。用小紙花子貼之。或小油調掃。如久不差。熱毒瘡。赤乾糝。或水調塗。亦佳。

生肌散

主斂瘡大效

寒水石 燒

滑石 已上各二兩

龍骨

烏魚骨 已上各一兩

蜜陀僧

枯白礬

乾胭脂

定粉 已上各伍錢

右為細末用藥乾糝瘡肉上

水澄膏

治熱毒腫痛大效

大黃

黃蘗

鬱金

天南星

白芨

砒硝

黃蜀葵花 已上各一兩

右為細末。每用新水一盞半。藥末二錢攪調勻。候澄底者。去浮水。以紙花子攤於腫焮處貼之。如急燥津唾潤之。此藥治熱毒赤腫神效。如皮膚白色者勿用之。

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定。

寒水石 生用

石膏 生用已上各四兩 黃蘗

甘州 已上各一兩

右為細末。每用新水調掃之。或油調塗之。或紙花

子小貼亦妙涼水潤之

金露散

出普降
生靈方

治時氣熱毒

寒水石 生用一兩 黃蘗 一兩

白芨

白歛

雄黃

已上各二錢五分

右為細末無根水調以紙花子貼或搗亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石 一斤

黃蘗 二兩

黃丹 一兩

乳香 五錢

輕粉 三錢

右為細末每用乾糝或燒湯及下注賺瘡風濕疥癬等瘡油調塗之

外科精義卷之三 終

外科精義卷之四

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣投保全郎陝西醫局提舉馬雲卿技

大檳榔散

成子玉方

治乾濕疥癬

硫黃

黑狗脊

已上各五錢

輕粉 一錢

紅娘子

大檳榔

已上各一箇

右爲細末。每用藥末半錢於手掌中。臨卧時。油調如糊。兩手搓摩極熱。鼻內聞之。及摩擦疥上。隔日

再用甚者不過三上必驗。

天麻散

治白秃甜瘡及風毒疥癬

藜蘆

天麻

狼毒

白芷

茵艸

釣苓根

艸烏頭

管仲

細辛 已上各五錢

雄黃 二錢

輕粉 一錢

右為細末。每用藥半兩。紙一重。綿裹油二兩。浸三日。外蘸指擦患處。如稍乾。添油一兩。添至二兩。換

藥其効如神

決効散

治風痒頭瘡

管仲 三兩

白芷 一兩

右為細末。油調塗之。

水銀膏

治癩瘡疥癬無名惡瘡。但是手足瘡疥浸淫多。汁久而虫生。塗之神効。

藺茹 剉

黃蠟 已上各一兩

黃連 剉

蛇牀

微炒

白礬枯

水銀

已上各二兩

右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去粗再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不斂者

蜜陀僧

花藥石

二味同煨赤色

白龍骨

已上各一兩

黃丹

乳香

黃連

已上各二錢五分

輕粉 一錢

右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾糝之

神黃散

治一切熱腫攻焮疼痛

黃蘗末 一斤

黃丹 二兩炒紫色

雄黃 一兩另研

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾以蜜水潤之

博金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬

與蜜陀僧同為末相和於沙鍋內火上炮汁盡

蜜陀僧

已上各五錢

白堊

二錢

黃丹

輕粉

已上各一錢

乳香

五分

麝香

一分

右為細末。先須別用槐枝蔥白鹽甘艸熬湯淋濕洗一二時。淹乾。上項藥每用藥先須洗浴然後糝藥甚者三五次差。

金傷散

治刀鎌斧傷。僻風止痛生肌。

白芨

三兩

陳石灰

風化

桑白皮

黃丹

已上各二兩

白附子

天南星

龍骨

已上各一兩

右為細末。每用乾貼之。

完肌散

治證同前。

蜜陀僧

桑白皮

新者

龍骨

已上各四兩

陳石灰

二兩

黃丹

五錢

麝香

一錢 另研

右為細末。每用乾糝之。

定血散

治證同前。

黃丹 一兩

烏魚骨

白礬灰

龍骨 已上各二兩

蜜陀僧 半斤

桑白皮 一斤

右為細末。每用乾糝定血如神。

碧霞錠子

太醫陳官寶方

治惡瘡透不覺疼痛

銅碌 一兩

硃砂 二錢

膽酥 一錢

右為細末。軟米飯一處擦勻。搥作錠子。粳米樣。每用針刺之。不覺痛者。但有血出。維一錠子在內。以

膏貼之。或作散。以紙撚蘸。維之。亦可。臨證看如何。宜合用度。

漏蘆湯

治婦人吹妳初覺

漏蘆

練實

大黃

黃芩

芍藥

甘艸

已上各五錢

右為麤末。每服三錢。水一盞半。煆艸三十莖同煎。至一盞。去粗。溫服。無時。

玉粉散

出蘇沈標方

治陰瘡浸淫不止

白礬灰

定粉

已上各等分

右研細末先洗浴淨淹乾敷之

香礬散

治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中

枯礬 五錢

龍骨

黃丹 已上各一錢

麝香 少許

右為細末每用乾糝之

紫金散

治瘰癧久不差者

枯礬 五錢

砒霜 一錢

石膽 五分

右為細末入黃丹二錢每用紙入瘡口內以膏貼之如未被者灸一兩炷用津唾旋調一豆許安瘡上以膏貼之去根自平復

通耳丹 盧全寶傳

治耳聾

桑螵蛸

安息香

阿魏 已上各一錢五分

硃砂 五分

革麻子仁

大蒜

芭豆仁 已上各七箇

右為細末入二仁與蒜同研爛為丸如棗核樣每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即取出親驗方

菖蒲錠子 一名菖蒲散

治耳中卒痛

菖蒲 附子 炮去皮臍已上各二兩

右為細末每用油調滴耳內立効

寸金錠子 太醫成子寶方

治瘰癧疾

藤黃 雄黃 雌黃

硫黃 輕粉 粉霜

麝香 砒霜 黃丹 已上各一錢

牡礪粉 紅藤根 乾漆 已上各五錢

右為細末研勻燒陳米飯和搗為丸如棗核大每用一丸內肛門中深二寸許放定令用新磚毬子二箇炭火燒赤醞醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也

薰痔散

歲靈仙 三兩

右用水一斗半煎至七八沸去火就盆上坐令氣薰之候通手淋湯冷即再暖

通靈丸

治耳聾

松脂 五錢

巴豆 二十四箇
去皮研

右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿裹塞耳中覺痛取出赤水為効

三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比冰霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脉橫解腸澀為痔治之故不同也

枳殼 炒去穢

皂角 燒存性

五倍子 已上各等分

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三二十九丸溫水食前服養生必効方中三味皆單用一味為方今增為一方其効如神

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘艸 炙二兩

藿香葉

石膏 水飛

山梔子仁 已上各一兩

右為細末每服一錢新酒調下

平和飲子 出顯頤經中

治小兒瘡疹

人參

白朮

茯苓

甘艸

升麻 已上各等分

右為細末每服一二錢水煎去粗溫細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疹煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

玄參丸 出僧居泰傳

治口瘡連年不愈者

天門冬 去心 麥門冬 去心

玄參 已上各等分

右為細末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸噙化

犀角散

治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻

桔梗

甘艸 炙已上 各一兩

牛蒡子 炒四兩

右為細末每服三錢水一盞入竹葉五七斤煎至七分去粗細細熱嗽温即嚥之其粗熱掃項腫上防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注攣急及皮膚瘙痒麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風者大小法宜以意酌之藥本木煎去味羌活

地骨皮

荆芥穗 已上各五錢

右為細末每服三錢温酒調下

烏金散

治疔瘻惡瘡

麝香

蟾酥 已上各一字

粉霜

硃砂

輕粉 已上各一錢

銅碌

砒霜

白乾姜

艸烏頭

天南星

船上硫黃 已上各五錢

右為細末紙撚經之或湯浸蒸餅和為錠子經瘡

口內上以膏貼之

○劉守真瘡論

素問云痛痒瘡瘍癰腫疽疹癩氣結核拂鬱甚者皆
 熱五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰近于火
 氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用
 也人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則
 生瘡腫然肺主氣候于皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠
 開為風濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒
 熱毒氣客于經絡使血澀而不通壅結成腫風邪不

作即無頭無根寒血相搏作者即有頭有根壅盛則
 為膿赤根腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒
 則為虛非虛為寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也
 故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火潰之以
 湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮
 膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚
 痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽
 氣鬱結不能散拂熱內作故也瘡瘍皆為火熱而反
 腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰為污水

也潰而腐爛者水之化也。癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也。瘍有頭小瘡也。疹浮而小癢疹也。瘡氣赤癰丹燥熱勝氣火之色也。

沒藥膏

治一切癰疽發背瘡癤傷折跌壞膿生肌止痛又貼灸瘡極妙

麒麟竭

明乳香

沒藥

已上各一分研

當歸

去蘆

木鱉子仁

研

杏仁

已上各五錢

油頭髮

二兩

黃丹

六兩

右先用油一斤石器內或沙鍋內露天底鍊油令熟先下木鱉子當歸杏子頭髮慢火熬黃焦油耗五分離火用綿濾粗不用再入鍋下黃丹以新柳篋子十條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬軟得所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以盆合一宿出火毒用時或帛上或紙上攤一日一換必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂 二分

輕粉 一錢

麝香 五分

班猫

四十箇 去頭翅

巴豆

五箇去皮心膜

白檀榔

一箇

右同研極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在雞子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人每服半錢實人每服一錢並用炒生姜酒下五更初服藥至天明取下惡物如覺小腹內疼痛使用蘇麻子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸其取下惡物如爛肉老鼠兒及

新成卵內雀兒是藥効婦人有胎不可服
烏金散

治癰瘡腫硬無頭不變色者

米粉 四兩

蔥白 一兩 細切

右同炒黑色杵為細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次消為度

抵聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫

苦苧蘆

不以多少于火上隔紙炒過

右杵為細末，棗肉為丸。如小豆大，每服十丸，煎麻子湯下。食前日進三服，五七日小便多，腫消為效。如喘嗽煎桑白皮湯下。忌生冷醋滑物及鹽須別丸。一等小丸兒與小丸服。看大小加減與服。煎棗肉湯下。

應効散

治氣癭疔瘡多年不効者

地骨皮

不以多少冬月自取只要皮陰乾

右杵為細末，每用紙撚蘸，縫瘡口內，頻用自然生

肉，更用米飲調二錢，無時日進三服。又名托裏散。白金散。

治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黃水出者。

桂府滑石

右為細末，先用虎杖、甘艸、豌豆各等分，約半兩許。二椀水煎上項三味，至一椀去粗微熱，淋洗瘡水。冷拭乾，上糝滑石末，令通便睡至明決愈。

如聖散

治渾身瘙癢。抓之成瘡。及癩疹之類。

蠶沙 一升

右用水二斗。煎至一斗。濾去粗。夜卧避風處。淋洗。水冷。卽拭乾。便睡。

天蛾散

治刀斧傷。止血定痛。生肌。

晚蠶蛾 不拘多少

右爲細末。每用藥貼於瘡口上。用綿裹。不須再動。一上便可。

必効散

治蜘蛛咬著疼痛。

鹽豉 炒乾

右爲細末。每用油調塗之。必効。

蛤粉散

治湯火燒瘡。

蛤礪 燒赤放冷

右研如粉。每用油調塗之。日三次。

治小兒丹瘤。

木鱉子

新者去殼

右研如泥。淡醋調。傳之。一日三五次。便效。

治小兒疳口瘡

天南星

一箇去皮

右為末。好醋調。攤在紙上。男左女右。貼在脚心底。以帛繫定。三日。外取了。以溫水洗盡。脚下藥。

治破傷風并洗頭風藥

麻黃

一錢去節

蝎稍

二錢五分

蠻姜

黑附子

炮去皮

白附子

天麻

烏梢蛇

好酒浸二夜去骨。火上炙黃色。

川芎

已上各五錢

右為細末。每服一錢。熱酒調下。日進三五服。重者三五日必效。此證不宜早治。但邪氣入臟則難治。治有四死證不可治。一頭面青黑色。二額上有汗珠不流。三眼小目瞪。四身上汗出如油。

烏龍丸

治遍身風瘡。癢痒疥癬等疾。服之消風散熱。利膈化痰。唾治肺氣不和。此藥推陳致新。去腸垢。治證

甚多。要能用度。

皂角 肥者不以多少炙刮去皮弦槌碎水
採取濃汁去粗銀石器內熬成膏另放

黑牽牛 不以多少微炒令
香熟碾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五
十九丸氣虛者一二十丸食後溫水送下無病氣實
人一兩箇月頓一服取利三五行不傷正氣身體
輕健肌膚光澤永無風痰疥癬之疾

紫參丸

治熱毒瘰癧腫毒未成者內消已潰者行膿止痛

散腫毒

麝香 另研

膩粉 已上各
三錢

紫參

苦參 炒已上
各一兩

丹參 一兩
五錢

連翹 二兩

滑石 二兩
五錢

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日搽
取汁去粗用皂角子三百箇煨熟為末用玄參酒
熬皂角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一
丸以黃芪湯下一日加一丸至患人歲數即住如
四十則二十每日減一丸其瘡自乾已結者內消

也服此藥大有神効

萬靈丸

治背腦疽并一切惡瘡初覺一二日

硃砂

血碓

蓮蕊

已上各等分

麝香 少許

右為細末酒糊為丸如黃米大每服七丸温酒送下瘡在上食後在下食前不過二服即効

治眼

治昏澀退翳膜

川椒

四兩去子合者不用

熟乾地黄

二兩酒浸九蒸九曝

甘菊花

二兩五錢

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸食後細嚼新折米十餘粒送下

治吹妳方 田仲寬方

治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効

生姜

一兩去皮

大黃

甘草

已上各五錢

苴萋

一箇去皮

右共搗作一塊以水半椀同煎至七分濾去粗入

沒藥乳香末共二錢半通作一服

治痔瘡

雄黃 五分 細研

五靈脂 去石燒 過斷烟

五倍子 炮已上 各一錢

沒藥 二錢五分 明淨者

白礬 半飛 半生

右為細末研令極細用紙花子貼瘡口上

洗痔

防風

當歸

川芎

已上各 等分

右三味剉細煎水去粗令熟溫淋洗瘡用軟帛印

乾傅前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽

丸六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿

示此方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下

便活如口噤但幹開牙關研下三丸灌下喉中立

生此方治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時

飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香 一分

南乳香

烏金石

輕粉

雄黃

狗寶

沒藥

已上各一錢

蟾酥

二錢

粉霜

黃蠟

已上各三錢

硃砂

五錢

鯉魚膽

乾用

狗膽

已上各一箇乾用

金頭蜈蚣

七條全者酥炙黃色

頭首兒孩兒乳

一合

右件為末。除黃蠟乳汁二味熬成膏子。同和丸如菘豆大。小兒丸如芥子大。每服一丸。病重者加三丸。白丁香七箇研爛。新汲水調送下。用衣服蓋之。睡勿令透風。汗出為度。大段疼痛如無頭瘡腫。不過三服立效。服藥後喫白粥菰蘆就服大妙。

牙疳藥

此藥是京兆惠民局見行經驗方

治大人小兒

揀信

青黛

輕粉

已上各一錢

麝香

五分

右同為細末。用小油調薄攤紙上。用木鎚鎚實收。起每用臨卧。以漿水洗淨印乾。可瘡口大小。以藥紙封之。至曉去藥紙嗽淨。勿令嚙下。大者不過三。上必効。

廻瘡蟾酥錠子

馬雲卿親傳經驗方

治丁瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶活三四况瘡初發無有不効大抵丁瘡生于四肢及胸背頭項骨節間唯胸背頭項最急初生痛痒不常中陷如丁蓋撼之有根壯熱惡心是也。

天南星

欵冬花

巴豆仁

黃丹

白信

已上各一錢

獨活

五分

班猫

去頭足十箇

右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大熬作錠子每遇丁瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅之膿出自差

用錠子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

乳香托裏散 同前所傳

治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疎利後服之大効

御米殼 去隔帶萹 蜜炒三兩

當歸

芍藥 已上各五錢

沒藥

乳香 已上各一錢

右為麤末每服五錢水一盞半煎至七分去粗溫服病在上者食後在下者食前若未止即再服

四聖旋丁散 各醫秘傳經驗方

治丁瘡生于四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根

巴豆仁 五分 白殭蠶 輕粉

硃砂 已上各二錢五分

右為細末醋調用之

天丁散 同前秘傳經驗方

治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之惡服托裏內消

山丹花藥 香白芷 已上各二錢 牛蒡根 春採 去皮

天丁 乃皂角刺

蒼耳芽

大力子 已上各五錢

雄黃 一兩

右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之丁瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可

萬應膏 同前所傳

治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏可腫痕貼之煎蔥白水熱淋兩炊時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂聚膿決然早差

黃蘗

芍藥

白芷

黃芪

木鱉仁

杏仁

當歸

白芨

生地黃

官桂

玄參 去皮剉碎

沒藥

乳香 已上各五錢研

白欵

黃蠟 已上各一兩

黃芩

大黃 已上各二兩

黃丹 一斤

芝麻油 二斤半

右件十四味入油內浸一宿絕早入沙鍋慢火熬用生柳條攪至申時以焦褐色出火去粗粗又以重綿濾過入丹再熬旋滴水中成珠子不散者出

入絕烟入乳香沒藥黃蠟攪勻用瓦器收貯於土
內埋七日取出攤用。

治小兒面漣瘡

俗云鍊銀瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過
度多生此瘡。

百藥前 五錢

生白礬 二錢

右為細末小油調旋搽之神效。

治赤白口瘡

大人飢渴不時小兒失驚即生口瘡

生白礬 一錢

右噙嗽之從瀝頑涎立効

治乾濕疥癬

此是肺受邪毒運於四肢久而不散以生肉蠹

硫黃 一兩

生白礬 八錢

右為細末油調火炙抓破塗之立効

治湯火燒燙

無問新舊

青槐枝 一兩
剉碎

菜豆粉 一兩炒
黃色
輕粉 一錢

右同為細末。油調塗之。止痛滅毒。

治破傷風

手足顫掉不巳者。

硃砂

另研

南星

姜製

獨活

去皮已上各二錢

人手足指甲

燒絕烟

六錢

右為細末分作三服。酒調服之。立効。

治破傷

無問新舊

石灰

右用一味。驗瘡口。大小儘乾塗之。不須封裹。神効。

治風狗咬破傷風

此病非為小可。及九死一生之病。可急用。

好班猫

七箇去翅足

右為細末。酒調服之。於小便盆內見衣沫似狗形。

者為効。如無再服七次。雖無狗形。亦不再發也。此

方累試經驗。今附于此。

治湯火瘡羊髓和膏塗之神良千金方如治金瘡及諸惡瘡依上塗傳大効

礬石 卽白礬

凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕惡瘡去鼻中瘻肉生含嚙津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿水者以筒吹一字於耳中以綿塞之立効又治諸毒虫惡獸咬傷傳之則差千金方以醋煮湯潰蝟螫立差王氏博濟治驢馬汁毒傷人瘡腫痛和黃丹傳之靈苑方治傷折瘡腫以沸湯投枯礬

黃漬浴之御藥院方治陰汗以枯礬投沸湯中浴之

水銀

主疥癩痂傷白禿入膏令膏冷凝下之攪令勻散如星勿令沉聚

水銀粉 卽輕粉

主瘰癧殺疥癬虫酒鱗風以全髓和如膏塗及貼廉瘡一上可

石灰

主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要方治風疹

以漿水調熱掃之隨手差孫真人治疥淋石灰水
溫洗之千年者尤佳

白麥飯石

即麤理黃石

曾磨刀者佳凡用須醎醋淬之令屑落醋中者良
亦單用治發背神良本草曰大凡石類多主癰疽

花藥石

主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或只刮花藥石
末効

黃芪

主癰疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠瘻止渴聖惠
千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪
六兩甘草一兩剉細水煎溫服無時大効

藁耳 即蒼耳

千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性爲末醋泔淀
和如泥塗之一日三易之三日腫消根丁自拔出
亦治諸腫掃之尋差

麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫曬乾剉

黃芩

凡用去腐蘆棟細實者佳。梅師方治諸丹作末水調掃之亦治湯火瘡。

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍。

半夏

凡用湯洗七次去滑。

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根醬塗之効。簡要濟衆方治癬。

瘡久不差取新者絞汁和膩粉如膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之皆愈。

狼毒

主癰疽惡瘡鼠瘻聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出痒痛以末傅之或猪膏和塗差。

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之。

土青木香

即馬兜鈴根

主頭風搔痒禿瘡

連翹

主寒熱鼠瘦癰疽惡瘡癭瘤同甘草服食

蒲公英

主乳癰煮汁飲之自消梅師方傳之亦消

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良

白石英

主肺癰吐膿咳嗽及膈上風熱痰肺瘦消渴陰瘦

補五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢加芫末等分粥飲調服一錢重神効寒者加乾姜服

白石脂

治癰疽排膿生肌新生兒臍濕

雄黃

主寒熱鼠瘦惡瘡疽痔灸肌疥癬

硫黃

主女人陰蝕。疽痔惡瘡疥癬殺虫。

雌黃

主惡癩疥頭禿下部惡瘡殺虫。

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核喉痛。

蜜陀僧

主金瘡止血口瘡疔瘻面上癩點。

伏龍肝

礬石

糝主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令內消。

主寒熱鼠瘻惡瘡蝕死肌。

姜石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰。

麤理黃石

堪作礮碾者即磨刀麓石

齊馬嗣明治楊遵彥發背取此石猛火煨赤投醋

醋中因有屑落取為末醋熬如糊厚塗立愈大凡

石頭多主癰疽。

硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺蟲

雌黃

主惡癩疥頭禿下部惡瘡殺蟲

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核喉痛

蜜陀僧

主金瘡止血口瘡疔瘻面上癩點

伏龍肝

取龍肝也或取龍肝之皮也或取龍肝之骨也或取龍肝之髓也或取龍肝之血也或取龍肝之氣也或取龍肝之神也或取龍肝之精也或取龍肝之液也或取龍肝之汗也或取龍肝之淚也或取龍肝之涕也或取龍肝之唾也或取龍肝之痰也或取龍肝之便也或取龍肝之溺也或取龍肝之汗也或取龍肝之淚也或取龍肝之涕也或取龍肝之唾也或取龍肝之痰也或取龍肝之便也或取龍肝之溺也

礬石

糝主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令內消

主寒熱鼠瘻惡瘡蝕死肌

姜石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰

麤理黃石

堪作礬石者即磨刀麤石

齊馬嗣明治楊遵彥發背取此石猛火煨赤投醋中因有屑落取為末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭多主癰疽

爐甘石

主愈瘡止血治目赤瘡

燈心

主破傷血出每用貼破上封之立差

槐根皮

主痔及白皮煎湯薰浴良入荆芥尤妙

地骨皮

主疔瘡經年以麤皮煎湯洗之細沫白穰別碾糝
之即差

黃蘗

主瘡腫神良每用去麤皮塗蜜炙剉諸方用作湯
漬陰瘡良搗末蜜水調敷腫

枳殼

凡用須麩炒去穰剉枳實亦同

厚朴

凡用須去麤皮生姜塗製炙微焦剉

皂角

凡用須不艸者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鱉子

凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚研如泥以沸湯浸用汁先薰但通手即浴洗日三度

楸樹白皮

單用熬膏貼癰疽惡瘡疔瘻痔疾用其白馬牙燒灰治發背初生用糝瘡頭以膏封之

兔頭

連皮骨臘片細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背

惡瘡

出百一方

兔腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水搽之後用兔白毛貼之毛落平復勝金方治痔用坑月砂即兔糞也和乳香末酒調三錢溫服日三服即差

蜜

凡鍊須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘草末塗之神效肘後方單用塗湯火瘡

牡礪

凡用木炭灰炒通赤濕地上放經宿方用。經驗方
 治瘰癧用牡礪四兩玄參三兩為末糊丸如梧桐
 子大酒服三五丸食後服藥盡患亦除根。集驗
 方治一切癰腫水調牡礪粉掃之乾即再掃即消
 名拔毒散初虞世治瘰癧用和甘州末茶調三錢
 服之神効大驗
 蛇退皮 諸方用治下雜惡瘡十年不較者全用炒存性猪
 膏和塗之其驗神効

蜘蛛

聖惠治瘰癧不問新舊或成癭者熬乾為末酥和
 如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠瘻
 神良譚氏治贅瘤瘰且以網絲作線際根繫之一
 宿自落

蟪頭

聖惠治一切惡瘡端午日收乾為末者油調傅之
 神効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞
 汗傅其上大効古今諸方治下瘡欲成者取蟪頭

心腹下度取之稍白者是以針刺下瘡當心及四
畔以心塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌
食羊肉多不効

陳橘皮

凡用溫水浸去白青橘皮亦然

枇杷葉

主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一二兩
者思台煎藥不用味覺苦大寒未得海味未相味

桃杏仁

無心草

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

凡用去蘆苗煎洗甲癩疽神効

防風

凡用去蘆

藜蘆

凡用去苗

犀角

凡用生不會見火者即鑄錯爲末

茯苓

凡用去麤皮白者佳

芍藥

亦用白者佳

牽牛子

凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩

外科精義卷之四 終

