

中武
143



海外珍寶

明武
第 1 卷
卷



袖珍内外方叢刻方人名符辨

(骨) 骨布
 (律) 律布
 (劉) 劉私馬
 (結) 結列見
 (蓮) 蓮珍
 (綉) 綉南非尔列
 (獨) 獨宋实
 (福) 福倫

(瓦) 瓦伊
 (榮) 榮蓮厨
 (樓) 樓使私的印陋榮見
 (吳) 吳阿田
 (兜) 兜魁姪
 (蒲) 蒲列羅
 (砥) 砥歌蘭度
 (春) 春垣隣



(伍) 伍 震 涅 爾
 (鞫) 鞫 兒 的 爾 兒 兒
 (漏) 漏 兒 的 兒 兒
 (獲) 獲 兒 的 兒 兒
 (忽) 忽 布 滿 兒
 (放) 放 哈 羅 歌
 (刺) 刺 放 退 涅
 (點) 點 兒 兒 兒
 (技) 技 兒 兒 兒
 (微) 微 兒 兒 兒

(訖) 訖 謨 墨
 (亞) 亞 兒 兒
 (惡) 惡 兒 兒
 (整) 整 兒 兒
 (扼) 扼 兒 兒
 (透) 透 兒 兒
 (越) 越 兒 兒
 (布) 布 兒 兒
 (未) 未 兒 兒
 (耶) 耶 兒 兒

(燿) 燿 兒 兒
 (哥) 哥 兒 兒
 (央) 央 兒 兒
 (私) 私 兒 兒
 (勿) 勿 兒 兒
 (兀) 兀 兒 兒
 (羅) 羅 兒 兒
 (的) 的 兒 兒
 (烏) 烏 兒 兒
 (屈) 屈 兒 兒

(加) 加 兒 兒
 (瓜) 瓜 兒 兒
 (歌) 歌 兒 兒
 (拏) 拏 兒 兒
 (計) 計 兒 兒
 (拏) 拏 兒 兒
 (繆) 繆 兒 兒
 (胘) 胘 兒 兒
 (法) 法 兒 兒
 (邁) 邁 兒 兒

(大) 火 鳩 伊 爾
 (廣) 嶺 雁 列 軫 傑 兒
 (麗) 麗 兒
 (肅) 肅 烏 兒 抹
 (叱) 叱 葛 歇 兒
 (阿) 阿 失 安 垣 兒
 (訶) 訶 訶 烏 列 兒
 (漑) 漑 漑 布 坦 兒
 (佻) 佻 佻 五 華 兒
 (袁) 袁 度

(刑) 刑 刑 兒
 (蔚) 蔚 蔚 兒
 (丘) 丘 丘 護 滿 列 屈 德
 (瑪) 瑪 瑪 榮 賢 伍
 (西) 西 西 勃 兒 寫
 (擗) 擗 擗 倫 度
 (燉) 燉 燉 列 乙 施 屈
 (琢) 琢 琢 的 爾 勃 朗 屈
 (滿) 滿 滿 獲 尼
 (思) 思 思 亥 彌 的 兒

(辨) 辨 辨 昆 烏 兒
 (擊) 擊 擊 兒
 (濇) 濇 濇 爾 查
 (督) 督 督 私 采
 (賢) 賢 賢 猓
 (失) 失 失 加 狻 孽 兒 寫
 (支) 支 支 葛 歇 兒
 (恨) 恨 恨 爾 珉 度
 (斯) 斯 斯 屈 列 傑 兒
 (戎) 戎 戎 利 墨 爾

(哈) 哈 哈 羅 兒
 (華) 華 華 兒 列 兒
 (鏡) 鏡 鏡 瑛 里 馬
 (狹) 狹 狹 爾 屈 失 布
 (業) 業 業 兒 鳩 兒 私
 (栗) 栗 栗 屈 的 兒
 (爵) 爵 爵 躬 膺
 (木) 木 木 僕 乙 斯
 (聰) 聰 聰 善
 (蓄) 蓄 蓄 珍 吉

(紅) 紅 亞 烏 天 利 寫
 (比) 比 爾 天 滿 良 土
 (怖) 怖 盧 烏 和
 (汶) 汶 設 見 列
 (匹) 匹 練 滿
 (勿) 勿 乙 見
 (四) 四 見 連 晚 度
 (遇) 遇 用
 (對) 對 乙 伍 的 見
 (孤) 孤 碌 執

(沃) 沃 和 沛 朗 屈
 (紀) 紀 和 寫
 (德) 德 路 執
 (寫) 寫 漢
 (須) 須 微 旬
 (蹙) 蹙 宛 的
 (屋) 屋 地 見
 (奴) 奴 井 歌 雨
 (噉) 噉 乙 加 爾 度
 (歌) 歌 伊 設 見

(百) 百 尔 失 萃 尔
 (乳) 乳 滿
 (汶) 汶 設 和 莫 里 非 枝
 (浮) 浮 雨 的 飲
 (契) 契 列 和 室 尹
 (衷) 衷 魯 苦 列 和 列 乙
 (鞮) 鞮 兒 帝 刑
 (過) 過 欠 漢 和 德 怨 屈
 (質) 質 祿 烏
 (併) 併 密 計 兒

(陞) 陞 爾 吉 烏 和
 (跋) 跋 爾 鐵 見 執
 (格) 格 兒 換
 (依) 依 百 乙
 (古) 古 尔 點 漢
 (角) 角 屈 密 寫
 (室) 室 卒 德
 (昆) 昆 刺 地
 (勞) 勞 備 蘭 埕
 (昉) 昉 墨

(脛)脛
脛僕
列見

(南)南
南僕
尔

(列)列
列墨
見
(舟)舟
舟託
後里
弗
(物)物
物見
魯拂
(朱)朱
朱他
見
(回)回
回弊
見
伍
(遠)遠
遠突
寫
(魯)魯
魯警
見
多
(弱)弱
弱夫
奴
乙
見
(住)住
住位
尔
列
漢
乾

(非)非
非尔
味
伍
(杞)杞
杞屈
拔
尔
託
(奕)奕
奕乙
(苦)苦
苦苗
僕
(揭)揭
揭列
私
珍
(赫)赫
赫列
涅
鳥
歌
(麻)麻
麻健
地
(個)個
個屈
扶
(寶)寶
寶實
見
墨
乙
(穴)穴
穴僕
見

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

○頭面及鼻耳

顏面小疱蓬妙外用才一方耳中潰瘍升來外用

鼻痔撒爾末見扶社外用顏面潰瘍五鉛花外用

頭面內刺及鱗屑狀小疹老利爾結兒私水外用

頭痛氏一埕列利精外用頭瘡鹽酸宜土外用

顏面痛先黃水外用一、二、三、顏面小疹安息香外用

小兒頭濕爛才石七、二、一、惡疔潰爛頭瘡黑用僕丑

曹黑欠弗刺兒外酒用三、頭水安芩各利私用

○眼病

○眼病

角膜斑點
食塩外用
才一方
蓬砂外用
才四方

先華
外散
外用
一、
牛胆外用
一、

慢性眼
外明
外用
一、
七、
二、
三、
外用
一、

眼中潰瘍
老利欠
結見
私水
外用
六、
三、
外用
一、

瞳孔縮小
或白內障
眼
外用
三、

遷延眼
外骨
腫脹
者刺
必私
印
散
外
那
私

南膜
及南膜
腫瘍
赤
外用
五、

遷延眼
外液
滲出
甚
者刺
必私
印
散
外
那
私

眼
外瘰癧
毒
疥
毒
者
升
外
用
一、
五、

淋毒眼
外
廿
外
用
一、
三、

眼中潰瘍
及南膜
翳
散
外
用
一、
三、

瘰癧
外
用
一、
二、

眼中潰瘍
外
用
一、
四、

易膜
外
用
一、
二、

南膜
外
用
一、
二、

眼
外
用
一、
二、

輕症
外
用
一、
二、
五、

角膜
外
用
一、
二、
三、

眼
外
用
一、
二、
三、

眼
外
用
一、
二、
三、

眼
外
用
一、
二、
三、

黑障眼 廿一 永外用 一、五、

眼 焮 腫 潰 爛 者 硫 酸 鈉 一、二、

濕眼 外用 他 藥 二、三、

○咽喉及口中病

口中失音 外 陪 苦 山 炭 外 用 一、二、

百菜 五 外 用 方 藜 魯 林 水 外 用 一、二、

齒 觀 失 音 外 陪 苦 藜 魯 林 水 外 用 一、二、

驚口 瘡 蘆 藜 水 外 用 一、二、

咽喉 焮 症 蘆 藜 水 外 用 一、二、

惡性 舌 痛 琥 珀 鹽 用 一、二、

咽喉及口中 焮 腫 用 石 外

齦 齒 痛 阿 芙 蓉 外 用 膜 核 咽 喉 焮 腫 甘 肅 利 萬 二、

、三、二、 粘 液 性 咽 喉 焮 腫 及 懸 壅 毒 地 緩 明 萬 五、

、二、 齒 觀 腐 爛 出 血 潰 瘍 山 荷 菜 外 用 一、二、三、

中 口 失 音 外 陪 苦 及 驚 口 瘡 撒 外 用 一、二、三、

咽 喉 氣 管 粘 液 過 多 者 沒 菜 一、

齒 痛 齦 潰 瘍 懸 壅 毒 地 緩 柳 皮 外 用 一、二、

口 內 舌 上 潰 瘍 兼 吐 涎 者 藜 魯 林 加 外 基 二、

驚 口 瘡 及 咽 喉 腫 外 陪 苦 五、

齒 觀 腐 爛 刺 各 厄 亞 外 用 粘 液 性 及 傷 冷 毒 咽 喉 焮

腫 確 砂 外 用 一、

○心胸及肺病 附勞瘵瘦削羸弱小

肺微衝終期肺臟欲六痺者安息香花、二、

因喉氣管粘液過多者沒菜、一、

小兒疫咳後肺癆遺漢安沒尼豆豉

肺粘液及肺痿初愈護漢安沒尼豆豉

胸水氣管微衝刺屈點加非露薩

肺血撒兒末尔秋私 肺知覺過敏香酸、二、

肺微衝及胸痛吐酒石 胸肺瘵等諸症香酸、三、

肺微衝實芟荅利私、七 勞瘵老利尔結私、水

肺勞疏加尔基、一、 硫利馬私、三、

肺勞刺乙尼刺、一、 刺、一、

沒菜、三、 勞瘵、四、 老利、一、 結、一、 私、二、

胸水、實、芟、荅、利、私、二、

氣管微衝、水、利、私、三、

粘液壅滯于肺者、全、硫、私、五、

瘦削羸弱小兒、咳、耶、十、

全、硫、黃、一、三、 乳、糖、一、

安、負、母、尼、酒、四、 護、漢、安、母、尼、豆、豉、二、

○乳房病 乳、汁、虛、乏、結、鹿、一、

乳房剥脱、蓬、砂、外、用、

乳汁過溢 夫鳩膏、三、乳頭潰瘍 拔灰撒 漢字露
乳頭破裂 二、粉子外用、

○肝膽胃腸及腸間膜病

小兒腸間膜腺閉塞 二、度屋布密 溫刺列
肝欬衝及腸欬衝 二、木、遷延肝欬衝 廿、木、一、
腸間膜閉塞 小兒腹肚緊張 七、利、給、水
胃腸虛弱 大便不利 芦會、三、
胃症 消酸 昆、私、溲、馬、一、遷延肝病 牛、胆、一、
胆液虛乏 拾、倫、僕、三、胃虛萎、一、
胃症 曰、凡、氣、者、格、墨、曰、方、膽、結、石、的、列、並、油、一、

○前陰病

石淋及尿管潰瘍 石、灰、水、崩、漏、明、答、二、五、

白帶下後淋 枝、升、衣、外、用、一、
白帶下 用、弛、緩、者、一、明、答、一、

白帶下 用、檳、皮、外、用、一、
白帶下 用、子、宮、硬、腫、及、瘰、癧、外、用、一、

子宮口 用、縮、曰、瘰、癧、者、莖、若、外、用、一、
白帶下 淋、疾、密、陀、酢、外、用、一、

白帶下 百、屈、杖、二、
尿道 諸、症、的、三、並、油、

尿管 因、瘰、癧、者、的、用、列、並、油、

淋疾 用、錫、石、外、用、一、

尿管 因、瘰、癧、者、的、用、列、並、油、

淋疾 用、錫、石、外、用、一、

石淋 石髓、二、
弱性白帶下 益髓 外用

產婦白帶下 桂、一、
白帶下 刺 益髓 外用

頑固後淋 的列至油
腔內息肉 撒 外用

尿道疝 寧 阿芙蓉 外用
陰囊 只 俸 苦 蕪 沃 外用

膀胱結液 海葱、三、
產寧性帶下 吐根、二、

小兒尿閉 石松子、一、
尿閉 阿魏、二、

尿閉 目 事 痊者 阿芙蓉、十三、

○後陰病

痔血 閉塞 氣 熱 君 嫩 衡者 疏 黃 花、一、

直腸 粘 液 塵 塞 廿 亦 外用
盲痔 及 脫肛 明 荖 丸 用

頑固便秘 蒸 酸 外用、三、
大便燥結 食 鹽 外用、二、

痔痛 蕪 沃 私 外用、
消 石 外用、二、

盲痔 蕪 沃 私 外用、
脫肛 梅 皮 丸 用、四、五

大便閉 廿 亦、七、九、十、

○手足及關節

足部創傷疼痛 用 五 鈔 等 外
代 指 外 用 製 食 鹽

關節疼痛 外 用 容
膝痛 凡 的 列 並 油

脚痛 凡 朴 屈 法 馬、一、
小兒 膝 濕 燥 外 用 石 松 子、二、

膝慢性腫脹 外 用 護 安 母 厄
膝 益 腫 二 食 鹽 食 用、一、

關節腫痛 外 用 護 安 母 厄

○表皮病花血中爵毒

温癬眼疮溃烂者外用炭

頑固皮病烟中外用

梅毒皮病外用

先著膏痕痒瘡外用

夏班升石搽外用

皮病硫磺搽外用

羅氏外用

疥癬外用

毒越銀質脂膏外用

皮膚剥脫外用

華尔屋兒漢外用

皮病硫磺搽外用

夏班升石搽外用

皮病硫磺搽外用

羅氏外用

疥癬外用

毒越銀質脂膏外用

血中爵毒惡液

解熱散

○神經病

精神錯亂及心思爵憂病

精神錯亂研莖馬外用

局心症事疼痛

癩痢癩狂心思爵憂

依卜昆垣兒孕

眩暈朴层法烏馬

小兒症寧青酸

吐酒石

症事疼痛

癩及孛厥眩暈

痲及症事顯

小兒搐搦

神經諸症

搐搦剛症

酒石搽

痲痺搦用酒石塩、四、及外搦搦酒石塩方四、

併積疼痛用硝砂加石灰精外子宮停逆鹿角揮毫塩

广痺杜松实油外用三、三、一、大驚、一、四、

子宮衝逆用凡氣者鎖症精依剥昆在視及歇依和的

痲白效子一、

里证阿親、四、

○癩痢舞踏病

癩痢銀卷、一、二、二、吐

艾根、一、二、三、四、的列、二、油、二、三、一、一、二、三、

癩痢及广痺番木電百尔的列、二、油、二、三、一、一、二、三、

舞踏病 蔓陀罗卷、三、一、

○回歇热

回歇热及三日热 辣、一、预固三日热 胡椒、一、

预固回歇热及预防方 辣、二、预固三日热 胡椒、一、

预固回歇热兼胃中粘稠液者 白效子

神经証回歇热 实百尔油

回歇热及水炭、二、四、硝砂、五、

清酸昆、秘、用、二、三、四、吐酒石、二、

蕃利尔、二、三、三、加、

老利尔、二、三、三、加、

回歇热其他有注去 葱歇者 刺建尼 豆、一、

○酸敗液及惡阻

酸敗液煎下利者石灰水

二、綠礬土、一、四、

、格絳、一、

小兒酸液二酒石塩、一、
胃中酸敗液二酒石塩、二、
酸敗液凡氣大黃、四、

惡阻 格絳、一、

○吧吐及吐血 失血諸竅脫世

經人吧逆魚胃痛者 失鳩唇、四、

吐血目症夢者 萊沃和、抽痛吧吐

吐水及水病百藥煎

炭醃蓬塩、二、

○咳嗽喘息

粘液咳及小兒疫咳 硫黃、二、

小兒疫咳 香酸、五、 乾咳 阿芙蓉、十四、

乾咳傷冷毒或諸穢癰塞者 金硫黃

俸尸質和性喘息 絲欠菴和密胆刺列、二、

粘液喘粘液咳 安息香花 症幸性咳嗽及疫咳 點刺加屋

非露薩、三、 豁疼、確砂、知石灰精

頑固疼咳因傷冷毒或肺症夢者 拔欠撤漢、

粘液喘急如中、一、二、 遷延喘息 確砂、一、

○下利病

虛性下利 百菜煎

下利及赤痢 格絳、二、

(ア) 補
亞的兒 價高星
斯 二百一
アセチル 根 二百一
アルター 根 二百一
重仁 二百一
阿列被油 二百一
アマ仁油 二百一

(イ) 補
斯太斯 價高星
守末 價高星
男羊泉 價高星
西瑪 價高星
七葉樹皮 價高星
價秋 價高星
壽香 價高星
失河青 價高星

カ 饒達塩 價高星
苧普 價高星
府利 價高星

ク 哥寧 價高星
琥珀塩 價高星
格老 價高星
コロク 價高星
コロク 價高星
梅皮 價高星
梅皮 價高星
胡椒 價高星
胡椒 價高星

ケ 鉄 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星
鐵 價高星

カ 牛息 價高星
阿美 價高星
カヒ 價高星
カヒ 價高星
カヒ 價高星
カヒ 價高星
カヒ 價高星
カヒ 價高星

キ 銀 價高星
吉訥 價高星
榆皮 價高星

ク 根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星
根植 價高星

シ 清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星
清酸 價高星

チ 砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星
砒石 價高星

ツ 木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星
木炭 價高星

セ 青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星
青酸 價高星

ス 瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星
瑞香 價高星

價高星

袖珍内外方叢卷之一

藥品標目

第一綱 山物

第一目 可燃體

硫黃華

木炭

第二目 酸類

硫酸

磷酸

蘇魯林水

硫黃乳

磷素

硝酸

鹽酸

哥寧伍水

蒸餾水

安息香茅

香酸

牙三日

羅伍鹽

整乙典坭羅伍

硝砂加石灰精

煨製麻伍涅失亞

酒石塩・酸

琥珀鹽

刺必靴加烏和整

石灰水

袖珍内外方叢卷之二

菓高標目

牙四日 塩類

酒石塩

驗蓬塩

六伍涅矢亞

硝砂精

鹿角精

厚葵固石

硝石

炭酸剝寫更煎

炭酸曹悻

硝砂揮發萃

鹿角揮發塩

鹿珮液

芒消

食塩

煨製食塩

酒石葉

酒石葉晶

厚醱酒石

厚醱酒石

蓬砂

結霰土

浮利塩

枯蓉

塩酸重土

硝砂

酒石葉液

民埏列里猪

純精酒石

厚蓬酒石

煇酸曹蓬

广低涅失豆

明蓉

塩酸加介基

第五目

硫羅低塩

硫磺砂

硫加介基

硫水素硝

硫利馬豆托

袖珍内外方叢卷之三

藥品標目

牙六月 金屬及其製劑

其一 銀

銀器

刺必取印款及那粟既

其二 水銀

華涅滿潑水散

越扶屋布既密涅刺列

赤求水

赤降水

升水

已

廿六

白降水

其三 銅

硫酸銅

確銅卷

其四 鐵

精製鐵屑

越扶屋布乾末兒扶五更乾

格碌屈乾末亦扶乾 撒兒末亦扶乾

升鐵塩 末亦扶乾鎮痛液

收斂鐵液 確鐵萃

鐵丁裁剖用連方 槓植加鐵丁裁剖

其五 錫

錫屑

其六 鉛

密陀醋

羅獨窠馬尔

鉛糖

其七 亞鉛

亞鉛萃

皓卷

其八 安負拔扭護

金硫黃

結尔蔑乾密涅刺列

五

安質沒硫加尔基

裁拱屋布斯安質沒担

安質沒醪

吐酒石

安質沒酒

其九 毘和繆寫

沃酸毘和繆寫

其十 砒石

砒酸

袖珍内外方叢卷之一

括套

諸藥品次序從和蘭局方列之若其製劑各就其
本藥條或其製劑中為主品者舉之例如黃葛越
或劑則從黃葛條如銘硬膏則從酸化銘條如蓬
驗鎮吧散則從炭酸曹達條而拳惠等是也○如
近世款所發明之藥品載在附錄

(第一編) 山物

從和蘭局方之例分之為六月一曰可燃體二

曰酸類三曰羅伍塩四曰塩類五曰硫羅伍塩
六曰金屬及其製劑

第一目 可燃體

硫黃萃 シニヒニルデヒラナム

為散、鏡、鐵、煉、每服三斤五斤十斤至三十斤

第一方

硫黃萃 純精酒石 各二

右為散朝夕服一茶匙

第二方

硫黃萃 乳糖 各一

伊里托弗魯連底那 三斤至

右為散每十服每一時一服乳汁送下自三週至

一歲兒之服量

第三方

硫黃萃 乳糖 各一
甘草 各三

伊里托弗魯連底那

右為散每一時一茶匙冷水送下大人服量

第四方

硫黃萃 甘草膏 沙糖 各二

右作鏡七十箇每一時服一箇二箇至四箇此劑

外用
一箇合蓄硫黃葦三丸小兒大人悉散者且與之

第一方

硫黃軟膏(增製法)硫黃葦二多家猪脂六多倍一多和一多

右取一茶匕着一食匕方晚擦一箇節明朝用石

驗水洗除之次日又於他一箇節擦洗如前法

第二方 諸厄利斯治癬膏

硫黃葦 石鹼各半 蒜二多 消石一多

家猪脂一多

右研合取一手擦周身日三次施之三四日癩癬

全治其難治者亦不出於六日

第三方

硫黃葦 石鹼各一 搗皮油適且取其芳香

右研合用法如第一方

硫黃乳シユルヒユル、パラソド力ナム

(增製法)取硫一剝一寫一煎一適一且一以一熱一湯一二十一倍

下生一淫一乃一取一煎一過一次一加一稀一硫一酸一適一且一合一沈一定一候一毫

而水洗淨一放一乾一固一封一貯一為一散一丸一或一吸一劑一每一服一三

一方(齊)

硫黃乳二十丸至二十丸 五刺昆虫護炭燒七

沙糖三 蕃薇水一

右調勻為吸劑每半時服一茶匕臨服宜振蕩之
為小兒服量

水炭 カレホベゲタヒリス

為散及吸每服十匕至二十匕、外用為搽劑

磨齒散 帛軟膏

第一方 治腐敗膿汁也

水炭 四匙至五匙 鴉布羅 二十匕至三十匕

右為散每半時服一茶匕以酒送下

第二方 治同散熱

水炭三

右每一時服一二茶匕骨喜送下

第三方 律 治腐敗性赤痢

水炭三 五刺昆 五獲漢末 二 沙糖三

蒸餾水適

右作散劑每四分時服一食匕

(外用)

第一方

水炭 赤炭 邦末各一

右合搽敷創上

第 二 方

木炭 肆

赤 芫 那

沙 糖

汶 菜

各 二

丁 子 油 十

五

橙 皮 油 十

滴

右 為 磨 齒 散

第 三 方

水 炭

赤 芫 那

水 楊 皮

泥 葛 根

各 二

右 為 散 用 酒 作 琴 布 微 溫 貼 患 處

第 四 方

木 炭

家 猪 脂 各 一

右 作 軟 膏

第 五 方

木 炭

被 方 蘇 合 軟 膏

各 一

五

增 製 法

的 列

一 寸 裁 列 密 黃 蠟 各 七 更 上 微 火 蒸 散 水 氣 下

加 蕪 合 油 七 寸 沸 騰 已 更 上 微 火 蒸 散 水 氣 下

右 作 軟 膏

燐 素

ホスホリニ、キヒニ、チニ

以 亞 的 尔 差 油 溶 解 每 版 十 六 分 十 分 八

分 以 更 多 不 過 半 分

一 方

燐 素 三

亞 的 尔 差

續 草 油 或

半 實 丹 尔

右溶解每服五滴十滴至三十滴用水半碗送沙
列布粘汁及酒送下日三四次
又方(結)

燒素 油二丸以 房桃 五刺昆 五護漢

房桃 去皮三箇 覆盆子水 覆盆子舍利別

右研合為乳劑每一時半服一食匕

(外用)

一方(吳) 治痛風

燒素 刀二 薩昆那油 的列並油

瑠砂加石灰精

右溶解擦關節
又方(接) 治疫咳

燒素 三丸至 錫布羅 葛縷子油

右溶解擦胸及胃部肩胛間日三次

第二月 酸類

硫酸 アシヂニム、ヒソ、ヒソ、ニユム、ダリ、ニケム

半支至一支為滴劑若酸屈劑或取半支至三
支和水一比加覆盆子舍利別三為飲劑

第一方

硫酸 一支 至 水 或橙皮水

土

覆盆子舍利別方

右調勻每一時服一食匕

方二方

收飲亞的尔

右每服十滴至二十滴水半碗或沙列布粘汁大

麥水等點服

方五方

越栗失尔赫馬利沃利半方

右每服十五滴三十滴至四十滴水半碗或酒和

用

消酸 アシゲム、トリキム

一月至二月多量水內和解為蜜屈劑或取半

匙至二匙和水一匕若大麥水為飲劑

一方

消酸一匙至水或橙皮水六

覆盆子舍利別方

右每半時服一食匕

又方

消酸 蒸餾水

右每一時五滴至二十滴大麥水一茶碗和服

(外用)

一方

丙酸半斤

右注于浴湯名丙酸浴湯

又方

酸化家猪脂二斤
加丙酸用研子酸一斤
細侯其色不變冷定固封暗處貯
取脂上微火烱解次
用法先取家猪脂十六斤
烱解次

右為外用

燒酸 アシダニム、ホスホリキニム

每日一匙至二匙為密屈劑若痛劑或常用飲

液和服

一方

燒酸二匙至五匙
水三或橙花水六字誤字又脫字

覆盆子舍利別

右調勻每一時服一食也

又方

燒酸 蒸餾水各一

右十滴十五滴二十滴至三十滴大麥水半碗和

服日三次

(外用)

一方 治瘡骨

薩昆那煎 或楊皮

煨酸 一匙至

沒藥下 或劑

右為射注劑或浸撒紙貼患處

鹽酸

アニチユ。ヒユアチキユ

為密屈劑若滴劑每日服半匙至一匙或每服
五滴十滴至二十滴量水內點服

一方

鹽酸 水或橙皮

覆盆子 舍利子

右每半時若一時服一食匕

又方

鹽酸 蒸餾水 各一

右每一時半若二時十滴至二十滴大麥水一盞
点服

(外用)

一方

鹽酸 十二 桑椹 舍利子

阿西藥下 或劑

右調勻用毛筆或毛羽塗齒根若古小兒應用方

蘇魯林水

ソロリン。キユ、アソク

每服一匙至二勺量水君大麥水和服
一方

蘇魯林水 覆盆子水或橙

覆盆子舍利別各二

右調勻每半時一食匕大麥水半碗和服

(爪用)

第一方 治頭瘡

蘇魯林水 一匙至

阿列襪油

右調勻

第二方 治齒齦失苟兒陪苦

蘇魯林水 六十

蕃薇水 六

玫瑰蜜 二

右為合漱劑

第三方 治其口瘡

蘇魯林水 三

過足托五舍利別 三

右調勻用毛羽塗古

哥寧候水

アヒラム、ニトク、ヒユリアナキム

(增)製法 清酸一匙 鹽酸四匙 右取硝子器置
於冷水中 注兩酸合和 蓋閉靜定 一二日入硝
子塊固封 唯浴湯脚湯用之

一方

哥寧候水 二

右注于浴湯
又方

哥寧伍水一

右注于脚湯

蒸餾酢

アシダラ。アベチキユム。チリュチユム

半一乃至二勺和水一升為飲劑

外用

第一方 治弱性白帶下

刺答尼^ニ煎^ア補^六

蒸餾酢^三

右射注于宮或鼻孔

第二方

撒尔非亞^三煎^六

蒸餾酢^一

玫瑰蜜^三

右合為含漱劑

第三方

酢^三水^{各二}

右為灌腸劑冷用

第四方

燕麥水^{三六}

酢^三

右為灌腸劑微溫施之

第五方

香甯酸(色ニ)

右嗅之或洗頭

酒石酸 アシチユム。タルトリキユム

一匙至二匙為塞屈劑或和水二升為飲劑又取五升至十升為散

一方

酒石酸 一匙至二匙 橙花水 六升至

覆盆子舍利別 一

右調勻各半時服一食匕

又方

酒石酸 一 沙糖 一 枸橼油 一

右為散每服取一茶匕水一麥酒盞和服以代用

里沒奈垣

安息香萃 アシチユム。ベンソキユム

為散每服二升五升至十升

一方

安息香萃 二 茴香油 糖 十

右為散製劑六箇每一時取一劑 菩提樹花泡劑

或和胸泡劑送下

又方

安息香 蘇和 錫布羅仁 通泥子油糖

右為散製劑 四箇 每一時取一劑 和胸泡劑送下

琥珀鹽 アシガム、ヒュクシニキム

每服二匁 五匁至十匁 和沙糖為散 ○大抵与

府香葛 和葛 綏漢 碧布羅 確砂 揮奄 萃等 配合

一方(蓮) 治寒壞疽

府香仁 琥珀鹽 沙糖

右為散製劑 六箇 每一時取一劑 以酒送下

又方(鹿) 治惡性舌痛

琥珀鹽 加密列 裁裁劑 沙糖

右為散製劑 五箇 一日服尽

青酸 アシガム、ブローユ、ヒュクシ

每一時或一時半 服四五滴 若一滴至二滴 一

日服量漸加至十二滴 以二十滴為極度 小兒

一日服量一滴 以六滴為極度 作乳劑最佳

第一方(蒲)

青酸 蒸餾水 漿 或 護漢

右每一時服二食匕

第二方(細)

扁桃乳 青酸

右合每一時半服一二食也
第三方蒲

实芰荈利私一戈浸沸湯適宜芦過
取八寸放冷加餘葉

青酸二十滴 亞刺昆 亞護 護 燒一

右合每一時服二食也

第四方厄

依蘭苔並放冷者 青酸八 玫瑰舍利列 拜

右調勻每一時服一二食也

第五方 治小兒熱毒及疫咳

白罌粟子二 甘扁桃一 茴香水三

遇見此更舍利列 拜

右搗碎為乳劑加青酸四滴至六滴每一時服一

食也

第六方

青酸八 亞刺昆 亞護 護 燒

遇見此更舍利列 拜

右調勻每一時服一茶匙為大人服量

第三目 羅厘塩

整心 乙典 埵羅 伍ホットアサリキエイダ

每服一滴至六滴加粘汁用之然供內服大抵

以刺必斯加烏私蟄溶劑代之の浴湯加半勺
至一勺半

刺必斯加烏私蟄ハツトアサヒユ

每服半匁一匁至二匁用水多量溶解服の浴
湯加二匙至半勺

一方 治腺病

刺必斯加烏私蟄水一匙以蓋解

右加水少量至無浸餘味朝饑後夕臥前服之

服量一歲至二歲者每日二滴至十滴曰歲至

八歲者一匙至半勺八歲至十五歲者一匙至一

勺余

確砂加石灰精 アムモニアリキ

每服一滴三滴至十滴和粘汁今之或取一刃

至半匙製密屈劑六勺

一方 名確砂加燒酒精

確砂加石灰精一再餉燒酒二

右調勻每服十滴二十滴至三十滴水或茶一碗

和服或取半匙至一匙半和密屈劑若煎劑若浸

劑六勺至八勺

又方 名確砂加過泥子精

確砂加石灰精二 再餾燒酒二

過泥子油五滴至八滴

右合每服十滴二十滴至三十滴冷水吞服或取半匙至二匙和飲劑六至八勺

(外用)

第一方

確砂加石灰精二

右為嗅藥

第二方

確砂揮發膏各半至二半

第三方

確砂揮發膏一至四精一壇製法白石灰精二

錫布羅各二匙
右宜湯煇和

右每一時或一時半塗擦患處

石灰水 アール、カルクス

一勺二勺至四勺日一二次乳汁若粘汁若芳

香煎劑和服

一方

石灰水十至六至三

右每一時半取一食匕至一碗乳汁和服

〔外用〕

第一方 破 治 華尔、屋 見 漢 皮 疹

石灰水 兩 桃油 各 二 三

右 患 部 日 一 二 次

第二方 (福) 治 火 傷

石灰水 三 阿 列 襪 油 三

右 患 處

第三方

石灰水 十 八 三 至

右 洗 患 部 或 浸 撒 絲 布 之 綑 帶

阿 芙 蓉 液 三 十 滴 至

煨 製 广 促 胆 朱 五 マク子シ人ユスタ

為 散 若 密 壓 劑 若 加 味 藥 五 服 十 氏 至 二 十 氏

小 兒 二 氏 至 五 氏 の 此 藥 禁 于 金 屬 塩 配 合 例

如 甘 灰 鉛 糖 吐 酒 石 丹 若 皓 若 綠 若 升 鉄 塩 明

若 確 砂 紙 精 酒 石 是 也

袖 珍 内 外 方 叢 卷 之 一 終

袖珍内外方叢卷之二

第四目

鹽類

酒石塩

シユアカルホナス。ホットアサ
即精製剝馬豆乾

酸敗液每服二丸五丸至十丸の搗搦每服十

丸至二十丸共為溶劑

第一方

酒石塩

一匙以蒸餾水
四勺液解

杜合利別二

右調勻每一時服一食也

第二方

酒石鹽一 五刺昆 五護漢 漿一
雞子黃三 兩水三 舍利別一

右調勻每一時服一食匕為小兒服量

第三方 治搖擗剛 瘡牙肉緊急

酒石鹽二 半五 蒸餾水六

右液和每一時若一時不服二食匕

第四方

酒石鹽九 十 蒸餾水一

右液和酸敗液每二時服十滴至二十滴搖擗剛
瘡牙肉緊急每半時若一時取二十滴至四十滴

大麥水半碗點服

(外用)

第一方

酒石鹽一 三五

右為一貼裏蠟紙于之。用法取二時溫湯溶解
以注于浴湯

第二方

釐乙與拉羅佐三

右用法同前

第三方

治曾墨兒弗刺見七 婦人顏面十 小

酒石鹽 三
食鹽 二
薔薇水
橙花水 各 二

右液和為洗劑

炭酸 剥馬豆乾 カルホナス。ホトアサ

用法加炭酸曹達

鹽蓬 鹽 シエフタルホナス。ソーダ

取量同酒石鹽

一方

鹽蓬 鹽 三

右丸六服用列印波酒一小麥酒蓋送下

又方

鹽蓬 鹽 二
枸櫞汁 孰搗者適宜
以可口為度

桂水 三
舍利別 三

右調勻每半時服一食

炭酸曹達 カルホナス。ソリ

一方

蓬 鹽 三
鹽蓬 鹽 一
右各 一
上酒

微火乾之研

右丸九服每四丸時取一服冷水溶和頓服

麻 伍 胆 失 五 シエフタルホナス。マグ子シヤ

用法同燉製 廣 伍 胆 失 五 ○ 此 蛎 蛸 蛤 石 加 同

硝砂揮毫筆

シブカシボナス。アムニニア

取羊錢加其外房等里纈草等浸劑然大抵以

硝砂精代之

硝砂精

シブカシボナス、アムニニア、リキョイゲユル

每服十滴至三十滴或取一匙若二匙和密壓

劑若煎劑六乃至八寸

鹿角揮毫塩

シブカシボナス。アムニニア、ペイロ、アミマシ

每服二尺五尺至十尺加沙糖或乳糖為散若

凡

一方卷治子宮衝逆

鹿角揮毫塩一匙

阿魏一匙

白石験一匙

纈草油六滴

右調勻加健須五那越或劑適取二尺為一九硝

子最固封貯每服五九至八九日二次

鹿角精

シブカシボナス。アムニニア、ペイロ、アミマシ、ソキユイダム

每服十滴二十滴至三十滴泡劑煎服或取一

匙至二匙和煎劑浸劑若密壓劑六乃至八寸

一方為

鹿角精二

海葱酢

玫瑰合利別

合電卷護阿芙蓉液八

孕礬酒石二 杜蘅根一
右合每一時半服一小茶匕

芭消 シユルハス。ソーカ

解凝劑取凡化者五匁至一日為散。下劑取
結芭者半匁至一匁半米或梅那浸劑溶和

一方

扁椒油半 五刺毘五護漢通 水六

右為密屈劑加芭消一匁若一匁半溶解每一時
服一茶匕以至得下
又方

芭消六 溶和水 拘攪汁一
覆盆子 舍利別一 氣擗者

右每半時服一茶匕以至得下

外用 半匁至一匁作灌腸劑

消石 ニトラス。ホトアサ、デビエラ、ユム

每服五匁至十匁至二十匁為散或取一錢至二
錢和密屈劑若乳劑六匁至八匁

第一方

消石 五刺毘 五護漢 沙糖各一
右為散分六服每一時一服

第二方 名清涼散

消石 孕礬酒石 牡蛎 各二

右為散 每一時 差一時 半服 半茶 匕 若一茶 匕 或代之以次方

第三方

鎮瘥散 三支 (增) 製法 消石 一支 右研合 孕礬

右每一時 差一時 半取 半茶 匕 冷水送下

第四

過兒託 五新汁 煎 若大麥 煎

消石 二

過兒託 五舍利 別 引

右調勻 每半時 服一食 匕

第五方

扁批 乳 引 消石 二支 至

過兒託 五舍利 別 引

右調勻 每半時 服一食 匕 臨用 宜振蕩之

第六方

消石 一支 至 五刺 昆 豆 護 漢 二 蒸 餲 水 引

過兒託 五舍利 別 引 半 引 安 負 沒 酒 至 二 支

右調勻 每半時 服一食 匕

(外用)

第一方(葱)

大麥五升 桑椹令利別子 消石十五

右溶和為合漱劑

第二方(鹽)

消石一升 麥五升 燕麥煎汁五升 屋施茂尔一

右溶和微溫為灌腸劑

第三方

消石一升 硝砂六

右研令取一食匕水適宜溶解蘸中置患處

食塩 ヒエノアス、ソリダ

每服一茶匕至一食匕日一二次

一方治完穀下利

枸櫞汁二升 攪者 食塩 和為度 飽

右合每二時若三時服一酒盞

橙花水十六

(外用)

第一方(治灰白腫)

食塩一兩 水二十 燒酒二或酒

右溫蘸毛巾布若綿布慰膝蓋

第二方(治灰白腫)

蒲旦阿尼根一

右用水四升煮淨過和醋三升食塩適宜調勻令
得可堪之溫度蘸毛布懸膝蓋

第三方

加麥列浸牙大 食塩 一兩至

亞广仁油 二兩至

右今作灌腸劑

煨製食塩

增製法 取食塩同磁器密封埋炭
火至爆声休成白末為度固封貯

外用

第一方 為散着軟膏等
治角膜斑點

煨製食塩

牡蛎末 煨
右為極末微濕筆端抹藥末以入眼中或用鸞翎

管吹入眼中

第二方

治粘液腫翳延水腫瘰癧

煨製食塩 二兩至

右灸熱柳布兒置患處

第三方 治代指

煨製食塩 一

右和雞子黃作軟膏塗指

確砂

ニリラス、アムニア

五丸至十丸或间有半刃至一刃日二三次
取一匙二匙至三匙和密屈剖着浸剖六寸至
八寸

第一方 治 喘 息 经 久 淋 疾

确砂 甘草末 各三
右为散 炙丸服 裛蠟纸 午之 每一时早一服

第二方 治

确砂 锡布 羅心 瓦 瓦 瓦 加 瓦 研

沙糖 六

右为散 入硝子 器 午之 每服一茶匕 日三四次 为

和胸及催生通经剖

第三方

确砂 麦 蒲公 英 裁 裁 剖 三 通 见 託 瓦 末 通

右二丸或三丸 为一丸 衣 鞋 末 服 五 丸 至 八 九 日

三次

第四方

确砂 一 匙 至 甘草膏 二 半 匙 至

接骨木 花 水 八 寸 至 屋 施 蔑 尔 或 海 葱 二 匙

右先用接骨木花水溶和 二味 以加 屋施蔑尔 调

匀 每一时服 一 合 匕

第五方 治同歌括

確砂 珊馬里裁奴 各一匙

嵩公英裁奴 加密列水 八匙至

右調勻每一時服一食匕

第六方

確砂 蘇刺昆 蘇獲誤 茴香水

沙糖

右調勻每一時服半食匕為小兒飲劑或大人忌

甘草膏者亦宜此

外

第一方

撒兒非 亞葉 葵葉

右浸熱湯適宜過取七寸加確砂二匙蜜一匙

為合漱劑

第二方 各諸尼利斯 嗅鹽

確砂 生石灰

右入確子各半之

第三方

確砂 雨水 醋

右浸布片慰患處

酒石葉

アセタス。カトアア

十片二十片三十片至一片為溶劑。或取一
支二支至三支和密原劑四片至八片以
易引濕氣不可為散丸

第一方 厄

椿骨水花浸六片至

酒石葉二片至

海葱密片

右調勻每服一食匕日三次

第二方 格

酒石葉一片或酒石
葉池半片

洋芥水四

海葱越我劑十六

大黃舍利列片

右溶和每一時服一食匕

第三方

酒石葉餅再餉燒酒半片

右合每一時半取三十滴至五十滴冷水和服或

為密原劑加藥

第四方

大黃浸片 酒石葉二片

右溶和每一時服半茶匕至一茶匕

酒石葉液

アセタス。カトアア。リキエイオム

一匙至半勺用法如酒石葉

一方

酒石葉液

芦根散或剖各一

加密列水六

甘消石精一匙

右調勻每一時或一時半服一食也

又方原

酒石葉液半勺

甘消石精二匙

檢尔失屈或海葱 漢酢或五勺 蜜

右調勻每一時服一食也

酒石葉晶

アセキス、ソーダー

為溶劑若散為散劑常用嫩製者每服半匙至

一匙日一二次

一方

酒石葉晶

二匙或一匙半

六厘胆失五匙

沙糖六匙

右為散服一食也日三四次

民埵列利精

アヒタス、アムモニア、ソキエイケル

每一時一匙至二匙小兒二十滴至三十滴或

取半勺和接骨木无泡劑臨臥頓服或取半勺

至一勺以上初浸劑密屈剖六勺至八勺

第一方

民埴列利精 一三至
接骨木花水 六三
安貞沒扭酒 二
屋施茂兒 一

右每半時或一時服一二食也

第ニ方

纈草浸 六
民埴列利精 一三至

鹿瑞精 一
橙花合利別 一

右調勻每一時半服一食也

第三方

民埴列利精 一
橙花水 或提蓋
香春花合利別 一

右調勻每一時半服一食也

(外用)

右調勻臨時頓服次飲服接骨木花濃泡劑二碗

一方

民埴列利精 一
蒸餾水 三

右蘸紙貼患處乾則更換

厚饅酒石 シムトラス、ホットアサ、エト、リ、カ、

一方哥治依劇昆埴見

厚饅酒石 三
大黃 一
硫黃乳 一
橙皮 末

六飯涅失亞 各半
茴香油 糖 三

右調勻服一茶匕日三次冷水送下

又方

孕驗酒石并 蒲公英越戎制

芦根越戎制并 加密列水并

右溶和每一時服一食也

純精酒石 シユニシクハラスホットアサレヒエテ左ム

清涼制 利尿制 五丸 十丸 至十五丸 〇為丁制

半棗一棗 至二棗 作散制 紙制 密原制 飲制

第一方

純精酒石并

右早朝以糖水若肉羹汁候服

第二方

大麥煎 純精酒石并

右以水適宜煮沙過取八勺加枸櫞汁舍利別二

勺每一時若一時半服半碗若一碗

第三方

純精酒石并 蒼广林皮 并 枸櫞皮油糖并

右為散制每一時服一茶也

第四方

純精酒石并 葯刺巴 二切至 橙皮舍利別

桂舍利別各適宜

右為散劑服一茶匕日二或次

厚饅酒石 タルト、又、ホトアサ、エト、ソ、リ、カ、

即、是、又、法、厚、饅、酒、石、
半了至一弓以水溶解或為散劑

第一方

厚饅酒石 栲 栲椽皮油糖

右為散冷水頓服或每半時服一茶匕以至得下

第二方

厚饅酒石 栲 栲那葉末

右為散劑每一時服一茶匕以至得下

第三方

厚饅酒石 栲 茴香水

栲椽汁舍利別 栲椽大黃

右調勻每半時服半碗以至得下

第四方 藥初生兒下利

厚饅酒石 乳糖 舍利別

茴香水 各一

右每服一茶匕臨服宜振蕩之

厚饅酒石 タルト、ノ、ニ、ス、ガ、ラ、ク、サ、チ、ニ、ス、

增製法、○、蓬、砂、通、宜、右、存、錫、器、注、熱、湯、十、倍、溶、
解、之、用、水、也、不、使、子、攪、拌、或、磁、水、氣、試、取、少、許、冷、
互、令、溶、和、字、確、子、攪、拌、或、磁、水、氣、試、取、少、許、冷、
正文、大、不、住、手、攪、拌、蒸、散、水、氣、試、取、少、許、冷、

處便速疑結可為粉末乃下火撒紙上取半勺
文火乾之一時硝子墜固封冷心時
至六匙以水四勺至六勺溶解每一時服一食
匕○此藥以易引濕氣不可作散九

一方

孕蓬酒石 五 蒲公英 越我劑 五

白屈菜 越我劑 一 歐宋 蓬水 五

右調勻每一時服一食匕

又方

孕蓬酒石 二 匙 至 洋芥水 八

海葱 蜜 一 匙 甘海鹽 精 二 匙

蓬砂

為散或以水忌舍利別溶解每一時九丸十丸

至二十丸

第一方 孕臨產催生宜此方

蓬砂 一 雞腹 蘭 一 桂油 二

右為散丸一服每半時一服

第二方 起日

蓬砂 一 消石 一 沙糖 二

右為散每半時服一茶匕

第三方 同上

蓬砂 二斤 至

桂油糖 斤

右為散製劑六箇每八丸時為四丸時服一劑冷

水送下

第四方 臨產魚症者宜此方

蓬砂 十六斤 至

阿芙蓉 四斤 至

桂油糖 斤

右為散製劑四箇每半時服一劑

第五方 治驚口瘡

蓬砂 一斤 玫瑰蜜 斤

右作啜劑服一茶匙日四次

第六方 治小兒驚口瘡

蓬砂 二斤 至 茴香水 斤

過尔托 五合 刺別 斤

右每一時服一茶匙

(外用)

第一方 治顏面小疱

蓬砂 斤 薔薇水 斤 橙花水 各 斤

右為洗藥

第二方

蓬砂 斤 秋波里膏 斤

右合每夕擦乳房

嬌酸曹蓮 玫瑰蜜

右調勻每服一茶匕

另三方 幼生兒下劑

嬌酸曹蓮 茴香水 遇尔托亞命列別

右調勻每服一茶匕 臨服宜振蕩之

結麩土 シゴカレホナカレナ

以牡蛎蚶蚌石代之然用广偃涅矢豆殊居多

麻偃涅矢豆 シゴカレホナカレナ

為散若密原剖每服五匕至四十匕

另一方 職名乳母散

广偃涅矢豆 橙皮料 茴香 沙糖

右為散每服一茶匕日三次

另二方 酸敗液 且用之

广偃涅矢豆 葛縷子油 糖 或桂油

右調勻每服一茶匕日三次 小兒製此量二分

之一若三分之一每服一小刀尖

另三方

广偃涅矢豆 薄荷水 橙皮命列別

右調勻每服一時服一食匕 臨服宜振蕩之

另四方 小兒酸敗液 且用之

广恒温矢豆二
大黄土一
茴香水半

舍利列半

右调勻每一時服一茶匕臨服宜振盪之

浮利塩 シユルハス、マク子シア

解凝劑 每服半錢至二錢為散系際劑の下劑

半多至一多半の隨腸劑半多至一多の用法

同也清

明礬

シユルハス、アリユニシ、エトホツトアーサ

為散丸煉溶劑五匕十匕至十五匕

第一方(拂)治白帶下目地緩者

明礬半 五刺昆豆護漢半

右為散分四服每一時半一服

第二方(見) 治崩漏

明礬一 阿芙蓉四 桂皮一

右為散分四服每二時一服

第三方

明礬半 刺答尼越義劑二 葛蒲根一

右二匕為一九每一時半服五九至十九

第四方(歌)

明礬半 五刺昆豆護漢半

列印設酒

右溶和每一時服一茶匕

第五方 健治崩漏

明礬

薄荷水

桂下義劑

橙皮

白罌粟

右溶和每八分時為四分時為半時服一食匕

外用

第一方 治失音見陰苦

明礬

玫瑰蜜

百葉並下義劑

右溶和用羽毛若毛筆塗齒銀

第二方

玫瑰花 煮取四寸

明礬

玫瑰蜜

右溶和為含漱劑

第三方

樛皮 煮取十二寸

明礬

再餉燒酒

右溶和為含漱劑

第四方

樛皮 煮取十二寸

明礬

右溶和射注腔內

第五方 瓜治後淋

明礬 壹 薔薇水 二

右溶和射注尿道

第六方

明礬 壹 酪 貳 鮮者

右調勻敷盲痔縛帶之

第七方

明礬 壹 鈎糖 貳 薔薇水 四

右溶和為眼水

栲 壹 シエリシエリス。トリエシト。ニトハワトアサ。エキエガチエム

第一方 各取用散 止出血

栲 壹 亞刺昆 壹 蘆 壹 漢 壹

右為散搽之

第二方 治眼中潰瘍

栲 壹 沙 糖 壹

右為極末吹入眼中

第三方

栲 壹 二

右末飴肉努張者互搽之

塩 酸 加 尔 基 ニエリアス。カルクス

增製法の精製結晶
度右冷溶和抱合瀘過上火蒸散水氣乾之棄

一方(碱)

塩酸加ル基一水

右每一時半版三十滴の六歳小児取量

又方(藥)

塩酸加ル基一苗香水

右五滴至十滴大麥粘汁送下日二次

鹽酸重土

增製法の硫酸重土自然生一者極末適宜炭酸

大寫之候一倍二九
内通紅但切熱以木右
多量熱湯洗淨之至精
明分全末多是土炭
騰止飽和酸定沈下
火蒸散水至大氣至全
榮蒸氣下大氣至全
散水蒸氣下大氣至全
一瓦三瓦至五瓦

第一方(碱)

塩酸重土

右以蒸餾水一弓溶和三歳以下小児每服五滴
至二十滴三歳以上十滴至三十滴大人四十滴

若溶劑每服二丸至十丸

一方 治肺癆

硫加尔基

木炭

葛尔儒越基

右二丸為一丸每服十五丸至二十九日四以

又方 解金石毒

硫加尔基

桂水

過兒化五舍利

右調勻每半時服一食匕

(外用)

一方 人工硫黃泉

硫加尔基

右溫湯溶和注于浴湯○當患者在浴內取稀硫

酸少許時々注加之稀硫酸認量則發硫元素尾

酸也

硫劑 萬豆乾

一名豆乾

硫肝

二

右

合

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

研末之

第一方 治肺癆

硫劑 萬豆乾

木炭

葛尔儒越基

各二

右作軟膏朝夕取一牙金擦患處

又方按治頭瘡

硫劑馬五苑


石鹼

石灰水

再餉燒酒

右合朝夕洗頭

袖珍內外方叢卷之二終



袖珍内外方叢卷之三

第六目

金屬及其製劑

金屬有十種 一曰銀 二曰水銀 三曰銅 四曰鐵
五曰錫 六曰鉛 七曰亜鉛 八曰安質 沒担謨 九
曰昆私繆 寫十曰砒石

其一 銀

銀器

シトラス、ハアルゲニナ

為丸者 溶劑 每服 十丸 八丸 八丸 四丸 半丸
至一丸

第三

五十

一方春

銀礬

水少許以蒸和

拾餘僕

過泥子油

右調勻為四十九朝夕服一丸漸加量〇一九中

含蓄銀礬八九丸

又方

銀礬

橙花水

右溶和朝夕服一茶匕〇入硝子器以黑紙封之

暗心貯

刺必斯印歇尔那栗斯 ニトラス・アルゲンチー、ヒュニム

共銀礬無異就中供內服銀礬為佳〇外用膏

融劑以水些少濕之或溶之

另一方劉治遷延眼嫩銜魚骨腫脹者

刺必斯印歇尔那栗斯

一丸至

蒸餾水

右溶和沙過內硝子器以黑紙封之〇滴入眼中

另二方治遷延眼嫩銜粘液渗出甚者

刺必斯印歇尔那栗斯

二丸至

蒸餾水

右溶和內硝子器以黑紙封之〇用毛筆滴入眼

中日一次

另三方治創瘍弛弱內努脹者

刺必斯印歇尔那栗斯

蒸餾水

二至三

右液和煎撒紙貼患處

其二 水銀

華涅滿液散 プロットオキシゲム、ヘイダラルゲイ、ニトリニ、アムモニアカレ

為散若丸每服四丸丸半丸一丸至二丸

一方

華涅滿液散 一丸至 沙糖 半

右為一服朝夕一服冷水送下

又方(點)

華涅滿液散 一丸 甘草膏 二

右為二十九丸朝夕服一丸

(外用)

一方(破) 治角膜斑點

華涅滿液散 一丸 胡桃油 一

右合取少許塗眼日二三次

又方

華涅滿液散 一 酪 新搾者

右合為眼膏

赤降液 ラウトオキシゲム、ヘイダラルゲイ、ニトリニ、アムモニアカレ

為散若丸每服八丸丸四丸丸半丸至一丸

一方

赤降永化 乳糖 二
右調勻 乳八服 朝夕飯後 一服 冷水送下
又方

赤降永 阿芙蓉 各四
甘草末 宜各通
右合為十六丸 每晚服一丸 至四丸

(外用) 為敷供腐蝕劑 作軟膏敷潰瘍或製眼膏
另一方 布

赤降永 三 枯卷 三
右合為腐蝕劑

另二方
赤降永 一 家猪脂 二 三 三

右合塗撒絲貼患處
另三方

赤降永 十一 至
家猪脂 二 桃油 黃蠟 各一 代之用
右合每夕取少許用指塗眼管

另四方 (劉)
赤降永 六 四 至
密陀醋 合電 阿芙蓉 液 各 手
葛加 阿酪 或 牛 酪 執
或 若 二 執

赤灰水 ニトラス、ヘイタラシゲイリ、リキユイヂム

為丸若液劑朝夕服二滴至四滴

一方

赤灰水十 蒸餾水一

右合朝夕飯後取二十滴冷水和服漸加至四十

滴

又方

赤灰水三十 白蒸餾心 沙糖各半

右二丸為一丸朝夕飯後服一丸漸次增量

外用

一方 治疥癬及頭瘡

消毒銀脂膏(各半)

右微温塗患處

升灰 ニユイマス、デウトオキシデヘイタラシゲイリ

為丸若液劑每服四丸半丸至一丸〇此藥

共亞刺昆亞獲護沙列布椴栲栳汁等配合則

為是所外拆瓶其効力雖如白蒸餾亦尚然虫

如遇兒託亞煎甘草膏丸梳之力為劣〇為散

外用供腐蝕劑又作液劑軟膏浴湯

第一方

外水二 蒸餾水八
右液和朝夕一食七過見託五煎和服

另二方(刺)

升水一 亞的兒一

右液和每服十滴日二次

另三方(獨)

外水十 些少以蒸餾

白蒸餾心

沙糖 宜各適

右為二百四十丸隔日午飯後服之初日服四丸
後每服加二丸以至三十丸升三十九丸中含蓄以二
十八日為期限凡服藥中且魚用沙爾薩根煎粉

催氣蒸氣禁滋味飽餐

(外用)

另一方 腐蝕劑

升水一 亞刺昆亞獲漢料

右為極末微濕撒絲抹藥末貼患處

另二方(劉) 治癩毒贅疣

升水一 瑪布羅戈 再餾燒酒

右液和滴患部日一二次

另三方(福) 治割墨兒布刺兒

升水一 老利兒 結尔 斯水

右液和供用

第四方

西拾扒尾埕尾加至四

右敷縛帶用之

第五方

治眼嫩銜因瘰癧毒疾癰毒者
升灰一丸以薔薇 合電阿芙蓉液二

右調勻微溫蘸巾貼眼

第六方

治癰毒 家猪脂一

右研和十二時作軟膏○晚取半支擦右足踝骨

上十二分時次晚又擦左踝骨上如前如是每晚

左右交換施之漸增加至二支

第七方

治癰毒皮病 外液 確砂各二支

右熱湯浴和注于浴湯

第八方

治白帶下後淋耳中潰瘍等 外液 確砂各一丸以蒸餾水 阿芙蓉液一

右合為射注藥

第九方

治赤痢 尋常瀉腸劑不 外液大丸 蒸餾水一

方四方

名清血散

甘草

全硫黃各六

乳糖

广低涅失亞各半

右研末一時半許分六服朝夕取一服冷水送下

或日三四次

方五方

治蛔虫粘液及水腫

甘草

三九至

藥刺也

乳糖各一

右為散分二服先取一服冷水送下後四九時進

後服

方六方

治蛔虫及粘液

甘草

二九至

藥刺也十六九至

乳糖半

右為散分二服先取一服骨喜送下後四九時進

後服〇小兒二歲至十歲之服量

方七方

下劑

甘草

二九至

藥刺也一四九至

遇泥子油二匙 隔公英裁或劑隨

右煉為一塊頓服骨喜汁不和乳送下

方八方

名清血丸

甘草

全硫黃各一

右研合一時半許加甘草膏二刃二九為一九朝

夕服二丸

第九方 緩下劑

甘草 芦會 越巽劑 白石 皚 各一

右調勻二丸為一九方 魁服二三丸

第十方 下劑

甘草 葯刺巴 華 尔 斯 白石 皚 各一

右調勻二丸為一九 每服九九

第十一方 治遷延肝病

甘草 什 白屈 萊 越 巽 劑 白石 皚 各二

右調勻二丸為一九 朝夕飯後服十九丸至十五丸

(外用)

第一方

甘草 什 芦會 什 沙糖 各二

右為極末用葯翎管吹入眼中或微濕筆抹藥末

塗眼

第二方 治癩毒諸症 陰莖包皮 疔瘡及皮翻箱

膏者

甘草 什 石灰 水 各六

右合洗患處或射注臨用宜振蕩之○此劑不合

蓄甘草但合蓄酸化亦足甘草既為石灰水所化

托故也

第三方散 治眼欲衝因淋毒者

甘草一 石灰水六 菲阿煎越炭剂并

蔷薇水一

右溶和貼眼

第四方膏 治蛇虫及直腸粘液瘰癧

甘草一 至四 二九 五刺毘亞獲漢末并

細草水一 并一

右調勻為灌腸剂

第五方

甘草一 伊里乾布魯連底那根 沙糖各

右末作嚏剂

白降衣 ミエリマス、ヘイカウシゲイロ、アムニニアカシ

今世唯供外用

第六方

白降衣半 家猪脂或 葛加阿至

阿芙蓉四 六九 至

右作眼膏

第七方

白降衣六 十九 至 僕里亞兒毘半 并日

酏 新藥者
二 貳

右作眼膏

第三方 治疥癬

白降衣 貳 半脂 貳

右石臼內研合取榛子大於炒也擦腕臂膝脚

第四方 (選) 治疥癬

白降衣 貳 升衣 貳 家猪脂 貳

右塗擦如前方

第伍方 (骨) 治疫咳傳人多痛

白降衣 一 刃 貳 實芟谷利乾膏 貳

右合和塗擦患部以蠟布卷之日三四次以代吐
酒石膏

其三 銅

硫酸銅 シニハス、キエアリ
即人工胆卷

為散若丸每服四九丸半丸至一丸〇吐劑三

丸四九至八九丸為液劑頓服然不可護用

一方 (忽) 治膜搦咽喉嫩衝

硫酸銅 貳 乳糖 貳

右為散製劑十二箇每一時服一劑

又方 治勞瘵溶萌下利

硫酸銅 八九至
 萬尔面空刺 越芬 劑
 或刺 芬 九
 越芬 劑 三 支
 右二丸 為一丸 每夕 服 十丸

(外用)

一方 治眼 翳 衝 潰 爛

硫酸銅 二
 薔薇水 六

羯布羅 以二 燒 酒 至 三 解

右 作 眼 水
 又 方
 神 効 石 羊 皮 增 製 法
 薔 薇 水 八 寸 羅 製 之 胆 容 兩 石 明 蓉 三 味 輝

右作眼水

硝銅卷

ニハス、キエフ、アムニアカル

(增製法) 取 硫 酸 銅 末 適 量 內 硝 子 器 以 硝 金
 加 石 灰 精 液 更 加 亞 候 其 初 所 生 綠 色 底 塗 金
 成 底 青 色 已 取 之 乾 硝 子 場 固 封 貯

另 一 方 (棒) 治 癩 疔
 硝 銅 卷 三
 乳 糖 二
 右 調 勻 分 十 二 服 每 一 時 一 服 大 麥 水 送 下

另 二 方 (棒) 同 上
 硝 銅 卷 八
 白 蒸 餅 心
 沙 糖 各 二 十
 右 一 丸 為 一 丸 朝 夕 取 一 丸 薔 薇 水 送 下

粘汁半碗送下漸加至四九若八九〇此藥最易
為沙糖所化托故藥性耐化之以此方

確銅器十斤以確砂加石過尔託亞末一斤

右為三十九朝夕服一丸漸加量

另三方托治舞蹈病

確銅器十斤蒸餾水三升

右液和每服五滴日三次每隔日增一滴

另四方個屈林氏安負密亞斯末加下莖劑

銅以確砂加石灰

右加監酸適宜至為綠色透明稠濃液

另五方個安負密亞斯末加下莖劑

安負密亞斯末加下莖劑蒸餾水三升

右液和嬰兒一茶匙幼年長者一食匙食後服之

日二四次啤酒二

另六方獲阿栗斯氏安負密亞斯末加下莖劑

劑

確銅器三升蒸餾水四

右液和加鹽酸適宜至為綠色稠濃液

另七方獲

安負密亞斯末加下莖劑二支即

蒸餾水二十

右用法如第五方

其四 鐵

精製鐵屑

ハルノエム、ヒニルハラナム

為丸散若酒浸每服一丸二丸至五丸日二次至四次

第一方

鐵屑 桂各十 沙糖二

右為散丸十二服日四服為小兒服量
第二方 護胎仙傳病

鐵屑 刺蝟石引 沙糖一

右為散每服一茶匕日三四次

第三方

鐵屑二 健復五那哉引

右二丸為一丸衣桂末每服六丸日四次

第四方

鐵屑 橙皮末引 桂二

右合以列印設酒二升浸出十二時沙過每服一小酒盞日二三次

第五方

鉄屑一 大黃末一 姜末二 列印設筒七

右浸出六時 淨過每服半茶碗 若一茶碗 日四次
越二 扶十 屋フ 布フ 乾ス 末ニ 見レ 扶レ 西ア 栗リ 乾ス ポットナキゴトハハハリ

格二 碌一 屈レ 乾ス 末ニ 扶レ 乾ス シニブカルホナスハハリ

力丸散每服三丸 五丸至十五丸
第一方（整）

格碌屈初末見扶乾四丸至 府利油糖一

右為散製劑十二箇 每服一劑 日四次
第二方（整）

格碌屈初末扶乾二 油糖劑一 丸一 乾一 藥一 名一
右為散 頓服 日三次 多レ 恐レ 有レ 誤一

第三方

格碌屈初末扶乾二 續草越一 散一 劑一 彈一

右二丸為一丸 每服六丸至十二丸 日三四次

撒十 見レ 末ニ 扶レ 乾ス シニハスハハリ

為散丸 煉紙液劑 每服一丸 二丸至一丸

第一方 治肺血

撒十 末ニ 扶レ 乾ス 一丸至 吉訥六 沙糖一 彈一

右為散製劑十二箇 每一時 若一時 半服一劑

另二方 治粘液病
撒兒末尔扶斯 一丸 至 桂末 四 沙糖 半
右為散製劑六箇服一劑日二次

另三方 屬

撒兒末尔扶斯 三
葛尔面室刺末 二
右二丸为一丸每服七九日四次
亞刺昆亞護後境 通

另四方 屬

撒兒末尔扶斯 一
未蒙那我我劑 二
沒藥 各一
桂油 滴八

右二丸为一丸每服六九日二次

另五方 屬

撒兒末尔扶斯 一
右合加橙皮舍利別 適耳 二丸为一丸每一時服
四丸
沒藥 越我劑 一
半 一

另六方 屬

撒兒末尔扶斯 一
薄苛昆設尔希 二
橙皮舍利別 三
黃美那末 三
右合為散劑每一時半服一茶匕

外用

第一方 治角膜斑點

乾白撒兒末 扶乾 十四分 至

沙糖 二

右為極末 取少許 用毛筆入眼中

第二方 治淋疾

撒兒末 扶乾 十六分 至 蒸餾水 六

右作射注劑 或蘸巾貼眼

第三方 治眼中潰瘍及角膜翳障

撒兒末 扶乾 八分 至 蒸餾水 一

右合点眼中

第四方 治鼻痔及腔內息肉

撒兒末 扶乾 一分 至 蒸餾水 一

右夾撒絲作筆形蘸之 掃鼻中

第五方 人工欬泉 小兒用方

撒兒末 扶乾 二分 至

右沸湯溶解 注于浴湯

第六方 人工鐵泉 大人用方

撒兒末 扶乾 二分 至

右沸湯溶解 注于浴湯

外鐵鹽 (Sulfate, etc.)

每服五分 至十五分 常為溶劑 用之 此藥

引濕氣即化成洗動故草用少大抵與豆的見
配合作末尔扶斯鎮痛液

一方 治衰弱下利

升鉄鹽三 阿芙蓉液二十

桂水 五刺昆 豆獲漢漿各三

右溶和每服一食匕日二三次

又方 治腺病

升鉄塩一 蒸餾水一

右溶和每服二十滴至四十滴日四次

末尔扶斯鎮痛液 アルフォルニシヒニヒノマ、アチレウス、ヘリ

每服十滴二十滴至三十滴日一二次

一方

末尔扶斯鎮痛液三 葛粉多見一

右合每一時半服二十滴

又方

末尔扶斯鎮痛液一 桂水六

橙花舍利別二

右調勻每一時服半食匕

收斂鉄液 ユリアス、ヘリ、リキユイヂム

此藥今世不供用但為止血劑○以塩酸代之

可也

確鐵華

ニエラス、ヘビ、アムヒニカレ

為散丸煉液劑每服五丸十丸至二十丸
藥唯作煉藥最佳何者為散劑則易引濕氣作
液劑則味不佳且如丸藥宜加脂麥造之尚易
破碎攻也

第一方 治間歇熱

黃芩那末 一
確鐵華二丸至
桂末三

右為散製劑十二箇每服一劑日三四次

第二方

確鐵華五丸至 甘草膏一

蒲公英裁 裁劑隨

右合作一塊煉藥每一時半若二時服一塊

第二方 治間歇熱

確鐵華五 確砂十 甘草膏一

蒲公英裁 裁劑隨

右合為一塊煉藥每一時半若二時服一塊

第四方 同上

確鐵華五 確砂十 黃芩那末

蒲公英裁 裁劑隨

右合作一塊煉藥每二時服一塊

另五方 蒲兒墨氏取林用

硝鉄華 明礬 黃家那越炭劑各半

桂油 桂末

右二丸為一丸朝夕服五丸至十九

另六方 治弛弱性月經閉塞

硝鉄華 芦會越炭劑 雜炭劑

瓦尔板奴漢 拔尔撒謨字露

右二丸為一丸朝夕服五丸至十九

鉄下炭劑同造方

每一時半服二十滴三十滴至四十滴或取一

支至二支加酒君桂水六至八支每服一食

一方

鉄下炭劑同造方

右加白蒲桃酒一場每服一食七日四次漸加至

一酒盞

撰植加鉄下炭劑

每一時半若二時服十滴二十滴至四十滴桂

水若酒和服

一方

槓植加鉄丁炭劑一
桂水

橙花合劑一

右調勻每一時半服半食也至一食也

又方

槓植加鉄丁炭劑二

右加白蒲桃酒半場每服半酒盞至一酒盞日四

次

其五 錫

錫屑

スタニム、ヒル、ラ、主ム

海鹽製法 錫屑 純錫 海鹽 各木 右先 温石 研入 淨研至全 貯之末 洗 為故 若煉 每日服 一刃 至一 支

另一方

錫屑 綿馬根末 蜜

右合作故劑服一茶匕強日三服臨服宜振蕩之

另一方

錫屑 葯刺巴末 蜜

右合作故劑每二時服三茶匕骨喜不和乳送下

另一方

錫屑 綿馬根末 葯刺巴根末 各半

蜜

右合作一塊煉藥早朝服一塊後半時又服一塊

其六 銘

密陀醋

アセトス、アノニヒ、リキニイタ

第一方 治白帶下淋疾

密陀醋三 蕃薇水五

右合乃射注劑

第二方

密陀醋二 蕃薇水四 阿芙蓉液五

右溫眼

第三方

密陀醋二十 阿芙蓉液五十

右照眼

第四方 治赤痢

密陀醋一 阿芙蓉一 加密列四

右合為瀉腸劑

第五方 治火傷芫菁膏痕毒瘡等

密陀醋膏 油三 密陀醋四 增製法 家猪脂阿 列和

右金之縛帶

第六方

羅

扶和屈漢膏
二補由各增製法
○精製家猪脂
所一列
此右上天煮
至將點加容
陀僧夫一北
用蠟各
根不休于境
并至溶和更
煮至成思
福包
右攤布片貼
創上
羅獨窠馬尔
リキエオル
シニブアセク
ナスブリエル
ヒ

一方

羅獨窠馬尔
十八至

右乃冷煎劑或温煎劑

又方

羅獨窠馬尔
四阿芙蓉液
一

右微温煎中貼眼

銘糖

アセラス、フリユレヒ

為丸散若液劑每服四丸
半丸至一丸
日三次

第一方

銘糖六 阿芙蓉三 乳糖三

右為散丸十二服朝夕一服冷水送下

第二方

銘糖六 健復更那越天劑各一

右為六十九衣石松子末每服二丸至五丸日三

四次

方三方(膏)

鉛糖二九至

面香水九

全電阿芙蓉液一

橙花舍利別子一

右調勻每一時若一時半服一食也○小兒每服

一茶匕

(外用)

一方

鉛糖九

蕃薇水六至

阿芙蓉液二

右合為眼水

又方治淋疾

鉛糖心 蒸餾水六

右合為射注劑

其七 亞鉛

亞鉛萃 方中しだん、しん

為散嬰兒每一時半若二時服四九至半日
大人每一時若一時半一丸至二丸

第一方

亞鉛萃二九至 桂油糖一

右為散製劑十二箇每一時半服一劑

第 二 方

正 鉛 華 二 錢
桂 油 糖 各 二 錢

檢 葉 末
檢 花 末

右 調 勻 每 服 一 茶 匙 日 三 次

第 三 方 治 小 兒 搐 搦

正 鉛 華 三 錢 至 五 錢
麝 香 一 錢 至 二 錢

煨 製 六 伍 溫 失 五 錢 乳 糖 四 錢

右 為 散 分 八 服 每 一 時 差 一 時 半 一 服

外 用

第 一 方

五 鉛 華 二 十 錢 至 三 十 錢
阿 莫 蓉 六 錢 至 八 錢

家 猪 脂 二 錢

右 合 為 眼 膏

第 二 方

五 鉛 華 一 錢 至 二 錢
赤 石 脂 一 錢
家 猪 脂 一 錢

右 合 為 眼 膏

第 三 方 治 足 部 創 傷 疼 痛 若 顏 面 潰 瘍

五 鉛 華 一 錢 至 二 錢
石 松 子 末 各 半 錢
越 沒 里 膏 一 錢

右 貼 患 部 縛 帶 之

第 四 方 治 白 帶 下

五 鉛 華 三 錢
水 一 錢

皓礬

右合为射注剂

至十丸
为速散若溶剂每版八丸
吐剂四丸六丸

一方 峻吐剂

皓礬^十 乳糖^{十二}

右为散倾服

又方(辨)同上

皓礬^{十五} 至 蒲公英^越剂^一

右作一块煉藥衣甘草末傾服

(外用)

另一方

皓礬^一 以^次 蒸餾水^解

阿芙蓉液^一

右調勻點眼

第五方(哈)

皓礬^二 蕃薇水^三 楨楂核黏汁^一

阿芙蓉液^三

右調勻取一滴点眼日二次

第三方(擊)

皓礬 鉛糖^{各六} 蕃薇水^六

第_二方

金硫黃_二

何芙蓉_三

羯布羅_四

沙糖_一

沙糖_二

右為散_八服日四服冷水送下

第_三方

金硫黃_一

硝砂

甘草末

各_半

右為散_三服每一時一服冷水送下

第_四方

清血散出于甘草條

第_五方

金硫黃_一

土木香_一越_一剖_一

右合為三十丸每一時半若二時服三丸

第_六方

清血丸出于甘草條

第_七方

金硫黃

双鸞菊越_一剖_一

各_二

朴屈福烏_一為脂

甘草膏

各_二

右為_二丸為一丸服三丸至六丸日四次

第_八方

和胸剖

金硫黃

羯布羅_六

豆刺毘_一豆_一獲_一漢

沙糖_各

右研末和苗香水六_一每_一時服一食_七臨服_宜

振蕩之

結爾茂斯密涅刺列 シドロンニシユレナク、スナヒ

为丸散君密屈剂

另一方 和胸剂

結尔茂斯密涅刺列 一丸至

茴香油 一

阿芙蓉 四丸

右调勻每一時若一時半頓服

另二方 治傷亡實性喘息

結尔茂斯密涅刺列 一丸 朴屈福烏馬脂

紫堇越戎剂 略

右每服三丸至六丸 日四次

另三方 和胸剂

結尔茂斯密涅刺列 一丸 羯布羅 一

甘草膏 一

右合為二十九每一時半服一丸○悉散剂者宜

与之

另四方 同上

結尔茂斯密涅刺列 六 羯布羅 十二

沙糖 亞刺昆 亞獲漢 各一

右研末和葡萄酒六勺每一時半服一食

力散若溶劑催吐劑，病欲劇每服八九丸，四丸
丸至半丸吐劑一丸二丸三丸至四丸

第一方 治精神錯亂及心思鬱憂病

吐酒石四 蒸餾水三四

右每半時服一食匕

第二方 百和孫解熱劑

吐酒石一 水八 以蒸餾水解 白罌粟舍利別

五刺昆 五護 漢 橙花水各半

右調勻者免熱時先服一食匕後半時服二食匕

又過半時服三食匕午飯後再自一食匕始漸增

量如前

第三方藥 治肺嫩傷及胸痛

吐酒石十六 至九 蒸餾水六

右滾和每一時服一食匕

第四方 吐劑

吐酒石一 吐根十 沙梅半

右冷水頓服

第五方 小兒吐劑

吐酒石一 蒸餾水三

右先取其半頓服後每八分時服一食匕以至得

第六方 名吐酒石硬膏

吐酒石 一匙至 安汶元 丑戌膏 羊 若 燿 製 法

膏 二七 黃 蠟 護 漢 安 汶 元 丑 戌 膏 羊 若 燿 製 法
列 並 底 那 各 三 弓 右 先 煎 膏 典 蠟 輝 之 拔 奴 誤 的
味 微 火 輝 之 棄 膏 蠟 未
冷 合 之 如 法 作 硬 膏

右 攤 掌 大 軟 草 貼 胸 上 若 肩 胛 間

安 貨 汶 酒 七 三 二 六 八 十 七 十 二 六

和 胸 剖 兌 汗 刺 每 服 二 滴 五 滴 十 滴 至 二 十 滴

○ 吐 劑 小 兒 半 匙 至 一 匙 大 人 至 四 匙 ○ 吐 劑

一 弓 合 蓄 吐 酒 石 二 分

第一方 小兒吐劑

安 貨 汶 酒 半 海 葱 蜜

過 尔 託 五 告 刺 別 各 三

右 調 勻 每 八 分 時 服 一 茶 匕 以 至 得 吐

第二方 同上

安 貨 汶 酒 二 吐 根 心 海 葱 蜜

覆 盆 子 舍 刺 別 各 半

右 調 勻 每 八 分 時 服 一 茶 匕 以 至 得 吐 臨 服 宜 振

蕩 之

第三方 和 胸 剖

安 貨 汶 酒 確 砂 加 過 泥 子 精 各 二

海葱蜜彈 過尔托亞舍利別 苗香水各一

右調勻每服一茶匙

另四方 亮汗劑

安復沒酒 瓦埵列利精各半

過尔托亞舍利別子

右合每半時服一食匕服後即喫梓骨木花飽劑

一疏

其九 昆私繆葛

消酸昆私繆葛

シエフニトラス。ヒスミユチ

增製法の消石精加水等分者適宜昆私繆葛
適宜為粗末右取昆私繆葛後々滴下于内石

精令溶和終至全不溶和取昆私繆葛二三培
水徐徐注加則生白塗於是頓去上清其其
紙上更注水洗淨二三回暗處貯乾
硝子場固封用黑氣覆之暗處貯乾

第一方 治胃症有奇効

消酸昆私繆葛四 嫩製六厘涅失五 或牡蛎五

白柿末十六 葛縲子油糖一

右為散製劑十二箇每服一劑冷水送下日三四

次

第二方 治癩痢

消酸昆私繆葛八 至 續草末三 刀一 至

續草油糖一

右為散製劑十二箇朝夕飯後服一劑

第三方(賢) 治同散熱

消酸昆和繆萬三四至 薄荷油糖一

阿芙蓉四丸

右為散製劑十二箇每一時半服一劑

第四方 治癩病

消酸昆和繆萬一 繆草裁一劑一

繆草油二十滴至 繆草末適

右合為六十九八疳子器子之每服六九至十二

九日三次

(外用)

一方(癩) 治癩癬

消酸昆和繆萬一 家猪脂三

右調勻塗患部

其十 砒石

砒酸 アセチル、アルセニコシム

為散丸若溶劑然作溶劑最佳小兒六歲至九

歲者每服三十分丸至二十分丸大人十二分

丸至八分丸

第一方(癩)

(外用)

第一方

砒酸什 銀朱 蘇列 亞律 護加 兒說 乙洋

血竭 各四

右極末 砒子 器貯 取一 九半 至一 九和 以軟膏一

錢塗 撒絲 掩癌 腫樣 創宜 至創 圍外 一方 許

軟膏 製法 拔取 撒護 字露 失鳩 谷裁 裁劑

各一 銀糖 舍電 阿芙蓉 後 裁彼 里

膏 右調 勻

第二方

砒酸 四十 銀朱 二

支潤 利乾 蘇列 亞律 護加 血竭 什

右極末 知唾 液若 水用 筆塗 癌腫 樣創 上用 金箔

若軟 華若 布片 若物 蛛絲 覆之

第三方

砒酸 什 銀朱 一 血竭 一

右極末 知唾 液塗 患處

第四方

砒酸 八 阿芙蓉 末 什 密陀 醋膏 二

右塗撒絲肺瘰腫核創上以此代身一方

另方(蜀)

砒酸 二斤 至

蒸餾水 一

右外用

另六方(栗)

砒酸 六斤 至

蒸餾水 六

右為洗藥

袖珍內外方叢卷之三終

