

門中武
新 150
卷 /



刻 二

小兒痘疹

保赤全書



喬山堂梓行

保赤書經如保赤子

四境孟子 連年四境

保赤全書

陵金陵也大明一統志在楚威王初置金陵邑其地有王氣埋金以鎮之故多禱瘕洄集之序直隸高禱極矣禱同祀韻會年也爾雅商曰祀疏孫炎曰取四時祭祀一訖訖回春自布其禱十禱折節

保赤全書叙

沈侯治陵五禩。四境晏如業已。舉我陵赤子而保護安全之矣。每於暇時折節過余。劇談六合。內外事或評騭古今藝文。郎方家岐黃之術。靡不辯析。一日謂

劇談楊子曰維口吃不能劇談六合治法天地四方也評騭言評也品論也量也訂也隨職也切音質升也又

隲

成也。博書。惟天
陰。下民。注。
定也。方家
方梅氏曰。術也。法
也。又類書。道
也。

為海內
言四海者。至大。廣
者。而身。精。兼。潤
在。於。此。而。又。素。
問。本。草。之。二。事。
於。其。內。亦。希。珍
之。事。故。也。素。裏
而。不。相。離。而。行
於。四。海。攝。精
日。擊。緯。男。女。攝。精。萬。物。化。生。關。繫。帶。按。按。之。取。關。繫。於。之。根。本。鴻。梅。氏
曰。大也。鉅。又曰。大也。唐。鄭。玄。傳。鉅。與。鴻。生。度。梅。子。曰。達。各。切。音。鐸。筆。誤。

也。且。里。也。計。也。科。也。村。也。詩。小。雅。周。之。爰。次。呂。度。
補。梅。氏。曰。神。也。真。
也。加。色。存。之。
補。當。作。卿。本
在。其。內。亦。希。珍
故。會。試。於。凡。編
不。賴。明。者。之。施
前。漢。書。以。為。李
唐。書。以。為。李
唐。書。以。為。李

余曰。陵故梓有本草與素問相
表裏為海內希珍獸嬰兒痘疹
從古方書多所未悉且其根源
隱於父母構精之初其存亡判
於倏忽變幻之際關繫鴻鉅理
旨微渺惜世無全書度茲衆生

若之何先是從兄樛幼補邑庠
九鄉於試會數奇弗竟厥施嘗
秘受此術活鄉之嬰兒數千百
人余以從兄所藏書若干卷眎
侯侯津津然快亟命醫士李時
中等參挾較訂博採群書勒成

也。且。里。也。計。也。科。也。村。也。詩。小。雅。周。之。爰。次。呂。度。
補。梅。氏。曰。神。也。真。
也。加。色。存。之。
補。當。作。卿。本
在。其。內。亦。希。珍
故。會。試。於。凡。編
不。賴。明。者。之。施
前。漢。書。以。為。李
唐。書。以。為。李
唐。書。以。為。李

無起樓臺尔雅虎
 綻大誇之傳
 展一經猶
 經歷之經又經
 過也言周其
 濟之用
 國家命脈回春
 自歸弗克為良
 相贊廟謨以壽
 國脈則云
 丁梅曰古文其字
 補瘡瘕史劉敬傳天下之民瘡瘕者未起○附唐杜甫詩願聞哀痛詔招問瘡瘕韻

金陵管

橋禹父題



金陵管
 橋禹父題
 金陵管
 橋禹父題
 金陵管
 橋禹父題

保赤全書目錄

卷之上

- 原痘 第一
- 辨痘症似傷寒 第三
- 看耳後筋文斷法 第五
- 面部驗痘吉凶圖 第七
- 看四時氣色 第九
- 初熱看面色以斷後症 第十一
- 異痘 第十三
- 治痘摠要 第十五
- 氣血 第二
- 痘症傳變 第四
- 紙燃照法 第六
- 部位論 第八
- 觀痘形色 第十
- 看耳目口鼻秘訣 第十一
- 雲翼子異痘廿八 第十四
- 諸醫評 第十六

痘後日期 第十七

五運六氣 第十九

治痘須明經絡 第二十一

虛痘禁用藥性 第二十三

小兒服藥 第二十五

調養禁忌 第二十七

又禁忌 第二十九

論血虛實寒熱 第三十一

論裏虛實寒熱 第三十三

預服稀痘方 第三十五

痘症決生死日期 第十八
脈 第二十

用藥 第二十二

汗下 第二十四

乳母服藥 第二十六

避惡氣 第二十八

論氣虛實寒熱 第三十

論表虛實寒熱 第三十二

論三陰三陽症治

初熱三日症治 順逆險第
三十六

報痘三日症治

貫膿三日症治

落痂症治及醫後餘症

痘中雜症

發熱

厥冷

夾疹

夾凡瘡

乾枯黑紫血諸陷

倒陷

順逆險第
三十七

順逆險第
三十九

順逆險第
四十二

順逆險第
四十四

順逆險第
四十六

順逆險第
四十八

順逆險第
五十

起脹三日症治

收醫三日症治

諸症提要

寒熱

夾斑

夾砂

發泡

白陷灰陷

倒醫

順逆險第
二十八

順逆險第
四十

順逆險第
四十一

順逆險第
四十三

順逆險第
四十五

附丹第
四十七

順逆險第
四十九

順逆險第
五十一

順逆險第
五十三

順逆險第
五十五

內潰 第五十六

瘁塌 第五十八

腰痛 第六十

腹脹 第六十二

目睛露白 第六十四

咽喉 第六十六

痰涎 第六十八

水噎 第七十

驚搐 附癩癩瘋等症第七十二

煩燥 第七十四

頭溫足冷 第五十七

痛 第五十九

腹痛 第六十一

面目預腫 第六十三

口舌 附痔瘡第六十五

咳嗽痰喘 第六十七

失音 第六十九

中風 第七十一

倦怠 第七十三

發渴 第七十五

噎氣 第七十六

汗 第七十八

嘔吐 第八十

吐瀉並作 第八十二

咬牙寒戰 第八十四

陰囊發腫 第八十六

痘瘡乾燥 第八十八

癰毒 第九十

惡証不治歌 第九十二

卷之下

不食 第七十七

諸失血 第七十九

瀉痢 第八十一

痢 第八十三

二便 第八十五

痘後浮腫 第八十七

痘疔 第八十九

眼目 第九十一

女人出痘 第九十三

姪婦出痘 第九十四

麻疹症治 第九十五

麻疹輕重不治三症要訣 第九十六

水痘症治 第九十七

用藥法象 第九十九

目錄

保赤全書局方目錄

第九十八 凡三百五十二方

一 敗毒散 治初熱壯盛等症

二 蘇解散 治痘初壯熱頭痛或腰痛

三 參蘇飲 治壯熱風痰寒

四 麻黃湯 治初熱壯甚疑似未明服

五 升麻葛根湯 治初熱壯甚疑似未明服

六 和解毒湯 治初熱壯甚疑似未明服

七 人參羌活湯 治痘發甚驚搐

八 解毒疎痘湯 治痘發甚驚搐

九 加味葛根湯 治痘發甚驚搐

十大靈丹 治壯熱癩狂發驚語紅

十一 無比散 初熱服痘出自稀又治痘夾
 十二 小無比散 治痘初熱口渴小便澀大便秘口氣熱煩燥
 有熱者可用 治痘初熱或色焦紫或有紅班自發熱至起脹時
 後餘熱亦可用 治痘熱毒太盛狂言引飲痘疹經紫黑陷
 十三 辰砂益元散 治痘熱毒太盛狂言引飲痘疹經紫黑陷
 十四 退火回生散 治痘熱毒太盛狂言引飲痘疹經紫黑陷
 十五 龍腦膏 治痘毒出未透心煩狂亂如見鬼
 十六 猪尾膏 同前已出未透心煩狂亂如見鬼
 十七 威靈龍腦散 治痘毒出未透心煩狂亂如見鬼
 十八 獨聖散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 十九 大成散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 二十 無比散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅

廿一 人牙散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿二 無價散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿三 烏金膏 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿四 紫金散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿五 紫草飲 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿六 連翹升麻湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿七 清地退火湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿八 紫艸透肌湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 廿九 化毒湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十 解毒散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十一 透骨解毒湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十二 紫艸透肌湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十三 化毒湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十四 解毒散 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
 三十五 透骨解毒湯 治痘起發有起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅

卅五 消毒飲 治痘已出上焦
卅六 四聖散 治痘熱胸膈不快
卅七 加味四聖散 治痘不紅活小倒靨不起
卅八 鼠粘子湯 治痘赤身熱未退或風吹復冒者
卅九 涼血解毒湯 治痘乾枯未退
四十 惺惺散 治痘頭痛壯熱喘急
四一 五積散 治痘不快為毒散熱之劑
四二 內托散 治痘不快有內傷等症
四三 四君子湯 補養胃氣
四四 保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟
卅五 如聖湯 治痘已出未愈身熱如火

四九 補中益氣湯 治虛熱
五十 人參歸薯湯 治痘頂不起血不紅活雖或成癩
五一 生脈健脾湯 治痘氣血不足也氣不足
五二 通天散 治痘已出熱不紅活
五三 升天散 治痘頂散或紫紅黑陷乾枯
五四 七真湯 治痘不起脹漿八九十日皆可服
五五 淫羊補漿湯 治痘壯或漿清不
五六 補元湯 治痘頂氣有餘而根盤不聚色不
五七 活血湯 治痘淡色
五八 異攻散 治方調順陰陽會表裏之非寒不可輕用耳
四九 補中益氣湯 治虛熱
五十 人參歸薯湯 治痘頂不起血不紅活雖或成癩
五一 生脈健脾湯 治痘氣血不足也氣不足
五二 通天散 治痘已出熱不紅活
五三 升天散 治痘頂散或紫紅黑陷乾枯
五四 七真湯 治痘不起脹漿八九十日皆可服
五五 淫羊補漿湯 治痘壯或漿清不
五六 補元湯 治痘頂氣有餘而根盤不聚色不
五七 活血湯 治痘淡色
五八 異攻散 治方調順陰陽會表裏之非寒不可輕用耳

三內助丹

四回生起死丹

五理中湯

六和中湯

七藿香正氣散

八藿香安胃散

九丁附治中湯

十定痛散

十一黃連湯

十二益黃散

三助陽丹

六蘇發散

六蘇發散

七加味平胃散

七桂枝芍藥湯

七人參養胃湯

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

七珍散

八堅腸湯

九黃連解毒湯

十加味犀角飲

十一寶散

十二梔子仁湯

十三人參白虎湯

十四竹葉石膏湯

十五麥門冬湯

十六參苓白朮散

九白朮調元散

十荳蔻丸

十一犀角地黄湯

十二斬關散

十三生脈散

十四生脈散

十五生脈散

十六生脈散

十七生脈散

十八生脈散

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

治腹脹白不食寒逆上嘔不紅

百一 紫霜丸	百二 葱白湯	百三 羌活當歸湯	百四 當歸六黃湯	百五 半夏生姜湯	百六 葛根黃芩湯	百七 獨活消痰飲	百八 天花散	百九 井桔湯	百十 三黃熟艾湯
治頭痛	治頭	治初熱時背痛	治盜汗	治氣喘而	治有汗	治瘧後	治失音	治利或痛	治利或痛
百十一 蜜導法	百十二 黃芩湯	百十三 如神湯	百十四 二陳湯	百十五 黃芩半夏湯	百十六 五味子湯	百十七 清肺飲	百十八 清肺散	百十九 利咽解毒湯	百二十 甘露飲
太熱則焦務要得中	治身痛	治腰痛	治痰	治乾嘔	治而利	治聲乾	治聲末	治咽喉疼	治牙疳去血喉舌生瘡

百二十一 承氣湯	百二十二 通腸散	百二十三 四順飲	百二十四 枳殼散	百二十五 前胡枳殼湯	百二十六 滑利散	百二十七 導赤飲	百二十八 四苓散	百二十九 參苓湯	百三十 柴胡麥門湯
治秘結同上	治同上	治秘結	治腹脹大便熱秘	治赤痢	治淋瀝亦可用	治渴發驚	治去肉桂方	治經日不退	治壯熱
百三十一 宣風散	百三十二 大柴胡湯	百三十三 通幽散	百三十四 涼膈散	百三十五 堅實固則喘氣	百三十六 八正散	百三十七 辰砂五苓散	百三十八 五苓散	百三十九 小柴胡湯	百四十 小柴胡湯
治秘結	治大便熱	治秘結	治舌生瘡煩渴	治未回壯熱不退	治便秘	治瀉發燥謔語	治利水陰陽	治小便秘	治陰陽

百六 大連翹飲 治痘後凡發熱赤腫癰毒

百六 二聖散 治前同

百七 必勝膏 治腫毒

百七 敗艸散 治爛流

百七 綿蠶散 治疥癩瘡膿水不絕

百七 秘傳茶葉方 治疥癩欲落不能抱者

百七 乳香韶粉散 治疥癩瘡毒入眼

百七 洗肝散 治腫毒入眼

百七 發雲散 治生翳

百六 四聖膏 治疔挑破

百六 趙氏敷藥方 治疔後肥疔內見筋

百六 金華散 治疔後肥疔水鮮毒

百七 三豆散 治熱毒瘡爛不斂

百七 生肌散 治熱毒瘡爛不斂

百七 地黃散 治疔毒入眼

百八 密蒙花散 治疔毒入眼

百八 羌活菊花散 治眼羞光

百八 兔糞散 治眼

百八 吹耳丹 治眼

百八 木驚膏 治眼

百八 安胎散 治胎動

百八 安胎獨聖散 治胎動

百九 柳花散 治室女

百九 秘傳返靈丹 治灰自頂陷

百九 回生丸 治黑陷

百九 龍虎丹 治一切紫黑陷伏危症

保赤金書

目錄

二花散

對棋

百九 胎元散 治痘不起發不活潤者是血氣俱虛胎元之不

須是人補此理雖好但仁人君補木壤須用木修人損

百九 水楊湯 治痘乾乾以備參考云

百九 黃連杏仁湯 治痘出因內熱

百九 大補湯 治痘虛氣

百九 溫膽湯 治痘面青筋縮嘔吐

百九 中和湯 治痘氣寒鼻流涕或瀉

百九 陳氏木香散 治痘前

百九 雙解散 治痘表寒瘡不起發身發寒

百九 百解散 治痘表熱瘡焦紫不起

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九 參苓白朮散 治痘出裏寒飲食少進大便泄瀉小

百九 平和湯 治痘出被諸穢所觸此藥大能解風邪穢毒之

百九 神効消毒保嬰丹 每歲春分秋分日服藥一丸能消痘

百九 代天宣化丸 即韓氏五瘟 龍鳳膏

百九 稀痘仙方

百九 鼠肉方

百九 蝦蟆方

百九 雞蛋方

百九 葫蘆花湯 判方

百九 烏魚湯 稀痘

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九

百九 玄兔丹 本府鄭府尊方○以

百九 苦練子湯 巡御方

百九 三豆湯 俱以下諸方

百九 鯽魚方

百九 兔紅丸

百九 四脫丹

百九 龍鳳膏

百九 龍鳳膏

百九 龍鳳膏

百九 龍鳳膏

陰陽二血丸 治小兒瘧瘡未出者稀已出者減用鹿血免血各以青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香各一錢為末煉蜜綠豆大每服十九空心酒下凡小者減之 孫氏集效方 見本綱

預防散

治瘧未出之時服之或無

甘艸散

治瘧未出之時服之或無

稀痘丹

治發熱三日之內初起

清涼湯

治口氣臭

痘保嬰丹

將發痘時

味稀痘飲

將出時服之

調珠砂丹

可以稀痘

砂解毒丹

解毒神效

服萬靈丹

即輕百發

白牛毛散

治瘧初出

固陽散火湯

治痘初出

四物快班湯

治痘甚乾燥

大補保命湯

治痘易破

寬中快班湯

治痘不起

補脾快班湯

治痘不起

加味四聖散

治痘便秘

防風升麻湯

治痘不快

涼血芍藥湯

治痘作痛

除濕湯

治痘濕收

作喘寒燥

治痘語小

芍歸均氣飲

治痘出如豆

四君快班湯

治痘氣虛

平胃快班湯

治痘久陰

托裏快班湯

治痘毒甚

十宣湯

治痘因邪

快班湯

治痘大便

秦艸湯

治痘六七日

十全大補湯

治痘頂平

清金導赤飲

治痘熱不

白龍散

治痘潰爛

一以... 用... 藥... 治... 效...

固陽散火湯 治痘初出 色白皮薄	四物快班湯 治甚乾燥	大補保命湯 治痘破皮	寬中快班湯 治痘起發者	補脾快班湯 治不起手足	加味四聖散 治便秘大者	防風升麻湯 治痘不快者	涼血芍藥湯 治痘作痛	除濕湯 治痘不齊者	作喘寒燥 治危者
芍歸均氣飲 治痘出如豆	四君快班湯 治痘氣虛	平胃快班湯 治痘久陰	托裏快班湯 治痘起者	十宣湯 治痘因邪穢	快班湯 治痘大便秘	秦芩湯 治痘六七日	十全大補湯 治痘頂平	清金導赤飲 治痘熱不	白龍散 治痘潰爛

麻油擦法 將痘發之時 將行之時	三花丹 小兒將出 之能稀痘	輕班散 治痘未見 稀痘	三酥餅 解痘熱 神效初	稀痘如神散 此藥極消 毒氣	稀痘獸驗丹 治痘凶者 輕服之	預防散 治痘少重者 轉輕	甘艸散 治痘不致 大甚	稀痘丹 治發熱三日 之內	清涼湯 治氣臭
稀痘保嬰丹 將發痘時	六味稀痘飲 將服之時	蜜調珠砂丹 將出時服之	珠砂解毒丹 解毒神效	預服萬靈丹 即輕發熱 百發百中	白牛毛散 治痘初出	涼血化毒飲 治痘頭焦	解毒托裏散 治痘稠		

當歸涼血湯 治血出 治血天寒氣鬱 當歸解毒湯 治血過而不醫者 發太致肌肉不落者

桂枝解毒湯 治血過而不醫者 發太致肌肉不落者

人參固肌湯 治血不密痲久粘肉不落者

八物湯 仍治痲發痲去痲皮

人參清神湯 治痲昏迷沉痲者

馬齒莧散 治痲同前

當歸桂枝湯 治痲後手足不能伸屈

蟬蟻法

黃連陰慝丸 治痲感瘡

硃凡散 治白口瘡

當歸解毒湯 治痲大便秘

白鷹糞散 治痲痲不落

玄參化毒湯 治痲後赤火

蚕退散 敷牙痲

陰陽散 治赤口瘡

洗心散 治痲通至前赤白二瘡

防風葛根湯 治痲發癢

十三味敗毒散 治痲毒

望月砂散 治痲室不能開

紫中木通散 治痲身熱小

荆芥解毒湯 治痲赤短者

麻黃解毒湯 治痲紫黑陷

小靈丹 治痲發痲一切惡症危者

加味清肺飲 治痲發紫

加味四聖解毒湯 治痲大便秘

消風火解毒湯 治痲發

蜆子湯 治痲後癢

涼肝明目散 治痲羞明

羊同骨髓 治痲痲欲落

加味升麻湯 治痲熱甚

絲瓜湯 治痲乾枯

參耆內托散 治痲氣虛痲者

調元托裏湯 治痲泄瀉

犀角消毒飲 治痲痛

世三	世一	世九	世七	世五	世四	世二	世一	世十	世八
加味麻黃散	桂枝解毒湯	防風解毒湯	如聖散	歸脾湯	瀉肝散	涼血解毒湯	涼血地黃湯	三一承氣湯	神效隔蒜灸法
治不出痘	治寒月痘	治暖投此藥	治安胎	治通血海乾涸	治發熱昏沉	治非經發熱	治不止室熱	治結腹瀉	治疥疔
世四	世三	世三	世八	世三	世三	世三	世三	世九	世三
化班湯	升麻解毒湯	黃連解毒湯	黑神散	逍遙散	當歸養心湯	拔毒膏	神效隔蒜灸法	三一承氣湯	神效隔蒜灸法
治色紅痘	治以此發之	治以此發之	治後血作癢	治全前	治口瘡不言	治全	治疥疔	治結腹瀉	治疥疔

世六	世四	世三	世二	世一	世五	世三	世二	世一	世九
加味五皮湯	潤腸湯	空延散	紅花湯	當歸湯	麝干牛蒡湯	大黃化毒湯	平胃散	妙應丸	羌活當歸湯
治濕浮腫	治虛秘	治陰瘡	治痛痘	治盜汗	治熱藥太過	治結大便	治不思飲食	治熱腹痛	治皆作痛
世七	世五	世三	世二	世一	世四	世三	世二	世一	世九
神效散	加味鼠粘子湯	灯心竹葉湯	人參四苓五皮散	仙方活命飲	一聖散	芍藥防風湯	保和丸	桃仁承氣湯	羌活當歸湯
治痘作渴	治陰中有	治乾喘	治浮腫	治痘	治喉痛	治全前	治全前	治全	治皆作痛

目錄畢	五 清金降火湯	四 黃芩湯	三 三黃丸	三 文蛤散	三 瀉白散	世 黃芩芍藥湯	世 竹茹石膏湯	世 玄參解毒湯	世 養榮湯
	治麻後熱聲 喘嗽氣急	治赤痢後 赤白痢	治赤痢後 赤白痢	治麻毒入胃 走馬牙齦	治麻毒入胃 走馬牙齦	治帶下者 治麻症	治作痛 治麻症	治全前	治色白 治痘
	五 羌活散	五 麥冬清肺飲	四 香連丸	四 雄黃散	四 蘆膾肥兒丸	四 十全散	四 升麻澤瀉湯	世 茅花湯	世 大青湯
	治麻後 癰毒	治麻後 咳嗽	治全前 虛者	治全前	治疔瘡 治麻後	治喉腫痛 治麻症	治白痢 治麻症	治鼻血 治麻症	治赤乾燥 治麻症紫

保赤全書卷上

原痘 第一

易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生夫男女交構無欲不行無火不動恣情肆慾而火毒遺於精血之間歲火流行相感而動故毒乘時而發若痘有稀稠由毒有淺深而吉凶生死亦于此乎判焉此為不易之論也或謂小兒初生之時口舍胎血咽下至於腎經以致此証謬矣

醫生 龔居中 增補
庠生 管 樞 編輯
醫生 吳文炳 較正

醫矣

氣血第二

夫人身由氣血而生。火毒亦由氣血而中。而發而解。故痘者假氣血以成其形者也。然氣衛於脉外。血榮於脉內。而元氣者。又為榮衛之主。故元氣盛則氣血運行。五內百骸周流不息。諸疾無自而作。雖痘毒感發。而氣有領逐之能。血有負載之力。氣抑血附。並行祛毒。痘瘡必應斯而開落。苟使元氣一虧。則氣血交會不足。氣在內而外不固。血即載毒以出。而為外剝。氣在外而內不續。血即載毒以入。而為內攻。諸症變作。真元益損。斯毒不能化而危亡立至矣。

剝梅氏曰。剝也。剝也。傷也。

譬如元氣者主帥也。氣血者卒徒也。痘毒者敵人也。主將得入則卒徒用命。而敵為之自破。不然鮮有不肆害於吾之土地者。觀於氣血之盛衰。而痘有負陷榮枯。信可驗矣。故智者必補益真元。調理榮衛。誠攻賊之上策也。然氣血盛故能逐毒。而火毒盛亦能損其氣血。急則治標。清火緩則治本。補氣。醫者尤不可不知。心鑑曰。氣有生血之功。血無益氣之理。是故氣不可虧。虧則陽會不及。而員暈之形不成。血不可盈。盈則陰乘。陽位而倒陷之禍立至。觀此必先益氣。氣盈則能引血。以逐其毒。如水必得風而後舟楫之行自順也。苟或過於益血。則必載毒泛溢。久為太逆矣。

此扶陽抑陰之大道也。况氣無形而血有形。無形者可旺於一時。有形者須養於平素。故保元之劑。專在守氣。前人之製方。亦為有見。不可以偏執擬也。善醫者能自得之。又曰：氣以成痘之形。而氣充則頂起。員暈血以華痘之色。而血盛則根窠紅活。是為血氣交會。苟氣過盛則為泡氣。虛則為頂陷。為痒塌。為自汗。為皮薄而軟。為寒戰。為吐瀉。為灰白色。血過盛則為班丹。血失職則為滯。為紫黑。為倒靨。血虛則為淡白。為根窠無暈。以手抹過而紅色不見。是皆交會不足也。若夫根焦紫黑者。血熱也。頂陷紫黑者。血熱而氣滯也。不可以氣虛而用溫劑。但涼血解毒為主。血

活則氣行也

辨痘症以傷寒 第三

痘症發熱。大抵與傷寒相似。但傷寒從表入裏。只見一經形証。痘症從裏出表。而五臟之証皆見。如呵欠煩悶。肝証也。乍涼乍熱。手足稍冷。多睡。脾証也。面躁腮赤。咳欬。噴。肺証也。驚悸。心証也。體冷耳涼。腎之平証也。又觀心窩有紅色耳後有紅筋赤縷。或身熱手指皆熱。惟中指獨冷。左男右女。乃知是痘症也。故已上五臟之証。獨見多者。即主其臟之毒特甚。治之要識此意。如肝症多用川芎。槐子。仁。青皮之屬。肺証多用黃芩。知母。地骨皮之屬。心症多用黃連。木

心窩

通之屬脾症多用防風甘草之屬惟腎不宜有証如耳熱
骭熱則邪在於腎用黃蘗木通茯苓猪苓之屬此其大略
也臨機應變存乎其人焉

痘在傳變

第四

前輩謂痘出自腎而傳脾傳脾傳心傳肺者人皆疑之不
知此乃自內出外之意非謂胎毒獨藏於腎而後傳於各
經也蓋毒在人身隨寓而伏但因歲火流行而發一二日
自腎骨髓而出之於肝筋血氣充徙者盡迭出毒於筋而
無少留於骨髓二三日盡出於胃肌肉而無少留於筋三
四日盡出於心血脈而無少留於肌肉四五日盡出於肺

皮毛而無少留於血脈五六日盡出於瘡疹而無少留於
皮毛七八日膿水漸乾十日十一日而結痂十二三日痂
落而體光澤矣若初出於筋而少留於骨髓則渾身壯熱
日乾悶亂雖出於肌肉而少留於筋則搐搦牽掣紫黑潮
熱雖出於血脈而少留於肌肉則發癰毒多在四肢雖出
於皮毛而少留於血脈則痘不員肥雖出於瘡疹而少留
於皮毛則痂遲落而多麻癢此自腎傳至於肺之說也故
痘疹未出五臟皆藏其毒痘疹將出五臟皆見病証若痘
出自四經而腎無留邪者吉若初熱便作腰痛見點紫黑
者多死蓋毒氣留於腎間而不能發越故耳乃謂胎毒出

於命門又曰變黑歸腎則痘專主一經而後傳變於各經矣豈理也哉

看耳後筋文斷法 第五

詩曰翻來復去一條筋。要作明醫須用心。筋有梅花五般樣。青紅黑白要分明。凡耳後筋文似水紅色為上。杏紅色次之。大紅色宜退火。紫黑青色皆不治。又須條均直上耳尖而無分枝者為上。若分枝纏繞者雖淡紅亦凶。其或橫過髮際者多不可救。

又曰耳上屬脾。熱者重。涼者輕。耳下屬胃。涼者重。熱者輕。出於紙燃照法 第六

瀑吃

中庭 醫書曰六要
四診之末。五官之
下曰庭者。首面也
又曰庭者。額也

用學書竹紙或燒錢草紙。烘乾作燃子如小指。大蘸清油于燈上往來薰熾。令紙條無泡不瀑吃。又飽蘸油畧薰熾令油無泡。即點燃子將患者房內牕門閉令黑暗。有光處以物閉之。看其左額有何色點。右額有何色點。中庭有何色點。觀兩額宜以燃子在兩耳邊及鼻邊平照。觀中庭宜以燃子在兩目角邊平照。看其皮中歷歷可指。是赤。是紫。是塊。是點。曉然明白。若是麻疹則浮于皮外。肉內無痕。若是痘疹根在肉內極深。若以燃子當額及中庭正照。則黯而不見。燃子有灰。即搯去令明。如此照之。病情在內者可以預見。若日間以天日光觀之。則不見矣。

面部驗痘吉凶方位之圖



痘疹初形有重輕表裏虛實各不同但觀面上諸經絡死生凶吉自靈通左臉肝心右臉肺脾為年壽及人中心屬球堂方廣角腎為顴骨耳尻逢此是陰陽部位屬痘嫌枯滯及鮮紅假如年壽初先發人中腮頰亦相同淡紅磊落如珠潤過期七日自然糝若越印堂方廣出心家熱毒解方際顴滑耳目及麻紫重極須知命必終

面部部位論 第八

痘疹初發紅點先察部位可知吉凶輕重蓋人之面部左頰屬肝木也右頰屬肺金也正額屬心火也額屬腎水也鼻屬脾土也正額者太陽脈之所會唇頰陽明脈之所經兩耳後兩傍少陽脈之所過痘為陽毒故隨陽而先見于面但陽明者胃與大腸積陳受朽血氣俱多故先於口鼻兩傍人中上下腮耳年壽之間先出現者吉若太陽則水火交戰之處少陽則水火相併之衝若於其位先出現者凶其起漿收靨亦皆如是至如頭者諸陽聚會之處兩頤兩額五臟精華之府咽者水穀之道路喉者肺腕呼吸之

往來胸腹者諸陽受氣之地為心肺之所居五處最要稀少若頭額多者謂之蒙頭頸項多者謂之鎖項胸前多者謂之喘胸蒙頭則視聽廢氣化絕鎖項則內不出外不入胸則陽不清而神失守兩頰兩頰多致成疔或如塗朱則肝盛尅脾八九日當作滑泄瀉青不食而為險候故不宜多也惟四肢則雖多而不妨以上諸症俱要解毒清熱疎通榮衛表裏使血活氣均庶無乾枯焦黑之變矣

看四時氣色 第九

氣色者臟腑之精華也故觀氣色則痘之出於何部以至輕重死生斷可識矣蓋氣色分屬四季肝青心赤肺白腎

黑脾黃是其本體肝旺於春心旺於夏肺旺於秋腎旺於冬各七十二日脾旺於四季後十八日是其本位然有時乎不春不冬而面色青黑者非肝與腎也不秋不夏而面色赤白者亦非心與肺也但得本色見于本季而不反者為正故春季面見青色兩頰兩腮微紅外帶微黑色者是水能生木其色光潤出痘必輕定先見點于手足或唇之上下若前位紅而帶淡白者金能尅木也此痘必重定先見點於天庭太陰甚至七八日間多不可救 夏季面見正色額腮微紅外帶青色兼黃色者吉必于左右腮上或耳下見點若黑色外見發痘必凶在十一二日死 秋季

見兒顴腮紅色。外加唇紅，眼紅，此痘必死。于六七日內，若見紅而帶黃色，唇白色，則放標不過十數粒而已。冬季顴與腮紅外帶黃色，唇白者，痘必遍身如蚕種，定在十日十一日死。若帶白色，眼有精神，痘必先出於兩臉，上三四次出，大小不齊，不藥而自愈。君子於此詳加推察，必獲應驗矣。又概而言之，不拘四時，但紅黃見于面部者，為吉，蓋紅者心之有本，黃者脾之有根。此則氣血必盛，而痘出自順也。倘有他証，亦隨証加治，而即瘳耳。若面部青白相兼，微有黑色，凝滯不散者，乃肺肝腎三經反勝，而心脾已失其主矣。再兼壞証，死無疑也。倘得唇齒光澤，眼不血紅，則

則氣血不足之故，可大加補劑，善于調攝，亦或有日至功成之效矣。

觀痘形色 第十

形乃氣之充色，乃血之華。看痘發此更無他法。是故形貴尖員，起發瘡皮厚硬，而皮平塌者為凶。色貴光明潤澤，根窠紅活，而慘黯昏黑者為危。然形有起發，而或至變者，由色不明潤，根不紅活故耳。若痘色光澤，根窠紅活，雖平塌亦為可治。但色以紅活為貴，而猶有圈紅、嚙紅、鋪紅之別。圈紅者，下線淡紅，緊附於根下，而無散走之勢，吉之兆也。嚙紅者，血雖似附，而脚根血色隱隱出，部險之兆也。鋪紅

者痘色與肉不分平鋪散漫凶之兆也以此察之則生死可預決矣

根窠者血之暈膿者血之腐故六日以前專看根窠若無根窠必不貫膿六日以後專看膿色若無膿色必難收靨此必然之勢也

初熱看面色以斷後症 第十一

面白者肺經有風主疾喘

面青者初主泄瀉

面赤者主潮熱往來其瘡必慘

面紫赤者有八九分如或作渴作吐將來必主瘡壔

面黃者脾經有積主發熱吐瀉或腹痛下痢

看耳目口鼻秘訣 第十二

耳後青筋起主瘰癧 耳前後俱黃主驚入腎咬牙 兩

耳畔青黑筋橫過髮際主臍腹痛 耳蒼黑者腎經熱

黑色從太陽透耳者死 眼內神光不明珠色轉綠或赤

者危 鼻青者主吐乳 眼內黑珠起浮油混睛者吉

鼻有黑氣者死 鼻黑者小便不通 鼻孔乾燥氣粗者

主衄血 鼻尖紅直上印堂者主心熱發癰毒夜啼出疹

人中青主乳不化便難 印堂青者主夜啼胎中受冷

口唇 凡痘毒唇口紅活無燥白之色者吉若唇 肛門如

竹筍藥食直下者死

異痘 第十三

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者醫者不可不辨

天根痘 諸痘不起壯而天庭或曉星起灌者乃精氣

外生故曰天根十有九生

天空痘 諸痘壯起而天庭或曉星不壯者乃血不灌

頰也故曰天空十無一生

明朗痘 諸痘不起而太陽太陰獨起者吉日月為明

也之謂也 諸痘起壯而太陰太陽不起者凶

明蝕痘 諸痘起壯而太陰太陽不起者凶

海溢痘 諸痘不起而耳後方員一寸獨起者名曰星

宿海溢是腎經旺也可治

海枯痘 諸痘俱起而耳後方員一寸獨不起者腎

敗也名曰星宿海枯不治

頭面遍身四肢耳上俱已起沙灌膿惟左耳下外圍有二三粒不起灌者定作唇裂齒齦如不急救內攻而死

有根痘 凡痘出頭面多四肢密者十分危險若得地

角方員略有數粒如珠者十有七生蓋腎為

人之根本此痘腎旺故曰有根

無根痘 諸痘俱好而地角方員大有乾枯及灰白不

起者腎水絕也不治

抱鼻痘

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此毒聚於脾胃也名曰抱鼻証其危矣

單鎖口

面部俱稀而嘴角有一粒黑痘較諸痘獨大者名曰單鎖口

雙鎖口

若嘴角兩頭各有一粒者名曰雙鎖口皆惡候也

鎖項托頤痘出遍身稀疎惟項下稠密一疔以至於頤

者名曰鎖項托頤亦為不治之証

猪頸痘

痘出而喉頸窩太多者急用山豆根玄參桔

兩頭痘

梗甘艸生地芎歸山查木通荆芥牛子水煎與服遲則毒結喉而死

初標時看自胸而上自臍而下俱有而中間一截全無者是也七日內急用人參歸耆湯

去桂加蘇葉桔梗山查白芷厚朴紫草防風木通再加黃豆三十粒水煎救之出七日則難救矣

逆痘

上身少下身多者名曰逆痘此無大害

鬼捏痘

痘出遍身全無點粒其斑處后恰如打傷痕一般故名鬼捏不治

生
赤水玄珠作以

鬼痘

痘標既完手足胸背俱多而頭面全無者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可救五日之外難救益血氣下行不能上升急用升麻川芎白芷蘇葉前胡甘州桔梗防風當歸等尖姜水煎服如不治曲池生毒一月見骨而死若身上四肢稀少者不可遂生鬼痘看

賊痘

痘初出便如綠痘過一日便如黃豆大再一日又大如員眼者名曰賊痘其痘根窠與頂全無血色形雖起脹按之虛軟至四五日上下出血而死但此諸痘獨大其大甚速者就

蛇皮痘

頭面遍身無空地平場而色白者俗名蛇皮此必乾枯不能作漿至十一二日必死

藥患痘

初標紅潤至四五日忽變陷伏不起將至裏虛此名為藥患急用扶表裏為上

九焦痘

當額地閣顛骨胸背耳後手足皆有一二箇黑陷者名曰九焦痘不治

伏陰痘

痘不貫膿而瀉膿血故名伏陰急宜溫裏

空倉痘

瘡雖肥滿而內實乾枯全無血水者乃空倉也決灰之証

石白痘

痘中有凹而四弦特起明亮好看內實漿板

不化以手摸之其硬如石因形猶石白故名
乏此証斷不可治

茱萸痘

痘不甚起而中亦有凹凹弦皆有縹紋以其
形似茱萸故名之也若得根窠紅活者服內
托散三四去防風白芷頂中發黑點者保元湯

蟲痘

痘瘡痒甚者不必夏月中生蠅蛆雖寒月亦
有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪下冷見即
於其上則蛆自出此蓋毒留於皮膚延綿日
久臍膚熱腐故耳譬之腐州為蠶朽木生蟲

血症

其理一也
痘初出血點其色紅紫六日之中決許以死
平如珠筆點于遍身者內根已腐外苗必萎
一症決無可治之理

血疱痘

血疱痘者血協熱毒而自漿也刺疱血猶紅
者尚可治急與犀角地黄湯三八加白芍以制
血解毒血黑者不治身熱者小柴胡湯九加
生地血漿不能收斂者紫州煎湯調下龍腦

血靨痘

痘出稀少四五日胖如碗豆六七日血靨痂
膏六十

準繩云天泡瘡即丹毒之類有泡由天行少陽相火為病故名天泡

血毒

白漿痘

乾亦似丹砂九日而痂落此氣血充足毒少故隨出隨痂不及釀膿也此痘極佳百無一若初起發瘡頭便帶白漿者此疫癘痘也但有此便不可治至七日死

四圍痘

若瘡起發根窠四畔又旋出小痘攢簇本落或發似粟米不待養即加搔痒而死

漏瘡痘

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色如天泡瘡及癩頭之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者此皆厲氣所為傳染相似俗名漏瘡未有能治者矣

蛭痘

起腫時痘上有小孔不黑不白名曰蛭痘其膝理不密而有是痘大泄元氣急用保元湯加丁香肉桂其孔一密而痘自起矣

隱血斑

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後血出亦無膿血故曰隱血斑也不治

赤萍瘡

痘已出齊或未齊如赤浮萍微微高起若爬出有血急以解毒升發藥救之如成爛痘則無妨矣

紫萍瘡

痘已出齊紫色不起不灌漿如浮萍貼在肉上者不治

盧赤水作盧

白萍瘡

同上

草尾珠

其痘遍身俱陷惟骹骨一團飽滿如珠此証可治補托灌膿即痊矣

黑痘

盧廉夫曰黑痘多屬血熱黑痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端猶可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

痘紫黑或黑點子隱在皮廬之間者無比散

一十或人牙散一卅用猪尾血三十五滴酒調下兒小

三分木人五分

初出便是黑點急用紫艸茸一二錢醇酒半

蓋煎至三分濾渣與服為妙

其形如癍皮膚發青紫紋者服透肌散卅或

加防風荆芥

一形如牽牛而色癍敗又黑痕併黑靨者並用

蟬退二十五箇紫艸茸一錢水煎服

一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散九五一錢

酒煎紫艸湯下

一痘黑而皮膚皆黑或片者化毒湯卅加蟬退

地骨皮酒炒黃芩

一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元加

紫茸

一痘焦黑潮熱煩燥者小無比散(二十)井水磨犀

角調下一錢

氣血兩敗痘

近着猶如水莖花

遠望胭脂紫可誇

復出痘

先見標一二點于面部或口唇上下如常起

脹貫漿收靨不知者以為痘本稀少故也然

以火照之紅點隱隱然藏于皮膚之內急用

內托解散則痘復出不然願下決發一毒不

急散其毒而發其痘即死

雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參看 第十四

赤水作頂

一彤雲繞頂

遍身痘好但頭頂一丘紅赤者乃熱毒盛于膀胱也須清利之

一紫雲灌頂

遍身痘好但頭頂紫乾陷伏不起者不治

一烏紗覆頂

其証心咽喉啞塞鼻氣大穢乃血衰氣敗而元陽脫也不治

一梨花漫頂

用保元湯(四)加天雄猶或可救

一雲掩天庭

遍身磊落光澤惟額上一丘血疱如雲者乃心家客熱甚也急磨犀角服之

一紫萍鋪額

其証熱甚咽喉悶亂發狂用小無比散(十一)加玄參升麻犀角

一烏砂落額

不治

一灰撲印堂

此証心家少血也若兼腹脹咽乾用保元湯(四)加芎桂紅花

一紅紗拂面

加味犀角(八)加白芍涼血解毒湯好

一楊花撲面

用內托散(四)加天雄

- 一赤珠饒唇 此乃脾經極熱也用小無比散(十一)加雄黃
- 一烏飯沾唇 此証必聲啞神昏目睛不轉四肢厥冷痰響如錫三朝七日乃死期也
- 一震錦穿胸 此因火毒淫盛不治之証
- 一紫雲佈胸 此証血枯氣滯毒來攻胸也其証則咬牙戰掉口唇焦裂頃刻命頓矣
- 一黑棋排胸 三朝決死
- 一柳絮飛胸 此乃血氣枯弱也保元湯(四)加芎桂歸附
- 一桃花映背 此証清火解毒可生
- 一紫萍浮背 不治
- 一黑砂落背 不治
- 一雪鋪魚背 此血已枯盡也不治

- 一赤鱗穿腹 此証必大便秘小便淋瀝乃胃家熱甚也
- 一黑段纏腹 此証必肚內脹脹聲音啞二日終矣
- 一白梨墮腹 氣血衰敗也半月之間發驚而死
- 一葡萄落地 腎間紅紫一疔若葡萄者兩日命終
- 一爛粟居臀 通身俱好惟腎上一疔如粟壳臭爛者托補下元可轉
- 一榴花散野 諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須涼血清火解毒
- 一黑珠遍體 四肢枯黑如火燒柴頭口中涎出氣冷朝夕死矣
- 一楊花墮枝 手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

治痘摠要

第十五

丹溪曰虛者益之實者損之寒者溫之熱者清之此治痘

之大要也。舍是四者無治法矣。又發熱之初。急宜表散。要在表熱盡退為佳。既出之後。隨証溫涼。務在解肌。消毒。調氣活血。使榮衛和暢。則無塵滯。陷伏之患。又必謹避風寒。絕戒防事。調節飲食。禁止穢氣。自然獲吉矣。

諸醫評 第十六

古之治痘者。陳文中乃用木香散。異攻散。峻熱之藥。丹溪發揮其誤。然亦有有用之而獲捷效者。劉河間張子和則專用黃連解毒湯。白虎湯。升麻葛根湯等。寒涼之劑。此豈古人之用藥迥別。有如斯哉。各因所值之時。所犯之証。而為之處方。非後之宗陳氏者。多用熱藥。宗劉張者。多用涼藥。

以下云。身正傳命。痘疹門。矣。考。

處方大成命。又方考。延年門。

此刻再求劍之道也。君子誠能臆渡寒暄。推詳脈候。而視疾為之轉移焉。則攻補適宜。宗陳氏可也。宗劉張可也。焉有執一之病哉。方書有曰。痘宜溫補。不知溫補之劑能扶元氣。亦能長邪熱。况痘症屬火。實者十常八九。故丹溪曰。酒炒芩連。能解痘毒。觀此則張劉尤為可宗。但涼藥久服。則傷胃。亦能滯血。故熱退則止。熱未盡退。但加于溫補藥中。則熱亦漸退。而痘可無恙矣。

痘証日期 第十七

夫痘熱蒸三日。放標三日。起脹三日。貫膿三日。收靨二日。此病之正也。輕者不拘常數。重者則出常數之外。固不可

一例而視。但得痘色明潤。根窠紅活。飲食二便如常。又無表裏雜証。雖遲數日。不妨設有當出不出。當起不起。當膿不膿。當靨不靨者。須詳察之。或為元氣虛弱。不能運行。則補其元氣。或為雜証攻剝。不能通貫。則去其雜証。又六日以前毒發未盡。有雜証者。常也。六日以後。毒該盡出。雜証當除而不除者。為逆。須急治之。可也。治痘之要法。無出此矣。

痘証決生死日期 第十八

凡痘以出標一日為始。六日九日為變。又十一日十四日為變。此決死生之定期也。但証有寒熱。故死有遲速。王節

齋曰。重証屬虛寒者。毒少而氣血不足。不能貫膿成就。必九日後變証而死。或延十數日方死。屬實熱者。不過六日而已。蓋痘毒自內出外。三日方齊。毒尚在內。出至六日。則當盡發於表。七八日成膿。而結痂矣。若毒盛不能盡出。至六日反內攻臟腑而死。又有三日而死者。由毒氣不能發洩。腑臟受傷。故其死最速。此虛實輕重之分也。

五運六氣


第十九。五運者。金木水火土也。六氣者。風寒暑濕燥火也。

人身之氣。與天地相通。故痘瘡之發。要亦感天地之氣而然也。治痘者。能知運氣。加臨勝復之理。則設方處治。庶溫涼寒熱之得宜矣。昔陳氏木香異攻散立方之時。為

引伸云易上係辭云
 引而伸之觸類而長
 之天下之能事畢矣
 矣又格致豆之膏陳
 氏方論在此此語
 正傳或問序引伸觸
 類之畢
 五帝政大論

天和格致餘論陽有
 餘陰不足論保全天
 和莊子知北遊篇曰
 註曰希逸曰天和者
 元氣也忘其形體之
 耳目則元氣全矣云
 曰脈有三一曰命本
 二曰氣之神三曰形
 之道經所謂天和是也

五運圖



甲巳之年為土運
 乙庚之年為金運
 丙辛之年為水運
 丁壬之年為木運
 戊癸之年為火運

劑以清之
 劑以溫之
 劑以燥之
 劑以濕之
 劑以寒之

木

運氣在寒水司夫時令又值嚴冬故耳後人不知立方之意一概用之候久多矣今特集運氣圖說使人知運氣周流而得隨時用藥引伸觸類以為無窮之妙用也經曰必先歲氣毋伐天和又曰先立其年以明其氣此之謂也

[Faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

六氣圖



子午卯酉年，少陰君，火陽明燥，金司夫在泉宜清之。○辰戌丑未年，太陰濕土，太陽寒水司夫，在泉宜溫。○寅申巳亥年，少陽相火，厥陰風木司天，在泉宜涼劑以和之。然又當察病以調治，而不可執一也。

脈第二十

痘以發熱至起脹時，毒從內出，陽之候也。脈宜浮大而數，不宜沉細而遲。自收靨以後，毒從外解，陰之候也。脈宜和緩，不宜洪數。

治痘須明經絡 第二十一

夫人之身，諸陽脈上行頭面，諸陰脈自頸胸而還，故痘瘡之發，自頭面始也。丹溪曰：上引用升麻，下引用牛膝，此亦自其大概而言之耳。至於六經，則有氣血多寡之異，而用藥則有君臣佐使之殊，故自人身言之。太陽多血少氣，少陽多氣少血，陽明多氣多血，厥陰多血少氣，太陰少陰少

血多氣。此人身之常數也。小兒出痘發熱，飲食少，進榮衛之氣衰多者，至是已不足而少者，益不足矣。是故小兒出痘，氣血鮮有不虧者。但視其色白者，少血也。起遲者，少氣也。陷下者，氣虛甚也。補血用芍歸生地為主，補氣用參朮。白朮為主，當視其經氣血多寡以為引用。如太陽經下陷，補氣藥為君，補血藥為臣。藁朮、羌活為佐，防風、升麻為使。有毒則加牛旁、連香、紫草之類。紫色毒盛者，連犀角之輩。少陽陷下，用補血藥為君，須倍加川芎，以為本經升發之用。補氣藥為臣，羌活、升麻、葱白為使，防風、白芷、少加柴胡。藁朮為佐，俱用甘草以和之。如心經毒盛，用犀角、黃連、肝

經用羚羊角、黃芩、肺經亦用羚羊角、片苓、炒黑山、支麥、門冬、少陰則用酒炒知母、黃柏之類，不可過用。又曰：身後出不快，足太陽經也。用荆芥、防風、甘草、身前出不快，手陽明經也。用升麻、葛根湯。四肢出不快，足陽明經也。用防風、芍藥、甘草湯。此固治痘審經之大略。治痘者當知所鑒也。

用藥 第二十二

治痘用藥專看氣血虛實寒熱有雜証者各從其類而施治之條陳于後。

- 一補氣 人參、白朮、黃耆、茯苓、甘草
- 一補血 當歸、川芎、芍藥、地黃

一發散表熱升麻柴胡乾葛紫蘇前胡葱姜
 一清裡熱黃連黃柏山梔犀角羚羊角
 一表寒黃耆桂枝生姜川芎防風
 一裡寒乾姜肉桂附子木香豆蔻
 一利小便猪苓澤瀉木通滑石車前
 一利大便枳殼枳實大黃玄明粉
 一活血涼血生地紅花紫草牡丹皮
 一調氣木香陳皮青皮香附
 一咽痛玄參桔梗連翹牛子山枝甘草薄荷
 一嘔吐藿香砂仁胃寒丁香木香

一驚搐姜蚕天麻硃砂茯神
 一咳嗽麥門瓜蒌桑白杏仁五味
 一風熱蟬退白芷
 一泄瀉柯子肉蔻
 一腰痠牛膝杜仲玄胡索
 一頭痛川芎藁本蔓荊
 一清痰半夏南星貝母石羔
 一止渴乾葛五味麥門天花
 一消食山楂麥芽神曲草菓
 一腹脹厚朴蒼朮大腹皮

一快班紫草防風荆芥升麻
一起痘鹿茸川山甲

以上諸品乃治痘之大畧至於臨機應變又不可執一於此也

虛痘急用藥性 第二十三

鼠粘子通肌滑竅多服恐內動中氣外致表虛

蟬退能開肌竅多服恐泄元氣以致表虛

紫草性寒利竅多服恐成溏瀉

白朮多用恐能燥濕使潤濕之氣不行則痘難成漿

茯苓猪苓燥濕滲泄能令水氣下行多服恐津液耗散

外不行漿內防發渴

人牙性烈發表太過內動中氣外增潰爛

訶子龍骨枯礬皆能塞阻肌竅氣虛之証用此毒亦不

能前進雖能泄甚不可施

大黃蕩滌污穢耗削胃氣雖熱渴便實亦不可輕施

山梔性寒降火虛痘便赤必非實熱用須慎之

生地性寒涼血潤腸胃虛者慎之

枳壳下氣寬腸多用則損中氣泄瀉

乾葛性涼解肌多用恐致表虛况太涼則痘不長

山查散血解結多用則內虛

麻黃開竅走泄妄施則成表虛氣脫

烏梅酸收 砂仁散氣

人參黃耆皆補氣助火之劑凡痘色白陷散宜用之若痘色紅紫壯實者輕用之則血愈熱而毒愈熾紅紫者轉而為黑格不救之証矣

世有見痘不起以蟲魚腥脂毛血牙骨鱗角等毒藥以發之謂其以毒攻毒也殊不知毒藥損人元氣元氣既伐毒氣愈熾而酷烈之性反為內攻更有何法以救之哉萬有一中亦兒稟之本厚耳不可以為常例

汗下 第二十四

汗下之法古人深以為戒蓋恐毒發於表妄汗則成斑爛妄下則成陷伏耳若痘症之初有表熱非微汗何由而散有裏熱非微利何由而解以至醫後實熱又可以不下乎但以古人慎重之意用之可也若謂首尾俱不可汗下恐非通變之見矣

小兒服藥 第二十五

小兒多不肯服藥強之亦不能多進然病熱得瘳非藥力不能驅逐痘屬虛寒者固可延綿數日屬實熱者藥不可緩故用藥惟宜重劑濃煎止用頭服則藥力能勝病矣

乳母服藥 第二十六

獨倣類書莫要
十一卷倣倣
兒根也強深之
驅逐 正傳或問第
五十一卷驅逐滯氣
延綿文選十七洞蕭
也俱不絕自云又格
致疾瘧命綿延字

示示全書

痘瘡已隨症服藥至於乳母亦宜服大劑使其乳汁亦有藥力

調養禁忌 第二十七

痘瘡既出內臟空虛熱氣一蒸毛孔俱開飲食起居之際稍失其宜則風寒易於侵襲內氣易於傷損故衣被當順天時以為加減亦不可以熱而縱其赤體當風單衣取涼亦不可以寒而重綿疊褥使熱氣壅遏痘本熱毒宜以爽快為主
飲食最宜調和不可使之太飢亦不可使之太飽如或好食何物有不宜者但少與之以順其意不可禁固使之忿怒反添火邪亦不可過縱致生他變如辛甘多則發汗酸苦多則吐瀉鹹多則鬱結咳嗽雞肉生風猪肉生痰魚腥助火牛脯黑茹荔枝與酒皆能發疹棗柿糖蜜味甜能引痘入眼醋酸損齒葱蒜泄氣此皆不可不慎也
痘後脾胃怯弱血氣尚未平復飲食不能消化易於發火生痰令人多以病後保養太過恣其飲食葷腥致成他症而反傷生者往往有之尤不可不慎戒之也

避穢氣第二十八。仲景曰小兒痘時宜燒乳香辟穢氣蓋榮衛遇香則行遇臭則凝故也

- 腋下狐臭氣
- 房中淫液氣
- 行遠勞汗氣
- 溝糞濁惡氣
- 婦人經候氣
- 諸瘡腥臭氣

柴

硫黃蚊烟氣

吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣

紫烟魚骨氣

葱蒜菲薤氣

煎炒油烟氣

醉酒暈腥氣

麝香燥穢氣

又禁忌 第二十九

生人往來

詈罵呼怒

對梳頭

對搔痒

勿掃地

勿對荒言

勿飲食謂樂

勿僧道師巫入房

以上穢氣禁忌諸條謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

解穢氣內服平和湯

或惺惺散

加解毒湯

外解方凡被房事經水生產之穢所犯者以大棗燒烟解

之被酒厭者以葛根茵陳蒿燒烟解之被五辛厭者以生

厭即厭穢之厭

痘疹經驗方卷

之下十一葉

重穢忌之下曰

恐防厭穢

之被酒厭者以葛根茵陳蒿燒烟解之被五辛厭者以生

姜燒烟解之被死屍之氣及癘氣所犯者以大黃蒼朮燒

烟解之凡為狐臭犬羊厭者燒楓毬解之凡遇風雨燒蒼

朮楓毬避之又辟諸惡氣通以乳香燒烟薰之以胡荽酒

喫之

世俗者醋薰痘謂其能活血然醋主收斂故婦人血崩者

用薰之痘毒欲升發而不欲收斂故不宜耳嘗見用醋薰

痘發痒搔破而敗事者慎之

論氣虛實寒熱 第三十

一凡痘之輕重由於氣之虛實而知蓋元氣者痘之主也

大補湯 酒地_ヲ用
清肺飲 一麻_ヲ知_ヲ天_ヲ術_ヲ
荆柯_ヲ葛_ヲ桔_ヲ
中和湯 參_ヲ耆_ヲ補_ヲ並_ヲ
芳_ヲ版_ヲ耳_ヲ桔_ヲ桂_ヲ防_ヲ
藿_ヲ
陳氏木香散 三木_ヲ版_ヲ
參_ヲ耆_ヲ前_ヲ青_ヲ夏_ヲ
丁_ヲ柯_ヲ耳_ヲ心_ヲ

元氣虛則痘不能起發長疔或平塌或頂陷或摸不礙手
或皮皺其見于雜証者或吐瀉不食或咳嗽連聲不斷而
無痰或聲音不出或語言不全此氣之虛也宜內托散_{三四}
保元湯_{四九}大補湯_{百二}四君子湯_{四四}加糯米官桂木香王之_{三四}
如痘形飽滿輪郭豐厚瘡堅硬或發壯熱或喘痰壅或咳
嗽有痰或氣促悶亂此氣實也宜清肺飲和鮮之_{百四}
如鼻流清涕咳嗽惡風自汗身體戰慄瘡色慘白者此氣
寒也中和湯_{百二}陳氏木香散_{百三}理中湯_{百五}加杏仁五味子_{百六}
之_{百七}
如鼻中乾燥皮毛枯槁咳嗽痰中有血或鼻中出血瘡色

瀉肺散 即瀉白散也

焦紫此氣熱也宜瀉肺散_{百四}清肺飲_{百五}加黃芩生地王之_{百六}
論血虛實寒熱第三十一

夫痘之形固全視夫元氣矣然氣為之主血為之附必氣
血相和於內則發揚於外為吉之兆若氣雖盛而血失所
宜不相歸附則又有變態存焉故血之虛實寒熱尤當詳
審而治之如瘡色不紅活淡白發痒不能發貫漿手摸週
即轉白者此血虛也四物湯_{百五}加黃耆紅花糯米王之_{百六}或
少加黃芩以滋血瀉肺

如身熱不除或寒熱往來瘡色焦黯口紅舌乾唇青面赤
脇肚作痛者此血實也犀角地黃湯_{百八}及小柴胡湯_{百九}王_{百十}

溫膽湯 二陳 一茹
壳 〇 實 〇

之或少加桂以抑肝氣

如瘡色灰慘血凝不洩腹脇脹滿面青筋縮嘔吐青水或

瀉青菜色稀水者此血寒也宜溫膽湯 乙 加川芎黃耆白

朮官桂王之

如瘡色昏黯發痒眼珠紅者大便堅燥身熱易怒此血熱

也宜犀角地黄湯 三 八 合三味消毒飲王之 五 三

論表虛實寒熱 第三十二

痘瘡之出根于裏而發于表故表裏虛實寒熱不可不辨

蓋脾為肌肉之主肺為皮毛之合如惡寒惡風寒熱往來

面青目白怠惰嗜臥手足冷身體靜精神怯弱瘡不起發

中和湯

身有寒慄凌振之狀者此脾弱肺虛為表虛也宜中和湯

三 四君子湯 五 王之

如瘡色綻實肌肉疼痛舌上有胎面赤唇紅毛焦膚燥手

足俱熱者此脾熱肺盛為表實也宜升麻葛根湯 五 加苓

施黃連柴胡等解表散熱為治切不可用黃耆官桂實表

之藥若悞服初則痘閉不出中則不能起發後則不能結

痂變生潰爛諸症矣

如瘡不起發身發寒慄肌肉不密咳嗽惡風自汗時作戰

慄如氣寒之証者此表寒也宜中和湯 乙 雙解散 六 固表

和中更用四君子湯 五 加黃耆陳皮半夏以密腠理

雙解散 五 防羌 正 硬
陳 獨 柴 麻 耳 莎

百解散六葛根湯麻
枝苓正考

如高之復傷寒
明理論發熱之條
合病論發熱者謂
若合初所復明
其熱在外

參苓白朮散七參朮
耳葉蓮枯砂薏
藿

如瘡色焦紫不能起發但吸吸發熱往來不定如翁之所合羽
覆此表熱也宜百解散七少加柴胡以散其熱或升麻葛根
根湯五少加黃芩以清之

論裏虛實寒熱第三十二

裏者五臟六腑之謂也瘡雖當固養元氣調和脾胃然
亦必察其虛實寒熱而治之如飲食少進大便泄瀉小便
清白神思昏倦口鼻氣冷瘡不起發者此裏虛也宜內托
散三四參苓白朮散八大補湯百泄瀉者去當歸生地加肉
豆蔻乾姜治之

如飲食大便如常或二三日一次小便通利精神爽快瘡

色和順起發者此裏實也少施治但節飲食而已若口
氣熱作渴舌燥咽乾煩燥痰壅喘促驚悸譫語狂亂腹脹
胸膈飽悶或上下失血此裏寔之過甚者必致燥其陰血
急宜四物大加陳皮牛蒡荆芥耳艸等以涼血活血為治
切不可用參朮助脾補氣之藥反成熱悶飲食減少變生
癰毒諸症矣

如手足厥冷唇面青白小便淡泄欲飲不飲身體凌振或
大便瀉青色或厥冷過膝瘡色灰白寒慄不起發者此裏
寒也宜陳氏木香散三去大腹皮青皮加黃耆白朮甚者
異攻散一六及內托散三四倍加肉桂乾姜治之

異功散六君一飯朴
木丁肉果官附

保赤全書

卷三

三

如唇紅面赤手足皆熱小便短赤大便秘結口渴瘡色焦紫蒸蒸發熱此裏熱也宜四物六五加牛蒡荆芥連翹酒炒芩連治之或略與通利大小便以清火滋陰解毒為治切不可過治以成實實虛虛之悞然又有表裏氣血之虛實寒熱並見者俱當隨其虛實寒熱之並見者標本兼治之更須辨認明白為要

論三陰三陽証治第三十四

夫臟腑之於陰陽各有所主故三陰三陽隨經見証者皆當辨識而治如太陽經所主者小腸膀胱也其証則身熱小便赤短治當紫艸木通散三五灯心竹葉湯三五如少陽經

大連克飲 克防荆牛
佩采芩厄蟬禱耳
通茶滑

化毒湯 芍朴貴
耳大
四順飲 大板芍耳

所主者膽與三焦也其証則乍寒乍熱咽喉腫痛治當連翹飲百加玄參桔梗三味消毒飲六合甘桔湯七如陽明所主者胃與大腸也其証則身熱自赤大便秘結治當化毒湯五四順湯五如太陰經所主者脾與肺也其証則四肢厥冷大小便自利治當四君子湯四加陳皮紫艸桔梗如少陰經所主者心與腎也其証則口乾舌胎唇燥黑陷治當四物湯六五加紅花紫草連翹木通如厥陰所主者肝與包絡也其証則舌卷卵縮時發厥逆治當陳氏異攻散三

預服稀豆方 第三十五

保赤金書

凡痘於未見之先服解毒稀痘等方冷痘出多者可少少者可無或終身不出若見點切不宜服恐藥性寒而斂肌則出又不快矣方陳于后用者任意擇焉

- 神功消毒保嬰丹
○代天宜化丸
○龍鳳膏
○稀痘仙方
○兔紅丸
○鼠肉方
○鯽魚方
○蝦蟆方
○四脫丹
○雞蛋方
○玄兔稀痘丹

- 浴洗免痘法
○葫蘆花湯
○苦練子湯
○烏魚湯
以上諸方皆用之於平日解痘毒於未出之先也
○三豆湯
○麻油擦法
○稀痘保嬰丹
○三花丹

執毒之毒皆因作微

- 六味稀痘飲
○輕班散
○蜜調硃砂丹
○三酥餅
○稀痘獸驗丹
○白牛毛散
○硃砂解毒
○預服萬靈丹
○預防湯
○甘州散
○消瘟飲
○稀痘丹

以上諸方皆服之於臨期解痘毒於將發之際也
初熱三日証治 順逆險第 三十六

發熱之初痘症之吉凶皆兆於此故急宜表汗使臟腑胎毒及外感不正之氣盡從汗散則痘出自然稀少但熱甚者其毒亦盛熱毒者其毒亦微微者固不必治妄汗則表氣一虛痘不能起發反為害也盛者汗之要在身熱盡退

為佳其有一切雜証皆由毒氣欲出不能故取一表散則毒氣盡洩而諸症自退矣或有當解者解之當下者下之不可執一也胡氏曰表熱壅盛非微汗則表不解裏熱壅盛非微利則裏不解正此之謂耳失此不治則毒氣漸盛而逆証隨見世人多忽於此及見逆証而後治之將何及哉

熱有三因

小兒發熱或因內傷或因外感或因驚恐跌踣証雖不同皆能感動胎毒治之之法因內傷者當于清熱藥中兼消食調胃因外感者當用表散因驚恐跌踣者宜鎮驚平肝

調和血氣若不詳察而概以升麻葛根湯表之是失病因也

順症不須治

一身熱和緩或熱或退神清氣爽飲食如常大便稠黃小便清利而無襍症者吉

一初熱先發驚搐者吉驚則毒從心經而出

一初熱吐瀉不甚而隨止者吉節齋曰症初若自吐瀉者慎勿亂治而多言謂邪氣泄也

險証當治

一初熱憎寒壯熱頭疼咳嗽鼻流清涕與傷寒疑似之間

蘇解散 紫葛防

荆正蟬紫中周

牛通耳

稀痘丹 雄朱

水麝 取蟾酥丸

小無比散 滑羔

粉少醫寒水

敗毒散 周葛

芎桔壳牛蟬

查骨耳 在紫州

無葛

大比六一散 滑辰

耳雄

大靈丹

雄珠 牛黃 斤 腦 犀 麝

右共研細和勻將升耳防芎燈中牛紫中紅連各三

外此既煎至半碗細布濾去渣加蜜四兩同煎滴承成珠為度和前茶丸如小龍眼大金荷為

蜜二兩入好酒半盞煉過同茶草膏攪勻調前末茶丸如綠豆大

人參羌活散 羌參羌

獨柴前云荆芎耳

壳桔芎荷茯苓紫草

骨牛蟬疾

紅綿散 蝎 庚 麻 蟬

荷耳 荆紫草

抱龍丸 星 雄 珠

麝為末煎耳汁打

糊為丸

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

窟

二便調者升麻葛根湯五或參蘇飲俱加葱姜以表之

初熱頭疼身熱腰腹皆痛者宜蘇解散二夏加香薷冬

加麻黃熱甚加柴胡黃芩姜一斤連根葱白五莖乘熱

送下稀痘丹以汗之汗后身熱不退空用蘇葉麻黃

葱姜煎水調下小無比散以解之必以熱退為良

初熱壯盛頭體腰腹俱痛吐瀉咳嗽兼作者其証必重

急與敗毒散一熱甚磨犀角汁和服

前証兼煩渴譫語小便如火如見鬼祟者敗毒散一調

下辰砂益元散四熱甚失表發狂譫語煩渴壯熱如見鬼狀燥亂不寧者

外邪與內毒相搏也急與葛根湯九微汗之后以灯心

湯調下大比六一散三甚者大靈丹

風寒壅盛致紅紫斑影不起者敗毒散一化下紫艸膏

六須令遍身皆出臭汗則毒氣可散

發熱痰甚譫語昏迷驚搐者是外感風寒而內發心熱

也人參羌活散七驚搐甚不止者用紅綿散調下辰

砂益元散四痰涎壅盛不省人事者薄荷湯下抱龍丸

初熱發驚目睛上吊頭竅向後身如反弓肝木以生風

故也用惺惺散一加蟬退全蝎法綴如珠者死

蘇發散^三 紫貴^三 芩
蒼朴^三 芩 茯苓^三 芍藥^三 石膏^三
和中湯^三 六君^三 砂
藿

一初熱腰痛腹痛膨脹努氣乾霍亂及內症重者四順飲
五或大柴胡^八承氣湯^九下之
一初熱傷風傷食咳嗽嘔吐者蘇發散^六加生姜服之
一初熱身痛吐瀉者四苓散^七加柴胡羌活砂仁藿香
一初熱口渴乾嘔者藿香正氣散^九加姜炒黃連瞿麥
一發熱吐瀉不止身熱口渴者四苓散^七加黃連淡竹葉
一發熱嘔吐瀉利不止口渴身與手足俱冷不能飲食
脈沉細者和中湯^七治之甚者理中湯^五穀食不化加
山查神曲麥芽失此不治則胃氣益虛血脈凝滯未出
者不出已出者陷伏倒替遂致不救

二寶散^四 犀玳磨水
頰服

一初熱聲遂變者重宜清肺飲^{十四}甘桔湯^七加魚腦子荆
芥玄參
一初熱眼紅發在可用冷水濕包頭以透四心
一初熱一切失血之証急服犀角地黃湯^{三八}
一初熱或見點紫色小便如血者二寶散^{五八}
一初熱四肢殭直不能舉動者以四君子湯^{五四}加川芎當
歸羌活獨活天麻蠲退全蝎炒姜蚕炒木香
一初熱肚脹眼合狂燥大渴身體不太熱或舌乾燥或舌
尖熱此毒根于裡也將變失血之証宜大解散發之如
遲一日則難療矣王口上痘出稠密成疔或痘鬱滯斑

紫艸透肌湯紫草
 周牛防荆着耳
 木姜水煎如紫
 色腹痛加蟬

點隱于肌膚之間欲出不出以紫艸透肌湯逐之

逆症不治

- 一發熱頭面一片紅如胭脂者六日後決死
- 一初熱時用灯照心窩或遍身皮內有成塊紅者不治此乃毒氣壅於肌肉未能發散故也急與解毒散血極或可生
- 一熱如射掌眼紅口唇紫黑破裂者不治
- 一初熱腹中大痛或腰痛如被杖者不治
- 一初熱七孔一便出鮮血不止者死
- 一發熱時遂見紫黑斑者不治

目_急開_夫於_目也

- 一初熱胸高而突者不治
- 一初熱目閉無覓者不治
- 一初熱先腰痛甚而後見點者不治
- 一初熱舌頭紫黑或聲啞噎神昏者不治
- 一初熱吐瀉有蛔虫者不治

報痘三日症治順逆險第

形色一見吉凶攸分因循失治或辨痘不明至後必難起
 脹必難貫膿瘡塌陷之禍隨至矣此時必辨虛實寒熱
 急為之調攝斯有起死回生之效也
 痘有連熱三五日而後出者由血氣充足毒少難于感動

循詳校編海因也
 与循同字已累因
 循無所作也

難療者難滅也

如灼火難療。杯水難流也。其痘必稀疎而易愈。有經熱一。日或半。日而即出者。由血氣怯弱。毒多易於感動。如烈火易焚。長河易決也。其痘必稠密而難愈。又初出三五相連者。必密。見形者必稀。

順証不須治

- 一發熱三日或四五日熱退。乃於頸上。口鼻腮耳。年壽之間。或四肢先放數點。大小不一。淡紅潤色者佳。
- 一放標稀疎。起頂摸之。堅硬。得手根。策紅暈。痘與肉色紅白分明者佳。
- 一痘作二三次出。三日後手足心方繼出。皆頭面胸背稀。

11

少飲食二便如常者吉
一初出如蚤斑紅現。二日大如粟米。稀而紅活。三日尖滿。具如珠者佳。

險証當治

- 一痘初出色貴明潤而鮮也。若頭焦帶黑。此毒在血分。當涼血解毒。為王不急治。則黑陷不收矣。涼血化毒散。王
- 之三四
- 一痘初出形貴兼實而厚也。若色白皮薄。此專在氣分。因補氣散火。為王不急治。則痲塌而死矣。固陽散火湯加白木茯苓去生地。王之三四

固陽散火湯參 參 荖 荖
耳 歸 酒 周 葛 荊
堯 防 地

保赤公傳

卷上

三七

當歸活血散七 椒芳地

稿紅紫草

和解湯八 升葛芍

參防芳耳

清地退火湯九 骨地膚牛 紫草 葛 羌 椒 通 蟬

秦朮湯十 秦酒 水煎

化毒湯十一 系草 周 耳 蟬 骨 泔

涼血解毒湯十二

紫少地稿紅蘇木

云荆連牛戾柴

通牡耳

大成散十三 川山甲 酒一兩

耳三 雄一 半一 殊一 麥半

紫中三 小一 麝二 分一 為末

每五歲用二分冷瘡

熱用熱症紫十湯用

連壳升麻湯十四 壳升苓
葛一 分一 韭二 分

太抵初出痘分惟此一証而已此時急宜治之必待白
轉紅活黑轉淡紅根窠明潤磨皮堅實能食二便如常
則起脹貫濃收靨一途無餘恙矣

初出痘色慘黯不明者升麻湯五 加酒炒苓連芍歸紅
花紫艸

初出一二日身熱不退無根窠紅暈者用當歸活血散
八 加酒炒苓連

一痘出而熱不退而痘充滿紅活此因外感寒邪而熱也
宜和解湯六 若痘勢不起根窠欠紅或隱或現或出而
復沒者乃氣血俱虛不能盡發其毒而熱也可與內托

散四 服之

一熱未退而見標者名曰火裡苗痘必紅紫而不分地若
不急退其熱則苗必稿矣宜清地退火湯十三 秦朮湯二十

一痘見標而表甚熱者急與入參羌活散七 若兼紅紫色
者化毒湯三 加酒炒苓連紅花

一標既見未曾服藥退熱其痘紅紫焦乾根窠成疔或有
黑陷急與涼血解毒湯十四 若兼氣粗口渴引飲宜紫草
灯心煎湯調下大成散十二 後起脹貫漿否則八九日
必致痒塌而死

一初出稠密如蚕種形勢重者合輕其表而涼其內用連

解毒托裏散^{世五} 桔力
人中黃云荆紅酒升
葛蟬栲連飯尾酒
十分煎入燒人屎調服

翹升麻湯^七或化毒湯^七加紅花酒炒黃芩或解毒托裏散^四

一初出胸前稠密者急與消毒散^五加山查紫草酒炒
一痘出稠密成片或毒鬱未泄斑點隱在肌膚之中似出不出者用紫艸透肌湯^一逐之如不急治定變黑枯焦而死

一痘出雖稀其色與肉色一般無紅暈者用保元湯^四加芎歸紫艸紅花
一初出放標漸多隨見紅斑痘乾紫不起真摸過不礙手身熱氣粗者此熱毒流於胃經故紅斑見於肌肉也宜

烏金丸^六 蚕酒 蝎酒
耳 翠中白附子麻
川山甲^半 蟬^二 末
緊中紅卷^{各一} 兩好酒一
鐘熬至大半去渣下蜜
五兩慢火同熬滴水成
珠

玄參升麻湯^七
玄參升麻 水煎

紅花紫草木通石膏括棟柴胡白芍小甘草灯心為使煎磨犀角化烏金丸^四喉痛加玄參痘轉紅活不宜服
一初出熱盛色紫不分地者涼血解毒湯^四加酒炒黃芩兼有黑點或紅斑如錦紋在皮內者化毒湯^二加酒炒黃連喉痛加牛子玄參磨犀角汁服
一痘既見點面頰口唇帶紅紫色木潤澤身不退熱此由火毒鬱結於臟腑故也宜用防風白芷紫艸紅花蟬退木通小川芎歸尾灯心為使水煎調下小無比散^十若有紅紫斑者加紫艸膏^六熱不退者多磨犀角汁和之
一初出有紅丹如雲頭突起者用玄參升麻湯^五加紫草

保赤全書

卷上

三九

人參破著湯共芪半

參破著一分耳

紅酒木八分官三分

姜水煎

起死回生丹廿九丸

姜一分水煎熱服被

蓋斤時令脾胃溫暖

陰退陽回瘧自括

此二條前後通用

退火回生散平清一錢

硃砂二分行水三厘石

末涼水調下得睡少時

神氣寧虛轉紅活

紅花黃芩

一初出灰白頂陷不起或起亦軟不得手根窠不紅身

涼而靜此虛寒証也用人參歸著湯十五氣滯者少加木

香兼泄瀉者理中湯五六

一身涼灰白色不進飲食寒氣逆上或嘔吐或腹脹痛或

泄清水手足厥冷此純陰之証也空起死回生丹四六或

保元加芎桂姜附危急則異攻散一六

一太熱不退煩渴飲水譫語狂亂其色紅紫者由火毒煉

於內以致神不守舍將成黑陷焦枯此純陽之証也可

與退火回生散五十四或辰砂益元散四十四

一痘內黑外白者解毒湯二八主之內白外黑者升麻湯九二

主之太抵色紫黑者皆加紫草紅花

連克升麻湯也

一初出自汗丹溪曰初出自汗不妨蓋熱氣薰蒸而然也

但汗出表虛恐難收斂可與保元湯七四倍加黃耆以實

其表有熱者加炒芩連

一痘出完熱甚氣滯皮肉腫亮者乃毒氣在內故也用內

托千金散四四治之失治則內攻而死

一初出因夏月炎天暑氣薰蒸以致煩燥發渴而出不快

者入參白虎湯八八或五苓散六九加木通乾葛主之

一初出因冬月天寒為冷氣所侵以致肌膚粟起而出不

內托千金散聖參芪

耳芳破芍桔芷

補力不虛加糯米

四十九粒鷄汁半盃服

一方聖二

參芪耳破芍

芍堯地川山甲

或加鹿茸

以下以

十宜散 三 參苓

瓶二分官耳五分芳

云桔木芬卜紫中

一水煎

平和湯 四五

參苓耳散芍芸

芬桂沉檀乳桔

紫葳石等分到

細用酒四兩和勻

加味四聖散 四五 紫

其二分糯一撮木水

快班散 四十六

參芍紫蟬木

其有實熱者去參

加大版

防風升麻湯 四十七

其五分升三分田蒼

其五分黃芩一兩芍

其二分實五分每服

三錢荷五分姜三斤

水煎

紫草飲 四十八 紫中

右細刻百沸湯一

大棗泡使以物合定勿

令泄氣候溫量兒大小

手服多至一合少至半

合雖出亦減○又紫中

條

與

後

起

脹

險

証

條

犯

快者陳氏木香散 三 加紫蘇梗 主之 或五積散 二

初出為風寒所侵鼻塞聲重咳嗽而出不快者參蘇飲

三入參敗毒散 主之 十

初出或因邪穢所觸伏匿而出不快者十宜散 五 或平

和湯 九 外以乳香羌萎燒之以辟其氣

初出大便秘結內有實熱而出不快者加味四聖散 五

加枳壳黃芩及快班散 五 去入參合四順飲 五

初出大便利口渴而出不快者內虛熱也四君子湯 五

加肉苳蔻黃芩紫草若不渴而大便利者此內虛寒也

理中湯 六 陳氏木香散 五 若氣實為痰所鬱而不發者

防風升麻湯 五 及抱龍丸 四

初出因勞力在前元氣虛弱而出不快者補中益氣湯

主之 九

初出因吐瀉以致胃虛不食而出不快者理中湯 主

之 五

逆証不治

一發熱一日而出者以一日而出者次之齊垣出者不

治急服紫艸飲 七 鮮之若色紫黑死無疑矣

一熱未退而見點於太陽太陰額角髮際及天庭方廣之

處再加目紅唇裂痰鳴色白者不治毒參陽位故也

- 一 痘已出熱一遍又出一遍者不治
- 一 初出密如蚕種或如沸子無縫者不治
- 一 初出全不起頂如灯燒湯泡之狀者由氣血不和毒無由而出也九日後決主瘳而死
- 一 初出遍身如蚊蟲咬者不治此乃斑毒壅于肌膚不得透出故也急宜清熱散血快斑猶或可生
- 一 初出慢頂連肉紅者八九日決主瘳塌而死或以化毒湯一加紅花蘇木芩連蟬退調下紫艸辰砂二餅
- 一 初出色白與肉一般久不轉者不治
- 一 痘初出而色紫黑乾枯者不治

- 一 初出頂陷中有黑點或如針眼者不治
- 一 初出即虛泛如水珠子皮薄光潤易破而乾者不治
- 一 初出皮薄色光好看而根窠全無血色或帶微紅一二日間即大如菘菘者決不能貫漿多成一包清水八九日擦破即死急宜大補氣血
- 一 初出先于天庭方廣太陽之處見標一粒突起光亮好看少頃又即沒者此名賊標猶賊欲陷城掠地先以奸細探之也決死
- 一 痘出煩燥不寧腰腹仍痛口臭氣粗身出紫黑點者死
- 一 初熱腰痛至報痘而大痛不止面赤標如蚕種煩燥悶

胃爛下六十一葉之
表曰一厭後
觀自爛不可近者
此官爛也不治云云

傷寒全書

亂者五六日主口唇青黑舌上發赤而死

一初出如血點子帶紫色者此將發斑之証也一二日必死藥用涼血解毒化斑清熱猶或可生

一痘出時狂言如見鬼神好飲冷水其斑先從腰眼上起者不治

一初出有紅斑如錦紋者玄參升麻湯(二百)或犀角地黄湯(八)治之不退六七日後死

一發青斑或黑斑如痣或肌肉有成后青黑者死

一痘出時噴唇崩裂胃爛發斑者不治此係熱毒攻於肺脾二經大宜清解推利有膿血及紫血下者十生一二

一痘舌捲囊縮者死

一初出有赤點如菜豆大見於兩腋小腹數點者不治

一先發無各種毒而後出痘者十有九死預散其毒可也

一初出吐瀉不止蛔虫從口鼻大便中出不進飲食者死此証大宜扶胃參苓白朮散(七)主之

一初出渾身發作紫泡刺破出黑血者死

一初出斜視之面如橘皮不分肉地者死
一初出如蚕壳蛇皮者此氣至而血不隨也以芎歸均氣飲治之(三五)若治之氣血不相隨而痘如舊者死
一初出數粒發于山根之上此毒盛氣虛乘虛犯上也其

芎歸均氣飲(四九)
吸芎歸非參云
荆青木官姜水
煎
涼血化毒湯(五十一)
飯尾搗地翁堯
力紅葉枯山豆根
咬咀白水煎調人
薑末一匙同服

清金湯 平一知 芥
羔栝耳門韭
菊丹花馬兜鈴
水煎

活幼心法上卷十五
葉表其毒氣發
動於五臟一動其
欲出外其肌決不
可阻過

胖 大也

保赤金書

卷上

四十三

証多凶。宜涼血化毒飲三百王之

一初出口中氣醒臭勅勅出衝人者此肺中邪火煎熬潰爛故也急與清金湯四百治之如遲至七日而死矣經曰肺絕者七日死此証之變或失聲或喘或乾嘔皆其候也

起脹三日証治 順逆險第三十八

放標之後漸漸起脹痘瘡肥胖十分是胎毒發出十分胖盡則毒出盡也有不起者或因元氣本弱不能送毒或有雜証阻滯不得升發皆發熱放標之時失于調攝故也于此不急置之後難為矣

順証不須治

一報痘三日之後先出者先起後出者後起根窠紅綻肥滿光澤面自漸腫依期灌漿飲食二便如常而無他証者不必加治

險証當治

一瘡頂肥滿而根盤不聚色不紅活散氣有餘而血不足也補元湯或當歸活血湯補元湯紅貴木耳補元湯淑消芍芍紫草酒
一頂不員滿而上有紋路猶未出部根窠雖紅而皮軟且薄者血有餘而氣不足也大保元湯以扶陽抑陰
一灰白頂陷下有紋路出部根盤血散不聚者氣血俱不

大保元湯 茵參丹
芳官木 五十二

解毒湯 益參耳版
苦桂查紅酒水 五十三
保生散 紫河車龜板

升天散 五參益木
耳版 苦貴查
淫手霍 川山甲
圭木

解毒疎痘湯 芸荆
羌活 芎藭 芥版 羌
芎連 廣 紫草 蟬
五十六

化毒湯 紫草升耳
蟬骨 芥酒 五十八
無價散 五九 用無病小
兒糞陰乾於臘日
將傾銀確二箇上下
合定搗泥固濟火煨
通紅取出為末蜜水
調服一匙

保赤全書

卷上

足也。用人參歸著湯^{十五}或內托散^{三三}送下保生散^{十六}若
泄加訶子肉。若有斑去官桂加紫艸炒黃芩牛蒡失此
不治必不貫漿九日後擦破毒氣攻內變成腹脹聲啞
氣急而斃

一痘紅紫頂陷不起用保元湯^{七四}加川芎紫艸紅花酒炒
芎連

一痘頂陷不起仔細看年壽上痘起不必憂如年壽上亦
不起急與升天散^{三五}一服如不起再進

一痘當起脹而天庭邱堂坎離二宮不起者急用升天貫
濟散^{三五}治之

一報痘紅紫色口渴壯熱譫語者屬實熱也解毒疎痘湯

八去麻黃加紅花小便赤澀加木通灯心

一痘紫黑頂陷或有黑痘如疔此皆血熱太盛也用當歸

活血散^{八五}或化毒湯^{三三}加芎歸木通紅花或無價散^{二二}

一痘半起忽然平定而色白者急與內托散^{三四}或補中益

氣湯^{九四}

一痘出於正位偶然變動先紅後紫後黑者有之此乃毒
氣內攻于腎患者必煩渴氣悶嘔逆惡心可用射香人

牙散^{一三}治之

一痘雖紅鮮反乾燥而不充肥者此火盛而血不足也宜

保赤全書

卷上

四

四物快斑湯平胃快斑湯 藜藜地
 藜藜力升葛藜藜地
 六分水煎入燒人犀服
 四君子快斑湯益參藜
 本疾其官芬荆藜
 陳藜五分
 大補保命湯益參藜
 藜地藜藜力耳藜
 塌荆藜官五分煎入
 人犀燒服
 平胃快斑湯益參藜
 耳陳藜羌猪狀五分

退火涼血輕清之劑。四物快斑湯三百 主之四六
 一痘克肥而帶濕者。此脾中有濕而氣不足也。宜瀉濕補氣。兼風藥治之。蓋風能勝濕也。四君子快斑湯三百 主之四七
 一痘紅活克肥。以指捺之。隨破者。此血有餘而氣不足也。後必痒塌而不可救。宜大補保命湯三百 主之四八
 一痘起發遇久陰雨而不能起者。平胃快斑湯三百 主之四九
 一痘發內傷飲食。腹中飽悶或痛。以致中氣鬱而不起發者。寬中快斑湯三百 主之五〇 貴芩不實查曲砂連耳朴青堯木
 一痘稠密應腫不腫者。此毒鬱留於內也。急服托裡快斑湯三百 主之五一 羌云房桔升荆耳葛堯

捺乃
 難入
 手按
 也
 難入
 捺乃

補脾快斑湯益參藜
 甘藜已官五分

麻黃湯六分 杏枝
 獨聖散九分 川山甲酒炒
 一分或五分用本香煎
 湯入酒調下熱甚看
 紫中煎湯下
 猪尾膏七十

一過身俱起手足起不透者。脾胃虛也。補脾快斑湯三百 主之五二
 一頭面漸腫痘漸平塌者。危証也。所謂肉腫痘不腫是也。急用麻黃湯四 加川山甲三錢。汗後隨証調治。
 一痘不起發不拘黑陷。用獨聖散九十 或胡荽酒八十 若黑陷。腹脹用猪尾膏七十
 一痘乾射不起者。水楊湯九六 洗之。服補中益氣湯四九
 逆証不治
 大抵痘脹一分則毒出十分。至五六日不盡脹。又色不紅活者。決無生理。

保赤全書

卷之

四

- 一痘頭面不起脹雖遍身皆壯者不治
- 一痘根窠全然不起頭面紅腫如飯皮者不治
- 一痘至四日全然不起而根皮先腫者凶急用內托散三四
- 加川山甲托出其毒
- 一痘紫黑不起乾燥不潤慘黯不明者不治
- 一痘遍身紫點如蚊蚤所咬或發為紫泡者俱不治
- 一痘紫色刺出黑血如屋漏水者不治
- 一痘遍身黑脂悶亂不寧神氣昏惰者不治
- 一灰白不起漸成倒塌慘黯不明膨脹不食氣促神昏悶亂者不治

- 一灰白頂陷內外俱有紋路而根窠血散不聚更加世瀉
- 一煩渴唇白痰鳴不思飲食乃氣血俱虧也不治
- 一腰腹大痛者不治
- 一起脹時啼哭不已日夜呻吟煩燥悶亂狂言妄語如見鬼神者不治
- 一吐利不止乳食不化或一便下血者不治
- 一起脹時有六七粒細而成塊於中有一大者扁濶歪斜若此者不治
- 一起脹痘如烟霧罩定者不治
- 一起脹時手足見而復隱起而復塌者死此根本已極枝

葉先萎之象也

貫膿三日証治 順逆險第三十九

膿者血之變也。有血則有膿，無血則無膿矣。痘至貫膿，大勢已成，故此時必以有膿為主。有膿則生，無膿則死，必然之理也。痘至七日，若頂陷不能貫膿者，必由先失調治故也。急看根窠，血聚無甚，雜証則大補氣血，必俟漿滿足方止。如斯猶可回生，若頂陷灰白，則氣血俱離，無能為矣。

順証不須治

一自初出至七日為貫膿之時，其形員滿，光澤而有膿窠者，毒化成漿，色如綠水，而漸變蒼蠟，將毛披之，其皮堅

硬，飲食二便如常，更無他証者，吉

險証當治

一痘貫膿，肥滿則易結痂，若起脹光澤，可觀而以手摸之，軟而皮皴，則毒雖化而漿未滿，後必不能收靨，或中間猶有未成漿者，為氣血少寒而不能振，故也。終當變為虛寒之証，急用七真湯四五加川山甲、糯米、乳酒，助其成漿。

一頂陷無膿，或服內托藥而暫起，不久又陷者，貫膿不滿，故也。宜內托散三四倍功，參、蒼當歸煎，和入乳糯米好酒服。

七真湯 七一 淫羊藿 三分 參 八分 川山甲 三分 莖 一兩 芎 酒 五 兩 八分 茸 五方 木 二分 右 姜棗糯米水煎
內托散 七二 參 莖 茸 芎 版 芸 芩 桔 芍 卜 木 桂 石 用姜一斤 棗一枚 煎服
紅紫者去桂不加蟬 葉漿不滿水酒各 半 煎色淡白者去 云 芩 加糯米不食 者 加 入 乳 和 服

淫羊補漿湯 七十三

七與湯加木 六分土炒
查八分陳 五分官三分
黃豆 三十粒 笋尖 三箇
水煎或加芸芬

一痘色灰白漿不滿足欲成倒塌皮薄易破者用淫羊補漿

漿湯五或保元湯七加芎歸升麻人乳好酒

一痘色紅紫漿不滿足欲成乾枯黑陷者當歸活血散八五

合解毒湯二八加升麻石膏乾葛

一痘遍身貫膿忽然一日變白變紅變紫者不可不察變

白屬虛宜內托散三四變紅紫屬熱宜當歸活血散八五合

解毒湯二八

一痘起脹貫膿俱好至八日大便忽秘常欲去而不去急

與歸尾三錢枳壳三錢芝麻三錢紫草生地黃芩各一

錢煎服即通有一失治至醫時忽然發熱而死

涼血芍藥湯 七十四
液池紅六分水煎

白龍散 七十五 乾牛糞
燒過取中間白者研
篩散之

一痘貫膿作痛不止者有二如氣滯作痛者保元湯七四加

木香山查血熱作痛者涼血芍藥湯七五又方專以白芍

為末漆酒調服

一破如成坑者此內陷也急用白龍散七五敷其瘡內服

內托散三四

一貫膿時痘雖若起脹而中空軟此名空倉豆極危証也

若痘中略有清水根窠起脹而血紅活尤有生意急用

內托散倍加參耆歸以人乳好酒各半盞八藥溫服

此貫膿妙法也

一貫膿時頂平脚濶漿不滿足治當十全大補湯三五加木

十全大補湯 七十六 去薑
加姜炒 版芍藥 酒木 炒

香乾姜浴之

一貫膿時發泡如彈子大者以保元湯(七四)加白朮搗皮茯苓以利皮膚之水發紫泡者不治

逆証不治

一紫黑如爛昏慘不明乾枯成塊者不治

一諸痘有癢天庭不起者不治

一貫膿額上如沸水澆皮易破漸延兩頰水去而乾似曆非曆者死

一頭面腫大瘡盡抓破臭不可聞及紫黑者不治
面腫早退瘡陷無膿目無神光者不治

一漿不充實不肯結痂而渴泄寒戰者急與大保元湯(八四)

一不食者加乳汁根不紅者加鷄冠血半匙

一痘當貫膿身反太熱而煩渴甚者白虎湯(八八)加天花粉乾葛其艸小便不利者四苓散(七九)

一頭稠密身上稀少色淡不能起頂灌漿者氣血虛少所致宜內托散(三四)加桔梗升麻白芷先灌頭面若四肢不灌者前藥內減桔梗白芷去升麻倍加白朮白芍牛膝引之蓋四肢屬脾前藥脾經藥也

一抵血淋漓及痒塌斑爛者敗草散(百三)內服內托散(三四)加何首烏牛子蠟退木香白芷之類痒甚者以荆芥穗紙

助陽丹七七 著酒分 其
三分 芎參 酒分 椒分 湯
一分 紅五 參八 陳分 官分
 姜水 煎如食加
 查下
 當歸涼血湯天 漱
 池六 力堯 耳
 參栢 小分

暴成條然火指定痒痘頭刺之或以乾荷葉燒烟薰之
 竝妙又方以細茶當歸黃耆燒烟薰之
 一蒲身無皮膿水流沾衣席不能轉動者用秘傳茶葉方
(百) 或敗艸散(十一) 內服內托散(三) 去桂(四) 加荆芥穗
 一痘痒場不起根窠不紅者助陽湯(六) 加紫草
 一痘發痒滿面振去而面上瘡痕隱然點點有起發之勢
 此猶可治急以托裡發毒止痒之藥用內托散(三) 加蟬
 退服之亦驗
 一痘抓破而出血者此陽瘡出血也宜當歸涼血湯(三) 王
 之不 宜實不實瘡而即出與此法治法與大不相同也

- 一 灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治
- 一 痒白如水晶皮薄無膿或純是清水九日後抓破而死
- 一 痘痒太甚抓穿破肉者不治
- 一 二便不通自閉聲啞腹中脹滿肌肉者不治
- 一 瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不治
- 一 痘未起頂但脚漸潤至七八日乾燥瘡皮皺起誤認結痂收靨者多不可救急與助血解毒之劑庶可回生
- 一 痘膿時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰先有焦枯黑陷者此名倒陷者不治

痘醫自上下而下者順從下而上者逆而
 收靨三日証治 順逆險第四十

赤水珠不消之二字
作失治或字作
角

醫家入門曰十日以歸
膿滿回綠痘高腫
蒼蠟色或似紫紅
似葡萄色者佳自
上而下按之堅硬全
無灰陷者里者生
自下而上倒腐者死

痘至收靨大勢已定亦有膿不滿足似靨而非靨者此時
再宜明辨若七日之間面自腫覺微退痘雖似乾而痂薄
如紙或有內証未除此痘極險時也不治凶變定矣急以
補血涼絲之劑治之或可轉移

順証不須治

一痘至十日血盡毒解其膿漸乾如蒼蠟色或如葡萄色
從口鼻兩傍或面部收起至胸腹而下然後額上與脚
背一齊結靨逐漸剝落內証全無身漸輕快飲食二便
如常者吉或手足心或手指尖或陰上先收者俱吉
一人中者任督一脈交會之衝也凡痘自初出至收靨俱

額赤水
珠作

盤

赤水珠痘疹心印
一鼻上上痘中
自者佳是凶也
亦不死也目見世三
卷七十二年重

除濕湯七九卷蒼
芸椒猪沢翁
木枝中分

要在此部位先見者佳謂陰陽和暢也

一痘收靨自人中平分上下髮際以上陽中之陽也謂之
孤陽足膝以下陰中之陰也謂之孤陰孤陽寡陰所以
痘蒼之收至此一二處每遲留而後靨也不必施治
一痘既蒼蠟色而身有微熱者乃燒盤之証亦不必治
一痘鼻梁上先焦者任凶不死 在心印作凶逆

險証當治

一痘當靨而流漿不已者因表過則斑爛流水或飲水多
則漂蕩流水俱服保元湯四七加防風白芷白朮或除濕
湯三六外以敗草散付之百七

赤水珠

卷七

保元湯

敗草散

四漿散 何首烏

姜參木茯苓

姜水煎

象牙散 參

何首烏 糯一撮

二枚水煎送下

末一錢

當歸解毒湯

飯酒池大壳壳

葉麻仁炒研末

內助丹 茵酒

參仙木茯苓陳

其卜桂查石加

姜三束一糯五十粒

水煎不食加乳一

杯痒甚加大附子

寒戰不止加附云

渴加麥泄加猪沃不止加訶子豆蔻

清金導赤飲

瀉清陳貝羔茯苓

泮連否年蜜壳

翁滑韭芥參漆

十分水煎

一痘當醫不醫而膿貫充足者服回漿散五或象牙散五

一痘有醫至頸或至腰而下身數日不醫者此乃熱毒太

盛不能收醫故也治當有熱則清之若小便不利者四

苓散加苓連滑石木通大便秘結者當歸解毒湯六利

之

一痘當醫不醫忽然變動成白頂陷吐瀉腹脹寒戰咬牙

者急與內助丹二若瘡塌氣促足冷者加附子有水泡

者多加白木行出惡水而膿自乾矣

一血盡漿足濕潤不斂者內虛也用保元湯七加苓朮以

助收斂結醫○心印曰或六君子湯

一痘當醫不醫發熱諸語自閉大喘手足大亂小便不利

者此熱毒乘於肺經無陰氣以收之然也急用清金導

赤飲六王之

一漿未稠濃頂未飽滿面腫忽退自閉忽開瘡脚散爛色

白皮破乾燥似醫非醫此因津液枯竭血虛氣少內証

未除之故此証之極險者也急用四君子五加麥門牛

勞荆芥連喬桔梗救之遲則不及矣今人每見此証認

作回頭結痂謂為無事致成不救者多矣

一膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者此倒醫也係中

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

氣不足急用保元湯七加當歸牛子連喬薄桂木香浴

豆蔻丸 木縮
 龍骨 柯子肉 赤石脂
 枯荖 七少 羊肉果 五少 石
 為末 麩粉 九如 黍米
 大每服 二十九 米飲
 送下
 桂枝解毒湯 三枝
 麻酒 藜 芸 荆 羌
 甘 桔 參 芍 芎 朮
 生 姜 水 煎
 桂枝解毒湯 三枝
 猪 澤 麥 六 芎 朮
 耳 亮 官 水 煎 此 條 下 方 也

之其頭面瘡已破者復加腫灌手足遍身原無瘡處又
 復出一層謂之補空若治之頭面不腫空處不補不旋
 踵而告變矣
 一過期不醫瀉身潰爛以致粘衣席者以白龍散^{三百}以敷
 艸散^{七三}貼襯佳^方
 一收靨時忽泄膿血痂皮者此亦倒靨之証乃脾強腎弱
 順利盡自愈不可施治如利下水穀不分者此腎強脾
 弱也急用陳氏木香散^{三百}送下^一荳蔻丸^{八十}
 一痘因冬嚴寒被寒氣鬱遏而不能靨者以桂枝解毒湯^{三百}
 治之^三

壽按三百三十一之方也

當解解毒湯八名中
 露手^{二百六十四六六}
 淑池大壳麻仁壳
 紫草等分水煎

一痘因夏炎暑熱氣薰蒸而不能靨者以甘露解毒湯^{二百}
 略微利之^六
 一遍身俱收惟頭與足不收者此陰陽不和故也以四物
 湯^{六五}去地黃加牛膝升麻半蒴紅花荆芥之類
 一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者服小柴胡湯^{四九}
 合回漿散^{百五}或天水散 或猪尾膏^七外以黃連輕粉^四
 為末柏油調敷或用猪胆汁研芒硝如膏塗之
 古人用猪尾膏獲効神速者蓋以蘊熱毒氣併于心臟故
 熱毒內外貫注而瘡不結痂用此方者以血歸心引龍腦
 以涼之而行榮衛克榮衛遇香則行遇臭則止也

保赤全書

卷七

二百

生肌散 六連
 栝子耳栝石
 共為末搽之
 綿蠶散 出蛾
 腫不拘多少將生
 明若末入內填滿燒
 令汁盡成烏末搽
 之

一痘收靨時有臭氣帶腥者佳全無氣息者尚有餘毒未
 發也若臭氣如爛肉不可近雖似結痂未可為真急與
 清熱活血之劑服之緩則無濟矣
 一瘡有臭爛深坑不收口者用生肌散百三綿蠶散百四敷之
 瘡欲收而唇口乾紫連結渣滓頰紅者將成肺癰也宜
 解毒湯百八加麥門冬知母百合甚則大連翹飲百五
 爬破去皮而猶有血水者可治急與保元湯加歸芍
 膿汗不乾而能食者時與葡萄食之為其能利小便也
 一痘臉上未收而耳先收者耳冷用枸杞故紙知母當歸
 川芎白芍山查陳皮白朮甘草薑水煎服耳熱用艾連

熱赤水玄珠痘疹
 心印作熱

芎歸白芍木通厚朴甘草水煎
 一凡痘係危証氣血本虛多服補劑而漸有膿色將收靨
 者雖有熱者凡當與補劑中加涼藥可也若謂將靨去
 補劑而竟與涼藥更用下利藥令其速靨是令其速斃
 也蓋虛者復虛毒返內攻而死此必然之理也又已斃
 之驗也
 逆証不治
 一痘當靨遍身未見青膿黃色之漿而口唇上下痘先黃
 熱者毒氣內攻於脾也不治
 一痘皆未靨口唇先腐爛及唇白到舌者皆不治

醫學入門痘疹門北
四葉裏如遍身
自爛如餅搭不
可近目中無神者
死搭字彙附也

醫學入門痘疹門北四
葉裏遍身如白
惟數顆不爛面亦結
殺入猶蛇退皮雖一
節被傷不礙退節
亦死若原貫膿充滿毒氣盡出不生異症者無妨

- 一痘至收靨不吃飲食口唇常如食物而動不止者不治
- 一面部胸腹未靨而脚先靨者不治蓋陰勝于陽也
- 一遍身臭爛如餅搭不可近目中無神者不治急用內托散三四加白朮茯苓以補氣血托毒收斂
- 一遍身發癢振破不見膿水皮捲如莖壳乾者不治
- 一將靨寒戰手足搖動咬牙禁口者不治
- 一痘不收靨痰壅喘急聲啞目閉無神者不治
- 一目閉腹脹足冷過膝者不治
- 一遍身收靨內遺數粒不靨尚能殺入猶蛇退皮而一節被傷退不全者終死凡靨至項下或至胸仔定而服藥

不效者皆死

落痂証治及靨後餘証 順逆險第四十一

痘瘡灌漿滿足乾靨結痂依期脫落固為吉矣然有應落不落以至綿延日久或落而不齊者此時尤宜明辨而治也且痘後血氣已損虛火易熾不可因循失治致生他變也又曰痘後餘毒尚在用藥宜以清涼如虛寒泄瀉之外不宜溫補但証多端不能盡錄其餘依後各條治之

順証不須治

- 一痘瘡收後痂厚落遲離肉不粘者吉
- 一痂落痂帶紅色而不凹凸更無他証飲食二便如常者

綿延記於前北五
葉之首書
因循記於前三六
葉之首書

因

羊鬮骨散

羊鬮骨髓一兩右煉
八鞭粉一錢研成白膏
以磁器盛之塗瘡上

人參固肌湯

人參 羌活 甘草 芍藥
等分白木一鍾入糯米一撮煎服

八物湯

本方用
瀝汚池木末
陽會下六十八葉
裏頭乃諸陽之會
痘疹驗方卷之上三五葉表頭面者諸陽之會

人參清神湯

乳香韶粉散

乳香 韶粉 一兩
右共為末豬
油拌如膏用錫箔敷上

白鷹糞散

取白鷹糞
燒灰 馬齒見
晒乾燒灰和勻蜜水調
塗瘡上

馬齒莧散

馬齒莧
榨汁積膏脂石蜜共
熬膏塗腫處

疾藜散

疾藜
芸耳 羌活 芍藥
分末水調
塗上

掀字 暈虛延切
音軒詳校篇海舉
也又引也梅白曰以
手高引與也按如掀

自食痘痂雖有他証不死

險証當治

一痘已結痂而不焦落者餘熱為害也大連香飲
一遍身已焦落而頭面不落者毒聚于陽會也大連香飲
一痘痂至半月或一月粘肉不落或發癩者此因表發太
過致肌肉不密無力收斂故也宜入參固肌湯治之
一發痒剝去痂皮或血出或血不出仍復灌漿如瘡疥者

參耆耳瀝本 參耆耳瀝本 參耆耳瀝本 參耆耳瀝本 參耆耳瀝本

此血熱氣虛也宜八物湯加紅花紫艸牛蒡子治之

一痂不落反見昏迷沉睡不省人事者此脾胃虛甚也宜
人參清神湯

一結痂乾硬深入肌肉不能脫落者即以韶粉散或真
酥開之或蜜水塗之俱可使之脫去若遲延日久則深

陷而成癍痕矣或成癍痕者宜用乳汁或用蜜水調蜜
陀僧未塗之及鷹糞白散

而用之

一痂雖乾好但半邊掀起半邊粘着不能脫落者此過用
辛熱之藥留熱在肌表也宜升麻葛根湯五加防風荆

腫或亦在作燉腫
重且之亦重例見
燉梅白曰火以也

芥蟬退連喬以去肌表之熱即落矣
一醫後癍紅紫者乃血熱毒盛也當與涼血解毒
一醫後癍白者血不足也不治雖過四十日還死此症因
漿水淡故癍白若漿充實必無此証急用保元湯
合四物湯六五加白朮陳皮紅花老米
一痘癍淡白者四物湯六五加紅花有表熱者合升麻湯四
有裏熱者合解毒湯三八
一醫後身熱不退或寒熱往來用小柴胡湯四九虛則補中
益氣湯五九俱加黃芩
一醫後唇乾口渴熱甚不解者大連喬飲五五王芝

活血解毒湯

芸荆地芎版克連力紫甘蒼苛芳翁小分水煎○人參敗毒散 荆防敗毒散如

力克銀方此二方治
餘毒癰腫之敗毒
涼血者二方兼云乎

獨活清痰飲

貴四分桔七分貝三分耳如
芍六分味四粒菖蒲五分

去參三分右姜水煎
指當作錯痘疹經

驗方卷之下一世一
葉東垣吧吐門合數

而噴出者謂之錯
喉

竹葉石膏湯

膏知耳韭竹葉
水煎

一痘癍而唇不蓋齒者急用敗毒涼血散二五加玄參失治
定變走馬牙疳而斃此名不見活血解毒湯有
一痘後措喉謔語急用獨活清痰飲二五治之
一醫後虛弱坐立戰搖而二便俱調者八物湯二五加黃芩
知母麥門冬
一醫後泄瀉身熱而渴者白虎湯合四苓散九八身涼不渴
者五苓散六九甚則理中湯五六
一痘癍起而能飲食者內熱也再加二便秘瀉而赤喘
滿者四順飲五五下之恐胃熱不去則成癰腫
一醫後虛煩不眠者竹葉石膏湯九八煩渴謔語者辰砂益

滿

鈎藤湯 鈎藤 紅木飯芎芍甘木 青連官 生薑煎 痘後赤水心印作 痲後

元散 四十

一痘後口禁，羶直，腹痛，逆膈，冷汗，如雨，痛定，注止，而脉弦緊者，因癩受風寒也。宜散風養血，用鈎藤湯二百加紅花、木香、川芎、芍藥、當歸、甘艸、白朮、青皮、官桂、生薑。一瘡雖愈而未散，痲雖落而癩猶黧，或凹或凸，以乳香、韶粉散二百塗之。一靨後遍身肢節上有痲蝕瘡者，蓋因氣血虛弱，或被風寒相搏於腠理，使津液滲滯而然也。宜以綿蠻散四百治之。有熱者解之。一靨後痲落，肌肉尚嫩，出見風早，遂成癩癬，有濃汁出者

金華散

黃丹 栢耆連大輕

栢耆連大輕，磨石為末，瘡濕乾，搽燥，用臘猪油熬化調。

解毒散

忍肝

耳、兩翁、法、刑、亮、力、二、我、共、春、料、用、水、一、鐘、酒、一、鐘、煎、服、泄、加、詞、肉、瘡、紅、芩、芍、瘡、痒、皴、蛇、或、何、首、痛、搗、外、用、大、黃、磨、塗、患、處、後、各、瘡、母、同、銘

燒牛糞，灰敷之。若痲不落，搗指抓搔，致成疔，風癩者宜消毒飲二百加苦參、當歸，外用金華散二百或乳香韶粉散二百。遺毒生瘡，不已者，活血當歸湯二百宜，灸風池、曲池、三里、諸穴，則永不發。四百有解毒散活血解毒湯

銀、五、兩、甘、一、兩、翁、芸、荆、亮、力、加、減、同、煎、先、全、痘、母、方、當、取、桂、枝、湯、派、芎、湯、莖、其、枝、栢、耆、分、水、煎、如、氣、虛、亦、加、川、烏、以、行、經、或、加、參、如、感、風、寒、以、致、骨、節、痛、者、加、羌、活、散、之

一痘後遍身青紫，瘰癧，口禁，痰響者，由氣血虛弱，以受不正之氣也。用蠶蛻一錢，以薑汁薄荷汁入酒，丁薑調服，得汗即愈。

一靨後手足忽然拘攣，不能伸屈轉運者，此由血少不能養筋，或因風寒濕三氣使之然耳。不可輕用發散，反耗其血，只補脾養血此秘法也。以當歸桂枝湯治之三百

蜈蚣法 用水蛭三五條

放在紅腫處吮去惡

蜈蚣 血毒亦從吮也

玄參化毒湯

參 飯尾 紅西 堯羔

六 粘 芸 荆 菊

淡竹葉水煎

蚕退散

枯岩 二 蚕 退 燒 一 分

五倍 二 分 蚕 退 燒 一 分

右共為末先以米泔水

用蟾蜍虫翻轉煎

水洗淨敗血後以茶

未敷之

黃連 陰 虛 丸

連 一 分 蘆 二 分 史 二 分

蕪 一 分 半 乾 蟬 燒 一 分

棟 肉 一 分 右 共 為 末

用烏梅洗去黑水

去核搗膏和丸米飲下

出血謂之銀耳呼吸自大便

受如唇面浮腫穿面破頰潰喉腐面飲食不能入者不治

保赤全書

一 醫後赤火丹瘤此惡候也從頭上起者過心即死從足

下起者過心腎即死內服玄參化毒湯二百五外用蜈蚣法

以斷之二百五

一 痘後牙齦生瘡時時出血謂之牙宣呼吸息謂之息露

此走馬疔也由熱在陽明急用蚕退散二百五敷之如唇腫

面浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不下者不治

一 唇口生瘡破爛上唇有瘡虫食其臍名曰狐下唇有瘡

虫其臍名曰惑由熱在裏虫無所食不肯吐出內食臍

腑及肌而外見唇口也其人好睡默默不欲食其聲啞

啞謂之狐惑証黃連除慝丸主之二百五如唇落鼻崩牙落

失聲者不治

痘疹經驗方卷之下口瘡門凡瘡後牙齦生瘡時時

此走馬疔也由熱在陽明急用蚕退散敷

受如唇面浮腫穿面破頰潰喉腐面飲食不能入者不治

肥搖也 有潤溫者

失聲者不治

一 舌生瘡赤者名曰赤口瘡此熱在心脾二經也白者名

曰白口瘡又為鵝口瘡此熱在心肺二經也赤瘡用陰

陽散二百五白瘡用朱礬散二百五通以洗心散二百五主之二百五

一 痘後發癰者皮膚間隱隱起成疔瘡此由毒氣未得發

盡藏于皮膚或癢痒因爬而成者或因受風風火相持

而成者此吉兆也欲發洩無使停留以變他疾如發太

甚不已者內服防風葛根湯二百五外用靛子水洗之二百五如

無以天水散拂拭之

一 痘後癰毒發于手足委中曲池而不散者乃氣血凝滯

保赤全書

卷下

痘疹

蜈蚣 針之 二百五 詳記於

灣字彙鳥還
切音彎水曲也
彎鳥還切音
灣曲也按二字
通用亦彎字
畧字彙鳥還
無二音

越字彙超也
越也

於灣曲也宜以十三味敗毒散治之
一痘後兩目不開惡見明者謂之羞明惟向暗處敢開也
涼肝明目散主之若暗中亦不敢開者此即防目中
有瘡以望月砂散治之
一壓後忌食五辛恐熱毒薰于肝隔眼生翳障
逆証不治 痘後不善調攝有過一月而死者有過二月
一痂雖落而痂雪白略無血色者氣血盡也過後多死如
無襍証急用大補湯以補氣血養脾胃
一痂後發驚心氣已絕神無所依不治
一痂後目睛翻白無寃失智不省人事者死

一壓時寒戰手足顛掉咬牙禁口者決死目閉腹脹足冷
過膝者死
一壓後牙齦臭爛不可近者此胃爛也不治

痘中雜症 第四十二

痘証發則熱氣動而雜証鬱於內者亦與之俱發矣痘証
有定限雜証無常期故心鑑曰治雜証一寸則痘証落後
一文此誠有見之言也但雜証不去則痘証亦為其所害
醫者知其本末輕重以為治之緩急斯得之矣蓋痘証重
而雜症輕則雜証之藥加于痘証藥內是緩則治其本也
雜症重者先逐雜証而後調其痘証是急則治其標也

諸証摠要 第四十三

頭疼 止有頭疼輕 目閉 初起不治八九日咳嗽無事

氣急 初熱八九 聲啞 初起不治七八日可治或哭泣

後以兼喘急始終不治 喉痛 初起難治八九日可治

亂語 初起重痲落 心痛 不治 肚疼 初熱無事痲落

腰痛 初起及痘中內 十指冷 不治 手足痛 初起內八九

手心疼 用一芍散 手搖 不治 足搖 不治

足冷 過膝者不治 眼出血 不治 耳出血 不治

鼻衄 無事 口吐血 鮮血可治 尿血 不治

大便血 可治 吐黃水 肚不疼無吐清水無事

措喉見於前五十八葉表

吐膿痰 無事 吐臭痰 不治 措喉 初熱因貫臍

蛔虫 初起吐一二條無事多則因十寒戰 初起不治七

咬牙 初起不治起脹時因 泄白糞 寒也理 泄紅糞 熱也

泄青糞 寒也理 泄黑糞 不治腸 泄黑糞 肺壞也

痘痂口渴煩燥者以 痘痂不食者以

○發熱 附痘後潮熱 東園曰身熱不退毒氣太盛故

夫痘之毒非熱不能發痘之出非熱不能指故發熱之初

必為之表散見標之後必為之清解大小便秘則利之錢

氏曰熱甚當利大小便熱小當解毒若驟用補劑則毒氣

壅塞熱終不退而紫黑陷伏痒渴咽啞風搖牙疳之証不

園字音下五官切 玩平声

可免矣。智者可不調之於預哉。

初熱証見前。

標後熱未退，清地退火湯(十三)起脹熱而無漿者，鼠粘子湯

(九)熱甚，經日不退者，加味升麻湯(八)如聖湯(六)或柴胡麥

門冬湯(三)氣血虛而作潮熱者，補中益氣湯(九)加山查牛

子，或保元湯(七)加地骨皮黃芩。

痘後潮熱，痘後猶產後氣血大虛也。火從虛發，故午後臉

赤發熱宜保元湯(七)合四物湯(六)加麥門冬柴胡黃芩。

寒熱 第四十五

夫火動則熱，火鬱則寒，皆痘毒欲發不出故也。或發或來有

如此耳。然痘未出而發者，氣血與毒火相攻也。已出之後

發者，毒盛則為邪勝，毒輕則為虛極。發於結痂之後，則為

餘毒，皆表裏俱見之証也。治法始終用柴胡湯(九)加知母

石膏。大便秘則大柴胡湯(八)下之。

日寒熱作於七八日之間，恐有坐陷之患，須多服內托散(三)

又有七日前後而獨熱者，則為痘蒸氣血與毒俱盛也。或

十四日後而獨熱者，亦為餘毒易治。若七日前後而獨寒

者，為氣血損而毒火內鬱也。難治，須急與保元湯(七)加芩

桂姜附木香，或與內助丹(二)死生之際不可執一也。

厥冷 第四十六

夾班此論以下至
夾凡瘡出於赤水
玄珠

熱毒之氣鬱遏於內。元氣亦不得行。以至表上無陽而厥冷也。宜以保元湯四加桂枝。生薑。川芎。當歸。或理中湯五

夾班 附丹第四十七

班者。血之餘。有色點而無頭粒。隨出隨沒者也。丹則成。赤如雲頭。而突背血太過。而氣不及。榮衛失護。致血任焦浮游之火。散漫於皮膚之間耳。宜以輕劑散其火邪。兼活血解毒之藥。治之。並用玄參升麻湯五加石膏。黃芩。荆芥。芍藥。芎歸。或升麻湯五加紫艸。蟬退。多磨犀角汁。化下烏金丸四。又或結茹之後。而發者。餘熱煎熬肉。分其班必爛。宜解毒湯三加歸。芍。黃芩。石膏。甚則大連翹散二爛處六五

須要預煎藥
玄珠心印作須要預
煎候之
斑退血附之上在
候之字

以生肌散七敷之。無不瘳矣。至若青黑紫斑。乃毒氣不能發泄之故。死生一反掌間耳。急與四順清涼飲五利之。其班既退。即以四君子湯四加黃耆。姜。棗煎服。如不止。再加肉苳蔻。須要預煎藥。班退血附。即服。庶可免其內陷也。大抵班在發熱。放標起脹。多用表散。在貫膿收靨時。多用解利。遍身通紅者。治同。

發班有二。一陽毒發班者。壯熱渴燥。兩目如火。脈洪有力。其色紅赤者。胃熱也。紫黑者。胃爛也。二則下之。早故熱乘虛入胃。一則下之。晚故胃熱不得泄。皆內外挾熱而發班也。當服玄參升麻白虎等湯。陰証發班者。身無大熱。手足指

保赤全書

卷上

六

臟玄珠心印作陰
腑作陽下參考
於其處

肺

甲俱青脉沉細而急其色微紅此無根失守之火聚於胃
獨薰肺傳于皮膚而為班也若妄投以涼劑則誤矣當與
升麻驚甲湯百調中溫胃其火自下而班自退矣

夾疹 卽痧也第四十八

痘毒出於臟疹毒出於腑臟屬陰陰主血故痘有形而有
汁腑屬陽陽主氣故疹有形而無汁此皆中于有生之淫
火本非尋常竝發者惟痘出之時或風寒閉塞腠理熱氣
擊動腑毒故竝出耳此亦不順之証也但臟乃積受之地
故其受毒為最深腑乃傳送之所故其受毒為差淺是以
疹之發輕而易解先服升麻葛根湯五不解則犀角地黃

湯三主之惟內既清涼則疹隨內解而愈矣

錢氏曰痘瘡只出一般者善凡痘已見形其間碎密若疹
子者此挾疹也此由火毒薰灼於中故使疹挾出於外也
急宜解毒使疹于消散痘得單成可也宜荆防解毒湯八十
主之若服此疹不退者凶之兆也挾班治同

膚疹者熱毒之氣發越而然也暴出之時點如麻狀但色
鮮赤成丘耳用敗毒散一毒散隨沒越數日出血則反稀
矣

劉宗厚曰癩疹多屬脾隱隱在皮膚之間故名之也發則
多癢或麻木不仁者是兼痰兼濕之殊也色紅者兼火化

赤水玄珠 珠 珠 珠 珠 之 細
註云亦麻類 粒頭
瑣碎異地 呼為
沙 子 其 狀 如 夏 月
膚 脹 之 疔 子

凡瘡心印作疥瘡

也。用解毒防風湯三百。若內傷外感而發者，用調中湯七六。

夾沙沙與瘡疹蔡氏謂皆麻之異名也 第四十九

砂之形如粟一般，尖員而硬，中含清水，夾瘡而出者，亦熱

毒之所發也。用四苓散七九加防風、黃芩，分利陰陽而砂自

沒矣。

夾片瘡 第五十

痘夾，凡瘡而出，則血氣為瘡所奪，痘多不能起發，成癰，須

連服內托散三四庶無坐陷之患也。

發泡 第五十
痘瘡發熱之初，身之火皆動，故肺火發而皮毛受傷，則

并其膚間之津液，遂發而為泡矣。白而空者，氣之虛白，而

有清水者，氣之寔泡。紅紫者，血之熱，皆內毒未出而歸邪

先為之病也。宜內托之藥以行血氣，則正痘自出，用補中

益氣湯加川芎、酒炒白芍、木通、車前、茯苓、利水，飲泡可也。

若泡大甚，則毒散漫無定，虛蕩無藥，破塌如湯，潑樣更兼

壯熱不食，亦難療矣。如貫膿將收時，有泡大者，無分紅白，

皆多痘相併而成泡，不足為慮，或利亦可。

又曰：痘瘡發紫血泡，白泡者，皆肺熱也。蓋皮毛者，肺之合

也。熱毒在肺，金傳於皮膚之間，故泡從而發也。紫泡血泡

宜加味清肺飲三百加當歸、生地、蔥、姜煎服。熱甚者加酒炒

肺

參連白泡亦清肺飲或升麻湯加生地黃芩即解裡虛加四君子湯四合服

乾枯黑陷紫陷血陷

乾黑之陷熱邪著滯有餘之症也猶為可治。第五十一

痘色初見深紅者必變紫紫必變黑紫黑必至於乾枯皆血熱乾滯而氣不能運行一定之理固如此也治之須以涼血退熱為主看其微甚或利大便或利小便或為解散頂雖平陷不可以氣虛例之而用參耆補劑蓋補氣則熱愈甚而血愈澀也宜以絲灰化毒湯九加當歸紅花連翹牛蒡更以麻黃解毒湯九發散其毒或以紫艸湯化下小靈丹九或灯心湯化下大靈丹十有黑疔者以針挑破去

心印參考
心印乾枯黑陷
云之下細註明來
曰九黑如鳥羽者
生以煎熱雖熾而
血尚活治以涼血
解毒可愈也黑
如焦燥者死無
生氣也故不治

百燒人屎者之毒
心印作有用燒人
屎者

喜心印作蟻古
文字考蟻子
辟虫

有元氣云心印
作元氣成血尚可
虧損况痘後之
兒尤宜慎之

心印白陷里陷之
細註明來曰察其
乳食少進二便清
利者為真法後溫

其毒血兼用扶脾實土之藥古方有燒人屎者有用四聖散者有用入牙散獨聖散者有用雞冠血和酒灌之者有用胡荽酒塗其遍身并衣服蒸之者有用壁間喜蜘蛛如巨火者研爛入雄黃每歲一厘同研均酒調服者有清心火黃連犀角之類者皆可選而用之如宣風散百祥丸牛李羔內有大戟牽牛等峻利之藥有元氣者尚能虧損况痘後之子有不耗傷者乎用者慎之

又曰痘瘡黑陷大小便不通腹滿喘急熱甚謔語者以三一承氣湯三合涼隔散四服之立効

白陷灰陷灰白之陷不足之症也多難救治

保赤金書

氣虛印作金

痘色白者必變為灰慘灰慘者必至于平伏倒塌此雖氣
虛而血不華色血亦虛也故補氣亦宜補血血活氣行則
白色可變為紅庶亦可救矣若單用補氣之藥則氣燥血
虛必致發瘁抵破灰慘平伏倒塌為不治之症矣治宜補
中益氣湯九合四物湯六有內熱者加解毒藥或利小便
白陷抵破皮薄乾燥而極瘁者皆由失於補血以致氣虛
則燥然也慎之

倒陷 第五十四

痘既員暈而復陷者內外俱虛之象也此必兼行之後或
因泄瀉而氣陷故毒即隨氣血而反陷耳如根窠血猶歸

金白當作金

入門痘疹門九三
葉將厭面全白
瀉難救將厭面
時全白色如豆殼
者仍因初時飲水
過多故厭面不能
齊亦曰割厭面大
便秘則通大便小
便秘則通小便
內潰此命與心印參

附急以保元湯四加苓朮肉豆蔻治之消則參苓白米散
九苟血已散則必校毒內攻其可救乎

倒陷 第五十五

痘瘡初見一二日細小四五日漸大總見頂陷至六七日
脚漸濶頂愈平陷其色金白形如豆壳者名曰倒陷急宜
服人參歸耆湯五去桂加白芍連翹白芷香附有泄瀉者
止之便秘者通之又有為穢氣所觸而倒陷者加味四聖
散八若感冒風寒者用人參羌活散七或獨味麻黃湯四
或服白花蛇散百即時轉紅而無恙矣

內潰 此証必發於七日之前

心印蓋如此此對言
生靈何其慘毒
之十字

心印縱毒外出
無日之症

拈字彙取格切音
葉開也

心鑑曰內潰者胃爛也蓋因風寒所中膝理固密陰陽二
分壅塞不通其毒內攻而臟腑之間毒火炮熾則潰而成
膿口舌皆白是其驗也加此尅害生靈何其慘毒識者於
痘未出之時或有風寒阻隔氣粗熱甚身必戰動肚腹急
痛謹防此患以敗毒散一或升麻葛根湯五逐散寒邪開
泄膝理縱毒而出豈有是証也哉

頭溫足冷 第五十七

頭乃諸陽之會因毒氣上蒸故溫也足之六經屬水土木
足三陽者太陽膀胱水陽明胃經土少陽胆經木蓋水寒
足三陰者太陰脾經土少陰腎經水厥陰肝經木蓋水寒
則冰土寒則折木寒則枝葉枯落足冷者陽氣絕也故曰

前六十一葉東
諸証按要足冷
過膝者不治也

足冷過膝者不治然又有火鬱於上而足寒者清上則火
降而足自溫矣不可泥于前說而不治也

又曰痘瘡通身皆熱獨耳聾一處宜涼所以瘡疹之症頭
宜涼手足宜溫如手足宜溫而反冷者此脾胃虛弱也蓋
四肢者脾胃主之可用補中益氣湯去升麻柴胡加官
桂甚者加附子以治之如服此湯手足暖者吉厥冷不退
者死

瘵塌 第五十八

痘瘡瘵塌令人總歸之氣血虛寒殊不知亦有氣盛血熱
而瘵者須從形色及他症辨之如瘵色淡白精神虛怯小

赤水心印
考
瘵者心印作然者

氣血兼脾云心
印作此脾氣弱
而氣血均虛也
血味之活幼心法上
卷九章詳在
本文首書百

沖觸心印作衝
觸古冲衝通
其性者謂所觸之穢氣
字海以冲冲弄也

承執心印作煎
煎

傷赤全書

卷上

六

便利大便頻至夜痒甚者此氣血兼脾俱虛也參耆內托
散三音及四君子湯四音加黃耆肉苳蔻官桂白芷蟬退主之
甚則陳氏木香散佐之三音如瘡色紅紫煩燥大小便不利
渴欲飲湯水甚至抵破血流者此氣虛血熱毒盛血行氣
分血味臧醯螯皮肉而痒也四物加參耆丹皮連翹蟬
翹主血流者敗艸散三音蒼麥麵炒黃土摻之甚者以蜜水
調滑石末潤之又遍身痒甚抵破者不問前後皆服蟬花
散三音外以乳香或敗荷葉茵陳燒烟薰之若穢氣冲觸作
痒抵破者宜服內托散四音外以避穢散薰之然發痒精神
清爽自知其悞或言其痒欲人拊摸者吉若悶亂不寧搖

拊梅子曰斐古切音府拊猶也摸末各切音莫摸捺拊也

無亂言不聽禁不止者凶也

群玉曰痘瘡發痒如能食而大便堅結者此邪氣內實正
氣外虛也加味四聖解毒湯三音治之外用升麻蒼木麻黃
槐柳桑皮煎湯承熱拭之如泄瀉者此正氣內虛邪氣外
實也調元托裏湯治之三音外用乾山茵陳白艾二十味搗為
末子燃火薰之如用上一二法而痒即止者言痒不止而反
甚者凶也

心書曰痘瘡作痒者火邪傳於肌膚之間不能即出或血
左流行而為風寒外束故鬱滯而作痒與傷寒汗不出而
作痒相同法以荆芥穗束之以紙燃火刺痒痘之頂以散

火邪心印作鬱

火邪其痺即止驗之如神內服消風火化毒湯以解之
以上痺症痘瘡惡候也諸家治法甚驗故悉陳以備參
用

痛 第五十九

痘出而痛者治各不同初出時痛者發未盡也宜和解之
既出稠密而痛者毒盛血瘀也犀角消毒丸
加連翹牛子牡丹皮荆芥防風紅花主之若頭痛發熱惡
寒咳嗽者感冒也參蘇飲主之
三熱氣上攻痰壅頭痛者
二陳湯加石膏黃芩山梔荆芥薄荷主之身背痛者血
氣凝也羌活當歸湯或桃仁承氣湯主之或感冒作
目

痛者升麻葛根湯五加山查蟬退羌活主之木醫時痛甚
治之不愈者凶又曰六日以前多用發散六日以後多用
活血因乾滯而痛者水楊湯浴之

腰痛 第六十

腰主於腎而人以腰為屈伸乃一身大關節也血氣流通
則平氣滯血凝則痛腎實則壯腎虛則難屈伸故此証乃
痘之切患也初熱痛者以熱麻油按痛處揉之可任服敗
毒散一加
大黃或用桃仁承氣湯下之兼上體痛者注
之亦可羌活當歸湯如神湯皆治腰痛之良劑也若
腎虛而痛者用保元湯加杜仲黃柏知母龜板枸杞五

保元湯

如神湯

皆治腰痛之良劑也

味痘後治之不愈者凶。若兼胸高足冷。則腎敗毒深。必不可治。或初有腰痛服藥而止者。後用補劑內多加枸杞。

腹痛 第六十一

痘瘡腹痛者由毒氣滯于腸胃。當隨証調治。如痛而面青手足冷。此脾胃虛寒。宜益黃散。理中湯。痛而面赤。作渴。手足熱。此脾胃實熱。當妙應丸。保和丸。傷食而痛。不思乳食者。平胃散。加山查神曲。出不快而痛。煩燥啼叫者。芍藥防風湯。大便秘結而痛者。大黃化毒湯。裏表自利。腸鳴而痛者。理中湯。慢食生冷而痛者。理中湯。加陳皮砂仁。感冒風寒。身體戰動而痛者。升麻葛根湯。

醫家正傳論腹痛
門云此事難知集
曰傷寒中脫痛
者太陰也理中湯
黃芪建中湯之類
脾腹痛者少陰
也四物湯黃芪湯
附子湯之類小腹痛
痛厥陰也重則
正陽散回陽丹輕
則當歸四逆湯
之類

五腹痛發厥而痘不出者。蟬退去翅足為未。每服一錢白湯下。痛住則痘自出。腹痛熱毒在胃。時欲嘔吐者。黃連湯。
五虛痛不止。桂枝芍藥湯。臍以上痛屬太陰。當臍痛屬少陰。少腹痛屬厥陰。皆毒氣鬱遏之故。當平胃散。加升發解利。并利小便之藥。則毒上下分消。其毒自止矣。若氣粗身發戰動而痛。口臭唇舌白胎者。此為風寒阻隔陰陽壅塞不通。毒攻臟腑已成。內潰胃爛成膿。至惡之候也。

腹脹 第六十二

腹脹者毒氣聚於腸胃不能發出。或少發外而反內入也。甚者氣喘發厥。瘡無血色。或變紫黑。多致不救。治法當升

發解利使毒氣分消則脹自愈故曰痛隨利減脹以利消
 大便秘脾熱生脹者枳壳散七小便赤胃熱生脹者四聖
 散三亦有乳食停滯而腹脹者當於升發藥中加消導之
 劑若熱毒為冷所蓄不能發洩以致腹中虛鳴一使自利
 厥後手足冷而飲食不進者宜理中湯六以致毒氣倒陷
 而令人腹脹者則異攻散六主之若目閉神昏口氣臭盛
 則血氣已離治之亦無益矣

面目預腫 第六十三

痘出三四日之間面目先腫光亮者因血有不足虛陽動
 作其氣妄行肉分也一有此症則毒不能盡發七日後氣

不可為左傳成公
 十年殿西至曰疾
 不可發也在三日
 之上喜日之下攻
 之不可連攻不
 及道不至至馬不
 可為也

退毒陷不可為矣故曰難療面腫痘不腫急須大補氣血
 升發痘毒猶或可生

目睛露白 第六十四

人之下身必元氣固則精血為之凝象而瞻視為之有常
 若元氣虛損則衛氣受虧是以督脈縮促致睛上吊而露
 白也若謂之風則謬矣遇此証而無他証者可以保元湯
 加七陳黃米主之無覓失智不省人事者不治雖無他証
 而或見於七日之前則毒尚未解而氣血已離必不可治
 之症也

口舌

附毒瘡 痘出唇裂急用雄黃珠砂為末以膠
 第六十五 暗沙調擦即時結靨落之其痘起膿

陳

吹口丹 黃連 青黛
見茶斤略

唇口與五內相通故熱毒之發口舌必先受傷毒盛則唇
口與舌或紫或白或黑舌或腫大此皆實熱之症也用加
味犀角湯四八或解毒湯二八加牛子石膏生地木通荆芥或
涼膈散四〇以玉鎖匙三〇點之若氣粗熱盛舌白至唇濕處
者則胃爛矣乃不治之症也

口舌生瘡者以吹口丹三〇吹入即愈或赴筵散三〇亦可間
有毒攻牙根腐爛成海者此症殺人甚速急服甘露飲三〇
先以韭菜根老茶葉濃煎水用翎毛三〇刮去腐肉洗見鮮血
乃以擦牙散五〇敷之三次或牙疳方三〇亦可治 若爛
至喉中者用小竹管將藥吹入雖遍口牙齒爛落口唇穿

破者敷藥皆愈或用靈東散 尤效但鼻梁發紅點者不
治 又有黃白膿水者可治若色如乾醬其肉臭爛一
日爛一分二日爛一寸者名曰走馬疳世無可治之理

咽喉 第六十六

喉之在入司呼吸主升降乃下身之橐籥也毒氣不能發
舒遂至衝逆于此或卒然腫痛水漿難入言語不通死生
頃刻誠可驚駭首尾俱用利咽解毒湯三三又或燥裂或破
或咽澀或流涎其症多端治以退火為急用甘桔湯三七合
解毒湯三三加麥門冬牛蒡子玄參杏仁荆芥或甘桔湯三七
加玄參調水無比散三三解之又如聖散六三加薄荷枳殼腫

橐籥者
外之櫃所以受
氣者籥者內之
管所以鼓也
出於老子一俗言
フイゴ也

大者以玉鎖匙世百或一聖散全百點之咽乾或大便秘者四
順飲五下之若身涼無熱而喉痛者由毒氣鬱結故也其
桔湯七調大成散十二以開之東垣曰凡喉病最宜下利
此乃外症之最危者苟非急瀉其熱毒烏能活入於須臾
者哉

咳嗽痰喘 第六十七

痘症或外感寒邪則熱毒壅遏而不得發散故痰塞肺竅
而為咳嗽之症治法不過散邪清氣利痰而已參蘇飲三
主之甚則麻黃湯四加麻門冬石膏前胡杏仁桔梗瓜蔓
至干痰喘氣促而氣厥者氣為火毒所鬱也前後通用五

味子湯百有汗者葛根黃芩湯百大便秘實者前胡根壳
湯百君頭溫足冷腹脹脈微身涼渴瀉虛喘無痰証其危
矣蓋痘症賴氣以逐其毒而此症乃肺氣不清痘之深忌
也鑒者其可忽諸

痰涎 第六十八

人身之津液所以滋生精血者也毒氣閉塞而有碍於津
液津液不能流通故作痰涎正氣被塞於胸膈故為喘為
嗽而喉中作聲也治以二陳湯百加前胡枳壳桔梗瓜蔓
石膏麥門冬杏仁黃芩牛子

失音 第六十九此論在赤水

碍同礙妨也

痘後失音有之也

內瘡 心印作內

痘

心印作

管

作

馴

順也

心之氣舉擊於肺而為音肺清則音清肺熱則音啞此必
氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也然須分順逆為治如七
日之後失音者乃內瘡先熱而先醫則咽喉漸寬毒氣漸
消聲音自曉為順症也若七日之前失音者此毒氣薰蒸
失於調解致肺竅不通閉塞管竅毒無從泄內瘡糜爛舌
齧成坑咽門腐壞馴至呼吸俱廢為不治之症矣或有內
本無瘡因食辛熱之物或多服熱藥所致者急用甘桔湯
二百射于牛蒡湯二百加玄參連翹犀角治之或能言聲不清
者此火乘於肺也瀉白散三百加天花桔梗石膏片苓花苓
麥門陳皮山枝治之或感風寒閉塞而聲不清者參蘇飲

以上俱本草云心印加桑白皮杏仁石膏治之如法治之而效者吉否則凶

三加桑白杏仁石膏治之以上俱藥効者吉不効者凶矣

水噎 第七十

喉之竅若管簫然痘之初出細小不覺及肌表之痘成漿
則內痘亦成漿而其毒壅於會厭門然是門乃飲食所進
之處故飲湯水不易進納則溢入氣喉而發瘡也若穀食
有渣自能咽下非如水溢以犯氣道矣七日後見者不藥
而愈何也外痘醫而內自痊也若七日前見則為逆証由
熱毒壅塞不能盡行肌表故取治用甘桔湯二百合解毒湯
三百加牛子玄參荆芥麥門冬羌葷預以其桔湯二百清其氣
道安致有此患哉

水噎 痘疹經驗
方卷之下一世一葉
重表吧吐門食水
而噴出者謂之
噎水

心印無先此輩之
二字作若預

保赤金書

卷二

七十六

中風 第七十一

痘症熱則生風亦如中風之狀或手足腰項強急直視牽引口張舌強俱參蘇飲三消風散六百有痰用玄明粉若起脹後見此危殆之症也

驚搐 附癩癩癩等症 第七十二

素問云痘瘡出於心驚搐亦出於心夫痘毒本熱熱氣擊動心神不能制故神不安而發此症治宜瀉肝利小便瀉肝則風去利小便則熱除風熱既退則痘出而驚自愈矣故痘未出而見此証者則升麻湯五合消毒飲五主之或紫艸膏六或蟬酥丸七不可竟投涼劑蓋心一涼則氣

以下之論印
參考考之
瘋梅毒曰方戎切
考風頭風病
字海瘋腫

血隨斂毒無從出也痘既見而有此症由熱毒之未解取

四苓散七合消毒飲五或柴苓湯九或道赤散九若風火

相搏喉中痰鳴自睛上視面赤引飲喜居冷處者柴苓湯

五或抱龍丸四若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搐其

人必面黃潮熱大便酸臭秘泄不調或吐利腹痛宜紫霜

丸二下之大便秘者四順飲五痘後毒當盡解而又發驚

則心氣已絕神無所依必不可治

發癩癩者粉紅丸四治之

又痘發瘋手足麻木無汗者參附湯五若手足難動常出汗者芪附湯六卒然驚死不省人事者用皂角為末吹入

保赤全書

卷三

口口

鼻中即懸先輩曰先痘後發者都不治痘正發而有此証能
不為之可慎哉

又痘未出毒氣內逼自上攬驚叫如驚風者及痘欲出之
傾也誤認為驚而治之則毒氣內蓄邪熱不泄而反危矣

倦怠 第七十三

倦怠者神氣本弱為熱所蔽而精神不能舒暢然也不可
專以虛治宜清熱助氣為主少以休元湯四加陳皮茯苓
麥門冬施子黃芩白芍起脹後倦怠嗜卧而聲啞者喉舌
必有痔蝕須急視之緩則誤矣

煩燥 第七十四此論

心經有熱則煩燥蓋痘毒之熱擊動乎心火脾少津液不
能濟之此所以發為煩燥不寧悶亂在言等証也治當觀
其虛實何如痰實壯熱者施子仁湯七或解毒湯二或辰
砂益元散四便秘則通利之虛煩而渴者保元湯七加
麥門冬五味或麥門冬湯九夏月暑甚煩渴而痘出不快
者宜辰砂五苓散六醫後發熱煩渴者門冬飲子此症似
輕而重苟服藥而久不愈則心脾二經皆為熱毒所傷矣
煩則必渴渴則必瀉瀉則必咬牙寒戰而痒場之患立至
也慎之慎之

秘傳痘疹曰痘瘡以安靜為貴但有煩燥者必毒氣壅滯

折肱梅氏曰三折
肱謂歷病痛多
以喻入經麻事
變也

衰裏不寧宜審諱之如爬搔不停者瘡瘳也。不寧者裏熱也。呻吟者痛也。非折肱之效手安能識其病而藥之哉。

發渴 第七十五 以下至諸失血共

渴者胃中熱也。胃中津液為熱所耗故渴而飲水也。始終宜用白虎湯八加天花粉乾葛甘草有汗加入參或辰砂益元散四七小便不利者四苓散七九氣虛則保元湯七四加麥門冬五味至於陰虛火動而發渴者固為難治之症理辨則謂六味地黃丸加肉桂五味乃治虛渴之聖藥也。用此亦或有效。

痘疹心書曰毒氣萃于陽明此時多發渴熱淫于內而外

心印作宣通

不得宣故發渴也。宜服神功散九三服此猶渴者宜紅花子一味煎湯飲如無子即用紅花湯十一三加牛蒡子服之此藥神妙能散胃口之瘀血故也。切不可用荔枝黑棗椒姜等湯能助陽經之火也。

噯氣 第七十六

熱氣鬱於胃中欲發而不得發故噯氣治用半夏生姜湯五九加陳皮黃芩或四苓散七九加陳皮竹茹以利之。

不食 第七十七

痘瘡始終以脾胃為主若飲食如常者此臟腑充實脾胃本實不須服藥若不喜飲食者必須辨別而治之如泄瀉

萬氏曰痘瘡不
怕稠密只要能食

蘇林全書

卷上

七九

貫心印作灌

痘瘡灰白兼不食者此脾胃虛而元氣弱也宜四君子湯
或人參養胃湯七七七珍散八七治之如大便秘瘡掀腫不
食者此毒盛而血熱也宜四物湯七五加解毒藥熱甚者加
薑炒芩連便秘者下之

汗第七十八

汗乃心之液由熱氣內蒸腠理開泄故熱隨氣而出也故
自汗盜汗俱能虛入未發之時恐不能貫既貫恐不能
既覺惡血脫陽虛變為他証最宜調理自汗宜保元湯七四
加桂枝白芍浮小麥以斂之有熱加酒芩盜汗宜當歸六
黃湯七二或當歸湯八三丹溪曰自汗不妨益濕熱薰蒸而然

此言特為之字

珠心印作此特

汗少出者一言

心印若身冷之間

在汗大出之三

身冷之以下

惡寒蓋不

功散救之

細故

八門痢疾門出注如

肝不可治蓋症痢

黑如雞肝者

又曰濕如豆汁

也此言特為未甚者發耳若身冷惡寒而反汗者異攻散
救之 寒不已者死 汗綴如珠者死 汗而昏沉者
死 汗流煩渴者死 奚可以細故而忽之哉

諸失血 第七十九

舊云血熱則妄行蓋熱毒之氣淫佚無歸則血亦隨之而
走泄也始終用犀角地黃湯三加芩連梔子白芍但血之
妄行或吐或便或從陽瘡疔毒而出者悉皆不治何也吐
便者有傷于內也瀉膿血如死肝豆汁者胃爛也從瘡毒
而出者肉分空虛而元氣為之走泄也間有從鼻出者得
生蓋血載毒行傳注督脈斬關而出不犯其內故耳至

保赤全書

卷上

八

女人失血不止。尤當急治。嘗有一男子口鼻出血。數碗。以
韭菜汁半碗頓服而愈。

嘔吐 第八十

內經曰。諸嘔吐酸皆屬於火。河間曰。胃膈熱甚則為嘔。火
氣炎上之象也。故吐而有聲。有物者。謂之嘔。有物無聲者
謂之吐。有聲無物。謂之噦。皆熱毒壅塞胃口故也。又曰。吐
症有三。上焦吐者。從於氣。中焦吐者。從於積。下焦吐者。從
於寒。治之之法。須分寒熱虛實。如胃膈有痰。有熱。心煩作
渴。面赤。手足熱。一便赤澁者。熱吐也。二陳湯加炒梔子
姜炒黃連。生姜。有食積者。加枳實神麩。臉汗欲飲者。四苓

散九加木通麥門冬乾噦加姜汁炒黃連或竹葉石膏湯

九如不煩渴四肢厥冷一便自利者冷吐也平胃散十七加

藿香砂仁又加炒小茴香胃虛不能飲食者保元湯七四加

白朮砂仁藿香或藿香安胃散七虛嘔不止者和中湯七六

四君子湯五四加陳皮半夏竹茹兼心腹疴痛則丁香理中

湯二七或益黃散六七若飲食硬塞而嘔逆者此咽中有瘡必

然作痛閉塞而嘔也加味鼠粘子湯五三更用控涎散

三吹之

惡心乾嘔不定者此衝任虛火上衝犯於清道臟敗毒攻
最為惡候必用灯心竹葉湯五三加天花黃連瞿麥以利小

便若夏月則五苓散八九六一散四乾嘔之症以利小便為

至利而不通者危也
初熱惡心乃正氣與毒相搏升而逆上未須治而自愈切
不可用砂仁丁香燥脾之劑以致血不潤痘也

瀉利 第八十一

經云陽氣在下則生溼泄蓋積熱之氣不得上升注而為
下泄也又曰濕勝則濡泄又曰諸病水液澄徹清冷皆屬
於寒病式曰瀉白為寒青黃赤黑為熱瀉利而小便清白
不澁完穀不化身涼不渴脈遲而微者皆寒症也小便赤
澁穀肉消化身熱作渴脈洪而數者皆熱症也寒則虛用

理中湯五兼瀉加人參六去乾姜或豆蔻丸一以止之虛瀉

而痘陷者保元湯七加荳蔻丁香訶子熱則四苓散九加

木香或柴苓湯五九語言錯亂者辰砂五苓散九起脹貫膿

脈不宜久泄須急治之初出水靨時暫泄無妨

東垣曰凡大便自利即與升麻湯服之恐痘內陷以作罪

過故痘有泄瀉雖投訶子肉荳蔻以止瀉用白木茯苓以

滲濕健脾尚當多用升麻以升提痘毒出於皮毛之表若

吐瀉並作 第八十二

獨治泄瀉而致痘成倒塌是失本末之辨也

潔古云斑症若自吐瀉慎勿亂治而多吉謂毒氣從上下

而出也。然此亦自其症初言之耳。若久而不治，則中氣一虛而毒不能運出，而內攻之禍立至矣。此時須分寒熱而治之。如身熱、口渴、煩燥而吐瀉者，柴芩湯三九加砂仁、姜炒黃連、陳皮五。如身涼、口氣冷、虛弱而吐瀉者，和中湯七六加肉桂、生姜五。或藿香正氣散九六合五苓散六九加砂仁七一。王之甚者，豆蔻散一八以止其瀉，而吐自止矣。但出蛔者，

痢 第八十三

丹溪曰：痢赤屬血，白屬氣，白大腸來，此皆濕熱鬱於腸胃，致傷氣血而然也。痘症以氣血為主，而熱毒傷之，可乎。治之之法，紅用四物湯六五加炒芩、連、炙甘草、木香。

梅氏曰：大較、木略也。又曰：較、里也。

白用四君子湯五四加炒芩、連、木香、陳皮、炒滑石、紅白相兼者，合而治之。腹痛加當歸、砂仁。再加木香、芍藥。後重者，加炒滑石、枳殼、生芍藥、條芩。久而不愈者，紅加阿膠、硃砂、黑乾姜、白朮、白加黃耆、砂仁、炙乾姜、煨外感者，小柴胡湯四九加蒼朮、川芎、陳皮、芍藥、生姜，以發之。後重除者，加訶子、豆蔻，以止之。若大便膿血，下腸垢者，服阿膠、駐車丸五五。痘後下痢膿血，黃赤者，宜以薤白散五五或胃風湯五五治之。若兼小便赤澀，而煩渴者，宜服導赤散九五或犀角地黃湯三八。此治痢之太較也。

東垣曰：痘症下利，須用升麻提起正氣，使痘不致下利。

見此症當以保元湯七四加升麻以扶痘然後隨其赤白而加裁治之可也

咬牙寒戰 第八十四

夫痘有寒戰咬牙者或曰病熱而反覺似冷經云心火熱甚亢極而戰反兼水化制之寒戰咬牙者此為病熱也或又曰俱屬於寒如嚴冬之氣伏陽在內不勝其寒手足戰慄而齒自動也一家之說一偏於熱一偏於寒均之非通變之術也蓋痘瘡之証不外乎寒熱虛實而已故寒戰咬牙之症屬熱者固有之矣而寒者未必無也若執其熱而槩投以苦寒之劑熱者宜矣而寒者可乎屬寒者固有之

齊梅氏曰莊也疾也小補類會東也勇銳也猛也

矣而熱者未必無也若執其寒而槩投以辛溫之劑寒者宜矣而熱者可乎是故偏寒偏熱不免有實實虛虛之弊也然則治斯症而欲辨寒暑之分者如之何亦惟驗痘色之紅白二便之秘利脈息之遲數內外兼察而後寒熱始明施治無訛矣如痘色紅赤或紫黑齊勇掀發身熱煩燥惡熱作渴大便秘小便澀赤脈來洪數者此屬熱也故陽明胃熱則為咬牙太陰肺熱則為寒戰治宜四物湯五合黃連解毒湯五加連翹木通石膏麥門冬升麻大便秘者加瀉炒大黃以利之如痘色淡白或青色或皮薄頂陷身涼而靜惡寒不渴太便利小便清長脈來沉遲者此屬寒

保元湯

卷五

八

和藥字彙鄰
溪切音離里
黃色一日里色

也故胃血虛寒則為咬牙肺氣虛寒則為寒戰宜保元湯
七四加川芎當歸桂米炒黑色乾姜木香甚欬加附子或異
攻散泄瀉者加肉蔻以佐之以上二症見於七日之前者
其治易見於七日之後者其治難有獨咬者有獨
寒戰者以下治

二便 第八十五

凡治痘二便不可不通一或閉焉則腸胃壅塞脈絡凝滯
毒氣無從而洩由是眼閉聲啞肌肉腫黑不旋踵而告變
矣然大便之所由秘熱氣燥結於腸胃之間津液乾涸故
也或因汗多或利小便以致涸其津液亦令便秘治法凡
身熱者大柴胡湯八身不熱者通幽散六或四順飲五又

和藥

細故見於前十
辛表

多服紫艸飲亦可若煩渴手足心熱腋下汗者熱秘也
涼膈散四下之不食嘔清水面青腹不脹無裡急后重者
虛秘也潤腸湯三或用鮮猪脂一塊以白水煮熟切豆大
連汁服之以潤大腸再不通或蜜導法或口含真麻油
用竹筒灌入谷道須臾即通切不可妄投峻劑以致內虛
而毒入也小便赤澀者心移熱於小腸也宜涼藥以泄
其熱用八正散八或四苓散九導赤散九加滑石梔子仁
有血加瞿麥生地丹皮痘未出而有此症兼熱甚者恐將
發驚宜急解利之不可視為細故也痘已出而小便赤澀
者下焦失血也四物湯六加黃柏知母牛膝甘草王之東

和藥

和藥

和藥

垣曰。大便秘而小便利者。是津液行於小腸。但潤大腸可也。大便秘而小便不利。覺有裡急后重之勢。是津液還入胃中。大便必自利也。或汗出及小便利者。不可驟下。此表裡津液泄也。但用滋潤之藥。或蜜導法。

陰囊發腫 第八十六以下二條。與心印參考。

痘症而陰囊腫痛。如鰕皮者。乃膀胱熱甚。毒氣流入小腹。而然也。急宜清利退火。用滑石車前白朮木通牛膝瞿麥。搗子炙甘草加灯心十莖水煎服。或服紫艸飲子。小便不利者。加木通外以石燕子醋磨濃汁敷之。

痘後浮腫 第八十七

痘入門痘疹門
 輕甚一箇大黑痘
 頭面上忽生三五箇
 或一箇高火紫黑
 似釘痘者名曰
 飛痘有此痘出最
 難或此痘再出是知
 黑豆之生死輕重迥
 別深究之

痘靨之後。失於調理。或傷飲食。或感風濕。致傷脾土。土虛不能制水。水溢上行。故發而為腫也。因飲食傷者。宜健脾胃。利水。宜人參四苓散皮散。主之。因風濕傷者。宜以汗解。五皮湯。主之。一方用蘿蔔子壳蒲蘆煎湯洗之。即愈。

痘瘡乾燥 第八十八

初起時。肌膚乾燥者。乃腠理閉密。汗液阻滯也。宜乾葛升麻。麻黃之類發之。若痘已起脹。或將成就之時。瘡乾者。由血氣弱而熱太甚。故津液枯少也。宜黃芩犀角升麻連翹之類。以清之。并隨証以滋補氣血。

痘疥 第八十九

其痘紫黑枯梗。針撻不動。手搽有核者。為疥。若黑大而軟者。名曰黑痘。慎不可下。

根者之者字非
行
被挑者或用銀
簪白銀

痘疔治

痘疔者。害痘之禍苗也。若七日。至十二三日之間。痘瘡忽
然變動。灰白頂陷。即點灯照之。其間有紫黑脹硬。獨大而
無根者。即是也。痘中有此。則不能宣發諸毒。故爾變動。
速以銀針挑破。吸其血水。吐於水中。紅者可治。黑者難療。
治法。即用四聖膏百六或二聖散百七填入孔中。以滿為度。其
毒自散。則痘即紅活。貫漿矣。或謂飛過雄黃為末。用蟾酥
拌勻。為丸。如麻子大。挑疔點入。立效。又用巴豆一粒。去皮
膜。硃砂一分。研爛。點入。一時突出。即愈。服無比散十一。汲井
水。加猪尾血三五滴。調下。服後。或下物。如爛魚腸。葡萄穗

狀者愈。如紫黑惡血者。不治。

一方以神功散九加雄黃黃連黃芩大黃煎服。外以拔毒

膏十九點之。即愈。

一 小兒出痘。有疔數枚。挑破。出黑血。諸痘不起。皆以為不

治。以仙方活命散三十徐灌。一劑。外灸以神効隔蒜灸法。

疔解而諸痘即愈

心鑑曰。痘疔見於四肢。不近臟腑者。易治。至穿肋骨者。亦

難治。見於頭面腹背。逼近於內。其勢必攻穿臟腑矣。如未

穿者。須急治之。

一 醫後痘疔潰爛成坑。內見肋骨者。服人參敗毒散三十加

川山甲。蟬退。姜蚕。連翹。外用。趙氏敷藥方二百六

痘毒 第九十

痘毒發於肌膚而榮衛不能運行是以鬱熱不散輕則結為瘡癤重則頭項胸背手足肢節之間赤腫而成癰毒方未成膿宜鮮肌發表令其自散及其成膿則宜涼血解毒托裡使其自愈也但痘正發之時熱甚則升麻湯五加柴胡芎歸黃芩黃柏之類否則人參芎歸湯或以當歸活血湯五活血解毒并痘大發之若膿已成必須針破去膿外以膏藥貼之不刺則害傷筋骨不貼恐膿反內攻致生變症也 醫後發者先與升麻湯五合消毒飲五腫用荆防

大者者兒之大者也

敗毒飲二百或敗毒散一合消毒飲五或仙方活命飲七隨

上下加減不散則與活血解毒湯六東垣謂醫後發毒未

成膿者消毒飲五小柴胡湯四加羌活連翹金銀花黃芩

赤芍已成膿者消毒飲五加黃芩茯苓白芍當歸連翹上

用升麻引下用牛膝引

又未成膿者以必勝膏貼之已成膿者以生肌散敷之

又治癰毒用金銀花多荆芥牛子甘艸連翹水煎加雄黃

末大者五七分小兒三四分

眼目 第九十一

內經曰諸脉皆屬於目東垣曰目得血而能視五臟六腑

之精氣皆上注於目故陰陽合德而為精明也又丹溪曰
 目病屬風熱血少夫痘蘊非常之熱自裏而達外苟氣血
 弱而不能逐毒則火內鬱而血脉逆行斯痘毒入於目矣
 况熱毒生風肝應於木而目病由茲作焉是故有赤腫而
 痛不能開者洗肝散二百加消毒飲五有翳膜遮蔽而不能
 視者地黃散七或撥雲散九蜜蒙花散十有翳膜遮睛流
 淚羞明者老活菊花散六或龍胆草散八點用硼砂為末
 染黃膽血點入或謂點藥加輕粉研用極好若痘瘡入
 眼宜用克糞散百頻服兔糞丸百外用吹耳丹百
 古方有曰初覺痘症急取油胭脂用蜜調塗眼眶則痘不

入門痘疹門十五葉
 東八眼醫膜比白
 但宜活血解毒則五臟和而疼痛自止醫膜自去則不致凹凸損陷不宜點者毒氣自臟
 連外點藥攻逼反以為害但醫膜已成者只用生鮮魚刺血點入翳上更服免屎湯
 最妙云云求其下

入眼又謂初出之時即以牛旁子末蜜調敷顙門上或硼
 砂為末蜜調敷眼四傍又以白菜子為末水調敷足心引
 熱歸下皆免痘毒入眼夫痘能損人之明所係不小與其
 救藥於病目之時孰若預防之為愈哉
 又曰痘瘡入眼不在於初多在收靨之時或蒲面痘瘡破
 爛重復腫灌者膿血膠固毒蒸內攻於眼其班入眼又或
 痘出太盛成就遲緩鑿用辛熱之藥發之亦令班瘡入眼
 又於收靨之時喜啖辛熱謂之乾漿以致二火相扇亦能
 令班瘡入眼在白珠子不必治久當自去惟在黑輪上或
 掩腫人者急用望月砂散三五治之切不可輕用點洗之藥

勿韻之子集
因借為面虛
字或作每在
因每三者皆

推搯也折也
入門痘疹門
曰聲耳啞飲食
便推喉

反為大害如腫人損破反突出或陷下者皆不可治也
惡症不治歌訣 第九十二

初出頂陷連肉紅
又如血點帶紫色
發班黑者在朝夕
無膿痒塌期二日
痘根麻密如囚囚
紫泡刺出黑血死
難療面腫痘不腫
一便滑利下腸垢
過至九日下場空
班症死在六日中
班青頃刻去匆匆
不治腰疼及高胞
舌捲囊縮命當終
飲食挫喉証亦凶
青黑色陷痘無膿
更有吐瀉出蛔虫

頭温足冷渴飲水
氣促泄瀉吐不止
聲啞或因叫與哭
有腫氣急亦不治
氣滿咽喉嗽失音
身温腹脹多痰喘
難治痘瘡丁后白
賊痘灌膿醫不識
灰白痘中疔决有
此症莫勞虛用藥

痘先驚後藥無功
目閉無魂毒已攻
痘色不好也須終
如灌膿滿是傷風
咬牙時復戰無停
煩燥無寧命必傾
不思飲食困沉沉
誰知毒自內攻心
遲察筋骨去幽冥
醫家詳察要分明



