

霍亂治略
全

中武9
159



門中武
編 159
卷

元治紀元開鑄

榕堂尾臺先生著

霍亂治略

江都

玉山堂藏



敘

近歲吐瀉疾流行。人多橫折。醫者病家。眩惑其證。或以為痧病。或以為疫癘。或以為霍亂一種。眩揣目。各出異見。要之是丹者非素。好甘者忌辛。遂無定說矣。吾友尾臺



霍亂治略

霍亂六甲
士超以古方。鳴于世。頃著一書。論其方法。律之仲景。徵之周漢。斷以爲霍亂病。予致任之後。老懶日加。不爲人治病。故於此病情。伏委曲。茫焉無省。士超之言。未知果中窾否。然士超老師也。恒以此術。起死

回生。而又自信如此。乃其言固當。不誣矣。抑予亦有說。昔人謂霍亂之稱。取于揮霍撩亂之義。則此疾倏忽變幻。呼吸不遑。其名義適相符焉。嗚呼。世之扣盤扞燭。漫然無定識者。讀此書。可以自反而已。汗

青已畢。屬余點次。予喜其克用力。吾道老而益勉也。為書數言。以還之。元治元年甲子晚春。

拷窓喜多村直寛法



霍亂治略

尾臺逸士超著

霍亂ノ病タル初起或微發熱惡風寒スルアリ或氣分常ナラス或腹中少シク水氣ノ動揺スル心地ナトシ或自身是ト心付ホトノ一モ無キニトツト下利シ下後腹中緩ヤカニナリ反テ心地好ク覺ユル内ニ二三度モ下ルト忽カツカリト氣力ヌケ繼テ嘔吐ヲ發シ追吐利共ニ甚シクナリ瞬息ノ間ニ色衰へ眼クホミ鼻ヤセ肌肉瘦瘠ス其下利スル物多クハ米泔汁ノ如シ吐出ス物

八粘液稠涎ヲ交ヘ舌胎ハ恰モ牛舌ノ色ノ如ク
ニナリ煩躁悶亂衣被ヲ發揭シテ席ニ安ンセス
渴シテ冷水ヲ好ミ厥冷轉筋或脱汗出テ水藥共
ニ飲ムニ隨テ吐シ脉微細或沉伏シ苦楚萬狀一
時ヨリ二三時或五六時ニシテ死ス稍緩ナル者
モ一晝夜ニ過キス勢ノ迅速ナル者ハ一二下ニ
テ死ス又下利セス但吐ノミニテ直ニ斃ル、者
モ稀ニハアリ故ニ至急ノ症ハ鑿藥ニ及ハスシ
テ死スル者多シ時日ヲ延ク者ハ治療ヲ施ス暇
アルユヘ危險篤劇ノ症トイヘトモ救得ラル、

ナリ其死スル者ハ服藥ノ手オクレト鑿治ノ法
ヲ得サルナリ

初起ヨリ腹痛シ二三日或四五日モ日日三五行
ホトツ、下利スル者アリコレハ多ク大患ニ至
ラスシテ治ス腹痛セスシテ暴下スル者ハ皆篤
劇ニ至ルナリ其腹痛スル者ハ邪氣劇シカラス
正氣邪氣ヲ根排シ正邪相拒ムヲ以テ痛ヲ發ス
ルナリ痛ナクシテ暴下スル者ハ邪勢劇シクシ
テ正氣コレト相持スルノ能ハサルヲ以テナリ
譬ハ猶弱將ノ勅敵ニ遇ヒ一戰ニ及ハス敗走ス

霍亂論 卷中
ルカ如シ

初起寒熱腹痛ノ有無ニ拘ラス其機ヲ見ハ早ク
葛根加朮湯ヲ用ヒ唐蒼朮ヲ用ユ温覆シテ十分ニ發
汗サスヘシ十分ニ發汗スレハ嘔吐ヲ發セス發
スル氏甚シキニ至ラサル故ニ後ノ措置自由ニ
出来ルナリ此病ハ嘔吐ヲ發シテ藥ヲ納レサル
故ニ治法ヲ心ノ儘ニ施ス可能ハスシテ死スル
者多シ故ニ初起病人ト看護人トヲ叮嚀ニ喻シ
速ニ大發汗サスヘシ若己ニ嘔氣アル者ニハ葛
根加半夏湯ニ生薑ヲ倍シ發汗サスヘシ毒ノ甚

シカラサル者ハ始終葛根加朮湯ヲ用ヒ消息シ
テ快復スルナリ

發汗後下利止マス心下痞鞭腹痛小便不利シテ
熱飲ヲ好ム者ハ人溲湯下利甚シク四肢微冷或
惡寒スル者ハ人溲湯ニ附子ヲ加フ即附子理中湯ナリ大附子ハ功劣ル烏頭ヲ用ユヘシ諸方皆同
加ル者ハ桂枝人溲湯下利發熱口舌乾燥シテ渴
シ冷水ヲ好ミ或飲テ直ニ吐スル者ハ五苓散茯苓澤瀉湯等ヲ撰ミ冷服セシムヘシ嘔吐甚シク
シテ止サル者ハ先小半夏加茯苓湯生薑半夏湯

神關當臍中
天樞在挾臍旁
關元在臍下三寸

等ヲ冷服セシメ嘔吐ヲ止ムルヲ肝要トス嘔止
サレハ的當ノ主方ヲ用ヒ難キヲ以テ也若嘔吐
止マスシテ下利甚シク藥汁一切入ラサル者ハ
溫石ニテ腹部腰部ヲ溫メ神穴天樞關元等ニ數
數艾灸スヘシ炷ハ大ヲ佳トス腹裏溫マリテ胸
膈鬆開シ嘔氣止ム也又嘔甚シク心胸煩悶スル
者ニ虵ヲ挾ムアリ能其病情ヲ體認シテ烏梅圓
ヲ兼用トスヘシ下利甚シク嘔シテ腹中水鳴或
腹痛小便不利四肢冷或攣痛スル者ハ真武加半
夏湯即真武湯合方ナリ下利止マス厥冷煩躁四肢轉

筋腹拘急面青肉脫眼凹之聲嘶ル者ハ四逆湯
症ニ隨ヒ四逆加人蔘湯モ用ユヘシ直根人蔘ヲ
下利轉筋益甚シク厥冷臂膝ヲ過キ精神衰弱脫
汗珠ヲ綴リ脉微細若クハ沉伏シテ見ハレサル
者ハ通脉四逆湯前症心胸氣閉乾嘔シテ煩躁甚
シク或吃逆ヲ發スル者ハ通脉四逆加猪膽汁湯
ニ宜シ猪膽ナキ時ハ極上熊膽ヲ用ユヘシ此症多クハ死ス若下
利乾嘔共ニ止ミ厥冷煩躁轉筋白汗吃逆止マス
小便不利ノ者ハ茯苓四逆湯ニ宜シ此症亦多ク
ハ死ス然氏此方ニテ小便通利シ大便ノ色黄ヲ

帶ルニ至ル者ハ諸症漸ニ退キ回生スル者アリ
 吐下厥冷漸ニ減シ心胸煩熱ヲ發シ渴シテ冷水
 ヲ好ム者ハ石膏黃連甘草湯白虎加桂枝湯ヲ撰
 用スヘシ若心下痞塞スル者ハ白虎加人蔘湯ヲ
 用ユヘシ前症ニ乾嘔痰喘或吃逆ヲ加ル者ハ竹
 葉石膏湯ニ宜シ藥ヲ吐スル者ハ冷服スレハ納
 マルナリ諸方トモ皆然リ若胸腹鬱熱シテ吐渴
 共ニ甚シク煩躁スル者ハ冷水ヲ與ヒ消息スヘ
 シ煩躁穩ニナリ嘔吐能止ムナリ
 初起發熱シテ身體解惰腹痛或拘攣シテ微利ス

ル者アリ是ハ大患ニ至ラス桂枝加芍藥湯ヲ用
 ヒ溫覆シテ汗ヲ取ルヘシ腹中結實シテ痛ム者
 ハ桂枝加芍藥大黃湯ヲ用ユヘシ快通シテ反テ
 下利止ムナリ若寒熱作止シ胸滿嘔吐心下痞鞭
 腹中拘攣或腹痛シテ下利スル者ハ大柴胡湯ヲ
 用ユヘシ此病腹中凝結阻滯アル者ハ早ク疎利
 スヘシ腹中和シテ下利自止ムナリ譬ハ猶表症
 アル者葛根加半夏湯ニテ發汗シ嘔利共ニ止ム
 同一理ナリ總テ外症ト腹候脉狀トヲ審ニ診視
 シ陰陽表裏寒熱虛實ヲ締斷シタシカニ把捉據

證スル所アツテ方ヲ處スルニ非サレハ病ハ治
 セヌナリ傷寒論大陽上篇ノ末章ヲ見テ治法ノ
 條理ト機變ノ要妙ヲ悟ルヘシ
 嘔シテ心下痞鞭腹中雷鳴下利或血ヲ雜ヘ下ス
 者ハ半夏瀉心湯ヲ用ユヘシ嘔吐劇シキ者ハ生
 薑瀉心湯心煩安カラサル者ハ甘草瀉心湯渴シ
 テ嘔セス血便止マス冷水ヲ好ム者ハ白頭翁加
 甘草阿膠湯ヲ用ユヘシ此病ハ厲氣内淤相感動
 シテ發スルユヘ發汗ノ期ヲ失フ時ハ厲氣軀中
 ヲ擾亂シ其吐下スル者宿飲淤毒ノミナラス一

身ノ津液血精ヲ併セテ歐泄シ元氣翳時ニ衰脱
 シテ救ヒ難キニ至ルナリ鑿者病家深ク心ヲ用
 ヒ早ク治療スヘシ
 嘔吐下利ハ此病ノ常態ナリ能ク寒熱虛實ヲ審
 ニシテ甘草乾薑湯附子粳米湯吳茱萸湯黃連湯
 乾薑黃連黃芩人溲湯ナトモ撰用スヘシ嘔吐甚
 キ者ハ神冗天樞等ニ灸シ伏龍肝ノ煎汁ニテ藥
 ヲ煮テ冷シ用ユル寸ハ能ク納マルナリ或直ニ
 伏龍肝一味ノ煎汁ヲ冷ヤシ用ユルモヨシ
 物多シ味藥汁稍納マルニ至テハ適當ノ藥ヲ本
 味スヘシ

伏龍
肝

方トシ止嘔劑ハ兼用トスヘシ
 斑疹或疣瘡ヲ發スル者ハ葛根加石膏湯葛根加
 朮附湯桂麻各半湯大青龍湯ヲ撰用レテ斑毒ヲ
 十分ニ搽托シ内陷ヲ防クヘシ斑ノ形状大小一
 ナラス色ハ紅鮮ヲ吉トシ紫黒ヲ凶トス紫黒ノ
 者ハ尺澤委中ヨリ放血スヘシ斑ナキモ身體ノ
 血色黯紅ナル者青筋紅筋ヲ現ハス者多血肥胖
 ノ者皆放血スヘシ但多少斟酌ヲ要ス
 吐瀉後大熱煩躁譫語大渴舌乾黃黑心胸苦悶不
 能眠大便秘閉或泄利下重等ノ證ニ變スル者ハ

證ニ隨ヒ白虎湯大柴胡湯大柴胡加芒硝湯調胃
 承氣湯大小承氣湯ヲ撰用スヘシ病症ノ轉變ニ
 隨ヒ治法ヲ施ニ非サレハ起死回生ノ功ヲ成シ
 カタシ

平素酒肉ヲ好ム者或平素秘結スル者或病前數
 日大便秘結シ腹中停滯アル者或平日水麪果物
 ナト貪啜スル者或一時痛飲過食シ或傷食病中
 ニ厲氣ヲ感受スル者等ハ其腹症ニ隨テ備急紫
 圓瀉心湯調胃承氣湯大小承氣湯ヲ撰用シテ宿
 毒停滯ヲ逐除シ併セテ闖入ノ邪氣ヲ驅出スル

寸ハ下利自止ムナリ又水毒穢毒胸膈胃中ニ在
テ吐セント欲シテ吐スルヲ能ハサル者ハ瓜蒂
散ヲ用ユヘシ急劇ノ病ユヘ精細ニ心ヲ用ヒサ
レハ救ヒ得カタシ治療ノ際其因故ト見症トヲ
審ニシテ處方ヲ誤ルヲ勿レ

吐利全ク止ミ諸症隨テ退キ飲食ヲ欲スル氏粥
ノウハ湯ヲ少少宛與ヘ置キ元氣漸漸復スルニ
隨ヒ糜粥ヲ與フヘシ自身起居スルホトニ快復
スルトモ尚粥ヲ與フヘシ決シテ多食セシムヘ
カラスマシテ滋味並ニ化シ難キ者ヲ禁スヘシ

且風雨夜涼等心ヲ用テ防護スヘシ食復ト再感
ニテ死スル者少カラス

預防ノ仕方ハ飲食起居ヲ慎ムヨリ善ナルハナ
シ然トイヘ氏性質虚弱ノ人痲瘋水毒ナトアル
人ハ時候ノ冷熱ニ隨ヒ桂枝加苓朮湯桂枝加苓
朮附湯五苓散桂枝人蔘湯等ヲ服セシムヘシ平
日大便通シカタク心下ツカヘ腹中結實スル者
ハ瀉心湯桂枝加芍藥大黃湯當歸四逆加吳茱萸
生薑湯等ヲ用ユヘシ腹中ニ阻滯ナク胃氣四布
スレハ血液健運シテ邪氣ハ受ケサルナリ

平素飲食起居萬事行狀ヲ節慎スル者ハ軀内ニ
 淤毒生セス癥癖結ハス精神充盈シテ血液宣通
 スルユヘ六淫ニ侵侮セラレス無病息災ナリ平
 素不養生ニシテ我ニ病ムヘキ種子有ル寸ハ外
 淫感觸ノ速ナルヲ猶火ノ燥ニ就カ如シ假令此
 病ニ嬰ラサルモ終ニ他病ヲ免ル、一能ハスイ
 カニ外邪ヲ防護スルトモ固有ノ鬱毒終ニハ内
 ヨリ發動シ種種ノ病患ヲナス戒慎セサルヘケ
 ンヤ此病ノ中年人ニ多キハ男子ハ飲食房室ノ
 欲ヨリ過勞過逸風寒暑濕ヲ犯冒スル一多ク婦

人ハ胎産ト經水ノ多少閉滯等ノ一アルヲ以テ
 ナリ

寛延年中ノ流行病ト寛政戊午ノ秋京都邊流行
 セシコヅヘイ文政壬午ノ秋西國ヨリ大坂邊ニ
 行レシコロリノ類ハ目撃セサレ氏大同小異ノ
 證ナルヘシ余去々年戊午初冬ニ江戸ヲ發シ上
 野信濃ヲ歷テ越後新潟ニ至リ北陸諸國ヲ跋涉
 シニ丹但播ニ出テ大坂ヨリ京師ニ游ヒ東海道
 ヲ經歷シ翌年江戸ニ歸レリ諸國ニテ流行病ノ
 證狀ヲ委シク尋テ問フニ大同小異アルノミナ

ラス輕重モ亦齊シカラス越後ノ門人原正貞ハ
多ク刺絡ニテ効ヲ得タリト云フ彼地ノ病状ハ
所謂沙症ニ似タル者多キヲ以テナリ常陸ノ奥
田氏力論說スル所モ亦正貞力說ト略相似タリ
故ニ鑿療ハ一途ニ拘泥セス深慮諦察シテ證ニ
隨ヒ術ヲ施スヘシ

此病ハ兼テ冷熱濕邪ニ侵傷セララル、者宿水鬱
毒アル者血液淤滯精氣虧虛スル者等一時酷厲
ノ邪氣ニ感觸シテ發スルナリ故ニ尋常傷食ヨ
リ發スル霍亂ノ停滯ノ物ヲ吐下スレハ苦患脱

然ト解スル者ト同シカラス但飲食傷ヨリ發ス
ル霍亂モ暑濕冷氣等ノ感アリトイヘ氏畢竟傷
食ユヘ吐下スレハ治シ吐下セサレハ死ス流行
ノ霍亂病モ飲食停滯ヲ挾ミ發スルモアレ氏多
ク固有ノ鬱毒厲氣ニ感觸シテ發スル故ニ感受
甚シケレハ吐下甚シ吐下甚シケレハ精神隨テ
困憊シ遂ニ死ニ至ル是其別也酷厲ノ毒氣タル
トハ鳥獸マテモ病ミ死スルニテ想ヒ見ルヘシ
此病ハ葠附溫補ノ治ニ限ルト云フ者アリ畢竟
熱病ニハ葠連石膏等ニ非サレハ治セスト云フ

者アリ瀉下藥ニテ先ヲ代ツカ專一ナリト云フ者アリ刺絡力第一ト云フ者アリ灸ニシク者ナシト云フ者アリ是皆偏見ニシテ矜式スルニ足ラス凡病ニ一定ノ因由アルモ其病ムニ當テハ必シモ各各其症ヲ同セス且其症モ又變動シテ居ラス故ニ見ル所ノ症ニ隨ヒ見ヘサル所ノ奸ヲ察シ變ニ應シテ方ヲ處シ專ラ圓機活法ヲ以テ全功ヲ收ムヘシ若一概ノ見ヲ爲ス寸ハ其過少カラズ

此病余ハ初ヨリ病症ト病情トヲ考ヘ斷シテ霍亂トス世人疑フ者アルヘケレ氏此ハ古書ヲ探索セサルカ故ナリ後漢靈獻ノ世天下大疫數度流行セシ後漢書ニ見ユ張仲景傷寒雜病論ヲ著シ萬世不易ノ治法ヲ垂ル其書厥陰篇ニ次テ霍亂篇ヲ列シ脉症治法ヲ論述ス是此病ノ流行傳注スル一疫ト同シク其症少陰厥陰ニ疑似スルヲ以テ傷寒論ノ篇末ニ并ヘ論セシ一其意昭然トシテ明ラカ也其方法殘缺スト一ヘ氏三陰三陽ノ治法ト相照シ類ニ觸レ症ヲ諦ニシテ治ヲ爲ス寸ハ決シテ足ラサル一ナク又誤ル一ナ

伊澤信恬曰易說穀雨氣高
至不至則多霍亂
論衡四時篇云凡人所患
莫有傷臭之氣敗傷
人心故臭聞臭已食傷
心積口惡霍亂嘔吐

夏月字下暑時字脫
屬字下也字脫

シ霍亂ノ名又王充論衡春秋考異郵太平御覽二引前漢
書等ニモ見ユ考異郵ニ襄公朝于荆士卒度歲愁
悲失時。淫雨暑濕多霍亂之病。前漢書嚴助傳ニ夏
月。歐泄霍亂之病相隨屬スト是其流行傳染ノ病
タルヲ知ルヘシ患人死人ノ夥キニ非スハ史
家何ソコトナラニ此等ノ事ヲ記載スヘケンヤ
霍亂病年トシテ無キハナシ但多少アルノミ又
方隅ニヨリ絶テ無キ年モアリ本邦ニテモ去去
年戊午ノ夏秋ホト流行セシハ未聞ナル所ナ
リ故ニ古ニ無キト云フ説ヲ信スルモ宜ナリ總

テ感冒瘧痢傷寒痘麻風疹脚氣疫眼ノ類モ流行
甚シキ年ト甚シカラサル年ト頻年行ル、ト數
年ノ間絶テ行レサルト甚タ重キ年ト甚タ輕キ
年トアルカ如シ享和三年癸亥ノ麻疹流行ハ余
五歳ニテ自身ノ患状モ詳ニハ得記セス此時ハ
重症多ク死人夥シク幸ニ免レタル者モ眼病腫
瘍虛勞痢疾腸澼脚氣水氣等ニ變シ死セシ人多
シ誠ニ畏ルヘキトユヘ余成長ノ後祖考先考先
師ヨリ其治法消息等マテ備ナニ聞キ置ケリ然
ルニ文政甲申天保丙申ノ兩度ハ輕症ノミニテ

余カ嘗聞ク所トハ雲泥ノ違ニテ治療心易ク不治ノ者モ無カリキ又文政ノ始余カ先師ニ從學ノ時脚氣大ニ流行シ江戸ニテ十六七萬人モ死セリ其翌年モ夥シク死セリ夫ヨリ以後四十餘年ハ患人モ多カラス脚氣ノ流行スル者トハ人モ思ハヌトニハナリタリ總テ流行病ハ一般流行スル中ニ或一郷或一村更ニ一人モ病ナルトモアリ今其患ル者夥シク死スルト多キヲ見テ疑惑迷亂シ古今未嘗有ヲサルノ事ト思ヒ漢人ハ攪腸沙絞腸沙疔腸沙番痧觸惡虎狼病ナト、名

ツケ西洋人ハ膽液病冷徹疫ナト、稱シ邦人モ各家種種ノ名稱ヲ建テ療法治験ヲ著シ古來未發ノ論ノ如ク唱フレトモ畢竟此病ノ霍亂タルヲ知ラサレハ病ノ治シタルハ偶中ニ非サレハ病者ノ天幸ノミ藥石ノ能トハ云ヘケレ鑿ノ功ニハ非サルナリ傷食病ヲ以テ霍亂トセシハ千金方ヲ始トス其ヨリ後諸家逞ニ其說ニヨレリ傷寒論素問靈樞神農本經甲乙經名鑿別錄等ニハ傷食ニ係ケ論シタルハナシ肘后方病源候論等ハ專傷食病トハセス吳有可ハ雜氣ノ爲ス所

トス見解アリト云フヘシ香川太冲ハ千金ノ説ヲ信スルノ餘リ恨ラクハ其不直謂霍亂即傷食也惜哉ト云ヘリ故ニ行餘鑿言ニ傷食門ヲ立テ霍亂門ハ立ス偏見ト云ヘシ近者又英人合信氏カ内科新説ヲ閱スルニ亦以霍亂病トス余ハ張仲景ヲ奉崇シ西洋ノ鑿法ハ信仰セサレ氏今其説ノ余ト同ヲ以姑左ニ舉ケテ旁證トナス然氏合信氏カ論説モ疵瑕少ナカラス讀者宜シク取舍スヘシ曰霍亂俗名絞腸痧又名抽筋證一方之中同時傳染與痘證傳染相似忽然而來有時十死

七八有時十死四五傳染之故不盡可知大概風傳人傳人之衣服氣汗便溺所傳人傳尤多過風隔海猶能傳染受染之人大概虛弱人中年人尤多受染之時大概困倦時飢饑時瀉泄時尤多以地言之熱國尤多所以印度土耳其等國多過歐羅巴各國以節序言之暑月尤多所以長夏多過餘月其證不必年年皆有傳染輕重亦年年不同歐羅巴昔無此證數十年前自亞細亞傳來由東遞傳至西初次傳染時死者尤多漸退漸減其狀嘔吐瀉泄不止筋肉亂用或手足抽絞或腹內抽絞痛劇大不安夜晚尤多病在

肚腹大小腸初起多由於瀉。下暴注。上傾出。略如淘米之水。係曰多血流入腸胃。血中之水。吐瀉而出。所以血太濃。微絲血管。不易通行也。各處津液俱少。證見面白而瘦。眼凹喉乾。口中氣冷。皮冷脉細。或隱伏不見。冷汗無溺無尿。聲低不能語。或譫語。有忽然周身軟弱無精神而死者。有累肺喘促而死者。有累腦鈍滯譫語而死者。有脉細不見而死者。有吐瀉略止。內部生炎發熱而死者。有曰平素虛弱死者。有時瀉出水色如醬。係和大小腸中之血齊出。亦為危候。死時速或一時至三四時。遲或一日。更多夜發出。次早

死。愈候脉出吐瀉止。水色漸黃或漸綠。冷汗止。皮漸暖。小便及各處津液漸回。皆為欲愈之徵。過九時十時。勢漸減者。可愈。西醫剖割死人視之。腸胃中多白水。內皮白過平日而縐。似浸入水中之狀。迴管中之血滿而濃黑。大腸縮。小膀胱短縮。有時腦內黑血多。過平日。意者其源或由於血。但此證性質暴速之故。醫者尚未確知所。以治法亦無定論。此其全文ナリ。方藥ハ取ニ足ラサレハ省キテ茲ニ錄セズ。西洋法ヲ奉スル醫者西洋ニハ此病ノ定論良方預防藥等アレ氏漢土ニハ病論モ治法モナシ故ニ此

病ノ治療ハ吾黨ニ非レハ回復シカタシナト云
フ者アリト聞ク然ルニ其徒ノ巨擘ト稱スル者
此病ニカ、リ數月ヲ經テ漸ク復故セリ預防ノ
奇方アラハ何ソ此患ニ嬰リシヤ速効ノ良方ア
ラハ何ソ速ニ快復セスレテ長ク垂死ノ苦患ヲ
受ケシヤ怪ムヘシ又父ヲ救フヲ能ハス疝ニテ
死シタリト遁辭ヲ設ケシ者モアリ一家内六七
人死シ外聞ヲ憚リ夜夜潜ニ葬埋シタル者モア
リト聞ク當時有名ノ西洋家スラ此ノ如シ吠聲
耳學ノ徒ニ至リテハ固ヨリ以テ齒及スルニ足

ラス又川越ノ儒官保岡氏ノ話ニ同藩金子誠之
助ナル者去去年長崎留學中此病ニ罹リ直ニ治
療ヲ在館ノ蘭醫ニ托スルニ寸効ナクシテ死ス
同學ノ徒大ニ失望悔恨セリト云フ今合信氏カ
醫者尚未確知所以治法亦無定論ト云フヲ見テ
ハ西洋ニハ定説モ良法モナク人人目巧臆揣ヲ
以テ治ヲ爲スニ過キス此方ノ洋學者流ハ一二套
劑ノ外甘朮阿片麝香機奈鹽火酒薄荷油芥子泥
蜚吮發泡塗油浴湯等ノ施設ニ過キス
上ニ論スル所ノ治法ハ只其概略ニシテ固ヨリ

規則ト爲スニ足ラス僅ニ初學ノ階梯ニ供スル
ノミ學者三反シテ其精蘊ヲ極メシテ是余カ希
フ所ナリ凡病者ヲ療スルニ慈母ノ赤子ヲ保シ
シ老吏ノ冤獄ヲ斷スルカ如クニ心ヲ用ヒ病ノ
我カ身ニ在ルカ如クスル寸ハタトイ如何ナル
苛疾篤患ニ臨ムトモ病情病機明ラカニ見ヘ措
置ヲ誤ルヲナシ鑿小技トイヘ氏仁ノ術也故ニ
常ニ聖賢ノ書ヲ讀ミ仁義ノ道ヲ講明シ務テ名
利形迹ノ念ヲ去リ惻隱哀矜ノ心ヲ持スルニ非
スハ決シテ伎術造詣スルヲ能ハス是鑿學ノ

第一義也學者宜シク心ヲ茲ニ用ユヘシ東洞先
生有言曰鑿道之訣無善於守廉鑿道之害無大於
求利ト豈千古ノ確言ナラスヤ

應用方

葛根湯

葛根七分麻黃生薑大棗各五分桂枝芍藥甘草各三分
三釐五釐
右七味水一合八勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

葛根加半夏湯

葛根湯ノ方内ニ於テ半夏九分ヲ加フ

葛根加朮湯

葛根湯ノ方内ニ於テ朮四分ヲ加フ

葛根加朮附湯

葛根加朮湯ノ方内ニ於テ附子三分ヲ加ヘ微

火ニテ煮ル

葛根加石膏湯

葛根湯ノ方内ニ於テ石膏一匁二分ヲ加フ

桂麻各半湯

桂枝六分芍藥生薑甘草麻黄各四分杏仁五分大棗四分

右七味水一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

大青龍湯

麻黄九分桂枝甘草杏仁各三分生薑大棗各四分石

膏二分

右七味水一合八勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

桂枝加芍藥湯

桂枝大棗生薑各六分芍藥一分甘草四分

右五味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

桂枝加芍藥大黃湯

桂枝加芍藥湯ノ方内ニ於テ大黃四分ヲ加フ

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸桂枝芍藥細辛大棗各三分甘草通草各二分吳

茱萸分一生薑分八

右九味水一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

桂枝加茯苓朮湯

桂枝芍藥大棗生薑朮茯苓各五分甘草三分

右七味水一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

桂枝加茯苓朮附子湯

桂枝加茯苓朮湯ノ方内ニ於テ附子四分ヲ加

一微火ニテ煮ル

五苓散

澤瀉分九朮猪苓茯苓各六分桂枝四分

右五味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

茯苓澤瀉湯

茯苓一分澤瀉分六甘草三分朮四分桂枝三分生薑分六

右六味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

人蔘湯

人蔘甘草朮乾薑各七分

右四味水一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

人蔘加附子湯

人蔘湯ノ方内ニ於テ附子五分ヲ加一微火ニ

テ煮ル

桂枝人蔘湯

桂枝甘草各八分 人蔘乾薑各六分

右五味水一合八勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

小半夏加茯苓湯

半夏二分 生薑五分 茯苓八分

右三味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

生薑半夏湯

半夏三分 生薑汁四勺

右二味水一合二勺ヲ以テ半夏ヲ煮テ八勺ヲ

取り生薑汁ヲ内レ煮テ六勺ヲ取ル

甘草乾薑湯

甘草二分 乾薑一分

右二味水一合二勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

四逆湯

甘草二分 乾薑九分 附子六分

右三味水一合五勺ヲ以テ微火ニテ煮テ六勺

ヲ取ル

通脉四逆湯

甘草一分 附子九分 乾薑二分

右三味煮ルヲ四逆湯ノ如シ

四逆加人蔘湯

四逆湯ノ方内ニ於テ人蔘六分ヲ加フ

茯苓四逆湯

茯苓二分人蔘三分甘草六分乾薑四分附子三分

右五味水一合五勺ヲ以テ微火ニテ煮テ六勺

ヲ取ル

通脉四逆加猪膽汁湯

猪膽二分水ニテ解キ通脉四逆湯ノ煎汁ニ和

シ用ユ

真武加半夏湯

茯苓芍藥生薑各七分 朮五分 附子三分 半夏一分

右六味水一合六勺ヲ以テ微火ニテ煮テ六勺

ヲ取ル

吳茱萸湯

吳茱萸一分 人蔘一分 大棗六分 生薑二分

右四味水二合ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

乾薑黃連黃芩人蔘湯

乾薑黃連黃芩人蔘各七分

右四味水一合八勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

黃連湯

黃連甘草乾薑桂枝大棗各四分人蔘三分半夏九分

右七味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

半夏瀉心湯

半夏九分黃芩乾薑人蔘甘草大棗各四分黃連一分

五釐

右七味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯ノ方内ニ於テ甘草一分五釐ヲ加

フ六和木一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

生薑瀉心湯

大半夏瀉心湯ノ方内ニ於テ乾薑三分ヲ減シ生

薑六分ヲ加フ五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁黃連黃蘗秦皮各六分甘草阿膠各四分

右六味水一合六勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

白虎湯

知母九分石膏二分甘草三分粳米八分

右四味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

白虎加桂枝湯

白虎湯ノ方内ニ於テ桂枝四分五釐ヲ加フ

白虎加人蔘湯

白虎湯ノ方内ニ於テ人蔘三分ヲ加フ

竹葉石膏湯

竹葉四分石膏一分半夏一分人蔘四分甘草二分粳米一分

分九麥門冬一分

右七味水二合ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

石膏黃連甘草湯

石膏五分黃連一分甘草五分

右三味水一合五勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

大柴胡湯

柴胡八分黃芩芍藥大棗各三分半夏一分生薑五分枳實五分

分四大黃二分

右八味水二合四勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

大柴胡加芒硝湯

大柴胡湯ノ方内ニ於テ芒硝六分ヲ加フ

右九味水二合四勺ヲ以テ先八味ヲ煮テ六勺

ヲ取り滓ヲ去リ芒硝ヲ内レ消セシム

瀉心湯

大黃二分黃芩一分黃連一分各六分

右三味水一合八勺ヲ以テ煮テ六勺ヲ取ル

調胃承氣湯

大黄^{六分} 枳實^{各八分} 甘草

右三味水一合八勺ヲ以テ先ニ味ヲ煮テ六勺ヲ取り滓ヲ去リ芒硝ヲ内レ消セシム

小承氣湯

大黄^{二分} 厚朴^{九分} 枳實^{九分}

右三味水一合五勺ヲ煮テ六勺ヲ取ル

大承氣湯

大黄^{六分} 厚朴^{二分} 枳實^{七分} 芒硝^{九分}

右四味水三合ヲ以テ二味ヲ煮テ半ヲ減シ滓

ヲ去リ大黄ヲ内レ煮テ六勺ヲ取り滓ヲ去リ

芒硝ヲ内レ消セシム

瓜蒂散

瓜蒂^{各五分} 赤小豆^{各五分}

右二味散ト爲シ熱湯七勺ヲ以テ香豉二分四分ヲ煮テ稀粥ト作シ滓ヲ去リ散五分ヲ服ス吐セサレハ更ニ服ス

備急圓

大黄^{各二分} 巴豆^{各二分} 乾薑^{各二分}

右三味別ニ研リテ末ニシ蜜ニテ丸シ器中ニ

貯フ

紫圓

代赭石赤石脂各二分巴豆五分杏仁四分

右四味別ニ研リ末ニシ糊シテ丸ス

烏梅圓

烏梅三十個細辛附子桂枝人蔘黃蘗各三兩乾薑五兩

黃連八兩當歸蜀椒各二兩

右十味末ト爲シ蜜ニテ丸ト爲シ五分或一匁

白湯或薑湯ニテ送リ下ス

伏龍肝

伏龍肝三匁

右一味末ト爲シ水ニ合ヲ以テ煮テ一合五匁

ヲ取リ藥ヲ煮ルヘシ藥汁ヲ吐スル者ハ右ノ

煎汁ハカリ用ユヘシ

右諸方ノ分量ハ其大概ノ疾ノ輕重緩急ニ

隨ヒ空シク酌量スヘシ

霍亂ハ卒暴ノ疾ユヘ服藥手後レトナリテハ

悔ルトモ追カタク故ニ桂枝人蔘湯ヲ散藥ニ

製シ置キ診察ノ時即坐ニ一匁ヨリ二匁三匁

ホトモ白湯ニテ用ヒ湯藥ハ出来次第ニ用ユ

霍亂治略終

跋

霍亂之為病。卒暴迅劇。勢如風雷。故治療後期。施設錯法。則其死不迴踵。豈可不懼哉。斯書家翁為生徒。筆以代口舌之勞者。固非以當大方之觀也。然其言本古說。發踐

霍蕭治明
履之實。非懸斷臆說者。學者尋繹而施之於匕術。未必無裨益也。因強請襄梓。以貽同志之士。其用國字。欲讀者易通曉也。

元治元年甲子秋八月

喜多見深撰併書




尾臺良作著

元治元年甲子十一月

日本橋通二丁目

江戸書林 山城屋佐兵衛梓行



崔乱病名就御尋問予不学予忌編年予虽然以尋
 經文觀山味經第五觀佛心品文ナリ仙告阿難若有
 衆生殺父害母罵辱六親作是罪者乃至即便命終揮霍之間已
 如聖塗車顧瞻王女初生時見此形起所愛念後忽現苦相皆捉鐵斧斬截其身
 身下火起如旋火輪譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄次
 經墜獄相明氣絕命終生刀輪上如碎象立又氣絕命終
 如擲繩頃又氣絕命終如天電頃說非病名唯時間迅速
 ナルコト況然者揮霍之間イフモ時刻速ナル也揮霍者奮也振
 也動也散也指揮也又字彙揮霍熟語アリ貴命如ク霍
 擲ト通音也揮者手及覆スル也搖手云揮及手云擲所
 謂翻手為雲トイフ如ク時間急速イフノ思按揮霍之間
 トアルコト熟字ヨリテ後ニ病名トナリタル歟ト思相心ス六印度者熟
 國ニテ人熱ノ為酷烈サレテ手及覆ノ間ニ死スル者アルコトヲコノ
 熟語出ル死セアリフレタ居伸臂頃如欵未タ其原因ヲ不知字
 彙ニ云ク山在中大山在外圍繞之云霍トアリ山勢ニテ大畝ニ圍
 繞セラル時ハ手及覆之間ニ打ルト必セリ今亦全ク熟語多
 分ニテ命根持々難ト如是ヨリ霍乱ノ病名起歟