



孫真人備急千金要方卷之一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

論太醫背景第一

凡欲爲大醫必須詣素問甲乙黃帝鍼經明掌疣溼十二經脉  
三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河  
南范東陽張苗斯邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相  
法及火龜五兆用易本王並須精熟如此乃得爲大醫若不爾  
者如無晝夜遊動致顛頹必須熟讀此方尋思妙理留意研  
始可與言於醫道矣又須熟習前書何者若不讀五經不知  
有仁義之道不讀王史不知有古今之事不讀諸子觀事則不

武  
門  
卷

175  
又

篤信堂

孫真人備急千金要方卷之一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

論太醫習業第一

凡欲爲太醫必須諳素問甲乙黃帝鍼經明掌疣溼十二經脈三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗斬邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得爲太醫若不爾者如無宵夜遊動致顛頹次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵群書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子觀事則不

麻旨指唾及小汗子日  
三史記西漢書漢  
晉書

余文

元美集

能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任真體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七耀本文並須探頤若能具而學之則於醫道無所滯礙而盡善盡美者矣

論太醫精誠第二

張隱著養生篇

張隱曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脉榮衛之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沉弦緊之亂俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言於茲矣今以至精至微之事求之於至麤至淺之

思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而溫之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病可治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極醫源精勤不倦不得道聽塗說而言醫道已了深自誤哉凡太醫治病必當安神定志無欲無求先發太慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼妍媸怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不得瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼苦惱若已有之深心懷愴勿避嶮巇晝夜寒暑飢渴疲勞一心赴救無作工夫

形迹之心如此可爲蒼生大醫。反此則是舍靈臣賊。阜多賢治病多用。生命数以濟厄急。雖曰賤畜貴人。至於愛命人畜一也。捐彼益已。物情同患。況於人乎。夫殺生求生。去生更遠。吾今此方所以不用。生命数爲藥者。良由此也。其蟲蟲水蛭之屬。市有先死。者則市而用之。不在此例。只如雞卵一物。以其混沌未分。必有太段要急之處。不得已隱恋而用之。能不用者。斯爲大哲。亦所不及也。其有患瘡痍下痢。臭穢不可瞻視。人所惡見者。但發慚愧。悽憐。憂恤之意。不得起。一念帶芥之心。是吾之志也。夫太醫之體。欲得澄神內視。望之儼然。寬裕汪汪。不皎不昧。首病診疾。至意深心。詳察形候。纖毫勿失。處判鍼藥。無得差誤。雖曰病。

宜速救要。須臨事不惑。唯當審諦。覃思不得於性命之上。率爾自逞俊快。邀射名譽。甚不仁矣。又到病家。縱綺羅滿目。勿左右顧盼。絲竹奏耳。無得似有所娛。珍羞迭薦。食如無味。醞釀兼陳。肴肴若無所以爾者。夫一人向隅。滿堂不樂。而况病人苦楚。不離斯須。而醫者安然。懽娛傲然。自得茲乃人神之所共耻。至人之所不爲。斯蓋醫之本意也。夫爲醫之法。不得多語。調笑謔謔。譁譁道說。是非議論。人物銜耀。聲名虛毀。諸醫自矜己德。偶然治瘥一病。則昂頭戴面。而有自許之貌。謂天下無雙。此醫人之膏肓也。老君曰。人行陽德。人自報之。人行陰惡。鬼神害之。尋此二途。陰陽報施。豈誣也哉。所以醫人不得特已。所長專心經略。

財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能詎非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可耻言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以爲五臟經絡腑輸陰陽會通玄冥幽微變化難極易曰非天下之至贍其孰能與於此觀今之醫不心思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊習病問疾務在口給相對斯湏便處湯藥按守不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髮聾明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生

固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆相嫉害扁鵲爲秦太醫令李醯音希所害卽其事也丁醫處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷夫百病之本有中風傷寒寒熱溫瘡中惡霍亂太腹水腫腸澼下痢大小便不通竇豚上氣欬逆嘔吐薰疽消渴留飲癖食堅積癥痕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒折癰瘻痔瘻瘻瘻男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰餌蟲蛇蠱毒所傷此皆太略宗兆其間變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷飽房勞驚悸恐

懼憂恚慄惕。又有產乳落胎。墮下瘀血。又有貪餌五石以求房中之樂。此皆病之根源。爲患生諸枝葉也。不可不知其本末。但向醫說男女長幼之病。有半與病源相附會者。便可服藥也。男子者衆陽所歸。常居於燥。陽氣遊動。強力施泄。便成勞損。傷之病亦以衆矣。若比之女人。則十倍易治。凡女子十四已上。則有月事。月事來日。得風冷濕熱。四時之病。相協者。皆自說之。不爾。與治誤相觸動。更增困也。處方者。亦應問之。凡用藥。皆隨土地所宜。江南嶺表。其地暑濕。其人肌膚薄脆。腠理開疏。用藥輕省。關中河北。土地剛燥。其人皮膚堅硬。腠理閉塞。用藥重覆。世有少盛之人。不避風濕。觸犯禁忌。暴竭精液。雖得微疾。皆不可。

輕以利藥下之。一利大重。竭其精液。困滯着狀。動經年月也。凡長宿病。宜服利湯。不須盡劑。候利之足。則止。病源未除者。於後更合耳。稍有氣力。堪服。則不論也。病源須服利湯。取除者。服利湯後。宜將丸散。時時助之。凡病服利湯。得瘥者。此後慎不中服。補湯也。若得補湯。病勢還復。成也。更重瀉之。則其人重受弊也。若初瘥。氣力未甚平復者。但消息之。須服藥者。當以平藥。和之。夫常患之人。不妨行走。氣力未衰。欲將補益。冷熱隨宜。丸散者。可先服利湯。瀉除。胃腹中擁積。瘀實。然後可服補藥也。夫極虛勞。應服補湯者。不過二劑。即止。若治風病。應服治風湯者。皆非三五劑可知也。自有滯風。

卷一

洞虛節服十數劑乃至百餘日可瘥也故曰實節瀉之虛則補

四百四十八

此一條至玉函經例載  
云文字稍異篇次不  
同

夫二儀之内陰陽之中唯人最貴人者稟受天地中和之氣法  
律禮樂莫不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天  
足方象地眼目應日月五臟法五星六腑法六律以心爲中極  
太陽長一丈二尺以應十二時小腸長一丈四尺以應一千四  
氣身有三百六十五絡以應十二歲人有九竅以應九州天有寒  
暑人有虛實天有刑德人有愛憎天有陰陽人有男女月有大  
小人有長短所以服食五穀不能將節冷熱酸苦更相振觸共  
爲攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺

張觸也

王正子景曰三字血

元益

王居子驚作驚悸

王左作惡

名曰巧醫仲景曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通于  
二經脉辨三百六十五孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可  
不通古者上醫相色色脉與形不得相失黑者死赤者亦死乘  
青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶千驚木聞金聲怒  
畏相刑脾者土也生育萬物廻助四肢善者不見死則歸之太  
過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運  
轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相  
生審知臟腑之微此乃爲妙也

論診候第四

自此以下至保生平經  
文元後調作飲本經調  
理作飲立章正應江

凡調理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂

夫當將難全作命可得全萬晉叔命將難全作將保全  
自夫至未亂脉要精微論又自夫至逆順玉五經例載

九三卦九位移互

精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全  
夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未  
盛絡脈調均氣血未亂精取其脉知其逆順非其時不用也深  
察三部九候而明告之古之善爲醫者上醫醫國中醫醫人下  
醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脉又曰上醫醫未病  
之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病若不如心用意於事  
混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也上部爲天肺也中  
部爲人脾也下部爲地腎也何謂九候部各有三合爲九候上  
部天兩額動脈主頭角之氣也上部地兩頰動脈主口齒之氣  
也上部人耳前動脈主耳目之氣也中部天手太陰肺之氣也

中部地手陽明胃中之氣也中部人手少陰心之氣也下部天  
足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎之氣也下部人足太陰脾  
之氣也合爲九候夫形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大  
胃中多氣者死形氣相得者生參五不調者病三部九候皆相  
失者死愚醫不通三部九候及四時之經或用湯藥倒錯針灸  
失度順方治病更增他疾遂致滅亡哀哉烝民枉死者半可謂  
世無良醫爲其解釋經說地水火風和合成人凡人火氣不調  
舉身蒸熱風氣不調全身彊直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮  
腫氣滿喘粗土氣不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止  
則氣絕水竭則無血土散則身裂然愚醫不思脈道反治其病

右篇者九位元

愚医以下王五經例  
第八章  
玉函子下有云庚仲  
景日三字

王孟病一作二病

此則出王孟統例等  
佗中底經亦載三文  
稍異  
王衍作槁

王風作沉

玉液下有金人二字

使藏中五行共相尅劫如火熾燃重加其油不可不慎凡四氣合德四神安和工氣不調百病一生四神動作四百四病同時俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病雖治難愈一百一病真死不治

張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五臟六腑開通諸脈治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次第用散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不須汗而瘡汗之者出其津液枯竭而

死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而死又不須下而瘡下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與下之者使人人心內懊惱脹滿煩亂浮腫而死又不湧炎而瘡與灸者令人火邪入腹干錯五臟重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死

黃帝問曰淫邪泮衍柰何岐伯對曰止邪從外襲內而未有定舍反淫於藏不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人目不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於外不足於內氣淫於臟則有餘於內不足於外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉太水而忍懼陽盛則夢蹈大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺

王不禁上有便溺二字中底經作開陽  
皆陽冒洞泄不禁

此條溫邪瘡癰篇  
全文

元正及作及

元踏作陷

經一作二元同

元鉉作鑑是

靈忙作憂接內  
在及字下

元繫作贊

則夢見禮節拜跪客於胞贖。則夢見溲溺便利。凡此十五不足者。至而補之。立已。善診候者亦可。深思此意。乃盡善盡美矣。  
史記曰。病有六不治。驕恣不論於理。一不治也。輕身重財。二不治也。衣食不能適。三不治也。陰陽并。藏氣不定。四不治也。形羸不能服藥。五不治也。信巫不信醫。六不治也。生候尚存。形色未改。病未入。轉裏針藥及時。能將節調理委以良醫。病無不愈。  
論處方第五

夫療寒以熱藥。療熱以寒藥。飲食不消以吐下藥。鬼疰蟲毒以蟲毒藥。癰腫瘡瘤以瘡瘤藥。風濕以風濕藥。風勞氣冷各隨其所宜。雷公云。藥有舌品。病有二階。藥有甘苦輕重。不同病有新

論處方第五

毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮墜甚飽則夢亭巢源云其飢則夢行  
夢取夢耳肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢慾噏心氣盛則夢喜笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十上盛者至而寫之立已厥氣客於心則夢見丘山煙火客於肺則夢飛揚見金鐵之器等物客於肝則夢見山林樹木客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨淵沒居水中客於膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於太腸則夢見田野客於小腸則夢見聚邑街衢客於膽則夢見鬪訟自割客於陰器則夢交接鬪內客於項則夢見斬首安於跨則夢見行走而不能前進及池渠窪處中居客於股

註頭只以下八字無

火寒溫亦異。重熱膩滑鹹酢藥石飲食等於風雨爲治。餘病非對輕冷粗澀甘苦藥草飲食等於熱病爲治。餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病爲治。餘病非對其大綱略顯其源流自餘覩狀可知臨事制宜當識斯要。

藥對曰。夫衆病積聚皆起於虛。虛生百病。積者五臟之所積聚者六腑之所聚。如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端。宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚。早則藥勢未成晚則盛勢已歇。今之爲醫不自採藥且不委節氣。早晚只共採取用以爲藥又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無必愈之效。此實浮惑聊復審其

冷熱記其增損之主耳。

虛勞而苦頭痛復熱加枸杞姜雞虛而吐加人參虛而不安亦加入參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺肉蔻巴戟天虛而太熱加荳翠天門冬虛而多忘加茯苓遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石英沙參小草冷則用紫石英小草若客熱則用沙參龍齒不令不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸收加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白朮黃耆。

註類引其示性論黃老

羸弱者下神立歲考白

水赤皮者微寒治客

並序例作虛而損酒白

虛而冷用隴西黃耆虛而疼復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫脅虛而小腸不利加茯苓澤鴻虛而刺白加厚朴諸藥無有一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅入處方者宜準此

論用藥第六

本經名例之文

上藥一百二十種爲君王養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經  
中藥一百二十種爲臣王養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲避病補虛羸者本中經  
下藥一百二十五種爲佐使王治病以應地多毒不可久服欲

除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經  
三品合一百六十五種法三百六十五度每一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也

凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣二佐五使又可一君三臣九佐使也又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有本經和下有視字

法其相使相畏七情列之如左處方之日宜深而究之

玉石上部

玉泉 圓 款冬花

丹砂 圓 磁石 圓 鹽水

石膽水 英爲使 圓 牡桂 茵

桂 芫花 辛夷 白微

鐘乳 蝙牀子 菓絲子爲使 圓 牡丹 玄

朴消 圓 薑

芒消 石韋爲使 圓 薑 句薑

滑石 石韋爲使 圓 曾青

紫石英 長石爲使 圓 扁青 附子 不欲鮀申 黃連 来句薑

玉屑 圓 鹿角

曾青 圓 菓絲子

消石 火爲使 圓 苦參 苦

雲母 澤瀉爲使 圓 鮀魚 及

流水 圓 徐長卿

礬石 茅草爲使 圓 牡蠣

白石英 圓 馬自毒公

太一餘糧 杜仲爲使 圓 藏落

黃石脂 曾青爲使 圓 細辛

圓 蟲蠟 稦青 附子

黃連 蔡胡爲使 圓 黃石脂

圓 雷丸 蛇蛻皮

磁石 牡丹 菓草

凝水石 圓 地榆 圓 巴豆 毒

陽起石 桑螵蛸爲使 圓 菓絲子 圓 澤瀉 菓桂 雷丸 蛇蛻皮

石膏 雞子爲使 圓 菓草 毒公 圓 澤瀉 菓桂 雷丸 蛇蛻皮

玄石 愚松脂 柏子人蔴桂 圓 雷丸 蛇蛻皮

理石 滑石爲使 圓 麻黃

玉石下部

青琅玕 得水銀 良圓

雞骨 殷鷗 毒

舉石 得火良 棘針爲使 圓 虎掌 毒

八公 鸳屎 細辛 圓 水

註 雜七綱尾下百石

葵子

征類血扁青附子

无枝作脂又辛血

出征類序例

微作廢

卷一

卷一

卷一

四百十

特生譽石

得火良圓水

方解石

圓巴豆

代赭

圓天雄

大鹽

漏蘆爲使

草藥上部

六芝

薯蕷爲使得髮良園

天門冬

垣衣地黃爲使圓曾青

麥門冬

地黃車前爲使園款冬苦瓠圓苦參青襄

防風地榆爲使

女萎

圓鹹

乾地黃得麥門冬清酒良

葛蒲

秦艽秦皮爲使園地膽麻黃

澤瀉

圓海蛤文蛤

薯蕷

紫芝爲使園耳遂

遠志

附子毒蘂真珠蟬蠅藜蘆背蛤

菊花

木拘杞根桑根白

人參

茯苓爲使園凌疏反藜蘆

甘草

木乾漆苦參爲使園遠志園甘遂大戟芫花海藻

元本著作者著始本  
銅四十六馬刀下出

石斛 陸英爲使園凝水右  
巴豆 圓白 瘤蠶雷丸

牛膝

園熒火龜甲 陸英圓白前  
半夏爲使園草

獨活 藥實爲使

柴胡

圓英女苑藜蘆

細辛 曾青棗根爲使園狼毒山茱萸

桔梗子

圓乾薑苦參

龍膽 貫衆爲使園

菟絲子

圓得酒良薯蕷松

巴戟天 覆盆子爲使園

蒺藜子

圓乾薑苦參

防風 芫花爲使園附子毒

沙參

圓防已反藜蘆

絡石 杜仲牡丹爲使園

丹參

圓鹹水反藜蘆

天名精 埼不爲使

決明子

著實爲使園太麻子

黃連 黃芩龍骨理石爲使園

參白鮮皮圓數冬勝烏頭

巴豆毒

芎藭 白芷爲使

黃耆 圖龜甲

續斷 地黃爲使 圖雷丸  
杜若 得辛夷 細辛良

葛根 圖鼠姑 即鼠婦 别名元作元

飛廉 得烏頭良 元作惡

五味子 茄蓉爲使 圖桑葉

當歸 恩簡茹 圖菖

黃芩 實圓丹砂 及牡丹 蒼蘆

麻黃 厚朴爲使 圖辛夷 石葦

葛根 殺野葛巴豆 及百藥毒

元元 前胡

半夏爲使 圖皂莢 圖藜蘆

秦艽 菖蒲爲使

藁本 圖簡茹

乾薑 秦椒爲使 圖黃連 黃芩

天鼠薑 圖半夏 萍石毒

石韦 滑石 杏人爲使 得菖蒲良

狗脊 草薢爲使 圖敗醬

瞿麥 蓼草 牡丹爲使 圖桑螵蛸

石龍芮 大戟爲使 圖蛇

草薢 蔷薇皮 吳茱萸

仙靈脾 蕃蕷爲使

紫苑 圖辛夷

白鮮皮 圖桑螵蛸 桔梗

牡丹 圖菟絲子

防己 肉桂爲使 圖細辛 圖

白微 圖黃耆 太黃 大戟 乾薑

及乾漆 大棗 山茱萸

孟卿按乾膝恐乾

正心方作牽皮

欬冬花

杏仁爲使得紫菀良藥草消石玄參貝母辛夷麻黃黃芩黃連黃耆白芍相因

女蕊

圓齒鹹

地榆

得髮良園

麥門冬

海藻

因甘草延壽保和名分人

草藥下部

大黃

黃芩爲使

桔梗

節皮爲使因白芍龍膽龍眼

葛蘆

黃連爲使因細辛芍藥五參頭太黃

甘遂

瓜蒂爲使因遠志因甘草

澤漆

小豆爲使因薯蕷

鉤吻

半夏爲使因黃芩時考未可知何安

天雄

遠志爲使因腐婢

藜蘆

黃連爲使因細辛芍藥五參頭太黃

烏頭

莽草爲使因半夏括蔴

烏喙

貝母白芨白芨圓藜蘆

貫衆

蘿蔔爲使

虎掌

蜀漆爲使因莽草

附子

地膽爲使因蜈蚣圓防風甘草黃耆人參烏韭大豆

蜀漆

括蔴爲使因貫衆

恒山

圓平札

半夏

射干爲使因皂莢圓薤黃及生薑乾薑秦皮龜甲因烏頭蕪荑爲使因秦艽地榆

狼牙

蕪荑爲使因秦艽地榆

白斂

代赭爲使因烏頭

白芨

紫石英爲使因圓理石李核人杏核人

蘿蔔

甘草爲使因圓麥門冬

蘿蔔

圓鼠婦

夏枯草

土瓜爲使因圓垣衣

鬼臼

圓垣衣

木藥下部

茯苓  
茯苓  
神 馬齒爲使 圖 白斂圓 牡蒙及地榆雄黃秦艽  
馬齒爲使 圖 白斂圓 牡蒙及地榆雄黃秦艽  
元方作圖

柏子仁 甘蠟桂心瓜子爲使 圖 菊花羊蹄諸石麪麴

杜仲 圖 蛇蛻玄參

蔓荆子 圖 烏頭石膏

五加皮 遠志爲使 圖

蛇蛻玄參

辛夷 蒲苗黃連石膏黃環

酸棗仁 圖 防已

乾松 半夏爲使 圖 雞子

牡荆實 防風爲使 圖 石膏

黃蘖 圖 乾漆

厚朴 乾薑爲使 圖 澤瀉

及寒水石消石

吳茱萸 黃實爲使 圖 丹參消

石白芷圓紫石英

梔子 天雄景天爲使

木藥中部

山茱萸 莫實爲使 圖 桔梗防風防已

秦皮 大戟爲使 圖 吳茱萸

蜀椒 杏仁爲使 圖 款冬

黃環 蕤尾爲使 圖 茯苓防已

石南 五加皮爲使

秦椒 圖 桔梗防葵圓雌黃

桑根白皮 繢斷桂心麻子爲使

1木藥下部

黃環 蕤尾爲使 圖 茯苓防已

巴豆 荒花爲使 圖 蓼草圓大黃及黃連黎蘆圓斑蝥毒

蜀椒 杏仁爲使 圖 款冬

欒華 决明爲使 圖 葛根

皂莢 柏子爲使 圖 蒜門冬圓空青人參苦參

獸上部

龍骨 得人參牛黃良圓石膏

龍角 圆乾棗蜀椒理石

牛黃人參爲使 圓龍骨地黃及龍膽 蜂蠟 圓牛膝  
白膠得火良 圓太黃

阿膠得火良 圓太黃

犀角松脂爲使 圓蘿蔔雷丸 殺羊角菟絲子爲使

鹿茸麻勃爲使

鹿角杜仲爲使

麋脂圓木黃 圓耳草

蟲魚上部

蜜蠟圓光花齊蛤

蜂子圓黃芩芍藥牡蠣

牡蠣貝母爲使 得甘草牛膝遠志蛇牀

牡蠣良圓麻黃吳茱萸辛夷

蜥蜴圓硫黃斑貓蕪荑

海蛤蜀黍爲使 圓狗

桑螵蛸圓旋復花

海蛤膽草遂芫花

龜甲圓沙參蜚蠊

海蛤蜀黍爲使 圓狗

伏翼莫實雲實爲使

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

蜥蜴圓草芙蓉葛蒲

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

麝蟲圓草芙蓉葛蒲

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

鮀魚甲蜀黍爲使 圓狗

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

烏賊魚骨圓白斂白芨

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

天鼠糞圓白斂白芨

海蛤得酒良圓桔梗麥門冬

蟲魚下部

蛇蛻 圓磁石及酒  
斑貓 馬刀爲使 圓巴豆  
馬刀 得水良 圓膚青丹參空青 恩膚青  
即負刀本草經作蘆

蛇蛻 圓磁石及酒  
地膽 恩耳草  
蟾蜍 圓全角石膏  
大棗 圓烏頭毒  
杏仁 得火良 恩黃耆 黃芩 葛根 及解錫胡粉毒 圓莽草元光  
冬葵子 黃芩爲使

菜上部  
菜中部  
菜下部

葱實 圓藜蘆毒  
米上部  
麻蕡麻 圓牡蠣白薇 圓茯苓  
米中部  
大豆及黃卷 圓五參龍膽得前胡烏喙  
杏仁 牡蠣良 圓烏頭毒  
大麥 食蜜爲使

醬 圓藥毒火毒

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰 古人用藥至少 分兩亦輕 痘病極多 觀君處方非不煩重 分兩亦多 而痘病不及古人者何也 答曰 古者日月長遠 藥土中自養經久氣味真實百姓少欲熏氣中和感病輕微易為

外臺委作知元同  
外臺不得作不能得  
愈四字

外臺草石作草不

醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以爲醫  
病輕用藥須少病重用藥即多此則醫之一隅何足怪也又古  
之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土地所以治  
十得九今之醫者但以診脉處方不委採藥時節至於出處土  
地新陳虛實一皆不悉所以治十不得五六者寔由於此夫處  
方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自悞耳方來  
學者須詳而熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映徹色理鮮淨  
者爲佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈

六陳

論合和第七

王函統例十二章大小  
異教作合殺作減

玉函缺失上有秋石  
有軟硬消走七字

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟  
須精新也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何  
答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨  
之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福途之者殃  
或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令  
淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱  
君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自  
以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病

玉函則不作焉知草  
木好惡  
玉函使上有配半外  
量有善字

正泣利作妥

外塗脚上百下字

序例中下石火大  
外塗赤作以黃火大  
作大燒

研之

外塗不研作著水

水

更加鬪爭草石相反使入迷亂力甚乃劍若調和得所雖未能治病猶得安利五臟於病無所增劇例曰諸經方用藥所有繁鍊節度皆脚注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別注也

凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充角不得生秤

凡用石藥及下皆碎如米粒綿裹內湯酒中

凡鍾乳等諸石以王槌木研二十日三夜漂鍊務令極細

凡銀屑以水銀和成泥

凡譽石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入

藥使人破心肝

凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散碎硝朴硝皆絞湯訖內汎中

更上火兩沸熑盡乃服

凡湯中用丹砂雄黃者熟末如粉臨

外塗取作肢

取內湯中攢令調和服之

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打碎

山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之

旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之

凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀

凡諸果實人皆去尖及雙人者湯搗撻去皮仍切之用梔子者

去皮用蒲黃者湯成下

凡麥門冬生薑入湯皆切二擣二絞取汁湯成去滓下之煮五

六沸依如升數不可共藥煮之丁法薄切用

元正標作承  
外安下百伏字

外葉下有莫三字

序例斬作剉

凡來門冬皆微潤抽去心

凡麻黃去節先別煮兩三沸掠去沫更益水奴木數乃內餘藥  
不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前二分斬之  
膏中細剉也

凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以研槌極  
打令碎乃入臼不爾擣不熟入酒亦然

凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者  
秤之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆槌破去  
心紫菀洗去土曝乾乃秤之薤白葱白除青令盡葍草石南茵  
芋澤蘭剔取葉及嫩莖去木枝鬼臼黃連皆除根毛石韋辛夷

序例辛夷去心血

拭去毛辛夷又去心蜀椒去閉口者及目用大棗烏梅皆去核  
用鬼箭削取羽皮

凡從芩芍藥補藥湏白者瀉藥惟赤者

凡菟絲子暖湯淘汰去沙土乾灑暖酒漬經一宿灑出曝微白  
擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之湏更悉  
盡極易碎

凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳實  
去穰藜蘆去頭皂莢去皮子

凡用椒實微熬令汗出則有發力

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆燒灰炮令微搗剉去

序例辛夷去心血  
於鏡中

正泣若作中

序例 潛灰作皆現  
黑燥乃存之

黑皮乃秤之。惟姜附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤之。真理  
破作七八片。

凡半夏熱湯洗去上滑。一云十洗四破乃秤之以入湯。若膏酒  
丸散皆燒灰炮之。

凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃仁杏仁夢蓮胡麻諸有脂膏藥  
皆熬黃黑別擣令如膏指摸視泥泥爾。乃以向咸散稍稍下白  
中合研擣令消散乃復都以輕絹築之湏盡又內臼中依法擣  
數百杵也。湯膏中雖有生用者並擣破。

凡用麥蘖麴末太古黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾櫟炒令煙斷用  
烏梅入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸藥擣令細散不

正類卷下有別持  
二字

須節者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鱉鯀鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆  
炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑蝥等諸蟲皆去翅足微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣熬  
令黃名殼蠶蜂房微炒之

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯中  
攬令調和服之

凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可擣。有不沸處更炙之斷  
下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火  
兩三沸令烊

棕疑錄

泥、毛待值滅巴令  
摩滑利只至方  
証類從徒作節

序例不以下有其不  
宜陽酒直入湯更  
今亦條於後矣十六  
字

凡用蜜先火煎掠去沫令色微黃則九經久不壞掠之多少隨  
蜜精粗遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用蠟炮枝少蜜中攪調以和藥

凡湯中用鶴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物  
兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違之其不宜湯酒者

列之如左

朱砂 熟入酒元正陽正銀同

雲母

陽起石 入酒

礬石 入酒

硫黃 入酒

鍾乳 入酒

孔公孽 入酒

譽石 入酒

白堊

銅鏡鼻

胡粉

鉛丹

鹵鹹 入酒

石灰 入酒

藜灰

野葛

狼毒

毒公

鬼臼

莽草

蒴藋

巴豆

躑躅 入酒

皂莢

蘚菌

藜蘆

雷丸

狼牙

貫眾

蕪荑

巴豆

蕘蕘

狼牙

鳶尾

蒺藜

文苑

白芨

紫葳

薇銜

白芨

牡蒙

飛廉

蛇銜

占斯

辛夷

右石類一十七種

花枝子下元有入酒二字

- 石南入酒 棱實 虎杖入酒單漬 虎掌  
蓄根 羊桃入酒 麻勃 苦瓠  
瓜蒂 陟釐 狼跋子入酒 雲實  
槐子入酒 地膚子 蛇牀子酒 青葙子  
茺蔚子 王不留行 药莢子 菟絲子

右草木之類四十八種

- 蜂子 蜜蠟 白馬莖 狗陰  
雀卯 雞子 雄鵠 伏異  
鼠婦 檉雞 萤火 蟬喻醫舊作醫元作蟬  
殼蟲 蠕蚣 蜥蜴 斑猫

- 荒青 亭長 蛇膽 蟲蟲  
蜚蠊 蟬蛻 馬刀 赭魁  
蝦蟆 蝶皮 生鼠 生龜入酒  
蝎牛 諸鳥獸入酒

蟲魚膏骨髓膽血屎溺

右蟲獸之類二十九種

古釋惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之稱也吳人以一兩為一兩隋人以二兩為一兩今依四分為一兩稱為定方案凡二等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉

序例作十夕為合

分兩同等耳。凡丸散云若干分兩者，是品諸藥宜多宜少之分兩，非必止於若干之分兩也。假令日服三方寸匕，須差止是三分五兩藥耳。凡散藥有云刀圭者，十分方寸匕之。一準文梧桐子大也，方寸匕者，作七正方一寸抄散取不落為度。錢七者以太錢上全抄之。若云半錢七者，則是一錢抄取一邊爾。並用五銖撮者四刀圭也。十撮為一勺，兩勺為一合。以藥升方作上徑一寸下，徑六分深八分內散藥勿按抑之。正爾微動，令平調耳。今人分藥，不復用此。

明豆豌豆也

刷跡十上有四字外無同

凡丸藥有云如細麻大者，即胡麻也。不必扁扁，但令較畧，大小相稱爾。如黍粟者亦然。以十六黍為一大豆也。如麻子者，即今太麻子，準三細麻也。如胡豆者，今青斑豆也。以二太麻子準之。如小豆者，今赤小豆也。粒有大小，以三太麻子準之。如大豆者，以二小豆準之。如梧桐子者，以二大豆準之。一方寸匕散以蜜和得，如梧桐子十九為定。如彈丸及雞子黃者，以十梧桐子準之。

凡方云已去若干枚者，粒有大小，當先去皮乃秤之。以一分準十六枚附子，烏頭若干枚者，去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者，去穰畢以一分準一枚橘皮。一分者準三枚，棗有大小。

熊蕡

元世分者之方稿作枝

于金方

卷一

三十五

元末早云七字為細注外  
臺正元乃是

外量有下有不二字

以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩為正本草云兩為正  
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正板一升三兩為正吳茱  
萸一升五兩為正菟絲子一升九兩為正華闌子一升四兩為  
正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同  
也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平  
升為正

凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重三兩  
為正云某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正

凡云蜜一斤者有合猪膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去  
正作搗

細末此於事殊不為當藥有易碎難碎多末少柴秤兩則不得  
均平今昔細切之較略令如咬咀者乃得無末而片粒調和也  
凡云末之者謂搗篩如法也

凡丸散先細切曝燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言  
其潤濕藥如天門冬、乾地黃、黃芩皆先切曝乾獨搗令偏碎更出  
細薑曝乾若值陰雨可微火烘之既燥小停令乃搗之凡濕藥  
燥皆大耗當先增分兩頭得骨乃秤之為正其湯酒中不須如此

凡節充藥用重密絹合細於蜜丸即易熟若節散草藥用輕疎  
絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹節合如丸藥者

凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳。

凡煮湯當取井花水極令淨潔升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法。

凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者爲病須快利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者爲病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尽木絞之澄去渣滓分再服三服者第二第三服以紙覆金器勿令洩氣欲服以銅器

於熱湯上暖之勿令器中有水氣  
凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也津可曝燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯津合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也

凡膏先以苦酒漬令淹浹不用多升密覆勿洩云時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿煮膏當三下以洩其熱勢令藥味得出上之便匣匣拂乃下之取沸靜良久乃止寧欲小生其中有薤白者以兩頭微熬黃爲候有白芷附子者亦合

卷一  
小黃色爲度。猪肪皆勿令經火。臘月者。彌佳。絞膏亦以新布絞之。若是可服之膏。膏滓亦堪酒煮飲之。可摩之膏。膏滓則宜以佛病上此。蓋欲兼盡其藥力故也。

凡膏中有雄黃硃砂輩皆別擣細研如麯湏經膏畢乃投中以  
物疾攬至干凝僵勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中  
研令消散胡粉亦爾

凡擣藥法燒香洒掃淨潔不得雜語喧嘩當使童子擣之務令  
細熟杵數可至千萬杵過多爲佳

論眼餌第八

雞犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人擣合非止諸不如法至於石斛菟絲子等難擣之藥費人功力貲作擣者隱主悉盜棄之又爲塵埃穢氣入藥中羅飾粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻覬之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復眼餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂謗醫者處方不效夫如此者非醫之咎自緣發意甚誤宜熟思之

### 論服餌第八

此一例本經各例文  
序例系粟作栗麦

服藥而後食。病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜飽滿而在夜。

凡服丸散，不云酒水飲者，本方如此，是可通用也。

凡服利湯，欲得侵早，凡服湯，欲得稍熱，服之即易消下，不吐。若冷則吐嘔不下。若太熱則破人咽喉，務在用意。湯必湏，澄清若濁，令人心悶不解。中間相去如步行十里，久再服。若太促數前湯未消，後湯來衝，必當吐逆。仍問病者，腹中藥消散，乃可進服。凡服湯法，大約皆分爲三服。取三升，然後乘病人穀氣彊，進一服，最湏多次。一服漸少，後一服最湏少。如此即甚安穩，所以病人於後氣力漸微，故湯湏漸少。凡服補湯，欲得服二升半，晝三。

夜一中間間食，則湯氣澣灌，百脉易得藥力。凡服湯不得太緩，太急也。又湏左右仰覆，卧各一食頃，即湯熱徧行，腹中又於室中行，皆可一百步許。一日勿出外，即大益。凡服湯，三日常忌酒。緣湯忌酒故也。凡服治風湯，第一服厚覆，取汗，若得汗，即湏薄，覆勿令大汗。中間亦湏間食，不爾，令人無勞更益虛羸。凡丸藥，皆如梧桐子大。補者，十九為始，從一服漸加，不過四十九過，亦損入云。一日三度服，欲得引日多時，不闕藥氣，漸漬熏蒸。五臟積火為佳，不必頓服。早盡爲善，徒棄名藥，獲益甚少。凡人四十已上，有病可服瀉藥，不甚湏服補藥。必若有所損，不在此限。四十已上，則不可服瀉藥。湏服補藥，五十已上，四時勿闕。

元加減作量度

補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中  
素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大略也  
凡有臟腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補  
即補以意加減而用之

凡服痔漏瘻瘍等藥皆慎猪雞魚油等味至老

凡服瀉藥不過以利爲度慎勿過多令人下利無度大損人也  
凡諸惡瘡瘍後背百日慎口味不爾而瘡即發也

凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絕絕則不得藥力多必皆  
以知爲度不可以令至醉及吐則大損入也

凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬雞魚油麪蒜及菓實等其大補丸

此條序例

元血而卒瘡即倒

序例作百空言朱秋  
勿食生血物有云內火  
勿食鰐魚云例故立

元葫上有生

元桂心二字血

元正蕙作善

散切忌陳臭宿滯之物有空青已食生血物天門冬忌鯉魚白  
木忌桃李及雀肉胡荽太蒜青魚鮓等物地黃忌蕷夷甘草忌  
菘菜海藻細辛忌生菜菟絲子忌兔肉牛膝忌牛肉黃連桔梗  
忌豬肉牡丹忌葫蘆藜蘆忌狸肉半夏菖蒲忌飴糖及羊肉恒  
山桂心忌生葱生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物柏子仁忌濕麪  
巴豆忌薑筍姜及猪肉鱉甲忌莧菜

凡服藥忌見死尸及產婦穢污觸之兼及忿怒憂勞  
凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟孰即易消與藥相宜若生則  
難消復損藥力仍須少食菜及硬物於藥為佳亦少進鹽醋乃  
善亦不得苦心用力及房室喜怒是以治病用藥力惟在食治

元亨下百節復

將息得力太半於藥有益所以病者務在將息節慎之至可以長生豈惟愈病而已

一饭作飲

凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一口冷醋飯湏更乃進食為佳

凡人忽遇風發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及西洲續命排風越婢等湯於無風處密室之中日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出不絕為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦少與羊肉臘脷補若風大重者相續五日五夜服湯不絕即經二日停湯以羨臘自補將息四體若小瘥即當停藥漸漸將息如其不瘥當服湯攻

元亨下百

之以瘥為度

凡患風服湯非得太汗其風不去所以諸風方中皆有麻黃至如西洲續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣

凡人五十以上大虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一二升暖飲終身勿絕及一時勿食蒜油魚猪牛馬雞鵝鴨等肉即無病矣

論藥藏第九

三石即三生散見卷之六十更生散見卷之三十

用心所以神農鳩集百藥皇帝纂錄針經皆備預之常道也。且人病瘵多起食卒不與人期一朝嬰已。豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所謂起心雖微所救惟廣見諸世祿之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不見養身者有蓄人藥一錙銖以此類之極可愧矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問焉此言妄用哉至妄人或有公私使命行邁邊隅地既不毛藥物焉出勿逢瘴癘素不資貯無以救療遂拱手待斃以致夭歿者斯爲自致豈是枉橫何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云爾。

石藥灰土藥水藥根藥莖藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五

果五藥諸獸齒牙骨角蹄甲皮毛尿屎等藥酥髓乳酪醍醐石蜜沙糖飴糖酒醋膠麴蘖豉等藥

右件藥依時收採以貯藏之蟲豸之藥不收採也

秤斗升合鐵臼木臼絹羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌瓷鉢大

小銅鎚鎗金銅鐵匙等

右合藥所湏極當預備

凡藥皆不欲數數曬曝多見風日氣力即薄歇宜熟知之諸藥未卽用者候天大晴時於烈日中曝令大乾以新瓦器貯之泥頭密封湏用開取即急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓦器貯密封之勿令泄氣則三十年不壞諸亦

元仁作人

仁及子等藥在器貯之則鼠不能得之也。凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也。

孫真人備急千金要方卷之一寃政八年丙辰秋八月大戶孟通



