



篤信堂



孫真人備急千金要方卷之四

婦人方

虛損第一

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其  
 在於斯勿以產時無他為縱心恣意無所不犯犯時微者秋毫  
 感病廣於萬倍何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五臟  
 虛弱惟得將補不可轉瀉若其有病不須驟察若行驟藥轉更  
 增虛就中更虛向生路遠所以產後百日以來極須慈救憂畏  
 勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身支重宜加用功冬  
 張名曰產風則是其犯候也若有角才命同轉弱凡百女人



篤信堂

試  
第 177  
卷 4

篤信堂



孫真人備急千金要方卷之四

婦人方

虛損第一

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其  
在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫  
感病廣於高山何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五臟  
虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須駛藥若行駛藥轉更  
增虛就中更虛向生路遠所以產後百病以來極須慙歎憂畏  
勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反  
張名曰蓐風則是其犯候也若有角弓命同轉燭凡百女人宜

元產上者婦人



篤信堂

元在作有

元多作得

元正可作得

正此作洗

元月高倒

元君以三劑凡見補益

好思之苟或在微不慎戲笑作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱多醫家太命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不可同於常方耳特忌上廁便利宜室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之

凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也

凡產後七日内惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯

有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至月滿

丸盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石

澤蘭丸凡在葶必須服澤蘭丸補之服法必七白外不得早服

外室內作終元將常

傷寒命各三四因方

也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄

至於老百方治不能瘳桃仁煎主之出葶後服之婦人縱令無

病每至秋冬須服一兩劑以至年內將常服之佳

四順理中圓已產訖可服此方

甘草

人參

白朮

乾薑各一兩

右四味為末蜜和丸如梧子服十九稍增至二十九新坐藏

虛此所以養臟氣也

桃仁煎治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃仁一千二百枚擣令細熟以上好酒一斗五升研慮三

月令廣多曰一伏時一  
周時也又一周日也枕  
言一後時也時伏即  
後外是或作一後時

四遍如作麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶中密塞以麩  
封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出  
在湯上無令沉沒熟訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可  
服之

外作胎胎共病

石斛地黃煎治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方

石斛子補解所 甘草 紫苑各四兩 桃仁半升 桂心二兩

大黃兩八 麥門冬升三 茯苓升一 生地黄汁

淳酒各八升 一方用人參三兩

右十味為末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得一斗  
次內餘三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生

于玉聖云九黃

引翼方後下有沃病羸  
瘦四字  
三合錄驗斗作升

竹攪無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不  
知稍加至一九

地黃羊脂煎治婦人產後欲合肥白飲食平調方

生地黄汁升一 生薑汁升三 白蜜各五升 羊脂二斤

右四味先煎地黃令得五升次內羊脂令煎減半內薑汁復

煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大一枚投熱酒中服

日三

地黃酒治產後百病未產前一月當預釀之產訖尊中服之方

地黃汁升一 好麩 好米各二升

右三味先以地黃汁漬麩令發準家法醞之至熟封七日取

千金方

卷四

三

藥會

清服之常使酒氣相接多令斷絕慎蒜生冷酢滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月熱不可合春秋冬並得合服地黃并滓內米中炊合用之二右十石一準此一升為率先服

羊肉湯治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛之方

肥羊肉三斤 當歸姚氏用 桂心 甘草各二

芍藥子母秘錄 芍藥子母秘錄

生薑各四 乾地黃五

右八味以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取三升去滓分三服不瘥重作若胸中微熱加黃芩今麥門冬各

元大便上有頭痛加石  
真膏一兩中風加防風一  
兩

猪腎湯治產後虛羸喘乏作寒作熱病如瘡狀名犀勞方

猪腎一具去脂四破 香豉綿裹 葱白各一兩

白粳米

右四味以水二斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作方有

羊肉黃耆湯治產後虛乏補血方

羊肉一斤 黃耆三 大棗三十 茯苓

甘草二兩 當歸 桂心 麥門冬

乾地黃 芍藥各二

元聖方二作三

千金方

卷四

四

長庚

右十味㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取二升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後虛羸勞損補之方

鹿肉斤四 乾地黄 甘草 芍藥

黃耆 芍藥 麥門冬 茯苓各二

人參 當歸 生薑各一 半夏一

大棗二十

右十二味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

麋骨湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不調方

麋骨一具 遠志 黃耆 芍藥

乾薑 防風 茯苓一作茯苓 厚朴各三兩

當歸 橘皮 甘草 獨活

芍藥各二兩 桂心 生薑各四兩

右十五味㕮咀以水二斗者麋骨取一斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸一兩半 芍藥 人參 桂心

生薑 乾地黄 甘草各一 大棗二十枚

右八味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

杏仁湯治產後虛氣方

杏仁 橘皮 白前 人參各三兩  
蘇葉 半夏各一升 桂心 四兩 生薑 十兩

麥門冬 二兩

右九味以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治婦人產後上氣賁脈氣積勞臆氣不足胸中煩躁關元以下

如懷五千錢狀方

厚朴 桂心 當歸 細辛 芍藥 石膏 桔梗各三兩  
甘草 黃芩 澤瀉各二兩 吳茱萸 五兩 千金 翼作大黃 乾地黄 兩 乾姜 兩  
右十三味以水一斗二升煮取三升去滓分三服服之劑佳

翼方名氣黃湯元无  
如二子氣下有及人  
三六子

元惡作回

元正作以非

赤石脂膏常作石脂  
元作脂  
常知白苦知盡川學形  
似記

元治百作主病

乳蜜湯治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒冷補氣方

牛乳 七升 惡則 白蜜 一升半 當歸 人參  
獨活 各三兩 大棗 二十枚 甘草 桂心 各二兩

右八味以咀諸藥內乳蜜中煮取三升去滓分四服

五石湯治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補腎治百病

紫石英 鍾乳 白石英 赤石脂 石膏 茯苓 白朮  
桂心 芎藭 甘草 各二兩 雄白 六兩 人參 常歸 各三兩 生薑 八兩 大棗 二十枚

右十五味五石並為末諸藥各咀咀采耳二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨活各二兩下麻加龍骨兩

三石湯治百病如前方

千金方

卷四

六



紫石英 生薑 當歸 人參 甘草 各二兩 白石英

鍾乳 各二兩 茯苓 乾地黄 桂心 各三兩 半夏 五兩 大棗 十五枚

右十二味三石為末，吹咀諸藥，以水一斗五升，煮取三升，去滓，分四服。若中風，加葛根四兩。

內補黃耆湯治婦人七傷，身體疼痛，小腹急滿，面目黃黑，不能食飲，并諸虛之不足，少氣心悸不安方。

黃耆 當歸 芍藥 乾地黄

半夏 各三兩 茯苓 人參 桂心

遠志 麥門冬 甘草 五味子

白朮 澤瀉 各二兩 乾薑 四兩 大棗 三十枚

元斗下百平

右十六味，吹咀，以水斗，煮取三升，去滓，一服五合，日三夜服。

吳茱萸湯治產後虛羸，盜汗，瀉瀉，惡寒方。

吳茱萸三兩，以清酒三升，漬一宿，煮如蟻，鼻沸，減得二升許，中分之，頓服一升，日再間，日再作服，亦治產後腹中疼痛。

猪膏煎治產後體虛寒熱，自汗出方。

猪膏 生薑汁 白蜜 各一升 清酒 五合

右四味煎令調和，五上五下，膏成，隨意以酒服，方寸匕，當炭火上熬。

鯉魚湯治婦人體盈，流汗不止，或時盜汗方。

鯉魚二斤 豉 葱白 切各一升 乾薑 桂心 各二兩

千金方

卷四

傷寒論桂枝加附子湯

傷寒論元叔作十二枚

右五味咬咀三物以水一斗者魚取六升去魚肉諸藥微火煮取二升去滓分二服取微汗即愈勿用生魚桂枝附子湯治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸者方

桂枝 芍藥 生薑各三兩 甘草半兩 附子一枚 大棗二十枚

右六味咬咀以水七升煎取三升分為三服

虛煩第二

薤白湯治產後胸中煩執逆氣方

薤白 半夏 甘草 人參 知母各二兩 石膏四兩 栝萸根三兩 麥門冬半升

即惡更

右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

竹根湯治產後虛煩方

其竹根細切一斗五升以水一斗煮取七升去滓內小麥二升大棗三十枚復煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之 人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參 當歸 麥門冬 乾地黄 桂心各一兩 大棗二十枚 粳米一升 芍藥四兩 淡竹葉三升

羽異方斗作升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三斗煮取一升盡服之甚良  
甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹升一 人參兩一 茯苓 甘草各二兩

黃芩兩三

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方

知母兩三 芍藥 黃芩各二兩 桂心

甘草各一兩

元孝考各一兩

羽異方斗作升

元孝考各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半三服一方不用桂心加生地黄

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉 麥門冬各一升 甘草二兩 生薑

茯苓各三兩 大棗十四枚 小麥三合

右七味㕮咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取三升去滓分三服若心中虛悸者加入參二兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方

生淡竹茹升一 麥門冬 小麥各五合 甘草一兩

生淡竹茹升一 麥門冬 小麥各五合 甘草一兩

千金方 卷四 三百五十一

外其室無二條考大全良  
十方引于至無條考

生薑

三兩 產室 用乾葛

大棗

十四枚 產室 用石膏三兩

右六味以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸藥者取二升去滓分二服羸人分作三服若有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之良

蒲黃散治產後煩悶方

蒲黃以東流水和方寸匕服極良

元聖方良血

活人產作室微瘡作瘡狀

蜀漆湯治產後虛熱往來心曾煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘡方

蜀漆葉

桂心

甘草

黃芩各一兩

黃耆五兩

知母

芍藥各二兩

生地黃一斤

右八味以水一斗煮取三升分三服治寒熱不傷人

芍藥湯治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黄

牡蠣各五兩

桂心三兩

右四味以水一斗煮取二升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

中風第三論方

活人此湯加黃芩二兩桂心牡蠣湯痛下有身縣灸極四子外其生斗作升

外百病及三字无及方  
傷三字无

元驗无

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯產後大善

大豆紫湯治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方

大豆

五升祛凡解並

清酒一斗

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更令小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風痲口噤不開并治血氣痛勞傷補腎方

獨活一升

大豆五升

舊酒一斗

右二味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減二升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活半斤

葛根

生薑各六兩

甘草二兩

右四味以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳  
甘草湯治在羣中風背強不得轉動名曰風痲方

五升三升无  
留天方三作二

- 甘草
- 栝蒌根
- 葛根斤半
- 乾地黄
- 麥門冬
- 黃芩各三兩
- 麻黃各十二兩
- 杏仁五十枚

右九味以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升去滓  
內諸藥煮取二升去滓分再服一劑不瘥更合良千金翼  
獨活湯治產後中風口噤不能言方氏有前胡

- 獨活
- 生薑各五兩
- 防風
- 秦朮
- 桂心
- 白朮
- 甘草
- 當歸
- 附子各二兩
- 葛根二兩
- 防已一兩

元之无  
至正握作把無二兩字  
活人百生

至正大元

右十一味以水一斗二升煮取二升去滓分三服  
雞糞酒治產後中風及百病并男子中一切風神效方  
雞糞一升熬 烏豆一升熬

竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛之方  
服取汗病重者凡四五日服之無不愈

- 淡竹葉握一
- 葛根三兩
- 防風二兩
- 桔梗
- 甘草
- 人參
- 桂心各二兩
- 大附子一枚
- 生薑五兩
- 大棗十五枚

右十味以水一斗煮取二升半去滓分三服日三溫覆

使汗出若頸項強者用大附子若嘔者加半夏四兩  
防風湯治產後中風背急短氣方千金翼作裏急短氣

防風

獨活

葛根各五兩

當歸

芍藥

人參

甘草

乾薑各二兩

右八味咀咀以水九升煮取三升去滓分三服白三

鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉斤三

芍藥

獨活

秦艽

黃芩

黃耆各三兩

半夏升一

乾地黄

桂心

芍藥各二兩

生薑兩六

甘草

阿膠各一兩

茯苓千金翼作茯神

人參各四兩

右十五味咀咀以水一斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎取三升去滓內膠令烱分四服日三夜一  
獨活酒治產後中風方

獨活斤一

桂心兩三

秦艽兩五

右三味咀咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

大豆湯治產後卒中風發病倒悶不知人及姪娠挾風兼治在  
尊諸疾方

大豆

五升炒

葛根

獨活各八兩

防已

兩六

右四味咬咀以酒一斗二升煮取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服而日四夜二  
五石湯治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘰癧眩冒不知人及濕痺緩弱身體痙姪旅百病方

- 紫石英兩三
- 鍾乳
- 赤石脂
- 石膏
- 白石英
- 牡蠣
- 人參
- 黃芩
- 白朮
- 甘草
- 栝蒌根
- 芎藭
- 桂心
- 防己
- 當歸
- 乾薑各一兩
- 獨活三兩
- 葛根四兩

右十八味末五石咬咀諸藥以水一斗四升煮取三升半分五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

四石湯治產後卒中風發疾口噤瘰癧閉滿不知人并緩急諸風毒痺身體痙強及挾胎中風婦人百病方

- 紫石英
- 白石英
- 石膏
- 赤石脂各三兩
- 獨活
- 生薑各六兩
- 葛根四兩
- 桂心
- 芎藭
- 甘草
- 芍藥
- 黃芩各二兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服  
小柴胡湯治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所為若頭不痛但煩熱與三物黃芩湯頭痛與小柴胡湯方

- 柴胡半斤
- 黃芩
- 人參
- 甘草各三兩
- 生薑二兩
- 大棗十二枚
- 半夏半斤

金玉附方治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所為若頭不痛但煩熱與三物黃芩湯三



右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓每服一升日三服

三物黃芩湯方

黃芩 苦參各二兩 乾地黄四兩

右咬咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日二多吐下蟲

元石下有三味

甘草湯治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中風內絕藏氣虛所為方

甘草 芍藥各五兩 羊肉斤三 通草三兩產實

右四味咬咀以水一斗六升煮取一斗去肉內藥煮取三

升去滓分五服日三夜二

羊肉湯治產後中風火絕不產月水不利作赤白及男子虛勞冷盛方

羊肉斤二 成籜大蒜去皮 香豉各三升

右三味以水一斗二升煮取五升去滓內酥一升更煮取三升分溫三服

葛根湯治產後中風口噤瘳痺氣息迫急眩冒困頓并產後諸疾方

葛根 生薑各六兩 獨活四兩 當歸三兩 甘草 桂心 茯苓 石膏

人參

白朮

芍藥

防風各二兩

右十二味以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三

防風酒治產後中風方

防風

獨活各一斤

女萎

桂心各一斤

茵芋去風濕兩

石斛兩

右六味以酒二斗漬二宿初服一合稍加至三四合日

二

木防已膏治產後中風方

木防已升半

茵芋兩五

右二味以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎三上三下膏

元翼一作二

元翼二作三

正位升作斤

大父作父

柔凡出病源

身洪著肘後東晉  
便近之著小品方十  
二卷  
流腫出于病源

成炎手摩于遍瘥

治產後中風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方

獨活兩八

當歸兩四

右二味以酒八升煮取四升去滓分四服日二夜一取

微汗葛氏單用獨活小品加當歸若

浴湯治產後中風流腫方

鹽五升熬

雞毛一把燒

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適令暖以浴

大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以紫湯一服

瘥神效紫湯是妙

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取一升  
內白朮八兩附子三兩獨活二兩生薑八兩添水一斗煎  
取五升內好酒五升合煎取五升去滓分五服日三夜一  
間粥頻服三劑

扶神湯治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯  
謬心虛所致方

- 扶神 四兩
- 人參 各三兩
- 茯苓 各三兩
- 芍藥 各三兩
- 甘草 各三兩
- 當歸 各二兩
- 桂心 各二兩
- 生薑 八兩
- 大棗 三十枚

元二作三又夜一字无

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日二夜一良  
遠志湯治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯誤惚惚  
憤憤情不自覺方

- 遠志 各三兩
- 麥門冬 各三兩
- 人參 各三兩
- 甘草 各三兩
- 當歸 各二兩
- 桂心 各二兩
- 芍藥 一兩
- 茯苓 五兩
- 生薑 六兩
- 大棗 二十枚

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三服者分  
四服產後得此正是心虛所致無當歸用芎藭若其人心胸  
逆氣加半夏三兩

茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍恍惚惚心中憤憤

大主良方九作三  
草桂心各四各三

千金方 卷四 十七  
此皆心虛所致方

茯苓 五兩

甘草

芍藥

桂心

當歸 各二兩

生薑 六兩

麥門冬 一升 大棗 三十枚

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三無當歸  
可用芎藭若苦心志不定加入參二兩亦可內遠志二兩若  
苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水一斗三升煮竹葉取一  
斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩桂心二兩用水一  
斗五升若頸項苦急皆脾強者加獨活葛根各三兩麻黃桂  
心各二兩生薑八兩用水一斗半  
安心湯治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語錯誤虛

翼方羊下有獲取  
三升羊分四服日三  
夜一十二字

煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

甘草 各二兩

人參

茯神

當歸

芍藥 各三兩

麥門冬 一升 大棗 三十枚

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦虛  
煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升者竹葉取一斗內藥  
若胸中少氣者益甘草為三兩善

甘草圓治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或若恍恍  
惚惚不自知覺者方

甘草

遠志

甘蒲 各三兩 人參

麥門冬

乾薑

茯苓 各二兩 澤瀉

桂心各一兩 大棗五十枚

右十味為末，蜜丸如大豆，酒服二十九日，四五服，夜再服，不

知稍加，若無澤瀉，以白木代之。若胸中冷，增乾薑。

人參圓治產後大虛，心悸，志意不安，不自覺恍惚，恐畏，夜不得

眠，虛煩，少氣方。

人參 甘草 茯苓各三兩 麥門冬

菖蒲 澤瀉 薯蕷 乾姜各二兩

桂心一兩 大棗五十枚

右十味為末，以蜜棗膏和丸，如梧子，未食酒服二十九日，三夜一，不知稍增，若有遠志，內二兩為善。若風氣內，當歸獨活

元三作二正同  
對異方五作三

三兩亦治男子虛損，心悸。

大遠志圓治產後心虛不足，心下驚悸，志意不安，恍惚，腹

中拘急，痛夜卧不安，胸中吸吸，少氣，內補傷損，益氣，安定心神，

亦治虛損方。

遠志 甘草 乾地黄 桂心 茯苓

麥門冬 人參 當歸 白木 澤瀉

獨活 菖蒲各二兩 薯蕷 阿膠各二兩 乾薑四兩

右十五味為末，蜜和如大豆，未食溫酒服二十九日，三不知，稍增至五十九丸，若大虛，身體冷，少津液，加鍾乳三兩為善。

心腹痛第四方

經心錄步系三兩  
正升作斤

千金翼方無  
方名

日三

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒二合

芍藥

當歸

半夏

甘草

桂心

人參

茯苓各二兩

生薑汁五合

右十味咬咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥者取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

乾地黄

當歸

獨活

甘草

芍藥

桂心

細辛

小草各二兩 吳茱萸一升 乾薑三兩

右十味咬咀以水九升煮取三升內蜜五合重煮分三服日

南齊書胡洽經驗方  
又有治百要方三卷

乾地黄湯治產後兩脅滿痛兼除百病方

乾地黄

芍藥各三兩

當歸

蒲黃各二兩

生薑五兩

桂心

甘草一兩

大棗二十枚

右八味咬咀以水一斗煮取一升半去滓分服日三

芍藥湯治產後苦腹少痛方

芍藥六兩

桂心

生薑各三兩 甘草二兩

膠飴八兩

大棗十二枚

右六味咬咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分三服

日三

元正一作二  
習方方服日三  
作三服  
腹少痛此大腸痛乎  
傷寒論小建中湯  
腹少痛  
傷寒論八節作一升

三胡洽不用獨活桂心  
小草千金翼不用蜜

全玉續作序二  
作三

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸 芍藥各二兩 干母秘錄有甘草 生薑五兩 羊肉一斤  
經籍志許仁子母秘錄十卷

右四味咬咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升適寒溫服七合日三金匱要畧胡洽不用芍藥各小羊肉湯

桃仁芍藥湯治產後腹中疼痛方

桃仁半升 芍藥 芎藭 當歸 乾漆 桂心 甘草各二兩

右七味咬咀以水八升煮取三升分三服

羊肉湯治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

且吳實作身

元并上有肉字異方同

肥羊肉二斤 茯苓 黃耆 乾薑各三兩 甘草 獨活 桂心

人參各二兩 麥門冬七合 生地黄五兩 大棗十二枚

右十二味咬咀以水二斗煮肉取一斗去肉藥煮取二升半分四服日三夜一千金翼無乾薑

羊肉當歸湯治產後腹中下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣方

羊肉三斤 當歸 黃芩時後用 芎藭 防風時後用 甘草各二兩 芍藥三兩 生薑四兩

右八味咬咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三升

元良字无

元留其常作嗽

元桂心下有白木

去滓分三服日三胡洽以黄耆代黄芩白木代芍药各六羊

七枚

羊肉杜仲湯治產後腰痛欬喘方

羊肉 四斤

杜仲

紫苑

當歸

桂心 各三兩

五味子

細辛

欬冬花

人參

厚朴

芎藭

附子

草薢

甘草

黄耆 各二兩

白朮 三兩

生薑 八兩

大棗 三十枚

元一作二翼半字无  
五升字无

右十八味㕮咀以水一斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥煎取三升半去滓分五服日三夜一

羊肉生地黃湯治產後二百腹痛補中益氣強氣力消血方

元方字无

羊肉 三斤

生地黃切二桂心

當歸

甘草

芎藭

人參 各二兩 芍藥 三兩

右八味㕮咀以水一斗煮肉取一斗去肉內藥煎取三升分

四服日三夜一

元一作二作三翼  
刺狗作中痛上有摩

內補當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疼痛不止吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑為善令人力壯方

當歸 四兩

芍藥 五兩

甘草 一兩

生薑 六兩

桂心 二兩

大棗 十八枚

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三夜一

元一作二作三翼  
八作二

元玉引翼方作強



千金方

湯作與異字

翼或作成

大虛內飴糖六兩作湯成內之於火上飴若無生薑則以乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠二兩合八種作湯或去滓內阿膠若無當歸以芎藭代之

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中絞痛方

芎藭 乾地黃各四兩芍藥五兩 桂心二兩

甘草 乾薑各三兩 大棗四十枚

右七味以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三不瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面自無色及唾血甚良

元方無

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或腸血少腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之方

當歸 續斷 桂心 芎藭

乾薑 麥門冬各三兩芍藥四兩 吳茱萸一升

乾地黃六兩 甘草 白芷各二兩 大棗四十枚

右十二味以酒一斗漬藥一宿明且以水一斗合煮取五升去滓分五服日三夜二有黃者入二兩益佳

桂心酒治產後疹痛及卒心腹痛方

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三

生牛膝酒治產後腹中苦痛方

元佳作桂翼全

肘後方作作撤反  
文亦俗作疹翼旁  
作款

後說文曰及也世曰意不立  
世世說列陰在郡後通  
龜困勞也韻音短氣自  
涉劣切又丑倒切太平記  
李桂果生狂滿心絕食  
三日薄疾甚篤旬餘無  
甚即主懼其不起從之  
于山碑三中綿後移特  
合肆之人共傷嘆而互詞  
之後稍愈加源曰綿微也  
連也理氣息沈微綿傷  
未絕也周白野曰綿微見  
佛本行集疏屬綿之後  
絕氣

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾牛膝  
根以酒漬之一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒溫頓服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少  
或腫或寒或下痢氣息綿愒欲絕產後益劇皆主之方

吳茱萸 二兩

防風

桔梗

乾薑

甘草

細辛

當歸各十二

乾地黄 十八銖

右八味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹

滿飲死方

蒲黃

生地黄

生薑各五兩

芎藭

桂心各一兩

砒硝二兩

桃仁二十枚

大棗十五枚

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓內砒硝分三服日

三良驗

敗醬湯治產後疹痛引腰腹中如錐刀所刺之方

敗醬 三兩

桂心

芎藭各一兩

當歸一兩

右四味咬咀以清酒二升水四升微火煮取二升去滓適寒

溫服七合日三食前服之

芎藭湯治產後腹痛方

元作甘在酒下同

衛生易問方作疹作腹  
對吳方血上族字元無三  
字

元兩作銖

主上湯加獨活

据丰大湯當作土枚  
是必側

芍藥

甘草 各二兩

蒲黃

女萎 各一兩半

芍藥

大黃 各三銖

當歸 十八兩

桂心

桃仁

黃耆 作黃芩

前胡 各一兩

生地黄 一升

右十二味㕮咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四服  
日三夜一

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

當歸

桂心

芍藥

生薑 各三兩

甘草 二兩

大棗 二十枚

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服服後相去如  
人行十里又再進

孟通此湯大補  
加並

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

芍藥 四兩

黃耆

白芷

桂心

生薑

人參

芍藥

當歸

乾地黄

甘草 各二兩

茯苓 三兩

大棗 十枚

右十二味㕮咀以酒水各五升合煮取三升去滓先食服  
升日三千金翼無人參當歸芍一  
窮地黄茯苓為七味

治產後腹脹痛不可忍方

煮黍粘根為飲一服即愈

治婦人心痛方

布裏鹽如彈丸燒作灰酒服愈

柔子氣通

肘後方作煎布

千金方  
又方燒秤錘投酒中服亦佳  
又方炒大豆投酒中服佳

孫真人備急千金要方卷之四

絲真人備急千金要方卷之五

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

婦人方

惡露第五方

乾地黄湯治產後惡露不盡除諸疾補不足之方

乾地黄 二兩

芎藭

桂心

黃耆

當歸 各二兩

人參

防風

茯苓

細辛

芍藥

甘草 各一兩

右十一味以水一斗煮取三升去滓分三服日再夜

桃仁湯治產後往來寒熱惡露不盡方

惡露作血

元正之無  
元二作三

聖方作百鍊核

傷居効方分量不同

元三作二

聖方在下有共

桃仁 五兩

吳茱萸 二升

黃耆

當歸

芍藥 各二兩

生薑

醍醐百鍊

柴胡 各八兩

右八味以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒溫先

食服一升日三

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣

力方

澤蘭行血水 當歸

生地黄 各三兩 甘草 一兩半

生薑 三兩

芍藥 一兩

大棗 十枚

右七味以水九升煮取三升去滓分三服日三墮身欲

死服亦瘥

元脈作脣

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷脈乾腹脹短氣

方

甘草

芍藥

桂心

阿膠 各三兩

大黃 四兩

右五味以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊分

三服一服入腹中面即有顏色一日一夜盡此三升即下腹

中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥 各三兩

吳茱萸 一升

其方斗下有升二字

冒說文曰忘也一日憂也  
括翼方作煇煇痛通  
元正十作半

右七味呔咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加  
人參二兩各一人參大黃湯

柴胡湯治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑各八兩 桃仁五十枚 當歸

黃耆

芍藥各三兩 吳茱萸二升

右七味呔咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升日  
三千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食衝心  
脅時時煩憤逆滿手足煩疼胃中結熱方

蒲黃 十兩

大黃

砒硝

甘草

其方一作三

黃芩

各一兩 大棗三十枚

右六味呔咀以水五升煮取一升清朝服至日中下若不止  
進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人羸者半之千金翼各

大黃湯而不用芒硝

銅鏡鼻湯治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏心腹疼  
痛方

銅鏡鼻

十八銖 燒未

大黃 二兩半

芍藥

乾地黄

芎藭

乾漆

砒硝

各二兩

亂髮

雞子大燒

大棗 三十枚

右九味呔咀以水七升煮取二升去滓內髮灰鏡鼻末

分三服

小銅鏡鼻湯治如前狀方

銅鏡鼻十銖未

大黃

甘草

黃芩

砒硝

乾地黄各二兩

桃仁五十枚

右七味以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末分三服亦

治遺尸心腹痛及三十六尸疾見肝後方自三十九尸至九十九尸

梔子湯治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二兩蜜

五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二升分三服

日三

聖異流作蟹  
石異二作三

生地黄湯治產後二百至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通聖異作或四五三

生地黄 五兩

生薑 三兩

大黃

芍藥

茯苓

細辛

桂心

當歸

甘草

黃芩各一兩 大棗二十枚

右十一味以水八升煮取二升半去滓分三服日三次

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黄

桂心

乾薑各二兩

右五味以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一升

凡諸心腹痛血氣方批  
差入腹寂然不動但益  
氣息急者此尸症病  
也○尸症鬼症即立尸  
之中尸症又挾鬼邪  
為害者也其變動乃有  
三十六種至九十九種  
大畧令人寢地淋瀝  
、堅、不的知其所堪而  
無處不惡 聖見未居  
五十二卷  
元汝子元正三作二  
元漆作漆

元方作不翌生

血當下若不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥  
麻子酒治產後血不去方

麻子五升搗以酒一斗漬一宿明且去滓溫服一升先食  
服不瘥夜服一升當吐下忌房事一月將養如初產法  
升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服當吐下惡  
物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃 黃芩 桃仁 各三兩 桂心  
甘草 當歸 各一兩 芍藥 四兩 生地黄 六兩

元正作二

元船作紅

右八味以咀以水九升者取二升半去滓食前分三服  
治產後漏血不止方

又方  
露蜂房 敗船茹  
右二味等分作灰取酪著漿服方寸七日三

大黃 三兩 礞石 一兩 桃仁 水蛭  
麤蟲 各二十枚 甘草 當歸 各二兩 麤蟲 四十枚

右八味以咀以水三升酒二升合煮取二升去滓分三服當  
下血

又方

千金方

卷五

五



桂心

蟾蜍各二兩

栝萸根

牡丹各三兩

鼓升一

右五味以水八升煮取三升去滓分三服

治產後血不可止者方

乾薑蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分再服即止

治產後惡血不除四體並惡方

續骨木二十兩破如算子以水一斗煮取三升分三服

相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此

木得三遍煮

治產後下血不盡煩悶腹痛方

元正算作等

元正作炭良也

羚羊角

燒成灰刮

芍藥二兩熬

枳實

一兩細切

右三味治下篩者水作湯服方寸匕日再夜一稍加至二匕

又方鹿角燒成炭擣篩者鼓汁服方寸匕日三夜再稍加至二

匕不能用鼓清者水作湯服之

又方擣生藕取汁飲二升甚驗

又方生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

又方赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不瘥更服

治產後血癥痛方

古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五升中

稍稍服之神妙

一炭作反  
元服作用

証類引此書產後心  
劇目不開

外聖骨下有飛仁

治婦人血瘕心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中熱腰背  
痛小便不利大便難不下食有伏蟲臙脹癰疽腫久寒晉熱胃  
腕有邪氣方

半夏一兩

石膏

藜蘆

牡蒙

茯苓各十

桂心

乾薑各一

烏蒙半兩

巴豆六十枚

右九味為末蜜丸如小豆服二九日三及治男子痼病

治婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨各一兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

外聖川澤師不用黃

又方末桂心温酒服方寸七日三

下痢第六方

膠蠟湯治產後三日內下諸雜五色痢方

阿膠

黃蘗各一

蠟如棊子

當歸一兩半

黃連二兩

陳廩米一升

右六味以水八升者采蟹目沸去米內藥煮取二升去

滓內膠蠟令烱分四服一日令盡

桂蜜湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下

血方

桂心

甘草各二

乾薑二兩

附子一兩

外聖蠟上有方三

外聖蠟作枚

元六作七

外症下有利

外症一作四

蜜一升 當歸三兩 赤石脂十兩

右七味以水六升煮取三升去滓內蜜煎一兩沸分三服日三

治產後下赤白腹中絞痛湯方

芍藥 乾地黄各一兩五分 甘草 阿膠

艾葉 當歸各二兩

右六味以水七升煮取二升半去滓內膠合烱分三服

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆微熬 小麥 蒲黃各一升 吳茱萸半升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神驗亦可以水

五升酒一斗煎取四分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白一兩 當歸二兩 酸石榴皮三兩 地榆根四兩

粳米五合

右五味以水六升煮取二升半去滓分三服必効方加厚朴一兩

阿膠人參甘草黃連各一兩半

當歸湯治產後下痢赤白腹痛方

當歸 龍骨各三兩 乾薑 白朮各二兩

芍藥二兩 甘草 白艾熟者 附子各一兩

右八味以水六升煮取二升去滓分三服一日令盡

外症去上一百半

千金方

卷五

郭一

全玉名白頭翁加  
甘草阿膠湯

白頭翁湯治產後下痢兼虛極方

白頭翁

阿膠

秦皮

黃連

甘草各二兩

黃蘗各二兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓內膠合燀分三服

日三

龍甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

龍甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃蘗

長一尺廣二寸

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

加白頭翁兩

龍翼方大有多氣  
黃三寸

元二作三

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露不  
斷方

龍骨 四兩

乾薑

甘草

桂心 各二兩

右四味為末蜜和暖酒服二十九如梧子日三方用人參

地黄各二兩

阿膠圓治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

阿膠 四兩

人參

甘草

龍骨

桂心

乾地黄

白朮

黃連

當歸

附子 各二兩

右十味為末蜜丸如梧子溫酒服二十九日三

正桂心作桔梗

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裏急胸脇滿痛欬嘔血寒熱  
小便赤黃大便不利方

澤蘭 石膏各二十銖 當歸 甘草

厚朴各十銖 遠志各十銖 藁本 芎藭各十五銖

乾薑 人參 桔梗 乾地黄各十二銖

白朮 蜀椒 白芷 栝子仁

防風 山茱萸 細辛各八銖 桑白皮

麻子仁各半升

右二十一味咬咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半  
去之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

乾地黄湯治產後下痢方

乾地黄二兩 白頭翁 白朮 黃連各一兩 蜜蠟一方寸

阿膠如手掌一枚

右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓內膠蠟令烊分三

服日三服 乾薑一兩

生地黄湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黄五兩 甘草 黃連 桂心各二兩

大棗二十枚 赤石脂二兩 淡竹葉二升

右七味咬咀以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮取二升

半分三服日三

外置石脂洗淨  
作各一兩

正忽作勿

監青圓治產後下痢方

監青熬

附子

鬼臼

蜀椒各一兩半

厚朴

阿膠

甘草各二兩

艾葉

龍骨

黃連

當歸各三兩

黃蘗

茯苓

人參各一兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十九丸空腹飲下方

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂三兩

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

甘草各二兩

蜀椒

附子各一兩

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十九丸千金翼作散空

赤散治產後下痢方

赤石脂

代赭各三兩桂心一兩

右三味治下篩酒服方寸七日三十日愈

黑散治產後下痢方

麻黃

貫衆

桂心各一兩 甘草

乾漆各三兩 細辛一兩一作各

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散治產後下痢方

正妻作麻

千金方

卷五

七

四

黃連 二兩

黃芩

麤蟲

乾地黄 各一兩

右四味治下篩酒服方寸七日三十日愈  
龍骨散治產後痢方

五色龍骨

代赭

赤石脂

黃蘗根皮

蜜炙令焦

艾 各一兩半

黃連 二兩

右六味治下篩飲服方寸七日三

淋濁第七方

括萎湯治產後小便數兼渴方

括萎根

麥門冬

甘草

黃連 各二兩

人參

生薑 各三兩

大棗 十五枚

桑螵蛸 二十枚

右八味以水七升煮取二升半分二服

又方治產後渴不止方

括萎根

人參

麥門冬 各三兩

甘草 崔氏不用

乾地黄 各二兩

大棗 二十枚

土瓜根

五兩崔氏用蘆根

右七味以水一斗二升煮取六升分六服

雞臍湯治產後小便數方

雞臍脰

雞腸

乾地黄

當歸

甘草

麻黃

厚朴

人參 各二兩

生薑

大棗 二十枚

右十味以水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸

本細臍脰裏黃皮一名雞內至又曰臍脰也後文曰臍脰百葉一曰鳥臍脰鳥臍也臍臍名

貝齒又名貝子見本綱四十六卷

藥前取三升半分二服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能治方

貝齒

四枚燒作末

葵子 一升

石膏

五兩碎

滑石 二兩末

右四味以水七升煮二物取二升去滓內二末及猪脂一合

更煎三沸分三服日三不瘥再合服

石韋湯治產後卒淋氣淋血淋石淋方

石韋

黃芩

通草

甘草

各二兩

榆皮

五兩

大棗

二十枚

葵子 二升

白朮

產寶用芍藥

生薑

各二兩

招與三

因史經籍去有姚大夫集驗方十三卷北史曰姚僧植字法慶後周吳興武康人

右九味以水八升煮取一升半分二服集驗無甘草生薑崔氏同產寶

不用

招與三

葵根湯治產後淋瀝方

葵根 二兩

車前子 一升

亂髮

燒灰

大黃

桂心

滑石 各一兩

通草

三兩

生薑

六兩

冬瓜練

七合

右九味以水七升煮取二升半分三服千金翼不用冬瓜練

茅根湯治產後淋方

白茅根

一斤

瞿麥

茯苓

各四兩

地脉

人參

各二兩

生薑

三兩

桃膠

甘草

各一兩

冬瓜練本綱冬瓜類也元一升作汁

瞿麥方脈作麥地麥地膚子一名

新金

卷五

生

朝



煎方有餘分半  
煎方有大連工枚

鯉魚齒 一百枚  
右九味咬咀以水一斗煮取二升半分二服

滑石散治產後淋方  
滑石 五兩 通草 車前子 葵子 各四兩

右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二七

竹葉湯治產後虛渴少氣方

竹葉 三升 生薑 半夏 各三兩 大棗 十四枚

小麥 五合 甘草 茯苓 人參 各一兩

麥門冬 五兩

右九味咬咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸藥更

煎取二升半一服五合日三夜一

雜治第八方

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣

方

烏頭 黃芩 巴豆 各半兩 半夏 二兩

大黃 八兩 戎鹽 一兩半 麤蟲 桂心

苦參 各十八 人參 消石 各一兩

右十一味為末以蜜青牛膽拌和搗三萬杵丸如梧子宿不  
食酒服五丸安卧酒更當下黃者小腹積也青者疝也白  
者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪氣也血如腐肉

元羊反三兩

并金方

卷五

七

熊心

二百八十一

日異方者下有內

華本同作病異作  
膈中氣胸脹病

者傷也赤如血者乳餘疾也如蟲刺者蠱也既下必渴渴飲  
粥饑食酥糜二百後當溫食食必肥濃三十日平復亦名破  
積烏頭丸主心腹積聚氣悶脹疝瘕肉傷瘀血產乳餘疾及  
諸不足

竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方

竹茹 二升

人參

芍藥

桔梗

芩藎

當歸

甘草

桂心 各一兩

乾地黄 四兩

右九味以水一斗煮取三升分三服

治婦人自少患頭疼眼眩方

元正惠下有凡

石南

石葦

細辛

天雄

茵芋

各二兩

薯蕷

防風

貫衆

獨活

薤蕪 各四兩

乾薑

山茱萸

各三兩

右十一味以酒三斗漬五日初飲二合日三服後稍稍

加之

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷飲又心胃煩熱眉骨眼  
背癢痛有時生瘡喉中乾燥口體痛癢方

桔萎根

麥門冬

龍膽

各三兩

大黃 二兩

杏仁 二升

土瓜根 八兩

右六味為末蜜丸如梧子大飲服十枚日三後漸加之

東昌

日異方故作同

治婦人患癰按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食常心悶方

牽牛子三升治下篩飲服方寸七日一服二十服後可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方

松脂二兩 雄黃一兩

右二味先煇松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥成取如雞子中黃夜卧以著燠籠中燒令病人取自昇其上以被自覆惟出頭勿令過熱及令氣得泄也

厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁小便俱出

肘後雞子中黃作如厚九董作七昇作浸坐

元正重作腫翼方汁下有十字

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂丁尺為末內汁中調和宿勿食且頓服之

溫經湯治婦人小腹脹方

茯苓六兩 土瓜根 芍藥各三兩 薏苡仁半升

右四味以酒三升漬一宿且加冰七升煎取二升分再服

服

半夏厚朴湯治婦人胃滿心下堅咽中帖帖如有炙肉嚙吐之不出咽之不下方

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 生薑五兩 蘇葉二兩

一升作斤

至

右五味吹咀以水七升煮取四升分四服日三夜二不瘥頓服方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

昆布圓治婦人胃中伏氣方

昆布

海藻

芍藥

桂心

白石英

欬冬花

桑白皮

人參各二兩

栝子仁

茯苓

鍾乳各二兩

紫苑

甘草各一兩

乾薑一兩六銖

吳茱萸

五味子

細辛各一兩

杏仁百枚

橘皮

蘇子各五合

右二十味為末蜜和丸如梧子酒服二十九日再加至四十九

治婦人無故憂恚胃中迫塞氣不下方

芍藥

滑石

黃連

石膏

山茱萸

前胡各一兩六銖

大黃

麥門冬

細辛

生薑各一兩

半夏十八銖

桂心半兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九日加至三十九日服

治婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒為末酒服之終身不產

元外至要上自大

又方油煎水銀二日勿息空肚服棗一枚永斷不損人  
治勞損產後無子陰中冷溢出子閉閉積年不產身體寒冷方

防風一兩半 桔梗三十銖 人參一兩 菖蒲

半夏 丹參 厚朴 乾薑

紫苑 杜蘅各十八 秦艽 白欬浮火散結

牛膝 沙參各半兩 大黃

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日三服不  
知增至二十九有娠止夫不在勿服之服藥後七日方合陰  
陽

五加酒治產後癯瘦玉閉冷方  
五加皮一斤 枸杞子二兩 蛇牀子一兩 杜仲一兩  
乳牀半斤 乾地黄 丹參各二兩 乾薑三兩  
天門冬四兩

元板五加枸杞三斤  
蛇牀子一斤杜仲一  
斤

右九味以絹袋子盛酒三斗漬三宿一服五合日再稍  
加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癥藏寒所致方

乾漆半斤 生地黄汁三升 生牛膝汁一斤

右三味先搗漆為散內汁中攪微火煎為丸如梧子大酒服  
三九日再若覺腹中痛食後服之  
治產後勞玉門開而不閉方

元血後字  
集驗勞作冷

集驗統黃蛇床子  
各四兩  
元面洗字解作海  
集驗作投

硫黃 四兩

吳茱萸 一兩半

菟絲子 一兩六銖

蛇牀子 一兩

右四味為散以水一升煎餌方寸七洗玉門日再洗  
治產後陰道開而不閉方

石灰一斗熬令燒草以水一斗投之適寒温入汁中坐漬  
之酒更復易坐如常法此方已效千金不傳

黃芩散治婦人陰脫方

黃芩

蛭皮

當歸 各半兩 芍藥 一兩

牡蠣

竹皮 各二兩

狐莖 一具 干金 一兩

右七味治下篩飲服方寸七日三禁舉重房勞冷食

梳黃散治同前

硫黃

烏賊魚骨 各半兩

五味子 三銖

右三味治下篩以粉其上良日再三粉之

當歸散治同前

當歸

黃芩 各一兩 蛭皮 半兩

牡蠣 二兩半

芍藥 一兩

右五味治下篩酒服方寸七日三服禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇牀子一升布裹灸慰之亦治產後陰中痛

又方燒人尿為末酒服方寸七日三

又方燒弊箒頭為灰酒服方寸七

千金方

卷五

七

援後

集驗字卷各  
二兩步兩半增兩

集驗

古今錄驗用鹽頭  
二枚葛根一斤分散  
酒服方寸匙

元三下有十字廣  
府六分

古今錄驗如下有  
半字

又方鼈頭五枚燒末以井花水服方寸七日三

又方

皂莢半兩 半夏 大黃 細辛各十

蛇牀子三銖

右五味治下節用薄絹囊盛大如指內陰中日一易即瘥

又方

吳茱萸 蜀椒各一升 戎鹽如雞

右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞子犬內陰中日一

易十日瘥

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅脂上多少令調以火  
炙布令暖慰肛上漸推內之然後末磁石酒服方寸七日

三

治陰下挺出方

蜀椒廣濟方不用 烏頭 白芨各半兩

右三味治末以方寸上綿裹內陰中入三寸腹中熱易之日

一度明且乃復著七日愈

當歸湯治產後臍中風陰腫痛方

當歸 獨活 白芷 地榆各三兩

敗醬金翼不用 礬石各二兩

廣濟方兩作四分  
集驗三味二分

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三  
又方熟搗桃仁傅之良日三度

陰瘡膏治男女陰瘡方

米粉 一酒杯許

芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷 各十八銖

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三  
芷黃膏成絞去滓內白粉和合相得傅瘡上併治口瘡

治陰中痛生瘡方

羊脂 一斤

杏人 一升

當歸

白芷

甘草 各一兩

右五味為末以羊脂和諸藥內鉢中置甑內蒸之三升米頃

藥成取如大豆許綿裹內陰中日一

治男女陰中瘡濕瘡方

黃連

梔子

甘草

黃蘗 各一兩

蛇床子 一兩

右五味治下篩為細末以粉瘡上無汁以猪脂和塗之深者

用綿裹內瘡內日二

治陰瘡方

蕪荑

芎藭

黃芩

甘草

礬石

雄黃

附子

白芷

黃連 各六銖

右九味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三

治陰中瘡如蟲行狀方

元蛇床子作二兩

元瘡內作瘡中



元血方

礬石 十八銖

芎藭 一兩

丹砂 少許

右三味治下篩取綿裹藥著陰中蟲自死

治陰中癢入骨困方

大黃

黃芩

黃耆 各一兩 芍藥 半兩

玄參

丹參 各十八 吳茱萸 三十銖

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方狼牙兩把以水五升煮取一升洗日五六度

治男女陰蝕略盡方

蝦蟇

兔屎

右二味等分為末取傅瘡上

仲文

外聖一作二

又方蛇床子

一方用芎藭

當歸

芍藥

甘草 各一兩

地榆 三兩

右五味咬咀以水五升煮取二升洗日三夜二

又方蒲黃 一升

水銀 一兩

右二味研以粉其上

又方肥猪肉十斤以水煮取熟生肉盆中浸之冷易不過三兩

度亦治陰中癢有蟲

治女人交接輒血出方

桂心

伏龍肝 各二兩

右二味為末酒服方寸匕立止

外聖十上有水三石三字

外聖兩作分

外經引雀氏研胡麻作新胡芦

治童女交接陽道遺理及為他物所傷血出流離不止方取傘

底墨少許研胡麻以傅之

又方燒繭紫灰傅之

又方燒青布并髮灰傅之立愈

治合陰陽輒痛不可忍方

黃連一兩半 牛膝

甘草各一兩

右三味以水四升煮取一升洗日四度

治女人傷於丈夫口體沉重噁吸頭痛方

香豉 葱白各一升 生地黄八兩

生薑四兩 甘草二兩 芍藥五兩

雀氏

驗集

外經引雀氏一丸

右六味以水七升煮取二升半分三服不瘥重作慎房

白玉湯治婦人陰陽過度玉門疼痛小便不通方

白玉半二兩 白朮 當歸各五兩 澤瀉 茯苓各二兩

右五味以水一斗煎玉五十沸去玉內藥煎取二升

分再服相去一炊頃

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫痛方

蒲黃 當歸切二兩 葱白一斤 吳茱萸 阿膠各一兩

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠合烱分三服

治姙娠為夫所動欲死單行竹瀝汁方

單方白朮厚各二兩

千金方

卷五

五

外聖三兩作半兩

元正水作酒  
翼方注作以一斗煮  
三去滓分溫服之通  
衣无令汗出

服法

翼方外聖兩作方  
十八銖作半兩三沸  
作十沸

取淡竹斷兩頭節火燒中央盡兩頭得汁飲之立効

桑根白皮湯治傷於丈夫苦頭痛欲嘔心悶方

桑根白皮半兩 乾薑二兩 桂心五寸 大棗二十枚

右四味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服適衣無令汗

治嫁痛單行方

大黃十八銖取好酒一升煮三沸頓服之佳

治小兒嫁痛連日方

甘草三兩 芍藥半兩 生薑十八銖 桂心六銖

右四味咬咀以酒二升煮三沸去滓盡服神効

又方牛膝五兩以酒三升煮取一升半去滓分三服

治小兒嫁痛方

烏賊魚骨燒為屑酒服方寸七日

治陰寬大冷窄小方

兔屎 乾漆各半兩 鼠頭骨二枚 雌雞肝二箇陰

右四味為末蜜丸如小豆月初七日合時著丸陰頭徐

徐內入三百知十日小五十五日如十五歲童女

治陰冷令熱方

內食菜萁於牛膽中令滿陰乾百日每取二十七枚綿裹之

齒嚼令碎內陰中良久熱如火

翼方骨下有二枚三字

元添作捺

元剛作一  
正元唐字

元文作文中在  
名玉泉  
元女下有人

元人上右婦字

灸法月水不利黃勝上下并無子灸四滿二十壯穴在丹田兩  
 邊相去各開寸半丹田在臍下二寸是也  
 婦人胞落類灸臍中二百壯 又灸身交五十壯三報在臍  
 下橫交中 又灸背脊當臍五十壯 又灸玉泉五十壯  
 三報 又灸龍門二十壯三報在玉泉下女入陰內外之際  
 此穴早令廢不針灸  
 婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報  
 婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其穴  
 又人欲斷產灸右踝上二寸二壯即斷  
 孫真人備急千金要方卷之五 丙辰秋八月 大戶孟通校

