



千金方

五

卷之六十七

月水不調

赤白帶下崩中漏下

補益

月水不調

婦人方

武口
175
分



紅印

孫真人補氣千金要方卷第六

婦人方

補氣第一端

論曰凡婦人欲求遠色肥白者必先下氣氣不除則

紫石英金入色黑黃瘦弱此其所以然也

相子人服此藥凡五勞七傷者服此藥則氣血充足

天必滋養又產後新諸婦人服之能久服令人堅壯補益方

種下仁

昔者

...

紅印

門 175
卷 5

篤信堂

石六作四

孫真人備急千金要方卷之六

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

婦人方

補益第一論

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服
紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭凡也

栢子人圓治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減少貌
失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

栢子仁

黃耆

乾薑

紫石英 各一兩

蜀椒 一兩半

杜仲

當歸

甘草

補益

篤信堂

芎藭各四十二 厚朴 桂心 桔梗
 赤石脂 茯苓 五味子 白朮
 細辛 獨活 人參 石斛
 白芷 芍藥各一兩 澤蘭二兩六銖 藁本
 蕪荑各十八銖 乾地黄 烏頭一方作牛 防風各三十
 鍾乳 白石英各二兩 三翼
 右三十味為末蜜和酒服二十九如梧子不知加至三十九
千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩為三十三味并治產後半身枯悻
 大五石澤蘭圓治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱
 月經不調繞臍惻惻痛或心腹痛堅逆飲食手足冷多夢身體

痺痛榮衛不和虛弱不能動及產後虛損並宜服方
 鍾乳 禹餘糧一兩半 紫石英八分 甘草
 黃耆各二兩 石膏 白石英 蜀椒
 乾薑各二兩 澤蘭二兩六銖 當歸七兩 桂心
 芎藭七兩 厚朴 栝子仁 乾地黄
 細辛 茯苓 五味子 龍骨各一兩
 石斛 遠志 人參 續斷
 白朮 防風 烏頭各三十 山茱萸
 紫苑各一兩 白芷 藁本 蕪荑各十八
 右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十

九千金翼有陽
起石二兩

小五石澤蘭圓治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益温中方

鍾乳 紫石英 礬石各一兩 白石英

赤石脂 當歸 甘草各四十 石膏

陽起石 乾薑各二兩 澤蘭二兩六 茯苓

龍骨 桂心各一兩半 白朮 芍藥

厚朴 人參 蜀椒 山茱萸各三十

栝子仁 藁本各一兩 蕪荑十八銖

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十

九日三

增損澤蘭圓治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭 甘草 當歸 芍藥各四十二銖

附子 乾薑 白朮 白芷

桂心 細辛各一兩 防風 人參

牛膝各三十 栝子仁 乾地黄 石斛各三十六銖

厚朴 藁本 蕪荑各半兩 麥門冬一兩

右二十味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸至二十丸

大補益當歸圓治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠及崩中

面目脫色唇乾口燥赤治男子傷絕或從高墮下內在所傷藏
虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸

芎藭

續斷

乾薑

阿膠

甘草各四兩

白朮

吳茱萸

附子

白芷各三兩

桂心

芍藥各二兩

乾地黄十兩

右十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三夜不
知加至五十九若有真蒲黃加一升絕妙
白芷圓治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹
中痛方

翼方以下有用一字代
兩地黃五兩膠三兩

翼方以下有用一字代
百之字入作加

持酸漸致諸字書其
未詳蓋酸劑後漸同
金匠酸劑不強行病涼
作酸漸周札注酒酸劑
也原云八患腹痛則有
酸劑○和名酸劑也
道在後也言脚疾力少行
道在後以避道也消也
如見刺劑助力弱也致上
教多酸劑酸劑痰癆酸
消其多並同
神農本草經水畜條宜並
酸劑无字

白芷 五兩

乾地黄 四兩

續斷

乾薑

當歸

阿膠 各二兩

附子 一兩

右七味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日四五服無常
歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷大薊根代

紫石英 栢子仁 圓治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱頭痛
熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食而頭眩心悸酸慙恍惚
不能起居方

紫石英

栢子仁 各三兩

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芎藭

石斛

遠志

寄生

茯苓

元正味上右为末字

乾薑

甘草各二兩

蜀椒

杜蘅一作杜仲

辛夷各一兩細辛一兩半

右十八味蜜和丸如梧子酒服二十九漸加至三十九日三服一方用牡蠣一兩

鍾乳澤蘭圓治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面自瘀黑憂恚不樂百病方

鍾乳三兩

澤蘭三兩六銖

防風四十二銖

人參

栝子仁

麥門冬

乾地黄

石膏

石斛各一兩半

芎藭

甘草

白芷

牛膝

山茱萸

薯蕷

當歸

藁本各三十銖

細辛

桂心各一兩

蕪荑半兩

艾葉十八銖

右二十一味為末蜜和丸如梧子酒服二十九加至四十九日二服

大澤蘭圓治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來自淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中溢如麻豆若癢瘡痞結氣或四肢拘攣風行周身骨節夜痛目眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻鼈

元若作世

痔忍瘡

通按字書自吳塞曰

風癩癩疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內訕無所
不治服之令人有子方

澤蘭二兩六銖 藁本

當歸 甘草各一兩十八銖

紫石英三兩 芎藭

乾地黄 栝子仁

五味子各一兩半 桂心

石斛 白朮一兩六銖

白芷 茯苓

厚朴 防風

薯蕷 茯苓

乾薑 禹餘糧

細辛 卷栝各二兩 蜀椒

人參

杜仲 牛膝

蛇牀子 續斷

艾葉 蕪荑各十八銖 赤石脂 石膏各二兩

一有枳實十八銖

麥門冬一兩半

右二十二味為末蜜和為丸如梧子大酒服二十九至四十

丸又赤白痢去乾地黄石膏麥門冬栝子仁加大麥蘗陳翹

龍骨阿膠黃蓮各一兩半有鍾乳加三兩良

小澤蘭圓治產後虛羸勞冷身體羸瘦方

澤蘭二兩六銖 當歸

甘草各一兩十八銖 芎藭

栝子仁 防風

茯苓各一兩 白芷

蜀椒 藁本

細辛 白朮

桂心 蕪荑

人參 食茱萸

厚朴各十八銖 石膏二兩

令千金翼石...
食其未更

慈錄外...
悅並作手

右十八味為末，蜜和丸。如梧子大，酒服二十九丸，日三服，稍加至四十九丸。無疾者依此方。春秋二時常服，劑甚良。有病虛羸黃瘦者，服如前。一方無茯苓、石膏，有芍藥、乾薑。胡洽十五
仁人參食菜黃，除細辛、桂心，生用外，盡變色為未蜜丸。如彈子，大內暖酒中服之。千金翼無茯苓、食菜黃，有乾薑二兩。

紫石英、天門冬、主風冷在子宮，有子常墮落，或始為婦，便患心痛，仍成心疾。月水都未嘗來，服之肥充。令人有子方。

- 紫石英
- 天門冬
- 烏頭
- 菴蓉
- 桂心
- 甘草
- 五味子
- 栝子仁
- 石斛
- 人參

禹餘糧 各三兩
燕薹

澤瀉 一作澤

遠志

杜仲 各二兩

蜀椒

卷柏

寄生

石南

雲母

當歸 一作辛

烏賊骨 各一兩

右二十一味為末，蜜和為丸。梧子大，酒服二十九丸，日二服，加至四十九丸。

三石澤蘭圓，治風虛不足，通血脈，補寒冷。方亦名石斛澤蘭丸。

- 鍾乳
- 白石英 各四兩
- 紫石英
- 防風
- 藁本
- 茯神 各一兩六銖
- 澤蘭 二兩六銖
- 黃耆
- 石斛
- 石膏 各二兩
- 甘草
- 當歸
- 芍藥 各一兩
- 白朮
- 桂心
- 人參

乾薑 獨活 乾地黃各一兩 白芷
 桔梗 細辛 栝子仁 五味子
 蜀椒 黃芩 茯苓 芍藥
 秦艽 防葵各一兩 厚朴 燕萸各十八銖
 右三十一味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十
 九日一二服
 大平胃澤蘭圓治男子女人五勞七傷諸不足定志意除煩滿
 手足虛冷羸瘦及月水往來不調體不能動等病方
 澤蘭 細辛 黃耆 鍾乳各三兩
 栝子仁 乾地黃各二兩 大黃 前胡

遠志 紫石英各二兩 芎藭 白朮
 蜀椒各一兩 白芷 丹參 梔子一本用枳實
 芍藥 桔梗 秦艽 沙參
 桂心 厚朴 石斛 苦參
 人參 麥門冬 乾薑各一兩 附子六銖
 吳茱萸 麥蘖各五合 陳麴一升 棗五十枚作膏
 右三十一味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十
 九令人肥健一本無乾薑有當歸二兩
 澤蘭散治產後風虛方
 澤蘭九分 禹餘糧 防風各十分 石膏

白芷 乾地黄 赤石脂 肉蓯蓉

鹿茸 芎藭各八分 藁本 蜀椒

白朮 栝子仁各五分 桂心 甘草

當歸 乾薑各七分 蕪荑 細辛

厚朴各四分 人參三分

右二十二味治下篩酒服方寸匕日三以意增之

月水不通第二方

桃仁湯治婦人月水不通方

桃仁各半 朴硝元正消 牡丹皮 射干

土瓜根 黃芩各三兩 芍藥 大黃

柴胡各四兩 牛膝 桂心各二兩 水蛭

蟲蟲各七十枚

右十三味以水九升煮取五升半去滓分三服

乾薑圓治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胸中支滿肩背脊重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中百節盡痛心下常若懸痛時寒時熱惡心涎唾意出每愛鹹酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦難食不生肌方

乾薑二兩半 芎藭二兩 茯苓 硝石元正消 杏仁一合
水蛭五 蟲蟲 桃仁 蟾蜍一合

元正若作若

貝貝石作朴消一合

元崇胡有方子不
胡 薑各一兩无黃
胡 薑各一兩无黃

麤蟲各一
芍藥 二兩
人參 三兩
大黃 二兩
蜀椒 二兩

當歸 各二兩
柴胡 二兩

右十六味為末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知加至十

丸千金翼以療婦人
瘕結脅助下疾

乾漆湯治月水不通小腹堅痛不得迎方

乾漆 芍藥 細辛

甘草 附子 各一兩
當歸 桂心

芒硝 黃芩 各二兩
大黃 三兩
吳茱萸 正一升

右十二味以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內硝煇
盡分為三服相去如炊頃

芒硝湯治月經不通方

芒硝 丹砂 未
當歸 芍藥

土灰根 水蛭 各二
大黃 三兩
桃仁 升

右八味以水九升煮取三升去滓內丹砂芒硝分為三

服

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方

當歸 大黃 芍藥 各三兩
吳茱萸

乾地黄 乾薑 芎藭 蟲蟲

水蛭 各二 細辛 甘草 桂心 各一兩
按本方

梔子 十四枚
桃仁 升

右十四味㕮咀以水一斗五升煮取五升分爲五服一本有
牛膝麻子仁各二兩
桃仁湯治月經不通方

桃仁升一 當歸 土灰根 大黃二兩 翼
水蛭 蝨蟲 芒硝各二兩 牛膝

麻子仁 桂心各三兩

右十味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內硝合煇分爲三
服肘後無當歸麻子仁用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各一兩
服爲十二味并金翼無蝨蟲

前胡牡丹湯治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及勞熱熱
病後或因月經來得熱不通方

前胡 牡丹 玄參 桃仁

黃芩 射干 旋復花 栝蔞根

甘草各二兩 芍藥 茯苓 大黃

枳實各三兩

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服

乾地黃當歸圓治月水不通或一月再來或隔月不至或多或
少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體噓吸不欲食心
腹取痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動舉體沉重惟思
眠卧欲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黃三兩 當歸 甘草各一兩半 牛膝

芍藥

牡丹各一兩
六銖

乾薑

丹參

澤蘭

蜀椒

人參

白芷

黃芩

芍藥一兩十
八銖

桑耳

桃仁二兩

桂心各一兩

水蛭

麤蟲四十枚

水蛭各七枚

蒲黃二合

右二十一味為末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下十五丸，漸加至二十九以知為度。

牡丹圓治婦人女子諸病，後月經閉絕不通，及從小來不通，并新產後瘀血不消，服諸湯利血後餘痰未平，宜服之，取平復方。

牡丹三兩

芍藥

玄參

桃仁

當歸

蟾蜍二十枚

桂心各二兩

蠱蟲

水蛭各五枚

右十一味為末，蜜和丸如梧子大，酒下十五丸，加至二十九。

血盛者作散服，方寸匕，腹中當轉如沸，血自化成水去，如小便赤少，除桂心，用地膚子一兩。

黃芩牡丹湯治女人從小至大，月經未嘗來，顏色萎黃，氣力衰，少飲食無味方。

黃芩

芍藥各二兩

牡丹

芍藥

桃仁

枳實

瞿麥

射干

海藻

大黃各二兩

蠱蟲七十枚

水蛭五十枚

正小五三作二
元正汗作汗

蠶槽十枚

右十三味咬咀以水一斗煮取三升分三服服兩劑後多服
下一寸黑員際各五十壯

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裏內陰中入三寸每
丸一宿易之有汗出止

乾漆圓治月經不通百瘡不瘥方

- 乾漆 土瓜根 射干 芍藥各一兩半
- 牡丹 牛膝 黃芩 桂心
- 吳茱萸 大黃 柴胡各一兩 桃仁

之小五火作火下同

蠶甲各二兩

廣蟲

蠶槽各四枚

水蛭

蠶蟲各七枚

大麻仁合

亂髮雞子大

菴藷子合二

右二十味為末以蜜和為丸每日酒下十五丸梧子大漸加
至二十九日仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

- 大麻子升三 菴藷子升二 桃仁升一 竈屋焙煤兩四
- 土瓜根 射干各六兩 牛膝兩八 桂心兩四

右八味咬咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以三盞下前丸
藥甚良或單服之亦好

當歸圓治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所刺或赤

洪倫三百五

白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在月後方

當歸 葶藶 附子 吳茱萸

大黃各二兩 黃芩 桂心 乾薑

牡丹 芎藭各一兩半 細辛 秦椒

柴胡 厚朴各一兩六銖 牡蒙一方無 甘草各一兩

蠱蟲 水蛭各五枚

右十八味為末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸日再服胎勿服之

蠶甲圓治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水

不通或在月前或在月後服之三十日便瘥有孕此是河內太守魏夫人方

蠶甲 桂心各一兩半 蜂房兩半 玄參

蜀椒 細辛 人參 苦參

丹參 沙參 吳茱萸各十銖 麤蟲

水蛭 乾薑 牡丹 附子

皂莢 當歸 芍藥 甘草

防葵各一兩 蟪蟪二十枚 蠱蟲 大黃各一兩六銖

右二十四味為末蜜和丸如梧子大酒下七丸日二稍加之以知為度

母當作若

元无方

又方治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不時苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱心悶不欲食方

鼈甲一兩半

乾薑

赤石脂

丹參

禹餘糧

當歸

白芷用一方

乾地黃各一兩六銖

代赭

甘草

鹿茸

烏賊骨

殭蠶各十銖

桂心

細辛

蜀椒

附子各一兩

右十七味蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十丸

禹餘糧圓治婦人產後積冷堅癖方

禹餘糧

烏賊骨

吳茱萸

桂心

正味下有為末三字元
血為字

蜀椒各二兩半

當歸

白朮

細辛

乾地黃

人參

芍藥

芎藭

前胡各一兩六銖

乾薑三兩

礬石六銖

白薇

紫苑

黃芩各十八銖

麤蟲一兩

右十九味為末蜜和丸如梧子大空心酒若飲下二十九日不知則加之

牡蒙圓治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣或產後未滿百白胞絡惡血未盡便利於懸圓上及父坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或如針刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不

創子唐通走留
角傷也

消化上下通流或守胃管痛連玉門背膈嘔逆短氣汗出小腹
苦寒胞中創欬引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼
痛四肢沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或
月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥方亦
紫蓋丸

- 牡蒙 厚朴 消石 前胡
- 乾薑 麤蟲 牡丹 蜀椒
- 黃芩 桔梗 茯苓 細辛
- 葶藶 人參 芎藭 吳茱萸
- 桂心各十八銖 大黃二兩半 附子一兩六銖 當歸半兩

元青白黃赤作赤白
青黃

右二十味為末蜜和更搗萬杵如梧子大空心酒服二丸
且三不知則加之至五六丸下青白黃赤物如魚子者病根
出矣

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥方

- 大黃 消石各六兩 巴豆二十粒 蜀椒各一兩
- 代赭二兩 柴胡熬變色 水蛭 丹參熬金紫色
- 土瓜根各三兩 乾漆 芎藭 乾薑
- 蝨蟲 茯苓各二兩

右十四味為末巴豆別研蜜和丸如梧子大空心酒服二十九丸
知加五丸日再服丹參土瓜根

正二作三

元正加下有至字

大蠹蟲圓治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹癢痛宜服此
數有神驗方

蠹蟲 四百枚 蟻螬 一升 乾地黄 牡丹

乾漆 芍藥 牛膝 土瓜根

桂心 各四兩 吳茱萸 桃仁 黃芩

牡蒙 各三兩 茯苓 海藻 各五兩 水蛭 三百枚

芒硝 一兩 人參 一兩半 葶藶 五合

右十九味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七丸不知

加之日三服

桂心酒治月經不通結成癥瘕方

元正小五服下方正至
翼與坐消七季八字

桂心 牡丹 芍藥 牛膝

乾漆 土瓜根 牡蒙 各四兩 吳茱萸 一升

大黃 三兩 黃芩 乾薑 各二兩 蠹蟲 二百枚

蠶蟲 蟻螬 水蛭 各七十 亂髮灰

細辛 各一兩 殭蠶 五十枚 大麻仁 龜突墨 三升

乾地黄 六兩 虎杖根 鱉甲 各五兩 菴藟子 二升

右二十四味以酒四斗分兩甕浸之七日併下甕成攪

令調和分作四甕初服二合日二加至三四合

虎杖煎治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重月經不通亦治丈夫

病方

元正小五和作迂四
作兩

元正斗作升

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大斗半
去滓澄濾令淨取好醇酒五升和煎令如飴每服一合消
息為度不知則加之

又方治月經閉不通結瘕腹大如甕短氣欲死方

虎杖根百斤去頭去土瓜根 牛膝各取汁二斗

右三味咬咀以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗內土
瓜牛膝汁攪令調勻煎令如飴每以酒服一合日再夜一宿
血當下若病去止服

桃仁煎治帶下經閉不通方

桃仁 蠶蟲各一升 朴硝五兩 大黃六兩

元正斗作升

右四味為末別治桃仁以醇昔酒四斗內銅鑪中炭火煎取
二升下大黃桃仁蠶蟲等攪勿住手當欲可丸下朴硝更攪
勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一
宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或
如膏此是病下也

治月經不通臍下堅結大如杯盤發熱往來下痢羸瘦此為氣
瘕作疝後方一作血瘕若生肉瘕不可為也療之方

生地黃三十斤 乾漆一斤為末

右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒下如梧
子大三丸不知加之常以食後服

此藥方名生地黃丸
元盤作升集驗同
氣瘕作瘕氣
元板一作血瘕為細注

治月經不通甚極閉塞方

牛膝一斤 麻子三升蒸 土瓜根三兩 桃仁二升

右四味以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃仁 麻子仁各一升 菴藺子一升

右三味以好酒三斗浸五宿每服五合日三稍加至一升

五京圓治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹寒食得冷便下方

九痛七害見後 帶下兩中

元引異方无困字

乾薑 蜀椒各三兩 附子一兩 吳茱萸一升元小五引異

當歸 狼毒 黃芩 牡蠣各兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三九日二加至十丸此出

京氏五君故名五京又患冷困當服之

雞鳴紫圓治婦人癥瘕積聚方

皂莢一分 藜蘆 甘草 礬石

烏啄 杏仁 乾薑 桂心

巴豆各二 前胡 人參各四 代赭五分

阿膠六分 大黃八分

右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一丸至五

聖方一下有九字

九止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青微黃者心腹病
逐東都尉所上圓治臍下堅癖無所不治方

恒山

大黃

巴豆各一

天雄二枚

苦參

白薇

乾薑

人參

細辛

狼牙五合

龍膽一兩

沙參

玄參

丹參各三

芍藥

附子

牛膝

茯苓各五

牡蒙四分

瞿蘆六分一方云二兩三分

右二十味為末蜜丸宿勿食服五九日一大羸瘦月水不調
當二十五日服之下長蟲或下種種病出二十五日服中所
苦悉愈肥膚盛五十日萬病除斷緒有子

世崔氏本編二十八
崔氏菌和名

元聖方上二十作
十服

元緒下有者

牡蠣圓治經閉不通不欲飲食方

牡蠣四兩

大黃一斤

柴胡五兩

乾薑三兩

芎藭

茯苓各二兩

蜀椒十兩

葶藶子

芒硝

杏仁各五合

水蛭

蠱蟲各半兩

桃仁七十枚

右十二味為末蜜丸如梧子大飲服七九日三

當歸圓治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭各四兩

蠱蟲

烏頭

丹參

乾漆各一兩

人參

牡蠣

土瓜根

水蛭各二兩

桃仁五十枚

聖方

卷六

三

翼方酒上有水字又
酒下有各字

右十一味為末以白蜜丸如梧子大酒下三九日三服
消石湯治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方

消石

附子

蠱蟲各三兩

大黃

細辛

乾薑

黃芩各一兩

芍藥

土瓜根

丹參

代赭

蟬螬各二兩

大棗十枚

桃仁二升

牛膝一斤

朴硝四兩

右十六味以酒伍升水九升漬藥一宿明旦煎取四升
去滓下朴硝消石烱盡分四服相去如炊頃去病後食黃鴨
羹勿見風

孫真人備急千金要方卷之六

七言九病母病源
具

病源不通字
元

正小丘物作始
病源里作音

由作皮

淋作汁無作前
非却四字

孫真人備急千金要方卷之七

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

婦人方

赤白帶下崩中漏下第三論方
灸法

論曰諸方說三十六疾者十一上癥九痛七害五傷三瘕不通是
也何謂十一癥是所下之物一曰狀如膏二曰如黑血三曰如
紫汁四曰如赤肉五曰如膿茄六曰如豆汁七曰如茶羹八曰
如凝血九曰如清血血似米十曰如米泔十一曰如月洗作前
乍却十二曰經度不應期也何謂九痛一曰陰中痛傷二曰陰
中淋瀝痛三曰小便即痛四曰寒冷痛五曰經來即腹中痛六

分二

病源方作皮

三因方中上有陰

三因方載下有丹

三因方作惡

曰氣滿痛七曰汁出陰中如有蟲嚙痛八曰脇下分痛九曰腰
膝痛何謂七害一曰窮孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急
堅痛四曰藏不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少
七曰害吐何謂五傷一曰兩脇支滿痛二曰心痛引脇三曰氣
結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不
生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同具治之方
白聖圓治女人三十六疾方又方見後

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 白聖 | 龍骨 | 芍藥 | 黃連 |
| 當歸 | 茯苓 | 黃芩 | 瞿麥 |
| 白欬 | 石韋 | 甘草 | 牡蠣 |

各十
八銖

枳耳皮即枳皮十七
卷中有耳字次亦
同上林賦昔耳橙
榛香度亮有耳賦
知乃枳洪武韻耳
果名俗作枳

細辛

附子

禹餘糧

白石脂

人參

烏賊骨

藁本

甘草

大黃

已上各
半兩

右二十一味為末蜜和丸如梧子大空腹飲服十九日再不
知加之二十日知一月百病除若十二藏倍牡蠣禹餘糧烏
賊骨白石脂龍骨若九痛倍黃連白欬甘草當歸若七害倍
細辛藁本甘皮加椒茱萸各一兩若五傷倍大黃石韋瞿麥
若三痼倍人參加赤石脂礬石巴戟天各半兩合藥時隨病
增減之

治女人腹中十二疾一曰經水不特二曰經來如清水三曰經

千金方

卷七

七

姜全

正元冷作寒
按葵汁即葵菜
汁耳
正元病作疾

水不通四日不周時五日生不乳六日絕無子七日陰陽減少
八日腹苦痛如刺九日陰中冷十日子宮相引痛十一日經來
凍如葵汁狀十二日腰急痛凡此十二病得之時因與夫卧起
月經不去或卧濕冷地及以冷水洗浴當時取快而後生百病
或瘡痍未瘥復合陰陽及起早作勞衣單席薄寒從下入方

赤石脂

半夏 各一兩
六銖

蜀椒

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白欬

防風 各一兩

藿蘆 半兩

右十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服十九日三
不知稍加以知為度

白石脂圓治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣 各十
八銖

赤石脂

乾地黄

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白欬

細辛

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芎藭

甘草 各半兩

右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十五丸
日再一方有黃蘗半兩

小牛角鯁散治帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰

黃五辛同

千金方

卷七

三

付第

經脈作月經

李時珍曰牛角鯁即角中堅骨也

經脈未斷為房事則血漏四日經來舉重傷任脈下血五日產後臍開經利五育之病外實內虛方

牛角鯁一枚燒令赤 鹿茸

禹餘糧 當歸

乾薑

續斷各二兩 阿膠三兩

烏賊骨

龍骨各一兩

赤小豆二升

右十味治下篩於腹以酒服方寸七日三金翼無鹿茸烏賊骨一魚赤小豆

龍骨散治溽下十二病絕產二日白帶二日赤帶三日經水不利四日陰胎五日子藏堅六日藏癖七日陰陽患痛八日內強

九日腹寒十日藏閉十一日五藏酸痛十二日夢與鬼交宜服

厚下下本 之厚下下本 腹下厚下下本

外溽溽下作溽下 翼方王字秦本作 腹下 翼方歲下有字字 按月胎未詳恐病 源所後鬼胎是 翼文作為夫婦 溽下細匡王字秦 按正翼方有

龍骨 三兩

黃蘗

半夏

竈中黃土

桂心

乾薑 各二兩

石韋

滑石 各一兩

烏賊骨

代赭 各四兩

白殭蠶 五枚

右十味治下篩酒服方寸七日三白多者加烏賊骨殭蠶

各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃蘗二兩子藏堅加

乾薑桂心各二兩已上各隨病增之服藥三月有子即住藥

藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

治女帶下諸病方

大黃蒸三斗米下 附子

茯苓

牡蒙

牡丹

桔梗

葶藶 各三兩

厚朴

正元下有人

芎藭 人參 當歸 蜜蟲
 蜀椒 吳茱萸 柴胡 乾薑
 桂心 各半兩 細辛 二兩半

右十八味為末，蜜和丸，如梧子大，每日空心酒服十九丸，不知加之以腹中溫溫為度。一本有麻子三兩，澤蘭十兩，而無蜀椒、葶藶。

治帶下百病無子，服藥十四日，下血二十日，下長蟲及青黃汁，出二十日，病除，五十日肥白方。

大黃破如豆粒 柴胡 朴硝 各一斤 芎藭 五兩
欬金黑色 蜀椒 各一升 茯苓 如雞子
 右七味為末，蜜丸，如梧子大，先食米飲服七丸，不知加至

此方名之三，名大黃，四分量不同。

元外并作斤

外血水者，重得四字

元無下字

九以知為度

治帶下方

枸杞根 一升 生地黄 五升

右二味以咀，以酒一斗煮取五升，分為三服，水煮亦得。治婦人及女子赤白帶下方。

禹餘糧 當歸 芎藭 各一兩 赤石脂
 白石脂 阿膠 龍骨 石葦 一兩六銖
 烏賊骨 黃蘗 白欬 黃芩 用黃連
 續斷 桑身 牡蠣 各一兩

右十五味為末，蜜丸，如梧子大，空心飲下十五丸，日再加至

二十九為度

白馬蹄圓治女人下焦寒冷成帶下赤白洗方

白馬蹄 鱉甲 鯉魚甲 龜甲

蜀椒各一兩 磁石 甘草 杜仲

葶藶 當歸 續斷 芎藭

禹餘糧 桑耳 附子各二兩

右十五味為末蜜丸梧子大以酒服十九加至二十九日三服一本無龜甲

白馬駝散治帶下方取白者取白馬駝下赤者取赤馬駝隨色取之

白馬駝二兩 龜甲四兩 鱉甲十八銖 牡蠣一兩十八銖

字典駝音毛馬長

右四味治下篩空心酒下方寸匕日三服加至二七半治五色帶下方

服大豆紫湯日三服方見前卷風篇中

又方燒馬左蹄為末以酒服方寸匕日三服

又方燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸匕

又方煮龜帶汁服一杯良

又方燒馬蹄底護乾為末以酒服之方寸匕日三

雲母芎藭散衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛固生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛與子藏相通小便不利常拘急頭眩項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得母

外血和毛皮三午

元之血

脈經曰白崩者形如淡赤崩者形如綠汁黃崩者形如爛肉崩者形如血也

翼魚上下

正元方無
引翼名醫甲散元東
門也本有乾姜三兩
竟骨一分白朮手兩
為十四味

腹中急痛食不下吞醋噎苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁六
臭如膠泔衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即
下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便
發動大惡風寒方

雲母 芎藭 代赭 東門邊木燒各一兩

白僵蠶 烏賊骨 白堊 蛭皮各六銖

鼈甲一作龜甲 桂心 伏龍肝 生鯉魚頭各十八銖

右二味治下篩酒服方寸七日三夜一下方有龍骨乾薑

慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏
色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心

翼至下有六

翼方食以下作食人
倚生氣三少食不至
肌膚腫背表痺
連兩脚不去久至但
欲得卧神疲
翼方慎上有火

兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能
久立每嗜卧困懶又方見後

慎火草 白石脂 禹餘糧 鼈甲

乾薑 細辛 當歸 芎藭

石斛 芍藥 牡蠣各二兩 黃連

薔薇根皮 乾地黄各四兩 熟艾 桂心各一兩

右十六味治下篩空腹酒服方寸七日三稍加至二七若寒

多者加附子椒熟多者加知母黃芩各一兩白多者加乾薑

白石脂赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓治崩中赤白不絕困篤方

正字泰按正程翼方
桂心无

翼方于下有万字
於下有石斛

羽異方度下有不知
稍加至三十九

禹餘糧 五兩
白馬蹄 十兩
龍骨 三兩
鹿茸 二兩

右五味為末，蜜丸，梧子大，以酒服二十丸，日再服，以知為度。增損禹餘糧，圓治女人勞損，因成崩中，狀如用經來去多不可，禁止積白，不斷五臟空虛，失色黃瘦，崩竭暫止，少白復發，不耐動搖，小勞輒劇。治法且宜與湯，未宜與此丸也。發時服湯減退，即與此丸，若是疾久，可以長與此方。

禹餘糧
紫石英
五味子
龍骨
烏頭
遠志
澤瀉
人參
寄生
杜仲
桂心
當歸

石斛
牡蠣
右十八味為末，蜜丸，梧子大，空心酒下，十九漸加至二十九，日三服。
治女人白崩及痔病方

槐耳
白芷
當歸
乾地黄
白馬蹄
白飲
黃耆
禹餘糧
蝟皮
艾葉
人參
橘皮
茯苓
蒲黃
續斷
牛角觥
猪後懸蹄

千金方 卷七

右十七味為末蜜丸每白空心酒下二十九日二加之
治婦人忽暴崩中去血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根 六兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

芎藭 各三兩

生地黄 八兩

釜月下土 續斷

地榆 各四兩

馬通 一升 赤帶用赤馬 白帶用白馬

右十味咬咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服不止頻服三四劑未全止續服後方

續斷

甘草

地榆 六分 集驗

鹿茸

小薊根

丹參 各三十銖

乾地黄 一兩 芎藭 半兩

赤石脂

阿膠

當歸 各一兩 龜甲 半兩

通下疑有什

集驗乾地黄十方

夫亦必據之方

秦牛角 各三兩 剉 栝子仁 一兩 作栝葉 驗
右十四味為末蜜丸梧子大空心以酒服十九日再後稍加至二十九

治女人崩中去赤白方

白馬蹄 五兩

蒲黃

鹿茸

禹餘糧

白馬鬃毛

小薊根

白芷

續斷 各四兩

人參

乾地黄

栝子仁

烏賊骨

黃耆

茯苓

當歸 各三兩

艾葉

菴蓉

伏龍肝 各二兩

右十八味為末蜜丸如梧子大空心飲服二十九日再加至

四十九

當歸湯治崩中去血虛羸方

當歸

芍藥

黃芩

芍藥

甘草 各二兩

生竹茹 二升

右六味以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

芍藥

芎藭

芎藭八兩以酒五升煮取三升分三服不飲酒者水

者亦得

治崩中下血出血下斛服之即斷或月經來過多及過期不來

元西者

主治溫經湯
外臺解作斗

者服之亦佳方

吳茱萸

當歸 各三兩

芍藥

人參

芍藥

牡丹

桂心

阿膠

生薑

甘草 各二兩

半夏 八兩

麥門冬 一升

右十二味以水一斗煮取三升分為三服

治暴崩中去血不止方

牡蠣

兔骨 各二兩
半炙

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治女人白崩方

芍藥

桂心

阿膠

赤石脂

千金方

卷七

九

隨秋

元正子作九

按時珍云牛角解
角天中經骨也角
中仁即是

小蘗根各二兩 乾地黄 四兩 伏龍肝 如雞子
大七枚

右七味咬咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令燂

盡分三服日三味無伏龍肝

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝 七枚 生薑 五兩 生地黃 四升 一甘草

艾葉 赤石脂 桂心 各二兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

大牛角中人散治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沉重虛極

方 牛角仁 燒 續斷 乾地黄 桑耳

引異方二他三

元正升宜室二可作
三斤

白朮 赤石脂 礬石 乾薑

附子 龍骨 當歸 各三兩 人參 一兩

蒲黃 三兩 防風 二兩 禹餘糧 各二兩

右十五味治下篩以溫酒末食服方寸七日不知稍加

治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉 二斤 乾薑 當歸 各三兩 生地黃 二升

右四味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黄汁及諸

藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

生地黃湯治崩中漏下日去數升方

生地黃 一斤 細辛 三兩

卷七

右二味吹咀以水一斗煮取六升服七合以服佳
治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲

牡蠣各二兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方燒亂髮酒和服方寸七日三

又方

桑耳正二半一兩

鹿茸十八銖

右二味以醋五升漬炙燥清盡為度治下篩服方寸七日三

又方燒鹿角為末酒服方寸七日三

又方燒桃核為末酒服方寸七日三

又方

地榆 知母

右二味各指大長一尺者吹咀以醋一升東向竈中治極濃

去滓服之

又方桑木中蟬屎燒灰酒服方寸七

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭

蜀椒二兩六銖

藁本

栝子仁

山茱萸

厚朴各十八銖

乾地黄

牡蠣各一兩半

代赭

桂心

防風

細辛

乾薑各一兩

甘草

當歸

芎藭各一兩八銖

蟬當作蟬本豆桑桑
三歲出一年桑蟬

金匱要略 卷十 崩漏 二頁上

蕪荑兩半
右十七味治下篩空心温酒服方寸七日三神良一方加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖為二十味正作九

治崩中方
白茅根斤三 小薊根斤五

右二味吹咀以水五斗煎取四斗稍稍服之外重用酒煎

丹參酒治崩中去血及產餘疾方

丹參 艾葉 地黃 忍冬

地榆各五斤

右五味剉先洗白熟春以水漬三宿出滓煮取汁以黍米一

外重中作升

丹參方產下有後。字外重同

外系作糯

元正飯作計 字各權同醉壓酒具也

解脈即解若止血及血崩即解葉也 見本草三十卷又按証類本草解若解云取脈多用二亩長觀之解脈乃為解脈无疑

解飲釀酒酒熟榨之初服四合後稍稍添之

牡丹皮湯治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮 乾地黃 解脈各三兩 禹餘糧

艾葉 龍骨 栝葉 厚朴

白芷 伏龍肝 青竹茹 芎藭

地榆各二兩 阿膠一兩 芍藥四兩

右十五味吹咀以水一斗五升煮取五升分五服相去如人行十里又再服

治崩中單方

燒牛角末以酒服方寸七日三服亦治帶下

李時珍曰脂言美亦作腴一名腎脂生兩腎間似脂非脂似肉非肉

又方桑耳燒令黑為末酒服方寸七日二服亦治帶下
又方生薊根一斤半搗取汁温服亦可酒煮服之
又方羊脂一具以酢煮去血服之即止忌猪魚鮓滑物犯之便
死亦治帶下

正元作酢

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸肉踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使胞門不閉淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸斷血湯宜且與牡丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所去淋瀝便自止亦漸變

牡丹丸見月經不通中

正治作服

消也此後有餘傷毀不復處此乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛心悶眩暈頭重目暗耳聾滿舉頭便悶欲倒宜且煮當歸芎藭各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續灸合諸湯治之

白聖圓治女人三十六疾胞中病漏下不絕方元十一字元見前分兩不向

邯鄲白聖 禹餘糧 白芷 白石脂

乾薑 龍骨 桂心 瞿麥

大黃 石韋 白欽 細辛

芍藥 甘草 黃連 附子

當歸

茯苓

鍾乳

蜀椒

黃芩各半兩

牡蠣

烏賊骨各十銖

右二十三味為末蜜丸梧子大空心酒服五九日再服不知

加至十九

治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體瘦飲食減少或赤或白

或黃使人無子者方

牡蠣

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

桂心

烏賊骨

禹餘糧各等分

右七味治下篩空心酒服方寸七日二白多者加牡蠣龍骨

烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍肝桂心隨

按文仲方五肘後同

疾加之張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散方

鹿茸

阿膠各三兩

烏賊骨

當歸各二兩

蒲黃兩

右五味治下篩空心酒服方寸七日三夜再服

治女人產後漏下及痔病下血方

礬石兩

附子一枚

右二味為末蜜丸如梧子大空心酒下二九日二稍加至五

丸數日瘥能百日服之永斷

芎藭湯治帶下漏血不止方

芍藥

乾地黄

黃耆

芍藥

吳茱萸

甘草各二兩

當歸

乾薑各三兩

右八味以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤

白不止者除地黄吳茱萸加杜仲人參各二兩

治漏下去血不止方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

治漏下神方

取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥

治漏下去血方

乾椽

麻黃

細辛

桂心各一兩

甘草半兩

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

治漏下去赤方

白朮二兩

白薇半兩

黃蘗二兩半

右三味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去黃方

黃連

大黃

桂心各半兩

黃芩

麤蟲

乾地黄各六銖

右六味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去青方

千金方

卷之七

七

婦科

大黃

黃芩

白薇各半兩

桂心

牡蠣各六銖

右五味治下篩空志酒服方寸七日三

治漏下去白方

鹿茸一兩

白鯁十八銖

狗脊半兩

右三味治下篩空志米飲服方寸七日三

治女子漏下積年不斷困篤方

取鵲巢柴燒灰作末服方寸七日三服二十日愈甚良

重巢者去年在巢中產今年又在上作重巢產者是也

馬通湯治漏下血積月不止方

羽翼方與赤馬凡馬亦得

羽翼方好里生作眉里生手輝九火

赤馬通汁

一升取新馬屎絞取汁

生艾葉

阿膠各兩

當歸

乾薑各二兩

好墨半兩

右六味以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及

膠微火煎取二升分再服相去如人行十里久

馬蹄屑湯治白漏不絕方

白馬蹄

赤石脂各五兩

禹餘糧

烏賊骨

龍骨

牡蠣各四兩

附子

乾地黃

當歸各三兩

甘草二兩

白僵蠶一兩

右十一味以水二斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓治白漏不絕方

蹄下恐脫屑字
羽翼方有炙令屑
連四字

元黃上有金字
羽異方茸作角

白馬蹄

禹餘糧各四兩

龍骨三兩

烏賊骨

白殭蠶

赤石脂各二兩

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九不知加至二十九

慎火草散治漏下方又防見前

慎火草十兩

當歸

鹿茸

阿膠各四兩

龍骨半兩

右五味治下篩先食酒服方寸七日三十里又

蒲黃散治漏下不止方

蒲黃半升

當歸各二兩

右三味治下篩酒服五分七日不知稍加至方寸七

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸

女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒灸關儀百壯穴在

膝外邊上一寸宛宛中是女人漏下赤白及血灸足太陰五十

壯穴在內踝上三寸足太陰經內踝上三寸名三陰交

女人漏下赤白月經不調灸交儀三十壯穴在內踝上五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後兩邊池中

脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴在內踝下五分微

動脚脉上

冠於元及中央隆
高也

豕蝨溝一名交儀

女人漏下赤白泄注炎陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下屈裏表頭白肉際是

月經不調第四方

白聖圓治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不
斷或來而腰腹痛嘔吸不能食心腹痛或青黃黑色或如水舉
體沉重方

白聖

白石脂

牡蠣

禹餘糧

龍骨

細辛

烏賊骨

當歸

芍藥

黃連

黃芩

乾薑

桂心

人參

瞿麥

石膏

元无黃卷有祇

白芷

白欬

附子

甘草 各一兩

蜀椒 半兩

右二十一味為末蜜丸如梧子大空心酒下二十九日三
月候來時日四五服為佳

桃仁湯治產後及隨身月來不調或淋瀝不斷斷後復來狀如
瀉水四體嘔吸不能食腹中堅痛不可行動月水或前或後或
經月不來舉體沉重惟欲眠卧多思酸物方

桃仁 五十枚

澤蘭

甘草

芎藭

人參 各二兩

牛膝

桂心

牡丹皮

當歸 各三兩

芍藥

生薑

半夏 各四兩

元未作水

地黃 八兩

蒲黃 七合

右十四味咬咀以水二斗煮取六升半分六服

杏仁湯治月經不調或一月再來或兩月三月一來或月前或月後閉塞不通

王正月坐日異方一作不來

杏仁 二兩

桃仁 一兩

大黃 三兩

水蛭

蠱蟲 各三十枚

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服下服當有物隨大便

小便有所下下多者止之少者勿止盡三服

大黃朴硝湯治經年水不利胞中有風冷所致宜下之方

大黃

牛膝 各五兩

朴硝

牡丹

甘草

紫苑 各三兩作紫葳代赭 一兩

桃仁

蠱蟲

水蛭 各三兩元作上者至乾薑

細辛

芒硝 各二兩 麻仁 五合

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升去滓肉硝念烱分

五服五更爲首相去下炊頃自下後將息忌見風

榮莖蠱蟲湯治久寒月經不利或多或少或方

吳茱萸 三升

蠱蟲

水蛭

廬蟲

牡丹 各一兩

生薑 一斤

小麥

半夏 各一升

大棗 二十枚

桃仁 五十枚

人參

牛膝 各三兩

桂心 六兩

甘草 一兩半

芍藥 二兩

引異方下有病二字

右十五味以酒一斗水二斗煮取一斗去滓適寒温服一升日三不能飲酒人以水代之湯欲成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

小丘党作虎王字非引異方作党

抵党湯治月經不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急方
虎掌作虎杖 大黃各二兩 桃仁三十枚 水蛭二十枚

右四味以水三升煮取一升盡服之當下惡血為度

七熬圓治月經不利手足煩熱腹滿默默不欲寤心煩方

大黃一兩半 前胡柴胡作 芒硝熬各五兩 葶藶

蜀椒并熬各六銖 生薑 芎藭 茯苓十五銖

杏仁九銖 熬 桃仁二十枚 水蛭正各五合 熬 蠱蟲熬

元水蛭去頭與各半合

引異方治作寐

引異方一倍作至十九治宜先食服之九字

右十二味為末蜜丸梧子大空腹飲服七九日三不知加一倍千金翼無芎藭又一左有蠱蟲牡丹各二兩為十四味

桃仁散治月經來繞臍痛上衝心胸往來寒熱如瘧症狀方

桃仁五十枚 蠱蟲二十枚 桂心五寸 茯苓一兩

薏苡仁 牛膝 代赭各二兩 大黃八兩

右八味治下篩宿勿食温酒服一錢七日三

治月經往來腹腫腰痛方

麤蟲四枚 蜀椒 乾薑各六銖 大黃

女青 桂心 芎藭各半兩

右七味治下篩取一刀圭先食酒服之日三十日微下善養

引異方温上右明朝宜腹四字日三三三三

引異方无症字无无方字

千金方

千金方

卷七

三

三百四十八

治月經不調或月頭或月後或如豆汁腰痛如折兩脚疼胞中風寒下之方

大黃

朴硝各四兩 牡丹三兩

桃仁一升

人參

陽起石

甘草

水蛭

蝨蟲各二兩

右十味以水九升煮取三升去滓內朴硝令烱盡分三服相去如一飯頃

陽起石湯治月水不調或前或後或多或少乍赤乍白方

陽起石

甘草

續斷

乾薑

人參

桂心各二兩 附子一兩

赤石脂三兩

伏龍肝五兩

生地黃一升

右十味以水一斗煮取三升二合分四服日三夜一

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃

芍藥

蝨蟲各二兩

土瓜根

蜀椒

黃芩

白朮

地骨皮一作炭

乾薑

芎藭各一兩

桂心

乾漆各一兩半

右十二味為末蜜丸如梧子每服十九日三不知加之
牛膝圓治產後月水往來乍多乍少仍復不通時時疼痛小腹

聖方名出處凡

証類廣文一名占

裏急下引腰身重方

牛膝

芍藥

人參

大黃 各三兩

牡丹皮

甘草

當歸

芎藭 各二兩

桂心 一兩

麝蟲

蟻螬

蜚蠊 各四十枚

蠱蟲

水蛭 各七十枚

右十四味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知稍增

又方鹿角末服之良

又方生地黄汁三升煮取二升服之

又方飲人乳汁三合善

又方燒月經衣并花水服之

蜚蠊見本草四十一

元正良字元

元正善字元

又方燒白狗糞焦作末酒服方寸匕日三六次五服外
又方取白馬尿服一升良
治月經不斷方

船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

又方服地黃酒良

又方服大豆酒佳

又方燒箕舌灰酒服之

又方灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

正元酒下有亦字

孫真人備急千金要方卷之七

千金方

卷七

三三

付留二百个五个

經真入前卷千金要方卷之十

又六味肉桂下白內含青熟上調半錢

又六味藥子牙

又六味大豆黃卷

又六味黃芩

破破一尺年表河水四升半煮爛二升餘二服

飲時惡不瀉

又六味白黑氣類一升

又六味白術

丙辰秋八月廿二天戶孟通按



