

千金方 六

卷八之十一

序例
驚癇
傷寒
客忤
初生出腹

少小嬰孺方 凡九板

中武 9

175
6



一




論曰夫生民之道莫不以養小為大若無於上豈不成於下哉

少小嬰痛方上

序例第一方

論曰夫生民之道莫不以養小為大若無於上豈不成於下哉
 稱積小以成大詩有賦初生民得而養于生隱於此之二義
 是從世道者自必及長人情其見不待言也故今斯方先
 小曰而後大夫者則其意亦以養小為大也夫養小者
 士欲留心於此則其功蓋難矣之語者亦不有也夫養小
 世保之內此



明武
潘
卷 6

篤信堂



外至无族字成下有萬

孫真人備急千金要方卷之八

宋朝奉即守太常少卿充祕閣校理林億等校正

少小嬰孺方上

序例第一方

論曰夫生民之道莫不以養小為大若無於小卒不成大故易
稱積小以成大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義即
是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人
小兒而後丈夫者老者則是崇本之義也然小兒氣執微弱醫
士欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於
襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜思之可為



篤信堂

小品方云靈托腐氣
夫常扁
今本外臺作十六

抄巫坊不知何代人呂氏
後文並云巫彭初作巫
妨彭音相近也其一人
再再按婦人良方引嬰
產室鑑集云小兒方
論起自巫方黃帝云
音不能察知此賴國有
巫方能知小兒毒毒耳
依此則巫方黃帝時人
在此層裡中古不及
大千脚覽引仲景方
序仲景弟于廣說按
小兒觀經方三卷
按律王丰詳其名隨經
籍志律王方五卷徐
王八世家効驗方十卷

說文云咳小兒笑也
外臺引崔氏任作百
和作知
此異方凡作觀
元外正作定

三編原下二十作三十
元畢作畢蒸後以下
十六字元

太息者美小品方云凡人年六歲已上為木十六歲已上為少
巢源外臺作十三十已上為壯巢源外臺作二十五已上為老
八已上為少其六歲已下經所不載所以乳下嬰兒有病難治者皆為無所
承據也中古有巫妨巢源作巫方者立小兒顛顛經以占天壽判疾
病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳
習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者
頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少小詳其方意不甚
深細少有可採未為至秘今博撰諸家及自經用有效者以為
此篇凡百居家皆宜持茲養小之術則無橫天之禍也又曰小
兒病與大人不殊惟用藥有少為異其驚癇客忤解顛不行

等八九篇合為此卷下痢等餘方並散在諸篇可披而得之
凡生後六十日瞳子成能咳笑應和人百日任脉成能自反覆
五十日一作百百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐
三百日臑骨成能獨立三百六十日膝骨成能行此其足法若
不能依期者必有不平之處
凡兒生三十二日一變六十四日再變且蒸九十六日三變
一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日
六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸
二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日
小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二

病源凡作龍魚上有
久字翼同
現呼世云吃乳

病源云近者五日而散
遠者八九日乃散

十八日復太蒸凡小兒自生三十二日一變再變為二蒸凡十
變而五小蒸又三太蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人
小兒所以變蒸者是榮其血脉改其五臟故一變竟輒覺情態
有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體
熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出其重
者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐現目白精微赤
黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證
也單變小微蒸小劇凡蒸畢者五日而衰遠者十日而衰先
期五日後之五日為十日之中熱乃除耳兒生三十二日一變
二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸乃畢耳恐

翼束作重

病源此在作此系双
九下同

不解了故東說之且變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸
或早或晚不如法者多又初變之時或熱甚者違日數不歇審
計變蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之若
良又熱不可已少與紫丸微下熱歇便止若於變蒸之中加以
時行溫病或非變蒸時而得時行者其診皆相似惟耳及尻通
熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當
歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有寒加之
即寒熱交爭腹腰夭亂啼不止者熨之則愈也熨法出下篇灸
粉絮熨者是
變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身熱耳熱尻亦熱此乃為他
病可作餘治審是變蒸不得為餘治也

病源膠作痛
天亂文說文屬世亂王逸
楚辭注庚也又存注說
文云天臨其頭臨其
顛作伏倚不伸也後作
厥軀亦同

病源定作麥
丹孔蓋理肚也

字典高、從立頁

外渠引崔氏
病源云溫積體壯名曰
溫壯若黃白而酢臭則
挾宿不、步腹紫紫丸

又一法凡兒生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變
變且蒸其狀卧端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄
至一百二十八日四變變且蒸以能咳笑也至一百六十五日
變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機成也至二
百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸
以知欲學語也至二百八十八日九變以亭亭然也凡小兒生
至二百八十八日九變四蒸也當其變之日慎不可妄治之則
加其疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脉亂汗出是也
近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也
紫圓治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹

母病源云服里散發汗
不止者服此方非結腸
丸蓋當此方非結腸
病中所載此方也

元在作麥
病源云服里散發汗
不止者服此方非結腸
丸蓋當此方非結腸
病中所載此方也

中有痰癖哺乳不進乳則吐現食瀉先寒後熱方

赤石脂

代赭各一兩 巴豆三十枚 杏仁五十枚

右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵當自相
得若硬入少蜜同搗之密器中收三十日兒服如麻子一九
與少乳汁合下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除
若未全除明旦更與一九百日兒服如小豆一九以此準量
增減夏月多熱善令發疹二三十日輒一服佳紫圓無所不
瘳雖下不虛久

黑散治小兒變蒸中挾時行溫病或非在蒸時而得時行者方

麻黃

杏仁 各半兩 大黃 陸銖

右三味先搗麻黃大黃為散別研杏仁如脂乃細細內散又搗令調和內密器中二月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱冷得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之

擇乳母法

凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎於喜怒夫乳母形色所宜其候其後不可求備但取不胡臭瘦瘦氣嗽癆疥癩癰白禿癰瘍審唇耳聾鼻癢癩無此等疾者便可飲兒也師見其故灸癰便知其先疾之源也孫真人備急千金要方卷之八

文選曹植上責強心詔表注云五情但喜怒哀樂愁也

外聖癰作瘡癰癰至心方作癰癰

孫真人備急千金要方卷之九

分三 宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

初生出腹第二論

論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此為之玉衡街若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣兒生落地不作聲者取暖水一器灌之須臾當啼兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐徐鞭之即啼兒已生即當舉之舉之遲晚則冷中寒腹內雷鳴乃先浴之然後斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留

外聖刊雀氏

千金方

卷九

美全

外至作吉

外多作若

嬰而作及
凡小兒以下病痲原

外下凡以下有日

臍帶令至兒足踏上短則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷
 臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中
 多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍者當令長六
 寸長則傷肌短則傷藏不以時斷若按汁不盡則令暖氣漸微
 自生寒令兒臍風生男宜用其父故衣裹之生女宜以其母故
 衣皆勿用新帛為善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜
 瘡而黃兒衣綿帛特忌厚熟慎之慎之凡小兒始生肌膚未成
 不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風則令
 肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也凡天和暖
 無風之時令母將兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉

外若時作亦見
腹下有中血日

牢密堪耐風寒不致疾病若當藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶
 陰地之草木不見風日軟脆不堪風寒也凡裹臍法椎治白練
 令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等令之調其緩急則令兒
 吐乳兒生二十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者
 此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹臍時閉戶下帳燃火
 令帳中溫暖換衣亦然仍以溫粉粉之此謂冬時寒也若臍不
 愈燒絳帛末粉之若過一月臍有汁不愈燒蝦蟆灰粉之日三
 四度若臍中水及中冷則令兒腹絞痛天紅啼呼面目青黑此
 是中水之過當火粉絮以熨之不時治護臍至腫者當隨輕重
 重者便灸之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼

呼者搗當歸末和胡粉傅之灸紫日熨之至百日愈以啼呼止
為候若兒糞青者冷也與臍中水同兒洗浴斷臍竟襁抱畢未
可與朱蜜渣與甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二
合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜺殼入腹
止兒當快吐吐去心胃中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不
得吐可消息計如飢渴須更更與之若前所服及更與並不得
吐者但稍稍與之令盡此一合止如得吐出惡汁冷兒心神知
慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不食惡血耳勿復與甘草
湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者
不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癩氣急變瘰癧而死新生

元出作去

與朱蜜法以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜺殼和之以綿纏
筋頭沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此二豆許可三日與
之則用三豆許也勿過此則傷兒也與朱蜜竟可與半黃如朱
蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病
也新生三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄
以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之滿七日可與哺也
兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗
若乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺者令兒
無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復
發令兒疳弱難養二十日後雖哺勿多若不嗜食勿強與之不

外三作二

元正小五之下有陸
再之三子

外翼以下十七元

消復生疾病哺乳不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫凡微
下之節哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦當爾利之要當下之
然後乃瘥凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也
以空乳乳之即消且四乳兒若臍未愈乳兒太飽令風中臍也
夏不食熱乳冷兒嘔逆冬不食寒乳冷兒效痢母新房以乳兒
冷兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令變黃不能食母怒以
乳兒令喜驚發氣疝又令上氣癩狂母新吐下以乳兒令虛羸
母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月內常飲猪乳大佳
凡乳母乳兒滿先極授散其熱氣勿令汗奔出令兒嗜睡奪其
乳令得息息已復乳之如是十送五返視兒飢飽節度知一日

正母作如

元逆作返外壁作
飽下有以字度下有
二字

外常下有啤

外又作乳也作忘之

元下又作又

元正三作兩
外飛根湯作雀氏

元正小丘又作至

三五四水

中幾乳而足以爲常又常捉去宿乳兒若卧乳母當以臂枕之
給乳與兒頭平乃乳之令兒不嗜母欲寐則奪其乳恐填口鼻
又不知飢飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失
所令兒驚亦致五藏疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不
可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癩若不浴久令兒毛落新
生浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿
以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二三
枝亦得取咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒
終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以艾虎湯浴艾一斤虎頭骨一
枚以水三斗煮爲湯浴但須浴即煮用之凡小兒初出腹有鵝

一

卷九

四

末

外聖小兒以下引文伸
扶三日夫李夫人德函
扶以候風兮章昭
曰扶者荷葉未啓也
粟莢是粟葉微黃也

口者其舌上有白屑如米劇者鼻中亦有之此由兒在胞胎中
受穀氣盛故也或妊娠時嗜糯米便之然治之之法以髮纏筋
頭沾井花水撩拭之三日如此便脫去如不脫可煮栗扶汁令
濃以綿纏筋頭拭之若春夏無栗莢可煮栗木皮如用井花水
決小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下後
喜冷兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有血出無害者血
出不止可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六七日後其
血氣收斂成肉則口舌喉項裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆
簾或米狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留刀處如粟米
許大以針刺決之令氣泄去毒黃赤血汁也一刺之止消息一

千餘方

卷六

四

四百八十六个

翼元喉作假
翼有下有赤

日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦
止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如
此者名重腭有著齒斷上者名重齒皆刺去血汁也小兒生輒
死治之法

當喉視兒口中懸癰前上腭有胞者以指摘取頭決令潰去
血勿令血入咽入咽殺兒急急慎之

小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其
血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口
撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脈不斂也喜不育若
有如此者皆宜與龍膽湯也

方出下
驚痛篇

王充論衡云見生辨
啼之聲鳴即高暢
者壽斯渴温下者天
何則稟丹天之氣以
氣多少為天性也
王月堂校正翼無作
右

羽異在下有人

翼齒下有生

翼腹上有兒而
三字

翼尻作豚侶路音
通松物而生也

翼身有生
外身有肉

相兒命短長法

兒初生吐聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽
 啼聲散不成人
 膻中無血者好
 通身軟弱如無骨者不壽
 鮮白長大者壽
 目視不正數動者大非佳
 汗不流不成人
 頭四破不成人
 昂坐昂行昂齒昂語皆惡性非佳人
 自開目者不成人
 汗血者多厄不壽
 小便凝如脂膏不成人
 常搖手足者不成人

頭毛不周匝者不成人
 額上有旋毛者昂貴妨父母
 兒生枕骨不成者能言而死
 尻骨不成者能倨而死
 踵骨不成者能行而死
 身不收者死
 股間無生肉者死
 陰不起者死
 卯縫通達黑者壽
 論曰兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其天壽太
 髮稀少者強不聽人不聽作
見初生陰大而身色同者成人
 掌骨不成者能匍匐而死
 臍骨不成者能立而死
 魚口者死
 頤下破者死
 陰囊下白者死赤者死

史記斗羅日理臺生
七歲為孔子師

翼成作羊

略兒小時識悟通敏過人者多天大則項囊頰回之流是也小
兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人
意迴旋敏速者亦天即楊修孔融之徒是也由此觀之天壽大
略可知也亦猶梅花早發不觀歲寒其菊晚成終於年事是知
晚成者壽之兆也

孫真人備急千金要方卷之九

孫真人備急千金要方卷之十

分四

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

少小嬰孺方

驚癇第三

論候癇法
方灸

論曰少小所以有癇病及瘈病者皆由臟氣不平故也新生即
癇者是其五臟不收斂血氣不聚五臟不流骨法不成也多不
全育其一月四日已上至期歲而癇者亦由乳養失理血氣
不和風邪所中也病先身熱擊瘈驚啼喚而後發癇脈浮者
為陽癇病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚擊不啼
呼而病發時脈沉者為陰癇病在五臟內在骨髓極難治也病

臧元作肺

千金方

卷十

羅凡利

元不作下

神農本草經蛇脫條主小兒百二十種驚癇瘈瘲外腹作胎

外星及以下十四字无

千至其風作食外風驚作風癇

發身軟時醒者謂之癇也身強直反張如弓不時醒者謂之瘈也諸反張太人脊不容側手小兒容三指者不可復治也凡脉浮之與沉以判其病在陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澁虛實遲駛諸證各依脉形為治神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常便是癇候也初出腹血脉不斂五臟未成稍將養失宜即為病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇及變蒸日滿不解者並宜與龍膽湯凡小兒之癇有二種有風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食癇也驚癇皆按圖灸

外持之作癲
一星翼怖下有元

星方下字下有三字
外星下作治外星
若翼方作癲

之風癇當與猪心湯食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風癇者緣衣暖汗出風因入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作者此風癇也驚癇者起於驚怖大啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癇者此食癇早下則瘥四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛入赤丸本無赤丸方諸醫方並無按此服四味紫丸不次後癖結脹滿篇中第一方八味名紫雙丸者用朱砂色當赤用色豆又用茸遂此紫丸當駛疑此即赤丸也

差駛病重者當用之凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖

按驚脈未詳何穴下云
耳後完骨上有絡青是
痛假甲之經云驚脈在
耳後鵝足青絡明堂下
經云驚脈治小兒驚風
瘦脈吐瀉瀉血時驚
足膝青目睛不明由此
考之驚脈即瘦脈也其
穴治驚癇瘦脈云瘦
脈又名驚脈并

下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤
丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍
服之并摩赤膏方見本篇未風癇亦當下之然當以猪心湯下之驚
癇但按圖灸之及摩生膏方見本篇未不可大下也何者驚癇心氣
不定一作下之內虛益令甚爾驚癇甚者特為難治故養小兒
常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令驚怖又天雷時當
塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長其血脉
但不欲大驚大驚乃為驚脈若五六十日矣者驚復更甚生百
日後矣驚脈乃善兒有熱不欲哺乳不安又數驚此癇之初
也服紫丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸

外甚下百寒

量方之下有夫

下之減其盛氣冷兒不病癇也兒立夏後有病治之慎勿妄灸
不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱湯散見下
篇傷寒條中除熱
赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲
之小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲為
癇之漸也便將紫丸以微消之服法先從小起常令大便秘勿
大下也稀後便漸減之不醋臭乃止藥也凡小兒冬月下無所
畏夏月下難寒然有病者不可不下下後腹中當小脹滿故當
節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒當令多少有常劑兒漸大
當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥勿復
哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都

外或下有反

外挾宿食作寒

宋本望方作挾寒

痛原小下作微利

外則作此

望傷下有小兒

不肯食哺而但欲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下
不下則致寒執或吐而發癩或更致下痢此皆病重不早下之
所為也此即難治矣但先治其輕時兒不耗損而病可速愈凡
小兒屎黃而臭者此腹中有伏執宜微將服龍膽湯若白而醋
臭者此挾宿食不消也當服紫丸微者少與藥令肉消甚者小
增藥令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病
易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過則傷矣
凡小兒有癖其脉大必發癩此為食癩下之便愈當審候掌中
與二指脉不可令起而不時下致於發癩則難療矣若早之此
脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增矣凡小兒腹

望方動下有血脈

經脈扁曰田日中有血
赤其里者留又
痛也而色青則寒且
痛

中有疾生則身寒執寒執則血脈動動則心不定心不定則易
驚驚則癩發速也
候癩法

夫癩小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然氣發於內
必先有候常宜審察其精神而探其候也

手白肉魚際脉黑者是癩候魚際脉赤者熱

脉青大者寒脉青細者為平也
鼻口乾燥大小便不利是癩候
眼不明上視喜陽是癩候

耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癩候

外笑作哭

青脉刺之令血出也

元此係合前為一條

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癩候

鼻口青時小驚是癩候

目閉青時小驚是癩候

身熱頭常汗出是癩候

身熱吐衄而喘是癩候

身熱目時直視是癩候

喜笑目上視是癩候

身熱目視不精是癩候

目瞳子卒大黑於常是癩候

外常下百時

正初作候

浩括通

臥惕惕而驚手足振搖是癩候

臥寢笑手足動搖是癩候

意氣下而妄怒是癩候

咽乳不利是癩候

身熱小便難是癩候

吐痢不止厥痛時起是癩候

弄舌搥頭是癩候

已上諸候二十餘條皆癩之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手念兒驟啼及足絕脉亦依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口禁不得乳反張春強汗出發熱為計不悟

外極作劇
元枚作枚

手足掣瘳驚凡八條癰之極者也如有此非復湯所不能救
便當時灸之

元假下有後

外聖師下有世賢者
三子歸作續

論曰若病家始發便來詣師師可診候所解為法作次序治之
以其節度首尾取瘳也病家已經雜治無次序不能制病病則
變異其本候師便不知其前證虛實直依其後證作治亦不得
瘳也要應精問察之為前師所配依取其前蹤跡以為治乃無
逆耳前師處湯本應數劑乃瘳而病家服一兩劑未效便謂不
驗已後更問他師師不尋前人為治寒溫次序而更為治而不
次前師治則弊也或前已下之後須平和療以援之而得瘳也
或前人未下之或不去者或前治寒溫失度後人應調治之是

外假上有依字弊
作散矣

為治敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必及重
弊也

龍膽湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐
嘔者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客入鬼氣
并諸驚癇方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一
此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此為例若必知客
忤及有魃氣者可加人參當歸各如龍膽多少也一百日兒加
三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥皆准耳

正懸作懸
外胆下有秤方二字

龍膽

釣藤皮

柴胡

黃芩

芍藥

茯苓一作茯神

甘草各六銖

宋本翼方一作二
元外如作宜

外居古者

文選匡大婦特出良
又相連讀良又親申
也又點糾特出良見
上林賦靈光殿賦

此方中外並至有耳
草一兩

蜚蠊 二枚 大黃 一兩

右十味吹咀以水一升煮取五合為劑也服之如後節度藥
有虛實虛藥如足數合水也兒生一日至七日分三合為三
服兒生八日至十五日分一合半為三服兒生十六日至二
十日分二合為三服兒生二十日至三十日分三合為三服
兒生三十日至四十日盡以五合為三服皆得下即止勿再
服也

大黃湯治小風癩積聚腹痛天矯二十五癩方

大黃

人參

細辛

乾薑

當歸

甘草 各二

四味各二兩備急

元疾下百方

元三作二

右六味吹咀以水一升煮取四合服如露許日三
白羊鮮湯治小兒風癩胃中有疾

白羊鮮 三銖

蚱蟬 二枚

大黃 四銖

甘草

釣藤皮

細辛 各三

牛黃 如大豆

四枚

蛇蛻皮 一寸

右八味吹咀以水二升半煮取一升二分五服日三若服
已盡而癩不斷者可更加大黃釣藤各一銖以水漬藥半日
然後煮之

增損續命湯治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反張不隨
并躄瘦僻不能行步方

麻黃

甘草

桂心 各一

芎藭

躄瘦即躄也

葛根 升麻 當歸 獨活各十八銖

人參 黃芩 石膏各半 杏仁二十枚

右十二味咬咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥煮取一升二合三歲兒分為四服一日令盡少取汗得汗以粉粉之

石膏湯治小兒中風惡非不能語目眼了戾四肢不隨方

石膏一合 麻黃八銖 甘草 射干 桂心

芍藥 當歸各四 細辛二銖

右八味咬咀以水三升半先煮麻黃去上沫內餘藥煮

取一升三歲兒分為四服日三

治少小中風狀如欲絕湯方

元二千倒

大黃 牡蠣 龍骨 桔蘆根 甘草

桂心各二 赤石脂 寒水石各六

右八味咬咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去滓半歲兒

服如雞子大一枚大兒盡服入口口中即愈汗出粉之藥無毒

可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃無寒水石朴硝代之

二物石膏湯治少小中風手足拘急方

石膏如雞子大一塊碎 直珠兩

右以水二升煮石膏五六沸內直珠者取一升稍稍分服

桂枝湯治少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方

桂心 生薑 甘草 芍藥各一 大棗四

元珠作未

右五味咬咀三物以水三升煮取一升分二服此方與傷寒二物驢毛散治小新生中風方

驢毛一把取背前交脊上會中按手取如手母指大一把麝香二豆

右以乳汁和銅器中微火煎令焦熟出為末小兒不能飲以乳汁和之葦筒貯瀉著咽中然後飲乳令入腹

茵芋圓治少小有風癩疾至裏不除或遇天陰節變便發動食飲堅強亦發百脉攣縮行步不止言語不便者服之永不發方

茵芋葉 鈔丹 秦朮 釣藤皮 石膏

杜蘅 防葵各一兩 菖蒲 黃芩各一兩半 松蘿兩

蜚蠊十枚 甘草三兩 外十四分

右十二味為末如小豆大三歲已下服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十九丸十歲已上可至十五丸

鎮心圓治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑十二銖 水銀二十銖 牛黃六銖 大黃六分 茯苓三分

茯神 遠志 防已 白欬 雄黃

人參 芍藥各二分 紫石英 真珠 防葵

鐵精各四分

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸二歲兒如麻子二丸隨兒大小增之一方無牛黃一味

丹參赤膏治小兒心腹熱除熱方

丹參

雷丸

砒硝

戎塩

大黃各二兩

右五味咬咀以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪肪一斤煎三上三下去滓乃內砒硝膏成以摩心下冬夏可用一方但用丹參雷丸亦佳

五物甘草生摩膏治小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣方

甘草

防風各一兩

白朮

桔梗各二兩 雷丸二兩

右咬咀以不中水猪肪一斤煎為膏以前藥微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一枚多手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩顙上及手足心

病源成病作成痲

崔氏

甚辟寒風

灸法

論曰小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成病河洛關中土地多寒兒喜病瘧其生兒三日多逆灸以防之入灸頰以防噤有噤者舌下脉急牙車筋急其土地寒皆決去血灸頰以防噤也吳蜀地温無此疾也古方既傳之今人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有天橫也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可針灸爪之動其百脉仍因驚成痲也惟陰痲瘰癧可針灸爪之凡灸痲當先下兒使虛乃承虛灸

之未下有實而灸者氣逼前後不通殺入癰發平日者在足少
陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太陽黃昏發者在足太
陰不定發者在足陽明夜半發者在足少陰

右癰發時病所在視其發早晚灸其所也夫癰有五藏之癰
六畜之癰或在四肢或在腹內當審其候隨病所在灸之雖必
必瘥若失其要則為害也

肝癰之為病面青目反視手足提灸足少陽厥陰各三壯
心癰之為病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二肋端宛
宛中此為巨闕也又灸手心主及少陰各三壯
脾癰之為病面黃腹大喜刺灸胃管三壯俠胃管傍灸二壯足

外中作下

陽明太陰各二壯

肺癰之為病面白口沫出灸肺膺三壯又灸手陽明太陰各
二壯

腎癰之為病面黑正直視不搖如刀狀灸心下二寸二分三壯
又灸肘中動脈各一壯又灸足太陽少陰各三壯

膈癰之為病目反四肢不舉灸風府又灸頂上鼻人中下脘承
漿皆隨年壯

腸癰之為病不動提灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳
後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右五藏癰證候

外脊作完元同

外臺云交肋戶兩脚
頭兩名一壯良程行
道云肋戶兩脚頭疑

馬癩之為病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三壯病在
腹中燒馬蹄末服之良

牛癩之為病目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯燒牛蹄
末服之良

羊癩之為病喜揚目吐舌灸大椎上三壯

猪癩之為病喜吐沫灸脊骨兩傍各一寸七壯

犬癩之為病手足拳攣灸兩手心一壯灸足太陽一壯灸肋戶

一壯

雞癩之為病搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯

右六畜癩證候

元皆作背月

小兒暴癩灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴癩者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸太倉及臍中

上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取皆以繩繞頸下至臍

中竭便轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯

若面白喘聲色不變灸足陽明太陰

若目反上視眸子動當灸顙中取之法橫度口盡兩吻際又橫

度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行

度之灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是此最要處

也次灸當額上入髮一分許直望鼻為正次灸其兩邊當目瞳

子直上入髮際二分許次灸頂上翹毛中次灸客主人穴在肩

外髮下有際

外筋助作筋

梅巢源小兒項腫底
此、在項項筋兩
轉之邊有病乃治之
知是動助二字、誤
係外至可改

後際動脈是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是也次
灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也下法大人當耳上橫三
指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可以針刺
令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風池在項後兩轉動
肋外髮際陷中是也次灸風府當項中央髮際亦可與風池三
處高下相等次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也
右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十
日可灸七壯病重者具灸之輕者惟灸顛中風池玉枕也艾使
熟炷金平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉
徒灸多炷故無益也

外至懸垂

至門即會度

元外三大作主

元身作脊教作度
外中下有尖字

若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取
之當腫乎是次灸臆中次灸胃堂次灸臍中次灸薛息薛息在
兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨關太人去鳩尾下一寸
小兒去臍作六分之分去鳩尾下一寸是也并灸兩邊次灸胃
管次灸金門金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度
之木孔前中分之
右腹部十二處會堂巨關胃管十日兒可灸三壯一月已上可
五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯
若身強反張灸大椎并灸諸臑及督脊上當脊中從大椎數至
窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也

右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯
 若手足掣癱驚者灸天澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸
 心主次灸合谷次灸三關次灸少陽
 右手部十六處其要者陽明少商青澤食谷少陽也壯數如上
 又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明次灸少陽
 次灸然谷
 右足部十四處皆要可灸壯數如上
 手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣
 癱者盡灸手足十指端又灸本節後
 孫真人備急千金要方卷之十

孫真人備急千金要方卷之十一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

少小嬰孺方

客忤第四論 方 灸法 呪法

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是
 為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還
 衣服經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆為忤也執作喘息乳
 氣未定者皆為客忤其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最劇能殺
 兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向
 兒邊命兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬

外身下方汗氣
其布作裳

元凡作及外遊上方
迴字

氣皆冷小兒中馬客忤慎護之特重一歲兒也凡小兒衣布帛
綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡
非常以及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外
來人凡有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛屎
令常有煙氣置戶前則善

小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病者
豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者
秋夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒
嫩弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢是故
夏末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魘也若治

魘疑魘

去中云、外至其小品
証類本草上右火

証類本草引制楚
歲時鈞作鈞令載
府記此名血水經注
引去中記再此文異

元無也

病源外至痛下有
皆

少小法夏末秋初常宜候天氣溫涼也有暴寒卒冷者其少小
則多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳
中記云天下有女鳥名曰姑獲肘後子母秘一名天帝女一名
隱飛鳥一名夜行遊女又名鈞星鬼喜以陰雨夜過飛鳴徘徊
人村里喚得來者是也鳥純雌無雄不產陰氣毒化生喜落毛
羽於人中庭置兒衣中便冷兒作癩病必死即化為其兒也是
以小兒生至十歲衣被不可露也七八月尤忌
凡中客忤之為病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛大糞面
色變易其候似癩但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍膽
湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也小兒中客急視

極原無小

量方痛即止作病
愈則天

其口中懸癰左右當有青黑腫脉核如麻豆大或赤或白或青
如此便宜用針速刺潰去之亦可瓜摘決之并以綿纏釵頭拭
去血也少小中客之為病吐下青黃赤白汁腹中痛及反倒偃
側喘似癰狀但目不上插少睡耳面變五色其脉弦急若失時
不治小兒則難治矣欲療之方用鼓數合水拌命濕擣丸如
雞子大以摩兒顙及手足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上
下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止
治少小中客忤強項欲死方
取衣中白魚十枚為末以傅母乳頭上令兒飲之入咽立
愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒項

着疑者

外室上石以下石
熟者二字

及脊強處

治少小客忤二物黃土塗頭方

竈中黃土蚯蚓屎等分擣合水和如雞子黃大塗兒頭上
及五心良一方云雞子清和如泥

又方

吞麝香如大豆許立愈

治少小犯客忤發作有時者方

以母月衣覆兒上大良

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊上旋毛犬如彈子以乳汁煎之令毛消藥

千金方

卷十一

三

熊養貴

証類月傷寒類要
赤作也
外汁下石飲

成著乳頭飲之下喉即愈

又方燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

又方取牛鼻津服之

又方取牛口沫傳乳頭飲之

一物猪蹄散治小兒寒熱及赤氣中人方

猪後脚懸蹄燒末搗篩以飲乳汁一撮立效

治少小卒中客忤不知人者方

取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治中客忤而嘔

唾面青腹強者

二物燒髮散治少小見人來卒不佳腹中作聲者方

外顯上有頭生

外顯上有頭生
外顯上有頭生
外顯上有頭生

治小兒卒客忤方

用向來者人顯上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細末和

乳飲兒即愈

一物馬通浴湯治少小中忤方

銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含

一物猪通浴湯治小兒中人忤嘔啼面青腹強者方

與之即愈

治小兒中馬客忤而吐不止者方

千金方

卷十一

四

元三作二

外一作三

翼銅上有取
翼亦作噴

莫壯下有又

灸手心主間使大都隱白三陰交各三壯可用粉丸如鼓法並用唾唾而呪之呪法如左

呪客忤法

呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客忤從我始痛鵲雖良不如善唾良呪訖棄丸道中

宋本莫方字作摩

又法取一力橫著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向兒呪之

唾輒以刀擬向心腹啡啡曰音非出煌煌日出東方背陰

向陽葛公葛公不知何公子來不視去不顧過與生人忤

梁上塵天之神戶下土鬼所經大力鏢犀對竈君二七唾

客愈兒驚唾啡啡如此二七啡啡每唾以刀擬之呪當三

宋本莫方下公作母
集韻犀兵器也
後馮亦世值若不犀
利音灼注犀也

莫方丸下有一

遍乃軍用鼓丸如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

小兒魘方

論曰凡小兒所以有魘病者是婦人懷娠有惡神導其腹中胎妬嫉他小兒念病也魘者小鬼也妊娠婦人不必悉招魘魅入時有此耳魘之為疾喜微微下痢寒熱或有去來毫毛鬢髮鬢鬢不悅是其證也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作魘也令兒黃瘦骨立髮落壯熱是其證也

治魘方

病源經君作髮
髮者字音血並髮
同音韻髮音信
髮髮乳白

千金方

卷二十一

五

道蒙

炙伏翼熟嚼哺之
又方燒伏翼末飲服之

又方以冰二升煮篇蓄冬瓜各四兩取浴之

白鮮皮湯治小客癩挾實方

白鮮皮 大黃 甘草各一芍藥 茯苓

細辛 桂心各十

右七味咬咀以冰二升煮取九合分三服

小兒夜啼

龍骨圓治小兒五驚夜啼方 崔氏名五驚丸

龍角 六分 牡蠣 牡丹 川大黃 各九 黃芩 兩

外聖藥裏以下十二
字作小兒女以意增
減之甚良

右六味末蜜丸如麻子葶裏兒服二丸隨兒大小增減

芫蕒 白朮 防己 各半

右二味治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母手掩臍
中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒末能服散者以乳汁和服
如麻子一丸兒大能服散者以意斟酌與之

一物前胡圓治小夜啼方

前胡隨多少搗末以蜜和丸如大豆服一丸日二稍加至
五六丸以瘥為度

元二作三

又方以妊娠時食飲偏有所思者物以此哺兒則愈
又方

伏龍肝

交道中土各一把

右二味治下篩水和少許飲之

又方取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止

治小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼屎中骨燒灰為末水服如黍米粒大一枚即定

治小兒驚啼方

取雞屎白熬末以乳服之佳

又方酒服亂髮灰

又方車轄脂如小豆許內口中及臍中

又方臘月縛猪繩燒灰服之

又方燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

汗金湯治小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣所逐令兒得疾眾醫不治方

蜀椒

左顧牡蠣各六銖碎

右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

傷寒第五論一方

論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之

年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥
分劑少異藥小冷耳

麥門冬湯治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆方

麥門冬十八銖石膏三兩寒水石一兩甘草各半兩

桂心八銖

右五味以水三升煮取一升每服一合日三

芍藥四物解肌湯治小傷寒方

芍藥四兩黃芩二兩升麻二兩葛根各半兩

右四味以水三升煮取九合去滓分服暮歲已上分二服

麻黃湯治小傷寒發熱欬嗽頭面熱者方

活人名名麻桂湯
疾上右未字桂心方

元升作斗

外方下有四

麻黃 生薑 黃芩 甘草
桂心 石膏 芍藥 杏仁
右八味以水四升煮取一升半分一服兒若小以意減之

治小兒傷寒方

葛根汁 淡竹瀝各六分

右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之不宜在者

服佳

治小兒時氣方

桃葉三兩擣以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之若復

外百以下七字无
生者倒

元板下有燒

發燒雄鼠屎二枚水調服之
五味子湯治小兒傷寒病久不除瘥後復劇瘦瘵骨立方

五味子 十銖

大黃 六銖外

黃連

黃芩 各二分

麥門冬 六分

前胡 各六分

磁硝 五銖

石膏 兩

甘草

當歸 各十銖

右十味咬咀以水三升煮取一升半服二合得下便止計大

小增減之

莽草浴湯治小傷寒方

莽草 半斤

牡蠣 四兩

雷丸 三十枚

大黃 兩

蛇牀子 升一

外眼及陰作日向陰處

右五味以水三斗煮取斗半適寒温以浴兒避眼及陰
又方治小兒卒寒熱不佳不能服藥方

莽草

丹參

桂心 各三兩

菖蒲 半斤

雷丸 升一

蛇床子 二兩

右六味以水二斗煮三五沸適寒温以浴兒避眼及陰

雷丸浴湯治小兒忽寒熱方

雷丸 二十枚

大黃 四兩

黃芩 一兩

苦參

石膏 各三兩

丹參 二兩

右六味咬咀以水二斗煮取一斗半浴兒避眼及陰浴訖以

粉粉之勿厚衣一宿復浴

崔氏升作斤三作三

外眼及陰作日向陰處

李葉浴湯治小身熱方

李葉無多少以水煮去滓將浴兒良

柳枝浴湯治小兒生一月至五月乍寒乍熱方

細切柳枝者取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之

青木香浴湯治小兒壯熱羸瘠方

青木香兩四 麻子仁升各一 竹葉升各一 虎骨兩五

白芷兩三

右五味咬咀以水二斗者取一斗稍稍浴兒

十二物寒水石散治小身體壯熱不能服藥方

寒水石三 硃砂兩半 滑石兩半 石膏兩半

赤石脂 青木香 大黃 甘草

黃芩 防風 芎藭 麻黃根

右各等分合治下篩以粉一升藥屑三合相和復以篩篩之

以粉兒身日三

李根湯治小兒暴有熱得之二三日者方

李根 桂心 硃砂各十 麥門冬八銖

甘草各一兩

右五味咬咀以水二升者取一升分五服

升麻湯治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小

便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚仍成癇疾時發時

浴人升上有十物三字

上瘡疑被

醒醒後身熱如火者悉主之方

升麻

白薇

麻黃

萎蕤

柴胡

甘草各半

黃芩一兩

朴硝

大黃

鈞藤各六銖

右十味咬咀以水三升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取一升

兒生三十日至六十日一服二合六十日至百日一服二合

半百日至二百日一服二合

大黃湯治小兒肉中久挾宿熱瘡瘡熱進退休作無時方

大黃

甘草

砒硝各半

桂心八銖

石膏一兩

大棗五枚

大黃

甘草

砂桂杖加羅榛竟骨牡蛎救逆湯之証而用此假桂杖不中者皆用此方

右六味咬咀以水三升煮取一升每服二合

蜀棗湯治小兒潮熱方

治火邪

蜀棗

甘草

知母

龍骨

牡蠣各半

右五味咬咀以水四升者取一升去滓一歲兒少少溫服半

合日再

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為不化方

大黃

黃芩

甘草

麥門冬

砒硝各半

石膏一兩

桂心八銖

右七味咬咀以水三升者取一升半二服暮歲已下小兒作

五服

○竹葉湯治小兒夏月患腹中伏熱温壯來往或患下痢色或白或黃三焦不利方

竹葉切

小麥各五合

柴胡

麥門冬

人參

甘草各半兩

茯苓十八銖

黃芩一兩陸銖

右八味咀咀以水四升煮竹小麥取二升去竹葉小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱燒人手洞下黃溲氣力憊然脉極洪數用此方加大黃二兩再服得下即瘥又方治五六歲兒温壯腹中急滿息不利或有微腫亦治極羸不下飲食堅痞手足逆冷方

元上經下有氣

聖藥高下有氣名竹葉湯

王肯堂謂此方卷作連

竹葉切

小麥半升

甘草

黃芩

括萋根

澤瀉

茯苓

知母

白朮

大黃各一兩

桂心二銖

生薑一兩半

人參

麥門冬

半夏各二兩

當歸十八銖

右十六味咀咀以水七升煮竹葉小麥取四升去滓內藥煎取一升六合分四服

治小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸方

大黃一兩

黃芩

括萋根

甘草各十銖

滑石二兩

桂心

牡蠣

人參

龍骨

凝水石

白石脂

消石各半兩

元治血外痔血

右十二味以水四升者取一升半每服二合一日一夜

令盡雖吐亦與之石本加紫石英半兩

調中湯治小兒春秋月長夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或欲赤白滯起數去小腹脹痛極壯熱氣脉洪大或急數者服之執復歇下亦瘥也但壯熱不吐下者亦主之方外至曰古今錄驗身瘥及初秋心石暴寒折於盛熱結四厥則壯熱頭痛傷於胃則下痢或血或水赤帶下壯且兩脈微且數宜下之方

- 葛根
- 黃芩
- 茯苓
- 桔梗
- 芍藥
- 白朮
- 藁本
- 大黃

甘草各六各三

右九味以水二升者取五合服如後法兒生一日至七

外二作九又五作三

日取一合分三服生六日至十五日取一合半分三服生六日至二十日取二合分三服生二十日至三十日取三合分三服生三十日至四十日取五合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至三百日兒一如前篇龍膽湯加之生地黄湯治小兒寒熱進退啼呼腹痛方

- 生地黄
- 桂心各二兩

右二味以水三升者取一升蒸歲以下服二合已上三合一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半兩

治小兒傷寒發黃方

搗土瓜根汁二合服之

外清以下七字

又方擣韭根汁澄清取如大豆許滴兒鼻中即出黃水瘡
又方擣青麥汁服之
又方

小豆三七

瓜蒂十四

糯米四十

右三味為末吹入鼻中

二物通汗散治少小有熱不汗方

粉斤

雷丸四

右擣為細末和下篩以粉兒身

二物茯苓粉散治少小頭汗方

茯苓

牡蠣各四

外中下百五

程行道云不当作出
外聖本綱作出

外粉下百五

崔

右治疳節以粉八兩合擣為散有熱輒取粉汗即自止
三物黃連粉散治少小盜汗方

黃連

牡蠣

貝母各十

右以粉一升合擣下篩取粉兒身佳

犀角飲子此由心臟熱之所感宜服此方

犀角十八

茯神一

麥門冬一兩

甘草半

白朮六

右五味咬咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩佳

恒山湯治小兒溫瘡方

恒山一

小麥二

淡竹葉一

外分下有再字服下石
即定又三字

千金方

卷一

一

竹秀

元三言作三

外鹿上者生

外并以下五字无

元十一作五上

右三味以冰一升半者取五合一日至七日見一合為二服
 八日至十五日見一合半為三服二十六日至二十日見一合
 為二服三四十日至六十日見一合為二服四六十日至百日見一合
 一服五合半六百日至二百日見一服七合八
外至五六一歲至七八歲見增水
並以此為十六字

又方鹿角末臨發時先服一錢七
 又方燒鼈甲灰以酒服一錢七至發時服三七并以火灸身
 又方燒雞胗胗中黃皮為末和乳與服男雄女雌
 又方灸兩乳下一指三壯

孫真人備急千金要方卷之十一丙辰秋八月大戶孟通

