千金方

十

ヤ武 9
175
10

外下師作仰
元二十作三十

篤信堂

孫眞人備急千金要方卷之二十二　切三

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

風毒脚氣方

論風毒狀第一（十六章）

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方爲三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不慇懃徐王撰錄未以爲意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑

篤信堂

門號 175
卷 10

外永作水諸下有
索療字十作千

不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發初得先從腳起因即脛腫時人號爲腳氣深師云腳弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連范祖耀黃素等諸腳弱方凡八十餘條皆是精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於腳

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於腳也答曰夫人有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中腳久而不瘥遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云（五十三難）次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病治之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起腳屈弱不能動有此爲異耳黃帝云緩風濕痺是也

十

經指難經五十七難七傳間藏是也呂廣注七者作傳孫氏因呂氏説云次傳間傳也

「黃帝云以下未詳」

元正氣無

病源悸下有寤処二字

元作或腫不腫无脚胜字

論風毒相貌

夫有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下痢或大小便秘澁不通或胷中衝悸不欲見光明或精神惛憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或脚脛腫（或不腫）或䏶腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶掣瘲驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞愊愊然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛為濕痺

元外皆下有咸字

元外人作入

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脱衣靴韈當風取涼皆脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸人經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一

外疏作疎擊作擊

元作三二十壯

心注意於事久坐行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如急箭或先中足心或先中足趺或先中膝已下腨脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處二三十壯因此即愈不復發也黄帝云當風取涼醉已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痺

外諸藥作餘藥

脚氣腫滿候出病源

五柔麻人丸見第十五卷

元正小勿作傷

病源急者不全日緩者二三月

外上急下有療字下急下有則字自作白

論因脚氣續生諸病

雖患脚氣不妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患脚氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻人丸等治之遍體腫滿成水病者則取治水方中諸治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之勿緩氣上入腹或腫或不腫胷脇逆滿氣上肩息急者死不旋踵寛者數日必死不可不急也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱

其脉促短而數嘔吐不止者皆死

論虛實可服藥不可服藥

凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或言是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同被壞病人心意不知孰是遷延未定時不待人歘然致禍各自散走

天门冬大煎見本層
三十八卷風虚中外
並十八卷脚氣中
引之

是故大須好人及好名醫識病深淺探賾方書博覧古今是事明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂悔但詳方意人死不難莫信他言以自悞也余嘗爲人撰門冬煎此方治脚氣大有驗病者須用之（方見第十二卷）

論脉候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脉要須不違四時者爲吉其逆四時者勿治餘如脉經所說此中不復具載其人本黒瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黒人耐風濕赤白不耐風瘦人肉

外無亦

外不下有頃

硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他疾發動治之得瘥後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不慎

外[illegible]糜作麋

外粳粱作粳米粱米

元善作差

元外也作色

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜蕺菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒惟得食粳粱粟米醬豉葱韮薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可瘥又大宜生牛乳生栗子

論善能治者幾日可瘥

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺之傷晩二驕狠恣傲三狐疑不決此三種正當枉死之也故世間誠無良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復鄙少故雖有騏驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其為枉横亦猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可得永瘥矣若無受入性者

元外骪作令

便作使元正小五

此上條所謂存王以三方鼎峙者歟

翼眼作目

亦不須爲治纔能治之恐無瘥日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者說

論灸法

凡脚氣初得脚弱便速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八風散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登時雖不即惡治之不當根源不除久久期於殺人不可不精以爲意

初灸風市

次灸伏兎（足陽明胃経）

次灸犢鼻（足陽明胃経）

次灸膝兩眼

次灸三里（足陽明胃経）

次灸上廉（足陽明胃経）

累夫之夫恐趺字歟

翼作外角手処

文選注云箕踵踊蹐後狭似箕之狸也

次灸下廉（足陽明胃経）

次灸絕骨

凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兎穴令病人累夫端坐以病人手夫掩横膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窩解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是

翼是下有灸百壯三字

元正少作入

一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絶骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絶骨各一處兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥速以次灸之多多益佳一說灸絶骨最要人有患此脚弱不即治及少腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨諸腧及諸管關節腹背盡灸之并服八

正元別卷作二十九卷

翼陰作陽林本草
有足巨陽穴治腰痛
穴在外踝下即是

盡通林止字恐上字
訛

元正乃作名

風散往往得瘥者諸管腧節解法並在別卷中覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胷心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上中節上横過為一夫夫有兩種有三指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絶骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六腑腧募頃來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏乃曰八衝極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯

元正悉作委

病源作若脉轉駃而
緊无浮大二字

外湯下有兩劑応差字

並大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相悉悉慎勿為人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有三品內外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應差若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大緊轉駃宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三品之中最惡脉也或沉細而駃者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在內治亦不異當

外臺作及

病源外臺並作若

元正病源外後上有下

李治古今黈云料理之
語見于世說者三蓋言
護之義

消息以意耳其形尚可而手脚未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輙停在胷心更為人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而苦脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以圓藥助湯令下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頑痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者瘥後半年始能扶人行耳既覺脉及體內

元別卷作第十三

外時作天

瘥但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘治餘治未必全得益更生諸惡失此諸治也偶人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷腰脚者即勿與治宜知此法此皆人無學性不可與醫故也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者服前方重者以次第服後方此風毒乃相注易病人宜將空鉄服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從少爲始金牙散方見別卷病人惟宜飲赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病而脉浮緩終不變歎此不治或數日而死或十日

外爛下有或腿膝穿潰者一句

元此作設

元別作第八

而死或得便不識人或發黄或發斑或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服續命湯一劑須服葛根湯麻黄湯下之若此不折更與續命湯兩三劑必瘥此病太急常令湯勢相接不可使半日闕湯即便殺人續命湯方見別卷

孫真人備急千金要方卷之二十二

薑不仁充外腹充

肘後云其有風引白鶏○竹瀝独活他湯及八風石斛狗脊散並別在大方中知是此等方皆出于孫公以前也

薑其方傍上有耳字防己上有木字

元二作三

孫眞人備急千金要方卷之二十三　切四

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

湯液第二　方三十八首　褁脚方附

第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝五升（浮火潤燥滑痰）　甘草　秦艽　葛根

黄芩　麻黄　防己　細辛

桂心　乾薑（各一兩）　茯苓（二兩）　防風

升麻（各一兩半）　附子（二枚）　杏仁（五十枚）

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗

翼方中下有惡字外急下有痛字翼作偏掣急痛恚作喜

翼無白朮

千金翼方無茯苓杏人有白朮一兩

第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五臟恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝一斗四升　獨活　芍藥　防風

茵芋（去風湿）　甘草　白朮　葛根

細辛　黃芩　芎藭各二兩　桂心（二兩外）

防已　人參　石膏　麻黃各一兩

生薑　茯苓各三兩　烏頭一枚

右十九味㕮咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服

翼無升麻芎藭防黃芩茯苓有芍藥茯神防已通草凡十五味

第三竹瀝湯治風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝一斗九升　防風　茯苓　秦艽各三兩

當歸　黃芩（千金翼作芍藥）　人參　芎藭（千金翼作防已）

細辛　桂心　甘草　升麻（千金翼作通草）

麻黃　白朮各二兩　附子二枚　蜀椒一兩（元一）

葛根五兩　生薑八兩

右十八味㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩膏日再痺定止（千金翼無麻黃蜀椒生薑）

麻黃湯治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒

元外七作二

氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次服第二第三

第四方

麻黄一兩　大棗二十枚　茯苓三兩　杏人三十枚

防風　白朮　當歸　升麻

芎藭　芍藥　黄芩　桂心

麥門冬　甘草各二兩

右十四味㕮咀以水九升清酒七升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活四兩　乾地黄三兩　生薑五兩　葛根

外臺云一方呉茱萸三兩

元小五正無肉

元[illegible]作二

桂心　甘草　麻黄　芍藥各二兩

右八味㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一脚弱特忌食瓠子蕺菜犯之一世治不愈

第三服兼補厚朴湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方

厚朴　芎藭　桂心　乾地黄

芍藥　當歸　人參各二兩　黄耆

甘草各三兩　吳茱萸二升　半夏七兩　生薑一斤

右十二味㕮咀以水二斗煮豬蹄一具取汁一斗二升去上肥肉清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久

元校作一

第四服風引獨活湯兼補方

獨活（四兩）　茯苓　甘草（各三兩）　升麻（一兩半）
人參　桂心　防風　芍藥
當歸　黃耆　乾薑　附子（各二兩）
大豆（二升）

右十三味㕮咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四服相去如人行二十里久更進服

防風散治脚痺并治毒氣上衝心胷嘔逆宿癖積氣疝氣諸病相當即服之方

防風　麻黃　芎藭　人參

芍藥　當歸　茯苓　半夏
甘草　橘皮（各一兩）　鼈甲　生薑
桂心（各一兩）　杏仁（一兩半）　赤小豆（一升）　貝子
烏梅（各五枚）　大棗（二十枚）　吳茱萸（五合）　犀角
令羊角（各半兩）　薤白（十四枚）

右二十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一日令盡一方用水一斗二升間食糜一方半夏二兩隨時用

獨活湯治脚痺方

獨活（四兩）　當歸　防風　茯苓
芍藥　黃耆　葛根　人參

外名防風湯

元治作治 疼作渋 外疼水作冷疼

甘草（各二兩） 大豆（二升） 附子（一枚） 乾薑（二兩）三元

右十二味㕮咀以水一斗清酒二升合煮取三升分三服

○越婢湯治風痺脚弱方

麻黄（六兩） 石膏（半斤）升正 白术（四兩） 大附子（一枚）

生薑（三兩） 甘草（二兩） 大棗（十五枚）

右七味㕮咀以水七升先煮麻黄再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗（胡洽方只五味若惡風者加附子一枚多痰水者加白术四兩）

治脚弱神驗方

防已 蜀椒 細辛 桂心

麻黄 石膏 各一両外 獨活 二両外 防風 三両外

黄芩 茵芋 葛根 芎藭

芍藥 甘草（各一兩）二外 生薑 茯苓（各二兩）三元

烏頭（二枚）三外

右十七味㕮咀以竹瀝一斗煮取四升分六服一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脉沉細駃風在內者作此湯也

外急下有屈

○風引湯治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行方

麻黄 石膏 獨活 茯苓（各二兩）

吳茱萸 附子 秦艽 細辛

外此上有及

桂心　人參　防風　芎藭

防巳　甘草（各一兩）元　乾薑（一兩半）　白朮（三兩）

杏仁（六十枚）

右十七味㕮咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗

大鱉甲湯治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方

鱉甲（二兩）　防風　麻黃　白朮

石膏　知母　升麻　茯苓

橘皮　芎藭　杏人　人參（各二兩）

半夏　當歸　芍藥　萎蕤

元正小豆三十作一十外作二十

元翼十枚作七枚

元翼外三斗作二斗
元薤作韮

翼有人參烏梅共二十五味

甘草　麥門冬（各一兩）　羚羊角　大黃（一兩半）京文一

犀角　青木香　雄黃（各半兩）　大棗（三十枚）

具齒　烏頭（各十枚）　生薑（三兩）　薤白（十四枚）

麝香（三銖）　赤小豆（三合）　吳茱萸（五合）

右三十一味㕮咀以水三斗煎取四升分六服相去十里久得下止一方用大黃半兩畏下可止用六銖一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖（胡洽有山茱萸半升爲三十二味千金翼加知母升麻橘皮芎藭人參當歸萎蕤二）

。小鱉甲湯治身體虛脹如微腫胸心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱方

鼈甲（補陰退熱）　黃芩　升麻　麻黃
羚羊角　桂心　杏人（各三兩）　前胡（四兩）
烏梅（二十枚）（七外）　薤白（三十枚）（二十一莖外）
右十味㕮咀以水一斗煮取二升七合分三服此常用若
體強壯欲須利者加大黃二兩

風緩湯治脚弱舉體痺不仁熱毒氣入藏胸中滿塞不通食卽
嘔吐方
獨活　麻黃　犀角（各三兩一方用羚羊角）
半夏（一升）　大棗　烏梅（各二十枚）　桂心
鼈甲　升麻　橘皮　枳實

眞作膝脛腫骨疾
蜱麻作胡麻
牛蜱一名牛虱
元研作碎
唐蘇恭為朝議郎行
右監門府長史騎都
尉宋人諱敬字改稱蘇
恭

甘草　呉茱萸　大黃（各一兩）　生薑
石膏（各六兩）　貝齒（七枚）
右十七味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二
不瘥至三劑必瘥

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方
取蜱麻葉切擣蒸薄裹之日二三易卽消蜱麻子似牛蜱
蟲故名蜱麻也若冬月無蜱麻取蒴藋根擣研和酒糟三
分根一分合蒸熱及熱封裹腫上如前法日二卽消亦治
不仁頑痺（此方非湯不當見此然以前後三方俱出蘇長史更不分出）
若腫已入脞至小腹脹小便澀少者方

肘後特作犢

取烏特牛尿一升分二服日二取消乃止（千金翼云羸瘦人二分尿一分牛乳合煮乳浮結乃服之）

若腫已消仍有此候者急服此湯方（蘇長史方神驗）

麻黄　射干　人參　茯苓

防已　前胡　枳實（各二兩）　半夏

犀角　羚羊角　青木香　橘皮

杏仁　升麻（各一兩）　生薑（五兩）　獨活（三兩）

吳茱萸（一升　元正）

右十七味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服相去二十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門冬一升去吳茱萸若心下堅加鼈甲一兩

元正痛作疼外同肘後作病
肘後冷下有時

夫脚氣之痛先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痹或兩脛腫滿或行起澀弱或上入腹不仁或時冷熱小便秘澀喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若覺此證先與

犀角旋復花湯方

犀角（三兩　外）　旋復花（各二兩）　橘皮　茯苓（二兩　外）

生薑（各二兩）　大棗（七枚　二十枚外）　香豉（一升）　紫蘇莖葉（一握）

右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十里久

服之以氣下小便利爲度（崔氏名小犀角湯妃其不下服後大犀角湯）

大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絶欲死方

犀角　旋復花　白术　桂心

防巳　黄芩　生薑（三兩外）　橘皮

茯苓（各二兩）　香豉（一升）　桑白皮　前胡（各四兩）

紫蘇莖葉（一握）　大棗（十枚）

右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久取下氣爲度若得氣下小便利脚腫即消能食若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黄湯（崔氏又以白前代白术無防巳黄芩桑白皮名旋復花湯）

犀角麻黄湯方

犀角　麻黄（三兩外）　防風　獨活（崔氏用茯苓）

防巳　芎藭　白术　羚羊角（崔氏用附子）

當歸　黄芩（各二兩一外）　石膏（四兩）　生薑

甘草（二兩外）　杏仁（崔氏用細辛）　桂心（各三兩）

右十五味㕮咀以水二斗煮麻黄去沫取汁八升下藥煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五日後更一劑取汗同前

○茱萸湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹方（蘇長史方）

呉茱萸（六升）　木瓜（兩顆切）

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即瘥（此起死回生方）

小風引湯治中風腰脚疼痛弱者方（胡洽名大風引湯）

獨活（二兩）　茯苓　人參（各三兩）　防風

當歸　甘草　乾薑（胡洽作桂心）　石斛（各二兩胡洽作黃耆）

附子（一枚）　大豆（二升）

右十味㕮咀以水九升酒三升煮取三升分四服服別相去如人行十里久（胡洽云南方治脚弱與此別用升麻一兩半夏芍藥各一兩合十三味本只有十味減當歸石斛名小風引湯删繁方無石斛以療肉極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰痛脚弱）

四物附子湯治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不可屈伸近之則痛白汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫方

皐文白作自孟通云
金匱自字無

附子（二枚）　桂心（四兩）　白朮（二兩）　甘草（二兩）

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服微汗愈大汗煩者一服五合體腫者加防已四兩悸氣小便不利加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩

活人已作風

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶欬嗽癱緩頑痺方

麻仁　升麻　麻黃　射干

菖蒲　芒硝　甘草　大黃（各二兩）

元無注

湘東王宋昏有本値

豉三合

右九味㕮咀以水六升煮取二升半内芒硝又煎三沸分三服微利一二行解毒熱有腫滓薄之凡覺氣滿輒服一劑佳（延年秘録作芒消半兩外臺同）

道人深師增損腎瀝湯治風虚勞損挾毒脚弱疼痹或不隨下焦虚冷胃中微有客熱心虚驚悸不得眠食以失氣味日夜數過心煩迫不得臥小便不利又時復下湘東王至江州王在嶺南病悉如此極困篤余作此湯令服即得力病似此者服無不瘥隨宜增損之方

黄蓍　甘草　芍藥　麥門冬

尔牙矜苦也

人參　肉蓯蓉　乾地黄　赤石脂

茯神　地骨白皮　當歸　遠志

磁石　枳實　防風　龍骨（各一兩）

桂心　芎藭（各二兩）　生薑（四兩）　五味子（三合）

半夏（一升）　大棗（三十枚）　白羊腎（一具）

右二十三味㕮咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升内諸藥煮取四升分爲五服不利下者除龍骨赤石脂小便澁以赤茯苓代茯神加白朮三兩多熱加黄芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚（胡洽方無黄耆蓯蓉赤石脂地骨皮磁石枳實防風龍骨半夏有黄芩爲十五味）

石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤矜急鼻塞去來來時

令人昏憒心胷恍惚或苦驚悸身體戰掉手足緩縱或酸痺頭目眩重眼反鼻辛熱氣出口中或患味甜諸惡不可名狀者方

石膏　龍膽　升麻　芍藥

貝齒　甘草　鼈甲　黃芩

羚羊角（各一兩）　橘皮　當歸（各二兩）

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分爲三服

○半夏湯治脚氣上入腹腹急上衝胷氣急欲絶方

半夏（一升）　桂心（八兩）　乾薑（五兩）　甘草

人參　細辛　附子（各二兩）　蜀椒（二合）

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服初稍稍進恐氣衝

元亦作益

元追作進

上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方

烏頭　細辛　蜀椒（各一兩）　甘草

秦艽　附子　桂心　芍藥（各二兩）

乾薑　茯苓　防風　當歸（各三兩）

獨活（四兩）　大棗（二十枚）

右十四味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服若熱毒多服亦佳

追毒湯治脚弱風熱上入心腹煩悶欲絶方

半夏　生薑（各四兩）　黃耆　甘草

元右下有二

元脚下有弱胃藏倒

按与前風緩湯主證相似而藥品多羚羊角防風當歸少大黃又烏梅作烏頭耳

當歸　人參　厚朴　獨活
橘皮（各一兩）　枳實　麻黃　乾地黃
芍藥（各二兩）　桂心（三兩）　貝子（七枚）　大棗（十枚）
右十六味㕮咀以水一斗一升煮取三升六合分四服日三
夜

風緩湯治脚體痺不仁毒氣上入胃藏中滿塞不通食輙吐失
味方
獨活　甘草　石膏（各三兩）　羚羊角
犀角（各半兩）　麻黃　防風　當歸
升麻　橘皮　吳茱萸　桂心

局方名蘇子降氣湯○

半夏　鼈甲（各二兩）　枳實（一兩）　生薑（六兩）
大棗（二十枚）　貝齒（七枚）　烏頭（二兩一作烏梅七枚）
右十九味㕮咀以水一斗四升煮取四升一服一升若有少
虛熱者加乾地黃二兩

紫蘇子湯治脚弱上氣昔宋湘東王在南州患脚氣困篤服此
湯大得力方
紫蘇子　半夏（各一升）　前胡　厚朴
甘草　當歸（各一兩）　橘皮（三兩）　大棗（二十枚）
生薑（一斤）　桂心（四兩）
右十味㕮咀以水一斗三升煮取二升半分爲五服日三夜

二

附子湯治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割方

附子（三枚）　芍藥　桂心　甘草

茯苓　人參（各三兩）　白朮（四兩）

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

防風湯治肢體虛風微痙發熱支節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多得力溫和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門南州士人常用亦治脚弱甚良方

防風　麻黄　秦艽　獨活（各三兩）外

生薑　半夏（各一兩）　當歸三兩外　遠志二兩外以下六味同

甘草　防己　人參　黄芩

升麻　芍藥（各一兩）　石膏（半兩）一外　麝香（六銖）二方外

一方用白朮一兩

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黄二兩先有冷心痛疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黄

甘草湯治脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

外三作四分六服作一服
六合
按今本見第五十卷
注痢中

甘草 人參（各一兩） 半夏（一升） 桂心
蜀椒（各三兩） 小麥（八合） 大棗（二十枚） 生薑（八兩）
吳茱萸（二升）

右九味㕮咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小麥內諸藥煮取三升分爲六服（女麴散見第十五卷第八篇中）

恒山甘草湯若寒熱日再三發可服此方

恒山（三兩） 甘草（一兩半）

右二味㕮咀以水四升煮取一升半分三服相去五里久一服

丹參牛膝煮散治脚痺弱氣滿身微腫方

元浪作須是

胳音各腋下也

丹參 牛膝 桑白皮
杏仁 升麻 茯苓 猪苓（各四兩）
犀角 黃芩 橘皮
防己 白前 澤瀉
桂心 秦艽（各二兩） 生薑
李根白皮（各三兩） 大麻仁（一升）

右十八味擣粗篩以水一升半內散方寸匕煮取七合輕絹濾去滓頓服日再夏月熱不得服圓散此煮散須年常用大驗

治腰胳不隨兩脚攣腫方

蜀椒四升以水四斗煮取二斗半甕盛下着火暖之懸板爲橋去湯二寸許以脚蹋板柱脚坐以綿絮密塞勿令泄氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入甕常令甕下火不絶勿使湯冷如此消息不過七日得伸展并腫亦消

孫真人備急千金要方卷之二十三

孫真人備急千金要方卷之二十四　切五

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

風毒脚氣方

諸散第三（三方）

例曰大法春秋宜服散

八風散治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱準經面青黑主腎不見日月光主肝宜補腎治肝方

菊花（三两）　石斛　天雄（各一两半）　人參

附子　甘草（各一两六銖）　鍾乳　薯蕷

續斷　黄耆　澤瀉　麥門冬

遠志　細辛　龍膽　秦艽
石韋　菟絲子　牛膝　菖蒲
杜仲　茯苓　乾地黃　栢子仁
蛇牀子　防風　白朮　乾薑
萆薢　山茱萸（各一兩）　五味子　烏頭（各半兩）
蓯蓉（二兩）

右三十三味治下篩酒服方寸匕日二三不效加至二匕

大八風散治諸緩風濕痺脚弱方

巴戟天　黃耆　桂心　細辛
天雄　萆薢　蓯蓉　牡荊子

元礜作礬

外行下有動

外恚作患

薯蕷　菊花　萎蕤　山茱萸
秦艽　黃芩　石斛　白朮
礜石　厚朴　龍膽　人參
蜀椒（各半兩）　附子　五味子（各十八銖）　菖蒲
茯苓　牛膝（千金翼作乾薑）　烏喙　遠志（各一兩）
桔梗（三十銖）　芎藭　白歛　芍藥（各六銖）

右三十二味治下篩酒服半寸匕日三未驗稍增令微覺

（無桔梗）

內補石斛秦艽散治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行脚趺腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲者皆由五勞七

元外正驗作馳

傷腎氣不足受風濕故也此方悉主之

石斛　附子　天雄　桂心
獨活　天門冬（各一兩）　秦艽　烏頭
人參　乾薑　當歸　防風
杜仲（各三十銖）　山茱萸　蕃草　桔梗
細辛　麻黃　前胡　五味子（各十八銖）（三分外）
蜀椒　白芷　白朮（各半兩）

右二十三味治下篩酒服方寸匕日再服不知稍增至二匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿則藥驗之當其救急理必如此

元三建以下十九字無

至於風消退四體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解無可疑焉（三建皆炮者天雄附子烏頭若虛人乾薑亦宜炮）

秦艽散治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻方

秦艽　乾薑　桔梗　附子（各一兩）
天雄　當歸　天門冬　人參
白朮　蜀椒（各十銖）　烏頭　細辛（各十八銖）
甘草　白芷　山茱萸　麻黃
前胡　防風　五味子（各半兩）

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之（胡洽無天門冬）

外頭下有鐵

外擣下有取

程敬通云餺飥餅也

（前胡有莽草桂心防巳萆薢白歛黄耆為二十三味）

單服松脂治一切風及大風脚弱風痹方薫陸法亦同

松脂三十斤以櫟皮袋盛繫頭鐺底布竹木置袋於上以石三五顆壓之下水於鐺中令滿煮之膏浮出得盡以後量更二十沸接置於冷水中易袋洗鍋更煮如此九遍藥成擣篩為散以麤羅下之用酒服一方寸七日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知為度如覺熱即減不減令人大小便秘澀若澀宜食葱羹仍自不通宜服生地黄汁微取泄利除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分蜜和為圓但食淡麪餺飥日兩度食一食一小椀勿多食也作餺飥法硬和麪熟接煮五十沸漉出冷水淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後即覺有驗兩脚似有水流下是效如恐秘澀和一斤松脂茯苓與棗栗許大酥即不澀服經一百日後脚氣當愈但經日服松脂一年增壽一年服二年增壽二年及服之十年則增壽十年

淮南八公石斛萬病散治風濕疼腰脚不隨方

防風　茯苓　菊花　細辛
蜀椒　乾薑　雲母　蓯蓉
人參　乾地黄　附子　石斛

翼方茱上有呉字　作風䟦蹇

杜仲　遠志　菟絲子　天雄

萆薢　桂心　牛膝　蛇牀子

白朮　薯蕷　巴戟　菖蒲

續斷　山茱萸（各一兩）　五味子（半兩）

右二十七味治下篩酒服方寸匕日再

茱萸散治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治

呉茱萸　乾薑　白歛　牡荆（千金翼作牡桂）

附子　天雄　狗脊　乾漆

薯蕷　秦艽　防風（各半兩）

右十一味治下篩先食服方寸匕日三藥入肌膚中淫淫然

外疼下有冷

二日知一月瘥

酒醴第四（例方）

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥内酒中密封頭春夏四五日秋冬七八日皆以味足爲度去滓服酒盡後其滓擣酒服方寸匕日三大法冬宜服酒至立春宜停

石斛酒治風虚氣滿脚疼痺攣弱不能行方

石斛　丹參　五加皮（各五兩）　側子

秦艽　杜仲　山茱萸　牛膝（各四兩）

桂心　乾薑　羗活　芎藭

橘皮　黄耆　白前　蜀椒

茵芋　當歸（各三兩）　薏苡仁（一升）　防風（二兩）

鍾乳（八兩擣碎別絹袋盛繫大藥袋内）

右二十一味㕮咀以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加以知為度

烏麻酒方

烏麻五升微熬擣碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之盡更作甚良

鍾乳酒治風虛勞損脚疼冷痺羸瘦攣弱不能行方

鍾乳（八兩）　丹參（六兩）　石斛　杜仲

天門冬（各五兩）　牛膝　防風　黃耆

正根作子

芎藭　當歸（各四兩）　附子　桂心

秦艽　乾薑（各三兩）　山茱萸　薏苡仁（各一升）

右十六味㕮咀以清酒三斗漬之三日初服三合日再後稍〻加之以知為度

枸杞菖蒲酒治緩急風四肢不隨行歩不正口急及四體不得屈伸方

菖蒲（五斤）　枸杞根（一百斤）

右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米酒熟稍稍飲之

虎骨酒治骨髓疼痛風經五臟方

元無研字日作升斗作升

宋元小丘久作冬

翼方無小字大治倒

虎骨一具炭火炙令黄色槌刮取碎擣研得數日清酒六斗浸五宿隨性多少稍飲之易云虎嘯風生龍吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑

蓼酒治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣久卧脚冷服此酒十日後目既精明體又充壯方

八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖效甚速

小黄耆酒大治風虚痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜夢悲愁不樂恍惚善忘此由風虚五臓受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼

眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡冷濇濇惡寒胸中痰滿心下寒疝藥皆主之及婦人産後餘疾風虚積冷不除者方

黄耆　附子　蜀椒　防風

牛膝　細辛　桂心　獨活

白朮　芎藭　甘草（各三兩）　秦艽

烏頭（集驗用薯蕷三兩）　大黄　葛根

乾薑　山茱萸（各二兩）　當歸（二兩半）

右十八味㕮咀少壯人無所熬練虚老人微熬之以絹袋中盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先食服一合不知可至四五合日三服此藥攻痺甚佳亦不令人吐悶小熱宜

付角二

元一作三
翼方可更作腹
更

冷飲食大虛加蓯蓉二兩下利加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石各二兩心下多水者加茯苓人參各一兩薯蕷三兩酒盡可更以酒二斗重漬滓服之不爾可曝滓擣下酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神良

薯蕷酒治風虛脚疼痿弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆　烏頭　附子　乾薑

秦艽　蜀椒　芎藭　獨活

白朮　牛膝　蓯蓉　細辛

甘草（各三兩）　葛根　當歸　菖蒲（各二兩半）

山茱萸　桂心　鍾乳　栢子仁

天雄　石斛　防風（各二兩）　大黃

石南（各一兩）

右二十五味㕮咀無所熬練清酒三斗漬之先食服一合不知可至五合日三以攻痺爲佳大虛加蓯蓉下利加女萎多忘加菖蒲各三兩（胡洽有澤瀉三兩茯苓二兩人參茵芋半夏栝蔞芍藥各一兩無秦艽芎藭牛膝蓯蓉甘草葛根當歸菖蒲鍾乳大黃爲二十二味名大黃耆湯）

茵芋酒治大風頭眩重目瞀無所見或仆地氣絶半日乃蘇口噤不開半身偏死拘急痺痛不能動搖歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行欲傾跛皮中動淫淫如

軫動也

元芋作蕷

有蟲啄軫癢搔之生瘡甚者狂走有此諸病藥皆主之方

茵芋　烏頭　石南　防風

蜀椒　女萎　附子　細辛

獨活　卷柏　桂心　天雄

秦艽　防己（各一兩）　躑躅（二兩）

右十五味㕮咀少壯人無所熬練虛老人薄熬之清酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不知加至二合寧從少起日再以微痺爲度（胡洽無蜀椒獨活卷柏爲十二味）

大金牙酒治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰脚氣無所不治方

外牡作蔓

外丹參五兩石南狗脊三兩

金牙（一斤）　側子　附子　天雄

人參　蓯蓉　茯苓　當歸

防風　黃耆　薯蕷　細辛

桂心　萆薢　萎蕤　白芷

桔梗　黃芩　遠志　牡荊子

芎藭　地骨皮　五加皮　杜仲

厚朴　枳實　白朮　牛膝

丹參（各三兩）　獨活（半斤）　茵芋　石南

狗脊（各二兩）　磁石（十兩）　薏苡仁　麥門冬（各一升）

生石斛（八兩）　蒴藋（四兩）　生地黃（切二升）

按痟削同酸削之裡

外補下有益

外信下有𫝀

右三十九味㕮咀以酒八斗漬七日温服一合日四五夜一石藥細研別絹袋盛共藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須將服之無所不治也服者一依方修合不得輒信人大言浪有加減

鍾乳酒治虛損通順血脉極補下氣方

鍾乳　石斛　茯苓（各五兩）　附子

甘菊（各二兩）

右五味㕮咀以清酒三斗漬服二合日再稍增至一升

秦艽酒治四肢風手臂不收髀脚疼弱或有拘急攣縮屈指偏枯痿躄痟小不仁頑痺者悉主之方

外經下有頸

秦艽　天門冬　五加皮　牛膝

附子　桂心（各三兩）　巴戟天　杜仲

石南　細辛（各二兩）　獨活（一兩）　薏苡仁（一兩）

右十二味㕮咀以酒二斗漬之得氣味可服三合漸加至五六合日三夜一

朮膏酒治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗（擣取汁三斗煎取半）

濕荆二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭二寸（燒取瀝三斗煎取半）

青竹三十束束別三尺圍各長一尺五寸經一寸（燒取瀝三

外大斗作大斤

外無六

外投作酘　遍下有以

浸作漬

字書烝米一甕而以水沃之乃再烝謂之餴、与饙同

（斗煎取半）

生地黄根五大斗（麤大者擣取汁三斗煎取半）

生五加根（三十六斤淨洗訖剉於大釜內以水四石煎之去滓澄清取汁七斗以銅器中盛大釜內水上煎之取汁三斗五升其煎諸藥法一準五加例）

右件白术等五種藥總計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤曝乾爲末以藥汁六斗浸麴五日待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饙以餘藥汁浸饙調強弱更蒸之待饙上痂生然後下於席上調強弱冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭三日後第二投之更淘米四斗一如前法投之三

更生散即六十卷補腎篇三石散也

日後即加藥如左

桂心　甘草　白芷　細辛

防風　當歸　麻黄　芎藭（各六兩）

附子（五兩）　牛膝（九兩）　乾薑　五加皮（各一斤）

右十一味㕮咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還以餘汁澆饙重蒸待上痂生下置席上調冷熱如常釀法和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得中訖密封頭二七日乃壓取清酒一服四合日再服細細加以知爲度温酒不得過熱愼生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉等

松葉酒主脚弱十二風痹不能行服更生散數劑及衆治不得

肘後某品同劑法
異

力服此一劑便能遠行不過兩劑方

松葉六十斤㕮咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米幷饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五斗漬七日去滓飲惟醉爲佳酒盡更以二斗半漬之飲之如初

側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子　牛膝　丹參　山茱萸
蒴藋根　杜仲　石斛（各四兩）　防風

肘後无管翳二字
按管翳病源所裡
目珠管即是也

乾薑　蜀椒　細辛　獨活
秦艽　桂心　芎藭　當歸
白朮　茵芋（各三兩）　五加皮（五兩）　薏苡仁（一升）

右二十味㕮咀絹袋盛淸酒四斗漬六宿初服三合稍加以知爲度患目昏頭眩者彌精

膏第五（例方）

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢産婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火炙摩之在内温酒服如棗核許

神明白膏治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛眥管翳耳聾鼻塞齲齒齒根挺痛及癰痔瘡癬疥等方

外附子四枚小者三十枚有漢防己一斤為十一味

呉茱萸　蜀椒（一升半外）　芎藭　白朮

前胡（崔氏作白前）　白芷（各一升　两附後）　附子（三十枚）　桂心

當歸　細辛（各二两　三附後）

右十味㕮咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎猪膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷色黃為候病在腹內溫酒服如彈丸一枚日三目痛取如黍米內兩眥中以目向風無風可以扇扇之諸瘡痔䶩齒耳鼻百病主之皆以膏傅病在皮膚炙手摩病上日三（肘後九味無桂心）

衛侯青膏治百病久風頭眩鼻塞清涕淚出霍亂吐逆傷寒咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩或急或心腹久寒積聚疼痛欬

開恐関字訛

腹前曰臚

逆上氣往來寒熱鼠漏瘰癧歷節疼腫開節盡痛男子七傷臚脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生產餘疾諸病瘑疥惡瘡癰腫陰蝕黃疸發背馬鞍牛領瘡腫方

當歸　栝蔞根　乾地黃　甘草

蜀椒（各六两）　半夏（七合）　桂心　芎藭

細辛　附子（各四两）　黃芩　桔梗

天雄　藜蘆　皂莢（各一两半）　厚朴

烏頭　莽草　乾薑　人參

黃連　寄生　續斷　戎鹽（各二两）

黃野葛（二分）　生竹茹（六升）　巴豆（二十枚）　石南

杏仁（各三兩）　猪脂（三斗）　苦酒（一斗六升）

右三十一味㕮咀諸藥以苦酒漬一宿以猪脂微火上煎之三下三上膏成病在內以酒服如半棗在外摩之日三

神明青膏治鼻中干灌之并摩服方

蜀椒（五合）　皂莢　黃芩　石南

黃連　雄黃　桂心　藜蘆（各三銖）

白朮　芎藭　大黃　澤瀉（各七銖）

烏頭　莽草　續斷　人參（各五銖）

半夏　當歸（各十二銖）　乾地黃（十銖）　萎蕤

細辛（各十銖）　附子　桔梗（各五銖）　乾薑（六銖）

戎鹽（杏子大一枚）

右二十五味㕮咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤為東南三隅竈內諸藥炊以葦薪作三聚新好土藥沸即下置土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火炙摩之在內溫酒服如棗核日三後稍益以知為度

太傅白膏治百病傷寒咽喉不利頭項強痛腰脊兩脚疼有風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉生瘡身體隱軫風搔鼠漏瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛領腫瘡及久寒結堅在心腹痛胸痺煩滿不得眠飲食欬逆上氣往來寒熱婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰太一神效膏方

蜀椒（一升）　升麻（切一升）　附子（三兩）　巴豆
芎藭（各三十銖）　杏仁（五合）　狸骨　細辛（各一兩半）
白芷（半兩）　甘草（二兩）　白朮（六兩）　一方用當歸（三兩）

右十二味㕮咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之先削附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯不仁皆摩之日一癰腫惡瘡鼠瘻瘰癧炙手摩之耳聾取如大豆灌之目痛淚出緣白醫如珠當瞳子視無所見取如黍米傅白上令其人自以手掩之須臾即愈便以水洗視如平復且勿當風三十日後乃可行鼻中痛取如大豆內鼻中并以摩之齲齒痛以綿裹如大豆著痛齒上咋之中風面目鼻口喎僻以摩之若晨夜行辟霜霧眉睫落數數以鐵漿洗用膏摩之

元打作片

曲魚膏治風濕疼痺四肢嚲弱偏跛不仁并癰腫惡瘡方

大黃　黃芩　莽草　巴豆
野葛　牡丹　躑躅　芫花
蜀椒　皂莢　藜蘆　附子（各一兩）

右十二味㕮咀以苦酒漬藥一宿以成煎猪膏三斤微火煎三沸一下別內白芷一斤三上三下白芷色黃藥成去滓微火炙手摩病上日三

野葛膏治惡風毒腫疼痺不仁瘰癧惡瘡癰疽腫脛脚弱偏枯

外血苦

百病方

野葛　犀角　蛇銜　莽草（外臺作茵芋）

烏頭　桔梗　升麻　防風

蜀椒　乾薑　鼈甲　雄黃

巴豆（各一兩）　丹參（三兩）　躑躅花（一升）（范長史无莽草丹參躑躅有茵芋細辛）

右十五味㕮咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此方不可施之猥人愼之（胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防已吳茱萸附子當歸代巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲）

蒼梧道士陳元膏治一切風濕骨肉疼痺方

當歸　細辛　芎藭（各一兩）　桂心（五寸）

本草序例云乾薑十累者以重一兩爲正時珍曰十絲曰毫曰參音壘十參曰銖四分也

肘後作日兩三度

肘後附子二兩半

元藥下有中

天雄三十枚（肘後三兩）　生地黃（三斤）　白芷（一兩半）（一両）　丹砂（二兩）

乾薑十累（二兩半）　烏頭（三兩）　松脂（八兩）　猪肪（十八斤）

右十二味㕮咀以地黃汁漬藥一宿煎猪肪去滓内藥煎十五沸去滓内丹砂末熟攪用火炙手摩病上日千徧瘥（胡洽有人參防風各三兩附子三十枚雄黃二兩爲十五味肘後千金翼有附子二十二銖雄黃二兩半大酢三升爲十五味崔氏與千金翼同）

裴公八毒膏治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入臟及魘寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不消温酒服如棗核大得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒内葱葉口中以膏灌葱葉令下病腫者向火摩腫上若歲中多温欲省病及行霧露中酒服之内

元以無一

肘後不用薤白

鼻中亦得方

蜀椒　當歸　雄黄　丹砂各二兩

烏頭　巴豆各一升　薤白一斤　莽草四兩

右八味㕮咀以苦酒三升漬一宿用猪脂五斤東向竈葦薪火煎之五上五下候薤白黄色絞去滓研雄黄丹砂如粉内之攪至凝乃止膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉傳之摩之以破除日合一方用礜石一兩蜈蚣二枚是名八毒膏（肘後不用巴豆莽草名五毒膏）

孫真人備急千金要方卷之二十四　丙辰秋九月大戸孟通