



千金方

十一

卷之五

角弓反張	風痺	風欬	偏風	諸風
	風癰			
				論雜風狀

諸風凡八類

武
175
11



政其人備急千金要方卷之二十五

宋謝奉即中...

治諸風方

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰痿痺三曰痲痺四曰瘖瘖

夫諸病皆多由是風初起時輕微人不知之或先覺身重或先覺

大寒之大風者百病之長也所謂風者言其動也言其寒也言其

枯者言其不仁也所謂偏枯者言其半身不遂也所謂痿痺者言其

間斷計取汗血其不足也所謂瘖瘖者言其不能言也所謂瘖瘖者

言其不能言也所謂瘖瘖者言其不能言也所謂瘖瘖者言其不能言也

賦
卷 175
11

篤信堂



偏枯麻痺見此病扁凡
身見厥病扁凡內
經中血所見病源作
瘰

病源不用作枯小

甲乙溫卧取汗作巨針
取之
此病扁凡可知之可

孫真人備急千金要方卷之二十五

切六

宋朝奉即守太常少卿文祕閣校理林億等校正

治諸風方

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依腧灸灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也取汗則巨取之風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚則不



篤信堂

能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒至然巢源作噫舌彊不能言病

在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後寫於陽發其汗身轉

輒者生汗不出身直者七日死巢源作眼平及鼻人中左右自

風痺濕痺周痺筋痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有証候形如風狀

得脉別也脉微澀其證身體不仁

凡風多從背五臟膂入諸臟受病肺病最急肺生氣息又胃諸

臟故也肺中風者其人偃卧而曾滿短氣悶汗出者肺風之

證也視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺膂百

病源懿作瘖咽中

巢源作眼平及鼻人中左右自

病源無周痺胞痺有

元主作三目作目

病源目下下上兩也

元日作日

壯服續命湯小兒減之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可

後治其人當妄言撥空指地或自拈衣尋縫如此數日死者為

急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣憊憊不能復言若

不求師即治宿昔而死即覺便灸肺膂及膈膂肝膂數十壯急

服續命湯可救也若涎唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受

風亦恍惚妄語與肺病相似然者緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者

肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝膂百壯服續命湯

若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂汗出者心風之

葉心貴

病源書下有汗流者三字

證也若唇正赤尚可治急灸心膈百壯服續命湯若唇或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死云旬

病源血目下青三字

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者尚可治急灸脾膈百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

病源未作未

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅菜犬者尚可治急灸腎膈百壯服續命湯若齒黃赤鬢髮直面上色者不可復治

病源直下有頭

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸膈百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脈孫脈

凡論之文大同小異元心作凡

滿則入傳於絡脈絡脈滿則輸於大經中成病歸於六腑則為熱不時卧止為啼哭其脈堅大為實實者外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉傍支去者皆為孫脉也

甲乙四季作季夏

元正偏作偏

甲乙下酒作漏素同全

甲乙與房凡三字

心風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風者為腎風風中五臟六腑之膈亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為酒風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風又風入房中風則為腸風外在腠理則

甲乙病源世作通散
作世

為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方焉
是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因入
動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有
風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難
泄喜為熱中目黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒自淚出
有風遇於虛腠理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀
時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人
熱悶是其證也

新食竟取風為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下
脹滿形瘦腹大失衣則憤滿食寒即洞泄新熱食竟入水自清

甲乙懷滿經作腫脹

甲乙目脫作冥視素問
新校正引本后作目眩

及浴者令人太腹為水病
因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣則身如

火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞
新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風為內風其狀惡風汗流沾衣勞風之為病法在
肺下使人墮上而目脫啞出如涕惡風而振寒候之二日及五

日中不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻
出為善若不出則傷肺

風邪客於肌膚虛癢成風疹瘡風邪入深寒熱相搏則肉枯
邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關節中即攣筋中亦然邪

能必

淫於臟夢臟大形小淫於腑夢臟小形大邪隨自系入腦則自轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘖喉痺舌緩不時服藥針灸風逐脉流入臟使人卒瘖緩縱瘖瘖致死風入陽經則狂入陰經則癩陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因執食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善

夫目瞤動口唇動偏喎皆風入脉故須急服小續命湯將入風

散摩神明白膏丹參膏依經針灸之

諸痺由風寒濕三氣併客於分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則分排肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濡但隨血脉上下不能左右去者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也
夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也久痺入深冷榮衛澀經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履水時如入湯腹中股脛淫瀼煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死

元無死

大阳至症也甲乙文

扁海集作作葉葉

太陽中風重感於寒濕則變瘓也瘓者口噤不開背彊而直如發癇之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脉虛竭小兒臍風大人涼濕得瘓風者皆死温病熱盛入腎小兒癩熱盛皆瘓瘓瘖厥癩皆相似故久厥成癩宜審察之其重者患耳中榮榮痛皆風入

耳前動脈即是下關穴

外名崔氏小續命湯救急死等甚奇吉仁元令不倒

腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘓直如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫生汁作癰癰者乃無害也惟風宜防耳針耳前動脈及風府神良

諸風第二方

小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗令人虛方

- 麻黃 防已 桂心 芍藥 甘草 黃芩
- 杏仁 防風 附子 生薑

右十二味以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫內諸藥

醫異典二升

外名古今錄驗經會
湯分兩不全

煮取三升分三服甚良不瘥更合三四劑必佳取汗隨人風
輕重虛實也有人脚弱服此方至六七劑得瘥有風疹象天
陰節變輒合服之可以防瘡一本云恍惚者加茯神遠志如
骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥小品千金翼同深師古
人救急無芍藥杏仁
止十味延壽無防風

小續命湯治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺
失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老小入

- 麻黃 桂心 甘草各二 生薑五 人參
- 芍藥 白朮前方有杏仁 附子 防已
- 芎藭 黃芩各一 防風半兩

右十二味以水一斗二升煮取三升分三服無桂心名續命湯胡洽

又方治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方

- 麻黃 人參 桂心 白朮各二 芍藥
- 甘草 防已 黃芩 芎藭 當歸各一

右十味以水一斗二升煮取三升分三服日二覆取汗
大續命湯治肝厲風卒然瘖瘖依古法用大小續命二湯通治
五臟偏枯賊風方

- 麻黃八 石膏四 桂心 乾薑 芎藭各二
- 當歸 黃芩各一 杏仁三十 荆瀝升

翼養致沸作羣
取三升

右九味以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮取
四升去滓又下荆瀝者數沸分四服能言未瘥後服小續命
湯舊無荆瀝今增之效如神千金翼
又方治大風經臆奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不自知

- 獨活 麻黃各二兩 芎藭 防風 當歸
- 葛根 生薑 桂心 茯苓 附子
- 細辛 甘草各一兩

右十二味以水一斗二升煮取四升分五服老小半之
若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣者加吳茱
萸一兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩腕者加橘皮二兩

若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一
兩若熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作二劑
停四五日已後更候視病虎實平論之行湯行針依穴灸之
又方治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

- 麻黃 芎藭各三兩 乾薑 石膏 人參
- 當歸 桂心 甘草各二兩 杏仁四十枚

右九味以水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯范注同云是張仲景方本欠

西州續命湯治中風癱瘓身體不知自收口不能言冒昧不
識人拘急背痛不得轉側方

古今錄驗方方向不同
外拘急背痛拘急
中外皆痛

全匡无苦茶有人考

元與取字二升作九

元少下有小

麻黃^{六兩} 石膏^{四兩} 桂心^{二兩} 甘草 芍藥

乾薑 黃芩 當歸^{各一兩} 杏仁^{三十枚}

右九味以水一斗二升者取麻黃再沸掠去上沫後下諸藥者取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠即可厚覆小汗出已漸減衣勿復大覆可熟眠矣前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風并治上氣欬逆若面目大腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合為佳間有輒行此湯與產婦及羸人喜有死者皆為頓服三升傷

多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害

也胡洽方古今錄驗

大續命散治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或卧苦驚如墮地狀盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黃 烏頭 防風 桂心 甘草

蜀椒 杏仁 石膏 人參 芍藥

當歸^{二兩} 藺茹^{翼作芎藭} 黃芩 茯苓 乾薑^{各一兩}

右十五味治下篩以酒服方寸七日再後加以知為度

疾痺同玉漏力極也
博雅疾也病源有
凡釋疾候

續命者散治風無輕重皆主之方

麻黃 芎藭 獨活 防已 甘草

杏仁各三兩 桂心 附子 茯苓 升麻

細辛 人參 防風各二兩 石膏五兩 白木四兩

右十五味粗篩下以五方寸匕內小絹袋子中以水四升和

生薑二兩煮取二升半分三服日白勿絕慎風冷大良吾嘗

中風言語寒澀四肢疼曳處此方日服四服十日十夜服之

不絕得愈

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂
其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲

元稹下有諸凡字

偏枯筋急曲拳而卧其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張
自呼喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐
倒錯與亡人相隨其肺風發則面白欬逆唾膿血土氣奄然而
極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼諸有
此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目
通臟腑悉主之

白鮮皮 白木 芍藥 桂心 芎藭

當歸 杏仁 防風 甘草各一兩 獨活

麻黃 茯苓各三兩 生薑四兩

右十三味以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可

外項作濕元仁作任

外瘡作音

外製其一作二

服三劑

大八風湯治毒風頑痺躄曳手脚不遂身體偏枯或毒弱不仁或風入五臟恍惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強直不得俛仰腹滿不食欬嗽或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失瘖半身不隨不仁沉重皆由體虛特少不避風冷所致治之方

- 當歸二兩 五味子 升麻各一兩半 烏頭 黃芩
- 芍藥 遠志 獨活 防風 芎藭
- 麻黃 秦艽 石斛 人參 茯苓
- 石膏 黃芪 紫苑各一兩 杏仁四十枚 甘草

元二作一

元復作燥
根退高源作根退
云四肢不收身休疾
痛肌肉腫滿骨節
懈怠腰脚延弱不
自覺知是也

木類
見本國灌

桂心 乾薑各二兩 大豆二升 右二十三味以水一斗二升酒二升合煮取四升彊人分四服羸人分六服

八風散治八風十二痺根退半身不遂歷節疼痛肌肉枯焦皮膚瞶動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘡瘰面上起疱或黃汗出更相染漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒乍熱方

- 麻黃 白朮各一斤 羌活二斤 黃芩一斤 大黃半斤
- 桔萎根 甘草 藥荆 天雄 白芷
- 防風 芍藥 天門冬 石膏各十兩 山茱萸

却天朝

食茱萸 躑躅各五升 茵芋十四兩 附子三十枚 細辛

乾薑 桂心各五兩 雄黃 朱砂 丹參各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕初每日一服三十日後日

再五十日知百日瘥一年平復長服不已佳先食服

小八風散治迷惑如醉任言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲

憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心痛徹背不嗜飲

食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖

汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頸項強直口面喎戾四肢不隨

不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方 天雄 當歸 人參各五分 附子 天門冬

防風 蜀椒 獨活各四分 烏頭 秦艽

細辛 白朮 乾薑各三分 麻黃 山茱萸

五味子 桔梗 白芷 柴胡 蒼草各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至二七日二服

以身中覺如針刺狀則藥行也

烏頭湯治八風五尸惡氣遊走胸心流出四肢來往不住短氣

欲死方

烏頭 芍藥 乾薑 桂心 細辛

乾地黄 當歸 吳茱萸 甘草各二兩

右九味以水七升煮取二升半分三服

此方生地黄四逆加吳茱萸
生手湯去通草大
頭乾地黄

此藥言從蒼耳一名

去細乾作所

大觀本草持下有水

証類本草者作處

病源云三蟲長虫赤
虫蛻虫也

蒼耳散治諸風方

當以五月五日午時乾地刈取蒼耳葉洗曝燥擣下篩酒
若漿服一方寸匕日三作散若吐逆可蜜和為丸服十九
準前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有風
者皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以鉞針刺
潰去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之者大甕
中稍取用之此草辟惡若欲看病者疾者便服之令人無
所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服
之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九
皆可採用

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁變急方

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|
| 荆瀝 | 竹瀝各五升 | 枸杞根白皮 | 生麥門冬各一 |
| 香鼓合三 | 人參 | 茯苓 | 梔子仁 |
| 芎藭 | 桂心 | 細辛 | 杏仁 |
| 白鮮皮各二兩 | 生薑 | 石膏 | 甘草各二兩 |
| 右十八味以水二斗和竹瀝荆瀝煮取三升分四服相 | 去如人行六七里凡五劑間三日服一劑已三兩 | | |
| 治虛熱恍惚驚邪恐懼方 | | | |
| 荆瀝三升 | 竹瀝二升 | 香鼓合三 | 牛黃十八銖 |
| 人參各三兩 | 升麻 | 鐵精 | 天門冬 |
| | | | 龍齒 |
| | | | 生麥門冬 |

茯苓 梔子各二兩

右十二味以水二斗者取三升去滓下牛黃鐵精更煎

五六沸取二升七分五服温服相去十里久

地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷所方

生地黄汁 枸杞根汁升一 生薑汁 酥各升

荆瀝 竹瀝各五升 天門冬 人參各八兩 茯苓六兩

大黃 梔子仁各四兩

右十一味擣篩五物為散先煎地黃等汁成煎次內散藥攪

調每服一七日再漸加至三七覺利減之

又方

黃芩 乾藍 芍藥 鼠尾草各三兩 梔子仁

生葛各六兩 羚羊角兩五 豉一升

右八味以水七升者取二升五分三服

治積熱風方

地骨皮 萎蕤 丹參 黃芪 麥門冬

澤瀉各三兩 清蜜 薑汁各一合 生地黄汁升一

右九味以水六升者取二升去滓內地黃汁更緩火煮減

升內蜜及薑汁又煮一沸藥成温服三合日再

大防風湯治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風 當歸 麻黃 白朮 甘草各十銖

黃芩三十 乾地黄 山茱萸 茯苓 附子各一兩
 右十味以水九升煮取二升半一服七合太小便不利
 內大黃人參各十八銖大棗二十枚生薑三兩煮取三升分
 三服深師加天門冬一兩

大戟洗湯治中風發熱方

大戟

苦參各等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒溫洗從上
 下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四升煮洗之

金牙酒療積年小風五疰舉身躡曳不得轉側行步跛躄不能
 收攝又暴口噤失音言語不正四肢背脊筋急腫痛流走不常

外以字白作用
 漿水作醋漿

元昨作酢醃作飢無方
 字麻作末

勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲滯結實逆害
 飲食乍咽嘔吐食不生饑醫所不能治者方

金牙

碎如米粒用
小絹袋盛

乾地黄

地膚子

無子用莖蘇
恭用蛇麻子

葫蘆根

附子

防風

細辛

葶草各四兩

羌活

一斤胡洽
用獨活

蜀椒四合

右十味以咀盛以絹袋用酒四斗於釜中漬密閉頭勿令
 洩氣春夏三宿秋冬六七日宿酒成去滓日服一合此酒無
 毒及可小醉常令酒氣相接不盡一劑病無不愈又令人肥
 健酒盡自可加諸藥各二兩惟蜀椒五兩用酒如前勿加金
 牙也冷加乾薑四兩服此酒灸刺起三十諸風躡曳神驗

元酒下有勝翼十有年

肝後有首字四兩蘇藟
根與石解作人考三兩

元血方

備急用升麻乾薑各四兩人參二兩石斛牛膝各五兩不用
蒴藿根為十四味蘇藟不用地黃為十三味一方用羨藜四
兩黃芪三兩胡洽用續斷四兩為十
一味千金翼用茵芋四兩無葶草

常山太守馬灌酒除風氣通血脉益精華定六腑聰明耳目悅
澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣
充盈八十日能夜書百日致神明房中強壯如三十時力能引
弩年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉王方

天雄二兩商陸根

躑躅

蜀椒各一兩

烏頭一枚

附子五枚

桂心

白欬

茵芋

乾薑各三兩

右十味以絹袋盛酒三斗清春夏五白秋冬七日去滓
初服半合稍加至兩三人擣滓為散酒服方寸七日三以知

為慶夏日恐酒酸以油單覆之下井中近冰令不酸也千金
商陸桂心為八味

蠻夷酒治火風枯癩三十年著床及諸惡風眉毛墮落方

乾地黃

獨活

丹參

礬石各一兩

麥門冬

附子

甘遂各二兩

赤石脂二兩

乾薑

蘇子升一

蕪荑

芫花

栢子仁各一合

蘇子升一

蘇子升一

菴蓉

茯神翼作

金牙

薯蕷

白木

杜仲

石南

牡荊子

山茱萸

欵冬各十

白芷

烏喙

烏頭

人參

狼毒

蜀椒

防風

細辛

礬石

寒水石

牛膝

麻黃

芎藭

當歸

柴胡

芍藥

牡蠣

桔梗

狗脊

天雄

石斛

桂心

狗脊

天雄

各半

右四十五味以酒二斗漬夏二日春秋六日冬九日

服半合密室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合

翼無芎藭云加天
棗四十枚更佳

又方治八風十二痺偏枯不隨宿食又寒虛冷五勞七傷及婦

人產後餘疾月水不調皆主之方

礬石

桂心

白朮

狼毒

半夏

石南

白石脂

龍膽

續斷

芫花

代赭

白石英

蘭茹

石韋

玄參

天雄

山茱萸

防風

桔梗

藜蘆

卷柏

寒水石

細辛

烏頭

躑躅

蜀椒

白芷

秦朮

菖蒲

礬石

附子

遠志

石膏

蜈蚣

各一

右三十四味以酒二斗漬四日每服一合日再十日後

去滓曝乾搗篩為散酒服方寸匕日再以知為度

心細辛烏頭躑躅蜀椒而有砒硝恒山黃芩黃連大黃麻黃
地黃前胡甘草兔絲子芍藥紫苑各一兩杏仁十枚同搗
篩絹袋盛用酒三斗麴三斤黍米三斗作飯依釀酒法以藥
袋置醱中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三
服曝藥為末酒服方寸匕以身體暖為度

君翼王作公

脾當作脚翼作解

翼帶上有白

魯王酒治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香臭口爛生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣胃脇肩脾痛手不能上頭不能帶衣腰脊不能俯仰脚酸不仁難以久立公風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉主之方

- 茵芋 烏頭 躑躅各三 天雄 防已
- 石斛二十 細辛 牛膝 甘草 栝子仁
- 通草 桂心 秦朮 茵陳 山茱萸

元志下有各十八銖字

汝元作四

右十五味咬咀以酒四斗清十日每服一合加至四五合以知為度其各此為魯公酒有乾薑胡洽無防已以絹囊又方治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不能行步不自帶衣攣躄五緩六急婦人帶下產乳中風五勞七傷

- 乾薑 躑躅 桂心 甘草 芎藭
- 續斷 細辛 附子 秦朮 天雄

黃芩胡洽作黃耆

附子

瞿麥

乾地黄

王不留行胡洽作天門冬

杜仲

澤瀉

石南

防風

遠志

石膏 紫苑各五兩 葛根 通草 防風
 栝子仁 巴戟天 石斛 石南 山茱萸
 石龍芮兩四 牛膝 天門冬各八兩 烏頭二十枚
 蜀椒斤半

右二十五味，咀以水五升，漬三宿，法麴一斤，合漬秫米二斗，合釀三宿，去滓，炊糯米一斗，醞三宿，藥成，先食服半合，日再待，米極消盡，乃去滓，曝乾末服。
 獨活酒治八風十二痺方

獨活 石南各四兩 防風三兩 附子 烏頭
 天雄 茵芋各二兩

肘後血脈篇云：三子惡作，多心，胸云，作，胸亂，欲飲。

肘后節作毒

肘后作眼上睛垂方

肘后助作腦又云此腦小脚屈頭也

肘后痛下有者

右七味，咀以酒二斗，漬七日，每服半合，日三，以知為度。

灸法

扁鵲云：治卒中惡風，心悶煩毒，欲死，急灸足太趾下橫文，隨年壯立愈。

若筋急不能行者，內踝筋急，灸內踝上四十壯，外踝筋急，灸外踝上三十壯，立愈。

若眼戴精，上插灸目兩眦後二十壯。

若不能語，灸第三椎上百壯。

若不識人，灸季肋頭七壯。

若眼反口，禁腹中切痛，灸陰囊下第一橫理十四壯，灸卒死亦

元氣身上有孝

良
治次風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或唇青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是

次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是○次灸上關一處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中是○次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脈陷者中是○次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是○次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是○次灸凶會一處七壯穴在神

凶惡白誤顛同

元氣作輸下左

元氣作五
元是下有次灸肝輸
二處各七壯穴在第九
椎下兩傍各一寸半是
二十三字

庭上一寸是○次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是○次灸本神一處各七壯穴在耳正直上入髮際二分是○次灸天柱一處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際陷者中是○次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是○次灸風門一處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半是○次灸心膪一處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半是○次灸腎膪一處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是○次灸膀胱膪一處各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是○次灸曲池一處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是○次灸肩髃一處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是○次灸支溝一處

元氣作五

卷二十一

五

秒兩相枕言兩史記周
昌傳索隱云正寐之東
西室皆謂兩言似箱
篋三形高厚云黃証
近手屈肘前臂上
脈當有三岐脈中央者
名為手肝脈兩兩者名
岐脈

各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間是。○次灸合谷二處各
七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是。○次灸間使二處各
七壯穴在掌後二寸兩筋間是。○次灸陽陵泉二處各七壯穴
在膝下外尖骨前陷者中是。○次灸陽輔二處各七壯穴在
外踝上絕骨端陷者中是。○次灸崑崙二處各七壯穴在外踝
後跟骨上陷者中是。

治風灸上星及百會各二百壯前項二百四十壯腦戶及風府
各二百壯會七百壯治大風灸百
治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸二分須取病人指
寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風身鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得瘥狂者亦
瘥兩耳門前後各灸一百壯
治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五推名曰臑膺
百五十壯多至三百壯便愈
心膺穴在第五節云第七節對心橫二間寸主心風腹脹滿
食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食鼻衄目眴眩暈不明
肩頭脇下痛小腹急灸一二三百壯
大腸膺在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸澀泄利
食不消化小腹絞痛腰脊疼彊或大小便難不能飲食灸百壯
三日一報

腋門在腋下攢毛中一寸名太陽陰一名腋間灸五十壯主風絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼

孫真人備急千金要方卷之二十五

孫真人備急千金要方卷之二十六

切七

宋朝奉郎守太常少卿元秘閣校理林億等校正

治諸風方

賊風第三論

方

桂枝酒治肺虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺失便利屬風所損方

桂枝

芎藭

獨活

牛膝

薯蕷

甘草

附子

防風

茯苓

天雄

茵芋

杜仲

蒟藿根

白朮

乾薑

躑躅

猪椒葉根皮

大棗

元肺作肝 肝厥偏痺 下有他頭二字

右十八味以酒四斗漬七日每服四合日一加至五六合

肝風占候其口不能言

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝膈第九椎下是五十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三百壯良

大定心湯治心氣虛悸恍惚方見別卷中

乾薑附子湯治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪方

乾薑 附子各八兩 桂心 麻黃各四兩 芍藥三兩 右五味以水九升煮取二升分三服三日後服一劑

外異枚作用

異邪作科

元作三

外傷作陽

側子酒治心寒或笑或呻口欬方見別卷中

芍藥湯治卒中風四肢不仁善笑不怠方

右十味以水九升煮取三升分三服
荆瀝湯治心虛寒陰氣傷寒損心驚悸語聲寬急混濁口喎冒昧好自笑屬風傷心方

荆瀝 升三 母薑 取汁 升一 麻黃 白木 芍藥 各四兩
防風 桂心 升麻 茯苓 遠志
人參 羌活 當歸 各三兩 防己 甘草 各二兩

外其下有所

正無作年

元胸作輸下同

右十五味以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥
煮取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升分四服日三夜
白木酒補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧
其疾源厲風損心具如前方所說無窮

白木切 地骨皮 荆實各五斗 菊花三斗

右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石
用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令全吐

治心風寒方

灸心膈各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沉澀如破鼓

聲舌疆不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重如山便利無
度方見別卷中 半夏湯溫中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶
恍惚脹滿方

半夏 大麻仁熬研 生薑各一升 芍藥 茯苓
五味子 桂心 橘皮各三兩 白木四兩 附子五兩
甘草二兩 大棗三十枚

右十二味以水一斗二升煮取三升去滓下大麻仁脂
更上火一沸分三服

當歸圓補脾安胃調氣止痛治脾虛寒身重不舉語音沉澀屬

風傷痛便利無度方

當歸 酸棗仁 乾薑各八兩 芎藭 乾地黄
 天雄各六兩 地骨皮 黃耆各七兩 大棗一十枚 吳茱萸五合
 甘草 秦椒葉 厚朴 秦艽各四兩 桂心
 防風 附子 白朮各五兩
 右十八味為末蜜丸如梧子酒服二十九丸加至四十九丸再服

脾風占候聲不出或上下手
 當灸手十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次灸兩大指節上下各七壯

益通海前卷三後第五推名曰脾胸

脾風為吉作少

元血自字

治脾風方

灸脾胸夾脊兩邊各五十壯凡人脾胸無定所隨四季月應病即灸臟腑是脾穴此法甚妙

依源麻黃續命湯治肺虛寒厲風所中噓吸戰掉聲嘶塞而散下氣息短憊四肢痺弱面色青葩遺失便利冷汗出

麻黃六兩 大棗五十枚 杏仁 白朮 石膏各四兩
 桂心 人參 乾薑 茯苓各三兩 當歸
 芎藭 甘草各二兩

右十二味以水一斗二升煮麻黃去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服舊方無白朮茯苓今方無黃芩轉以依經

千金方

卷三十六

四

三百三十什宿

肺虛痛治肺虛注
聲嘶傷語用力
戰掉後弱虛痛
凡入肺方血石骨
皆以凡二十二味

肺虛痛紫苑各三十
四味

逐病增損

八風防風散治肺寒虛傷語音嘶下拖氣用力戰掉緩弱羸瘠
厲風入肺方

防風 獨活 芎藭 秦椒 乾薑

黃耆 附子四十天雄 麻黃 五味子

山茱萸 石膏各三十 秦艽 桂心

薯蕷 細辛 當歸 防已 人參

杜仲各三 甘草十二 貫衆二 甘菊 紫苑二

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩七日再
溫中生薑湯治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胸滿肺痿方

元服下有先

生薑二 桂心 橘皮四 甘草 麻黃三
右五味以水一斗煮取二升半分三服煎麻黃兩沸去沫然後入諸藥合煮
治肺寒方

灸肺膈百壯

腎瀝湯治腎寒虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯肘脚偏跛
蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利仰久耳偏聾塞腰背相引
隨病用藥依源增損方

羊腎具 黃耆 芎藭 防風 甘草
桂心 當歸 人參

嘉靖原本草有乾
地黃山茱萸

元定作實

元故作秋別作七

下金方

卷二十六

五

三百九十五

五味子各三兩

玄參

茯苓

芍藥各四兩

磁石五兩

地骨皮二升

生薑八兩

右十五味以水一斗五升煮羊腎取七升下諸藥取三

升去滓分三服可服三劑

茵芋酒治耳聾口

散等病別方見今本見九四卷中

乾地黄圓治腎虛呻吟喜悲怒反常心性陽氣弱腰背疆急顛

冷杉

乾地黄

山茱萸

天門冬

桂心

續斷各一兩半

栝子仁

杜仲

牛膝

菴蓉各四兩

茯苓

天雄

鍾乳各二兩

松脂

遠志

乾薑各三兩

薯蕷

甘草各一兩

右十八味末蜜丸梧子大酒服二十九日二加至四十九

治腎寒方

各腎脬百壯

大巖蜜湯治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發即搶心

張滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子枚

甘草

乾地黄

細辛

羊脂青羊角亦得

當歸

桂心各一兩

右十一味以水八升煮取三升去滓內脂令烊分三服

千金方

卷二十六

六

付宿

元呂下有用

外且至香羊脂更勝

小呂治中風身如角引大巖蜜湯不用羊脂九味

温服相去如人行十里須若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥
人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩胡洽不用梔子
羊脂茯苓桂心

小巖蜜湯治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絕往來有時筋
急少陰傷寒口噤不利方

- 大黃二兩 雄黃 青羊脂各一兩 當歸 乾薑
- 桂心 乾地黄 芍藥 甘草 細辛各四兩
- 吳茱萸三兩

右十一味以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水
三斗煮取九升分十服○排風湯治諸毒風邪氣所中口噤

悶絕不識人及身體疼痛面目手足暴腫者方

- 犀角 貝子 升麻 羚羊角各一兩

右四味治下篩為粗散以水二升半內四方寸匕煮取一升
去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子傳上日二度老

小可斟酌加減神良亦可多合備用
烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側吐
呼發作有時使入陰縮手足厥逆方

- 烏頭十五枚 大棗十枚 甘草二兩 芍藥四兩
- 桂心六兩 老薑一斤

右六味以水七升煮五味取三升去滓別搗烏頭去皮

孟適抄唐一
名鬼箭羽厚
血一四

外二升字皆作杯

元辨作辨

四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中煮兩小沸去滓服
一合日一聞食強者二合以如醉狀為知不知增之
治賊風所中腹內攣急方

麻黃兩

甘草尺一

石膏雞子大碎

鬼箭羽各雞子大

右四味咬咀以東流水二升煮取一升頓服之

論曰夫歷節風者久不治者入骨節蹉跌變成癩病不可
不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也治之
雖有湯藥而不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急辨者宜
服諸湯猶勝不治但於痛處灸三七壯佳
防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣溫溫

悶亂欲吐者方

防風

白朮

知母

桂心各四兩

芍藥

芍藥

杏仁

甘草各二兩

半夏

生薑各五兩

右十味咬咀以水一斗者取二升分四服日三夜古今錄驗友無

半夏杏仁芍藥用附子二枚為八味

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後中風方

羌活

桂心

芍藥

葛根

麻黃

乾地黄各三兩

甘草二兩

生薑五兩

右八味咬咀以清酒二升水五升煮取三升溫服五合日三服

千金方

卷三十六

元瘴作瘰
習里作苦焰、微亞
瘰勿怪

脚氣中名附子湯
血于姜

防已湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者方

防已 茯苓 白朮 桂心 生薑各四

甘草兩 人參兩 烏頭七

右八味以苦酒一升水一斗者取三升半一服分合日
三夜一當覺焦熱瘡愈然慎勿怪也若不覺復合服以覺
乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒每入宜慎之

治濕風體痛欲拆肉如錐刀所刺方

附子 乾薑 芍藥 茯苓 人參
甘草 桂心各一 白朮四

元魚心字

右八味以水八升者取二升日三服一方去桂心用乾地黄二兩

大棗湯治歷節疼痛方

大棗十五 附子一枚 甘草一尺 黃耆兩 生薑二兩
麻黃兩

右六味以水七升者取三升每服一升日三合

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角兩 羚羊角兩 前胡 黃芩 梔子仁
射干各三 大黃 升麻各四 豉一

右九味以水九升者取三升去滓分三服
治歷節諸風百節酸痛不可忍方

元合作服

千金方

卷三十六

九

外斤作升

元第上右扭

外傷作實冷症

三字

酸大透切重釀酒

松脂三十斤鍊五十遍酒煮十遍不能五十遍二十遍亦可鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻且空腹酒服方寸七日三數數食麪粥為佳慎血腥生冷物酢菓子百日已後瘥

松節酒治歷節風四肢疼痛由如解落方

松節斤三十 猪椒葉三十斤碎到各用

右二味澄清合漬乾麩五斤候發以糯米四石五斗釀之依家醞法酉酸勿令傷冷第一酸時下後諸藥

大棗 栢子仁 天雄 單解 芎藭各五兩 秦朮六兩

茵芋各四兩 防風十兩 磁石十一兩 獨活十二兩

元通作逐

右木味咬咀內飯中炊如常酸法酸足訖封頭四七日壓取

清適性服之勿至醉吐

石膏湯逐風毒方

石膏雞子大

雞子二枚

甘草一尺

麻黃三兩

杏仁四枚

右五味咬咀以水三升破雞子內水中烱令相得內藥煮取

一升服之覆汗汗不出燒石尉取汗出為佳

治歷節風方

松膏一升酒三升浸七日每服一合日再數劑愈

又方松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六度

元覆下有取
外取作逐

孫真人備急千金要方卷之二十六
治諸風方
偏風第四方針灸法
防風湯治偏風甄權處療安平公方
防風 芍藥 白芷 牛膝 狗脊
草薺 白木各一兩 羌活 葛根 附子外臺作人參
杏仁 各二兩 薏苡仁外臺作 石膏 桂心各三兩 麻黃四兩
生薑 五兩
 右十六味以水一斗二升煮取三升分三服一劑覺好

孫真人備急千金要方卷之二十七

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

治諸風方

偏風第四方針灸法

防風湯治偏風甄權處療安平公方

防風

芍藥

白芷

牛膝

狗脊

草薺

白木各一兩

羌活

葛根

附子外臺作人參

杏仁

薏苡仁外臺作

石膏

桂心各三兩

麻黃四兩

生薑

右十六味以水一斗二升煮取三升分三服一劑覺好

千金方

卷之二十七

宋宅

元服下有服

更進一劑即一度針九劑九針即瘥灸亦得

針風池一穴 肩髃一穴 曲池一穴

支溝一穴 五樞一穴 陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴 凡針七穴即瘥

仁壽富備身患脚奉勅

針環鈿一穴 陽陵泉一穴 巨虛下廉一穴

陽輔一穴 凡針四穴即能起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起

針上窻一穴 環鈿一穴 陽陵泉一穴

針巨虛下廉一穴 凡針四穴即能跪起

唐狄欽患偏風不得挽弓

針肩髃一穴即得挽弓甄權所行

治猥退風半身不遂失音不語者方

杏仁去雙仁及皮小大二斗洗入臼搗二斗令碎研如寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香滑即熟未及此則為不熟惟熟為妙停極冷然後內好麴一斗六升煎取八升第十遍酸饋也次一炊後取杏仁三升研取三斗二升汁煎取六升第二酸也次一炊準第二酸取杏仁汁多少為第三酸也若疑米不足別更取二升杏仁研取八升汁煎取四升更斟酌炊米酸之若猶不足更

外坐一斗六升作一升下有按時已前所留一升杏仁內取四升持下水一斗六升廿一字與饋字

外不作石

外以下有外

外斗作升

習翼云手髓孔腕後
尖骨頭穴、中又三
脚五册屈兩脚膝腕
文又云脚髓孔足外
踝後一寸

研杏仁二升取八升汁煎取四升更酸之以熟為限一
不米杏仁三斗所以節次研杏仁者恐并煎汁酢故也
若冬白任意并煎準計三斗杏仁取汁一石六斗煎取
八斗四升清麴以分之酸饋酒熟封四七日開澄取清
然後壓糟糟可乾末和酒服之大驗秘方

又方草麻子脂一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日煮之令熟服
之
又方灸百會次灸本神次灸承漿次灸風府次灸肩髃次灸心
膂次灸手五冊次灸手髓孔次灸手少陽次灸足五冊次
灸足髓孔次灸足陽明各五百壯

元極作扭

外極作扭具作枚

柔風出病源

治木風半身不遂方

蠶沙兩石熟蒸分作直袋三枚各受七斗熟盛一袋著患
處如冷即取餘袋一依前法數數易換百不禁瘥止須羊
肚釀粳米葱白薑椒豉等爛煮熱喫日食一具十日止此
方千金不傳

又方蒸鼠壤土袋盛慰之瘥即止

葛根湯治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後中柔風及氣滿
方

- 葛根
- 芍藥
- 桂心
- 乾地黄
- 羌活各三兩
- 麻黃
- 甘草各二兩
- 生薑六兩

卷三十一
三十一
三十一

外有細辛二兩九十
一味

病源云刺凡者風
邪走徧於身而皮
膚淫踏如雞刀所
刺故名刺風

右八味以清酒三升水五升者取三升溫服五合日三
麻子湯治大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞彊服之不虛
久又治精神蒙昧者方

秋麻子三升淨擇 防風 桂心 生薑
石膏碎綿 橘皮各二兩 麻黃三兩 竹葉 葱白各一握
香鼓合

右十味吹咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓取九升
別煮麻黃兩沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓分三服
空腹服當微汗汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一
兩劑產有人患大風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯

全玉引千金拘李
作拘李

全玉麻黃五錢黃
芩三錢黃芩細辛
二錢獨活四錢五升作
六升

全玉麻中半兩
作二錢六銖作二錢

準當六七十劑

仲景三黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經白
不欲飲食方

麻黃三十銖 黃芩十八銖 黃耆 細辛各十銖 獨活一兩
右五味吹咀以水五升煮取二升分三服一服小汗兩服大
汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六銖氣逆加人參十八
銖心悸加牡蠣十八銖渴加栝蒌十八銖先有寒加八角附
子一枚此方秘不傳

白欬薤苈湯治風拘攣不可屈伸方

白欬 薤苈仁 芍藥 桂心 酸棗仁

牛膝

乾薑

甘草各升

附子三枚

細辛

右九味以酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶杖起行不耐酒服五合車前子

獨活寄生湯夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛舉脚重痺宜急服此方

獨活

寄生

杜仲

牛膝

細辛

秦朮

茯苓

桂心

防風

芎藭

乾地黄

甘草

當歸

芍藥

人參

元風作喜
元復作湯

右十五味以水一斗者取二升分三服温身勿冷風虛下利者除乾地黄服後取葫蘆葉火燎厚安席上及熱眠上冷復燎之冬月取根春取莖熬卧之佳其餘薄殼不及葫蘆蒸為愈也諸處風濕亦用此法新產竟或患腰痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消血附子一枚大者無寄生人參甘草當歸

菊花酒治男女風虛寒冷腰背肩食少羸瘦無顏色嗑吸少氣去風冷補不足方

- 菊花 杜仲各一斤
- 防風 附子
- 黃耆
- 乾薑 桂心
- 當歸 石斛各四
- 紫石英

茯苓各五兩 草薢

獨活

鍾乳各八兩

茯苓三兩

右十五味以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合

日三用乾薑

杜仲酒治腰脚疼痛不遂風虛方

杜仲八兩

石南二兩

羌活四兩

大附子五枚

右四味以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜冷病婦人服之

風痺第五論方

論曰夫風痺者卒不能語口噤手足不遂而僵直者是也治之以伏龍肝五升為末冷水八升和攪取汁飲之能盡為善此方

原本編作痛

元滕作勝

元更常倒

元各作合

治心煩恍惚腹中痛滿絕而復蘇自此以下九方皆主此風用之次第宜細尋

之

論曰凡欲醫此病當知先後次第不得謾投湯藥以失機宜非

但殺人因茲遂為痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝

於更常進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用於此制其熱毒

竹瀝湯治四肢不收心神恍惚不知人不能言方

竹瀝升二

生葛汁升一

生薑汁合三

右三味相和溫暖分三服平日日晡夜各一服服訖覺四體

有異似好次進後湯方

竹瀝升一

生葛汁合五

芎藭

防已

附子合四

千金方

卷二十一

六

三周受

次若同方互考看

人參 芍藥 黃芩 甘草 桂心 各一

生薑 羚羊角 石膏 杏仁 麻黃 各一

防風 升麻 防風 升麻 羚羊角 防已

竹瀝 升麻 防風 升麻 羚羊角 防已

桂心 芍藥 麻黃 各一

右八味以水四升合竹瀝煮取二升半分三服兩日服

一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進三劑若手足冷

者加生薑五兩白木二兩若未除更進後方

凡風痺服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

竹瀝 升一 甘草 根一木作二兩 人參 芍藥 各一

獨活 升麻 各一 防風 麻黃 各一

生薑 石膏 羚羊角 防已 桂心

黃芩 附子 一本作杏 白木 各二

右十七味以水八升煮減半內瀝煮取二升半分三服

相去如人行十里又更服若有氣者加橘皮牛膝五加皮各

一兩

防風 防已 獨活 秦艽 黃耆

芍藥 人參 白木 茯神 芎藭

凡風痺服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

- 遠志
- 升麻
- 石斛
- 牛膝
- 羚羊角
- 丹參
- 甘草
- 厚朴
- 天門冬
- 五加皮
- 地骨皮
- 黃芩翼作薯蕷
- 桂心各一兩一
- 乾地黄
- 橘皮
- 生薑
- 麻黃各三兩
- 枳柳翼作甘草
- 葉本翼作附子
- 杜仲翼作麥門冬
- 石膏六兩一
- 烏犀角各二兩一
- 薏苡仁升

右三十三味搗篩為粗散和攪合勻每服以水三升藥三兩煮取一升綿漚去滓頓服之取汗日一服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

判瀝湯凡患風人多熱常宜服此方

右三味相和溫暖為一服每日旦服者散午後進此平復好瘥乃止

- 獨活八兩
- 芍藥
- 茯苓
- 防風
- 防己
- 葛根各六兩
- 羚羊角
- 當歸
- 人參
- 桂心
- 麥門冬
- 石膏各四兩
- 磁石十兩
- 甘草三兩
- 白木五兩

右十六味各切剉分為二十四分每分入生薑生地黃切一升杏仁二十七枚以水二升煮取七合或日或夜中或日

獨活者散治諸風痺方

荆瀝

竹瀝

生薑汁各五合

服或間日服無所忌

五補圓凡風服湯藥多患虛熱翕翕然宜除熱方

防風 人參 茯苓 乾地黄 羚羊角

麥門冬 天門冬各一兩半 芍藥 獨活

乾薑 白朮 丹參 食茱萸云山茱萸

甘草 茯神 升麻 黃耆 甘菊花

地骨皮 石斛 牛膝 五加皮 薯蕷各二兩

秦艽 芎藭 桂心 防己 生薑屑

黃芩各一兩 附子十八銖 石膏三兩 寒水石二兩

右三十二味為末白蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服二十九

且三稍加至二十九忌油麪蒜生冷酢滑及猪羊雞魚等肉

論曰古人立方皆集病根冷熱制之今人臨急造次搜尋即用

故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢方用無不效湯

藥既爾丸散亦然凡此風之發也必由熱盛故有竹瀝葛汁等

諸冷藥焉後之學者不能仔細識其方意故有茲論具而述之

其人無密室者不可與療以彊人居室不密尚中風邪况服藥

之人乎 治風非不能語手足不遂方

度病者手小指內岐間至指端為度以置劑上直望心下

以丹注度上端畢文作兩度續所注上合其下開其上取

元創作脂
習美在石

先某作公于温母公当作
 公音集阮文三合也公
 某家君曰到作当作倒
 母于去重作公及倒上
 丹作以丹
 老字庵筆記曰今人
 書其為公皆以為俗
 從簡便其實古其字
 也穀梁值祖二年蔡
 侯鄭伯會於鄆范蠡
 匡曰鄆公地陸德明秋
 文曰不知其國說云公
 地本又作某

其本度橫置其開上合三合其狀如到作某字形男度左
 手文度右手媮不分下故上丹生三處同時起火灸之各
 一百壯愈

此處為模糊的書法或醫文，內容難以辨認，可能包含對前文或相關醫理的進一步闡述。

孫真人備急千金要方卷之二十八 一切九

宋朝奉郎守太常少卿文秘閣校理林億等校正

治諸風方

風懿第六論方

獨活湯治風懿不能言四肢不收手足輾曳方

獨活兩 桂心 芍藥 括蕒根 生葛各二兩

生薑六兩 甘草三兩

右七味咬咀以水五升煮取三升分三服日三

論曰脾脈絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脈係舌本合心脾

二臟受風邪故舌彊不得語也

病源

千金方

卷之二十八

一

桂

治中風口噤不能言方

防已

桂心

麻黄

葛根

甘草

防風

芍藥

生薑

右八味

以水六升

煮取二升

半分三服

瘖瘖不語皆治

石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行腰脊彊直五緩

六急手足拘攣隱疹搔之則作瘡風戶身癢卒風面目腫起手

不出頭口噤不能言方

瘖瘖俗呼為風序亦名風尸見六十四卷中

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參

桂心

麻黄

當歸

芍藥

甘草

元形作形
風尸疑當是風矢
外至曰瘖瘖風
齋俗呼為風尸
出六十四卷

乾地黄

食茱萸

右十二味以水六升酒三升煮取三升分三服大汗勿

治中風口噤不知人者方

芥子

酢

又方

右二味

煮取一升

薄頭以布裹之

日一度

不得語

又方

豉

吳茱萸

右二味

以水七升

煮取三升

漸飲之

不能語

又方

白朮

四兩

以酒三升

煮取一升

頓服

千金方

卷二十八

二

楊

又方服荆瀝一升
又方服淡竹瀝一升
針灸法

卒中風口噤不得開灸機關名頰車二穴穴在耳下八分小近
前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右灸之中風失音
不能言語緩縱不隨先灸天窻五十壯息火仍移灸百會五十
壯畢還灸天窻五十壯者始發先灸百會則風氣不得洩內攻
五臟喜閉伏乃失音也所以先灸天窻次百會佳一灸五十壯
悉洩火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風服
藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑

此篇者所謂
尸厥甲乙經
百全一名三曰
五會

惑也不至心者勿浪畫灸

論曰風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痺失聲
皆風邪所為也入臟皆能殺入故附之於治風方之末凡尸厥
而死脉動如此故陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也針百會入三
分補之灸鬩斗鬩兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又針
足中趾頭去甲如韭葉又刺足大趾甲下肉側去甲三分
桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥汁
又方濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉
治卒不得語方

酒五合和人乳汁中半分為一服
 論曰夫眼瞶動口唇偏喎皆風入脉急與夫續命湯附子散摩
 神明膏丹參膏依穴灸之喉痺舌緩亦然風入臟使人瘖瘖卒
 死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與伏龍肝散和雞冠血及
 鼈血塗乾復塗之并灸吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯報之
 至三報三日不瘥更報之

附子散治中風手臂不仁口面喎僻方

附子

桂心各五兩 細辛

防風

人參

乾薑各六兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

甘草湯治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎僻精神不定言語
 倒錯方

甘草

桂心

芎藭

麻黃

當歸

芍藥

人參各二兩

附子

側子各二兩

獨活

防已各三兩

生薑

石膏

茯苓

白朮

黃芩

細辛各一兩

秦朮

防風各一兩半

菊花一升

淡竹瀝四升

右二十一味以水一斗先煮麻黃去沫取七升內竹瀝
 及藥者取三升分四服服三服訖間一盃粥後更進一服待
 藥勢自汗慎生冷醋蒜麪乳酪魚等

外急上石痰

治中風面目相引口偏者耳牙車急舌不得轉方

獨活三兩

竹瀝

生地黄汁各一升

右三味合煎取一升頓服之即愈

又方

牡蠣

礬石

附子

竈下黄土

右四味各等分為末取三年雄雞冠血和藥傳其上持鏡候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也千金方云偏左者塗左偏右者塗右

又方

竹瀝

防風

防己

升麻

桂心

稟石下有正則洗去之五字

外引者書率暴風口面偏半身不遂不轉者瀝湯方

肘後附方布下有蕪字楊雄作搗

芎藭各二兩 麻黃四兩 羚羊角三兩 右八味吹咀以水四升合竹瀝煮取一升半分三服日服劑常用效

又方青松葉一斤擣令汁出清酒一斗漬二宿近火一宿初服

半升漸至一升頭面汗出即止

又方酒煮桂取汁以故布搗病上正則止左啗榻右右啗榻左

此秘方不傳餘常用大效

治口耳僻方

防風

附子

葛根各二兩

栢實

麻黃各三兩

獨活

生薑各四兩

杏仁三十枚

千金方

卷二十八

乙四

楊雄

本書廿一卷短氣不
得語灸小指第四指
向支脈上

右八味咬咀以水一斗酒二升者取三升分四服
治卒中風口喎不正方

取空青末如豆大一枚含之即愈

又方炒大豆三升合焦以酒三升淋取汁頓服用後以治之

又方大皂莢一兩去皮子下篩以三年木酢和左喎塗右右喎

塗左乾更塗之

又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩密塞之勿令

泄氣下頭內大豆一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患右灸

左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

又方灸手交脈三壯左灸右右灸左其性如鼠屎形橫安之兩

肘后作刊枳樹皮一升

頭下火

枳茹酒主諸藥不能瘥者方

枳實上青刮取末欲至心止得茹五升微火炒去濕氣以

酒一斗清微火暖令得藥味隨性飲之主口僻眼急大驗

治緩風急風并佳用後以酒身直不得屈伸反覆者枳樹皮亦得

角弓反張第七方

治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身強
直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用
食或大小便不利皆瘥之方古今錄驗名方
八風續命湯

人參

桂心

當歸

獨活

黃芩

乾薑

甘草各十銖石膏一兩杏仁四十枚

右九味以咀以井花水九升煮取三升分三服日三覆取汗

不汗更合加麻黃五兩合服

倉公當歸湯治賊風口噤角弓反張痙者方

當歸

防風各十銖獨活半兩附子一枚

細辛半兩

麻黃三十銖

右六味以咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者

格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

又方酒一斗膠二斤煮令烊得六升每服一升稍服得愈

又方單服荆瀝良

秦朮散治半身不遂言語錯亂作喜作悲角弓反張皮膚風癢方

秦朮

獨活胡洽用

黃耆

人參

甘菊花

各二兩胡洽用蜀椒

茵芋十八銖胡洽用茵草

防風

石斛

胡洽用草蘇

山茱萸

桂心各一兩半附子

芎藭

胡洽用桔梗

細辛

當歸

五味子

甘草

白朮

乾薑

白鮮皮胡洽用白斂各三十銖

麻黃

天雄

遠志各一兩胡洽用防已

右二十二味治下篩酒服方寸七日再漸漸加至二七又云

治風無新久并補

蓋通抄字原與吳
字而有吳字
或云吳字字內

與秦尤散治風注入肢體百脉身腫角弓反張手足酸疼皮膚
習習身體盡痛眉毛墮落耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下
濕養太便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆治

- | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|----|-----------------------|
| 秦朮 | 蜀椒 | 人參 | 茯苓 | 牡蠣 |
| 細辛 | 桔萸根 | 麻黃 <small>各十銖</small> | 乾薑 | 附子 |
| 白朮 | 桔梗 | 桂心 | 獨活 | 當歸 <small>各一兩</small> |
| 黃芩 | 柴胡 | 牛膝 | 天雄 | 石南 |
| 杜仲 | 莽草 | 烏頭 <small>各半兩</small> | 甘草 | 芎藭 |
| 防風 | <small>各一兩半</small> | | | |

右二十六味治下飾盛以韋袋食前溫酒一升服方寸七日

三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

風痺第八論一首 方九首

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛因疲勞
汗出臥不時動搖加被微風遂得之形如風狀巢源云其狀如
被微風如但以脉自微澀澀在寸口關上緊宜針引陽氣冷脉和緊去則
愈

治風濕脉浮身重汗出惡風方

- | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------------|-----|----|----|--|----|-----|
| 甘草 | 二兩 | 黃耆 | 五兩 <small>分</small> | 漢防己 | 四兩 | 生薑 | | 白朮 | 各三兩 |
| 大棗 | 十二枚 | | | | | | | | |
- 右六味咬咀以水六升煮取三升分三服服了坐被中欲解

至正房已黃其陽
外引浮師

至正與一洪字緊
上有小

元如作所

本綱四經云：瘧瘧中，正出如瘧，瘧也。而瘧瘧可以瘧瘧。銅書者，乃瘧瘧。

李宜別云：生鐵漬水，煎者最飲。入新水，日久，錄上生黃膏，則力愈。瘧瘧人肌，解鞋，徒按其所用黃鐵，出皇且生黃，其者者者。

孟通按：金匡名黃，其下右有瘧字。

如蟲行皮中，臥取汗。
鐵精湯治三陰三陽厥逆，寒食胃膈支滿，病不能言，氣滿胃中，急，肩息，四肢時寒熱，不隨喘悸，煩亂，吸吸少氣，言輒飛颺，虛損方。

黃鐵三十斤，以流水八斗，揚之，三千遍。

炭五十斤，燒鐵令赤，投冷水復燒，七遍如此，澄清取汁，二斗者藥。

麥門冬各一斤，白薇，黃芩，甘草。

芍藥各四兩，石膏五兩，生薑二兩，大棗二十枚。

右十味，㕮咀，內前汁中，煮取六升，服一升，日三服，分兩日服。

黃耆湯治血痺陰陽俱微，寸口關上微，尺中小緊，外證身體不

至正凡下有瘧

仁如風狀方

蜀黃耆，人參要藥，芍藥，桂心各三兩，生薑六兩。

大棗十二枚

右六味，㕮咀，以水六升，煮取二升，服七合，日三服，令盡。

治遊風行走無定，腫或如盤，或如甌，或著腹背，或著臂，或著脚，悉主之方。

海藻，茯苓，防風，獨活，附子。

白木各三兩，大黃五兩，當歸一本作當陸，鬼箭各一兩。

右九味，㕮咀，以酒二斗，漬五日，初服二合，漸加以知為度。

白欬散治風痺腫筋急，展轉易常處方。

商陸一名常陸

千金方

卷二十八

八

九十

卷二十八

七

三百四十七

白斂兩半附子六兩
右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至二刀圭身中熱
行為候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺太易方

草薺 薯蕷 牛膝 澤瀉各二兩 地膚子

白朮各半 乾漆 蟻螬 狗脊 車前子

天雄各十兩 茵芋六兩 山茱萸三十兩 乾地黄二兩

右十四味為末蜜和丸如梧桐子大酒下十九日三後稍加

治諸風痺方

防風 甘草 黃芩 桂心 當歸

茯苓各一兩 秦艽 葛根各二兩 生薑五兩 大棗三十枚

杏仁五十枚

右十一味咬咀以酒水各四升煮取三升分三服取汗

附子酒治大風冷痰癰脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云二枚酒五升漬春五日每服一

合日再以瘥為度

麻子酒治虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不調手足
疼痺著牀服之令人肥健方

麻子 一石 法麴斗一

右二味先擣麻子成末以水二石著釜中蒸麻子極熟炊

元傾作頃
翼出下有去

千金方

卷二十八

九

戊一

石米傾出滓隨汁多少如家醞法候熟取清酒隨性飲之

林下

...

...

今日再

...

...

...

谷

寬政八年丙辰秋九月 大戶孟通撰



電報年表
凡例
一、本表係根據
二、本表係根據
三、本表係根據
四、本表係根據
五、本表係根據
六、本表係根據
七、本表係根據
八、本表係根據
九、本表係根據
十、本表係根據

