



千金方

廿七

卷之五

卒死
諸盤傷損

火瘡
蛇蠱毒

備急凡四類

武 9

175

27



孫真人備急千金要方卷之七十五

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

備急方

卒死第一方

治卒死無脈無他形候皆復俱竭故也治之方

牽牛隔蒜上二百息牛臥必瘞牛不瘞者即死

牛頭背紙

又方牛馬屎乾以酒飲之煎其汁水其汁可引科者以

又方牛馬屎乾以酒飲之煎其汁水其汁可引科者以



武 9
補 17
卷 27

篤信堂



孫真人備急千金要方卷之七十五

慈

宋朝奉即守太常少卿充秘閣校理林億等校正

備急方

卒死第一方灸法

治卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨鼻上一二百息牛舐必瘥牛不肯舐著鹽汁塗面上

牛即肯舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得時後方云乾者以人溺解

此扁鵲法

又方灸斗兩脇下解急方云云又治屍厥

商期是



針灸法

針間使各百餘息又灸鼻下人中二名鬼客廳肘後方云又治屍厥

治魔死不自覺者方

慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語取東門上雞頭為末以酒服之

治卒魔死方

搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳張仲景云灌口中

治鬼魔不悟方

伏龍肝為末吹鼻中

又方皂莢為末如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死回生集驗方云治

思

辟魔方

雄黃如棗大係左腋下念火終身不魔張文仲云男左女右

又方灸兩足大趾叢毛中各二十七壯肘後方云華佗法又救卒死中惡

治中惡方

葱心黃刺鼻孔中血出愈肘後方云入廿八寸無苦使目

又方大豆二十七粒為末雞子黃并酒相和頓服

又方便人尿其面上可愈肘後方云此扁鵲法

又方灸胃腕五十壯愈

治中惡并蠱毒方

千金方 卷之五 三頁
冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

又方温二升猪肪頓服之

又方車軋脂如雞子大酒服之

治卒忤方 此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之

鹽八合以水二升煮取一升半分二服得吐即愈 備急方云治鬼

擊若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之即通

又方犢子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂 時後方云治鬼

又方書墨為末水服二錢七

又方臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

灸法 治卒忤死

灸手十指爪下各三壯餘治同上方 備急方云治卒死而張日及折者又灸人

中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯

還魂湯治卒感忤鬼擊飛屍諸奄忽氣絕無復覺或已死咬口

口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右足踏肩刮

之藥下復增取盡一升須更立蘇方

麻黃 兩二 桂心 兩二 甘草 兩一 杏仁 七十粒

右四味咬咀以水八升煮取三升分三服 肘後方云張仲景方云桂不用

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欬絕方

雄黃粉酒服二刀圭日三血化為水

治鬼擊病方 鬼擊之病得之無漸卒者人如刀刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口血出或下

雞屎白如棗 青花麻 一把

右二味以酒七升煮取三升熱服須臾發汗若不汗熨斗盛火灸兩脇下使熱汗出愈

又方艾如雞子大二枚以水五升煮取二升頓服

又方吹酢少許鼻中

灸法

灸人中二壯立愈不瘥更灸

又灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取瘥又灸臍下一寸三壯

治五絕方夫五絕者一曰自縊二曰墻壁壓逆三曰溺水四曰覺寐五曰產乳絕

醫經毛席說文云罷罷罷皆理絞之屬

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下溫者一日亦可治

治自縊死方 凡救自縊死者極須按定其心勿截繩手抱起徐徐解之

心下尚溫者以氈餅覆口鼻兩人吹其兩耳

又方強臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口傍無

念氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方擣皂莢細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方刺雞冠血出滴著口中即活男雌女雄

又方雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方皂莢為末以葱葉吹入兩鼻中逆出更吹

又方梁上塵如大豆許各內一小竹筒中四人各捉一筒同時吹兩耳兩鼻即活

又方尿鼻口眼耳中并捉頭髮二撮如筆管大擊之立活

又方雞血塗喉下

又方藍青汁灌之

又方灸四肢大節陷大指本文名曰地袖各七壯

治熱暈方

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

又方令聾人仰臥以熱土壅臍上令人尿之臍中温即愈

又方可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓

使飽但以熱土及熨灰土壅臍上佳

又方濃煮麥取汁三升飲之即愈不瘥更灌

又方張死人口念通以煖湯徐徐灌口中小兒死人頭念湯入

腹須臾即蘇

又方使人噓其心念煖易火熨之

又方抱狗子若雞著心上熨之

又方屋上南時瓦熱熨心冷易之

又方灌地漿一盞即愈

又方地黃汁一盞服之

又方水半升和麵一大抄服之

治落水死方

以甌中灰布地令厚五寸以甌側著灰上令死者伏於甌上使頭小垂下炒鹽二方寸七內竹管中吹下孔中即當吐水水下因去甌下死者著灰中擁身使出鼻口即活

又方握地作坑數斛灰內坑中下死人覆灰濕徹即易勿令大熱博人灰冷更易半日即活

又方取大甌傾之死人伏其上令死人口臨甌口然葦火二七把燒甌中當死人心下令烟出小入死人口中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人身及甌勿令其熱當火氣能使死人心下足得煖卒無甌者於岸側削地如甌空下如甌燒令煖以死人著上亦可用車轂為之勿令隱其腹令死人低頭水得出并炒灰數斛令煖以粉身濕更易者

又方但埋死人煖灰中頭足俱歿惟開七孔

又方倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得

又方綿裹皂莢內下部中須更出水

又方裹石灰內下部中水出盡則活

又方倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

又方熬沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易

又方甌中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活

又方屈兩脚著生人兩肩，上死人背，向生人背，即負持走，行吐出水，便活。

又方解死人衣，灸臍中，凡落水經一宿，猶可活。治冬月落水凍，四肢直，口噤，尚有微氣者方。

以大器中熬炭，使煖，盛以囊，薄其心上，冷即易，心煖氣通，目得轉口，乃開，可溫尿粥稍稍吞之，即活。若不先溫其心，便持火灸身，冷氣與火爭，即死。

治凍爛瘡方

猪後懸蹄，以夜半時燒研細篩，以猪脂和傅，小兒治入水手足腫痛方。

搗生胡麻薄之

治酒醉，兜酒，恐爛五臟方。

以湯著糟中，漬之，冷復易，夏亦用湯。

又方搗茱萸根汁，飲三升。

又方凡醉不得安卧，不動，必須使人搖轉，不在，特忌當風席地，及水洗，飲水交接。

治飲酒頭痛方

竹茹五兩，以水八升，煮取五升，去滓，合冷內破雞子五枚，攪勻，更煮二沸，飲二升，使盡。

治飲酒腹滿不消方

煮鹽湯以竹筒灌木孔中

治飲酒中毒方

煮大豆三沸飲汁三升

又方酒漬乾椹汁服之

治酒病方

葱白 豉各一升

右二味以水四升煮取二升頓服

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入百脉

心氣虛令人錯謬失常方

芍藥 人參 白薇 栝藹根 枳實

知母各二兩 甘草一兩 生地黄八兩 酸棗仁半升 茯苓神三兩外臺

右十味以水一斗煮取三升分三服

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻仁一升 黃芩二兩 附後用黃藥

右二味為末蜜和丸含之千金翼用黃藥二兩

治酒醉不醒方

飲葛根汁一斗二升取醒止附後方云治大醉連日煩毒不堪

飲酒令人不醉方

柏子仁 麻子仁各二兩

右二味治下篩為一服進酒二倍

又方

葛花

小豆花各等分

右二味合為末服三方寸七飲時仍進葛根汁芹汁及枇杷葉飲並能倍酒

又方九月九日菊花為末臨飲服方寸七

又方小豆花葉陰乾百日為末服之

又方五月五日取井中倒生草枝陰乾為末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾蔓菁根二十七枚三遍蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健噴方

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

又方取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方 柳花 臘月鼠頭灰

右二味等分為末黃昏時酒服一杯

又方酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安著猪圈

中任猪搖動經七日取酒盡飲

又方正月一日酒五升淋確頭搗一下取飲之

又方故氈中菴耳子七枚燒作灰黃昏時煖一杯酒呪言與病

狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方鷓鴣屎燒灰水服方寸七永斷
 又方取毛鷹一過吐毛水煮去毛頓服
 又方自死蟻螯乾搗末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗
 又方酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之
 又方酒漬汗靴替一宿平且空腹與飲即吐不喜見酒
 又方刮馬汗和酒與飲終身不飲
 又方虎屎中骨燒末和酒與飲 又方白狗乳汁酒服之
 又方故紡車絃燒灰和酒與服 又方臘月馬腦和酒服之
 又方驢駒衣燒灰酒飲方寸七
 孫真人備急千金要方卷之七十五

孫真人備急千金要方卷之七十六

慈五

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正
 備急方

蛇蟲等毒第二論方

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾内生椒三兩枚裹著須臾即出

若無火以刀周市割蛇尾截合皮

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭滴血著口中即出

又方以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍蛇瀉血口

中拔之

治卒馬蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

治蛇蝎螫方

服小蒜汁津薄上

又方熟搗葵取汁服之

治蛇咬方

人尿厚塗帛裏即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不瘥更消注之

又方以母猪耳中垢傅之肘後方云牛耳中垢亦可用

治蝮蛇毒方

念婦人騎度三過又令坐上

又方以射罔塗腫上血出即愈

又方生麻楮葉合搗以水絞去滓漬之

又方念婦人尿瘡上

又方末薑薄之乾復易

治諸蛇毒方

雄黃 乾薑各等分

右二味為末和射罔著竹筒中帶行有急用之

又方雞屎二七枚燒作灰投酒中服之
又方以麵圍上合童男尿著中燒鐵合赤投中冷復燒著二三
度瘥

又方雄黃為末傳上日一易

又方鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之

又方擣紫萁取汁飲一升以滓封瘡上以水灌之

又方梳中垢如指大長一寸尿和傳之

又方取合口椒胡荽苗等分擣傳之無不瘥

又方男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却秘方也

又方用銅青傳瘡上

又方擣大蒜和胡粉傳之
又方口嚼大豆葉塗之良
又方猪脂和鹿角灰塗之
又方炙梳汗出熨之
入山草辟衆蛇方

乾薑 麝香 雄黃各等分

右三味擣為粗散以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗瘡

方云蛇無麝香以射罔和代之救急方云以蜜和為膏傳瘡處良

又方常燒殺羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫入瘡已愈餘毒在肉中淫淫痛癢方

大蒜

小蒜各一升

右二味合搗以熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺久毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良

又方燒死鼠為末傅之

治衆蛇螫方

灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小執之

治虎咬瘡方

濃者葛根汁洗十數遍及搗為散以葛根汁服方寸七日五甚者夜二

又方青布急卷為繩止二物燒二頭燃內竹筒中注瘡中薰之妙

又方煮鐵令濃洗瘡

又方嚼栗子塗之良

辟虎法

凡入山燒水牛殺羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若

輒殺之於後必遭螫毒治亦難瘥慎之慎之又慎也

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者

用井底泥塗之温則易唯者用當瓦屋溝下泥傳之若值
無雨可用新汲水從屋上臨下取泥

又方取齒中殘飯傳之又猪脂封之又射罔封之又礪砂和水
塗上立愈

治蠟螿方

若著手足以冷水漬之水微暖則易之著餘處者冷水浸
故布揄之小暖則易

又方生烏頭爲末唾和傳之

治蜂螿毒方

取瓦子摩其上噉二十七遍置瓦子故處

治蜂螿方

猪脂

蜜各五

蠟二

右三味和煎如膏候冷以塗之

又方燒蜂房爲末膏和塗之肘後方云先煮蜂房洗之又燒塗之

又方酥脂塗之立愈

又方燒牛屎灰苦酒和塗之

又方齒垢塗之

又方淳酢沃地取泥塗之

又方醬鹽塗之

又方以人尿新者洗之

又方尿泥塗之

又方反手捻地上土傳之

論曰凡蠹蝮蟲尿入影著處便令人病瘡其狀身中忽有處是痛如芒刺亦如刺蟲所螫後起細瘡漏作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰脇胸治之法初得之摩犀角塗上止其毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠹蝮形以刀子細細畫蠹蝮腹中取生就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由矣

治蠹蝮尿方

殺羊髭燒灰臘月猪脂和封之

又方擣鼓封之

又方酢和胡粉塗之

治蠹蝮尿瘡方

燒鹿角為末以苦酒和傳瘡上已有汁者燒道傍葵蒲席傳之

又方槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處以洗日五六遍仍以赤小豆為末以苦酒和傳之燥復易小兒以水和又方嚼大麥以傳之三日

又方燕巢中土以猪脂和傳

又方熟嚼梨葉以水和塗燥復易之

又方爛搗馬鞭草以傳上燥則易之

又方取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治三種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短弧一名蟻其蟲形如甲蟲外臺云正

黑狀如大飛生有一長角在口前如弩檐臨其角端曲如土弩以氣為

矢因水勢以射人或聞其在水中鈸鈸作聲要須得水沒其

口便射入此蟲畏鷺鷥能食之其初始證候先惡寒噤瘳寒熱

筋急仍似傷寒亦如中屍便不能語朝旦小蘇脯夕輒劇寒熱

悶亂是其證始得三四日當即治之治之稍遲者七日皆死初

未有瘡但惡寒噤瘳及成瘡似蠛蠓屎亦似癩疽瘡射工中瘡

有五種其一種瘡正黑如黛子皮周邊悉赤或衣犯之如有芒

刺痛其一種作瘡久穿或哺間寒熱其一種如火灼燥起似

此者最急數日殺入備急方云有四種治射工中人寒熱或發瘡在一處有異於常者方

取鬼白菜一把清苦酒中熟搗絞取汁服一升日三

又方取生吳茱萸莖葉一握斷去前後取握中熟搗以水二升

煮取七合頓服

又方取葫荑切貼瘡灸七壯

又方取蜈蚣大者一枚火炙治為末苦酒和以傅瘡上
 又方取赤葛菜熟搗絞取汁每服一升日四五服
 又方白雞屎取白頭者三枚湯和塗帶毒處
 又方

升麻^{三兩} 犀角 烏扇根^{各二兩}

右三味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服相去如炊頃盡更作

治射工中人已有瘡者方

取芥子爛擣苦酒和厚塗瘡上半日痛便止
 又方取狼牙葉冬取根擣令熟薄所中處又飲四五合汁

治射工中人三種瘡方

升麻^{二兩} 烏扇根^{三兩}

右二味咬咀以水三升煮取一升適寒溫盡服滓薄上
 五香散治江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡方

甲香 犀角 鼈甲 升麻 薰陸香
 烏髮 丁香 沉香 黃連 青木香
 羚羊角 黃芩 甘草 牡蠣^{各四分} 吳茱萸^{三分}
 黃蘗^{六分}

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸七日二升以水和少許洗之仍以雞子白和塗腫上乾則易

野葛膏治射工惡核卒中惡毒方

野葛升一 巴豆 烏頭 蜀椒各五 茵芋

躑躅 附子 丹砂各一兩 雄黃 大黃各七兩

右十味治下篩以不中水猪膏二斤煎三上三下去滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合名膏皆無令產婦女人小兒雞犬六畜見之惟宜清淨

治沙虱毒方

斑猫二枚一枚熬為末服一大枚燒令烟絕為末著瘡中又方大蒜十枚止一物令度安熱灰中炮令熟去皮刀斷蒜頭取熟柱所著毒處

又方

麝香 大蒜

右二味合擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傅瘡上

又方

雄黃 朱砂 恒山各等分

右三味取五月五日中時令童子合之取傅瘡上

治石蛭方 山水中陰濕草木上石蛭著人則穿齧人肌膚行入肉中浸淫墳起如蟲行道之狀

凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽塗脚脛及足趾間跌上及著鞋鞋蛭不得著人也已著者灸斷其道即愈

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲入涉水中人射工而無物其診法初得之惡寒微似頭痛日匡疼心中煩懊四肢振煖腰背百節皆強兩膝痛或翁翁而熱但欲睡且醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日腹中生蟲食入下部肛中有瘡不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食入五臟熱盛毒煩下利不禁八九日雖良醫不能治矣覺得之急早視其下部若有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡如鯉魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是虫水與非者當作五六升湯以小蒜五升吹咀投湯中消息勿令太熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治之

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方

吳茱萸一升 生薑切半 犀角一升 麻一升 橘皮各二兩

烏梅十四枚

右六味吹咀以水七升煮取二升分二服

又方浮萍草曝乾為末酒服方寸匕

又方取梅葉桃葉搗絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之

小兒不能飲以汁傅乳頭飲之

又方搗蒼耳汁服一升又以綿裹杖沾汁導下部日三瘥

又方搗蓼一把以酒和絞取汁一升飲之不過三服瘥外臺肘後作梨

葉

又方擣藍一把水解以塗浴面自身體令遍

又方擣蛇莓根為末水飲之并導下部生者用汁凡夏月行常多齋此藥屑入水以方寸匕投水上流無所畏又辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無毒

治貓鬼野道病歌哭不自由方

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水服方寸七日一針灸方見別卷中

又方臘月死貓兒頭燒灰水服一錢七日

治貓鬼眼見貓狸及耳雜有所聞方

相思子 草麻子 巴豆 各一 硃砂末 二 蠟 各四

右五味合擣為丸先取麻子許大含之即以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中沸即盡火上作十字其貓鬼並皆死矣

治蜘蛛咬毒方

人尿傳又油淀傳又炮薑貼之又糊孫屎傳之

又方烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之

治馬醫入及踰入作瘡毒腫執痛方

馬鞭梢 二寸 鼠屎 二七

右二味合燒為末以猪膏和塗之立愈外臺方云治逐成瘡爛經久不愈者肘後

方云用馬鞭皮燒未猪膏和塗

治馬醫入陰卵脫出方

推肉入以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封之且忍勿小便即愈

治牛馬醫及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

取灰汁執漬瘡常令汁器有火數易汁勿令爛入肉三數日漬之有腫者灸石尉芝日二消止

治馬血入瘡中方

服人糞如雞子大復以糞傅瘡上

又方取婦人月水傅之神良

治剝死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中屎以塗之大良外臺方云取其屎燒灰

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

又方飲醇酒取醉即愈

又方燒雞毛作末以酒服方寸匕

又方以沸湯令得所浸洗之取瘡

論曰凡春末夏初犬多發狂必誠小弱持杖以預防之防而不免者莫出於灸百日之中一日不關者方得免難若初見瘡瘥痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺

心中醒然惺惺了方知咬已即狂是以深須知此此病至重
世皆輕之不以爲意坐是死者常年有之吾初學醫未以爲業
有久遭此將以見問吾了不知報答以是經吾手而死者不一
自此銳意學之一解已來治者皆愈方知世無良醫狂死者半
此言非虛故將來學者非止此法餘下方皆須沉思留心作意
殷勤學之乃得通曉莫以初解一二種法即謂知訖極自誤也
聊因方末申此一二言不盡意耳

又曰凡獠犬咬人七日輒應一發三七日不發則脫也要過百
日乃得免耳每到七日輒當搗韭汁飲一二升又當終身禁食
大肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚及諸

肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食便發不宜飲酒能過
一年乃佳集驗方云若重發者生食蟾蜍鱸魚良亦可燒炙食
之必全其人知初得毒便爲之則於後不發也

治獠犬毒方
頭髮 獠皮各等

又右二味燒灰水和飯一杯口禁者折齒內藥

又方搗地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之亦
可爲末服方寸七日三兼傳上過百日止

又方搗韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治愈後復發者
又方刮虎牙若骨服方寸七小品方云刮狼牙或虎骨未服
已發狂如獠犬者服即愈
又方燒虎骨傳瘡及慰又微熬杏仁搗研取汁服之良又取燈

益殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜

又方用韭根故梳二枚以水二升煮取一升頓服

又方桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服半出ス

又方取獭犬腦傅上後不復發

又方蝦蟇及粥飲服之

又方服葇若子七枚日二名

又方梅子末酒服之

又方以豆醬清塗之日三四

治狂犬齧人方

蛇脯一枚灸去頭擣末服五分七日三名

又方擣葇若根和鹽傅日三名

又方青布浸汁服三升

又方飲驢尿二升一名

治凡犬齧人方

又方熬杏仁五合令黑碎研成膏傅之

又方取甕中熟灰以粉瘡中帛裏繫之

又方燒自死蛇一枚令焦爲末內瘡孔中

又方鼠屎爲末以臘月猪膏和傅之外臺方云用鼠一

又方飲生薑汁一升小品方云韭汁亦佳外臺方云亦治

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裏之瘡

千金方 卷七十六

又方以沸湯和灰塗瘡上

又方燒犬尾為末傅瘡日三

又方以頭垢少少內瘡中

又方火炙蠟以灌瘡中

又方以熱牛屎塗之佳

又方以苦酒和灰塗瘡中

治小兒狗齧方

凡犬月一日以水一升灌之

勿令狗主打狗若豚盡日三升水

灌之

灸法

凡獠大所齧未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒及猪犬肉

治猪齧方

松脂煉作餅上貼之

又方屋雷中泥塗

孫真人備急千金要方卷之七十六

千金方

卷七十六

七

孫真人備急千金要方卷之七十七
宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理校億等校正
備急方
被打及諸傷損第三方論
論曰凡被打損血悶搶心氣絕不能言可擊開口尿管中念下咽
即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安者以手袖掩
其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升
治被打擊頭眼青腫方
炙肥猪肉令熟搗上肘後方云治血聚
皮膚間不消散者
又方牆上朽骨唾於石上研磨塗之乾即易

孫真人備急千金要方卷之七十七

茲六

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理校億等校正

備急方

被打及諸傷損第三方論

論曰凡被打損血悶搶心氣絕不能言可擊開口尿管中念下咽
即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安者以手袖掩
其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升

治被打擊頭眼青腫方

炙肥猪肉令熟搗上肘後方云治血聚
皮膚間不消散者
又方牆上朽骨唾於石上研磨塗之乾即易

又方灸猪肝貼之

又方新殺羊肉乘熱封之

又方大豆黃為末水和塗之

治被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃升一

當歸

桂心各二兩

右三味治下篩以酒服方寸七日三夜

又方

劉寄奴

延胡索

骨碎補各一兩

右三味以水二升煎取七合復內酒及小便各一合熱

溫頓服

又方

麝蟲

蚤蟲

水蛭各三十枚

桃仁五十枚

桂心二兩

大黃五兩

右六味以酒水各五升煮取三升分五服

又方生地黄汁三升酒一升半煮取二升七合分三服治後方

墮下瘀血張心面青短氣欲死者

又方葇荍子為末傅瘡上

白馬蹄散治被打腹中瘀血并治婦人瘀血化血為水方

白馬蹄燒令煙盡擣篩酒服方寸七日三夜

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶方

鼓一升以冰三升者三沸分再服不瘥重作更取麻子煮
如鼓法不瘥更煮鼓如上法

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞短氣方

甘草兩 茯苓兩 杏仁五十枚

右三味以水二升者取九合分二服

治從高墮下傷折疾痛煩燥啼叫不得卧方取鼠屎燒末以猪

膏和塗痛上即急裹之肘後方云裹骨破碎

治從高墮下及為木石所定或因落馬凡傷損血瘀凝積氣絕

欲死無不治之方

取浮土五升蒸令溜分半以故布數重裹之以慰病上勿

大熱熱破肉冷則易之取痛止即已凡有損傷皆以吐

法治之神效已死不能言者亦活三十年者亦瘥

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷方

以酢和麵塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止方

當歸 桂心 蜀椒 附子各二分

澤蘭分 芎藭分 甘草分五

右七味並熬令香治下篩酒服方寸七日二凡是傷損皆服

之十日愈小兒亦同救急方云治墮馬落車被打傷腕折臂

大痛十三日筋骨相連

黃耆散治腕折方

黃耆 芍藥各三 當歸 乾地黄

附子 續斷 桂心 乾薑

通草各二 大黃兩 蜀椒合 烏頭兩半

右十二味治下篩先食酒服五分七日無大黃

治折骨斷筋方

乾地黄 當歸 羌活 苦參各二

右四味治下篩酒服方寸七日三

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉搗取汁飲一升無生麻者乾麻汁服亦主

墜墮搗打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

生地黄不限多少熟搗用薄所損傷處爛搗熬之以裏傷

處以竹片夾裏令編縛急勿令轉動一日可

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

以水二升漬鼓三升取汁服之

鹿角散治同前

右酒服方寸七日三

又方筋骨傷物破時以熟馬屎傳之無癢
又方大豆二升水五升者取二升以淳酒六七升合和豆汁服
之一日盡如湯沃雪肝後方云治墮疔瘡
又方

羊腦兩一

髮灰

胡粉

胡桃脂各半

右四味搗和調如膏傅上生布裹

治頭破腦出中風口噤方

大豆一斗熬去腥勿使太熟搗為末熟蒸氣偏合配下盆
中以酒一斗淋之温服一升覆取汗傳杏仁膏瘡上
紫湯治破傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮胎凡

得此者大重不過五劑方見第八卷中
治丈夫從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡傷經崩
中皆主之方

阿膠

艾葉

乾薑各二兩

芍藥三兩

右四味以咀以水八升煮取三升去滓內膠分二服羸
人分二服蕪治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下
血不止者服之悉愈

大膠艾湯治男子傷絕或從高墮下傷五臟微者唾血及金瘡
傷經者方

阿膠

艾葉

甘草

當歸

芎藭各一 乾薑一 芍藥 乾地黄各三

右八味以水八升煮取三升去滓內膠合烱分再服羸人分三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止者神良

竹皮湯治為兵杖所加木石所迫血在胸背及脇中痛不得氣息方

青竹刮取胎亂髮烙如雞子二枚

右二味於炭火上炙令焦燥合搗下篩以酒一升煮三沸止一服盡之三服愈

治墮馬落車及樹間崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡劇者不過三三作

治墮落馬車間心腹積血唾吐無數方

乾藕根為末以酒服方寸匕日三服如無取新藕汁服

桃仁湯治從高墮下落大木車馬間胸腹中有血不得氣息方

桃仁十四枚 大棗二十枚 大黃 硝石

甘草各二兩 蒲黃一兩

右六味以水三升煮取一升絞去滓適寒溫服盡之當下不止瀉麻汁一杯飲之即止

又方治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通

桃仁

麩蟲各三枚

荆芥分半

大黃

芎藭各三兩

當歸

桂心

甘草各二兩

蒲黃五兩

右九味以水一斗煮取三升分三服

又方治墮落瘀血方

桃仁五十枚

水蛭

蜜蟲各二枚

甘草

桂心

當歸各二兩

砒硝三兩

大黃四兩

右八味以水八升煮取三升絞去滓適寒溫服三升日

三服深師方無砒硝

又方

桃仁五十枚

蜜蟲

麩蟲

水蛭各三枚

大黃五兩

桂心二兩

右六味以酒水各五升合煎得三升適寒溫飲三升日

三服

又方治腕折瘀血方

桃仁四十枚

亂髮握

大黃如指節

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之吹咀太黃桃仁以酒

三升煮取三升盡服血盡出肘後云仲景方用大黃三兩

灰久用次單布方一尺灰桃仁四十九枚敗蒲葶一握長三寸切甘草一枚如指大以童子小便量多少煎湯成內酒一

大盞次下大黃分溫為三服別對敗蒲葶半領煎湯以谷衣被重覆服藥須通利數行痛楚立瘥利及浴水赤勿怪瘀血

千金方

卷七十七

七

也

又方

桃仁^{六十枚} 大黃^{六兩} 桂心^{二兩}

右三味咬咀以酒六升煮取三升分三服當下血瘕

蒲黃散治從高墮下有瘀血方

蒲黃^{八兩} 附子^{一兩}

右二味為末酒服方寸七日不知增之以意消息

又方治腕折瘀血方

蒲黃^{升一} 當歸^{兩二}

右二味治下篩先食酒服方寸七日

三百三十二付宿二

又方

車蟲^{二十枚} 牡丹^{一兩}

右二味治下篩酒服方寸七血化為水備急方云治及宿血在諸骨節及外不去

者二味等分

又方取菴蘭草汁飲之亦可服

又方凡被打及產後惡血及一切血皆煮續骨木汁二升飲之

治從高墮下崩中方

當歸 大黃^{各二分}

右二味治下篩酒服方寸七日

治杖瘡方

新車

石灰斤七

新猪血升一

右二味和為丸熟燒之破更丸燒三遍止為末傳上

又方金月下土為細末以油和茶託卧羊皮上

又方服小便良

治竹木刺在皮中不出方

羊屎燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不出重塗乃言不覺

刺出時一云用乾羊屎末

又方薔薇灰水服方寸七日三服十日刺出

又方酸棗核燒末服之

又方鑿柄燒灰酒服二寸七

又方頭垢塗之即出

治刺在肉中不出方

煮山瞿麥汁飲之日三瘥止

又方用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡已合猶出也

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫者

又方鹿角燒末以水和塗之立出久堵不過一夕

又方罌白梅以塗之用烏梅

又方温小便漬之

治久刺不出方

服王不留行即出兼取根為末貼之
治惡刺方

苦瓠開口內小兒尿者兩三沸浸病上

又方菖蓉根火煮浸之令復易補方也

又方李葉棗葉搗絞取汁點上即效

又方濃煮大豆汁漬取瘡

治葉刺并狐尿刺方

以烏父驢尿漬之

又方温白馬屎漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐尿刺主之

方

燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒熏汁出愈

又方熟蠟內瘡中新瘡亦善

又方以鳧公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗為佳瘡止余以

五年七月十五日夜左手中指背觸著庭樹至曉遂患病不可
忽經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有
此治方試復為之手下即愈痛亦即除瘡亦即瘡不過十日尋
得平復此大神效故疏之蜀人名耳癩萊關中名苟乳乳奴苟
切

治瘡中水腫方

白灰

胡粉

炭各等分

右三味脂和塗瘡孔上水出則痛止

千金方

卷七十七

十

草惟

治手足卒中刺中水毒方

搗韭及藍青置上以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根一斤濃煮內鹽一把漬之

治破傷風腫方

厚荬香仁膏熬麻燭遙灸之

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入腹則殺方

溫桑灰汁漬冷復溫之當令熱神祕

治刺傷中風水方

服黑牛熱尿一服二升三服即止

燒燬火

又方蠟一兩熱炙耐薄裹于金水出愈

又方魚目燒灰傅之

又方熱煮韭搗之

又方刮箭羽下來塗之

治瘡犯露腫方凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺久不可輕

生桑枝三枚內塘灰中推引令極熱斫斷正以枝頭拄瘡

口上熱盡即易之盡三枚則瘡自爛仍取薤白搗綿裹著

熱灰中使極熱夫綿取薤白薄瘡上以布帛急裹之若有

腫者便作用薤白最佳

治漆瘡方

生柳葉三斤細切以水一斗五升煮取七升適寒溫洗之

日三時後方云老柳皮尤妙

又方以磨石下滓泥塗之取瘡止大驗

又方濃煮鼠查葉以洗漆上亦可搗葉取汁塗之

又方爛檮七姑草封之救急方云七姑草和芒硝金之又方取猪膏塗之

又方貫衆為末以塗上乾以油和之即愈

又方蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再

又方羊乳汁塗之 又方礬石著湯中令消洗之

又方芒硝五兩湯浸以洗之 又方宜噉猪肉嚼稊殼塗之

孫真人備急千金要方卷之七十七

孫真人備急千金要方卷之七十八

慈七

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

火瘡等病第四論方

論曰凡火燒損慎勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞入筋骨難瘡初被火燒急向火更炙雖大痛強忍之一食久即不痛神驗治火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤按開與之然後以下方治之

治火瘡方

梔子四十枚 白欬 黃芩各五兩

右三味吹咀以水五升油一升合煎令水氣歇去滓待冷以

淋之令溜去火熱毒則肌得寬也作二日任意用膏傳湯散治之

又方熬油麻為末和梔子仁塗之惟厚為佳已成瘡者燒白糖灰粉之即燥立瘥

治火燒瘡方

死鼠頭一枚以臘月猪膏煎令消盡以傳乾即傳之瘥不作神效亦治小兒火瘡

治火瘡敗壞方

柏白皮切以臘月猪膏合淹相得煮四五沸色變去滓傳瘡上附後方云

又方

柏白皮

蛇銜

生地黄

梔子仁

黃芩

苦竹葉

各等分

右六味咬咀以羊髓半升煎三升上三下去滓塗上瘥止

治火爛瘡膏方

竹葉

甘草

各二兩

柏白皮

四兩

右三味咬咀以猪脂一斤半煎三升上三下去滓冷以傳之驗

方用生地黃四兩

又方榆白皮嚼熟塗之

治一切湯火所傷方

初著即以女人精汁塗之瘡
治湯沃人肉爛壞方

杏仁

附子各二兩

甘草一兩

羊脂五兩

松脂雞子大

右五味攷咀以不中水猪膏五兩煎塗之

灸及湯火所損晝夜啼呼止痛滅瘢方

羊脂

松脂各二兩

猪膏

蠟各一分

右四味取松脂破鈹中切脂燭蠟著松明上少傾鈹火令滓
清皆消以杯承汁傳之松明是肥松木節也

治灸瘡方

甘草

當歸各一兩

胡麻外臺用胡粉

羊脂各六分

右四味攷咀以猪膏五合煎去滓傳之

又方

蠟三兩

松脂五兩

右二味合煎塗紙貼之且二

又方取車軋脂塗上

又方凡灸瘡不瘥日別灸上六七壯自瘥

又方石灰一兩擣為細末繪篩猪脂和令相得微火上煎數沸
以煖湯先洗瘡訖以布裹及處瘡上灸之又擣薤傳之

治灸瘡腫痛急方

擣竈下黃土以水和煮令熟漬之
治灸瘡中風冷腫痛方

但向火炙之瘡得熱則瘡發至痛止日六七日愈
薤白膏治灸瘡生肉止痛方

薤白 當歸各二 白芷一 羊髓一

右四味㕮咀合煎以白芷色黃藥成去滓取傳之目三

又方治灸瘡膿壞不瘥方

薤白 胡粉 石灰各一 臘月猪脂一

右四味先煎薤白合黃去之綿裹石灰煎數沸去之次入胡粉內膏中令調塗故布貼上日二

又方

白蜜 烏賊骨 二枚一方

右二味相和塗之

治針灸瘡血出不止方

燒人屎灰以傳之

又方死蠅蝦為末以猪脂和塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傳裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用若瘡甚深未宜速合者內必滑石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之噉燥食并肥膩之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥及漿犯即血動溢出

殺入又忌愼怒大言笑思想陰陽行動作勞多食酸鹹飲酒熱
萎曜輩瘡瘡後猶爾出百日半年乃可復常也
治金瘡太散方

五月五日平日使四人出四方各於五里內採一方草木
莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切碓擣并
石及極爛熟一石草斷一斗石灰先鑿木實中桑樹令可
受藥取藥內孔中實藥令堅仍以桑樹皮蔽之以麻擣石
灰極密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使牢至九月九日
午時取出陰乾百日藥成擣之日曝令乾更擣絹篩貯却
凡一切金瘡傷折出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉

不過十日卽瘡不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須
煖水洗令血出然後傳之此藥大驗平時無事宜多合以
備倉卒金瘡之要無出於此雖突厥質雄黃末未能及之

時後方云用百草心五月五日作七月七日出

又方燒乾梅為炭擣末傳之一宿卽瘡亦治打傷

又方磁石擣末傳之止痛斷血

又方取桑白汁塗桑白皮裹之或石灰封之妙

又方麻葉三斤以水三升熟煮取二升半為一服

又方飲麻子汁數升小品方云治毒箭所傷

又方蚯蚓尿以水服方寸七日三

又方杏仁石灰為細末以猪脂和封之亦王犬馬金治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方擣車前汁傳之血即絕連根取用亦效

又方柳絮封之

又方以蜘蛛蟞貼之血即止

又方以人精塗之

又方飲人尿五升愈

內補散治金瘡出血多虛竭方

菘蓉 甘草 芍藥 蜀椒 乾薑

各四兩

各三兩

當歸 芎藭 桂心 黃芩 吳茱萸

人參 厚朴 黃耆 白芨古今錄驗

右十四味治下篩以酒服方寸七日三

又方

當歸 乾薑 芍藥 辛夷 甘草

右五味治下篩酒服方寸七日三夜

治金瘡內漏血不出方

牡丹皮為末水服三指撮立尿出血

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和服之愈

又方

蒲黃二兩

七月七日麻勃兩

右二味酒服一錢七日三夜二

二物湯治金瘡腹中瘀血方

大麻子三

大蔥白二七

右使數人各擣令熟著九升水煮取一升半頓服若血出不

盡腹中有膿血更合服當吐膿血

內塞散治金瘡方

黃耆

當歸

芍藥

白芷

乾薑

黃芩

封公芍藥

續斷各二

附子兩

細辛兩

鹿茸兩

右十一味治下篩先食酒服五分七日二稍增至方寸七

治金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色黑服

方寸七日三

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥為末服方寸七日三又以傅瘡愈

治金瘡苦刺瘡痛不可忍自治不瘥者方

葱一把以水三升煮數沸取漬洗止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃 黃芩

右二味為末蜜和丸如梧桐子大先食服十九日三
治金瘡不止令唾止痛呪法

呪曰某甲今日不良為其所傷上告天皇下告地土清血
莫出濁血莫揚良藥百裹不如孰唾日二七徧唾之即止
又法我按先師本法男師在左女師在右上白東王公下白西
王母北斗七星黃姑織女請制水之法清且朗呪不痕不膿不
疼不痛羅肺得肺羅肝得肝羅肉得肉不在媪姥儂夫自來小
兒為日不吉不良某甲為刀斧槊箭熊虎湯火所傷二唾三呵
平復如故急急如律令此法不復須度受但存念稽急歎誦之

非止治百毒所傷亦治癰疽隨所集轉後語呼之良驗一切瘡
毒並皆用之

續斷散治金瘡中筋骨方

- | | | | | |
|-----|-------|----|-------|--------|
| 續斷兩 | 細辛 | 蛇銜 | 地榆 | 乾地黄兩 |
| 當歸 | 芎藭 | 芍藥 | 茯苓各二兩 | 人參 |
| 甘草 | 附子各二兩 | 乾薑 | 蜀椒 | 桂心各一兩半 |

右十五味治下篩酒服一方寸七日三

治金瘡腸出方

- | | | |
|----|----|-------|
| 磁石 | 滑石 | 鐵精各三兩 |
|----|----|-------|
- 右二味為末粉腸上後用磁石末飲服方寸七日五夜二腸

即入

又方取人尿乾為末以粉腸即入

治被傷腸出不斷者方肘後方云治腸出欲燥而草土著腸者

作大麥粥取汁洗腸推內之常研米粥飲之二十日稍稍

作強糜百日後乃可瘥

地黃膏能治金瘡火瘡灸瘡不能瘥者方

生地黄切一升搗絞取汁三合 薰陸香 松脂 杏仁

蠟各二兩 羊腎脂合五 烏麻油升二 石鹽一兩研如粉

右八味先下蠟微火令消次內羊腎令消次下油次下松脂

次下杏仁次下薰陸次下地黃汁次下石鹽以微火煎令地

黃汁水氣盡以綿濾停疑下切諸瘡初傷皆用傳之日二夜
二慎生冷猪雞魚肉此膏治瘡法先食惡肉不著藥先從內
瘥乃至平復無痂不畏風不膿木大要妙
治金瘡血出不止方

蒲黃一斤 當歸二兩

右二味治下篩酒服方寸七日二

又方取葱葉炙取汁塗瘡上即止若為婦人所驚者取婦人中

衣火炙令熱以慰瘡上

又方取豉三升熱湯漬食頃絞去滓內蒲黃三合頓服及作紫

湯服之紫湯方在產婦篇中

治金瘡箭在肉中不出方

白欬

半夏各等分

右二味治下篩酒服方寸七日淺瘡十日出瘡深二十日出終不住肉中

治卒中箭不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒灰屑酒服之

治箭鏃及諸刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出者方

牡丹皮分

白鹽二分附後

右二味治下篩以酒服方寸七日三服出

又方取栝蒌汁塗箭瘡上即出

又方酒服瞿麥方寸七日三瘥

治毒箭所中方

搗藍汁一升飲之并以薄瘡上若無藍取青布漬絞汁服之并淋瘡中鏃不出搗死鼠肝塗之

又方煎地黃汁作丸服之百日箭出

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方雄黃為末傅之當沸汁出愈

又方搗葛根汁飲之又葛白屑熬黃傅瘡止血

又方內鹽臍中灸之

又方貝齒末服一錢匕

又方煮蘆根汁飲二升

治中射罔筋方

藍子_合五

升麻_兩八

玉不留行

甘草_{各等分}

右四味治下篩冷水服二方寸七日二夜二又以水和塗瘡

乾易之

治針折入肉中方

刮象牙為末水和聚著折針上即出

又方以鼠腦塗之

又方磁石吸鐵者著上即出

孫真人備急千金要方卷之七十八丁巳春正月大戶孟適校

