



武9
門號
173
卷八十四

篤信堂

圖書

孫真人備急千金要方卷之八十四

隱二

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

養性平脉方

平脉木法第一

論七

論曰夫脉者醫之本業也既不深究其道何以爲醫者哉是以古之哲醫寤寐俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與常人混其波瀾則庶事隕壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必當尋棄俗情凝心於此則和鶴之功因茲可得而致也

經曰診脈之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈

卷八十四

篤信堂

圖書

未盛給脉調均氣血未亂故可診有過之脉此非也過均脈動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑彊弱形之盛衰可以此參互誤生死之分也

又曰平脉者皆於平旦勿食勿語消息體氣設有所作亦如食頃師亦如之既定先診于口初重指切骨定卑便漸舉指令指不厚不薄與皮毛相得如三菽之重於輕重之間隨人彊弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五臟相應不爾者以其輕重相薄尋狀論寒暑得失凡人稟形氣有中適有躁靜各自不同氣脈潮動亦各隨其性韻故一呼而脉再至一吸而脉再至呼吸定息之間復一至合

爲五至此爲平和中適者也春秋日夜正等無餘分時也其餘日則其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉至少此則不同如冬夏日夜長短之異也凡氣脉呼吸清晝夜變通倣四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻猶晷刻與四時有長短而歲功日數無遺也若人有羸弱壯其呼吸雖相厭邁而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜變通

夫診脉當以意先自消息壓取病人呼吸以自同而後察其脉數計於定息之限五至者爲平人若有盈縮尋狀論平源之所宜也

問曰何謂三部脉答曰寸關尺也凡人修短不同其形各異有

尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而寸分之而入取九分是爲尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分爲關分從關分又入六分爲寸分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰守口從寸口至次名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界如天地人爲三界寸五射上焦頭及皮毛音手上部關主射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此爲三部法象三十天地人頭腹足爲三元也夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五

臟六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脈之太會手太陰之動脉也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周晚時也故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也卽五臟六腑之所終始故法取於寸口人有三百六十脉法三百六十日也

診五臟脈輕重法第二

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部金秋三月庚辛之氣如六菽之重與血脉相得者心部火夏三月丙丁之氣如九菽之重與肌肉相得者脾部土王四季季夏戊己之氣

如十二菽之重與筋平者肝部木春三月

按之至骨舉之來疾者腎部水冬三月壬

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮散浮而短濶者肺

也浮濶

腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也如卉生

濡而大舉指來實者腎也

濡弱如水舉重勝船

脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也千金翼云遲緩

得濶脉細而遲往來難且散或一止復來

浮而短一日滑短而止或如散

指下形狀第三

浮脉舉之有餘按之不足浮於沉脈舉之不足按之有餘重按

得濶脉細而遲往來難且散或一止復來

浮而短一日滑短而止或如散

脉往來前却流利展轉替替然與數相似一曰浮中如有丸
脉極大在指下一曰浮細脉小大於微常有但細耳微脉極細
而軟或欲絕若有若無一曰薄一曰按之如欲盛也弦脉舉之無
力按之如張弓弦狀一曰如張弓弦按之不緊脉數如切繩狀
一曰如轉索之無常遲脈呼吸三至去來極遲一曰舉之不足按之盡牢
數脉去來促急一曰一息云五至緩脉去來亦遲小駛於遲日
浮大而軟陰弱脉極軟而沉細按之欲絕指下得舉之即無動
脉見於關上無頭尾大如豆厥厥動搖伏脉極重指著骨乃得
一曰關上沉不出名曰伏一曰手脉浮大而軟按之中央空
下裁動一曰按之不足舉之無有孔脉浮大而軟按之中央空
兩邊實一曰指下無兩傍有軟脉極軟而浮細一曰細小如軟千金翼軟

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁然空實脉大而長微遲
按之隱指幅幅然浮皆得促脈來去數時一止結脈往來緩時
一止復來脈結者生代脈來數中止不能自還因而復動脈代
者死散脈大而散散者氣實血虛有表無裏革脈有似沈伏實
大而長微弦千金翼以革爲牢弦與緊相類軟與弱相類浮與芤相類
又曰浮與微與濡相類沉與伏相類緩與遲相類又曰軟與革
洪相類翼作牢與滑與數相類

與實相類

實相類

滑與數相類

五臟脈所屬第四

心部在左手關前寸口亦名肝部在左手關上腎部在左手關
後尺中

肺部在右手關前寸口亦名脾部在右手關上腎部在右手關
後尺中

肝心出左

脾肺出右

腎與命門

俱出尺部

魂魄穀神

皆見寸口

左主司官

右主司府

在火順男

右火順女

關前丁分

人命之主

左爲人迎

右爲氣口

神門決斷

兩在關後

人無二脉

病死不愈

諸經損減

各隨其部

三陰三陽

一云按察陰陽

誰先誰後

陰病治官

陽病治府

府外

奇邪所舍

如何補取

審而知之針入病愈

脉有三部 陰陽相乘 榮衛氣血 而行人朝
呼吸出入 上下於中 因息遊布 津液流通
隨時動作 故象形容 春弦秋浮 冬沉夏洪
察色觀脈 大小不同 一時之間 變無經常
尺寸參差 或短或長 上下乖錯 或存或亡
病輒敗易 進退低昂 心迷意惑 動失紀綱
願爲縷陳 念得分明師子之所問 道之根源
脉有三部 尺寸及關 榮衛流行 不失衡鉉
腎沉心洪 肺浮肝弦 此自常經 不失銖分
出入升降 漏刻周旋 水下二刻 脉一周身

旋復寸口 虛實見焉 變化相乘 陰陽相干
風則浮虛 寒則緊弦 沉潛水畜 支飲急弦
動弦爲痛 數洪熱煩 設有不應 知變所緣
三部不同 痘各異端 太過可怪 不及亦然
邪不空見 終必有奸 審察表裏 三雋別分
知邪所舍 消息診看 料度腑臟 獨見若神

分別病形狀第五

脉數則在肺遲在臟脉長而弦病在肝脈經作出於肝 脉小血少病在心扁鵲云脈大而洪出於心 脉下堅上虛病在脾胃脉滑一作濶 而微浮病在肺脉大而堅病在腎扁鵲云小而緊 脉滑者多血少氣脉澀者少血多

氣脉大者血氣俱多。又云脉來大而堅者血氣俱實。脉小者血氣俱少。又云脉來細而微者血氣俱虛。沉細滑疾者熱遲緊爲寒。脈經云洪數滑疾爲寒。熟滯遲沉細爲寒。脉盛滑緊者病在外。熱脉小實而緊者病在內。冷脉小弱而濶謂之久病。脉滑浮者病在外。熱風走刺有飲難治。脉沉而緊者謂之新病。脉浮滑其人外熱風走刺有飲難治。脉沉而緊上焦有熱下寒得冷卽便下。脉沉而細下焦有寒小便數時苦絞痛。下利重脉浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便。脉洪大緊急病速進在中外若頭發熱癰腫脉細小緊急病速進在中寒爲痴瘕積聚腹中刺痛脉沉重而直前絕者病血在腸間脉沉重而中散者因寒之成癥脉直前而中散絕者病消渴又云病浸淫瘡脉沉重前不至寸

口徘徊絕者病在肌肉。遁戶脉左轉而沉重者氣微傷在眉中脉右轉出不至寸口者內有肉癰脉累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脉累累如止不至寸口轉者結熱在小腸膜中伏留不去脉直前左右彈者病在血脉中脉血也脉後而左右彈者病在筋骨中也脉前大後小卽頭痛目眩脉前小後大卽胷滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹伏則氣衰細太素作滑則氣少濶則心痛渾渾草草至如漏泉病進而危瞀瞀綽綽其去如弦絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沉

而弦急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外在上爲表在下爲裏浮爲在表沉爲在裏滑爲實爲下又爲陽氣裏數爲虛爲熟浮爲風爲虛動爲痛爲驚沉爲水爲實爲鬼病爲虛爲悸遲則爲寒濶則少血緩則爲虛洪則爲氣熱緊則爲寒弦數爲瘡瘍脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛弱則爲虛弦爲痛痺爲風症偏弦爲飲雙弦則脇下拘急而痛代散則死弦爲痛痺爲風症偏弦爲飲雙弦則脇下拘急而痛其人濶濶惡寒脉大寒熱在中伏者霍亂安臥脉盛謂之脫血凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其脉並緊浮而大者風浮大者中風頭重鼻塞浮而緩皮膚不仁風寒入肌骨而浮散者癱瘓風滑爲鬼症濶而緊痺病浮洪大長者風

弦癲疾大堅疾者癲病弦而鈎腸下如刀刺狀如蜚尸至困不死緊而急者遁戶洪大者傷寒熱病浮洪大者傷寒秋吉春成病浮而滑者宿食浮滑而疾者食不消脾不磨短疾而滑酒病浮而細滑傷飲遲而濶中寒有癥結缺而緊積聚有擊痛弦急痛痕小腹痛又爲癖病一作癖病遲而滑者脹盛而急曰脹弦小者寒滯沉而弦者懸飲內痛弦數有寒飲冬夏難治緊而滑者吐逆小弱而濶胃反遲而緩者有寒微而緊者有寒沉而遲腹藏有冷病微弱者有寒少氣實緊胃中有寒苦不能食時利者難治一作時利難治滑數心下結熱盛滑疾胃中有熱緩而滑曰熱中沉而急病傷暑暴發虛熱浮而絕者氣辟大而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也沉而數中水冬不治自愈短而數心痛心煩弦而緊脇痛臟傷有瘀血有寒沉而滑爲下重亦爲有瘀痛脈來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在內微浮秋吉冬成病微數雖不成病不可勞浮滑疾緊者以命百病久易愈陽邪來見浮洪陰邪來見沉細水穀來見堅實脉來乍大乍小乍長乍短者爲祟脉來洪大嫋嫋者祟脉來沉沉澤澤四肢不仁而重土祟脉與肌肉相得久持之至者可下之弦小緊者可下之緊而數寒熱俱發必下乃愈弦遲者宜溫藥緊數者可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸弦諸沉諸緊諸澀諸滑若在寸口膍以上病部若在關上胃以下病部若在尺中腎以下病部腰脚平寸口脉王對法寸口脉滑而遲不沉不浮不長不短爲無病左右同法寸口太過與不及寸口之脉中手短者曰頭痛守手長者曰足脛痛中手促上擊者曰肩背痛寸口脉沉而堅者曰病在中寸口脉浮而盛者曰病在外寸口脉沉而弱者曰寒熱及疝瘕小腹痛熱一云又作寸口脉沉而弱髮必墮落寸口脉沉而緊若心下有寒時時痛有積邪寸口脉沉而滑者脅中有水氣面目腫有微熱爲風水寸口脉沉大而滑沉卽爲血實滑卽爲氣實血氣相搏入臟卽死入腑卽愈寸口脉沉胷中短氣寸口脉沉而喘者寒熱

寸口脉浮而滑頭中痛寸口脉浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒水流走腸間寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之蟹脚云亦爲傷寒頭痛脈弦上寸口者宿食降者頭痛寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血失精寸口脉微而弱微即惡寒弱則發熱當發不發骨節疼痛當煩不煩與極汗出寸口脉微而弱氣血俱虛男女吐血婦人下血嘔汗出寸口脉動而弱動即驚弱即爲悸寸口脉緩而遲緩即爲虛遲即爲寒虛寒相搏則欲溫食食令卽咽痛寸口脉遲而緩遲則爲寒緩卽爲氣寒氣相搏則絶而痛寸口脉遲而澀遲即爲

寒澀爲少血脈來過寸口入魚際者遺尿脈出魚際逆氣喘息寸口脉但實者心勞寸口脉漱漱如羹上肥陽氣微運運如蜘蛛絲陰氣衰兩手前部陽絕者苦心下寒毒喙中熱寸口脉偏絕則臂僻不遂其人兩手俱絕者不可治寸口脉來暫大暫小者陰絡也苦陰風癥應時自發身洗洗也寸口脉來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汙出惡寒下部不仁寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向火灸身摩治風膏覆冷汗出寸口脉緊苦頭痛是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顚顫摩傷寒膏寸口脉微苦寒爲畱宜服五味子湯麻黃茱萸膏冷汗出寸口脉數卽爲吐以有熱在胃管真腎中宜服藥吐之及

針胃脘服除熱湯若傷寒七八日至十日熱在中煩渴者宜服知母湯寸口脉洪大胃脇滿宜服生姜湯白薇丸亦可紫苑湯下之針上脘期門章門寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之佳灸諸治風穴寸口脉滑陽實胃中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕瀉之寸口脉弦心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂丸針期門瀉之寸口脉弦陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯內補散并適飲食消息勿極勞針胃脘補之寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針胃脘三里補之寸口脉芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯灸膻中寸口脉伏胃中逆氣噎塞是諸氣土

衝胃中宜服前胡湯大三建丸針巨闕瀉之寸口脉沉胃中引肋痛胃中有水氣宜服澤漆湯針巨闕瀉之寸口脉軟弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯薯蕷丸內補散牡蠣散并粉針大衝補之寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之寸口脉實節生熱在肺肺區逆氣塞虛則生寒在脾胃食不消化熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱萸丸生薑湯寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯炙中府平關脉王對法關上脉浮而大風在胃中張口有息心下澹澹食欲嘔關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蛇蟲心健忘關上脉滑而大小不均必吐逆是爲病方欲來

不出二日復欲發動其人欲多飲食卽注利如利止者生不正者死關上脈緊而滑者蛇動關上脉弦而長翼作大有痛如刀刺之狀在腰左右上下脈經云有積在腰左右上下關上脈澀而堅大而實按之不減有分爲中焦實有伏結在肺脾氣塞實熱在胃中關上脉澹澹大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕結聚欲熟飲食關上脉時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘡狀關上脉浮腹滿不欲食浮爲虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑前胡湯針胃脘先瀉後補之關上脈緊心下苦滿痛脉緊爲實宜服茱萸當歸湯又加大黃二兩佳脈經云又大黃湯兩治之佳十三關下院瀉之關上脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯

生薑湯附子丸針巨闕補之關上脉數胃中有客熱宜服知母湯一作除熱湯針巨闕上院瀉之關上脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補脾湯又針章門補之關上脉滑胃中有熱滑爲熱實氣滿故不欲食食卽吐逆宜服朴硝麻黃湯平胃丸二作宜服紫菀湯人參大平胃丸針胃脘瀉之關上脉弦胃中有冷心下厥逆脈弦胃氣虛宜服茱萸湯溫調飲食針胃脘補之關上脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱爲虛熱作病且說云有熱不可大攻之熱去卽寒起正宜服竹葉湯針胃脘補之關上脉細虛腹滿宜服生薑湯茱萸椒湯白薇丸針灸三院關上脉澀血氣逆冷脈澀爲血虛宜服乾地黃湯四補散針足大衝上補之關上脉

丸大便去益宜服生地黃丹生竹皮湯。灸膈俞若重下。去血針關元甚者服龍骨丸。關云三十六作巨關關上脉伏有水氣滯泄宜服水銀丸。針關元利小便止。滯泄便止關上脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸。針胃脘先瀉後補之。關上脉沉心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸。茯苓丸附子湯。針胃脘補之。關上脉沉心下有冷氣苦滿冷脾氣弱。寒病宜服赤石脂湯。女萎丸。針關元補之。關上脉軟舌虛冷脾胃滿嚮嚮宜服紫菀丸。瀉脾丸。針灸胃脘瀉之。

平尺脉主對法

脉弱寸彊胃絡脉傷。尺脉偏滑疾。同赤如醉外熱則病。尺脉細微。滯泄下冷利。素問云。尺寒脉謂之後泄。尺脉虛小者足脛寒癰癰脚疼。尺脉澀下血不利多汗。素問云。尺澀脉謂之多汗。尺脉沉而滑者寸白蟲尺脉細而急者筋攣痙不能行。尺脉大者熱在脾中小便赤痛。尺脉粗常熱者謂之熱中腰脅疼小便赤熱。尺脉按之不絕婦人血閉與關相應和滑者。男子氣血實婦人卽爲妊娠。尺脉來熱手足逆冷汗出。尺脉俱沉關上無有者苦心下喘。尺脉俱沉關上若有苦寒心下痛陰中冷脚痺。尺脉微少心力不欲言。氣不足其人脚弱短氣尺脉俱數手足頭面有熱俱遲有寒手

足頭面有冷風尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針
橫骨關元瀉之尺脉緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補
之尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯針氣海尺
脉數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜服鷄子湯白魚散針橫骨瀉
之尺脉緩脚弱下腫一無此四字小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥
散針橫骨瀉之尺脉滑血氣實經脈不利宜服朴硝煎大黃湯
下去經血針關元瀉之尺脉弦小腹疼小腹及腳中拘急宜服
建中湯當歸湯針氣海瀉之尺脉弱氣少發熱骨煩宜服前胡
湯乾地黃茯苓湯金關元補之尺脉澀足脛逆冷小便赤宜服
附子四逆湯針足大衝補之尺脉芤下焦虛小便去益宜服竹

皮生地黃湯灸丹田關元尺脉伏小腹痛癥疝水穀不化宜服
大平胃丸桔梗丸針關元補之尺脉沉腰背痛宜服督氣丸針
京門補之尺脉軟脚不收風痺一無此五字小便難宜服瞿麥湯自
魚散針關元瀉之尺脉牢腹滿陰中急宜服草薢茱萸丸針
丹田關元中極尺脉遲下焦有寒宜服桂枝丸針氣海關元瀉
之尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩利大便
針關元補之

孫真人備急千金要方卷之八十四

千金方

卷之八十四

十四

卷之八十四

卷之八十五

八十四

孫真人備急千金要方卷之八十五

平脉方

五臟積聚第七

隱三

人病有積有聚有穀氣穀一作繫夫積者臟病終不移也聚者腑病發作有時、展轉、痛移爲可治也。穀氣者、肠下、牽痛、按之則愈、愈復發爲穀氣。夫病已愈不得復發今病復發即爲穀氣也。諸積大法脈來而細軟附骨者爲積也。寸口結積在胃中微出寸口積在喉中關上結積在脅傍微下關者積在小腹尺中結積在氣衝上關上積在心下脉出在左積在左脉出在右積在右脉兩出積在中央各以其部處之寸口沉而橫者、肠下及腹中。

橫積痛其脉弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕
脉弦緊而細微者癥也夫寒疝瘕瘕積聚之脉狀皆弦緊若在
心下卽寸弦緊在胃脘卽關弦緊在臍下卽尺弦緊一曰關脉
長弦有積在臍左右上下

又脉癥法左手脉橫癥在左右手脉橫癥在右脉頭大在上頭
小在下

又一法橫脉見左積在右見右積在左偏得洪實而滑亦爲積
弦緊亦爲積爲寒痺爲疝痛內有積不見脈難治見一脉相應
爲易治諸不相應爲不合治也左手脉大右手脉小上病在脇
左下病在左足右手脉大左手脉小上病在右脇下病在右足

脉弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治脉來細沉時直者
身有癰腫若腹中有伏梁脉來沉而虛者泄注也脉來小沉實
者胃中有積聚不可下食卽吐

陰陽表裏虛實第八

弦爲少陽緩爲陽明洪爲太陽三陽也微爲少陰遲爲厥陰沉
爲太陰二陰也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一
陽三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言如此者非有六
脉俱動也謂浮沉長短滑濤也凡脉浮滑長者陽也沉濤短者
陰也所以言一陰一陽者謂脉來沉而滑也一陰二陽者謂脉

來沉滑而長也。一陰三陽者謂脈來浮滑而長時，沉也。所以言一陽一陰者謂脈來浮而濁也。一陽二陰者謂脈來長而沉濁也。一陽主陰者謂脈來沉濁而短時，浮也。各以其經所在言病之逆順也。

脈有陽盛陰虛、陰盛陽虛，何謂也？然浮之損小，沉之實大，故曰：陰盛陽虛，沉之損小；浮之實大，故曰：陽盛陰虛。是謂陰陽虛實之意也。凡脈浮大數，動長滑陽也；沉濁弱弦短微陰也。陽病見陰脉者逆也，主死陰病。見陽脉者順也，主生。關前爲陽，關後爲陰。陽數卽吐，陰微卽下。陽弦則頭痛，陰弦則腹痛。以依陰陽察病也。又尺脉爲陰，陰脉常沉而遲；寸脉爲陽，陽脉但浮而速。有

表無裏邪之所止，得鬼病何謂表裏？寸尺爲表，關爲裏。兩頭有脈，關中絕不至也。尺脉上不至關爲陰絕，寸脉下不至關爲陽絕。陰絕而陽微死，不治。呼爲表屬，吸爲裏屬。臟陽微不能呼，陰微不能吸，呼吸不足，胷中短氣。

弱反在關，濡反在其上，濁反在下，微反陽氣不足，沾汗出濁，卽無血厥，而且寒。諸腑脉爲陽主熱，諸臟脉爲陰主寒。陽微則汗陰浮，自下。充脈經作陰微陽數口生瘡，陰數加微必惡寒，而煩擾不得眠。陽芤吐血，數則吐血陰芤下血。脉經作陰無陽卽厥，無陰卽嘔。

寸口脉浮大而疾者，名曰陽中之陽病，苦煩滿身，熱頭痛，腹中

熱寸口脉沉細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通不通作徐臂不能舉巢源作臂偏不舉

尺脉沉細者名曰陰中之陰病苦兩脰酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

寸口壯大尺中無有此爲陽中陰其人苦腰背痛陰傷足脰寒痛

有人三虛三實者何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之

虛實脈之虛實者脉來濡者爲虛牢者爲實也病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急者爲實也診之虛實者瘡者爲虛痛者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂

重實者大熱病氣熱脉滿是謂重實也脉盛皮熱腹脹前後不通急瞀爲五實

脉細皮寒氣少泄痢注前後飲食不入爲五虛也

何時得病第九

何以知人露卧得病陽中有陰也何以知人夏月得病諸陽入

陰也何以知人春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死病人循衣縫謠言者不可治病人陰陽俱絕掣衣掇空妄言者死病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死病人兩目皆有黃色起者其病方愈病人面黃目青者不死青如草滋死病人面黃目赤者不死赤如衃血死病人面黃目白者不死白如枯骨死病人面黃目黑者不死黑如焰死病人曾目俱等者不死病人面黑目青者不死病人面青目白者死

病人面赤目青者六日死病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經膽氣反洩目則爲青雖有天救不可復生病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因蓄積病人面青目黃者五月死病人著牀心痛短氣脾竭內傷病因蓄積病人面青目黃者因坐於地若立倚牀能治此者可謂神良病人面無精光若土色不受飲食者四日死病人目無精光及牙齒黑色者不治病耳目鼻口有黑色起入于口者必死病人耳目及觀頰赤者死在五日中病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩觀上者亦死在五

日中病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中
病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死病人固
黑目直視惡風者死病人面黑脣青者死病人面青脣黑者死
病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死病人目回回直視脣息
者一日死病人陰結陽絕目精脫恍惚者死病人陰陽絕竭目
眶陷者死病人眉系傾者七日死病人口如魚口不能復閉而
氣出多不返者死病人口張者三日死病人脣青人中反者三
日死病人脣反人中滿者死病人脣口忽乾者不治病人脣腫
齒焦者死病人齒忽變黑者十三日死病人舌卷卵縮者必死
病人汗出不流舌卷黑者死病人髮直者十五日死病人髮如

乾麻善怒者死病人髮與脣衝起者死病人爪甲青者死病人
爪甲白者不治病人手足爪甲下肉黑者八日死病人榮衛竭
絕面浮腫者死病人卒腫其面蒼黑者死病人手掌腫無文者
死病人脣腫反出者死病人陰囊莖俱腫者死病人脉絕口張
足腫者五日死病人足趺腫嘔吐頭重者死病人足趺上腫兩
膝大如斗者十日死病人卧遺尿不覺者死病人尸臭者不可
治肝病皮白肺之日庚辛死心病目黑腎之日壬癸死脾病脣
青肝之日甲乙死肺病頰赤目腫心之日丙丁死腎病面腫脣
黃脾之日戊己死青欲如蒼蠅之澤不欲如藍赤欲如帛裹朱
不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽黑欲如重漆不欲如炭黃欲

如羅裹雄黃不欲如黃土

診五臟六腑氣絕證候第十一

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止二云一作日死病人膽絕七日死何以知之眉爲之傾病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休二云一作日死病人腸病人心絕一日死何以知之肩息回視立死二云一作日日死病人腸小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白汗不止病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臍脹泄利不覺出無時度二云一作日死病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆二云一作日死病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫滑血平九日死

大便赤泄二云一尺死病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還二云一尺鼻口虛張短氣病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死病人腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黃色腰中欲折白汗出如流水二云一尺人中死病人骨絕齒落十日死諸浮脉無根者皆死已上五臟六腑爲根也

診四時相反脉第十二

春三月木旺肝脉治當先至心脉次之肺脉次之腎脉次之此爲三相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾也七十日死何謂腎反脾夏火王心脉當先至肺脉次之而反得腎脉是謂腎反脾期五月六月忌丙丁脾反肺

三十日死何謂脾反肝春肝脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝期七月八月忌庚辛腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心期六月忌戊己此中不論肺金之氣疎略未諭指南又推五行亦頗顛倒待求別錄上

凡療病察其形貌神氣色澤脉之盛衰病之新故乃可治形氣相得色澤以浮脈從四時此爲易治形氣相失色夭不澤脉實堅甚脉逆四時此爲難治

逆四時者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸

絕澀者曰逆春夏沉澀秋冬浮大病熱脉靜泄利脉大脫血脉實病在中脉堅實病在外脉不實名逆四時皆難療也凡四時脉皆以胃氣爲本雖有四時王相之脉無胃氣者難瘥也何謂胃脈來弱以滑者是也命曰易治

診脈動止投數疎數死期年月第十三

脉一動一止二日死一經云一日死脉二動一止三日死脉三動一止四日死或五日死脉四動一止六日死脉五動一止七日死或五日死脉六動一止八日死脉七動一止九日死脉八動一止十日死脉九動一止九日死又云十一日死一經云十三日死若立春死脉十動一止立春死一經云立夏死脉十一

動一止立夏死一經云夏至死又云立秋死脉十二動十三動
一止立秋死一經云立冬死脉十四動十五動一止立冬死一
經云立夏死脉二十動一止一歲死若立秋死脉二十一動一
止二歲死脉二十五動一止二歲死一經云一歲死又云立冬
死脉三十動一止二歲死若三歲死脉三十五動一止三歲死
脉四十動一止四歲死脉五十動一止五歲死不滿五十動一
止五歲死五行氣異陰陽數同榮衛出入經脈通流晝夜百刻
五德相生脉來五十投而不止者五臟皆受氣卽無病也脉來
四十投而一止者一臟無氣却後四歲春草生而死脉來三十
投而一止者二臟無氣却後三歲麥熟而死脉來二十投而一

止者三臟無氣却後二歲桑椹赤而死脉來十投而一止者四
臟無氣歲中死得節不動出清明死違不出穀雨死矣脉來五
動而一止者五臟無氣却後五日而死脉一挾而久住者宿病
在心主中治脉一來而久住者病在肝枝中治脉來三而久住
者病在脾下中治脉四來而久住者病在腎間中治脉五來而
久住者病在肺枝中治五脉病虛羸人得此者死所以然者藥
不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

孫真人備急千金要方卷之八十六

隱四

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

平脉方

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

扁鵲曰夫相死脉之氣如群鳥之聚一馬之馭系水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅闊之裏不在榮衛伺候交射不可知也

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絕而止時復起而不相連屬也雀啄者脈來其數而疾絕止復頻來也又經言得病七八日脉如屋漏雀啄者死脉如屋漏者辟辟急也解索者人手如彈石去如解索者死彈石者辟辟急也解索者亦米也脉來如彈石去如解索者死動數而隨散亂無復次緒

也脉困病人脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者弗剪而起尋乃復起起輒遲而沒去速都是也魚翔者似魚不行而但摆尾動頭身搖而久住者是也脉如懸薄卷索者死脉如轉豆者死脉如偃力者死脉漏涌不去者死脉忽去忽來暫止復來者死脉中侈者死脉分絕者死上下分脉有表無裏者死經名曰結去卽死何謂結脉在指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也

脉五來不復增減者死經名曰代何謂代脉五來丁止也脉亡來是人坐息半時不復增減亦名曰代正死不疑經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生存亡可切脉而知之耶然可具知也設病者若閉目不欲見人者脉當得肝

脉弦急而長而反得肺脉浮短而濶者死病若閉目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得沉滑而微者死病若吐血復衄翼云脉大者生沉遲細者難治病若譖言妄語身當有熱者脉當得沉細而反得浮大牢者死病若譖言妄語身當有熱脉當洪大而反得手足四逆脉反沉細微者死病若太腹而泄脉當微細而澀反得緊大而滑者死此之謂也經言形脉與病相反者死柰何然病若頭痛目痛脉反短濶者死病若腹痛脉反浮大而長者死病若腹滿而喘脉反滑利而沉者死病若四肢厥逆脉反浮大而短者死病若耳聾脉反浮大而濶者死金右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此爲逆逆者死

不可治脉來沉之絕濡浮之不止推手者半月死半日作一月脉來微細而絕者人病當死人病脉不病者生脉病人不病者死人病尺厥呼之不應脉絕者死脉當大反小者死肥人脉細小如絲欲絕者死羸人得躁脉者死人身澀而脉來往滑者死人身澀而脉來往澀者死人身小而脉來往大者死人身大而脉來往小者死人身短而脉來往長者死人身長而脉來往短者死尺脉上應寸口大遲者半日死脉經云尺脉不應至寸時如馳半日死診五臟六腑十二經脉皆有相反有一反逆卽爲死候也

診百病死生要訣第十五

凡診脈當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短

皆如其人形性者吉反之者凶
診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死

濕病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治溫病時行大熱其脉細小者死脉經時行作穰穰

溫病下利腹中痛甚者死不治溫病汗不出不出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者生虛緩者死

熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細彊十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉來牒牒按之不彈手時大心下

堅十七日死

熱病七八日脉不轉又作不散者當瘡瘍後三日若汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦枯黑者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死不治熱病已得汗脉常躁盛陰氣之極也亦死大素作陽極熱病已得汗常太熟不去者亦死大素作專熱病已得汗熟未去脉微躁者慎不得刺治也熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺

不汗出必下利診人被風不仁痿蹙其脉虛者生巢源云虛者生數者生堅急疾者死元診癲病虛則可治實則死癲疾脉實堅者生脉沉細小者死癲疾脉搏大滑者不久自己其脉沉小急實不可治小堅急亦不可療診頭痛目痛久視無所見者死久視一元卒視診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沉者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便血脉大時絕極下血脉小疾者死心腹痛痛不得息脉細遲者生堅大疾者死腸澼便血身熱則死寒則生腸澼下白沫脉沉則生浮則死腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生弦濶者死以藏期之腸澼下膿血脉沉小流連者生

數疾且大有熟者死。腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死。洞洩食不化下膿血脉微小者生緊急者死。洩注脉緩時小結者生浮大數者死。齧蝕陰瘡其脉虛小者生緊急者死。欬嗽脉沉緊者死。浮直者生。浮軟者生。小沉伏匿者死。欬嗽羸瘦脉形堅大者死。欬脫形發熱脉小堅急者死。肌瘦下脫形熱不平者死。欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死。吐血衄血脈滑小弱者生實大者死。汗出若劙其脉小滑者生。大躁者死。衄血脈緊彊者死。滑者生。吐血而欬上氣其脉數有熟不得卧者死。傷寒加欬而上氣其脉數散者死。謂其人形損故也。上氣脉數者死。謂其形損故也。上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生。脉澀四

肢寒者死。上氣面浮腫崩息其脉大不可治。加利必死。又甚上氣注液其脉虛寧寧伏匿者生。堅彊者死。寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澀則死。大素云寒氣暴上脉滿實何如曰實而舉形盡滿者脉急大堅尺滿而不應如是者順則生逆則死何謂順則生逆則死曰所謂順者手足溫也所謂逆者手足寒也消渴其脉數大者生。細小浮短者死。瘡癰脉實大病久可治。脈弦小堅急病久不可治。消渴脉沉小者生。實堅大者死。水病脈洪大者可治。微細者不可治。水病脹閉其脉浮大軟者生。沉細虛小者死。水病腹大如鼓脉實者生。虛者死。卒中惡吐血數升脉沉數細者死。浮大疾快者生。卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生。緊而浮者死。緊細而微者亦生病瘡腰脊彊急癢癰者皆

不可治寒熱瘻。從其脉代絕者死。金瘡血出，大多其脉虛細者生。數實大者死。金瘡出血，脉沉小者生。浮大者死。研瘡出血，一石脉來大二十日死。研刺俱有病，多少血出不自止，斷者脉止。脉來大者七日死。從高頸作內有血，腹脹滿，其脉堅彊者生。小弱者死。人爲百藥所中傷，脉微細者死。洪大而速者生。脈經速作遲人病甚，而脉不調者難瘥。人病甚，而脉洪易瘥。人陰陽俱結者見其上齒如熟小豆，其脉躁者死。結一云竭人內外俱虛，身體冷而汗出，微嘔而煩擾，手足厥逆體不得安靜者死。脉實滿，手足寒頭熱，春秋生冬夏死者，人脉微陽羸陰彊者生。脉焱大加息者死。陰弱陽彊，脉至而代奇月而死。尺脉濶而堅，爲血實氣虛。

也。其發病，腹痛逆瀉，氣上行，此爲婦人胞中絕傷。有惡血久成結痕，得病以冬時，蒸發赤而死。

尺脉細而微者，血氣俱不足。細而來有力者，是穀氣不足。病得

節，輒動，棗葉生而死。此病秋時得之。

左手寸口脉偏沉伏乍小乍大，朝來浮大暮夜沉伏浮大，即大過上出魚際沉伏，即下不至關中，往來無常，時時復來者，榆葉枯落而死。葉作英

右手寸口脉偏沉伏乍小乍大，朝來浮大暮夜沉伏浮大，即大過上出魚際沉伏，即下不至關中，往來無常，時時復來者，榆葉枯落而死。

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止乍動乍踈不與息數相應其人雖食穀猶不愈藜蕡生而死左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循張弓弦組組然如兩人共引一索至立春而死脈經作至立冬死上

診三部脉虛實訣死生第十六

凡三部脉大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲者脉呼吸八至細數吉千金翼云人大而脉細人細而脉大人緩而躁人壯而脉細人羸而脉大此皆爲逆逆則難治反之爲順順則易治凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒四五歲者脉自駛疾呼吸八至也

三部脉或至或不至冷氣在胃中故金脉不通三部脉虛其人

長病得之死虛而濶長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死三部脉實而長長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治三部脉彊非稱其人病便死三部脉羸非其人得之死三部脉粗長病得之死卒病得之生三部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生三部脉微而伏長病得之生細而病得之不治自愈治之死卒病得之生三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死三部脉浮而數長病風得之生卒病得之死三部脉芤長病得之生三部脉弦而數長病得之生卒病得之死三部脉滑長病得之生卒病得之生三部脉堅而數如

銀釵股蠱毒病必死數而輒蠱毒病得之生二部脈漱漱如羹
上肥長病得之死卒病得之生三部脈連連如蜘蛛絲長病得
之死卒病得之生三部脈如霹靂長病得之死二部脈如角弓
長病得之死三部脈累累如貫珠長病得之死三部脈如水淹
然流長病不治自愈治之反死三部脈如屋漏長病十四日死
脉經云十日死三部脈如雀啄長病七日死三部脈如釜中湯沸朝得
暮死夜半得日中死日中得夜半死

三部脈急切腹間病又婉轉腹痛針上下瘥

孫真人備急千金要方卷之八十六丁巳春二月大戶孟適校

