

千金方衍義

中武  
176  
12



門 759  
籍 176  
卷 12



孫真人千金方衍義卷八

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

治諸風方 凡八類

論雜風狀第一 論二十五首

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依腧穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也  
偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂

千金方衍義卷八

掃葉山房



病在分腠之間温臥取汗益其不足損其有餘乃可

復也

甲乙經云温臥取汗則生取之

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微知則可治

甚則不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然

巢源作噫噫然有聲舌強

不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後

寫於陽發其汗身轉輒者生汗不出身直者七日死

巢源作眼下及鼻人中左右白者可治一黑一赤吐沫者不可治

風痺濕痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有

證候形如風狀得脈別也脈微澁其證身體不仁

凡風多從背五臟入諸臟受病肺病最急肺主氣

息又冒諸臟故也肺中風者其人偃臥而胸滿短氣

胃悶汗出者肺風之症也視目下鼻上兩邊下行至

口色白者尚可治急灸肺腧百壯服續命湯小兒減

之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可復治其人

當妄言掇空指地或自拈衣尋縫如此數日死若為

急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣憒憒不

能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺腧及

膈腧肝腧數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不

收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄言與肺

病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝腧百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃臥不得傾側悶亂冒絕汗出者心風之狀也若唇正赤尚可治急灸心腧百壯服續命湯若唇或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死一云旬日死脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者

尚可治急灸脾腧百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅粢大者尚可治急灸腎腧百壯服續命湯若齒黃赤鬚髮直面土色者不可復治  
大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸腧百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脈孫脈滿則入傳於絡脈絡脈滿則輸於大經中成病歸於六腑則為熱不時臥止為啼哭其脈堅大為實實者外堅充滿不可按之按之則痛

也經絡諸脈傍支去者皆爲孫脈也

凡風之傷人或爲寒中或爲熱中或爲厲風或爲偏枯或爲賊風故以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙丁傷於風者爲心風以四季戊己傷於風者爲脾風以秋庚辛傷於風者爲肺風以冬壬癸傷於風者爲腎風風中五臟六腑之腧亦爲臟腑之風各入其門戶所中則爲偏風風氣循風腑而上則爲腦風風入頭則爲目風眼寒飲酒中風則爲酒風入房汗出中風則爲內風新沐中風則爲首風久風入房中風則爲腸風外在腠理則爲泄風故曰風者百病之長也

至其變化乃爲他病無常方焉是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜爲熱中目黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇於虛腠理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也

新食竟取風爲胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通

食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則臍滿食寒卽洞泄  
新熱食竟入水自漬及浴者令人大腹爲水病  
因醉取風爲漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近  
衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自  
勞

新沐浴竟取風爲首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風爲內風其狀惡風汗流沾衣

勞風之爲病法在肺下使人強上而目脫唾出若涕  
惡風而振寒候之三日及五日中不精明者是也七  
八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出爲善若不

出則傷肺

風邪客於肌膚虛癢成風胗瘡風邪入深寒熱相  
搏則內枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關節  
中卽攣筋中亦然邪淫於臟夢臟大形小淫於腑夢  
藏小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視  
見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘖喉痺  
舌緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒瘖緩縱  
瘖瘖致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病  
則靜陰邪入陽病則怒

若因熱食汗浴通腠理得開其自風出則覺肉中如

鍼刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善

夫目瞶動口唇動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將八風散磨神明白膏丹參膏依經鍼灸之

諸痺由風寒濕三氣并客於分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無

常處其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濡但隨血脈上下不能左右去者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也久痺入深令營衛滯經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中股脛淫灑煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死

一云三日

太陽中風重感於寒濕則變瘖也瘖者口噤不開背強而直如發癰之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脈虛竭小兒臍風大人涼濕得瘖風者皆死溫病熱盛入腎小兒癰熱盛皆瘖瘖瘖瘖瘖皆相似故久厥成癰宜審察之其重者患耳中策策痛皆風入腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘖直如死皆宜服小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作癰瘡者乃無害也惟風宜防耳鍼耳前動脈及風府神良

諸風第二

方二十九首  
灸法三十六首

小續命湯

治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗令人不虛方

麻黃

防已

崔氏外臺不用

人參

黃芩

桂心

白芍藥

甘艸

川芎

杏仁

各一兩

防風

一兩半

附子

一枚

生薑

五兩

右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此



方至六七劑得瘥有風疹家天陰節變輒合服之  
可以防瘡一本云恍惚者加挾神遠志如骨節煩  
疼本有熱者去附子倍芍藥小品千金翼同深師  
古今錄驗有白朮不  
用杏仁救急無川芎杏  
仁止十味延年無防風  
小續命湯 治中風冒昧不知痛處拘急不得轉  
側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜  
產後失血并老小人

麻黃

桂心

甘艸

各二兩

生薑

五兩

人參

川芎

白朮

前方用杏仁

附子

防已

芍藥

黃芩

各一兩

防風

一兩半

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

古今錄驗無桂心名續命湯胡洽千金翼同

又方 治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所

不及方

麻黃

三兩

人參

桂心

白朮

各二兩

芍藥

甘艸

防已

黃芩

川芎

當歸

各一兩

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日

三覆取汗

衍義續命方專爲中風六經形證而立以其死生反掌較之傷寒尤爲叵測蓋傷寒之邪卒然從表而入非若中風皆由本虛虛風直犯無禁且多痰涎內壅表裏糾纏之難於分解也所以小續命湯雖本古今錄驗而麻黃桂枝兩方皆在其中以其本虛必加人參駕馭麻桂發越在表之邪又需附子直入少陰搜逐在裏之邪不使外內交攻正氣立斷續命之名信乎不虛其餘川芎黃芩防風防已不過爲麻黃之使以祛標熱耳 前方治卒中風欲

死病起於暴故用麻黃必兼杏仁開發肺氣之逆滿殊不可缺此見四肢緩急遺失便利脾腎兩虛故加白朮實脾隄水不得復用杏仁耗氣之品又方治風癩歷年不愈笑歌悲哭不常肺虛而風火乘之經謂精氣并於肺則悲笑歌則火之變非續命無以療之以火乘肺燥非但附子耗陰當去防風杏仁耗氣亦須裁汰但加白朮以攝脾津不使復隨風火外泄

大續命湯 治肝厲風卒然培壅依古法用大小續命二湯通治五臟偏枯賊風方

麻黃 八兩

石膏 四兩

桂心

乾薑

川芎 各二兩

當歸

黃芩 各一兩

杏仁 三十枚

荆瀝 一升

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下

諸藥煮取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能

言未瘥後服小續命湯舊無荆瀝今增之效如神

千金翼有甘艸

又方 治大風經臟奄忽不能言四肢垂曳皮肉

痛癢不自知方

獨活

麻黃 各三兩

川芎

防風

當歸

葛根

生薑

桂心

茯苓

附子

細辛

甘艸 各一兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服

老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者

依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍

加附子一兩腕者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣

者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱

者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三

劑停四五日已後更候視病虛實平論之行湯行

鍼依穴灸之

又方 治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃

川芎 各三兩

乾薑

石膏

人參

當歸

桂心

甘艸 各二兩

杏仁 四十枚

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服 外臺名續命湯

范注同云是張仲景方本欠兩味

西州續命湯 治中風痺人 一作臟 身體不知自收口

不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃 六兩

石膏 四兩

桂心 二兩

甘艸

川芎

乾薑

黃芩

當歸 各一兩

杏仁 三十枚

右九味咬咀以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠臥可厚覆小汗出已漸減衣勿復大覆可熟眠矣前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無忌勿見風并治上氣咳逆若面目大腫但得臥服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯與產婦及羸

人喜有死者皆為頓服二升傷多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害也

湖洽方古

今錄名大續命湯

行義

大續命湯乃麻黃越脾麻杏甘石等方之製即於小續命湯中除去人參附子之助陽加入石膏以化熱荆瀝以滌疾則大小續命虛實攸分於此顯然以無參附助陽之品則防已傷津之味亦宜去之 又方即於大續命中除去杏仁乾薑石膏黃芩荆瀝仍取小續命中防風附子甘艸而加細辛獨活葛根乃大續命之變法仍不出小續命之圭

角 又方於大續命中除去黃芩荆瀝仍取小續命中人參甘艸是大續命而兼小續命之製也 於大續命本方但除去荆瀝一味即西州續命也 張景岳曰按歷代相傳治中風之方皆以續命等方為主夫續命湯以麻黃為君與薑桂並用本發散外邪之方至小續命大續命西州續命則加黃芩以兼桂附雖曰相制而水火冰炭道本不同雖有神妙終非予之心服者景岳為近代名宿究心靈素之學無出其右然於玉函金匱之旨猶虧一篑如小續命中之黃芩大續命中之石膏非具南

陽千金神通妙用難以語此

大續命散。治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或臥苦驚如墮地狀盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黃

烏頭

防風

桂心

甘艸

蜀椒

杏仁

石膏

人參

芍藥

當歸

簡茹

翼方作川芎

黃芩

茯苓

乾薑

各一兩

右十五味治下篩以酒服方寸七日再後加以知為度

續命煮散 治風無輕重皆主之方

麻黃

川芎

獨活

防已

甘艸

杏仁

各三兩

桂心

附子

茯苓

升麻

細辛

人參

防風

各二兩

石膏

五兩

白朮

四兩

右十五味粗篩下以五方寸七納小絹袋子中以

水四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿絕慎風冷大良吾常中風言語蹇滯四肢疹曳處此方日服四服十日十夜服之不絕得愈

衍義

大續命散與大小續命湯續命煮散及排風湯大八風散小八風散總皆一脈相承主治八風十二痺偏枯不仁悉屬風毒表證其臥如墮地狀盜汗臨事不舉則又腎氣本虧不出內經邪之所奏其氣必虛一語所以搜逐風痺藥中多用人參扶助胃氣庶克有濟如大續命散與大小續命之製藥皆彷彿獨藺如之除大風惡血蜀椒之逐骨節皮膚死肌寒熱痺痛別出手眼大小續命之所未及續命煮散亦是大小續命發脈與大續命散相同者半惟升麻佐麻黃升散獨活佐防已下泄白朮佐參附逐消變藺茹蜀椒之法

排風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亾人相隨其肺風發則

面白咳逆吐膿血上氣奄然而極其腎風發則  
面黑手足不遂腰痛難以俯仰痺冷骨疼諸有  
此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心  
定志聰耳明目通臟腑悉主之

白蘚皮 白朮 芍藥

桂心 川芎 當歸

杏仁 防風 甘艸 各一兩

獨活 麻黃 茯苓 各三兩

生薑 四兩

右十三味咬咀以水一斗煮取三升每服一升覆

取微汗可服三劑

大八風湯 治毒風頑痺躄曳手脚不遂身體偏

枯或痿弱不仁或風入五臟恍惚惚多語善

忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強

直不得俛仰腹滿不食咳嗽或始遇病時卒倒

悶絕即不能語便失音半身不隨不仁沉重皆

由體虛恃少不避風冷所致方

當歸 二兩半 五味子 升麻 各一兩半

烏頭 黃芩 芍藥

遠志 獨活 防風



川芎 麻黃 秦艽

石斛 人參 茯苓 各一兩

杏仁 四十枚 黃芪 紫苑 各一兩

石膏 一兩 甘艸 桂心

乾薑 各二兩 大豆 一升翼方云二合

右二十三味咬咀以水一斗三升酒二升合煮取

四升強人分四服羸人分六服

衍義

夫風虛濕冷足以傷人肢體亂人志意蓋八風之邪善行數變得濕以紐之則滯著不行經脈血氣無所不病故其治仍不出排風散邪猶如夏暑苑

蒸得風氣流蕩則濕熱隨之立散矣 大八風湯

方下見證渾是濕著為患故於續命方中兼取大

秦艽湯之製其妙用尤在黑大豆一味及和酒煮

服為開發毒風脚氣之捷徑亦諒人元氣用藥之

的訣

八風散 治八風十二痺猥退半身不遂歷節疼

痛肌肉枯焦皮膚瞶動或筋緩急痛不在一處

卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘡癩面上

起泡或黃黑角弓反張乍寒乍熱方

麻黃 白朮 各一斤 羌活 三斤

黃芩 一斤五兩

大黃 半斤

栝蔞根

甘艸

藥荊

天雄

白芷

防風

芍藥

天冬

石膏 各十兩

山萸

食茱萸

躑躅 各五升

茵芋 十四兩

附子 三十枚

細辛

乾薑

桂心 各五兩

雄黃

硃砂

丹參 各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕初每日一服三十日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已

已佳先食服

小入風散

治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語

語則失忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頸項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方

天雄

當歸

人參 各五分

附子

天冬

防風

蜀椒

獨活

烏頭

秦艽

細辛

白朮

乾薑各三分

麻黃

五味子

桔梗

山萸

柴胡

莽艸

白芷各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一  
七日三服以身中覺如鍼刺狀則藥行也

衍義

八風散主八風十二痺方中諸藥與膽腑門中荒  
花散者婆娑萬病丸相類其方下雖有半身不遂之  
證殊非中風六經形證之比詳其立方專以麻黃

附子細辛湯開發陰邪於外大黃附子湯分泄陰  
邪於裏而兼藥荆茵芋躑躅雄黃皆眩之藥非  
大風惡疾詎可輕試必其人元氣素強病氣方充  
始為合宜 詳小八風散所治之證皆病久本虛  
邪實雖用麻黃附子細辛湯及理中三建等方之  
制專守溫理正氣邪自退聽之法藥味雖峻而無  
藥荆茵芋躑躅大毒之味故以小八風散稱之  
烏頭湯 治八風五尸惡氣遊走胸心流出四肢  
來往不住短氣欲死方

烏頭

芍藥

乾薑

桂心

細辛

乾地黄

當歸

吳茱萸

甘艸各二兩

右九味咬咀以水七升煮取二升半分三服

衍義

八風五尸之邪遊走心胸流出四肢往來不佳雖非胸痺之著而不移其短氣欲死亦邪據胸中與胸痺喘息咳唾心痛徹背背痛徹心無異苟非大辛大烈無以分解毒邪故訪金匱赤石脂丸而用烏頭乾薑力開痺著佐以桂心細辛吳茱萸其襄溫散而兼芍藥當歸乾地黄護持營血甘艸和胃并和藥性之寒熱

菜耳散

治諸風方

當以五月五日午時乾地刈取菜耳葉洗曝燥

搗下篩酒若漿服一方寸七日三作散若吐逆

可蜜為丸服十九準前計一方寸七數也風輕

易治者日再服若身體有風者皆作粟肌出或

如麻豆粒此皆為風毒出也可以鉞鍼刺漬去

之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之著

大囊中稍取用之此艸辟惡若欲看病省疾者

便服之令人無畏若時氣不和舉家服之若病

胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進

食一周年服之佳七月七九月九皆可採用

衍義菴耳一名蒼耳為頭風腦痛風濕周痺要藥其葉

善辟惡氣開頂門行督脈專祛風濕毒邪服後觸

犯風氣遍身赤斑乃風毒發出之驗刺去黃汁乃

止取五月五日者取惡毒之辰以辟惡毒之邪也

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁攣急方

荆瀝各五升 竹瀝各五升 枸杞根白皮

麥冬各一升 香豉三合 人參

茯苓 梔子仁 黃芩 細辛

川芎 桂心 白蘚皮各二兩

杏仁 防風 石膏 甘艸各三兩

生薑 右十八味咬咀以水二斗和竹瀝荆瀝煮取三升

分四服相去如人行六七里凡五劑間三日服一

劑一用防已三兩 治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荆瀝三升 竹瀝二升 香豉三合

牛黃十八銖 麥冬 人參各三兩

升麻 鐵精 天冬

龍齒 茯苓 梔子各二兩

右十二味咬咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃鐵精更煎五六沸取二升七分五服温服相去十里久

地黃煎 治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷

所方

生地黃汁

枸杞根汁

各二升

生薑汁

酥

各三升

荆瀝

竹瀝

各五升

天冬

人參

各八兩

茯苓

六兩

大黃

梔子仁

各四兩

右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成煎次

內散藥攪和每服一七日再漸加至三七覺利減

之

又方

黃芩

乾藍

芍藥

鼠尾艸

各三兩

梔子仁

生葛

各六兩

羚羊角

鼓

一升綿裹

右八味咬咀以水七升煮取二升五分三服

治積熱風方

地骨皮

萎蕤

丹參

黃芪

麥冬

澤瀉

各三兩

清蜜

薑汁各一合

生地汁

右九味以水六升煮取二升去滓內生地汁更緩火煮減一升內蜜及薑汁又煮一沸藥成溫服三合日再

衍義

八風之散多用辛烈治本而兼涼潤治標如小續命湯中之黃芩大續命湯大續命散續命煮散中之石膏大八風湯中之石膏黃芩八風散中之大黃必同麻黃或兼人參或兼烏附各具寒熱相參標本兼濟之妙用而此方及地黃煎並用荆瀝竹瀝潤燥開痰全不用麻黃烏附等味乃八風五痺

之變法而實風虛發熱之正治也方中枸杞根麥門冬梔子豉黃芩石膏匡佐二瀝以散虛煩細辛桂心川芎白蘚皮杏仁防風以祛風熱人參甘艸以助藥力茯苓以守真氣生薑以散穢惡之邪也

第二方中天棘麥冬梔子豉佐二瀝以清虛熱龍齒牛黃鐵精以鎮驚邪人參茯苓以守臟氣升麻以鼓人參之力也地黃煎亦用杞根天棘而兼地黃乳酥佐二瀝以潤血燥梔子大黃以泄煩熱人參茯苓以助祛邪薑汁以辟痰涎之滯也又方用梔子豉湯兼黃芩芍藥乾藍羚羊以解肝

風蘊熱筋脈拘攣鼠尾生葛以治心胃虛也 其  
治積熱風用地骨蕨蕤門冬澤瀉地黃皆清利風  
熱解散血痺之品黃芪治大風癩疾丹參治心腹  
邪氣清蜜卽地黃煎中醍醐之意薑汁專行陰藥  
之性與地黃煎功用不殊

大防風湯 治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大

小便不利方

防風

當歸

麻黃

白朮

甘艸 各十  
八銖

黃芩 三十  
銖

乾地黃

山茱萸

茯苓

附子 各一  
兩

右十味咬咀以水九升煮取二升半一服七合大

小便不利內大黃人參各十八銖大棗三十枚生

薑三兩煮取三升分三服 深師加天  
冬一兩

衍

中風外有六經形證故用麻黃防風內有便溺阻

隔故用地黃當歸腎主二便大小便不利多屬腎

虛風燥故用朮附為主加茯苓甘艸則真武湯中

之二也山茱萸本經治心下邪氣溫中逐寒濕痺

去三蟲佐地黃則有酸收肝腎虛風之功黃芩本

經治諸熱黃疸逐水下血閉佐麻黃則有解散肌



表風熱之用方後有大便不利內大黃然必兼人參而用者正以血虛風燥藉以助力而除邪氣大棗安中平胃生薑去臭氣通神明皆本經主治及專和營散表之法靡不萃聚於是方也

大戟洗湯 治中風發熱方

大戟 苦參 等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒溫洗從上下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四升煮洗之

衍義中風發熱不止用大戟苦參為散煮湯以滌肢體

而祛毒邪專取大戟以治中風皮膚疼痛苦參以治結氣皆本經主治也

金牙酒 療積年八風五疰舉身羸曳不得轉側行步跛躄不能收攝又暴口噤失音言語不正

四肢背脊筋急腫痛流走不常勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲滯結實逆害

飲食乍咽嘔吐食不生肌醫所不能治者方

金牙 碎如米粒小絹袋盛 乾地黄 地膚子 無子用蘇

恭用蛇床子 蒟藳根 附子

防風 細辛 莽艸 各四兩

羌活

一斤胡洽用獨活

蜀椒

四合

右十味咬咀以絹袋盛用酒四斗於瓷罈中漬蜜閉頭勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡一劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩惟蜀椒五合用酒如前勿加金牙也冷加乾薑四兩服此酒灸刺起三十諸風躄曳神驗

常山太守馬灌酒

除風氣通血脈益精華定六

腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣充盈八十日能夜書百日致神明房中強壯如三十時力能引努年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉主之方

天雄

二兩生用

商陸根

躑躅

蜀椒

各一兩

烏頭

一枚大者

附子

五枚

桂心

白斂

茵芋

乾薑

各三兩

右十味咬咀以絹袋盛酒三斗漬春夏五日秋冬

千金方行義卷八  
七日去滓初服半合稍加至兩三合搗滓為散酒  
服方寸七日三以知為度夏日恐酒酸以油單覆  
之下井中近水令不酸也千金翼無商陸桂心為八味  
蠻夷酒 治久風枯癩三十年著床及諸惡風眉

毛墮落方

乾地黄

獨活

丹參

礞石

各一兩

麥冬

附子

甘遂

各二兩

赤石脂

二兩半

乾薑

蕪荑

芫花

柏子仁

各一合

蘇子

一升

茯苓

茯神

一作茯苓

金牙

薯蕷

白朮

杜仲

酒

石南

牡荊

山萸

欵冬

各十銖

白芷

烏喙

烏頭

人參

狼毒

蜀椒

防風

細辛

礬石

寒水石

牛膝

麻黃

川芎

當歸

柴胡

芍藥

牡蠣

桔梗

狗脊

翼作枸杞

天雄

各半兩

石斛

桂心

各六銖

右四十五味咬咀以酒二斗漬夏三日春秋六日冬九日一服半合蜜室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合千金翼無川芎云加大棗四十枚更佳又方治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之

方

礞石

桂心

白朮

狼毒

半夏

石南

白石脂

龍膽

續斷

芫花

代赭

白石英

藜蘆 天雄 山萸 防風 元參

桔梗 藜蘆 卷柏 天雄 山萸 防風 元參

寒水石 細辛 烏頭 天雄 山萸 防風 元參

躑躅 蜀椒 白芷 天雄 山萸 防風 元參

秦艽 菖蒲 礞石 天雄 山萸 防風 元參

附子 遠志 石膏 天雄 山萸 防風 元參

蜈蚣 一條 天雄 山萸 防風 元參

右三十四味咬咀以酒二斗漬四日每服一合日再十日後去滓曝乾搗篩為散酒服方寸七日再

以知爲度 胡洽四十二味無桂心細辛烏頭躑躅蜀椒有芒硝恒山黃芩黃連大黃麻黃地黃前胡甘草兔絲子芍藥紫苑各一兩杏仁三十枚同搗篩絹袋盛用水二斗麴三斤黍米三斗作飯依釀酒法以藥袋置釀中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三服曝藥爲末酒服方寸七以身體暖爲度

魯王酒 治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香

臭口爛生瘡風齒癩癰喉下生瘡煩熱厥逆上氣胸脇肩痺痛手不能上頭不能帶衣腰脊不能俯仰脚瘦不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚

中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉主之方

茵芋 烏頭 躑躅 各三

天雄 防已 石斛 各二十

細辛 牛膝 甘艸

柏子仁 通艸 桂心

秦艸 茵陳 山茱萸

黃芩 附子 瞿麥

乾地黃 王不留行 胡洽作天冬 翼方作王蓀 掃葉山房

杜仲

澤瀉

石南

防風

遠志

各三十  
六銖

右二十五味咬咀以酒四斗漬十日每服一合加

至四五合以知為度

千金翼名此為魯公酒有乾薑胡洽無防已以絹囊盛藥

用水二斗法麴二斤同漬三次宿出藥囊炊一斗黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二稍飲以知

為度

又方 治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢

不遂不能行步不自帶衣攣急五緩六急婦人

帶下產乳中風五勞七傷

乾薑

躑躅

桂心

甘艸

川芎

川斷

細辛

附子

秦艸

天雄

石膏

紫苑 各五兩

葛根

通艸

防風

柏子仁

巴戟天

石斛

石南

山萸

石龍芮 各四兩

牛膝

天冬 各八兩

烏頭 二十枚

蜀椒 半斤

右二十五味咬咀以水五升漬三宿法麴一斤合漬黍米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿

藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服

獨活酒 治八風十二痺方

獨活

石南 各四兩

防風 三兩

附子

烏頭

天雄

茵芋 各二兩

右七味咬咀以酒二斗漬七日每服半合日三以知為度

衍義

金牙酒 衍義見前七卷風毒脚氣門中 其馬灌

酒蠻夷酒魯王酒獨活酒等方皆治厲風惡疾大

毒瞑眩之方非中風門中藥也

灸法

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫文隨年壯立愈

若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上四十壯外踝筋急灸外踝上二十壯立愈

若眼戴睛上插灸目兩眥後二十壯

若不能言語灸第三椎上百壯

若不識人灸脇頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯

灸卒死亦良

治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不遂或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動卽灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是

次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是  
次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中是

次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脈陷者中

是

次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是

次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是

次灸凶會一處七壯穴在神庭上二寸是

次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是

次灸本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二分

是又作四分

次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際陷者中是

次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是



千金方卷之八  
三  
次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半是

次灸心膂二處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半是

次灸腎膂二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是

次灸膀胱膂二處各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是

次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是

次灸肩髃二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是

次灸支躡二處各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間是

次灸合二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是

次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩筋間是

次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是

次灸陽輔二處各七壯穴在外踝上絕骨端陷者中

是

次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中

治風灸上星及百會各二百壯前項二百四十壯腦

戶及風府各三壯

一云治大風灸百會七百壯

治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸三分須

取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得

瘥狂者亦瘥兩耳門前後灸一百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎

名曰臑腧百五十壯多至三百壯便愈

心腧穴在第五椎一云第七節對心橫三間寸主心

風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食

鼻衄目眴眈眈不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百

壯

大腸腧在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴

腸癖泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼強或大小便

難不能飲食灸百壯三日一報

腋門在腋下攢毛中一寸名太陽陰一名腋間灸五

十壯主風絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心

煩足脛疼

賊風第三 論一首 方二十九首

桂枝酒 治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面

目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損方

桂枝 芎藭 獨活

牛膝 薯蕷 甘艸 各三

附子 一兩 防風 茯苓

天雄 茵芋 杜仲

蒟藳根 白朮 各四 乾薑 五兩

躑躅 猪椒葉根皮 各一

大棗 四十枚

右十八味咬咀以酒四斗漬七日每服四合日二

加至五六合

義衍

肝虛卒犯厲風面青肢緩乃肝之本病至於瘖啞便失又為腎臟氣衰不能統攝上下之兆方用桂

枝附子湯白朮附子湯甘艸附子湯三方萃聚於

一可謂峻矣猶恐腎中真陽式微不能煥發脾氣

乃以乾薑易生薑佐朮附以溫水土二臟且合成

甘薑朮以祛腎著之邪猶恐附子之力不逮更

需天雄統攝茵芋躑躅蒟藳猪椒戮力并攻猶恐

茵芋等藥過烈因以大棗和之其獨活防風芎藭  
薯蕷杜仲牛膝雖藥中卑伍然無老成無以約制  
強悍克濟剛柔之用用酒漬者酒能活絡行經徹  
內外而搜逐風毒之氣也

肝風占候其口不能言

當灸鼻下人中灸大椎次灸肝膈第九椎下  
是五十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三百

壯良

大定心湯 治心氣虛悸恍惚方 見十六卷  
小腸腑中

乾薑附子湯 治心虛寒風半身不遂骨節離解

緩弱不收便利無度口面喎邪方

乾薑 各八兩 附子 各八兩 桂心

麻黃 各四兩 芎藭 三兩

右五味咬咀以水九升煮取二升分三服三日後  
服一劑

衍義

方下雖言心虛而實少火氣衰不能代天宣化故  
用乾薑附子湯峻補命門之陽兼桂心助薑附益  
火消陰腎氣有權則麻黃得以振發表之力心主  
血芎藭既能治風又能和血觀本經有中風入腦  
頭痛寒痺筋攣緩急之治功用可知

側子酒 治心寒或笑或呻口欬方

見前七卷  
脚氣門中

衍義側子酒方藥味雖宜而方下主治不類未審是否

芎藭湯 治卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭 一兩半

黃芩

石膏 一兩用黃連

當歸

秦艽

麻黃

桂心

乾薑

甘艸 各一兩

杏仁 二十一枚

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服

衍義卒中風四肢不仁善笑不息土困木乘心火熾然

之象乃彙取麻黃越脾麻杏甘石之製專以乾薑

實脾杜風麻黃開肺泄熱石膏清胃化火具列並

分之勢餘藥各隨寒熱佐使標本兼該此長沙密

諦真銓不覺為之吐露柰何千載塵埋能不為之

心折

荆瀝湯 治心虛寒陰氣傷寒損心驚掣悸語聲

寬急混濁口喎冒昧好自笑厲風傷心方

荆瀝 三升

母薑 取汁一升

麻黃

白朮

芎藭 各四兩

防風

桂心

升麻

茯苓

遠志

人參

羌活

當歸 各三兩

防已

甘艸 各二兩

右十五味攷咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一

衍義

荆瀝湯雖用荆瀝清火滌痰為君薑汁開導經絡為佐全賴參甘維持胃氣運行藥力桂心鼓動於中麻黃開發於外升麻提絜於上防已引泄於下遠志通達心經又以苓朮匡佐人參羌防輔弼麻黃芎歸協濟桂心統攝荆瀝毋薑共襄滌痰祛風活血之功所謂治風先治血血行風自滅也

白朮酒 補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無窮

白朮 切

地骨皮

荆實 各五升

菊花 三升

右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐

衍義

此又荆瀝湯之輔助白朮治風寒濕痺地骨皮治五內邪氣周痺風濕荆實治筋骨間寒熱濕痺拘

急菊花治諸風頭眩腫痛惡風濕痺詳千金取用藥性不出本經主治

治心風寒方

灸心膻各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯 治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語

音沉澹如破鼓聲舌強不轉而好咽唾口噤唇

黑四肢不舉身重如山便利無度方 見別卷中

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮

噍喜無度昏悶恍惚脹滿方

半夏

大麻仁 熬研為脂

生薑 各一升

芍藥

茯苓

五味子

桂心

橘皮 各三兩

白朮 四兩

附子 四兩

甘草 二兩

大棗 三十枚

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓下

大麻仁脂更上火一沸分三服

行義合近効白朮附子湯桂枝湯二陳湯三方但加麻

仁五味以滋朮薑半夏之燥而風毒化脾寒散矣

當歸丸 補脾安胃調氣止痛治脾虛寒身重不

舉語音沉鼓厲風傷痛便利無度方

當歸

酸棗仁

乾薑 各八兩

芎藭

乾地黃

天雄各六兩

黃芪

地骨皮各七兩

大棗二十枚

吳茱萸五合

甘艸

秦椒葉

厚朴

秦艸各四兩

桂心

防風

附子

白朮各五兩

右十八味為末蜜丸如梧子酒服三十九加至四

十九日再服

衍義

賊風襲人每挾寒濕為患所以身重疼煩肢廢不舉千金每以朮附薑桂等味開通血脈又需血藥濡之風燥乃化故獨取當歸命方厚朴一味從內

按滌風毒痰垢佐白朮以辟除痺濕也

脾風占候聲不出或上下手

當灸手十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳門前脈去耳門上下行一寸是次灸兩大指節上下各七壯

治脾風方脾風者總呼為八風

灸脾膈夾脊兩邊各五十壯凡人脾膈無定所隨四季月應病即灸臍膈是脾穴此法甚妙

依源麻黃續命湯 治肺虛寒厲風所中噓吸戰

掉聲嘶塞而散下氣息短憊四肢痺弱面色青



黃遺失便利冷汗出

麻黃 六兩

大棗 五十枚

杏仁

白朮

石膏 各四兩

桂心

人參

乾薑

茯苓 各三兩

當歸

芎藭

甘艸 各二兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下

諸藥煎取三升去滓分三服舊方無白朮茯苓今

方無黃芩轉以依經逐病增損

義衛

此即古今錄驗續命湯多白朮茯苓大棗三味即

八風防風散

治肺寒虛傷音嘶下抱氣用力

今戰掉緩弱羸瘠屬風入肺方

大防風

獨活

芎藭

秦椒

乾薑

黃芪

附子 各四十

二銖

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

石膏 各三十

秦艸

桂心

薯蕷

細辛

當歸

防己

人參

杜仲 各三十

甘艸 十二銖

貫衆 二枚

甘菊

紫苑 各二銖

千金方行錄卷八

但

掃葉山房

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩匕  
日再

衍義風門諸方以八風例稱者頗多此獨加防風二字  
立名者取其專行督脈與麻黃同為泄肺之品攷  
諸風毒脚氣門中八風散與此相同者十四味大  
八風散與此相同者十二味再攷本門大八風散  
與此相同者十味小八風散與此相同者一十味  
大八風湯與此相同者十四味推其法原不出古  
今錄驗續命湯之原方九味又於小續命湯中採  
取防已防風附子三味互相參究方得諸方之原

委心心相印不啻手提面命相向一堂也

温中生薑湯 治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胸

滿肺痿方

生薑 二斤

桂心

橘皮 各四兩

甘艸

麻黃 各三兩

右五味咬咀以水一斗煮取二升半分三服煎麻  
黃兩沸去沫然後入諸藥合煎

衍義

温中而用麻黃湯方中除去杏仁易入生薑統領

麻黃開發肺胃之寒邪且得橘皮輔佐生薑豁痰  
利氣以予邪之去路則桂心甘艸辛甘合劑以振

温中之力更易一味則麻黃湯之功用截然兩途且為肺痿門中要藥以生薑善開肺胃之氣也

治肺寒方

灸肺胸百壯

腎瀝湯 治腎寒虛為厲風所傷語音蹇吃不轉

偏枯胛脚偏跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁

便利仰人耳偏聾塞腰背相引隨病用藥依源

增損方

羊腎一具

黃芪

芎藭

乾地黄

山茱萸

桂心

當歸

人參

防風

甘艸

五味子

元參

茯苓

芍藥

磁石

地骨皮

生薑

右十七味咬咀以水一斗五升煮羊腎取七升下

諸藥取三升去滓分三服可服三劑

衍義

此與脚氣門中用腎瀝湯大意不殊總取祛除風

毒填補腎氣為務乃於腎臟門中本方除去澤瀉

加生地黃以治傷中逐血痺填骨髓長肌肉山茱

萸以治心下邪氣温中逐寒濕痺殊非專資腎氣

之謂脚氣門中用龍骨石脂固蟄封藏此用地黃  
茱萸滋化風毒宗旨雖同而支流各異方有濟於  
心手之妙須與二十一卷中腎臟門本方參看始  
詳

茵芋酒 治耳聾口欬等病 方見七卷脚氣門中

乾地黄丸 治腎虛呻吟喜恚怒反常心性陽氣

弱腰背強急髓冷方

乾地黄 山茱萸 天門冬

桂心 續斷 各一兩半 柏子仁

杜仲 牛膝 菴蓉 各四兩

羊茯苓 天雄 鍾乳 各二兩

松脂 遠志 乾薑 各三兩

菖蒲 薯蕷 甘艸 各一兩

右十八味為末蜜丸梧子大酒服三十九日二加

至四十九

衍義 腎虛風毒襲於髓府陽衰精冷故用鍾乳松脂填

塞骨空天雄薑桂辟除陰毒遠志菖蒲通利關竅

餘皆輔佐之功亦可助力成功也

治腎寒方

灸腎腧百壯

大巖蜜湯 治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作  
無時發即搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰  
傷寒方

梔子 十五枚

甘艸

羊脂 青羊角亦得

乾薑

細辛

芍藥 小品用芎藭

茯苓

吳茱萸

桂心 各一兩

當歸

當歸

右十一味咬咀以水八升煮取三升去滓內脂令  
烱分三服温服相去如人行十里頃若痛甚者加  
羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急

者加大黃三兩

胡洽不用梔子羊脂  
茯苓桂心名巖蜜湯

小巖蜜湯

治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶

合絕往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

大黃 二兩

雄黃

青羊脂 各一兩

當歸

乾薑

桂心

乾地黃

芍藥

甘艸

細辛 各四兩

吳茱萸 三兩

右十一味咬咀以水二斗煮取六升分六服重者  
加藥用水二斗煮取九升分十服

衍義

見前三卷婦人門心痛篇中大巖蜜湯下

排風湯 治諸毒風邪氣所中口噤悶絕不識人  
及身體疼痛面目手足暴腫者方

犀角 貝子 升麻

羚羊角 各一兩

右四味治下篩為粗散以水二升半內四方寸七  
煮取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和  
雞子傳上日三度老小可斟酌加減神良亦可多  
合備用

何義

排風者排散毒風邪氣也然有排之外散排之內  
解不同前本門中十三味排風湯乃大續命之發

派此四味排風湯乃於脚氣門防風散中採用血  
肉甲角三味磨礪堅積升麻一味升散毒風輔犀  
角羚羊貝子排之從內而解與前十三味排風湯  
風馬牛不相及也

烏頭湯 治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘  
急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥

逆方

烏頭 十五枚要略用五枚 大棗 十枚 甘草 二兩  
芍藥 四兩 桂心 六兩 老薑 一斤

右六味咬咀以水七升煮五味取三升去滓別搗

烏頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯  
中煮兩小沸去滓服一合日二間食强者三合以  
如醉狀為知不知增之


衍烏頭辛烈為寒疝絞痛單刀直入之英銳入於桂  
枝湯中和營散邪煎用蜂蜜誠得南陽剛柔兼濟  
之妙用於中易入桂心以壯烏頭之威但與金匱  
之名不合迺削去桂枝二字單以烏頭命方與前  
丸味烏頭湯略無干涉

治賊風所中腹內攣急方

麻黃 四兩

甘草 一尺

石膏 中



鳥  
山