





武
門
176
卷
14



孫真人千金方衍義卷九

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

傷寒方上 凡九類

傷寒例第一 論三首

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方
性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災
蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月
運行各別終其晷度方得成年是謂歲功畢矣天地
尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭

際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂
畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一
日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天
行瘟疫病者卽天地變化之一氣也斯蓋造化必然
之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能
廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於
攝生能知樽節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘
還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所
侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿
自瘥以此致枉者天下大半凡始覺不佳卽須救療

迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可
令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今博採
羣經以爲上下二卷廣設備擬好養者可得詳焉
小品曰古今相傳稱傷寒爲難治之疾時行瘟疫是
毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫爲異氣
耳云傷寒雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳不說
病之異同也考之衆經其實殊異矣所宜不同方說
宜辨是以略說其要經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣
清涼冬氣凜冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類
深藏君子固密則不傷於寒或觸冒之者乃爲傷寒

耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而卽病名曰傷寒不卽病者其寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此時行之氣也傷寒之逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不去病或日數久淹困乃告師苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃有效耳

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之卽愈若不解者二日在膚可依法鍼服解肌散發汗汗出卽愈卽不解至三日在肌復一發汗卽愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆圓微吐之則愈若病困藜蘆圓不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尙未醒醒者復一法鍼之五日在腹六日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃卽爛胃也然熱入胃須要下去

之不可留於胃中也胃若實熱爲病三死一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當通與新汲水一升或二升強飲之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆令相主不爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之尤佳夫飲膈

實者此皆難治此則三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬無大發汗法冬及始春大寒時宜服神丹丸亦可摩膏火灸若春末及夏月始秋此熱月不宜大灸及重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若無圓散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕駛者爲滯實者朝平夕駛者非滯也轉下湯爲可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非

傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈爲可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

王叔和曰夫陽盛陰虛

外臺作表
和裏病

汗之則死下之則

愈陽虛陰盛

外臺作裏
和表病

下之則死汗之則愈夫如是

則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治

外臺

作表裏
之病

相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下

咽陽盛則斃

外臺作表
和則斃

承氣入胃陰盛以亡

外臺作
裏平以

若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相

反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者殞沒自謂

其分至令冤魂塞於冥路天死盈於曠野仁愛鑒此

寧不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣

分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅

皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表

發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛

胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在藏故腹脹

身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不

可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不

可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所除當診其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣相染易爲邪惡所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也

陳廩邱云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如蒸中風法熱溫之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簾中冷得病但苦寒倦諸醫與圓散湯四日之內凡入過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之卽得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不汗出也諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗溫粉粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及下大利則不可大汗也數少與桂枝湯使體潤熱熱汗出連日

千金方卷九
當自解也

論曰凡人有少苦似不如平常卽須早道若隱忍不治冀望自瘥須臾之間以成固疾小兒女子益以滋甚若時氣不和當自戒謹若小有不和卽須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入臟則難可制止雖倉扁亦無能爲也癰疽疔腫喉痺客忤尤其爲急此自養生之要凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾卽宜便治不
等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須治之凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有溫覆而當不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更爲人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦不可與之忽然大汗出欲自愈也人得病能飲水欲愈也凡溫病可鍼刺者五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災
論曰夫尋方學之要以救速爲貴是以養生之家須預合成熟藥以補倉卒之急今具之於左

辟溫第二

方三十三首
濕匿病證

屠蘇酒 辟疫令人不染溫病及傷寒之方

大黃

十五銖

白朮

桂心

各十銖

桔梗

蜀椒

各十銖

烏頭

六銖

菝葜

十二銖

右七味咬咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中
令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東
向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人
飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還
滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆

悉著藥辟溫氣也 一方有防風一兩

又方

正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之懸
門戶上又令人帶之

又方

正旦吞麻子赤小豆各二十七粒又以二七粒
投井中

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚
又方

七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方

神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大小並服不限多少

太乙流金散 辟溫氣方

雄黃 三兩

雌黃 二兩

礬石 一兩半

鬼箭羽

一兩半 即衛芽 羚羊角 燒二兩

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并挂門戶上若逢大疫之年以月旦青布裏一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

雄黃散 辟溫氣方

雄黃 五兩

硃砂

菖蒲

鬼臼 各二兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

殺鬼燒藥方 辟溫氣

雄黃

丹砂

雌黃 各一斤

羚羊角

殺羊角亦得 蕪荑

虎骨

鬼臼

鬼箭羽

野丈人 即白頭翁

石長生

殺猪屎

馬懸蹄 各三兩

青羊脂

菖蒲

白朮 各八兩

蜜蠟 八斤

右十六味末之以蜜蠟和爲丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓 辟溫方

虎頭 五兩

硃砂

雄黃

雌黃 各一兩半

鬼臼

皂莢

蕪荑 各一兩

右七味末之以蜜蠟和爲丸如彈子大絳袋盛繫臂男左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓辟溫殺鬼圓 熏百鬼惡氣方

雄黃

雌黃 各二兩

龍骨

龜甲

鯪魚甲

蝟皮 各三兩

殺羊角

虎骨 各七兩

樗雞 十五枚

空青 一兩

芎藭

眞珠 各五兩

東門上雞頭 一兩

右十三味末之烱蠟二十兩并手圓如梧子正旦門戶前燒一圓帶一圓男左女右辟百惡獨宿弔喪問病各吞一圓小豆大天陰大霧日燒一九於戶牖前佳

雄黃圓 漢建炎二年太歲在酉疫氣流行死者

極衆有書生丁季迴從蜀青城山來東過南陽
從西市門入見患疫癘者頗多遂於囊中出藥
人各惠之一圓靈藥霑屑疾無不瘥市中疫鬼
數百餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃有鬼王
見書生謂有道法兼自施藥感衆鬼等奔走若
是遂詣書生欲求受其道法書生曰吾無道法
乃囊中之藥呈於鬼王鬼王覩藥驚惶叩頭乞
命而走此方藥帶之入山能辟虎狼蛇蟲入水
能除水怪蛟蜃

雄黃

雌黃

曾青

鬼臼

真珠

丹砂

虎頭骨

桔梗

白朮

女青

芎藭

白芷

鬼督郵

蕪荑

鬼箭羽

藜蘆

菖蒲

皂莢各一兩

右十八味末之蜜丸如彈子大絹袋盛男左女右
帶之卒中惡病及時疫吞如梧子一九燒彈大一
丸戶內

赤散 辟溫疫氣傷寒熱病方

藜蘆

躑躅花各一兩

丹皮

皂莢

各一兩
六銖

附子

桂心

真珠

各六兩

細辛

乾薑

各十
八銖

右九味末之內真珠合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便以粟米大內著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方

凡時行疫癘常以月望日細剉東引桃枝煮湯浴之

松身散 辟溫病常用方

芎藭

白芷

藁本

各等分

右三味治下篩內米粉中以粉身

斷溫疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者

方

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃

各二兩

右四味末之以蜜和服如小豆一丸可與病人同牀無妨

預備一物柏枝散 天氣不和疾病流行方

取南向社中柏東南枝曝令乾搗末酒服方寸

七神良

治溫病不相染方

以桃樹中橐屎末之水服方寸匕

又方

术豉等分酒浸服之妙

又方

赤豆一升新布袋盛內井中三日出舉家服二十七枚

又方

松葉末之酒服方寸匕日三服

治溫令不相染方

新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚

又方

白蜜和上色硃砂粉一兩以太歲日平旦大小勿食向東方立吞服三七丸如麻子大勿令齒近之并吞赤小豆七枚投井泉中

治瘴氣方

蒜

五十并皮碎之

豉心

一升

右二味以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之
蒜疑葱之誤

又方

青竹茹二升以水四升煮取三升分作三服

衍義

辟溫諸方有歲時預防而設有時氣不正而設然有內服有外佩有焚燒有懸挂有內鼻繫臂粉身浴體及投井中種種不同總取辟除惡毒異氣之義屠蘇酒方中首取大黃推陳致新白朮安中正氣桔梗升清降濁蜀椒辟邪下氣桂心破陰助陽烏頭祛邪辟惡菝葜逐穢除邪七味藥中惟藉烏頭爲主帥椒桂左右輔弼白朮守營大黃奪塞桔梗菝葜中外宣使一本有防風酒煎向東飲取吸

生氣隔歲置井中盡室均沾之意 自東行桑根

方至蕪菁菹汁六方皆歲時預防之法 自太乙

流金丹至粉身散九方咸用雄黃硃砂鬼臼鬼箭

虎頭羚羊等藥皆時氣不正辟邪之方 自斷溫

疫至青竹茹十方皆吞服小方廣收以便取用原

無分於彼此也

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩

欲倒身微熱戰掉不安時復增寒心中欲吐吐

時無物方

新猪屎二升半內好酒一升攪令散以生布絞

取汁更以綿濾頓服之取盡卽地鋪暖臥覆蓋
鋪前著火常汗出若得汗當細細去上衣勿使
心寒寒卽不瘥看汗自乾乃起慎風冷亦治瘧
及風勞蟲毒

衍義

霧從地濕蒸發皆平時所受穢惡之氣發則迷漫
大地卽時氣鬱蒸之類壯者氣勝無傷怯者著而
成病則有煩心頭痛目眩身熱欲吐等證長沙所
謂陽中霧露之氣故取水獸之遺以辟水土之邪
服後臥地向火取汗使鬱蒸之氣仍從土解嘗見
嬰孩麻疹著寒陷伏喘脹兒科用猪屎入大桶沸

湯中置牀簾下熱蒸如霧良久通身得汗麻卽熅
發藥所不及而此能療之勿以穢惡而鄙棄不錄
也

治肝腑臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰
強急縮目中生花方

桂心

一兩

白朮

芑硝

大青

梔子

各三兩

柴胡

五兩

石膏

生薑

各八兩

生地黃

香豉

各一升

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服

治肝肺臟溫病陰陽毒先寒後熱頸筋攣牽面目

赤黃身中直強方

元參 一兩

細辛 二兩

梔子

黃芩

升麻

芒硝 各三兩

石膏 八兩

竹葉 切五升

車前草 曝切二升

右九味咬咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去

滓下諸藥煎至三升內芒硝分三服

治心腑臟溫病陰陽毒戰掉不安驚動方

大青

黃芩

梔子

知母

芒硝 各三兩

麻黃 四兩

元參 六兩

石膏

生葛根 各八兩

生地黃 切一升

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓內芒硝分

三服

治脾肺臟溫病陰陽毒頭重頸直皮肉痺結核隱

起方

大青

羚羊角

升麻

射干

芒硝 各三兩

梔子 四兩

寒水石 五兩

元參 八兩

右八味咬咀以水七升煮取三升分三服

治肺腑臟溫病陰陽毒咳嗽連續聲不絕嘔逆方

麻黃

梔子

紫苑

大青

元參

葛根各三兩

桂心

甘草各二兩

杏仁

前胡各四兩

石膏八兩

右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服

治腎腑臟溫病身面如刺腰中欲折熱毒內傷方

茵陳蒿

梔子

芫硝各二兩

苦參

生葛各四兩

生地黃

石膏各八兩

葱白

豉各一升

右九味咬咀以水九升煮取二升半下芫硝分三服

衍義

溫病從內發外雖有臟腑之分却無陰陽之辨以

邪伏身中既久內外血氣無不受其蘊毒也其首
言肝腑臟病肝與膽合膽為陰陽之樞所以證先
寒後熱項背筋急等患肝藏血故以生地黃涼血
之味統大青石膏梔子芫硝疎其宿蘊之毒桂心
柴胡香豉生薑泄其在經之熱白朮斷其復入之
路也 其第二方亦證見寒熱有面目黃赤似乎
木邪乘土究竟肝熱居多故於芫硝石膏梔子黃

三金不從事卷九
二
芩元參蕩熱藥中略兼升麻細辛透達經邪車前
竹葉并通滲道以開泄熱之路也 心腑臟溫却
無寒熱而見戰掉火之象也心主血故亦用生地
黃統攝大青石膏梔子芫硝及元參黃芩與肝腑
臟無異以心部於表故用麻黃開發肺氣以散在
表之熱葛根知母輔石膏流行胃津以滋火氣之
燔灼也 脾腑臟溫而證見頭重頸直皮肉痺結
故用射干散結氣羚羊角辟惡毒不祥大青梔子
元參芫硝寒水石以攻熱毒升麻引入脾經也
肺腑臟溫而見咳嗽嘔逆是肺病而兼胃熱毒逆

也大青石膏梔子元參乃治溫專藥麻黃桂心杏
仁前胡紫苑甘草泄肺專藥葛根非佐石膏解利
陽明之熱乎 腎腑臟溫而證見熱毒內傷腰中
欲折不用知母反用茵陳苦參祛滌濕熱之味佐
石膏芫硝生地黃以辟毒邪專取香豉以靜少陰
之源梔子以除膈上之煩生葛以行胃中之津葱
白以通陰中陽氣也

萎蕤湯 治風溫之病脉陰陽俱浮汗出體重其
息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小
便難發其汗者必譫語加燒鍼者則耳聾難言

但吐下之則遺失便利如此疾者宜服之方

萎蕤

白薇

麻黃

獨活

杏仁

芎藭

甘草

青木香各三兩

石膏五兩

右九味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服取

汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之小品

方云萎蕤湯治冬溫及春月中風傷寒則發熱頭腦痛咽乾舌強骨肉疼心胸痞滿腰背強

衍義

風溫之病長沙但言脉證而無治療之方千金補所未逮特立萎蕤湯為專藥蓋風溫由溫病誤發其汗而成經言太陽病發熱而渴者為溫病若發

汗已身灼熱者為風溫此兩節一氣貫下陳氏不當以註釋間斷致後人作兩截看意謂風溫別是一證多生疑障且本例後一逆尚引日再逆促命期等語以為不可救藥束手待斃也原夫冬時之邪伏藏少陰至春發動必循太陽之經時當風木主令內火招風最為叵測總不因風亦必繇少陽而尋出路況經誤汗非惟不解身反灼熱其脉尺寸俱浮蓋腎脈本當沉也風溫載之從太陽上入根本撥而枝葉紊矣其證自汗身重多眠鼻鼾語難一皆腎之本病詎意發熱之初不及理脈輕犯

汗戒腎中伏邪從風外擾灼熱漫無止期胃中熱甚譫語不休神識不能主持可知若被下者小便不利直視失溲膀胱氣化受傷與少陰同時告竭也被火者微則熱傷營氣而瘀熱發黃劇則熱甚生風而如驚癇時瘈瘲火熱亂其神明擾其經脈也加燒鍼則耳聾難言但吐少陰伏火上攻本經之竅也少陰脈系咽喉喉乾痛乃至吐逆唾血多死一逆發汗已是引日待斃再逆火迫神丹莫救矣內經刺熱論溫營交之後病內連腎評熱論溫專言穀氣腎中精勝得汗則生腎中精敗更熱則

死長沙更出不盡之藏論腎更視膀胱以緯之膀胱氣化受傷則直視失溲命門精氣告竭神水不能照物其能生乎千金體究長沙餘蘊悟得發汗後汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯借此以治溫病汗後灼熱兼取麻黃升麻湯中萎蕤合麻杏甘艸僅取方中四味而麻黃升麻湯之格局儼然萎蕤滋腎益肺內化厥陰火熱外通少陽風氣佐石膏以降逆滿獨活芎藭杏仁佐麻黃以解鬱蒸得石膏之寒化不獨解表并能散火甘艸一味專和麻黃杏仁之性也此方中萎蕤白

薇青木香石膏自是一路爲方中之主麻黃杏仁
芎藭獨活自是一路爲方中之賓作兩路看方得
賓主歷然之妙深得風溫主治之奧卽更遇於風
變爲風溫之病則當以葛根黃芩黃連湯爲主治
萎蕤湯加減尤爲合宜多有熱傷津液無大熱而
渴者不妨裁去麻杏易入葱豉以通陽鬱枯蕤以
滋津液喘息氣上芎獨亦勿輕試虛不勝寒石膏
難以槩施或以竹葉清心茯苓守中則補救備至
於以補千金之未逮

傷寒膏第三 方三首

青膏 治傷寒頭痛項強四肢煩疼方

當歸

芎藭

蜀椒

白芷

吳茱萸

附子

烏頭

甘卿 各三兩

右八味咬咀以醇酒漬之再宿以豬脂四斤煎
令藥色黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服
取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭
痛背強宜摩之佳

黃膏 治傷寒赤色頭痛項強賊風走注方

大黃

附子

細辛

乾薑

蜀椒

桂心
各半兩

巴豆
七枚

右七味咬咀以醇酒漬一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服如梧子太一枚又以火摩身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊風所經摩之神效此趙泉方也
白膏 治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫覆取汗摩身當干過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗之以布拭之傅膏癰腫火灸摩干過日再自消者方

天雄

烏頭

莽草

羊躑躅

各三兩

右四味咬咀以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十二聚濕土各一升許大取成煎猪脂三斤著銅器中加竈土炊以葦薪令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡遍藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近日

衍義

西北風氣剛勁腠理緻密故取辛熱製膏摩服兼進內外透達以治冬時正傷寒寒氣嚴凝之病東

南陽氣易動良非所宜即使西北伏氣發於春夏者咸爲切禁

發汗散第四 方十一首

度瘴發汗青散 治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項

強體疼方

麻黃 三兩半

桔梗

細辛

吳茱萸

防風

白朮 各一兩

烏頭

乾薑

蜀椒

桂心 各一兩六銖

石十味治下篩溫酒服方寸匕溫服取汗汗出止

若不得汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭疼發熱此爲內實當服駛鼓丸若崔氏解散如得便頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病

衍義

汗散十餘方病因不同毫釐不辨相背千里如度瘴青散乃治山嵐瘴氣之方雖用麻黃艸防桔透表發汗全賴烏桂椒薑朮溫中散邪專爲面赤戴陽而設設服之不應頭疼發熱如故此必內有實邪固結又爲陽明病面合赤色急須駛鼓丸迅掃中外不當以面赤爲虛陽上泛而致扼腕也

五苓散 主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相當者方

猪苓

白朮

茯苓 各十
八銖

桂心 十二
銖

澤瀉 三十
銖

右五味治下篩水服方寸七日三多飲水汗出即愈

衍義

五苓散本太陽熱邪犯本及水逆煩渴之方千金借治時行熱病之熱乘心主狂言煩躁精采不與人相當取桂心為嚮導引領諸邪從水道開泄也又主瘦人臍下有悸吐涎沫癰眩而濕熱發黃亦

取用之金匱方加茵陳尤為合轍

崔文行解散 治時氣不和傷寒發熱者方

桔梗

細辛 各四
兩

白朮 八兩

烏頭 一斤

右四味治下篩若中傷寒服錢五匕覆取汗解若不覺復小增之以知為度若時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病者服一服皆酒服

衍義

時行有冬春之不同南北之區別此專主西北冬時時氣不正之病以西北風高氣烈非烏頭風藥不能通達嚴厲之氣佐以白朮實脾杜風細辛內

搜經絡桔梗外開皮腠也

六物青散 治傷寒赤色惡寒方

附子

白朮

各一兩
六銖

防風

細辛

各一兩
十八銖

桔梗

烏頭

各三兩
十八銖

右六味治下篩以溫酒服五七不知稍增之服後食頃不汗出者進溫粥一杯以發之溫覆汗繁繁可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸

衍義

青散卽前解散加附子防風以搜少陰之邪專爲

面赤戴陽而設得汗不解當服神丹專取半夏烏頭反激以祛寒氣厥逆也

青散 治春傷寒頭痛發熱方

苦參

厚朴

石膏

各三
十銖

大黃

細辛

各二
兩

麻黃

五兩

烏頭

五枚

右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故也

衍義

青散專治西北傷寒內外熱邪交結故首取苦參以治心腹結氣佐厚朴石膏大黃開泄於內細辛麻黃開發於外苦參得烏頭共解心腹寒熱互結之邪也

詔書發汗白薇散 治傷寒三日不解者方

白薇 十二銖

杏仁

貝母 各十銖

麻黃 一兩八銖

右四味治下篩酒服方寸匕自覆汗出即愈

衍義

此於麻黃湯中以白薇之苦泄易桂枝貝母之甘寒易甘艸治傷寒三日不解既散表邪兼解內熱

麻黃湯之變法也

華佗赤散 治傷寒頭痛身熱腰背強引頸及中

風口噤瘧不絕婦人產後中風寒經氣腹大方

丹砂 十二銖

蜀椒

蜀漆

乾薑

細辛

黃芩

防已

桂心

茯苓

人參

沙參

桔梗

女萎 即萎蕤

烏頭 各十銖

雄黃 二十銖

吳茱萸 三十銖

麻黃

代赭 各二兩半

右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者二七

覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二七半以意消息之細辛薑桂丹沙雄黃不熬餘皆熬之

衍義

麻烏辛桂椒薑茱萸一派辛溫散表藥中而兼黃芩女萎沙桔防已清解麻烏等熱毒參苓守五臟真氣丹砂雄黃性雖重著得麻烏薑辛鼓舞之力當無鬱遏邪氣之虞代赭鎮攝逆氣本經有治賊風蠱毒腹中毒邪女子赤沃漏下之功蜀漆專主寒熱痰積故可兼治瘧證之寒熱不絕

赤散 治傷寒頭痛項强身熱腰脊痛往來有時方

乾薑

防風

沙參

細辛

白朮

人參

蜀椒

茯苓

麻黃

黃芩

代赭

桔梗

吳茱萸

各一兩

附子

一枚

右十四味治下篩先食酒服一錢七日三

衍義

卽前華佗赤散中除去丹砂雄黃烏頭蜀漆防已桂心女萎而易白朮附子防風與前方格局雖同頭緒頗清方中白朮卽前方之茯苓附子卽前方之烏頭防風卽前方之防已也

烏頭赤散 治天行疫氣病方

烏頭一兩半

皂莢半兩

雄黃

細辛

桔梗

大黃各一兩

右六味治下篩清酒或井花水服一刀圭日二不知稍增以知為度除時氣疫病若牛馬六畜中水行疫亦可與方寸匕人始得病一日時服一刀圭取兩大豆許吹著兩鼻孔中

衍義此治天行疫氣之病故用烏頭雄黃辟除邪毒於內細辛桔梗開發經氣於上皂莢大黃降泄熱毒於下也

水解散 治時行頭痛壯熱一二日方

桂心

甘艸

大黃各二兩

麻黃四兩

右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖水服方寸匕日三覆取汗或利便瘥力强人服二方寸匕延年祕錄有黃芩芍藥各二兩古今錄驗無甘草有芍藥治天行熱病生庖瘡疼痛及解肌出汗

衍義此於麻黃湯中除去杏仁而易大黃是汗劑而兼下法從桂枝大黃湯化出中風門中三化湯則於承氣湯加羌活乃下劑而兼汗法又從此方變出治時病表裏大熱欲死方

大黃

寒水石

芒硝

石膏

升麻

麻黃

葛根

紫葛各等分

右八味治下篩水服方寸七日一

衍義

大黃石膏芒硝寒水石治裏之大熱麻黃升麻葛

根紫葛治表之大熱亦當作賓主兩路看一本無

紫葛有甘艸取其聯合賓主也

發汗湯第五

例一首 證方十九首

例曰大法春夏宜發汗凡發汗欲令手足皆周至繫
熱然一時間許益佳但不可如水流離霖霖耳若病

不解當更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗
也凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也凡云可發
汗而無湯者圓散亦可用要以汗出為解然不及湯
隨證良驗凡病無故自汗出復發其汗愈衛復和故
也 夫脈浮者病在外可發汗宜桂枝湯 夫陽脈
浮大而數者亦可發汗宜桂枝湯 夫病常自汗出
者此為營氣和營氣和而外不解此為衛氣不和也
營行脈中衛行脈外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯
夫病人臟無他病時時發熱自汗出而不愈者此
衛氣不和故也先其時發汗則愈宜桂枝湯 太陽

病發熱汗出者此為營弱衛強故令汗出欲掇邪風
宜桂枝湯 太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝
湯 太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴
杏仁湯 太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯
太陽病先發其汗不解而復下之其脈浮者不愈浮
為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須
解表則愈宜桂枝湯 太陽病下之氣上衝者可與
桂枝湯不上衝不可與 凡桂枝本為解肌若脈浮
緊發熱無汗者勿與之常知此勿誤也

桂枝湯 治中風其脈陽浮而陰弱陽浮者熱自

發陰弱者汗自出瀼瀼惡風淅淅惡寒翕翕發
熱鼻鳴乾嘔方

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草 二兩

大棗

十二枚

右五味咬咀三物切薑棗以水七升煮棗令爛
去滓乃內諸藥水少者益之煮令微沸得三升去
滓服一升日三小兒以意減之初服少多便得汗
出者小潤其間不得汗者小促其間令藥勢相及
汗出自護如法特須避風病若重宜夜服若服一
劑不解病證不變者當復服之至有不肯汗出服

兩三劑乃愈服此藥食頃飲熱粥以助藥力
衍義桂枝湯古稱湯液之祖太陽經風傷衛之首方風
傷於陽所以脈浮發熱邪迫於陰所以脈弱自汗
漉漉惡風淅淅惡寒翕翕發熱皆自汗表虛之徵
驗非若寒傷營之壯熱身疼也鼻鳴乾嘔者陽邪
上攻漸次欲傳陽明之界故用桂枝和營達衛芍
甘護營守中薑棗助桂芍以除寒熱服後啜熱稀
粥助力取汗不使復傳他經至於隨證加減信手
成方但看太陽經諸例便得長沙之妙用無窮何
憚心手不靈活乎

麻黃湯 治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱惡

寒不汗而喘方

麻黃

三兩

桂枝

甘艸

各二兩

杏仁

七十枚喘不甚用五十枚

右四味咬咀以水九升煮麻黃減二升去沫內諸
藥煮取二升半絞去滓服八合覆令汗

衍義

麻黃湯太陽經寒傷營之專藥寒氣剛勁故令脈

緊營受邪鬱所以壯熱熱蒸於上所以頭痛骨節
煩疼而喘皆熱邪內鬱不得汗泄之故故用麻黃
杏仁開發肺氣於上桂枝甘艸調和營血於內不

使隨汗外脫脫或尺中遲微又為營虛血少不能
勝任麻黃即當改用小建中以中有膠飴助胃蒸
發可無亡陽厥逆之虞也

大青龍湯 治中風傷寒脈浮緊發熱惡寒身體
疼痛汗不出煩躁方

麻黃

六兩

桂心

甘草

各二兩

石膏

如雞子
一枚碎

生薑

三兩

杏仁

四十枚

大棗

十二枚

右七味咬咀以水九升煮麻黃去沫乃內諸藥煮
取三升分服一升厚覆當大汗出溫粉粉之即止

不可再服服之則筋惕肉瞤此為逆也不汗乃再
服

衍義

麻黃湯專主寒傷營之無汗脈緊桂枝湯專主風
傷衛之自汗脈緩二湯雖同為太陽經藥而實開
發心肺之邪青龍湯專主營衛俱傷以喻龍之兩
角能通營衛兩岐也三方勢若鼎分故千金並列
湯液之首詳方下所云全是寒傷營之麻黃湯證
惟不汗出而煩躁與無汗而喘稍有分別蓋寒邪
拒閉則無汗風邪疎豁則汗泄今風寒兩傷又以
寒重風輕雖風邪欲作汗解而寒邪固閉不得出

所以煩躁不寧與寒傷營之但喘而不躁擾神氣
自能主持則有輕重之分恐人不能辨晰反以中
風二字首爲招揭千金又以中風傷寒疊舉開示
總不出大青龍之桂枝麻黃二湯合治也 然營
衛俱傷亦有風重寒輕而見脈浮緩不緊身但重
不疼且乍有輕時一一見證似乎風傷衛象卽身
重一證明非陽受風邪且乍有輕時又非營傷身
疼攣急之比洵爲寒輕風重無疑猶恐醫師不察
反以傷寒二字目之故拋疑團欲人深切致思庶
無輕舉妄治之失以風傷衛證居多故於桂枝湯

中除去薑棗加麻黃乾薑細辛半夏滌痰治咳五
味子收斂津氣則小青龍爲至當觀金匱治咳逆
倚息不得臥用小青龍下已猶不出桂苓五味甘
艸等味陳註傷寒論誤作大青龍發之非但滋誤
後學抑切紊亂聖經愚不自揣敢力正之世之知
我罪我所不惜也

陽毒升麻湯 治傷寒一二日便成陽毒或服藥
吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂
言或走或見鬼或吐血下痢其脈浮大數面赤
斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日

不可治宜服方

升麻

甘艸 各半

當歸

蜀椒

雄黃

桂心 各六銖

右六味咬咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里進一服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服之得吐亦佳
仲景無桂心有鱉甲手大錄驗有梔子六銖鱉甲如手一片

陰毒甘艸湯 治傷寒初起一二日便結成陰毒

或服藥六七日已止至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短

氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可治至七日不可治也方

甘艸

升麻 各半

當歸

蜀椒 各六銖

鱉甲 一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里頃更進一服溫服發汗毒當從汗出汗出則愈若不汗則不除重作服
仲景方無蜀椒

衍義按陽毒陰毒治例長沙不入傷寒而列之於金匱者以見證龐雜六經例中無一可歸乃次之於百

合狐惑證下首言陽毒之病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯主之次言陰毒之爲病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之或問陽毒發斑大熱何反恣用辛烈陰毒面青身痛何反除去蜀椒雄黃願聞其義何居因謂之曰夫陰陽二毒一皆熱毒極甚故五日可治七日當死其毒在陽分則面赤斑如錦文以毒邪亢極若用寒藥折之非徒悍格不入必致烈焰飛騰崑崙滅頂惟有從治一法庶可望其毒隨焰息

圖僥倖於萬一非故遛難險以誇奇特也其毒陷陰分則面青身如被杖以熱邪內伏若用辛烈從治擔薪救焚以火濟火五內裂崩勢所必致然升散之法勢在必需溫順之法在所切戒因於升麻鱉甲湯中除去雄黃蜀椒二味其在陽毒方中專解陽邪亢逆在陰毒方中恐其助火虐陰故除去不用僅取升麻之升散火氣當歸之通調營血鱉甲之削肝護陰甘艸之解毒安中其間取舍之機各有至理非深達長沙化機難以語此千金又以西北風高土厚升麻鱉甲方中蜀椒雄黃性雖雄

烈尙鮮辛散之功因去鱉甲而易桂心更其方曰
陽毒升麻湯以治陽毒面赤發斑之證又於陽毒
升麻湯中除去雄黃桂心進用鱉甲更其方曰陰
毒甘艸湯以治陰毒面青身如被杖之證則仍不
離長沙之繩墨耳陰陽二毒證治瀕危所不待言
設當風土柔弱天時和煦病人真陰不充因誤藥
變成二證者又當從金匱原方未嘗不合於治也
若夫陰寒極甚之陰毒則與中寒無異又當從事
薑附不當與此牽合

陰旦湯 治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩方

芍藥

甘艸

各二兩

乾薑

黃芩

各三兩

桂心

四兩

大棗

十五枚

右六味咬咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升
日三夜二服令小汗

陽旦湯 治傷寒中風脈浮發熱往來汗出惡風

頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左

方

以泉水一斗煮取四升分服一升日三如汗者
去桂枝加附子一枚渴者去桂加栝蒌三兩利
者去芍藥桂加乾薑三累附子一枚炮心下悸

者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之
煎得二升內膠飴半斤爲再服若脈浮緊發熱
者不可與之

衍義

陰旦者陰疑開霽之象病人中氣本虛而傷犯客
邪表雖疼熱而內則虛寒故於桂枝湯中加乾薑
黃芩分治本虛標熱則大氣布而胸次廓然如離
照當空自然陰霾無著矣 陽旦者陽和敷布之
象病人素稟偏陽而觸冒風氣裏不伏邪而外顯
微熱故於陰旦湯中除去乾薑之助陽但取黃芩
以化熱陰陽各得其平而無偏勝之厄然在素稟

陽虛之人誤投禍不旋踵觀太陽例中傷寒脈浮
自汗出二條則知陽旦之關係非細夫脈浮自汗
出風傷衛證也風爲陽邪本當自汗以寒邪外閉
不能透出半伏心包所以心煩微惡寒也小便數
脚攣急又爲陽虛暗伏少陰危證於中也此本營
衛俱傷恐人見其脈浮自汗誤認風傷衛證故長
沙特以傷寒二字貫之例首非但陽旦桂枝不可
誤與卽營衛俱傷之兼有少陰證者則大小青龍
尤爲切禁惟小建中湯爲之合劑凡尺中微遲營
氣不足血少之證總不出此然與陽旦祇爭一味

妙在膠飴之甘緩不得助桂作汗抑且實脾隄水
與陽旦方中黃芩苦寒閉邪傷犯中州功過天淵
誤服陽旦而厥逆咽乾兩勁拘急者則參附子於
桂枝湯中增桂令汗出以溫經復陽服後仍厥逆
咽乾煩躁陽明內結讞語煩亂則桂附又難過與
更作甘艸乾薑以俟夜半陽回足溫而脛尚微拘
急重與芍藥甘艸湯爾乃脛伸復以承氣湯微瀉
止其讞語其間增劇變證多端總誤在黃芩一味
所以百十三方此獨無預千金又取以治西北土
厚氣勝素偏陽旺之人最爲合轍其陰旦湯中復

取乾薑配合黃芩以治本寒標熱之病又從甘艸
乾薑湯採入至於陽旦方後加附子加桂心總在
挽回誤治增劇法來其治虛勞裏急用正陽旦詳
一正字當是桂枝湯本方中納膠飴必無兼用黃
芩之理世人但知桂枝湯加黃芩爲陽旦湯不知
方後增減皆陽旦之妙用也

六物解肌湯

治傷寒發熱身體疼痛方

葛根

四兩

茯苓

三兩

麻黃

牡蠣

生薑

各二兩

甘艸

一兩

右六味㕮咀以水八升煮取三升分三服再服後

得汗汗通即止

古今錄驗無生薑甘艸

義衍葛根專開陽明肉腠然必兼麻黃用之以陽明之邪必循太陽出路也辛甘發散為陽生薑甘艸在所必用牡蠣一味本經雖有傷寒寒熱溫瘧之治然性味鹹終非發散藥中所宜其柴胡龍骨牡蠣湯乃汗後邪犯少陽本藥此必發汗過多熱仍不解恐成漏風用以統攝茯苓內守藏氣外固津液使不隨麻葛外泄乃散中寓固之法斯義不講無人達此奧妙也

解肌湯 治傷寒溫病方

葛根

四兩

麻黃

三兩

黃芩

芍藥

甘艸

各二兩

大棗

十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升飲一升日三服三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沉實者宜以駛鼓丸下之

延年祕錄有桂心一兩

義衍黃芩湯四味本治溫病之方千金增入葛根麻黃專為風土剛勁腠理緻密而設設當水土柔弱之方又當除去麻葛而進葱豉方得應機接物之妙觀後治疫氣傷寒三日已前不解方其義自明治疫氣傷寒三日已前不解者方

好豉

綿裹一升

葱白

升切一

童子小便

三升

右三味先熬豉葱令相得則投小便煮取二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

衍義

香豉專解虛人疫氣壯熱從少陰發越其邪兼葱白以通陽氣投小便中煮服總取穢惡之氣以辟穢惡之邪故冬溫溫病初發咸取用之但病久流入經絡臟腑有所畱著者未有能應取効也

治傷寒時氣瘟疫疼痛壯熱脈盛始得一二日者方

丹砂一兩末之以水一斗煮取一升頓服之覆

取汗

衍義

本經言丹砂治身體五臟百病以其能攝伏諸邪也但時氣始得一二日間無形之時受病用之乃効若日久有所畱著恐無濟於用也

解肌升麻湯 治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

石膏

麻黃

甘草

杏仁

貝齒

三枚一作貝母十八銖

右七味咬咀以水三升煮取一升盡服溫覆發汗便愈

衍義

麻杏甘石湯本治發汗後汗出而喘無大熱者乃越脾湯之變方此治時氣三四日不解亦用此湯加升麻以治疫瘴芍藥以護營血貝齒以鎮邪毒與六物解肌湯中牡蠣同義取其鹹潤走血利水而鎮攝時氣之毒非正傷寒例藥也

葛根龍膽湯 治傷寒三四日不差身體煩疼而

熱方

葛根

八兩

龍膽

大青

各半兩

升麻

石膏

萎蕤

各一兩

甘草

桂心

芍藥

黃芩

麻黃

各二兩

右十二味咬咀以水一斗煮葛根取八升內餘藥煮取三升分四服日三夜一

衍義

此用麻黃升麻湯中八味彼兼乾薑白朮茯苓當歸佐麻黃升麻桂枝芍藥治傷寒六七日大下後邪伏至陰厥逆下利不止知母天門冬佐萎蕤黃芩石膏甘草治虛陽上逆咽喉不利唾膿血此兼葛根生薑佐麻黃升麻桂心芍藥治傷寒三四日不瘥龍膽大青佐萎蕤黃芩石膏甘草治發汗後身體煩疼而熱預防斑黃變證也

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方

梔子仁

黃連

黃蘗

大黃各半兩

好豉一升

葱白七莖

右六味㕮咀以水八升煮上四物六七沸內後葱白豉煮得三升頓服一升日三服湯訖溫服令汗出粉之得汗便止後服勿復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老小神良

衍義

方下雖云治傷寒四五日頭痛壯熱而實治溫熱病藥梔子豉湯加葱白專主伏氣發溫頭痛兼大黃黃連瀉心湯專治四肢煩熱心下痞滿不能飲

食加黃蘗者專淨邪伏少陰之毒也

七物黃連湯 治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人

喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩方

黃連

茯苓

黃芩各十八銖

芍藥

葛根各一兩

甘艸一兩六銖

小麥三合

右七味㕮咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升者可稍稍服之湯勢安乃臥藥主毒氣服湯之後胸中熱及咽喉痛皆差明日復煮一劑如法

服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者取
三分之一以水四升煮得二升稍稍服之

衍義

葛根黃芩黃連湯本治太陽證誤下脈促胸滿喘
汗引邪入犯陽明經證并治陽脈浮滑陰脈濡弱
更遇於風變為風溫之病最為合宜此治夏月伏
氣發溫熱劇昏亂之證故加茯苓以守藏氣芍藥
以護營血小麥以通肝氣麥為肝家之穀也

三七湯 治傷寒中風得之三日至七八日不解
胸脇痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消
重下血一日數十行方

茯苓

如雞子大

黃芩

人參

各三兩

栝蒌根

四兩

芒硝

乾地黄

各一斤

大黃

麻黃

寒水石

各半斤

右九味搗篩令相得以散三方寸匕水一升煮令
三沸絞去滓服之日三溫覆汗出即愈病劇與六
七七

衍義

此治風寒雜合傷外飲食壅滯傷內七八日胸脇
痛四肢逆乃中氣內結不能傍達四末之候乾嘔
水漿不下宿食不消種種皆裏實蘊熱而迫血妄
行不可以其四肢逆乾嘔疑似夾陰而致扼腕也

方中麻黃大黃地黃分治外內實結血熱妄行茯苓人參枯蕒根助胃通津以行三藥之勢黃芩佐麻黃分解表熱芩硝佐大黃疎滌裏實寒水石佐地黃滋降血滯取其鹹潤走血也

五香麻黃湯 治傷寒忽發腫或著四肢或在胸背虛腫浮如吹狀亦著頭面脣口頸項劇者偏著脚脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉主之方

麝香 半兩

薰陸香

雞舌香 各一兩

沉香

青木香

麻黃

防風

獨活

秦艽

萎蕤

甘艸 各三兩

白薇

枳實 各二兩

右十三味咬咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後外摩防已膏

衍義

至真要大論云諸氣臍鬱皆屬於肺故用麻黃外開肺氣佐以防風獨活秦艽風藥風能勝濕也諸濕腫滿皆屬於脾故用枳實內泄脾氣佐以萎蕤白薇甘艸氣藥氣能泄滿也經脈壅滯非香藥不能開通五香諸藥專通經絡諸竅也服後覆汗以

開鬼門平治權衡之道不外乎此若偏著脚脛腫大不赤不痛更摩防已膏取其辛寒開通濕熱之氣庶免不遂之虞

治傷寒三日外與前藥不瘥脈勢仍數者陽氣猶在經絡未入臟腑方

桂枝

黃芩

甘艸

各二兩

升麻

葛根

生薑

各三兩

芍藥

六兩

石膏

八兩

梔子

三七枚

右九味咬咀以水九升煮取二升七分三服相去十里久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗

更進一服得汗即止不得汗者明日去梔子加麻

黃二兩足水二升再依方服

衍義

傷寒身發浮腫服五香麻黃脈數不除陽邪猶在經絡故於桂枝湯中除去大棗之滯膈加升麻葛根以透表石膏梔子以化熱黃芩專散在表之標熱也倘服之不應更進一服仍不得汗恐升葛桂枝力綿不能勝芩梔石膏之過涼於中裁去梔子易入麻黃便合大料桂枝二越脾一湯之法以服前藥身腫尚未全瘥故大棗終非所宜升葛尚不可缺也

雪煎 治傷寒方

麻黃 十斤

大黃 一斤十二兩 金色者 杏仁 三斗 四升

右三味咬咀以雪水五斛三斗漬麻黃於東向竈
釜中三宿內大黃攪令調炊以桑薪煮得二斛汁
去滓復內大黃搗杏仁內汁中復炊之可餘六七
斗汁絞去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪
令調得二斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病
者以三沸白湯五合研一九入湯中適寒溫之立
汗出若不愈者復服一九密盛藥勿令泄氣

衍義

雪煎方中大料麻黃杏仁雖有些微大黃必從麻

杏走表然後緩通餘熱方下雖治傷寒總是西北
氣厚合成丸劑四時常用疎泄客邪之藥終非南
陽湯液隨證進退正治法也

發汗丸第六 方二首

神丹丸 治傷寒脈澀惡寒發熱體疼者方

附子

烏頭 各四兩

人參

茯苓

半夏 各五兩

硃砂 一兩

右六味末之蜜丸以真丹為色先食服如大豆二
丸生薑湯下日三須臾進熱粥二升許重覆汗出
止若不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應

解而不解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水
寒者溫飲解之治瘧先發服二丸

要略用細辛不
用人參名赤丸

主寒氣
厥逆

衍義

神丹丸本金匱赤丸彼治寒氣厥逆故用茯苓半

夏烏頭細辛礬硃專取相反激其破陰逐邪之功

此治傷寒脈澀惡寒發熱體痛而用烏附參附半

夏當矣乃反去細辛之溫散取用硃砂之鎮邪殊

不可解洗心求之方知此方既有烏附之辛烈則

細辛正可無用雖硃砂之重著諒不能阻礙烏附

破陰之力所以並行而不相悖也 前方服六物

青散得汗不解用神丹丸方中烏附雖同安得如

此方相反互激之力歟

麥奴丸 治傷寒五六日以上不解熱在胸中口

噤不能言惟欲飲水為壞傷寒醫所不能治為

成死人精魂已竭心下纔溫以杖發其口開灌

藥咽中藥得下即愈麥奴丸一曰黑奴丸二曰

水解丸

釜底墨

竈突墨

梁上墨

麥奴

黃芩

大黃

芒硝

各一兩

麻黃

二兩

右八味末之蜜丸如彈子大以新汲水五合研一
丸破漬置水中當藥消盡服之病者渴欲水極意
不問升數欲止復強飲能多飲爲善不欲飲水當
強飲之服藥須臾當寒寒竟汗出便解若服藥日
移五尺許不汗復服如前法不過再三服佳小麥
黑勃名麥奴

衍義

麥奴丸方下雖治傷寒而實時氣的方方中釜底
墨竈突墨梁上塵皆取溫散火毒麥奴乃濕熱間
氣所鐘取治溫毒爲同氣之嚮導麻黃黃芩以散
在表之熱大黃芫硝以泄在裏之毒也若渴欲飲

水極意與之飲後惡寒汗出便解故又名水解丸

宜吐第七

例一首
方二首

例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也
病如桂枝證頭不痛項不强而脈寸口浮胸中鞭滿
氣上衝喉咽不得息者此以內有久痰宜吐之

病胸上諸寒胸中鬱鬱而痛不能食欲得使人按之
反有涎出不利日十餘行而其人脈遲寸脈微滑者
此宜吐之吐之利卽止 少陰病飲食入口卽吐心
中愠愠然欲吐復不能吐者宜吐之宿食在上脘宜
吐之

病手足逆冷脈乍結者客氣在胸中心下滿而煩飢不能食者以病在胸中宜吐之

瓜蒂散 病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞堅氣上沖咽喉不得息者此為胸有寒也宜吐之方

瓜蒂

赤小豆 各一兩

右二味治下篩取一錢七香豉一合熟湯七合煮作稀粥去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止

張文仲以白湯三合和服

衍義

瓜蒂散治病如桂枝證言時如畏寒而無頭痛項

强表證但心下痞堅乃胸中寒寒者濁濕鍾聚陽和不能敷布或時兀兀欲吐也故與瓜蒂之苦寒以吐胸中寒實兼赤小豆之甘酸以清利心包餘熱所謂酸苦涌泄為陰也

水道散 治時氣病煩熱如火狂言妄語欲走方

甘遂 半兩

白芷 二兩

大黃 四兩

厚朴 八兩

枳實 五枚

芒硝 三合

右六味咬咀以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煎取二升去滓下芒硝更煎一兩沸分再服得快利止

衍義

大陷胸大承氣二方合用兼攻胸腹之結加白芷以解風熱內蘊之血閉也

宜下第八

方八首

大承氣湯 治正陽陽明病潮熱不大便六七日

短氣腹滿而喘手足戢然汗出方

大黃

四兩

厚朴

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右四味咬咀以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上微火一二沸分溫再服得下餘勿服

衍義

承氣者熱邪內結陽明之府用以下泄逆上之氣氣有餘便是火亢則害承乃制也夫火非苦寒不降故用大黃氣非辛溫不散故用厚朴滿非辛苦不泄故用枳實熱非鹹寒不除故用芒硝然泄滿蕩熱正當峻用苦寒而反倍用厚朴入於苦寒劑中乃得逆從相需之妙若太陽陽明離太陽未遠所以調胃承氣不用枳實厚朴而兼甘艸緩行祛熱之力少陽陽明則去正陽而逼太陰其邪已非大實所以除去芒硝僅用厚朴二兩以爲從治之使味耳

抵當丸 下血方

水蛭

蠱蟲 各二
十枚

桃仁 二十
枚

大黃 三兩

右四味爲末蜜和合分爲四丸以水一升煮一丸取七合頓服之晬時當下血不下更服

抵當湯 治同前

水蛭

蠱蟲 各三
十枚

桃仁 二十
枚

大黃 三兩

右四味咬咀以水五升煮取三升去滓服一升不下更服

衍義

抵當湯九南陽本治下焦結血故取蠱蟲水蛭破血之品以破瘀積兼桃仁大黃開泄下行之路也承氣湯方

枳實 五枚

芒硝 半斤

大黃 四兩

甘艸 二兩

右四味咬咀以水五升煮取二升去滓適寒溫分三服如人行五里進一服取下利爲度若不得和盡服之

衍義

變大承氣爲調胃承氣專取甘艸通調之力以緩硝黃之急也更加枳實於調胃承氣方中校大承

氣中厚朴雖辛溫辛苦不同而泄滿之功則一
生地黄湯 治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中
有宿食大便不利方

生地黄 三斤 大黃 四兩 甘草 二寸
芒硝 二合 大棗 二十枚

右五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

衍義又於調胃承氣方中加生地黄以滋血兼取大棗以行脾氣而散心腹之邪也
大柴胡荤蕤知母湯 治傷寒七八日不解默默

心煩腹中有乾屎譫語方

柴胡 半斤 荤蕤 知母

大黃 甘草 各二兩 人參

黃芩 芍藥 各三兩 生薑 五兩

半夏 半升

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓服一升日三卽下爲效 集驗用枳實四枚不用芍藥

衍義少陽爲樞乃陰陽之交界表裏駸駸內犯舍小柴胡別無主治小柴胡中非藉人參壯其胃氣不能把守其樞若心下急鬱鬱微煩則邪已內入雖用

人參徒資助虛故於小柴胡中除去人參甘艸加枳實以導滯大黃以泄滿芍藥以收陰其振蕩滌之威此兼大小柴胡於中但去大棗更加萎蕤知母二味不但滋化風熱并佐枳實大黃下行之力也 按此雖名大柴胡仍不去人參甘艸以病人津氣本燥故加萎蕤知母則人參甘艸又爲必需近見時師用小柴胡未有一人不去人參者何怪病邪傳陰入府變證多端也

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡

梔子仁

芍藥

知母 各四兩

升麻

黃芩

大青

杏仁 各三兩

石膏 八兩

香豉 一升

右十味咬咀以水九升煮取二升七合分溫三服若熱盛加大黃四兩

衍義

此方所治之證雖傳少陽而頭痛壯熱未除知尙未離陽明之界故用柴胡升麻兼治二經之邪香豉山梔專解膈上之煩黃芩杏仁以泄逆上之滿石膏知母以化胃中之火大青芍藥以清營血之熱若熱甚加大黃仍借大柴胡變通之法

駃鼓九 治傷寒留飲宿食不消方

鼓一升

杏仁六十枚

黃芩

黃連

大黃

麻黃各四兩

芒硝

甘遂各三兩

巴豆去油二枚

右九味爲末以蜜和丸如大豆服二九不得下者增之崔氏云此黃素方

衍義

千金本黃素方以治傷寒留飲宿食大施轉日回天神手伊尹三黃古稱湯液之祖從此採出以蕩滌中外熱毒香豉麻杏開金止沸巴豆硝黃撥火散焚非黃素不能設立非千金不能體用 服度

瘴發汗青散得汗不解內實不除之故故宜服此內外兼攻并納鼻孔專藉巴豆香豉發諸藥之性也

發汗吐下後第九

脈證七首 灸法一首

方十七首

傷寒已解半日許復心煩熱其脈浮數者可更發汗宜桂枝湯凡發汗後飲水者必喘宜慎也

竹葉湯

治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與

此方

竹葉一把

半夏半斤

麥冬一升

人參

甘艸各二兩

生薑四兩

石膏 一升

右七味咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半升米熟去之分服一升口三

張文仲不用生薑

衍義

此卽竹葉石膏湯方中一派化熱生津除煩止渴之藥但以半夏一味滌除痰飲則肺胃清寧千金加入生薑以助半夏開豁之力世言半夏辛燥煩渴非其所宜因小青龍湯後有服湯已渴者寒去欲解之語不知痰去則氣通火升覺渴不過暫時少傾津回氣潤煩渴自除先哲復有服二陳湯能使大便潤而小便長痰去則津液流通之明驗也

桂枝麻黃湯

服桂枝湯大汗後脈洪大者與桂

枝湯若形如瘧一日再發汗出便解者屬桂枝

二麻黃一湯方

桂枝 一兩 十銖

麻黃 十六銖

芍藥

生薑 各一兩 六銖

甘草 一兩 二銖

杏仁 十六枚

大棗 五枚

右七味咬咀以水五升煮麻黃再沸去沫內諸藥煮取二升適寒溫分再服取微汗而已

衍義

桂枝麻黃二湯分治風寒營衛之證此以汗下不解面赤身癢知爲汗出不徹當有小汗伏於經中

故宜桂枝麻黃各半分解兩經聯貫之邪方爲合
法 若服桂枝湯邪當解矣服後大汗出脈反洪
大此必營衛俱傷但以風多寒少有似乎桂枝證
故但治風而不及寒遺其邪於經中且汗出經虛
不能禦邪之向裏裏不服邪所以形如瘧日再發
邪雖勢衰終爲微寒所持故與桂枝二麻黃一湯
略兼治寒得小汗出則愈矣 若發熱惡寒熱多
寒少脈微弱者此無陽也不可誤發其汗蓋熱多
則陰受傷之明驗無陽乃無津液之通稱津爲陽
血爲陰不可以無陽謬誤陽虛反用石膏致惑

小青龍湯 治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發
熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹滿或
喘者方

桂心

麻黃

甘艸

乾薑

芍藥

細辛各三兩

五味子

半夏各半升

右八味咬咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內
諸藥煮取三升分三服相去十里許復服之若渴
者去半夏加栝蒌根三兩若微利去麻黃加芫花
如一雞子大熬令赤色若噎加附子一枚若小便

不利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升數用神效

衍義

見前大青龍湯下

四物甘艸湯 治傷寒發汗出而喘無大熱與此

方

甘艸 二兩

麻黃 四兩

石膏 半斤

杏仁 五十枚

右四味咬咀以水七升先煮麻黃去沫令減二升內諸藥煎取三升分三服

衍義

傷寒論原名麻黃杏仁甘艸石膏湯金匱名麻杏

甘石湯本治太陽寒傷營證因誤用桂枝固衛而見喘滿既經汗下邪從藥泄故無大熱仍取麻黃開發於外杏仁疎泄於上石膏清解於內甘艸調和臟腑寒熱之邪名曰四物甘艸湯專賴平調中氣之義

梔子湯 治發汗若下後頓熱胸中窒氣逆搶心者方

梔子 十四枚

香豉 四合 綿裹

右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮取一升半分二服溫進一服得快吐止後服

衍義

此卽梔子豉湯本治發汗吐下後虛煩懊懣梔子專散胸中客熱香豉專主太陽經中不正之氣

厚朴湯

治發汗後腹脹滿方

厚朴

半兩

人參

一兩

甘草

生薑

八兩

半夏

半升

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

衍義

傷寒論原名厚朴生薑甘草半夏人參湯本桂枝證誤用麻黃發汗濁陰之邪乘虛入裏而致喘滿與瀉心湯證似同而實小異濁氣填滿故首取厚朴以泄氣滯薑半以破痰結參艸以助清陽清陽

運動而濁陰自除本非結胸之寒熱互結故無藉於乾薑芩連大棗也

元武湯 治太陽病發汗汗出不解其人仍發熱

心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地方

茯苓

芍藥

生薑

各三兩

白朮

二兩

附子

一枚

右五味㕮咀以水八升煮取二升溫服七合

衍義

真武湯治太陽證過汗經虛致邪內陷迫其虛陽外擾而爲發熱上逆而爲頭眩內薄而爲心悸經虛而爲瞤動身不自主振振欲擗地而入苦無容

之狀也急需朮附以安水土二臟庶得統攝周身之經脈而調振向安茯苓降泄胸脇逆氣而心悸可止芍藥收斂虛陽而頭眩自除生薑發越陽氣招徠虛熱歸輔朮附無復外擾之患矣以證變之驟所以甘艸大棗甘緩之味無預於治也

葛根黃連湯 治太陽病反下之利遂不止脈促者表未解喘而汗出者方

葛根 半斤

黃連

黃芩 各三兩

甘艸 二兩

右四味咬咀以水八升先煮葛根減二升次內諸

藥煮取二升去滓分再服

衍義

傷寒論原名葛根黃芩黃連湯本治誤下利不止脈促喘汗之證以葛根解表芩連清內甘艸和中兼和藥性之寒熱并治溫病熱病之太陽陽明合病若合符節

茯苓湯 治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胸起卽頭眩其脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者方

茯苓 四兩

白朮

桂心 各三兩

甘艸 二兩

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服

衍義

傷寒金匱原名茯苓桂枝白朮甘草湯本治太陽

風傷衛證緣誤施汗下邪欲犯裏裏不服邪所以氣上衝胸邪竊內據運動其飲所以起即頭眩水精不上注於目所以目眩故以桂枝加入制飲藥內通陽氣開經絡白朮治痰水除脹滿然中滿不食反用甘草何也蓋桂之辛散得甘草和其寒熱使不僭上甘草得茯苓則不支滿而反燥泄且能下氣除滿也 金匱用此以治心下痰飲胸脇支滿目眩專取桂苓通利小便朮甘草培護中氣以振

運痰逐水之力耳

凡寸口脈浮關上自沉爲結胸

巢源作沉細

凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胸

大陷胸丸 治結胸病項亦強如柔痙狀下之即

和方

大黃

八兩

芒硝

杏仁

熬

葶藶

各五兩

右四味搗篩大黃葶藶餘二味別研如脂和散取如彈丸大一枚甘遂末一錢匕白蜜二合水一升煮取八合溫頓服之病乃自下如不下更服取下

爲效

傷寒六七日結胸熱實其脈沉緊心下痛按之正堅宜大陷胸湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴日晡有小潮熱心胸大煩從心下至小腹堅滿痛不可近宜

大陷胸湯方

甘遂

末一錢七

大黃

切六兩

芒硝

一升

右三味以水六升先煮大黃取三升去滓次內芒硝一沸次內甘遂分再服一服得快利止後服

新義

結胸而至項強證已篤矣蓋胸中邪結緊實項勢常昂有似柔痙之狀然痙則身首俱張此但項強原非痙也但此以驗胸中之邪十分緊迫以大陷胸湯下之恐過而不留卽以大陷胸丸下之又恐滯而不行故煮而連滓服之始得與邪相當方中大黃芒硝甘遂可謂峻矣更加葶藶杏仁以射肺邪而上行其急又須熬黑以滌其垢煮時倍加白蜜以畱戀潤導之而下行其緩深得長沙之奧千金一人而已 其大陷胸湯治太陽病重發汗而復下之不大便而燥渴日晡潮熱小腹鞭滿證與

陽明頗同但小有潮熱不似陽明之壯熱從心下
至小腹堅不可近則陽明又不似此大痛因是以
辨爲太陽結胸而兼陽明內實也緣屢經誤治重
傷津液不大便而燥渴潮熱更加痰飲內結必須
用陷胸湯由胸脇以及腸胃一舉而蕩滌無餘若
但下腸胃結熱反遺膈上痰飲則非法矣設心下
結而不鞭按之則痛脈微滑者乃痰飲挾熱內結
爲小結胸證則宜黃連半夏栝蒌實三物小陷胸
湯原無實邪固結不須峻攻也至若結胸證脈浮
大者爲邪尚在表不可下下之死結胸證悉具煩

躁者爲胃氣之絕亦死結胸危證死生反掌千金
僅舉長沙二方不輕增損一味心心相印於此足
徵

生薑瀉心湯

治傷寒發汗後胃中不和心下痞

堅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下痢者方

生薑

四兩

甘草

人參

黃芩

各二兩

乾薑

黃連

各一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右八味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升

日三

甘艸瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下痢

日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾嘔心煩不能得安師見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結實但以胃中虛客氣上逆使之然也宜治之方

甘艸 四兩

黃芩

乾薑 各三兩

黃連 一兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升

日三

衍義

汗後外邪雖解然必胃氣安和始得脫然無恙胃

主津液津液因邪入而內結因發汗而外亡兩相告匱其人心下痞鞭以伏飲搏聚胃氣不足以開之胃病故乾噎食臭水入而傍滲脇下也胃中水穀不行腹中雷鳴有聲下利而清濁不分也雖不誤下而且成痞設誤下之其痞結又當何如耶後條傷寒中風互言可見病發於陰下之成痞者非指傷寒爲陰也下後完穀腹鳴嘔煩皆誤下而胃中空虛之互辭不知此以爲熱結而復下之其痞必益甚故重以胃中空虛客氣上逆昭揭病因方用甘艸瀉心湯卽前生薑瀉心湯除去生薑人

參而倍甘艸乾薑也客邪乘虛結於心下本當用人參以誤而再誤其痞已極人參和柔無剛決之力故去而不用生薑辛溫最宜用者然以氣薄主散恐領津液上升客邪從之犯上故倍用乾薑代之以開痞而用甘艸爲君坐鎮中州庶心下腹中漸致寧泰耳今人但知生薑代乾薑孰知以乾薑代生薑之散哉但知甘艸能增滿孰知甘艸能去滿哉其傷寒五六日嘔而發熱下之心下但滿而不痛者宜半夏瀉心湯卽生薑瀉心湯除去生薑之走表藉半夏以溫膽以證起於嘔故推半夏

爲君主卽心實熱下利水穀不消腹中雷鳴心下痞滿乾嘔不安亦不出此痞證脈緊卽不可下誤下而邪反入裏寒邪轉入轉深外邪與飲搏結故心下滿鞭濁氣蘊熱上逆惟大黃黃連瀉心湯苦寒瀉之若惡寒汗出雖有濕熱痞聚於心下而挾陰虛陰盛之證故於大黃黃連瀉心湯內另煎附子汁和服以各行其力共成傾痞之功卽一瀉心湯方中法度森森若此千金於結胸痞證各舉二方爲例餘俟學人之自悟可也并治溫毒變爲狐惑蟲食於上聲喝及下痢不止腹中愒堅

嘔噦腸鳴此方並可主治總皆火毒之患耳

白虎湯 治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏

表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者方

石膏 一升

知母 六兩

甘草 二兩

粳米 六合

右四味咬咀以水一斗煮米熟去滓分服一升日三諸亡血及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月尚凜冷亦不可與之與之則嘔利腹痛

傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜服白虎湯傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯 渴欲飲水無表證宜白虎湯 若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

衍義

傷寒論此條主以白虎加人參湯詳本文熱結在裏表裏俱熱二句已自酌量惟熱在裏所以表熱不止妄得不以白虎湯化熱為務卽於方中加人參生津為急耶千金慮熱毒勢盛恐加人參助長邪氣未便輕用所以方後垂戒諸亡血虛家及立

千金方卷九
三
秋後春三月皆不可與與之則嘔利腹痛惟夏至
後立秋前得用之按白虎金神夏暑遇之而退爲
熱病暑病之的方何長沙白虎例首謂之傷寒當
知古聖藏機妙用全在乎此欲人深求而自得也
蓋熱病乃冬不藏精陽氣發泄復傷驟寒致邪氣
伏藏骨髓至夏大汗出而熱始發故仍以傷寒目
之以伏邪從骨髓發出由心包而薄陽明處方乃
以石膏救陽明之熱知母淨少陰之源甘艸化心
包之火粳米護肺胃之津氣弱者必加人參則本
方方始得力後人不審每以白虎湯治冬月傷寒

發熱未有僥倖得免者今特昭揭此義以爲冬月
擅用白虎之戒觀溫瘧用桂枝白虎濕溫用蒼朮
白虎皆春夏應用之方非秋冬藥也 又傷寒無
大熱而口燥渴心煩背微惡寒者宜白虎湯此言
熱毒內盛而煩表不勝邪而寒也 傷寒脈浮發
熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表
證宜白虎湯此辨暴感之邪而非伏氣之發故不
可與若渴欲飲水但顯伏熱外無表證方爲合宜
若渴欲飲水口乾舌燥者亦宜白虎湯此雖長沙
本例千金入此卽是上條渴欲飲水無表證之註

脚也上三條傷寒論本文並用白虎加人參湯義
見前方條下 其有傷寒脈浮滑此表有寒裏有
熱白虎湯主之一條詳脈浮滑明係伏邪初乘肌
表之應以表虛不能勝邪其外反顯假寒故言表
有寒伏邪始發未盡裏熱猶盛故言裏有熱與傷
寒脈滑而厥裏有熱一條參看自明因世本誤刊
表有熱裏有寒千金不解其故故不錄入 復有
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖
語遺尿發汗則讖語下之額上汗出手足逆冷若
自汗出者白虎湯主之一條是言熱病而兼中暍

乘勢一齊發出之證而非傷寒三陽合病故亦不
錄 更有服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪
大者白虎加人參湯一條此熱病誤認太陽中風
而與桂枝湯乃挽回誤治之法非本病方故亦不
錄

青葙子丸 治傷寒後結熱在內煩渴者方

青葙子

五兩

黃芩

栝蒌根

苦參

各一兩

黃檗

二兩

龍膽

梔子仁

黃連

各三兩

右八味爲末蜜丸如梧子大先食服七丸不知稍

加一本云錫和為丸

^{衍義}青箱子專走厥陰肝經本經治唇口青是熱伏至陰而見假象非陰寒藥也艸龍膽本經治骨間寒熱大瀉肝經濕熱苦參本經治心腹結氣與黃檗同為瀉腎之品兼芩連梔子一派苦寒暗伏黃連解毒於中更加栝蒌根通津液除煩渴相率以迅掃畱泊之餘邪咸非馴良之品病人稍涉虛者難以槩施

大青湯 治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱不除及下痢不止斑出皆治之方

大青 四兩

甘艸

阿膠 各二兩

豆豉 一升

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓煮三沸去豉內阿膠令烊頓服一升日三服欲盡復作常使有餘渴者當飲但除熱止吐下無服

深師治勞復時後有赤石

脂三兩胡洽集驗同

^{衍義}大青乃藍之一種善解陷伏至陰之邪豆豉專搜少陰不正之氣阿膠滋血潤燥甘艸解毒和中不特為陽毒發斑之專藥一切時行溫熱汗吐不利下利不止並得用之取其解散陰經熱毒也

治傷寒後不了了朝夕有潮熱如瘧狀方

知母二兩

麻黃

甘艸

芍藥

黃芩

桂心各一兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令胃中和則愈

衍義

此於金匱桂枝芍藥知母湯中除去木附防風生薑四味易入黃芩一味彼用木附以開下著之痺麻知以散上盛之熱此用麻知以解宿蘊之邪桂芍以和將復之血散邪杜火全在麻知二味之力

灸法

初得病或先頭痛身寒熱或漉漉欲守火或腰背強直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上脘第三處去心下三寸名胃脘各灸五十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃脘又中屈半繩更分為二分從胃脘向上度一分卽是上脘又上度取一分卽是巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之

大小以意斟酌量也若病者三四日以上宜先灸胸上
二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從
髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顙顙又灸兩
風池又灸肝腧百壯餘處各二十壯又灸太衝三十
壯神驗

孫真人千金方衍義卷九

終

