



葉山房
滑疾
册

千金方衍義

紙 9
176
22



門中武
瑞 176
卷 22

孫真人千金方衍義卷十六

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校



胃腑方 凡八類

胃腑脈論第一 論一首

論曰胃腑者主脾也口唇者是其候也脾合氣於胃
胃者水穀之腑也號倉庫守內畜吏重二筋十四兩
迂曲屈伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀
三斗五升其中當留穀二斗水一斗五升廣膈大頸
張胸五穀乃容而滿上焦泄氣出其精微慄悍滑疾

下焦下漑泄諸小腸此腸胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更滿更虛氣待上下五臟安定血脈和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調於胃故腸胃之中當留穀二斗四升水一斗一升故人一日再至後甲乙後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故平人不飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死矣

右手關上陽絕者無胃脈也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本節後一寸

右手關上陽實者胃實也若腸中伏伏一作幅不思食

得食不能消刺足陽明治陽在足上動脈脈浮而芤浮則爲陽芤則爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕跌陽脈浮大者此胃家微虛煩圖必日再行動作頭痛重熱氣朝者屬胃

胃脈搏堅而長其色赤當病折髀其奘而散者當病食痺髀痛病先發於胃脹滿五日之腎小腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背脊筋痛小便閉五日上之心脾心痛閉塞不通身痛體重靈樞云三日不已死冬夜半後夏日映胃病者腹臙脹胃脘當心而痛上支兩

膈膈咽不通飲食不下下取三里
飲食不下膈塞不通邪在胃腕在上腕則抑而刺之
在下腕則散而去之

胃脹者腹滿胃腕痛鼻聞焦臭妨於食大便難

胃瘧令人旦病也善飢而不能食食而支滿腹大刺
足陽明太陰橫脈出血

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前受
病移於胃脾咳不已嘔吐長蟲

厥氣客於胃則夢飲食

診得胃脈病形何如曰胃脈實則脹虛則洩脾應肉

膈肉膈堅大者胃厚肉膈磨者胃薄肉膈小而磨者
胃不堅肉膈不稱其身者胃下胃下者腕約肉膈不
堅者胃緩肉膈無小果累標緊者胃急肉膈多小果
累者胃結胃結者胃上腕約不利

扁鵲云足太陰與陽明爲表裏脾胃若病實則傷熱
熱則引水漿常渴虛則傷寒寒則苦飢常痛發於風
水其根在胃先從四肢起腹滿大通身腫方見治水

篇中

胃絕不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤泄
足陽明之脈起於鼻交頰中旁約大腸之脈下循鼻

外上入齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下
廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛
其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下隔屬胃
絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中其
支者起胃口下循腹裏下至氣衝中而合以下髀關
抵伏兔下膝入臏中下循胫外廉下足跗入中指內
間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者
別跗上入大指間出其端也動則病悽悽振寒善伸
數欠顏黑病至惡人與火聞木音則惕然而驚心欲
動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁嚮

腹脹是為肝厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽
衄口喎唇緊頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳
氣衝股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則
身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則
身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍
於寸口虛者則人迎反小於寸口也

胃虛實第二 脈二首 方三首 灸法一首

胃實熱

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦頭痛脈經作腹中堅
熱痛面汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫

痛名曰胃實熱也

瀉胃熱湯方

梔子仁

射干

升麻

茯苓各三兩

芍藥四兩

白木五兩

赤蜜

生地汁各一升

右八味咬咀以水七升煮取一升半去滓下地黃汁煮兩沸次下蜜煮取三升分三服老少均意量

減

衍義

瀉熱反用白朮可見瀉胃之熱而非瀉胃之實也方用升麻專走陽明開發胃熱地黃滋陰退陽赤

蜜和胃解毒射干散腹中結氣梔子仁滋胃中熱

氣芍藥治邪氣腹痛茯苓守五臟正氣而佐白朮

除熱消食之功祛邪養正全賴苓朮之力耳

胃中熱病

灸三里三十壯穴在膝下三寸

胃虛冷

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥

惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴外臺作耳虛鳴時寒時熱唇口

乾面目浮腫名曰胃虛冷也

補胃湯治少氣口苦身體無澤方

柏子仁 防風 細辛

桂心 橘皮各二兩 川芎

吳茱萸 人參各三兩 甘艸一兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分為三服

衍義胃中虛冷而用萸桂甘橘之屬人所同然至於防

柏芎辛祛風逐濕等味非深達土中瀉木之義茫

然不解何意也

人參散 補胃虛寒身枯絕諸骨節皆痛方

人參 甘艸各六分 細辛各六分

麥冬 桂心 當歸各七分

乾薑二兩 遠志一兩 吳茱萸二分

川椒三分

右十味治下篩食後溫酒服方寸匕

衍義胃氣虛寒而用參甘薑桂椒萸志辛辛溫散逆亦

食人所共喻其外當歸麥冬一以主身枯骨痛一以

滋諸味辛燥也

喉嚨論第三論一首

論曰喉嚨者脾胃之候也主通利水穀之道往來神

氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏翬膏主之方見第六卷中若

腑寒喉則耿耿如物常欲窒癢痺涎唾母薑酒主之

方見第六卷中熱則開之寒則通之不熱不寒依臟調之

反胃第四 脈二首 灸法三首 方十三首

寸緊尺濇其人胸滿不能食而吐吐止者為下之故不能食設言未止者此為胃反故尺為之微濇

跌陽脈浮而濇浮即為虛濇即傷脾脾傷即不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反跌陽脈緊而濇其病難治

治胃虛反食下喉便吐方

人參 一兩

澤瀉

甘艸

桂心 各二兩

橘皮

乾薑 各三兩

茯苓 四兩

竹茹 五兩

大黃 六兩

右九味咬咀以水八升煮取三升一服七合日三夜一已利者去大黃

衍義

反胃皆由胃虛穀氣留泊蘊為濁濕阻積於中所以飲食隨之上逆故用大黃甘艸湯領之下達加參薑以助二味之力并取五苓散中之三降泄水逆於下橘皮竹茹開發痰氣於上也

治胃反吐逆不消食吐不止方

人參

桂心

澤瀉 各二兩

茯苓 四兩

橘皮

甘艸

黃芪 各三兩

大黃 一兩

生薑 八兩

半夏 一升

麥冬 三升

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升二合一服八合日三夜一羸人六合已利去大黃

衍義

前以濁濕內蘊故用金匱大黃甘艸湯祛之下達此以痰飲上逆故用金匱小半夏湯豁之內通前以人參佐大黃蕩滌之力此以大黃佐半夏開豁之功前以竹茹橘皮佐乾薑人參開發於上此以麥冬黃芪佐茯苓桂心通調於下皆因勢利導之法

治反胃而渴方

茯苓

澤瀉

半夏 各四兩

桂心

甘艸 各二兩

右五味咬咀以水五升煮取二升分三服一方

入生薑四兩

衍義

胃反而渴良由水逆阻遏津氣遊溢之道故南陽主以五苓利水通津其渴自止此以痰涎挾水飲上逆乃以甘艸半夏易豬苓白朮但取三味利水足矣

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷方

橘皮 三兩

甘艸

厚朴

茯苓

桂心

細辛

杏仁

竹皮 各二兩

檳榔 十枚

前胡 八兩

人參 一兩

生薑 五兩

右十二味咬咀以水一斗三升煮取三升分為三服 一方有柑皮二兩

衍義

穀人則痛胃氣雖虛尚能與邪交逆所以激痛如刺其食停留經日乃吐脾氣雖衰尚有濁氣阻逆不得作純虛例治故用細辛桂心破結氣杏仁前胡降逆氣厚朴檳榔泄滯氣生薑橘皮逐痰氣人

參甘艸培胃氣茯苓竹茹清神氣濁氣散而清氣安脾氣運而穀氣進津氣布而正氣復

又方

橘皮 三兩

人參

白朮 各二兩

桂心 一兩

川椒 一百二十粒

薤白 一握

右六味咬咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以三升水煮水盡出之決破去滓分三服

衍義

亦治朝食暮吐腹中刺痛彼用厚朴檳榔此用薤白同為泄滯氣之藥氣雖少變而功用不殊

又反胃大驗方

前胡

生薑

各四兩

橘皮

三兩

阿膠

一兩

大麻仁

五合

桂心

三寸

甘艸

五寸

吳茱萸

四合

大棗

十枚

右九味咬咀以水三升酒二升煮取一升七合分

二服

衍義

反胃多屬胃虛氣滯惟此方獨主津血枯涸下咽
澀難所以專取阿膠麻仁滋血潤燥前胡薑橘降
氣止逆桂心吳茱萸温中下氣甘艸大棗益胃和
脾脾胃枯涸故無慮於棗之膩滯也
華佗治胃反為病朝食暮吐心下堅如杯升往來

寒熱吐逆不下食此為關上寒游所作將成肺

痿治之之方

大真珠

丹砂

雄黃

各三兩

朴硝

五兩

乾薑

十累

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸若小

煩者飲水自解然無所忌神良無比一方用桂

心一兩

衍義

寒游結聚心下將成肺痿而見胃氣反逆心神不
安故千金效元化法而用真珠丹砂以安神氣雄
黃朴硝以辟毒邪稍取乾薑以散肺寒寒游散而

嘔逆止胃氣和而肺氣溫矣

治胃反食即吐方

搗粟米作麵水和作丸楮子大七枚爛煮內醋中細細吞之即下便已麵亦得用之

衍義

借穀氣以安胃氣妙在酢之酸收以斂肝木乘脾之邪不勞餘力而胃氣安和勝於湯藥之戕犯正氣也

大半夏湯 治胃反不受食食已即嘔吐方

半夏 三升

白朮

白蜜

各一升

人參 二兩

生薑 三兩

右五味咬咀用水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半分三服

衍義

金匱大半夏湯本治胃反嘔逆取人參助半夏之祛痰白蜜滋半夏之辛燥千金加白朮生薑不但佐參半之祛痰且善行白蜜之滯也

治胃反食即吐出上氣方

蘆根

茅根

各二兩切細

右二味以水四升煮取二升頓服之得下良

衍義

吐逆上氣渾是胃槁火逆上迫於肺之象蘆根茅根涼潤滋胃以調氣化味簡力專下咽可使氣平

火隨下泄矣

又方

飲白馬尿即止

又方

燒雞胍脰灰酒服男雄女雌

又方

淘小芥子曝乾為末酒服方寸七日三

術義

馬屎殺蟲

雞胍脰磨積

芥子開痰丹方中之

可備用也

灸法

灸兩乳下各一寸以瘡為度又臍上一寸灸二十

壯又灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯外臺祕要云三

指作一指也

治醉咽方

麩末一斤

地黃三斤

右二味合搗日乾酒服三方寸七日三

術義

曲直作酸故用地黃之鮮者以清木鬱之火麩末

以行地黃之性

治噫氣酢咽方

吳茱萸半斤

生薑二兩

人參一兩

大棗十二枚

右四味咬咀以水六升煮取二升先食服一合日再

義術

吳茱萸湯本治食穀欲嘔乃胃虛氣滯而逆上故南陽以人參助氣大棗運脾精吳萸下逆氣生薑止嘔吐千金治噫氣酢咽亦不出是方也

治中散 食後吐酸水方

乾薑 食茱萸各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二胃冷服之驗

義術

食後吐酸木邪乘土以胃氣虛寒非從治之法無

以散虛陽之上逆

嘔吐噦逆第五論一首 方二十四首 脈一首 灸法十五首

夫吐家形狀如新臥起脈來陽緊陰數其人食已卽吐陽浮而數亦爲吐寸口脈緊而芤緊卽爲寒芤卽爲虛寒虛相搏脈爲陰結而遲其人卽噎關上數其人則吐跌陽脈微而澀微卽下利澀卽吐逆穀不得入跌陽脈浮者胃氣虛也寒氣在上憂氣在下二氣并爭但出不入其人卽嘔而不能食恐怖如死寬緩卽瘥嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥難治論曰凡服湯嘔逆不入腹者先以甘艸三兩水三升

煮取二升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖藥

半夏湯 治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方一名

小茯苓湯

半夏 一升

生薑 一斤

茯苓

桂心 各五兩

右四味咬咀以水八升煮取二升半分三服若少氣加甘艸二兩

衍義金匱小半夏加茯苓湯治心下痞膈間有水氣眩

悸千金祖胡洽方加桂一味上攝虛陽下導水逆

豈但治嘔吐而已哉

小半夏加茯苓湯 治諸嘔噦心下堅痞膈間有

水痰眩悸 方見後十八卷大腸腑痰飲門

前胡湯 治寒熱嘔逆少氣心下堅聚膨脹滿不

得食寒熱消渴補不足方

前胡 各三兩 生薑 各三兩 甘草

朴硝 湯成下 大黃 別浸各二兩 茯苓

半夏 麥冬 當歸

芍藥 滑石 石膏

栝樓根

黃芩

附子

人參各一兩

右十六味咬咀以水一斗二升煮取六升分四服

衍義

寒熱嘔逆故用前胡黃芩半夏生薑少氣故用參

苓歸芍甘艸附子心下堅滿不得食故用硝黃消

渴故用麥冬栝樓滑石石膏寒熱補瀉之法萃於

一方矣

治嘔吐四肢痺冷短氣腹熱三焦不調方

前胡

川芎

當歸

石膏

甘艸

桂心

橘皮各二兩

芍藥三兩

半夏四兩

生薑五兩

大棗三十枚

右十二味咬咀以水一斗二升下黃芩三兩合煮

取三升分三服一方不用黃芩

衍義

此以三焦真火式微不能溫養中土而致嘔逆因

彷彿前方而用前苓薑半夏歸芍參甘下氣溫中諸

味但取石膏以治標熱桂心以代附子川芎以佐

歸芍橘皮以佐薑半夏棗以佐參甘以無堅滿故

無取於硝黃以無消渴故無取於麥冬栝樓滑石

小麥湯 治嘔吐不止方

小麥 一升

人參

厚朴 各四兩

茯苓 三兩

甘艸 一兩

青竹茹 二兩

薑汁 三合

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

衍義

嘔屬肝氣之逆麥為肝穀大能補肝氣滋臟燥然必產於河北者為良南方土地卑濕能助濕熱入藥非宜加以參苓甘艸培養胃氣厚朴生薑清理痰濕竹茹專主虛煩嘔渴藉此以瀉標熱旺氣也猪苓散 治嘔而膈上塞方

猪苓

茯苓

白朮 各三兩

右三味治下篩以飲服方寸七日三渴者多飲水

衍義

金匱猪苓散治嘔吐思水千金借治嘔而膈塞總屬胃虛水停心下故用白朮健胃二苓利水不必全用五苓也

犀角人參飲子 治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食

並皆治之方

犀角

人參 各二兩

薤白 五兩

粟米 一合

右四味咬咀以水五升煮至二升下米煮令米熟

分四服相去人行七里久進一服
義衍四味並走陽明入胃腑共襄祛邪匡正之功犀散
血熱壅泄滯氣人參益胃粟米進食食進滯散何
有嘔逆之患乎

治嘔噦方

人參 一兩

大麻子 八合一作胡麻仁

橘皮 十兩

枇杷葉 八兩

右四味咬咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥煮
取三升內麻仁稍飲之

義衍諺云病深者其聲噦噦而且嘔胃虛氣逆可知人

參專資胃氣麻仁專滋津氣橘皮專散滯氣枇杷
葉專降逆氣也

治氣厥嘔噦不得息方

豉 一升

半夏 八兩

生薑 二兩

人參

前胡

桂心

甘艸 各一兩

右七味咬咀以水九升煮取三升分為三服

又方

豉 一升

橘皮 二兩

生薑

甘艸 各一兩

附子 一枚

大棗 十五枚

右六味咬咀以水九升煮取二升分爲三服日三
衍嘔吐而加氣厥宿病而更感異氣也故用香豉前
義胡解散暴邪半夏生薑宣通痰氣人參甘艸培護
本虛桂心匡正祛邪全在辛溫之力 又方主治
較前證稍異前證受寒較淺略借桂心佐人參溫
散之功則前胡香豉便得領邪外出此證感寒特
甚非藉附子峻溫之力暴邪何從得解人參亦未
便輕投僅取甘艸大棗保守中州橘皮清理胃氣
與前方中用半夏不殊也
橘皮湯 治嘔噦若手足厥冷者方

橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味咬咀以水七升煮取三升分三服不止更
合服之

半夏乾薑散 治乾嘔吐逆吐涎沫者方

半夏 乾薑 等分

右二味爲散取方寸匕漿水一升半煮取七合
服之日三

大黃甘艸湯 治食已卽吐方

大黃 四兩 甘艸 二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升半分再服

衍義

橘皮湯主嘔噦厥冷良由濁痰阻遏清陽不得旁達四末但須橘皮生薑滌除痰垢不得妄議溫經也半夏乾薑散主乾嘔吐逆吐涎沫又屬胃氣虛寒則半夏乾薑在所必用尤妙在漿水之酸收固斂津液也大黃甘艸湯主食已卽吐故用大黃以下胃熱降逆氣甘艸以和胃氣致津液也頓千金於嘔噦取金匱三方首治手足厥冷反不用乾薑溫理中氣而用生薑以通陽氣次治乾嘔吐涎沫反不用生薑止嘔下氣而用乾薑滌除寒飲三治食已卽吐反不用薑辛溫治嘔而用大黃

止逆下氣夫病在少陽則有三禁此病本在胃苟非大黃急下以除上逆之邪則津液悉隨痰涎上涌變證百出故毫不以苦寒傷犯中州爲慮也趙以德曰胃素有熱食復入之兩熱相衝不得停留用大黃下熱甘艸和胃按仲景旣云欲吐者不可下又用大黃甘艸湯治食已卽吐何也曰欲吐者病在上因而越之可也逆之使下則必憤亂而益甚旣吐矣吐而不已有升無降當逆折之使其下行故用大黃丹溪曰凡病吐者切不可下近於困矣

治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變哕方

橘皮

桂心

葛根

各二兩

白茅根

升一

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服數進服

盡更合有熱去桂

衍義

寒邪傷胃而變哕故用橘皮開胃氣桂心除胃寒

葛根解胃邪茅根化胃熱熱化邪散時行之氣無

容留之地矣

治傷寒後噦乾嘔不下食方

蘆根

青竹茹

各一升

粳米

三合

生薑

二兩

右四味咬咀以水五升煮取二升分三服不止服

三劑

又方

蘆根

升一

橘皮

通艸

各一兩

粳米

三合

右四味咬咀以水四升煮取一升半分三服

治病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

衍義

噦有胃寒胃熱之辨寒則聲怯而稀熱則聲濁而

頻此治熱噦故用蘆根竹茹以化胃熱粳米以滋
胃氣薑汁以散胃逆 又方以通艸橘皮通胃氣
粳米滋胃津蘆根化胃熱彼用薑汁此用橘皮彼
用竹茹此用通艸彼以熱盛故用竹茹此以氣上
故用通艸氣有餘便是火也 羊乳滋燥故治乾
嘔

治噦方

煮豉三升飲汁佳

又方

空腹服薑汁一升

又方

煮蘆根濃汁飲之

治惡心方

苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮取一升頓
服須臾吐并下蝦蟇衣三升

又方

服童子小便百日佳

又方

麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一
升飲盡日二服服盡一石瘥

治食飲輒吐方

頓服生熟湯三升即止

義

豉汁治時行犯胃之噦 薑汁治痰氣上膈之噦

蘆根汁治熱邪傷中之噦 苦瓠酒治脹閉舌

滿之噦 童子小便治陰火上逆之噦 麻子酒

治燥結不通之噦 生熟水治陰陽交錯之噦丹

方諸治辨證不果未可漫投至苦瓠酒大苦傷胃

辨證雖果苟非頑夫亦難輕予劫奪也

灸法

乾嘔不止粥食湯藥皆吐灸手間使三十壯若四厥

脈沉絕不至者灸之便通

病人乾嘔灸心主尺澤佳 又法灸乳下一寸三十

壯 治噦灸承漿七壯炷如麥大 又灸臍下四指七壯

吐逆嘔不得食灸心膈百壯

吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸膈膈百壯

吐變不得下食灸胸膈百壯

吐逆不得食灸巨關五十壯

吐逆食不止灸胃脘百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報

章門穴也

吐嘔宿汁吞酸灸神光一名百壯三報月膽募也在

期門下五分

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦膈中氣閉塞灸腋下聚毛下附脇宛宛中五十壯

壯

噫噦嘔逆灸石關百壯

噎塞第六論一首方三十五首

五噎丸 治胸中久寒嘔逆逆氣飲食不下結食

不消方古今錄驗云五噎者氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噎噦不

轍胸膈苦痛憂噎者天庭苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣膈脇下支滿胸中填塞手

足逆冷不能自溫食噎者食無多少惟胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜怒目視眩暈此皆憂恚與怒寒氣上入胸脇所致也

乾薑 川椒 食茱萸

桂心 人參各五分 細辛

白朮 茯苓 附子各四分

橘皮六分

右十味為末蜜丸如梧子大酒服三九日三不止稍加至十九

義五噎五膈方書皆類一門而千金獨以五膈隸之

肺臟究其所因良由胃虛不能游溢精氣於脾所

以氣噎不通脾衰不能散精上歸於肺所以食膈不下原其受病雖有氣食憂勞之不同總緣思慮氣鬱之所致素問明言膈寒閉絕上下不通暴憂之病也所以五噎丸首取薑黃溫散胃氣於中椒辛開發肺氣於上桂附收攝腎氣於下則參苓朮橘得諸辛溫鼓舞之力何憚氣噎不除并可預杜隔塞之患

又方 治五種之氣皆令人噎方

人參

半夏

桂心

防風

一作防葵

小艸

附子

細辛

甘艸

各二兩

紫苑

乾薑

食茱萸

芍藥

烏頭

各六分

枳實

三兩

右十四味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日三不止加至十五丸烏頭與半夏相反但去一味合之衍義五種之氣卽五噎五膈之謂方中烏頭開風寒濕痺卽五噎丸中川椒之變半夏祛痰濕卽白朮之變枳實助脾健運卽橘皮之變芍藥益氣利小便卽茯苓之變紫苑潤肺散結氣卽五膈丸中麥冬之變小艸通腎氣卽遠志之變取其利竅去濕故

以防風佐之其間薑辛荊桂附子人參甘艸辛溫
破結辟邪養正之味無庸變換也方後云烏頭與
半夏相反但去一味合之此必後人贅入半夏烏
頭並用專取激發奏功金匱赤丸成法也

竹皮湯 治噎聲不出方

竹皮 一用竹葉

細辛 各二兩

甘艸

生薑

通艸

人參

茯苓

桂心

麻黃

五味子

各一兩

右十味咬咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下

藥煮取三升分三服

衍義

噎本胃病加以暴寒折之所以聲瘖不出但欲徹

外邪先固正氣麻黃細辛專散暴邪生薑通艸專
通聲氣人參茯苓專培本元竹皮清肺胃之虛火
桂心助參苓之溫補五味收麻黃之開發甘艸和
斂散之味也

乾薑湯

治飲食輒噎方

集驗名 半夏湯

乾薑

石膏

各四兩

人參

桂心

栝蘘根

集驗作栝 梗各二兩

甘艸

一兩

半夏

小麥

各一升

吳茱萸

二升

赤小豆

三十粒

右十味咬咀以酒五升水一斗煮棗二十枚去滓合煮取三升分三服

衍義

此因胃氣之虛寒不能運化水穀之精微蘊釀而成本寒標熱之病非寒熱補瀉之兼投何以解虛實反正之糾結詳方中人參甘艸乾薑黃桂以治本寒石膏以化標熱半夏栝藎一熱一寒分解脾濕上逆之痰飲於中小麥小豆開泄木邪內蘊之虛火於下共襄洗滌之功舉世但知柴胡白芍和解肝邪木通車前降泄火氣曷知穀菽有如此之

妙用哉

通氣湯

治胸滿氣噎方

半夏

八兩

生薑

六兩

桂心

三兩

大棗

三十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分五服日三夜

二

衍義

通氣者解散胸中逆滿之痰以通噎塞之氣也薑半所以豁痰桂心所以開結大棗以布脾胃之津氣也

羚羊角湯

治氣不通不得食方

羚羊角

通艸

橘皮

各二兩

吳茱萸

厚朴

乾薑

各三兩

烏頭 五枚

右七味以咀以水九升煮取三升分三服日二

又方

杏仁

桂心

各三兩

右二味為末蜜丸如棗大稍齟咽之臨食先含彌

佳

衍義

通艸以下諸味皆辛溫利竅之品獨羚羊一味伐

肝散邪故千金取治噎塞以其性專通達善祛胃

中痰濕逆滿之氣也 又方杏仁下氣桂心散結

結散氣下而噎逆之病除矣

治卒噎方

滿口著蜜食之即下

又方

刮杵頭細糠含之即下神驗

治諸噎方

常食乾粳米飯即不噎

又方

末火炭蜜丸如彈子大含少少咽即下

又方

老牛涎如棗大內水中飲之終身不復噎

衍義

卒噎知非宿病但取蜜之潤澤不須湯藥反傷胃

氣也

又方取杵頭糠之轉動以助胃氣之健運

又治諸噎常食乾飯令少少進緩緩嚙使無頓

傷胃氣之虞

火炭丸者火能生土并取黑色下

達之義

牛涎治噎膈反胃專取坤土之津以滋

胃氣之結與牛齡艸之意不殊

論曰凡療病者皆以其類至如治噎之法以鷓鴣治骨哽狸虎骨治魚硬至於竹篾薤白嚼筋綿蜜等事

乃可以通為諸哽用耳

治諸哽方

以鹿筋漬令濡合而索之大如彈丸以線繫持筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽著筋出

又方

以竹篾刮令滑淨綿裹內咽中令至哽處可進退引之哽即隨出

又方

用綿二兩以蜜煎使熱外薄哽所在處灼瓠以熨綿上若故未出復著一段綿代用并以皂莢

屑少少吹鼻中使得嚏噎出

又方

確白煮令半熟小嚼之以線繫確中央捉線吞
確下喉至哽處牽引哽即出矣

治哽咽方

虎骨末或狸骨服方寸七

又方

服瞿麥末方寸七

治魚骨哽方

鷓鴣屎服方寸七

又方

服橘皮湯

又方

服沙糖水

又方

魚網燒灰服方寸七

必效方云取魚網覆其頭立下

治骨鯁在喉衆治不出方

取飴糖丸如雞子黃大吞之不去更吞漸大作
丸可至十九

又方

燒虎狼屎服之

又方

吞猪膏如雞子不瘥更吞

治食中吞髮咽不去繞喉方

取亂髮燒灰酒服一錢七

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服即下

又方

服蜜二升即出

又方

末火炭酒服方寸匕水服亦得

治吞金銀釵環方

白糖二觔一頓漸漸食之多食亦佳

誤吞環及指強方

燒雁毛二七枚末服之亦得

誤吞釵方

曝菲令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋

縷如韭法皆可用但力意多食自消

誤吞銅鐵方

燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

誤吞釘鍼及箭鏃方

但多食猪脂肥肉令飽自裏出

誤吞鍼方

取懸鍼磁石末飲服方寸七卽下

古今錄驗云吞鍼在喉中

而服磁末入腹若舍磁石於口中吸鍼而出

衍義治硬之方多用智巧或用相制隨宜取用可也

脹滿第七

論一首 方八首 灸法十一首

論曰病者腹滿按而不痛者為虛按之痛者為實也夫腹中滿不減減不足言此當下之舌黃未下者下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當得溫藥腹滿

口中苦乾燥腹間有水是飲 跗陽脈微弦法當腹

滿不滿者必下部閉塞大便難兩脚下疼痛此虛寒

氣從下上也當以溫藥服之取嗟腹滿轉痛來趣小

腹為欲自下利也 一云腹中痛若轉氣下趣小腹為欲自利

溫胃湯 治胃氣不平時脹咳不能食方

大附子

當歸

厚朴

人參

橘皮

芍藥

甘艸

各一兩

乾薑

五分

川椒

三合

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

衍義方下雖云治胃氣不平時脹欬不能食而實虛寒

從下上之的方方中椒薑附子治逆上之寒參甘
歸芍資病患之虛橘皮厚朴泄脹滿之氣也此治
虛寒從下上之脹滿與寒積在脇下偏痛用大黃
附子湯之法截然兩途

大半夏湯 治胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏 一升

大棗 二十枚

甘艸

附子

當歸

人參

厚朴

茯苓

枳實 各二兩

桂心 五兩

生薑 八兩

川椒 二百粒

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分二服

衍義

金匱治胃反嘔逆大半夏湯止人參半夏白蜜三

味此以胃虛腹滿故去蜜之膩滯加椒薑附子以
散寒結枳實厚朴以泄腹滿當歸茯苓以和血氣
生薑大棗以和榮衛甘艸代白蜜之和脾并和椒
薑附子之烈也

附子粳米湯 治腹中寒氣脹滿腸鳴切痛胸脇

逆滿嘔吐方

附子 一枚

半夏

粳米 各半升

甘艸 一兩

大棗 十枚

右五味咬咀以水八升煮米熟去滓每服一升日

三服 集驗方加
乾薑二兩

衍義 此方本諸金匱專取附子鼓舞粳米溫胃為主半

夏滌除痰垢甘艸大棗通行脾胃之津氣也

厚朴三物湯 治腹滿氣脹方

厚朴 半斤

大黃 四兩

陳枳實 大者
五枚

右咬咀以水一斗二升煮取五升內大黃煎取三

升去滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服

一方加芫硝二兩

厚朴七物湯 治腹滿發熱十日脈浮而數飲食

如故方

厚朴 半斤

甘艸

大黃 各三
兩

大棗 十枚

枳實 五枚

桂心 二兩

生薑 五兩

右咬咀以水一斗煮取五升去滓內大黃煮取四

升服八合日三嘔逆者加半夏五合利者去大黃

寒多者加生薑至半斤

衍義 小承氣湯治陽明府實熱結在裏大便不通故以

大黃為主厚朴枳實佐之厚朴三物湯金匱治腹

滿氣脹故以厚朴為主大黃枳實佐之 厚朴七

物湯金匱治腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故

知裏邪未實表證未盡乃以三物厚朴湯合桂枝加大黃湯於中除去芍藥之助陰而加枳實厚朴以泄滿二方治例世本皆交錯誤刻數百年來會無一人為之歸正醫道之憤憤不獨在於今日也

吳茱萸湯 治久寒胸脇逆滿不得食方

吳茱萸 半夏 小麥 各一升

甘艸 人參 桂心 各二兩

生薑 八兩 大棗 二十枚

右八味咬咀以酒五升水三升煮取三升分三服

衍義 吳茱萸湯在陽明例中治食穀欲嘔在金匱方中

治嘔而胸滿專取茱萸下逆氣人參補正氣大棗

安中氣生薑去穢氣干金加半夏開痰氣小麥通

肝氣桂心溫血氣甘艸和胃氣也

大桂湯 治虛羸胸脇滿方

桂心 生薑 各一斤 半夏 一升

黃芪 四兩

右四味咬咀以水一斗半煮取五升分五服日三

夜二

衍義 虛脹胸滿本氣虛寒濁氣上逆故用桂心散濁氣

薑半豁痰氣黃芪固榮氣專為虛羸藉此以溫分

肉實腠理為補虛之上乘世為黃芪氣滯服之令人胸滿曷知黃芪在補益劑中不無助滿之虞在溫散藥中能令諸味留泊於中轉助開胸之力非洞達澀因澀用之奧難以語此

治男子卒勞內傷汗出中風腹脹大飢食不下心痛小便赤黃時白大便不利方

大黃

葶藶

寒水石

苦參

黃連

栝蒌根

等分

右六味為末蜜丸以豉汁和飲服如梧子大一丸日二加至十九

衍義

卒勞內傷非虛羸久困之比腹脹大非虛寒從下

上之比溺黃大便不利非津枯脾約之比故用一

派苦寒開通閉塞何慮熱邪不隨手平復乎

灸法

臚脹脇腹滿灸膈膺百壯三報

胸滿心腹積聚痞痛灸肝膺百壯三報

脹滿水腫灸脾膺隨年壯三報

腹中氣脹引脊痛多飲食身羸瘦名曰食晦先取脾

膺後取季脇

臚腑積聚脹滿羸瘦不能飲食灸三焦膺隨年壯

脹滿雷鳴灸大腸腧百壯三報

脹滿氣聚寒冷灸胃腕百壯三報穴在鳩尾下三寸

腹滿脹繞臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上

一寸一名水分

脹滿瘕聚滯下痛冷灸氣海寸壯穴在臍下一寸忌

不可鍼

脹滿氣如水腫狀小腹堅如石灸膀胱募百壯穴在

中極臍下四寸

脹滿腎冷瘕積泄利灸太樞百壯穴在臍傍相對橫

去臍兩傍各二寸

痼冷積熱第八

論二首 脈一條 方二十首 灸法一首 附寒痼骨蒸

論曰凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者善

嚏凡覘病者未脈望之口燥清涕出善嚏欠此人中

寒其人下痢以裏虛故也欲嚏不能此人腹中痛凡

寒脈沉弦脈雙弦者寒也弦脈狀如弓張弦按之不

移脈弦數者當下其寒脈雙弦而遲者心下堅脈大

而緊者陽中有陰可下之右手寸口脈弦者即脇下

拘急而痛其人澀澀惡寒師曰遲者為寒澀為無血

寸口脈微尺中緊而澀緊即為寒微即為虛澀即為

血不足故知發汗而復下之

露宿丸 主寒冷百病方

礞石

桂心

附子

乾薑 各三兩

右四味為末蜜丸如梧子大每服十九日三後稍加之

又方 治遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消并主

傷寒晨夜觸寒冷惡氣方

礞石

桂心

附子

烏頭 各四兩

右四味為末蜜丸如胡豆大以酒服三九日一加

至十九藥耐寒忌熱食近火宜冷飲食

大露宿丸

方見第十七卷肺臟氣極門

公同

露宿者形寒飲冷致病故用礞石之大辛大熱以

治腹中堅癖邪氣兼取附子桂心乾薑壯其雄烈

以破癖冷沉寒能助陽氣內充即使霜行露宿亦

可無虞 又方除去乾薑易入烏頭專禦風毒外

邪不致內犯中氣藥雖峻而功用不凡 又首方

加皂莢桔梗名大露宿丸專主氣極肺傷而此門

亦取用之以有吹噎清涕脈弦腹痛等證故借搜

肺之藥以辟胃腑痺著之邪

治瘡冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五
勞七傷第一令人能食二強盛三益氣四有子
神驗方

大豆三升半

生地十五斤取汁

烏頭一百五十枚

右三味以除日咬咀烏頭以酒一斗半和生地汁
浸烏頭至破日絞去滓內豆藥汁中至除日出暴
之有汁更浸曝之至汁盡藥成初服從二丸起可
至二十豆酒服之有病空腹服無病食後服四時
合並得二月三月為上時藥令人能食益氣盛有
子髮白反黑齒落重生先病熱人不可服

衍義

下冷上眩良由腎虛風氣內陷火不生土不能安
鎮虛陽而致不時運動故取地黃汁和酒浸烏頭
滋血祛風製黑大豆中引入腎經深得峻藥緩攻
之妙

治小腹痼冷百治不瘥方

麩末三升 白朮五兩

乾薑

桂心各三兩 川椒

吳茱萸各二兩

右六味治下篩以米飲服方寸七日二不過五劑
諸冷頓瘥無忌空腹服之

衍義

此以水土虛寒不能健運故用薑桂椒萸以助麩

木之消磨也

治積年冷病方

川椒二兩

香豉一升

右二味搗椒為末和豉更搗三千杵丸如彈丸大食前酒服日再

衍義

川椒治積年冷病香豉散胸中陳氣也

治諸冷極醫所不治方

馬蘭子九升淨治去土空腹服一合日三飲及酒下之服訖須與以食壓之取瘥乃止

衍義

馬蘭性溫善走能治中外寒熱濕痺等病故本經

言主皮膚寒熱胃中熱氣不獨治諸冷極也

赤丸治寒氣厥逆方

茯苓

桂心

各四兩

細辛

一兩

烏頭

附子

各二兩

射罔

如棗大一枚

右六味為末內真珠為色蜜丸如麻子空腹酒服一丸日再夜二不知加至二九以知為度一方用

半夏四兩

衍義

金匱赤丸方止四味妙在烏頭半夏之反激並用

千金乃裁汰半夏改用桂附射罔雖悍烈過於半夏然不若反激之力最勝真珠力能交濟坎離收

攝虛火或云是緣礬煅造平治土藏有溫散之專
功無傷中之叵測

半夏湯 治胸滿有氣心腹中冷方

半夏 一升 桂心 四兩 生薑 八兩

右三味咬咀以水七升煮取二升一服七合日三
服

生薑湯 溫中下氣方

生薑 一斤 甘草 三兩 桂心 四兩

右三味咬咀以水六升煮取一升半一服五合日
三服

衍義半夏湯以薑半開胸中痰滿桂心散腹中冷氣

生薑湯中甘草欵留薑桂之性以盡溫中之力也

甘艸湯 治虛羸憒憒氣欲絕方

甘艸 五味子 生薑 各二兩

人參 一兩 吳茱萸 一升

右五味咬咀以水四升煮茱萸令小沸去滓內藥
煮取一升六合分二服服數劑佳

茱萸消石湯 治久寒不欲飲食數十年澀飲方

吳茱萸 八合 消石 一升 生薑 一斤

右三味以酒一斗水解令得二斗煮藥取四升服

二升病即下去勿更服也初下如泔後如污泥若
如沫滓吐者更可服養如乳婦法

衍義

參薑吳萸溫中散寒乃吳茱萸湯之變方彼用大
棗以行脾津此用甘艸以和胃氣五味子以收津
液也 茱萸消石湯亦吳茱萸湯之變法於中削
去參棗改用消石蕩練冷積但取薑萸溫中下氣
更一君主而主治迥然

大建中湯 治心胸中大寒大痛嘔不能飲食飲
食下咽自知偏從一面下流有聲泱泱然若腹
中寒氣上衝皮起出見有頭足上下而痛其頭

不可觸近方

川椒 二合

乾薑 四兩

人參 二兩

膠飴 一升

右四味咬咀以水四升煮取二升去滓內飴微火
煮令得一升半分三服服湯如一炊頃可飲粥二
升許更服當一日食糜更服之

衍義

虛寒積聚之治此方最力故千金效金匱用之其
方中人參輔椒薑溫散之法人皆得之至於膠飴
為助滿之首列而反用以治痛嘔不能食是專用
助滿之味引領椒薑人參為泄滿之通使方知大

桂湯中用黃芪之法從此化出

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒

也當以溫藥下之方

大黃 三兩 附子 三枚 細辛 二兩

右三味咬咀以水五升煮取二升分再服

衍義少陰病始得之反發熱脈沉用麻黃附子細辛湯

以治太陽少陰之兩感此治脇下偏痛發熱脈緊變表法為下法立大黃附子湯以治寒從下上之瑕積咸賴附子把守真陽不隨汗下亡脫設無發熱外證豈不可變大黃附子甘艸之治乎況治食

已則吐之大黃甘艸湯金匱千金具有成法始知權變之方不在規矩之外也

論曰寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不能飲食弦緊相搏即為寒疝跌陽脈浮而遲浮即為風虛遲即為寒疝凡瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞大烏頭湯 主寒疝繞臍若痛發即自汗出手足

厥寒其脈沉弦者方 仲景名二物烏頭煎

烏頭大者五枚熬黑不切以水三升煎取一升去滓內白蜜二斤煎令水氣盡得二升強人服

七合羸人五合一服未效明日更服每日止一服不可再也

烏頭桂枝湯 治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥不能治方

秋乾烏頭

實中者五枚除去角

白蜜一斤

右二味以蜜煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升許初服二合不知更進三合復不知加至五合其知者如醉狀得吐者為中病也 桂枝湯方見傷寒門中 外臺方以水二升半煮桂取一升和蜜合煎一升許服 寒疝用烏頭恐其烈性迅發故用蜜煎使之留戀

衍義

以緩破結之力 又烏頭煎治寒疝其力專矣設

見手足不仁一身盡痛又為木鬱風生風淫末疾肝風內動之象故以烏頭煎解桂枝湯中使內風仍從內散即有外風亦不出是方之神妙也

論曰凡人患大熱皆須候脈若大大熱者不得一準方用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍大大熱者乃至十倍用之乃可制之爾有人苦熱不已皆由服石所致種種服餌不能制止惟朴硝煎可以定之有金者貴高人所加也

朴硝煎方

朴硝 一斤

芒硝 半斤

石膏

金

各二兩

寒水石

四兩如無石鹽代之

右五味先內二硝於八升湯中攪令消以紙密封一宿取清內銅器中別搗寒水石石膏碎如豆粒以絹袋盛之內汁中以微火煎候其上有漠起以筋投中箸筋如凌雪凝白急下瀉貯盆中待凝取出烈日曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水五合攪和令消頓服之日二熱定即止之

衍義

膏梁金石皆富貴之所常嗜受如持虛每致熱發

毒蘊百治罔效惟朴硝煎可以蕩練臟腑專取石藥之寒以治石藥之毒如水沃火頃刻冰消貴膏人加金以治五金之毒皆同氣相招之意

五石湯

治胃間熱熱病後不除煩悶口中乾渴

寒水石

硝石

赤石脂

栝萸根

龍骨

牡蠣

黃芩

甘草 各五分

知母

石膏

桂心 各三分

大黃 二分

右十二味咬咀以水七升煮取三升分四服日三

夜一諸本只
有四石

義衍此於風引湯中除去滑石之傷津易去石脂以固脫因有煩熱口乾是以除去乾薑之燥烈紫白石英之慄悍并易黃芩知母栝蘆根清熱滋津之味更易四味而功用迥然矣

竹葉湯 治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱

方

竹葉

小麥各一
升

知母

石膏各三
兩

茯苓

黃芩

麥冬各二
兩

人參一兩
半

栝蘆根

半夏

甘艸各一
兩

生薑五兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取三升分三服老少分五服

義衍

竹葉石膏湯本治大病後虛羸煩渴千金乃於本

方中除去粳米之益胃易入小麥以清肝加栝蘆根以佐麥冬茯苓以佐人參黃芩以佐石膏生薑以佐半夏仍用白虎湯中知母以佐竹葉以治胃氣暴虛之煩渴固為合劑設見陰邪上逆之煩渴曷不效既濟湯法少加熟附以導虛熱乎

半夏湯 治胸中客熱心中煩滿氣上大小便難

方

半夏 一升

生薑 八兩

前胡 四兩

茯苓

白朮 各五兩

杏仁

枳實 各三兩

人參

黃芩 各二兩

甘艸 一兩

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服胸中大熱者沉冷服之大小便澀者加大黃二兩一方用梔子仁二兩為十一味

衍義

胸中客熱良由風熱內陷所致故以前胡黃芩杏仁開提於上枳實半夏生薑疎豁於中參朮苓甘

護持正氣不使傷犯津液自然胃氣安和二便如

常矣

承氣湯治氣結胸中熱在胃腕飲食嘔逆渴方

前胡

枳實

桂心

大黃

寒水石

知母

甘艸 各一兩

硝石

栝蘆根

石膏 各二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

衍義

承氣者承制逆上之氣也此方雖假承氣之名實取金匱大黃甘艸湯之製以治胸中客熱加前胡

枳實以下氣知母石膏寒水栝萋以化熱硝石桂
心為伏熱之開導也

治熱氣手足心煩熱如火方

竹葉 一升

枳實

青箱子

白前 各一兩

吳茱萸

黃芩 各半兩

栝萋根

麥冬 各二兩

生薑 六兩

前胡 一作芍藥

半夏 各五兩

右十一味咬咀以水八升煮取二升分三服

衍義

熱邪擾於四末手足心熱如火故用前胡白前下
氣薑半枳實開痰竹葉黃芩化熱栝萋麥冬回津

氣下痰開熱化津回而火自熄青箱吳萸並走厥
陰一為清火之通津一為辟熱之嚮導

地黃煎 治熱方

地黃汁 四升

茯苓

知母

萎蕤 各四兩

栝萋根 五兩

竹瀝 三合一兩

薑汁

白蜜

麥冬汁

鮮骨皮 各二升

石膏 八兩

右十一味咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三
升去滓下竹瀝地黃麥冬汁微火熬四五沸下蜜
薑汁微火煎取六升初服四合日三夜一加至六

七合四月五月作散服之

衍義

腎氣不能上蒸於肺肺胃枯槁不能滋其化源而致煩渴便難故用涼潤諸味潤血生津單取薑之辛以開結滯之氣

治積熱方

枳實

黃芩

大黃

黃連

芒硝

各二兩

右五味為末蜜丸如梧子大空心酒服三十九加至四十九日一服

衍義

積熱而用大黃黃連瀉心湯更加枳實芒硝兼合

承氣但不用厚朴之辛洩氣耳

治膈止熱方

苦參

十兩

元參

五兩

麥冬

三兩

車前子

三兩

右四味為末蜜丸如梧子大一服十五九日二服

衍義

熱在膈上故用麥冬滋肺氣苦參下結氣元參清咽氣車前泄滯氣也

細丸治客熱結塞不流利方

大黃

葶藶

各三兩

香豉

三合

杏仁

巴豆

各五分

千金方衍義卷之六

見

掃葉山房

右五味為末蜜丸如梧子大每日飲服二丸以利為度

衍義

熱結不通而用葶藶大黃滌除結熱熬黑杏仁滌除痰垢但以巴豆之辛烈易去苾硝之苦降乃大陷胸合走馬湯之製參入香豉以緩巴豆之烈并散胸中懊懺之氣也

治骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西即發方

龍膽

川連

栝蘘根

各一兩

苾硝

半兩

梔子

十枚

苦參

大黃

黃芩

芍藥

青葙子

各二兩

右十味為末蜜丸如梧子大飲服二丸日二以知

為度 一方無苦參已下止五味

張文仲為散飲方寸七

衍義

羸瘦骨蒸似乎虛熱而煩悶短氣喘息鼻張審非肺氣之絕即是五臟苑熱故用三黃瀉心苦參瀉腎苾硝瀉脾梔子栝蘘瀉肺龍膽青葙瀉肝即使骨蒸羸瘦亦是火極傷陰殊非陰虛發熱之謂

治骨蒸方

天靈蓋如梳大炙令黃碎以水五升煮取二升

又分三服起死人神方

又方

水服苾硝一方寸七日二服神良

衍義

天靈蓋治傳屍殮殍之神方 苾硝乃救熱存陰

之要藥虛實補瀉主治天淵

治五臟熱及身體熱脈弦急者方

灸第十四椎與臍相當五十壯老小增損之若

虛寒至百日橫三間寸灸之

孫真人千金方衍義卷十六

終

