



掃葉

中式 9
176
34



176
34



孫真人千金方衍義卷二十八

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

脈法 凡十六類

平脈大法第一

論曰夫脈者醫之大業也不深究其道何以爲醫是以古之哲醫寤寐俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與常人混其波瀾則庶事隳壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必當屏棄俗情疑心於此

則和鵲之功因茲可得而致也

經曰診脈之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂故迺可診有過之脈切脈動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰可以此叅互訣生死之分也又曰平脈者皆於平旦先診寸口初重指切骨定畢便漸舉指與皮毛相得於輕重之間隨人強弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五臟相應輕重相薄尋狀論寒暑得失凡人稟形氣有中適有躁靜各各不同氣脈流動亦

各隨其性情故一呼脈再至一吸脈再至呼吸定息之間復一至合爲五至此爲平和中適者也春秋日夜正等無餘分時也其餘日則其呼而脈至多吸而脈至少或吸而脈至多呼而脈至少此則不同如冬夏日夜長短之異也凡氣脈呼吸法晝夜變通做四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻猶晷刻與四時有長短而歲功日數無遺也若人有羸有壯其呼吸雖相壓遏而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜變通做四時

夫診脈當以意先自消息壓取病人呼吸以自同而

後察其脈數計於定息之限五至者爲平人若有盈縮尋狀論病源之所宜也

問曰何謂三部脈荅曰寸關尺也凡人修短不同其形各異有尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是謂尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內有寸陽得寸內九分從寸口入却行六分爲關分從關分又入六分爲尺分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸口從少

口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界如天地人爲三界寸主射上焦頭及皮毛竟手上部關主射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此爲三部法象三才天地人頭腹足爲三元也夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周故五十度而復

會於手太陰太陰者寸口也即五臟六腑之所終始
故法取於寸口人有三百六十脈法三百六十日也

診五臟脈輕重法第二

初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部金秋三月庚辛之氣

如六菽之重與血脈相得者心部火夏三月丙丁之氣

如九菽之重與肌肉相得者脾部土王四季季夏六月戊己之氣

如十二菽之重與筋平者肝部木春三月甲乙之氣

按之至骨舉之來疾者腎部水冬三月壬癸之氣

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也象火浮散

短澀者肺也象金浮澀

腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也如木生濡而

大舉指來實者腎也濡弱如勝水舉重船脾者中州故其脈在

中是陰陽之脈也千金翼云遲緩而長者脾也

指下形狀第三

浮脈舉之有餘按之不足浮於指下

沈脈舉之不足按之有餘重按之乃得

澀脈細而遲往來難且散或一止復來一日浮而短一日短而止

或如

滑脈往來前却流利展轉替替然與數相似一日浮一日沈

九一曰澀
澀如欲脫

洪脈極大在指下一日浮而大

細脈小大於微常有但細耳

微脈極細而軟或欲絕若有若無一日小也一日手下快一日薄一日

欲盡絕

弦脈舉之無力按之如張弓弦狀一日如張弓弦按之不移又曰浮緊

弓為弦也

緊脈數如切繩狀一日如轉索之無常

遲脈呼吸三至去來極遲一日舉之不足按之盡牢一日按之盡牢舉之無有

數脈去來促急一日一息云五至一日數者盡之名

緩脈去來亦遲小駛於遲一日浮大而軟一日陰與陽同等

弱脈極軟而沉細按之欲絕指下一日按之乃得舉之即無

動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥動搖

伏脈極重指著骨乃得一日關上沉不出名曰伏一日手下裁動一日按之不足

舉之無有

芤脈浮大而軟按之中央空兩邊實一日指下無兩傍有

軟脈極軟而浮細一日按之無有舉之有餘一日細小如軟于金翼軟作濡

虛脈遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

實脈大而長微強按之隱指幅幅然一日沉浮皆得

促脈來去數時一止

結脈往來緩時一止復來脈結長生

代脈來數中指不能自還因而復動脈代者死
散脈大而散散者氣實血虛有表無裏

革脈有似沈伏實大而長微弦千金翼以革為牢

弦與緊相類 軟與弱相類 浮與芤相類又曰浮與洪相類

微與澀相類 沈與伏相類 緩與遲相類又曰
軟與遲相類 革與實相類翼作牢與實相類 滑與數相類

五臟脈所屬第四

心部在左手關前寸口亦名人迎 肝部在左手關上

腎部在左手關後尺中 肺部在右手關前寸口亦名
脾部在右手關上 腎部在右手關後尺中

脈法讚云

心肝出左 脾肺出右 腎與命門 俱出尺部

魂魄穀神 皆見寸口 左主司官 右主司府

左大順男 右大順女 關前一分 人命之主

左為人迎 右為氣口 神門決斷 兩在關後

人無二脈 病死不愈 諸經損滅 各隨其部

三陰三陽一云按察陰陽 誰先誰後 陰病治官

陽病治府府外也 奇邪所舍 如何捕取

審而知之 鍼入病愈 脈有三部 陰陽相乘

榮衛氣血 而行人躬 呼吸出入 上下於中

因息遊布 津液流通 隨時動作 倣象形容

春弦秋浮 冬沉夏洪 察色觀脈 大小不同

一時之間 變無經常 尺寸參差 或短或長

上下乘錯 或存或亾 病輒改易 進退低昂

心迷意惑 動作紀綱 願為縷陳 令得分明

日師子之所問 道之根源 脈有三部 尺寸及關

榮衛流行 不失衡銓 腎沉心洪 肺浮肝弦

此自常經 不失銖分 出入升降 漏刻周旋

水下二刻 脈一周身 旋復寸口 虛實見焉

變化相乘 陰陽相干 風則浮虛 寒則緊弦

沉潛水畜 支飲急弦 動弦為痛 數洪執煩

設有不應 知變所緣 三部不同 病各異端

太過可怪 不及亦然 邪不空見 終必有奸

審察表裏 三焦別分 知邪所舍 消息診看

料度腑臟 獨見若神

分別病形狀第五

脈數在腑 脈遲在臟 脈長而弦病在肝 脈經作出於肝

脈小血少病在心 扁鵲云脈大而洪出於心 脈下堅上虛病

在脾胃 脈滑 一作澀 而微浮病在肺 脈沉而堅 扁鵲

云小病在腎 脈滑者多血少氣 脈澀者少血多

氣 脈大者血氣俱多又云脈來大而堅者血氣俱

實 脈小者血氣俱少又云脈來細而微者血氣俱

虛 脈沉細滑疾者熱 脈遲緊為寒 脈經云洪數滑疾為熱澀

遲沉細為寒 脈盛滑緊者病在外熱 脈小實而緊者

病在內冷 脈小弱而澀謂之久病 脈浮滑而疾

謂之新病 脈浮滑其人外熱風走刺有飲難治

脈沉而緊上焦有熱下寒得冷即便下 脈沉而細

下焦有寒小便數時苦絞痛下利重 脈浮緊且滑

直者外熱內冷不得大小便 脈洪大緊急病速進

在外苦頭發熱癰腫 脈細小緊急病速進在中寒

為疝瘕積聚腹中刺痛 脈沉重而直前絕者病血

在腸間 脈沉重而不散者因寒食成癥 脈直前

而中散絕者病消渴 又云病浸淫瘡 脈沉重前不至寸口

徘徊絕者病在肌肉遁尸 脈左轉而沉重者氣微

傷在胸中 脈右轉出不至寸口者內有肉癥 脈

累累如貫珠不前有風寒在大腸伏雷不去 脈累

累如止不至寸口軟者結熱在小腸膜中伏雷不去

脈直前左右彈者病在血脈中胚血也 脈後而

左右彈者病在筋骨中也 脈前大後小頭痛目眩

脈前小後大胸滿短氣 上部有脈下部無脈雖

其人當吐不吐者死 上部無脈下部有脈雖困無所苦 夫脈者血之府也 長則氣治 短則氣病 數則煩心 大則病進 上盛則氣高 下盛則氣脹 代則氣衰 細太素作滑則氣少 澀則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危 大弊弊綽綽其去如弦絕者死 短而急者病在上 長而緩者病在脾 沉而弦急者病在內 浮而洪大者病在外 脈實者病在內 脈虛者病在外 在上為表在下為裏 浮為在表沉為在裏 滑為實為下又為陽氣衰 數為虛為熱 浮為風為虛 動為痛為驚 沉為水

為實

又為鬼症

弱為虛為悸

遲則為寒

澀則少血

緩則為虛

洪則為氣

一作熱

緊則為寒

弦數

為瘧

瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒

微則為虛

代散則死

弦為痛痺

一作浮為風症

偏弦為飲

雙

弦則脇下拘急而痛其人澀澀惡寒

脈大寒熱在

中 脈伏者霍亂 安臥脈盛謂之脫血

凡凶汗

肺中寒飲冷水咳嗽下利胃中虛冷此等其脈並緊

浮而大者為風又為中風頭痛鼻塞

浮而緩者

皮膚不仁風寒入肌肉

滑而浮散者癱瘓風

為鬼疰

澀而緊痺病

浮洪大長者風眩癩疾

大堅疾者癩病 弦而鉤脇下如刀刺狀如蜚尸至

困不死 緊而急者遁尸 洪大者傷寒熱病浮洪

大者傷寒秋吉春成病 浮而滑者宿食 浮滑而

疾者食不消脾不磨 短疾而滑酒病 浮而細滑

傷飲 遲而濇中寒有癥結 駛而緊積聚有擊痛

弦急疝瘕小腹痛又為癖病 疝一作疝 遲而滑者脹

盛而急者脹 弦小者寒澼 沉而弦者懸飲內

痛 弦數有寒飲冬夏難治 緊而滑者吐逆 小

弱而澀胃反 遲而緩者有寒 微而緊者有寒

沉而遲者腹臑有冷病 微弱者有寒少氣 實緊

胃中有寒苦不能食時時利者難治 一作時時 滑

數心下結熱盛 滑疾胃中有熱 緩而滑曰熱中

沉而急病傷水暴發虛熱 浮而絕者氣病 大

而滑者短氣 浮短者其人肺傷諸氣微少不過一

年死法當欬嗽 沉而數中水冬不治自愈 短而

數心痛心煩 弦而緊脇痛臑傷有瘀血 一作有寒血

沉而滑為下重亦為脅痛 脈細而滑按之虛因急

持直者僵仆從高墮下病在內 微浮者秋吉冬成

病 微數雖甚不成病不可勞 浮滑疾緊者以合

百病久易愈 陽邪來見浮洪 陰邪來見沉細

掃葉山房

水穀來見堅實 脈來乍大乍小乍長乍短者為崇
脈來洪大嫋嫋者崇 脈來沉沉澤澤四肢不仁
而重者崇 脈與肌肉相得久持之至者可下之
弦小緊者可下之 緊而數發寒熱必下乃愈 弦
遲者宜溫藥 緊數者可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸沉諸弦諸緊諸澀諸滑若在寸口膈以上病
頭部若在關上胃以下病 腹部若在尺中腎以下病 腰脚部
平寸口脈主對法
手寸口脈滑而遲不沉不浮不長不短為無病左右

同法

寸口太過與不及寸口之脈中手短者曰頭痛中手
長者曰足脛痛中手促上擊者曰肩背痛
寸口脈沉而堅者病在中
寸口脈浮而盛者曰病在外
寸口脈沉而弱者曰寒熱及疝瘕小腹痛 熱一作氣又作中
寸口脈沉而弱髮必墮落
寸口脈沉而緊苦心下有寒時時痛有積邪
寸口脈沉而滑者胸中有水氣面目腫有微熱為風
水

寸口脈沉大而滑沉卽爲血實滑卽爲氣實血氣相搏入臟卽死入腑卽愈

寸口脈沉胸中短氣

寸口脈沉而喘者寒熱

寸口脈浮而滑者頭中痛

寸口脈浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食

寸口脈弦而緊弦卽衛氣不行衛氣不行卽惡寒水流走腸間

寸口脈緊或浮膈上有寒肺下有水氣

脈緊上寸口者中風風頭痛亦如之

翼云亦爲傷寒頭痛

脈弦上寸口者宿食浮者頭痛

寸口脈弦大婦人半產漏下男子亡血失精

寸口脈微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼煩當煩不煩熱極汗出

寸口脈微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出

寸口脈動而弱動卽爲驚弱卽爲悸

寸口脈緩而遲緩卽爲虛遲卽爲寒虛寒相搏則欲溫食食冷卽咽痛

寸口脈遲而緩遲則為寒緩即為氣寒氣相搏則絞而痛

寸口脈遲而澀遲即為寒澀為少血

脈來過寸入魚際者遺尿脈出魚際逆氣喘息

寸口脈實者心勞

寸口脈漉漉如羹上肥陽氣微

連連如蜘蛛絲陰氣衰

兩手前部陽絕者苦心下寒腰膝中熱

寸口脈偏絕則臂僻不遂兩手俱絕者不可治

寸口脈來蹇大暫小者陰絡也苦陰風痺應時自發

身洗洗也

寸口脈來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汗出惡寒

下部不仁

寸口脈浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯鍼風

池風府向火炙身摩治風膏覆令汗出

寸口脈繁苦頭痛是傷寒宜服麻黃湯發汗鍼眉衝

顛顛摩傷寒膏

寸口脈微苦寒為衄宜服五味子湯麻黃茱萸膏令

汗出

寸口脈數為吐以有熱在胃脘熏胸中宜服藥吐之

千金方卷之六
三
及鍼胃脘服除熱湯

若傷寒七八日至十日熱在中間煩滿而渴者宜服知母湯

寸口脈洪大胸脇滿宜服生薑湯白薇丸亦可紫苑湯下之鍼上皖期門章門

寸口脈緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之佳灸諸治風穴

寸口脈滑陽實胸中壅滿吐逆宜服前胡湯鍼太陽巨闕瀉之

寸口脈弦心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂

丸鍼期門瀉之

寸口脈弱陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯內補散將適飲食消息勿極勞鍼胃管補之

寸口脈澀是胃氣不足宜服乾地黄湯自養調和飲食鍼胃管一作三里補之

寸口脈芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯灸臍中

寸口脈伏胸中逆氣噎塞是諸氣上衝胸中宜服前胡湯大三建丸鍼巨闕瀉之

寸口脈沉胸中引脇痛胸中有水氣宜服澤漆湯鍼

巨闕瀉之

寸口脈軟弱自汗出是虛損病宜服乾地黄湯薯蕷丸內補散牡蠣散并粉身鉞大衝補之

寸口脈遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之

寸口脈實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛則生寒在脾胃食不消化熱宜服竹葉湯葛根湯寒宜服茱萸丸生薑湯

寸口脈細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯及灸中府

平關脈主對法

關上脈浮而大風在胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔

關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘

關上脈滑而大小不均必吐逆是為病方欲來不出一二日復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

關上脈緊而滑者蚘動

關上脈弦而長翼作大有痛如刀刺之狀在臍左右上

下臍脈經云有積在左右上下

關上脈澀而堅大而實按之不減有力為中焦實有
伏結在脾肺氣塞實熱在胃中

關上脈襜襜大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕
結聚欲熱飲食

關上脈時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱
羸劣不欲飲食如瘧狀

關上脈浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃丸茯苓
湯生薑前胡湯鉞胃管先瀉後補之

關上脈緊心下苦滿痛為實宜服茱萸當歸湯加大
黃二兩佳脈經云又大黃湯兩治之佳鉞巨闕下脘瀉之

關上脈微為胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯

附子丸鉞巨闕補之宜服生薑湯

關上脈數胃中有客熱宜服知母湯一作除熱湯鉞

巨闕上脘瀉之鉞巨闕瀉之

關上脈緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補脾
湯及鉞章門補之

關上脈滑胃中有熱滑為熱實氣滿故不欲食食即
吐逆宜服朴硝麻黃湯平胃丸一作紫苑湯人鉞胃

脘瀉之

關上脈弦胃中有冷心下厥逆脈弦胃氣虛宜服茱
萸湯

黃湯溫調飲食鍼胃脘補之

關上脈弱胃氣虛胃中有客熱脈弱為虛熱作病且說云有熱不可大攻之熱去即寒起宜服竹葉湯及鍼胃脘補之

關上脈虛細腹滿宜服生薑湯茱萸蜀椒湯白薇丸鍼灸三脘

關上脈澀血氣逆冷脈澀為血虛宜服乾地黃湯四補散鍼足太衝上補之

關上脈芤大便去血宜服生地黃并生竹皮湯灸膈脘若重下去血鍼關元甚者照龍骨丸關元一作巨關

關上脈伏有水氣澹泄宜服溫脾丸鍼關元利小便止澹泄便止

關上脈洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸鍼胃脘先瀉後補之

關上脈沉心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸茯苓丸附子湯鍼胃脘補之

關上脈軟苦虛冷脾虛氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎丸鍼胃脘補之

關上脈遲胃中寒宜服桂枝丸茱萸湯鍼胃脘補之關上脈實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭丸鍼胃脘

補之

關上脈牢脾胃氣塞盛熱即腹滿嚮嚮宜服紫苑丸
瀉脾丸鍼灸胃脘瀉之

平尺脈主對法

尺脈浮者客陽在下焦

尺脈弱者下焦冷無陽氣上熱衝頭面

尺脈弱寸強胃絡脈傷

尺脈偏滑疾面赤如醉外熱則病

尺脈細微澹泄冷利素問云尺寒脈細謂之後泄

尺脈虛小足脛寒痺脚疼

尺脈澀下血不利多汗素問云尺澀脈滑謂之多汗

尺脈沉而滑者寸白蟲

尺脈細而急者筋攣痺不能行

尺脈大者熱在臍中小便赤痛

尺脈粗而熱者謂之熱中腰膝疼小便赤熱

尺脈按之不絕婦人血閉與關相應和滑者男子氣

血實婦人即為妊娠

尺脈來而斷絕者男子小腹有滯氣婦人月水不利

尺脈軟弱內慍熱手足逆冷汗出

尺脈俱沉關上無有者苦心下喘

尺脈俱沉關上若有苦寒心下痛陰中冷脚痺

尺脈微少心力不欲言血氣不足其人脚弱短氣

尺脈俱數手足頭面有熱俱遲有寒手足頭面有冷

風

尺脈浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散鍼橫骨

關元瀉之

尺脈緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞鍼關元補之

尺脈微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯鍼

氣海

尺脈數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚

散鍼橫骨瀉之

尺脈緩脚弱下腫

一本無此四字

小便難有餘瀝宜服滑石

湯瞿麥散鍼橫骨瀉之

尺脈滑血氣實經脈不利宜服朴硝煎大黃湯下去

經血鍼關元瀉之

尺脈弦小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸

湯鍼氣海瀉之

尺脈弱氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃茯苓湯

鍼關元補之

尺脈澀足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯鍼足太

衝補之

尺脈芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸丹

田關元

尺脈伏小腹痛癥疝水穀不化宜服大平胃丸桔梗

丸鍼關元補之

尺脈沉腰背痛宜服腎氣丸鍼京門補之

尺脈軟脚不收風痺一本無此五字小便難宜服瞿麥湯白

魚散鍼關元瀉之

尺脈牢腹滿陰中急宜服葶藶菜菔丸鍼丹田關元

中極

尺脈遲下焦有寒宜服桂枝丸鍼氣海關元瀉之

尺脈實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩

利其大便鍼關元補之

五臟積聚第七

人病有積有聚有穀氣穀一作繫夫積者臟病終不移也

聚者腑病發作有時展轉痛移為可治也穀氣者脇

下牽痛按之則愈愈而復發夫病已愈不得復發發

即為穀氣也 諸積大法脈來細軟附骨者為積也

寸口結者積在胸中 微出寸口積在喉中 關

上結者積在臍傍 微下關者積在小腹 尺中結

積在氣衝 上關上積在心下 脈出在左積在左
脈出在右積在右 脈兩出積在中央各以其部
處之 寸口沉而橫者脇下及腹中有橫積痛 脈
弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕 脈弦緊
而細微者癥也 夫寒痺癥瘕積聚之脈狀皆弦緊
若在心下卽寸弦緊 在胃脘卽關弦緊 在臍
下卽尺弦緊 一云關脈長弦有積在臍左右上下
又脈癥法 左手脈橫癥在左 右手脈橫癥在右
脈頭大在上頭小在下
又一法 橫脈見左積在右 見右積在左 偏得

洪實而滑亦爲積 弦緊亦爲積爲寒痺爲疝痛
內有積不見脈難治 見一脈相應爲易治 諸不
相應爲不合治也 左手脈大右手脈小上病在左
脇下病在左足 右手脈大左手脈小上病在右脇
下病在右足 脈弦而伏者腹中有癥不可轉也必
死不治 脈來細沉而直者身有癰腫腹中有伏梁
脈來沉而虛者泄注也 脈來小沉實者胃中有
積聚不可下食卽吐

陰陽表裏虛實第八

弦爲少陽 緩爲陽明 洪爲太陽三陽也 微爲

少陰 遲爲厥陰 沉爲太陰三陰也

脈有一陰一陽 一陰二陽 一陰三陽 有一陽

一陰 一陽二陰 一陽三陰如此言之寸口有六

脈俱動耶然經言如此者非有六脈俱動也謂浮沉

長短滑澀也 凡脈浮沉長者陽也沉澀短者陰也

所以言一陰一陽者謂脈來沉而滑也一陰二陽者

脈來沉滑而長也一陰三陽者謂脈來浮滑而長時

一沉也所以言一陽一陰者謂脈來浮而澀也一陽

二陰者謂脈來長而沉澀也一陽三陰者謂脈來沉

澀而短時一浮也各以其經所在言病之逆順也

脈來陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沉之

實大故云陰盛陽虛 沉之損小浮之實大故曰陽

盛陰虛是謂陰陽虛實之意也 凡脈浮大數動長

滑陽也沉澀弦弱短微陰也陽病見陰脈者逆也主

死陰病見陽脈者順也主生 關前爲陽關後爲陰

陽數卽吐陰微卽下陽弦則頭痛陰弦則腹痛依陰

陽察病也 又尺脈爲陰陰脈常沉而遲寸關爲陽

陽脈但浮而速 尺脈上不至關爲陰絕寸脈下不

至關爲陽絕陰絕而陽微死不治 呼爲表屬腑吸

爲裏屬臟 陽微不能呼陰微不能吸 呼吸不足

胸中短氣

弱反在關濡反在巔微反在上澀反在下微即陽氣

不足煩熱汗出澀即無血厥而且寒諸腑脈為陽

主熱諸臟脈為陰主寒陽微則汗陰浮自下脈經作陰微

陽數口生瘡陰數加微必惡寒煩擾而不得眠

陽衄吐血脈經作陽數則吐血陰衄下血脈經作陰澀則下血無陽則厥

無陰則嘔

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱

頭痛腹中熱益淵

寸口脈沉細者名曰陽中之陰病苦悲傷衣樂惡

人聲少氣時汗出陰氣不通不通一作併臂不能舉巢氏病源

作瞬偏不舉

尺脈沉細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久

立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不

能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脈牢而長關上無有此為陰干陽其人苦兩脛重

小腹引腰痛

寸口壯大尺中無有此為陽干陰其人苦腰背痛陰

中傷足脛寒

人有三虛三實者何謂也然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者脈來濡者虛牢者實也病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實也診之虛實者癢者為虛痛者為實外痛內快為外實內痛外快為內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂重實者大熱病氣熱脈滿是謂重實也脈盛皮熱腹脹前後不通惋脅為五實脈細皮寒氣少泄利注前後飲食不入為五虛也

何時得病第九

何以知人露臥得病陽中有陰也 何以知人夏月得病諸陽入陰也 何以知人春得病無肝脈也 無心脈夏得病 無肺脈秋得病 無腎脈冬得病 無脾脈四季之月得病

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死
病人循衣縫謔語者不可治
病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死
病人妄語錯亂及不能語者不治熱病見此可治

病人陰陽俱絕失音不能言三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如艸滋死

病人面黃目赤者不死赤如衄血死

病人面黃目白者不死白如枯骨死

病人面黃目黑者不死黑如炔者死

病人面目俱等者不死

病人面黑目青者不死

病人面青目白者死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日死是謂亂經

飲酒當風邪入胃經膽氣妄洩目則爲青雖有天救不可復生

病人面赤目白者十日死

憂悲思慮心氣內索面色反好急求棺槨十日死

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因畱積

病人面青目黃者五日死

病人著牀心痛短氣脾竭內傷百日復愈能起徬徨因坐於地其立倚牀能治此者可謂神良

病入面無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入於口者必死

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死

在五日中

病人及不病人黑色若白色起入目及口鼻者死在

三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者

死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑唇青者死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉側者死

病人目回回直視肩息者一日死

病人陰結陽絕目精脫恍惚者死

病人陰陽絕竭目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死

病人口張者三日死

病人唇青人中反者三日死

病人唇反人中滿者死

病人唇口忽乾者不治

病人唇腫齒焦者死

病人齒忽變黑者十三日死

病人舌卷卵縮者必死

病人汗出不流舌卷黑者死

病人髮直者十五日死

病人髮如乾麻善怒者死

病人髮與眉衝起者死

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不治

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人榮衛竭絕面浮腫者死

病人卒腫其面蒼黑者死

病人手掌腫無文者死

病人臍腫反出者死

病人陰囊莖俱腫者死

病人脈絕口張足腫者五日死

病人足跌腫嘔吐頭重者死

病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死
病人臥遺尿不覺者死

病人尸臭者不可治

肝病皮白肺之日庚辛死

心病目黑腎之日壬癸死

脾病脣青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫脣黃脾之日戊己死

青欲如蒼璧之澤不欲如藍

赤欲如帛裏朱不欲如赭

白欲如鵝羽不欲如鹽

黑欲如重漆不欲如炭

黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土

診五臟六腑氣絕證候第十一

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視不

見人汗一作泣出如水不止一日二日死

病人膽絕七日死何以知之眉爲之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休

一日八日死

病人心絕一日死何以知之肩息回視立死

一日目
亭亭二
掃葉山房

死日

病人腸小腸絕六日死何以知之髮直如乾蔴不得

屈伸自汗不止

病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臙脹

泄利不覺出無時度一日五日死

病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆

一日脾腸平九日死

病人肉絕六日死何以知之耳乾舌腫溺血大便赤

泄一日足腫九日死

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還日

鼻口虛張短氣

病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑目

中黃色腰中欲折自汗出如流水一日人中平七日死

病人骨絕齒黃落十日死

諸浮脈無根者皆死已上五臟六腑為根也

診四時相反脈第十二

春三月木旺肝脈治當先至心脈次之肺脈次之腎

脈次之此為王相順脈也 到六月土王脾脈當先

至而反不至反得腎脈此為腎反脾也七十日死何

爲腎反脾夏火旺心脈當先至肺脈次之而反得腎脈是謂腎反脾期五月六月忌丙丁 脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脈當先至而反不至脾脈先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙 腎反肝三歲死何爲腎反肝春肝脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反肝期七月八月忌庚辛 腎反心二歲死何爲腎反心夏心脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反心期六月忌戊己 此中不論肺金之氣疎略未論指南又推五行亦頗顛倒待求別錄上 凡療病察其形貌神氣色澤脈之盛衰病之新故乃

可治之 形氣相得色澤以浮脈從四時此爲易治形氣相失色天不澤脈實堅甚脈逆四時此爲難治 逆四時者春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其至皆懸絕澀者曰逆 春夏沉澀秋冬浮大病熱脈靜泄痢脈大脫血脈實病在中脈堅實病在外脈不實名逆四時皆難療也 凡四時脈皆以胃氣爲本雖有四時王相之脈無胃氣者難瘥也何爲胃氣脈來弱而滑者是也命曰易治 診脈動止投數疎數死期年月第十三 脈一動一止二日死一經云一日死

脈二動一止三日死

脈三動一止四日死或五日死

脈四動一止六日死

脈五動一止七日死或五日死

脈六動一止八日死

脈七動一止九日死

脈八動一止十日死

脈九動一止九日死又云十一日死一經云十三日死或立春死

脈十動一止立春死一經云立夏死

清明死遠不出穀雨死矣

脈來五動而一止者五臟無氣却後五日而死

脈一來而久住者宿病在心主中治

脈二來而久住者病在肝枝主中治

脈三來而久住者病在脾下中治

脈四來而久住者病在腎間中治

脈五來而久住者病在肺枝中治

五脈病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治鍼不得而及盛人可治氣全故也

扁鵲診諸反逆死脈要訣第十四

扁鵲曰夫相死脈之氣如羣鳥之聚一馬之馭系水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛同候交射不可知也

脈病人不病脈來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絕而止時復起

而不相聯續也雀啄者脈來數而疾絕止復頻來也又經言得病七八日脈如

屋漏雀啄者死脈彈人手如黍米也脈來如彈石去如解索者

死彈石者辟辟急也解索者動數而隨散亂無復次緒也

脈困病人脈如蝦之遊如魚之翔者死蝦遊者冉冉而伏尋復退

沒不辨所在久乃復起起輒遲而沒去速也魚翔者似魚不行而但掉尾動頭身搖而久住者是也

脈如懸薄卷索者死脈如轉豆者死脈如偃刀者死

脈十一動一止立夏死一經云夏至死又云立秋死

脈十二動十三動一止立秋死一經云立冬死

脈十四動十五動一止立冬死一經云立夏死

脈二十動一止一歲死或立秋死

脈二十一動一止二歲死

脈廿五動一止三歲死一經云一歲死又云立冬死

脈三十動一止二歲死或三歲死

脈三十五動一止三歲死

脈四十動一止四歲死

脈五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死

五行氣畢陰陽數同榮衛出入經脈通流晝夜百刻五德相生脈來五十投而不止者五臟皆受氣即無病也

脈來四十投而一止者一臟無氣却後四歲春艸生而死

脈來三十投而一止者二臟無氣却後三歲麥熟時而死

脈來二十投而一止者三臟無氣却後二歲桑椹赤而死

脈來十投而一止者四臟無氣歲中死得節不動出脈涌涌不去者死

脈忽去忽來暫止復來者死脈中侈者死脈勿絕者死上下分散也

脈有表無裏者死經名曰結去即死何為結脈曰指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也

脈五來不復增減者死經名曰代何謂代脈五來一止也脈七來是人坐一息半時不復增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年月不已其死生存亡可切脈而知之耶設病者閉目不欲見人

脈當得肝脈弦急而長若反得肺脈浮短而澀者死
病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沉
滑而微者死

病吐血衄衄者脈當得沉細而反得浮大牢者死
病若譫言妄語身當有熱脈當洪大而反得手足四
逆脈反沉細微者死

病大腹而泄脈當微細而澀反得緊大而滑者死
經言形脈與病相反者死柰何然病若頭痛目痛脈
反短澀者死

病若腹痛脈反浮大而長者死

病腹滿而喘脈反沉而滑利者死

病四肢厥逆脈反浮大而短者死

病耳聾脈反浮大而澀者死

翼云脈大者生
沉細遲者難治

病目眈眈脈反大而緩者死

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有
病而下痛此爲逆逆者死不可治

脈來微細而絕者人病當死

脈來沉而絕濡浮而不止推手者半月死

一作
半日

人病脈不病者生

脈病人不病者死

人病尸厥呼之不應脈絕者死
脈當大反小者死

肥人脈細小如絲欲絕者死

羸人脈躁者死

人身澀而脈來滑者

人身滑而脈來澀者死

人身小而脈來大者死

人身大而脈來小者死

人身短而脈來長者死

人身長而脈來短者死

尺脈上應寸口大遲者半日死
脈經云尺脈不應寸時如馳半日死
診五臟六腑十二經脈皆有相反有一反逆即為死候也

診百病死生要訣第十五

凡診脈當視其人大小短長及性氣緩急脈之遲速大小長短皆如其人形性者吉反之者凶

診傷寒熱盛脈浮大者生沉小者死

傷寒已得汗脈沉小者生浮大者死

溫病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不治

溫病時行大熱其脈細小者死

脈經云時行作穰穰

溫病下利腹中痛甚者死不治

溫病汗不出出不至足者死

厥逆汗出脈堅強急者生虛緩者死

熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脈直而絕

者八日死

四五日頭痛腹痛而吐脈來細強十二日死

八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脈來

牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死

熱病七八日脈不軟一作喘不散一作數者當瘖瘖後三

日汗不出者死

熱病七八日其脈微細小便不利加暴口燥脈代舌

焦枯黑者死

熱病未得汗脈盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥

熱病已得汗脈靜安者生脈躁者難治

熱病脈躁盛而不得汗者此陽氣之極也十死不治

熱病已得汗脈常躁盛此陰氣之極也亦死太素作陽極

熱病已得汗常大熱不去者亦死大一作專

熱病已得汗熱未去脈微躁者慎不得刺治也

熱病發熱甚者其脈陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下

利

診人被風不仁痿廢其脈虛者生巢氏病源云虛數者生 堅急疾者死

診癰病虛則可治實則死又云脈實堅者生脈沉細小者死

癰病脈搏大滑者久久自己其脈沉小急實不可治小堅急亦不可療

診頭痛目痛久視一作卒視無所見者死

診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死又實強者生沉者死

其脈大腹大脹四肢逆冷其人脈形長者死

腹脹滿便血脈大時絕及下血脈小疾者死

心腹痛痛不得息脈細遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脈沉則生浮則死

腸澼下膿血脈懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脈不懸絕滑大者生弦澀者死以藏期之

腸澼下膿血脈沉小流連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣脈小細安靜者生脈浮大緊者死

洞泄食不化下膿血脈微小者生緊急者死

泄注脈緩時小結者生浮大數者死

蠱蝕陰疰其脈虛小者生緊急者死

欬嗽脈沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽羸瘦脈形堅大者死

欬脫形發熱脈小堅急者死

肌瘦下脫形熱不去者死

欬而嘔腹脹且泄脈弦急欲絕者死

吐血衄血脈滑小弱者生實大者死

汗出若衄脈小滑者生大躁者死

唾血脈緊強者死滑者生

吐血而欬上氣其脈數有熱不得臥者死

傷寒家咳而上氣脈數散者死謂其人形損故也

上氣喘息低昂脈滑手足溫者生脈澀四肢寒者死

上氣面浮腫肩息其脈大不可治加利必死一作甚

上氣注液其脈虛寧寧伏匿者生堅強者死

寒氣上攻脈實而順滑則生實而逆澀則死太素云寒氣暴

上脈滿實何如曰實而滑則生實而逆則死其形盡滿何如曰舉形盡滿者脈急大堅尺滿而不應如是者順則生逆則死何為順則生逆則死曰所謂順者手足溫也所謂逆者手足寒也

消渴脈數大者生細小浮短者死

消痺脈實大病久可治弦小堅急病久不可治

消渴脈沉小者生實堅大者死

水病脈洪大者可治微細者不可治

水病脹閉其脈浮大軟者生沉細虛小者死

水病腹大如鼓脈實者生虛者死

卒中惡吐血數升脈浮大疾快者生沉細數者死

卒中惡腹大四肢滿脈大而緩者生浮而緊者死緊

細而微者亦生

病瘡腰脊強急瘰癧者皆不可治

寒熱瘰癧其脈代絕者死

金瘡血出太多其脈虛細者生數實大者死

金瘡出血脈沉小者生浮大者死

斫瘡出血一二石脈來大者二十日死

斫刺俱有病多少血出不白止斷者脈止脈來大者

七日死

從高頓仆內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死

人為百藥所中傷脈洪大而速脈經作遲者生微細者死

人病甚而脈不調者難瘥

人病甚而脈洪者易瘥

人陰陽俱結者見其上齒如熟小豆其脈躁者死

一結

竭作

人內外俱虛身體冷汗出微嘔煩擾手足厥逆體不得安靜者死

脈實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死

老人脈微陽羸陰强者生脈焱大加息者死

陰弱陽強脈至而代期月而死

尺脈澀而堅為血實氣虛其病腹痛逆滿氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕得病以冬時黍擦赤而死

尺脈細而微者血氣俱不足細而有力者是穀氣不足病交節輒動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脈偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至

尺三部之位處處動搖各異不同其人病在仲夏得

之此脈桃花落而死

花一作葉

右手寸口脈偏沉伏乍小乍大朝來浮大暮夜沉伏浮大即太過上出魚際沉伏即下不至關中往來無

常時時復來者榆葉

一作葉

落而死

右手尺部脈三十動一止有頃更還二十動一止乍動乍疎不與息數相應其人雖食穀猶不愈繫艸生

而死

左手尺部脈四十動而一止止而復來來逆如循直

木如循張弓弦絀絀然如兩人其引一索者至立春

而死脈經作立冬死

診三部脈虛實訣死生第十六

凡三部脈大都欲等只如小人細人婦人脈小軟小

兒四五歲者脈呼吸八至細數吉千金翼云人大而脈細人細而脈大

人樂而脈實人苦而脈虛性急而脈緩性緩而脈躁人壯而脈細人羸而脈大此皆為逆逆則難治反此為順順則易治凡婦人脈欲常濡弱於丈夫小兒四五歲者脈自快疾呼吸八至也

三部脈或至或不至冷氣在胃中故令脈不通

三部脈虛其人長病得之死虛而澀長病亦死虛而

滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死

三部脈實而長長病得之死實而滑長病得之生卒

病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病

可治

三部脈強非稱其人病便死

三部脈羸非稱其人病得之死

三部脈粗長病得之死卒病得之生

三部脈細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦

生

三部脈微而伏長病得之死

三部脈軟長病得之不治自愈治之反死卒病得之

生

三部脈浮而結長病得之死

三部脈芤長病得之生

三部脈弦而數長病得之生卒病得之死

三部脈革長病得之生卒病得之死

三部脈堅而數如銀釵股蠱毒必死數而軟蠱毒病

得之生

三部脈漈漈如羹上肥長病得之死卒病得之生

三部脈連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

三部脈如霹靂長病得之死

三部脈如角弓長病得之死

三部脈累累如貫珠長病得之死

三部脈如水淹然流長病不治自愈治之反死

三部脈如屋漏長病十四日死脈經云十日死

三部脈如雀啄長病七日死

三部脈如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中

得夜半死

三部脈急切腹間病又婉轉腹痛鍼上下瘥

