



傷寒百證  
一

武  
179  
1

七



武  
卷 179  
卷 1

張仲景先生傷

喬木山房藏板

寒百證



張仲景傷寒百證敘

余少好岐黃術得張氏傷寒百證之書  
不覺喟然嘆曰至哉其言之也夫人身  
一小天地治天者必筭纏度察分秒而  
後知晦蝕之期治地者必計崇卑度  
源委而後識旱潦之歸夫傷寒為生





死之關亦必參四時究六脉而後知  
受病之端苟執一忘百則六經傳變  
七日剝復與三陰三陽之殊感其何  
以辯此張氏之書誠足當洛下閔宗  
伯子也予故再梓以廣其傳云

太醫院李存濟謹題

重鐫註解仲景傷寒百證歌發微論目錄

一卷

論傷寒七十二證候生死訣法

論桂枝湯用赤白芍藥不同

論傷寒慎用九子藥

論桂枝麻黃青龍等湯用藥三證

論兩感傷寒

論傷寒以真氣為主

論治傷寒須依次第



論緩遲沉三脉

二卷

○傷寒脉證總論

第一證

○傷寒病證總類

第二證

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

白虎湯

竹葉石羔湯

四逆湯

理中湯丸

大小承氣湯

大小瀉心湯

大小陷胃湯丸

茵陳湯

藜皮湯

五苓散

小柴胡湯

○表證

第三證

○小柴胡加桂枝湯

麻黃湯

○裏證

第四證

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

承氣湯

脾約丸

蜜導煎

○表裏寒熱

第五證



桂枝湯

小柴胡加桂湯

白虎加人參湯

桂麻各半湯

○表裏虛實 第六證

四逆湯

理中湯

柴胡湯

承氣湯

○急救表裏 第七證

桂枝湯

四逆湯

○無表裏證 第八證

大小柴胡湯

大小承氣湯

○表裏水 第九證

小青龍湯

十棗湯

○表裏兩證俱見 第十證

○五苓散

○三陰三陽傳入 第十一證

○陰陽兩感 第十二證

○陽證陽毒 第十三證

升麻枝子湯

○陰證陰毒 第十四證



關元灸法

金液丹

來麩丹

○太陽陽明合病

第十五證

葛根湯

葛根加半夏湯

麻黃湯

○太陽少陽合病

第十六證

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

○三陽合病 第十七證

白虎湯

○太陽少陽併病

第十八證

刺肺俞肝俞期門大椎

○陰證似陽

第十九證

○陽證似陰

第二十證

白虎湯

承氣湯

○陰盛隔陽

第二十一證

霹靂散

火燄丹

○陰陽易

第二十二證

燒裨散

豶鼠糞湯



橘皮湯

○傷寒 第二十三證

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

桂枝二越婢一湯

建中湯

小柴胡湯

○中風 第二十四證

桂枝湯

敗毒散

獨活散

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

○傷寒見風中風見寒

第二十五證

大青龍湯

桂枝麻黃各半湯

○熱病中暍

第二十六證

五苓散

白虎湯

橘皮湯

○五種溫 第二十七證

升麻解肌湯

小柴胡湯

竹葉湯

白虎加桂湯

黃芪防已湯

玄參升麻湯



傷寒百證 目錄  
○三種濕 第二十八證

防已黃芪湯 木附湯

瓜蒂搐鼻法

○兩種瘧 第二十九證

葛根湯 桂枝湯

續命湯 承氣湯

○四證似傷寒 第三十證

竹葉湯 麥門冬湯

○可汗不可汗 第三十一證

桂枝湯 麻黃湯

○葛根湯 小青龍湯

麻黃附子甘草湯 小柴胡湯

○可下不可下 第三十二證

承氣湯 茵陳蒿湯

大承氣湯 大柴胡湯

○大小陷胃湯丸 抵當湯丸

瀉心湯 密導煎法

○可吐不可吐 第三十三證



○可火不可火 第三十四證

外迎燒蒸布葉法 禁忌法

○可水不可水 第三十五證

少水和胃汁焦法 五苓散

猪苓湯 小青龍湯

可灸不可灸 第三十六證

三陰真寒證灸法 禁忌法

○可針不可針 第三十七證

刺法 桂枝湯

禁忌法

○傷寒可溫 第三十八證

四逆湯 理中湯

○發熱 第三十九證

大柴胡湯 小柴胡湯

柴胡解肌湯 麻黃細辛附子湯

四逆湯

○潮熱 第四十證

小柴胡湯

小承氣湯



太陽胃湯

三卷

○往來寒熱

第四十一證

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

○汗之而熱不退

第四十二證

萎蕤湯

竹葉湯

○下之而仍發熱

第四十三證

小柴胡湯

枳實梔子湯

○惡寒

第四十四證

桂枝湯

麻黃湯

○大青龍湯

四逆湯

理中湯

小柴胡湯加桂

附子瀉心湯

○背惡寒

第四十五證

○炙甘草附子湯

白虎湯

附子湯

○厥證

第四十六證



○細辛甘草湯

茯苓甘草湯

瓜蒂散

○結胃 第四十七證

枳實理中丸

大陷胃湯

小陷胃湯

三物散

白散

○痞 第四十八證

大黃黃連瀉心湯

五苓散

桔梗枳實湯

半夏瀉心湯

黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

○發黃 第四十九證

茵陳蒿湯

五苓散

抵當湯

白虎湯

○發強 第五十證

大承氣湯

○桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

○發痲 第五十一證



升麻湯

玄參升麻湯

○發喘

第五十二證

麻黃湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏子甘草石膏湯

小承氣湯

小青龍湯

返陰丹

○發渴

第五十三證

五苓散

白虎湯

白虎加人參湯

猪苓湯

黑奴丸

酒蒸黃連丸

○吐血

第五十四證

犀角地黄湯

抵當湯

陽毒升麻湯

○衄血

第五十五證

麻黃湯

桂枝湯

犀角地黄湯

茅花湯

○吃噫

第五十六證

橘皮乾薑湯

退陰散

○多法

小柴胡湯



傷寒百病

○譫語 第五十七證

承氣湯

○煩躁 第五十八證

承氣湯

白虎湯

○懊憹 第五十九證

梔子湯

大陷胃湯

○怫鬱 第六十證

承氣湯

○驚惕 第六十一證

柴胡龍骨牡礪湯

○心悸 第六十二證

小柴胡湯

小建中湯

真武湯

○胃悶 第六十三證

刺法

桂枝湯

竹葉石羔湯

炙甘草湯

桂枝甘草湯

炙甘草湯



○乾嘔 第六十四證

小柴胡湯 黃連湯

茯苓甘草湯 小青龍湯

五苓散 竹葉湯

梔子豉湯 真武湯加減

○吐逆 第六十五證

竹茹湯 理中丸

竹葉湯 橘皮湯

○霍亂 第六十六證

理中丸 五苓散

四逆湯 香薷散

○頭疼 第六十七證

麻黃湯 小柴胡湯

○脇痛 第六十八證

十棗湯 小柴胡湯

○腹痛 第六十九證

小建中湯 四逆散

通脈四逆湯 真武湯



傷寒百證 目錄  
桂枝加芍藥湯  
桂枝加大黃湯

黃連湯

○咽痛 第七十證

烏扇膏湯

○咳嗽 第七十一證

小青龍湯

小柴胡湯

猪苓湯

四逆湯

真武湯

○遺尿 第七十二證

白虎湯

○腹滿 第七十三證

小柴胡湯

小承氣湯

梔子厚朴湯

厚朴五物湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

○蛇厥 第七十四證

烏梅丸

理中丸

○自汗 第七十五證

桂枝湯

桂枝加附子人參湯



傷寒百證  
目錄

四逆湯

○頭汗 第七十六證

小柴胡湯

梔子湯

○欲得汗 第七十七證

○舌上胎 第七十八證

梔子湯

小柴胡湯

○下膿血 第七十九證

桃花湯

刺法

○晝夜偏劇 第八十證

乾薑附子湯

○循衣摸空 第八十一證

大承氣湯

○筋惕肉瞤 第八十二證

真武湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

○口燥咽乾 第八十三證

白虎加人參湯

小柴胡湯

承氣湯

甘草桔梗湯



傷寒百證

○傷寒似瘧 第八十四證

桂麻各半湯

桂枝湯

○邪中二焦 第八十五證

○多眠 第八十六證

治豎桃仁湯

雄黃銳散

小柴胡湯

萎蕤湯

黃連阿膠湯

苦參瀉心湯

○不得眠 第八十七證

雄黃散

○百合 第九十三證

百合地黄湯

○辯傷寒疫氣不同 第九十四證

○婦人傷寒 第九十五證

柴胡四物湯

○婦人熱入血室 第九十六證

小柴胡湯

○傷寒差後病 第九十七證

傷寒百證



理中湯

枳實梔子湯

小柴胡湯

牡礪散

○傷寒五臟死絕

第九十八證

○傷寒死脉

第九十九證

○傷寒死候

第一百證

四卷

論表裏虛實

論桂枝肉桂

論滑脉

重鐫註解仲景傷寒百證歌發微論卷之一

白沙 許叔微 知可述

○論傷寒七十二證候

○循衣摸床

仲景云傷寒吐下後不解不大便五六日至十餘日發潮熱不識人循衣妄撮微喘直視脉弦者生瀋者死

華陀云病人兩手循衣縫謔語者不可治

仲景云小便利者可治

○瞪目直視

○兩手撮空

仲景云直視搖頭此為心絕又云狂言及目直視腎絕也仲景云吐下不解大便不利朝熱摸床撮空皆宜大承氣湯服



傷寒下論 卷之

後脉弦者生瀋者死

華陀云陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死也

○汗出如油

○瘡癰不言

仲景云脉淫而洪身汗如油喘而不休此為命絕也

○舌卷囊縮

千金方熱病七八日其脉不轉不散當瘡癰三四日汗不出者死也

○鼻中煤煙

宋迪陰證訣云陰毒漸深則鼻中黑如煤煙

○指甲黑青

宋迪陰證訣云陰毒甚則指甲黑青扁鵲云手足爪甲下肉黑者死

○目盲見鬼

難經云脫陽者見鬼脫陰者目盲仲景云少陰病強發汗必動血或從口鼻耳目是謂下厥上竭

○九竅出血

治也 仲景云環口蠶色柔汗發黃此為脾絕也

○環口蠶色

霍亂證轉筋入腹者雞卵白湯主之

○轉筋入腹

仲景云寸口脉微而瀋根葉枯稿而寒慄欬逆嘔腥吐涎沫也

○吃噫噦皖

又云脉滑則為噦仲景傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其形損



○膈內拒痛

也故

○發黃疸熱

仲景云膈內拒痛胃中空虛心下因硬則為結胸此陷胃證也萬全云陽明病瘀熱在裏必發黃凡發黃寸口無脈鼻氣冷皆不可治也

○咽乾聲啞

狐惑濕壅證也狐則咽乾或感則聲啞

○痰涎口噤

仲景云痰涎而赤目赤痿頭卒口噤背反張者瘥病也又風温被火劫如

○筋惕肉瞤

驚癇痰厥狀萬全云傷寒瘥者乃肺熱傳於腎轉而為瘥也仲景云脈微弱汗出惡風誤服大青龍湯令人筋惕肉瞤傷寒

○叉手冒心

吐下後心下束滿發汗則動經身為振搖仲景云發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝湯

○發斑癰疹

又云持脈時病人叉手自冒心所以然者以重發汗虛故如此陽毒面赤發斑如錦紋仲景云風熱相搏則為癰疹斑粟為痺痒者名泄風

○顛狂不定

難經云重陽病者狂重陰者顛仲景云太陽病熱入膀胱其人如狂者桃仁承氣湯小便利其人如狂證也



○耳聾脇痛

仲景云少陽受病胸脇痛而耳聾

又云持脈時其人叉手自冒心師因教令欬而不欬必兩耳无

聞也所以然者以重發汗虛故如此

○上氣喘急

太陽陽明皆有喘證或水停心下亦喘陰證喘者必喘而加急

○小腹硬滿

客熱也小腹硬滿小便利者膀胱有也證

○唾膿咯血

仲景云脈浮熱甚而反灸之必嘔躁咯血仲景云吐衄側柏葉湯

○上吐下利

復吐下利者霍亂也

○二便不通

少陰小便利者真武湯陽明大便利者承氣湯

○振欲擗地

仲景云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動欲振擗地者真武湯

○遺尿失溺

仲景云洩便遺失狂言反目直視腎絕也風溫證下之則直視洩

○揚手擲足

太陽中風以火劫之則手足躁擾

○譫語鄭聲

又云六七日三部脈至大手足躁擾者欲解也仲景云實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也直視譫語喘滿者死

○心下痞斬

仲景云病發於陰而下之早則為痞

○心中懊懣

懷梔子湯主之



○舌上滑胎

仲景云濕家舌上滑胎者丹田有熱膏中有寒

○脚攣啣齒

又云陽明證懊懣舌上滑胎者施于湯風痺熱證屬陽也承氣湯主之

○脐上下築動

發汗後脐下悸者欲作奔豚

○項強几几

太陽病腰脊強几几反汗出惡寒者桂枝湯无汗者葛根湯也

○氣上衝膏

太陽病下之後其氣上衝者與桂枝湯

○外氣怫鬱

二陽併病小兒汗出面色緣緣正赤者陽氣怫鬱當解之薰之

○脚膝攣拳

傷寒脉浮自汗出惡寒脚攣急反與桂枝湯此誤也

○大便黑堅

陽明證其人喜忘必有蓄血所以然者本以久瘀血屎須硬大便反易其色黑

○手足逆冷

有熱厥有冷厥冷厥者初得病便四肢冷熱厥者手足雖冷半日復熱也

○漱水不嚥

陽明但欲漱水不嚥者心衄又濕家丹田有熱胃中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也

○額上冷汗

濕家額上汗出微喘陰證亦額上汗出皆有大煩渴

○煩躁發渴

太陽病宜白虎如人參湯不詳宜白虎如人參湯

○肉上粟起

太陽病宜以汗解更益煩肉上飲之却不得泄



咽喉乾痛

傷寒脈浮咽中乾痛而吐  
逆者甘草半夏湯主之  
又云少陰證  
者必咽痛

多眠好睡

此證大約有四少陰孤  
惑風溫及小柴胡證

夜不得眠

此證大約有  
六具在歌中

心下驚悸

傷寒脈結代心下悸  
動者炙甘草湯主之

腹中雷鳴

仲景云寒氣相搏則為雷鳴心  
下痞硬腸下有水氣腹中雷鳴  
者生薑瀉  
心湯證

下利溏垢

寒則鴨溏  
熱則垢膩

潮熱不常

仲景云潮熱者實也大抵  
潮熱有三證具在歌中

寒熱往來

此證有三一者中風證小柴胡  
二者熱入血室證刺期門三者  
狀如溫瘧

身體腫滿

風濕證身微腫  
者甘草附子湯

鬱冒不仁

仲景云寒則為  
鬱冒不可發汗發汗則額上脈

額上脈陷

陷脈緊急直視不得胸不得眠  
胸胡絢切

身重難轉

風濕相搏桂枝加白朮證○二  
陽合病白虎加人參柴胡加牡  
蠣丸  
骨證



○鼻中衄血

陽明病口燥但欲飲水不咽者必衄。衄家不可發汗宜小乾地黃湯。

○手背冷汗

宋迪云額上手背有冷汗者陰毒也。

○下利膿血

仲景云少陰下利便膿血者桃花湯主之。

○吐逆不止

吐有冷熱二證有胃熱吐者中喝則面垢有寒。

○面垢背寒

發汗後腹脹滿者厚朴五物湯下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯。

○腹脹滿悶

又云不轉失氣而下之必腹滿。

○咳嗽涎盛

或上焦有熱或水停心下皆嗽。

○頭疼惡心

頭疼惡心身不疼痛者食積也身疼痛者傷寒也。

○乾噫食臭

胃中不利心下痞硬乾噫食臭腸下有水氣者生薑瀉心湯無水者食積也。

○身痒如虫行

陽明病當汗而反无汗其身如虫行皮中之狀為其久虛故也。

○鼻鳴乾嘔

太陽中風證鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之。太陽陽明合病鼻鳴乾嘔者葛根湯主之。

○洒淅憎寒

仲景云陰氣上入陽中則洒淅惡寒也。

○腰脊疼痛

仲景云一二日太陽受病則頭項痛腰脊強。



○腹脇時痛

仲景云傷寒五六日中風或腹中痛或脇下痞硬者小柴胡證

○渾身壯熱

又腹中痛小建中湯  
仲景云陽明受病則身熱目痛鼻乾不得臥之大陽中風與傷寒皆發熱

以上七十二證或必死或可治淺深雖不同要之對證用藥斯過半矣

○論桂枝湯用赤白芍藥不同

仲景桂枝湯加減法凡十有九證但云芍藥聖惠方皆用赤芍藥孫尚方皆用白芍藥聖惠乃太宗

朝命王懷德等編集孫兆為累朝醫師不應如此皆戾然赤白補瀉極有利害常見仲景桂枝第四十七證云病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯蓋風傷衛而邪乘之則衛強榮雖不受邪終非適平也故衛強則榮弱仲景以桂枝發其邪以芍藥助其弱故知用白芍藥也榮既弱而不受病乃以赤芍藥瀉之決非仲景意至於小建中為尺遲血弱而設也舉此皆用白芍藥而仲景亦止稱芍藥可以類推矣



論傷寒慎用圓子藥  
仲景論中百一十三方為圓者有五理中陷胸抵當麻仁烏梅是已理中陷胸抵當皆大彈圓煮化而服之與湯無異至於麻仁治脾約證烏梅治濕匿證皆欲必達下部故用小圓其他皆欲入經絡逐邪毒破堅癰道瘀血燥屎之類須憑湯劑以條除也余見俗醫用小圓藥以巴豆而下邪毒致殺人者不可勝數蓋巴豆止導食積而不能去熱毒既下之後臟氣虛而邪毒宛然猶在更再以大黃朴

硝下之鮮不致斃大抵下藥欲其必中必當一服而止也故不可不慎歟

○論桂枝麻黃青龍用藥三證

仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脉傷寒見風脉此三者人皆能言之而不知用藥對病之妙處故今之醫者不敢用仲景方無足怪也且脉浮而緩者中風也故盡盡惡寒浙浙惡風人翕翕發熱仲景以桂枝對之脉浮緊而濇者傷寒也故頭痛



發熱身疼腰痠骨節疼痛惡風無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風脉浮緊傷寒脉浮緩仲景皆以青龍對之無不應手而愈何以言之風傷衛氣也寒傷榮血也榮行脉中衛行脉外風傷衛則風邪干陽氣陽氣不固發越而為汗是以自汗而表虛故仲景用桂枝以發其邪用芍藥以助其血蓋中風則病在脉之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故桂枝證云令遍身絪絪微似有汗

者蓋佳不可令如水流離病必不除是知中風不可大發其汗大發其汗則反動榮血邪乘虛而居其中故不除也寒傷榮則寒邪干陰血而榮行脉中者也寒邪居脉中則非特榮中病也邪自內作則并與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而煩冤仲景以麻黃大發其汗又以桂枝辛甘而其發散欲損其內外之邪榮衛之病故爾大抵二藥皆發汗而桂枝則發其衛之邪麻黃并與榮衛而治之固有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九證



云病嘗自汗出者以爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故耳榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和也又第一卷云寸口脉浮而濇浮則爲風濇則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮濇者榮衛俱病也麻黃湯中并桂枝而用此仲景之意歟至於青龍雖治傷寒見風

脉傷風見寒脉然仲景云汗出惡風者服之則筋惕肉瞤故青龍一證尤難用必須形證諦當然後可行王寔止以桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之者也

○論兩感傷寒

仲景論兩感傷寒云凡傷於寒熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死又云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同既云必死又云治有先後何也大抵此病表裏雙傳臟腑俱受得此者十不全



一故云必死然仲景豈以已見而重誣後人哉故有發表攻裏之說以勉後世恐萬世之下一遇大聖而得之者不欲絕望於後人也則仲景仁心可知矣

○論傷寒以真氣為主

傷寒不問陰證陽證陰毒陽毒要之真氣完壯者易醫真氣虛損者難治諺云傷寒多死下虛人誠哉是言也蓋病人元氣不固真陽不完受病纒重使有必死之道何也陽病宜下真氣弱則下之多

脫陰病宜溫真氣弱則客熱便生故醫者難於用藥非病不可治也主本無力也素問稱岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘麤爲之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死能能音耐冬不能夏陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能夏不能冬黃帝曰調此二者奈何岐伯曰能知七損八益則二者可調蓋陽勝而汗不出者傷寒也陰勝身寒而汗出者中風也二者須知七損八益而已蓋女子二七天癸至至七七止男子二八精氣



溢至八八而止婦人月事以時下故七欲損男子  
精欲蒲而不竭故八欲溢如此則男子女人身常  
無病也自身無病真氣完固雖有寒邪易於用藥  
故曰二者可調是知傷寒以真氣為主

○論治傷寒須依次第

仲景論中雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧  
其表裏待其時日若不循次第雖暫時得安損虧  
五臟以促壽期何足尚也昔范雲為梁武帝屬官  
得時疫熱疾召徐文伯診視是時武帝有九錫之

命期在旦夕雲欲預盛禮謂文伯曰可便得愈乎  
文伯曰便瘥甚易政恐二年後復不起爾雲曰朝  
聞道夕死可矣况二年乎文伯於是先以火煨地  
布桃栢葉布席置雲其上頃刻汗出以溫粉裹之  
翌日遂愈雲甚喜文伯曰不足喜後二年果卒夫  
取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日便欲  
速愈者耶今病家不耐病未病三四日晝夜督汗  
醫者隨情順意鮮不致斃故予感此而以為龜鑑  
也



論仲景緩遲沉三脉

仲景云衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲緩遲相搏名曰沉註云緩者四肢不收遲者身體俱重沉者腰中直腹內急痛若然則三者皆病脉也安得謂之和註者乃以脉訣中沉緩遲論之不知仲景傷寒脉與雜病脉異何以言之上文云衛榮盛為高章綱衛榮弱為慄卑損至此三脉謂之和則不盛不弱乃平和脉蓋傷寒之脉高章綱者陽證類慄卑損者陰證類即是而言則緩遲沉者陰陽向安

之脉也不特此爾下文云寸口脉緩而遲緩則陽氣長遲則陰氣盛陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得非安平而何

張仲景傷寒發微論卷之一



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



