



179  
2



重鐫註解仲景傷寒百證歌發微論卷之三

宋白沙許叔微知可述 明清邑後學杏泉雷順春校証

第一證

○傷寒脉證總論

大浮數動滑陽脉陰病見陽生可得沉濇弦微弱

屬陰陽病見陰終死厄仲景云脉大浮數動滑此

名陰也陰病見陽脉者陰陽交互最難明輕重斟

量當別白重以分表裏在下文輕手脉浮為在表

表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常



浙浙傷寒先要辨表裏虛實此四者為急仲景云  
有力者表實也無汗不惡風也重手脈沉為在裏  
而無力者表虛也自汗惡風也  
裏實脈沉來亦實重手無力大而虛此是裏虛宜  
審的裏證亦有虛實脈沉而有力者裏實也故腹  
滿大便不通沉而無力者裏虛也或泄利或  
陰證之類也上八句  
辨表裏虛實盡矣風則虛浮寒堅牢水停水瀆  
必沉潛動則為痛數為熱支飲應須脈急弦太過  
之脈為可怪不及之脈亦如然仲景云風則虛浮  
寒則堅牢沉潛水  
瀆支飲急弦動則為痛數則熱煩太過  
可怪不及亦然邪不空見中必有奸榮衛太盛  
名高章高章相搏名曰綱榮衛微時名曰  
卑徒類切  
恐懼也

卑慄卑相搏損名彰榮衛既和名緩遲緩遲名沉  
此最良九種脈中辯虛實長沙之訣妙難忘仲景

口衛氣盛名曰高榮氣盛名曰章高章相搏名曰  
綱衛氣弱名曰慄榮氣弱名曰卑卑相搏名曰  
損衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲遲緩相搏名曰  
沉大抵仲景脈法論傷寒與雜病脈法異故予嘗  
撰仲景三十六種脈法譬譬有如羹上肥此脈定知陽氣微  
縈縈來如蛛絲細却是體中陰氣衰脈如瀉漆之  
絕者病人亡血更何疑仲景云脈譬譬如羹上肥  
者陽氣微也脈縈縈如蜘蛛  
者亡血也陽氣衰也脈絲絲如瀉漆之絕陽結藹藹  
如車蓋陰結循筭亦象之仲景云藹藹如車蓋者  
陽結也累累如循筭者

陰結也。陽盛則促來，一止陰盛則結緩而遲。此謂促也。仲景云：脈來緩時一止名曰結，脈來數時一止名曰促。脈陽盛則促，陰盛則結。縱橫逆順宜審察，殘賊災怪須要知。仲景云：有相乘有縱也。曰水行乘火，火行乘木，木行乘金，金行乘水，水行乘土，土行乘水，名曰縱。火行乘木，木行乘火，水行乘土，土行乘水，名曰橫。有逆有順，何謂作病也？又問曰：脈有災怪，何謂也？答曰：舊時服藥，今乃發作，故為災怪。脈靜人病，內虛故安；脈病人行，內實故傷。人迎緊盛，風邪熾。左為人迎，右為氣口。人迎盛傷于風，氣口盛傷于食。

也。數為在府，遲為藏，浮為在表，沉為在裏。仲景云：浮為在裏，數為在府，遲為在藏，脈遲為在臟。脈浮而緩，風傷榮，浮緊兼澀，寒傷衛，脈微大，忌令人吐，欲下猶防虛，且細。仲景云：脈虛細不可下。沉微氣弱，汗為難，三者要須當審記。孫用和云：陰虛脈沉微而氣弱，者不可汗。三者汗下吐三候，脈有不可行者，切宜審也。陽加於陰，有汗證，左手沉微，却應未。素問云：陽加於陰謂之汗。跌陽胃脈定死生。仲景說：跌陽脈者，凡十有一。太谿腎脈為根蒂。傷寒必診太谿。邪氣漸深，須用意，浮大晝加，並屬陽，沉細夜加，勞。

陰位九至以上來短促狀若涌泉無入氣更加懸  
絕漸無根命絕天真當死矣孫尚云脈及七至六  
至以上浮大晝加病  
沉細夜加病更及八至精氣消神氣亂必有散脫  
精神之候須切急為治療又加之九至十至雖和  
扁亦難救如八至九至加以懸絕懸絕者無病人  
根也如泉之涌脈無入氣天真盡而必死矣

三部脈調勻大小浮沉遲速類此是陰陽氣已和

勿藥自然應可喜仲景云寸口關上尺王三處大  
小浮沉遲數同等雖有寒熱不  
雖劇當愈

第二證

○傷寒病證總類

傷寒中風與溫濕熱病瘧暍并時疫證候陰陽雖  
則同別為調治難專一已上七證大略雖一則桂  
相似須別作調治

枝二麻黃三則青龍如鼎立精對無差立便安何  
須更數交傳日孫尚云一桂枝二麻黃三青龍三  
日能精對無差立當見效不須更  
候五日轉瀉  
反致壞病也

發熱惡寒發于陽無熱惡寒自陰出  
仲景云發熱而惡寒者發于陽  
也無熱而惡寒者發于陰也

陽盛熱多內外熱  
白虎相當并竹葉白虎湯竹葉石膏  
湯皆治內外熱證

陰盛寒濕脈  
沉弦四逆理中為最捷孫尚云陰盛寒濕則  
用四逆湯理中湯

熱邪  
入胃結成毒大小承氣宜踈泄傷爛宜調胃或丸

小承胃滿宜用瀉心湯胃滿證候用大小瀉心湯結胃痞氣當

分別按之不痛為虛斬按之若痛為實結淺深大

小陷曾元仲景方中不徒折孫兆云結胃痞氣兩分

茵陳可治發黃證藥皮治痢兼下血發黃疸熱則用茵陳湯下

利腸毒惡痢下血藥皮湯小便不利更喘滿煩渴五苓安可缺

利小便止煩渴用五苓散半在裏兮半在表加減小柴胡有法

小柴胡治半在表裏仲景有加減法夜中得脈日中愈陰得陽兮災

必脫日中得脈中夜安陽得陰兮自相悅陰陽調

順自和同不須攻治翻為孽孫尚云凡傷寒三日脈微而微數以順四

時身涼而和者此名欲解也夜半得脈必次日中愈陰得陽而解也日中得脈夜半愈陽得陰而和也陰陽和同爾

### 第三證

#### ○表證

身熱惡寒脈又浮偏宜發汗更何求仲景云脈浮宜以汗解之

要須手足俱周徧不欲淋漓似水流金匱云凡發汗欲令手足

皆周發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也則隨時與和解重須正發病當瘳仲景有和解之者

和鮮若小柴胡桂枝是也初春陽弱陰尚脹正發若麻黃之類是也

亟奪成擾搜夏時暑熱脉洪大玄府開時汗易出

初春陽弱不可大發汗以擾乎不可汗脉微而弱

傷夏則玄府汗空開故易汗更兼尺中脉遲緩

金匱云脉微不可發汗無陽故也又云尺中脉遲榮不足血氣

少不可汗微弱無陽遲少血安可麻黃求發散更有

血并下血仲景云衄家不可發汗發汗則額上風

温濕温如何發壞病虛煩且慎之腹間動氣宜區

別此五證皆不可汗婦人經水適來時此是小柴

胡證决忽然誤汗表裏虛鬱胃不知人作孽婦人

適來適漸屬小柴胡證誤汗鬱胃不知人

第四證

○裏證

不惡寒兮反惡熱胃中乾燥并潮熱陽明證身熱

寒反惡熱當下之又云手心腋下汗常潤小便如

常大便結腹滿而喘或譫語脉沉而滑裏證决手

典兩腋下潤小便如常大便結硬皆裏證也內陽

實則腹滿而喘沉而滑者病在內故曰裏證也盛陰虛速下之安可日數拘脣脣

之則愈蓋陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱失

下心胃皆症悶胃鬱不安成熱厥失下則熱極生

則半日後庸醫不曉疑是陰誤服熱藥精魂絕補  
復熱也見厥便以為陰誤服熱藥則奪其發黃不知人也三陰大約可溫之積證  
見時方發泄太陰腹滿或時痛少陰口燥心下渴  
積熱悉具更無疑要在安詳加審別當下仲景云太陽病醫反下之因腹滿時痛屬太陰桂枝加芍藥湯主之其大實痛則大黃湯主之  
又云少陰口燥咽乾急下之宜承氣湯如此者當下之也病猶在表不可下脉  
浮更兼虛細者仲景云脉浮為在表又云虛細不可下之惡寒嘔吐小  
便清惡寒者表未解金匱云欲吐者不可下之不轉失  
氣應難瀉下小便清者知不在裏而在表也大便堅硬小便數約

證陽明白汗津液寡密允如斯之類下為難莫便  
參差成誤也

第五證

○表裏寒熱

病人身熱着得衣寒在骨髓熱在肌先與桂枝使  
寒已小柴加桂次溫之病人身寒衣襖退寒在皮  
膚熱在髓白虎加參先除熱桂黃各半解其外仲景云病人身上熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也仲景俱無治法朱肱云寒在骨髓先與桂枝湯以柴胡加桂湯熱在骨髓先以白虎加人參湯以



傷寒百證  
除其熱以解其外也  
各半湯以解其外也  
病有標本並始末先後  
同當審察裏寒表熱脉沉遲裏熱表寒脉必滑  
云裏寒表熱者脉沉而遲裏熱表寒脉必滑也

第六證

○表裏虛實

脉浮而緩表中虛有汗惡風腠理疏浮緊而滑表  
却實惡寒無汗體焚如傷寒最要辨表裏虛實為  
先有表實有表虛有裏實  
有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛先辨此六者然  
後用藥無不差矣蓋脉浮而緩又惡風有汗此表  
虛傷風證也脉浮緊而滑兼有  
力惡寒無汗此表實傷寒證也  
脉沉無力裏虛證

四逆理中為對病沉而有力緊且實柴胡承氣宜

相煎裏虛宜溫之故用四逆理中又有表和而裏

病下之則愈斯為正裏和表病汗為宜忽然誤下

應難拯外臺云表和裏病下之則愈汗之則死虛則

溫之實瀉之病形脉證要相宜更兼藥餌如精對

立便安康待甚時孫向云精對無差立當見效

第七證

○急救表裏

傷寒下後表裏虛急當救療莫躊躇下利不止身

疼痛救裏為先四逆歎忽若清便自調適却宜救  
表桂枝徒切莫遲延生別病過經脈變在斯須仲景  
傷寒症下之大過裏虛又瀉不止身疼痛者急  
當救裏或身疼痛清便自調者急當救表救裏宜  
四逆救表  
宜桂枝

### 第八證

○無表裏證

既無裏證又無表隨證小柴胡治療大便堅鞭脈  
浮數却與大柴胡極妙仲景云病人無表裏證死  
柴胡湯七八日後至過經證候如斯當辯真何况

熱實睛不和常覺目中不了了仲景云傷寒六七日  
不和無表裏證大便難微  
執者急下之大承氣大柴胡

### 第九證

○表裏水

有水須分表和裏安可妄投增病勢乾嘔微利咳  
發熱謂表有水青龍證仲景云傷寒表不解心下  
渴或利或噎或小使不利小腹滿忽若身涼并汗  
或喘者小青龍此謂表有水也  
出兩脇疼痛心下痞表解爭知裏未和十棗湯不  
能主治大陽中風心下痞硬滿引脅下痛乾嘔短  
氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗

傷寒百論  
湯主之

### 第十證

○表裏兩證俱見

脉來浮大表證爾便赤煩渴却在裏脉浮者表證也小便赤而  
 煩渴又却表裏兩證俱見時當用五苓與調理此宜用五苓散蓋五苓治內外俱熱  
 有熱其人小便却又清亦是兩證當區別大便結硬頭痛  
 身熱小便却清知大便堅鞭脉沉細裏證當下分不在裏而在表也  
 明諦頭汗出時微惡寒手足兼冷却非是仲景云傷寒五

六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脉細者此為陽微結有表復有裏也脉沉亦在裏也此為半在表半在裏焉仲景著論非一端要在審詳而已矣仲景論中有兩證者凡十餘證故此略舉一二為例

### 第十一證

○三陰三陽傳入

尺寸俱浮屬巨陽二日內病如常經絡上連風府穴頭項痛弓腰脊強仲景云尺寸俱浮者太陽受病當一二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強  
 脉長陽明為受病二三日內斯為應挾鼻絡目是其經目痛鼻乾眠不穩仲景尺寸俱長者陽明受

病也當二三日發以其脉按鼻絡少陽經絡貫耳

中脉弦脇痛耳應聾四日以前皆在腑汗之即退

易為功仲景云尺寸俱弦者少陽受病也當三四

沉布胃絡嗌嗌乾燥脾胃腹滿病難禁仲景云尺

沉緊胃腎絡肺繫舌本口燥舌乾渴不休五六日

中病有準尺寸脉俱沉者少陰受病也當五六日

舌乾七八日至厥陰經煩滿囊縮可愛驚三陰受

而渴

邪已入臟却宜瀉下自和平仲景云尺寸俱微緩

七日發以其循陰器絡于肝故煩滿而六經已盡

傳亦遍土不受邪脉來緩水火相交氣已和雲興

雨至斯為汗若傳至厥陰其脉來緩者脾土不再

第十二證

陰陽兩感

傷寒熱甚雖不死兩感傷寒慢料理仲景云凡傷

熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死又曰兩感

病俱作治有先後發表攻裏本自不同故漫料理

可一日太陽少陰病腹痛口乾煩飲水太陽膀胱

也為表裏故仲景云太陽與少陰俱病則腹痛口乾煩滿而渴二日陽明合太陰腹滿身熱如火熾不欲飲食口舌乾妄言譫語終難睡仲景云二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽合厥陰耳聾囊縮不知人厥逆水漿不入口六日為期是死反仲景云三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入口而不知人者六日死矣

### 第十三證

#### ○陽證陽毒

太陽陽明與少陽三陽傳入是其常二三日太陽三四日少陽陽以其經傳入也太陽脉浮惡寒風陽明惡熱脉來

長太陽脉浮陽明脉長太陽惡寒惡風陽明不惡寒反惡熱少陽口苦脇下滿往來寒熱脉弦張仲景云少陽之為病口苦咽乾目眩又曰太陽病不解傳入少陽者脇下堅滿往來寒熱其脉弦細陽若獨盛陰暴絕變為陽毒必發狂必變為陽毒內外熱結舌又卷鼻中煤煙不可當脉應洪實或滑促宜用升麻梔子湯

### 第十四證

#### ○陰證陰毒

飲食不節陰受之太陰腹脹病在脾素問云起居飲食不節則陰受之傷寒四五日少陰腎病脉微傳太陰太陰脾經也故其腹脹滿

細心煩但寐渴無時仲景云少陰之為病微細

六日自利而渴厥陰氣上衝心下饑不欲食食吐音回

衝心饑不欲食食吐音回陰病若深陽頓絕變成陰

毒更何疑四肢逆冷臍築痛身如被杖痛可知宋

傷脾胃或因慾事腎經衰內感伏陰外寒氣腰重

頭疼覺倦疲陰毒本因腎氣虛寒嗜慾過多或傷

或先感外寒而內伏陰內外皆陰故陽氣不守遂

發頭疼腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四

肢逆額上手背皆冷汗二三日內尚支持額上手背皆有

冷汗二三日內或六脉沉細時來疾尺部短小力

還微寸口有時或來大誤經轉瀉若何醫陰毒診

脉俱沉細而疾尺部短小寸口或大六脉俱浮大

或沉取之大而不甚疾者非陰證也誤轉瀉則渴

轉甚躁陰病漸深腹轉痛心胃脹鄭聲隨虛汗

不止咽不利指甲青黑面色黧陰證深則咽喉不

躁渴虛汗不止或時鄭聲指甲一息七至沉細疾

速灸關元不可遲六脉沉細而疾一息七至以來

壯穴在臍更兼金液來甦治庶得陽回命可追灸

更以金液來甦助之庶幾陽復也

傷寒百證

卷之三

七

第十五證

○太陽陽明合病

太陽陽明同合病仲景法中有三證自利宜服葛根湯但嘔却加半夏應喘而胸滿屬麻黃慎勿下之輕性命循規守矩治為宜要使中和自安靜仲景

第十六證

○太陽少陽合病

二證一者太陽與陽明合病則自利葛根湯主之二者合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之三

太陽少陽合病時亦須下利更何疑下利黃芩湯

可用若嘔還加半夏仲景云太陽少陽合病自

黃芩加半夏生薑湯

第十七證

○三陽合病

腹滿身重難轉側面垢遺尿譫語極三陽合病口

不仁白虎湯功更奇特仲景云三陽合病腹滿身

語遺溺發汗則譫語下之則額上出汗手足厥冷自汗白虎湯主之

第十八證

傷寒百證

卷之三

十四

○太陽少陽併病

太少併病證有二汗下差之皆致斃頭痛眩冒如  
結胸誤若汗時譫語至肺俞肝俞皆可刺譫語却  
刺期門是仲景一證云太陽少陽併病頭痛眩冒  
時如結胸心下痞硬當刺肺俞肝俞不  
可發汗發汗則譫語脈弦頸項強時刺大椎此候  
五日譫語不止當刺期門眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下

第十九證

○陰證似陽

煩燥面赤身微熱脉至沉微陰作孽脉來沉微是  
陰也但外發

熱故煩燥  
面赤身熱陰證似陽醫者疑但以脉憑斯要訣但  
脉為主不  
必守證也身熱裏寒陰躁盛面戴陽身  
而裏寒也煩躁者陰盛也面戴陽  
者下虛故也此皆陰證似陽也陰發躁兮熱發  
厥物極則反皆理性陰極則生躁熱極則發厥  
物極則反皆物之理性也

第二十證

○陽證似陰

小便赤色大便秘其脉沉滑陽證是四肢逆冷休  
執深陽證似陰當審諦小便赤大便秘結脉沉滑陽  
證也陽極生陰熱極生寒  
故令四肢逆冷以其伏熱深也  
醫見四  
肢逆冷便以為陰則誤也當仔細審詳輕者且宜



供白虎重者須當用承氣重陽如陰理宜然寒暑之變亦如是

第二十一證

○陰盛隔陽

身冷脉沉緊且細内雖煩躁不飲水此名陰盛隔陽證霹靂散用煩躁止脉沉緊而細不欲飲水者散躁若止兮應得睡寒已散兮陰自退熱氣上行得汗痊火燄丹砂宜用矣

第二十二證

○陰陽易

男子陰腫多絞刺婦人腰痛並裏急傷寒差後便行房男名陽易女陰易熱上衝胸頭不舉眼中生

花氣翕翕燒棍音加鼠橘皮湯選此用之醫西可必

仲景云傷寒陰陽易之為病身體重少氣小腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花目胞赤膝脛拘急燒棍散主之此病男子則陰腫婦人則腰痛千金外臺云有鼠鼠湯橘皮湯亦可用

第二十三證

○傷寒

脉浮眩澁是傷寒熱少寒多不躁煩傷寒脉浮眩澁而澁熱少寒

多心不煩躁不煩躁頭痛無汗身拘急微厥之時在指端腰脊

疼痛色多慘唯宜發汗與通關學者先須要辨傷寒中風一證傷寒

脉浮緊而澁中風脉浮而緩傷寒者惡寒不惡風

寒者面色慘悽中風者面色和悅也大青龍證及麻黃執多寒少

亦其常傷寒大抵雖執少寒多亦有執多寒少者如麻黃證云發熱身痛大青龍證云脉浮

而惡風執多寒少不煩躁亦宜汗解正相當微弱

無陽桂枝越仲景云太陽病發熱多寒少脉微弱者無陽也不可發汗用桂枝二越婢

湯尺遲血少建中湯尺脉遲者血少也宜建中湯

陰脉弦法當腹中急痛與建中湯遲弦雖不同皆少血之脉也林家衄家不可汗

小柴胡解自安康林家衄家瘡家以至四動脉不可發汗者主方皆用小柴胡湯

### 第二十四證

#### ○中風

惡風自汗是傷風仲景謂傷風體熱頭疼病勢濃厚為中風

足不冷心煩躁面色如常無慘容解在脉浮而緩

是本證寸大尺弱有時逢傷風脉雖浮而緩活人者仲景云陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出桂枝敗毒獨活輩宜

皆選用在其中活人書云治傷風藥宜項強桂枝桂枝敗毒獨活散之類

活人書云治傷風藥宜項強桂枝

加乾葛

仲景云太陽病項背強几几反汗漏風加乾葛出惡風者宜桂枝加葛根湯主之

附可收功

仲景云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝湯主之

惡寒風惡風傷風有汗寒無汗

前篇

第二十五證

○傷寒見風脈中風見寒脈

惡寒不躁微四逆脈浮而緩來無力惡風煩躁手足溫脈診緊浮來又澁寒脈反得傷風證中風却見傷寒脈大青龍證是為宜和衛調榮斯兩得

云太陽中風脈浮發熱惡寒身疼不汗出而煩躁者大青龍湯主之又云傷寒脈浮緩身不疼但受症有輕重無少陰證者大青龍湯主之

宜浮緩今却浮緊傷寒宜浮緊今却浮緩此中風見寒脈傷寒要知其病加煩燥方可服之為最的

見風脈也

脈微自汗又惡風誤用肉瞶并筋惕

仲景云脈微者不可服之服之厥逆筋惕肉瞶此為逆也故王寔止用桂枝麻黃各半

第二十六證

○熱病中喝

身熱惡寒頭痛楚心煩躁渴如何禦

身熱惡風頭痛但脈不同耳語在不在

為傷暑

熱病脉必浮大洪紫傷夏暑脉必虛細而弱者身熱而脉微又云其脉弦細孔遲小便已而

洒然毛聳未眩云脉虛身熱得之傷暑又曰熱病

脉洪大中暑脉細傷暑面垢并背寒四肢倦怠汗

無度口噤五苓白虎佳痰逆橘皮湯可愈仲景云手足逆

冷小有勞身即熱口開前板齒痛若發其汗則惡寒甚加温針則發熱甚數下之則淋其皮膚

既緩腠理開洒然毛疎反寒惡謬加熱藥發斑黃

可怪庸醫心術誤仲景云小便已洒然毛疎故其

班發黃也

第二十七證

温病 温瘧 温瘧 風温

○五種温

傷寒春月名温病脉來浮數是其證發熱頭疼亦

惡寒冬夏比之輕不甚升麻解肌為最良小柴竹

葉宜相稱以上論温病也素問云冬傷於寒春必

於肌膚至春变为温病故其尺寸盛方兼弦數重

感於寒變温瘧先熱後寒小柴胡但熱不寒白虎

藥以上論温瘧也仲景云若脉陰陽俱盛重感于

寒者变成温瘧素問云瘧脉自弦弦數者熱多

但熱不寒者白虎加桂湯主之濡弱陰脉浮滑陽

此是風温證候當頭疼身熱常自汗四肢不收

睡長當治少陰厥陰病誤汗黃者防已湯以上論

仲景云陽脈浮滑陰脈濡弱史遇於風變為風溫也

其病四肢痲緩又云風溫為病脈陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小

便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚

痲時痰癢也少陰火也厥陰木也當治之也

火風木誤汗之則用黃耆防已湯救之也陽脈濡

芳陰弦緊更遇溫氣來行令變成溫疫作天行少

長皆同無異病溫寒清熱順時宜以平為期如斯

正此論溫疫也仲景云陽脈濡弱陰脈弦緊者更

遇溫氣亦為溫疫一歲少長皆同病者溫疫也

最重溫毒為可怪陽脈洪數陰實大發斑癰疹如

錦紋咳兼心悶何由快此論溫毒也仲景云陽脈

浮數陰脈實大更遇溫熱

亦成溫毒溫毒為病最重也故發斑生

疹咳嗽心中不快痞悶宜用玄參升麻湯宜用玄參

升麻湯長沙仲景分明載

第二十八證

○三種濕

風濕 濕溫 中濕

濕溫中濕并風濕三者同名而異實暑濕相搏成

濕溫胸間多汗頭如擘兩脛逆冷苦妄言陽濡而

弱陰小急以上濕第二中濕之為病脈來沉緩其

名的一身盡痛兼發黃大便反快小便澁仲景云

關節疼痛而煩脈沉而緩者此名中濕其候令人

小便微利大便反快但當利其小便又云濕家之

湯藥百證 卷之三

傷寒百證  
為病一身盡痛發熱身色如薰黃濕家其人但頭汗出皆強欲得覆被向火若下之早則心胸滿小便不利舌上白胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也又云濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中無病病苦頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈本是風兩山澤氣中之令人成此疾第三風濕脉但浮腫體痛重難轉側額上微汗身微腫不欲去被憎寒慄此論風濕也風濕之證仲景云一身盡汗出當風或久傷取冷所致也故發汗藪藪欲潤其脉浮額上有微汗不欲去被也身風濕俱去斯為良仲景云風濕相搏一身疼痛止醫云此可發汗汗之病不愈何也答曰發其濕汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也治風濕

者發汗微微出者則防已黃耆木附湯對證用之是風濕俱去者也  
醫可必防已黃耆湯木附湯皆治風濕自汗  
第二十九證

○兩種瘧

發熱惡寒頭項強腰脊分明似反張瘈瘲口噤如癱狀此名瘧病是其常仲景云病身熱惡寒頭項強急惡寒時頭面赤其脉緊獨頭面搖卒口噤先感風寒後感濕沉遲弦細身反張者瘧病也症相當仲景云太陽病發熱脉沉而細者名曰瘧也仲景又云太陽發汗太多因病瘧有汗惡風名也孫尚云病熱而脉沉細者難治也

柔痊無汗惡寒名曰剛無汗葛根有汗桂三痊皆

宜續命湯無汗葛根湯有汗桂枝湯而分發汗解肌痊有剛痊有柔痊剛痊無汗柔痊有汗皆宜續命湯仲景云太陽病發熱無汗反惡寒名曰剛痊汗出不惡寒者名曰柔痊脚攣

啣齒皆陽熱承氣湯宜下最良以上皆熱證當用承氣湯亦名

陽痊并陰痊名異實同安可忘痊音熾痊巨郢反各異實同也

第三十證

○四證似傷寒

食積 寒痰

虛煩 脚氣

食積虛煩并有痰更兼脚氣似傷寒四家病證雖

云異發熱憎寒却一般此四證雖非傷寒然發熱憎寒則同當以脉證看之

中腕寒痰胸痞滿脉浮自汗體難乾此痰證也有痰則胸中痞滿自汗食積令人頭必痛身不疼兮積證端氣口

緊盛傷於食心煩脉數嘔吞酸此食積也食積則身不疼但嘔惡吞酸氣口脉緊盛而他脉數虛煩之脉不緊實但覺

身心熱與煩身不疼兮頭不痛唯宜竹葉便須安

孫尚云虛煩與傷寒相似但得病二三日脉不浮不惡寒身不疼痛但熱而不煩不可發汗發汗必危損如脉不緊實不甚痛但熱而或不煩非裏實亦不可下下之必危損唯可服竹葉湯主之又

有脚氣之為病大便堅硬足行難兩脛腫滿或枯

細莫與傷寒一例看此論脚氣也脚氣大便堅脚膝腫疼兩脛或有腫滿或有

枯細者方其發時亦發熱  
憎寒嘔惡似傷寒證候也

### 第三十一證

○可汗不可汗

脉浮唯宜以汗解仲景云脉浮宜以汗解春夏用之何足怪

云大法春夏宜汗風若傷衛屬桂枝寒傷榮血麻黃快

云風則傷衛寒則傷榮傷衛屬桂枝傷榮屬麻黃二藥雖均曰發汗自有淺深也項強几

几葛根湯心間水氣青龍對仲景云項背強几几者用麻黃葛根湯心

下有水氣者小少陰亦可微發汗仲景云少陰病得之二三日風濕發汗惡淋瀝

外仲景云少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發其汗

風氣去兮濕氣在唯宜浥潤徧周身濕氣風邪俱

已退風濕惟要微微澱汗出若大大抵尺遲汗

為逆以後諸症皆不可汗也仲景云尺中遲者精氣不足血氣微少不可汗微弦濡

弱斯為害仲景云微反在下弦反在上弱反在關

少陰沉細病在裏少陽弦細却內主仲景云少陰脉沉細數病

在裏不可發汗又云傷寒脉弦細頭兩厥若汗必

舌萎厥不可發汗發汗則聲四動汗之還室礙仲

云動氣在上動氣在下動氣在左動氣在右皆不可發汗瘡家汗之必成瘡淋

家汗之便血潑衄家汗之額上陷咽乾汗之咽却



隘仲景云瘡家雖身疼痛不可攻其表汗之必痊  
視不得胸不能眠咽乾燥者不可發  
汗王寔傷寒證治皆用小柴胡湯  
寒慄仲景云亡血不可發  
家重發汗必恍惚  
心亂小便已陰痛  
少陰強汗動經血仲景云虛煩壞病皆不  
其血動虛煩壞病尤須戒  
之必動可發汗宜用小柴胡湯  
主之月經適斷適來時切莫動經成胃味  
胃不證發則鬱  
知人

第三十二證

○可下不可下

宿食不消當下之寸口浮大尺中微人病有宿食  
日寸口脈浮大按之反澀尺中亦微而澀當下之承氣湯主之  
仲景云陽明痲熱在裏身必發黃宜茵陳蒿湯主之  
出而譫語者有燥屎在胃中此風也過經乃下之宜大承氣湯大柴胡湯  
圓對痲血抵當不可遲結胸宜大陷胸下之  
堅硬惟承氣痞氣瀉心湯勿疑大便  
宜下以瀉心湯若陽微下則痞自此以下不可下也  
或兼虛細更難之仲景云脈微不可  
浮大下之死金匱云結胸證其脈浮  
大者不可下下之則死四逆若下命

傷寒百證

卷之二

十四

傷寒論卷之十四

辨陰陽

十四

傾危金匱云四逆厥者不可惡寒自是有表證惡寒者表證在

者表證在不可下嘔吐仍兼胃氣虧仲景云嘔吐者不可下之不轉失

氣必溇利仲景云陽明病不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉

失氣者此為有燥屎乃可攻之若不轉陽明自汗下

難為陽明自汗少便利此為津液內竭咽中閉塞尤

須忌玉函經云咽中閉塞不可下下之跌陽浮數

已虛脾仲景云跌陽脈浮而數浮則傷胃數左右

上下有動氣更在調和仔細醫仲景云動氣在左右

咽燥鼻乾頭眩心悸動氣在左下之則腹滿氣急

動氣在上下之則掌握熱煩動氣在上下之則腹

蒲卒起頭眩

### 第三十三證

○可吐不可吐

傷寒大法春宜吐仲景云大春宜吐宿食不消曾滿症

云宿食在下胸中鬱鬱兼有涎寸口微數知其故

玉函云胸上結實胸中鬱鬱而痛不能食使人按

之而反有涎唾下利日十餘行其脈反遲寸口微

滑此可吐之證也以上脈微若吐大為逆仲景云脈微

不可吐之證也少陰寒飲無增劇仲景云少陰病其人飲食

不得吐始得之手足寒脈弦遲此胸中實可下

也若膈上有寒飲者乾嘔不可吐當溫之矣

四

傷寒論卷之十四

逆虛家止可溫誤吐內煩誰受責玉函金匱云四處家亦然又云太陽病強吐之則內煩論此皆不可吐者也

第三十四證

○可火不可火

中風忽然被火劫咽爛發黃津液竭仲景云太陽發其汗邪風被火劫血氣滯壅其身則發黃至於咽爛矣榮微血弱與燒針煩躁昏迷并發熱仲景云其脈沉者榮氣微也如燒針則血留不行更發熱而煩躁也陽明被火必怵惕玉函云陽明脈浮緊加燒針者必怵惕太陽被火必清血仲景云太陽以火薰之不得汗其人必躁過經不解必清血少陰火劫

小便難強責汗時翻作孽仲景云少陰病欬而下利謔語是為被火劫故也少陰汗故也或致虛煩不得眠或致發黃中

鬱結或致下血如豚肝或致謔言語無節仲景云陽明病

加溫針則煩躁不得眠陽明病被火劫額上汗出必發黃厥熱在膀胱蓄結成積則下血如豚肝大劫必謔語此皆誤火之為病切須仔細加分別

張苗欲汗外迎之却取燒蒸布桃葉陳廩丘問張苗連發汗不出如何苗云亦可燒地布桃葉蒸溫之氣於外迎之可得汗也

第三十五證

○可水不可水

此皆誤火之為病切須仔細加分別

太陽汗後不得眠少與水飲當自全仲景云大陽病發汗後若  
大汗出胃中乾燥煩而不能眠其厥陰煩渴思得  
人欲飲當時飲之胃中和則愈矣  
水斟量多寡亦如然仲景云厥陰病渴欲飲霍亂  
思水五苓妙嘔吐思水猪苓痊仲景云霍亂頭痛  
多飲水五苓散主之又云嘔吐而病在過多反病  
膈上後必思水者急與猪苓散飲之也  
成喘咳小青龍蓋云水胃冷應知嘔噦仲景云  
冷其人不能水噤皮上有粟起仲景云病在陽當  
食飲水則噦水洗結胸熱可憐仲  
去益煩皮上粟起者是也  
玉函云結胸身熱以寒氣得水即成餒餒音噎食  
水洗之灌之則益熱

景云寸口脈浮大醫乃不知而反飲冷水令可否  
汗大出以得寒氣冷必相搏其人即餒也  
醫工要達權

### 第三十六證

○可灸不可灸

少陰吐利時加嘔手足不冷是其候口中雖和背  
惡寒脉來微澀皆須灸仲景云少陰病其人吐利  
脉不至者灸厥少陰七壯又云少陰一二日口中  
和者惡寒者當灸之又云下利脉微澀者灸厥陰  
可五陰毒陽虛汗不止腹脹腸鳴若雷吼面黑更  
十壯兼指甲青速灸關元應不謬宋迪陰證訣云陰毒  
兼指甲青速灸關元應不謬汗不止腹脹腸鳴面

易經卷之八

微數之脉却慎之因火為  
和恐難救仲景云微數之脉慎不可灸因火為脉  
浮熱甚灸為難唾血咽乾不可灸仲景云脉浮熱  
實實以虛治因火而動咽燥必吐  
血自微數之脉以下皆不可灸也

第三十七證

○可針不可針

太陽頭痛經七日不愈再傳成大疾法中當刺足  
陽明可使不傳邪氣出仲景云西云太陽病頭痛  
也若欲再傳者刺足陽  
明使經不傳則愈也桂枝服了煩不解風府風

池刺無失仲景云太陽病服桂枝湯而反煩不解  
則愈經來經斷刺期門正恐執邪居血室仲景云  
也風經水適來又云經水適斷熱入項強當刺大椎  
血室者刺期門隨其虛實而取之  
間脉有縱橫肝募吉仲景云太陽與少陽併病心  
下痞頭項強而眩當刺大椎  
第一問又曰肝乘脾名縱肝乘肺  
婦人懷身及七  
月從腰以下如水溢當刺勞宮及關元以利小便  
去心實仲景云西云婦人傷寒懷身腹滿從腰以  
此心實當刺勞宮及  
關元穴小便利則愈大怒大勞并大醉大飽大饑  
刺之逆燒燭之熱漉漉汗渾渾之脉安可失素問

刺熇熇之執瀉瀉之汗渾渾之脉瀉瀉淺深分寸自依經此道相傳休秘密

第三十八證

○傷寒可温

大抵冬宜熱藥温大法冬宜服温熱藥下利少陰有二門仲景

云法中可温者有九證皆腹滿身痛先救裏仲景云

下利與少陰兩家而已腹滿身痛先救裏仲景云

發熱頭痛脉反沉若不差身疼更疼痛用救其表

四逆湯又云下利腹滿身疼痛先温其裏宜理

中脉來遲緊痛仍存仲景云下利脉遲緊而痛未

止者當温之得湯腹滿而便

少陰膈上有寒飲仲景云少陰病其人飲食入

則吐心中温温欲吐復不得

吐始得之手足寒脉弦遲若膈上或加嘔利病難

有寒飲乾噦者切不可吐當温之

分脉沉微溢如斯證四逆理中湯可温仲景云

微溢者即嘔汗出必數更衣反少當温之又云脉

沉者急當温之宜以四逆湯仲景王函云諸温者

可與理中四逆附

子湯熱藥治之

第三十九證

○發熱

太陽發熱惡寒慄陽明身熱汗自出少陽發熱多

乾嘔三陽發熱證非一仲景云發熱而惡寒者發

大陽證云齋齋惡寒翕翕發熱故太陽發熱則惡

寒慄也陽明證云身熱汗出不惡寒反惡熱故陽

易表百證

明發熱則自汗也少陽證云頭痛發熱者下堅滿乾嘔故少陽發熱則嘔大抵寒多為

易治執多寒少因寒極極寒多者病淺故易治焉

解熱大小柴胡湯更看淺深為妙術若發熱無表證當用大小

柴胡湯熱淺者宜小柴胡熱深者宜大柴胡胡餅肌大柴胡正下之也當以外證內脈為之準

三陰初無發熱證唯有少陰兩證實脈沉發熱屬

麻黃裏寒外執宜四逆仲景云少陰病始得之症發熱脈反沉者麻黃細辛

附子湯主之又云少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆通脈四逆湯主之

### 第四十證

#### ○潮熱

潮熱為實當與下仲景之言可憑仲景云朝熱者實也大法

當宜更看脈息浮與沉若但弦浮應未也仲景云脈沉為

在裏若但脈浮弦表證在者未可下惡寒脈浮表證在與小柴胡湯

勿下仲景云陽明病有潮熱若汗出多腹滿不通而微惡寒其熱不潮勿與承氣湯

小承氣但和胃氣無多瀉仲景云若腹滿而不大便者與小承氣湯微

和其胃氣潮熱之證有三說皆屬陽明小柴訣勿令大下

則潮熱且吃噫二則微熱或溇泄仲景云陽明中風脈弦浮大而

短氣腹痞滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜則一身及目悉黃小便難有潮熱時噦宜與小柴胡湯主之又云陽明病發潮熱大便溲小便白可而胸脇滿不去者小柴胡湯主之

傷寒百證卷之二  
 三則日晡發其時發已微利增嘔噦噦乙劣切逆氣也仲景云  
 其人日晡而發潮熱若劇者發則不知人太陽亦有一證存惟是結胸  
 發潮熱仲景云太陽重發其汗而復下之不大便  
心下至小腹堅滿而痛者宜與大陷胸湯

傷寒百證卷之二



