



仁齋直指

二

特別  
79  
183  
2



123  
2

1871

門 武  
號 183  
卷 2

書中文庫

新刊仁齋直指附遺方論卷之三

# 諸風

風論

氣血痰水受病於內者也風寒暑濕致寇於外者也人之身  
 血氣既虛陰陽不守飲食居臥嗜慾無節衝風卧地調護不加  
 於是經絡空踈腠理開徹風邪乘其虛而入之中風諸風皆是  
 物耳風之為病善行數變其中人也卒其眩人也暈激人之涎  
 浮昏人之神亂挾熱則痿瘓緩弛挾寒則急痛拘挛自其邪氣  
 之入人也邪氣反緩正氣反急引邪為離僻為窳視為掣縱為搐搦  
 為癱瘓為反張在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急緩則四肢  
 不能收急則一身不能仰皆隨其邪氣所至表裏淺深而有證  
 也種類雖多大要有四血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼  
 痛謂之偏枯神智不亂身體無痛四肢不舉一臂不隨謂之風

諸風  
 仁齋  
 直指  
 附遺  
 方論  
 卷之三

非能言則忽然迷仆舌強不語喉中窒塞噫意有聲謂之風癡  
身軟有風寒濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛癢風多  
則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈而不伸在脉則  
血凝而不流在肉則不仁在骨則癱重夫是之謂風痺傷風一  
證發熱煩燥頭疼面光惡風自汗蓋風能散氣故有汗也風家  
脉浮者病在表脉實者病在裏脉虛者病在臟脉促者病在上  
浮則發散實則疎導虛則溫之促於上而病人壯盛胃喉彭拜  
者瓜蒂散少少吐之俗謂熱則生風大綱然爾多有胃虛氣虛  
血虛虛極而生風者若諸虛證候天雄附子官桂烏又不可  
闕治法大要盡以消痰順氣為先順氣用南不香蘇合香丸葶  
消痰用南星半夏細辛檀香葶水銀礞石礞石  
消等劑謹勿妄施寒毒入胃則血脉凝澁真氣消鑠不旋踵而  
廢人治風良劑小續命湯為上排風湯次之然二藥主風不主  
氣須以人參順氣散烏藥順氣散佐助其間氣一流行則風亦

疎散矣至若口開手散瀉血遺尿眼合不開汗出不流吐沫氣  
籠聲如鼾睡面緋面黑髮直頭揺手足口鼻清冷口噤而脉急  
數皆為不治之證其餘諸風種類余於嬰兒驚風指要備論之

諸風證治

心中風

心風偃卧熱而痞

唇赤其身有汗生

白黑青黃唇上見

停停時悚扁醫驚

心中風偃卧不能傾側發熱失音其舌焦赤汗流唇赤者可  
治灸心俞若唇上白黑青黃乃心壞為水面目停停時悚  
動者並不治心俞二穴在第五椎骨下兩傍各一寸半五臟  
俞穴千金翼所載與六十七難注同取分寸法男左手文右  
手以中指第一節為一寸

肝中風

肝家踞怒不低頭

左脇偏疼筋急搜

額目唇青為可療 目黃目白使人愁  
肝中風踞坐不能低頭上視多怒左脇偏疼諸筋攣急頭目  
瞤動其目青遠兩目連額微青面黃者可治灸肝俞若大勢  
青黑其目一黃一白者不治肝俞二穴在第九椎骨下兩傍  
各一寸半

腎中風

腎中踞而腰脊疼 面浮耳黑賊風生  
脇無黃跡能痊愈 直髮泥容且暮傾  
腎中風踞坐腰脊痛引小腹面上浮腫其耳黑視左右脇未  
有點點黃色者可治灸腎俞若脇上黃點面如土色鬢髮直  
齒黃赤者不治腎俞二穴在第十四椎骨下兩傍各一寸半

肺中風

肺風喘促蒲骨堂  
口鼻之間須要白

偃卧熱熱燥異常  
尋衣肺壞色憂黃

肺中風偃卧曾蒲氣短喘息時嗽燥悶汗出其鼻白目下及  
鼻四圍以至於口色白者可治灸肺俞若色黃乃肺壞為血  
其與尋衣摸空者並不治肺俞二穴在第三椎骨下兩傍各  
一寸半

脾中風

脾中風兮肌肉潤 踞而腹滿吐鹹酸  
唇并肢體通黃瘥 手足眸青瘥已難  
脾中風踞坐腹滿皮肉瞤動四肢放縱其唇黃身通黃吐鹹  
汁者可治灸脾俞若手足青且冷或目下青並不治脾俞二  
穴在第十一椎骨下兩傍各一寸半

胃中風

胃病根源飲食來 擡肩喘息氣難開  
口張額汗腹中滿 浮診雙關脉大哉  
胃中風腹滿填脹膈塞不通張口喘息額上多汗孫地仙所

謂新食竟取風為胃風是也或曰風中諸臟不關諸府是亦一說然胃為水穀之海五臟皆取氣於胃故並存之三因云

**胃俞** 二穴在第十二椎骨下兩傍各一寸半

中風惡證 細推求

眼合不開并窺睛

口開吐沫氣鹿大

鼾齕喉鳴兼鼻冷

中風多是惡風自汗心風脉浮共肝風脉浮弦腎風脉浮滑

肺風脉浮滑胆風脉浮緩或以三部候之或以本臟取之不

可一槩論也醫者當明辨之

**治卒中法**

圓白天南星 濕紙裹煨

南木香

蒼木生

白羊眼半夏 用百沸湯洗能跳燕少頃

辣細辛

甘草 生

石菖蒲 細切各

右件剉散分作二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱

調蘇合香圓三圓灌下痰盛者加金蠅二枚炙治一切卒中

不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可

用此先以皂角去弦皮細辛或生南星半真為末搗以管子

次入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙噤者中指點南星細辛末

并烏梅肉頻擦自開

**又法**

南木香 細切

生南星 七片

生薑 七片

石菖蒲 二寸搗碎

右煎取清汁乘熱調南木香末壹錢蘇合香圓三圓與之

小續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌強語塞或昏潰痿弛或厥

冷拘攣不論表裏淺深服之皆驗

麻黃 去節

人參

防已

官桂

黃芩

杏仁 去皮尖

白芍藥

芎藭

甘草各壹兩 防風壹兩半 附子炮去皮臍

右剉散每服三錢薑五厚片棗二枚水盞半煎一盞溫服恍

惚加白伏令 骨節煩疼素有熱去附子 倍芍藥 煩燥大便秘

去附子 倍芍藥 加白瀉 大便利素有寒去黃芩 加白朮 附子

骨肉冷疼加陳桂 加附子 嘔逆腹脹加人參 半夏自汗去 麻黃

加芍藥 大便結熱去附子 加枳殼 大黃痰多加 南星炮切散

片風虛加當歸 渴加獨活 身疼加桑白皮 喘急加炒桑白皮

桃風湯治五臟風諸風亦治風毒脚氣腫痛

白鮮皮 白朮 白芍藥 辣桂去龜

當歸 川芎 杏仁去皮尖 防風

甘草焙 獨活 麻黃去節 白茯苓各叁兩

右鹿末每服三錢水盞半薑四片煎一盞溫服

良方人參順氣散治諸風戰掉拳擊眩暈嘔邪麻痺疼痛

川芎 桔梗 白朮 白芷

陳皮 枳殼炒 甘草各壹兩 麻黃玄煎

天台烏藥法心 各壹兩半 人參 白薑各半兩

右為末每二錢薑棗煎服

烏藥去心 證治同前亦主脚氣

麻黃去節 陳皮各貳兩 川芎

枳殼炒 北梗 白芷 直僵蚕炒去絲

甘草各壹兩 白薑半兩

右為末每二錢薑棗煎服

治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥飲厥氣

厥之類初作即用此

圓白南星溫紙裹煨 南木香 半夏用百沸湯洗

各壹錢半 辣細辛 蒼朮生 甘草生

細節石菖蒲各壹錢

右剉分貳服每服水盞半薑七厚片煎取其半乘熱調

**圓** 方且諸 氣門 參圓灌下痰盛加炙 **全蠟** 貳枚先以 **皂莢** 細 右為末管子塌些吹入鼻中俟噴嚏即進藥牙禁者 **烏梅** 揉和 **南星** **細辛** 末以中指顫按目開

**三豆飲** 治卒中昏迷痰盛喉鳴口眼喎斜半身不遂但脉沉無 熱者可服

南星 壹兩 川烏 生 附子 生 各去皮臍

南木香 貳錢半

右吹咀每服三錢水壹盞半啣半厚片煎取半微温服

**附香飲** 證治如前 附子 生 四錢 木香 貳錢

右吹咀分兩服每用水壹盞半啣半厚片煎取半微温服虛人可用

**星香飲** 證治如前 南星 捌錢 木香 貳錢

右剉分生服每用水壹盞半 片煎六分温服氣盛人用此

**大醒風湯** 治卒中諸風涎潮痰厥語訛神昏

附子 生 南星 生 各叁分 全蠟 川芎

防風 各壹分

右剉散每三錢薑十片煎服氣不和加 **木香**

**省風湯**

南星 炮 壹兩 防風 半兩 茸草 壹分

右剉每服三錢薑十片煎服氣虛人加 **生附子** **沉香** 氣逆加

**紫蘇** 頭痛而暈加 **全蠟** 多痰加 **半夏**

**五癰圓** 治諸風癱瘓拘挛強直疼痛或跌撲傷損亦主之

草烏 炮 去尖 川烏 炮 去皮 以藥 壹兩半 乳香 壹兩

黑豆 生 壹升 以班 備取 豆焙 乾 筒去 頭足 迥同 煮候 且 賤 爲

右細末醋和豆為糊圓桐子六每服三十圓温酒下

**蠶骨丹** 治諸風癱瘓拳挛半身不遂

川烏 頭 草烏 頭 各 壹兩 川芎

中風



當歸酒浸熟 辣桂 川續斷洗熟 華陰細辛

楠骨脂炒 烏蛇洗酒浸 直僵蚕炒去絲

木鱉子炒去殼 天麻酒浸 防風 羌活

獨活 沒香 麻黃去節 蒼木炒 堅白南星炮 白疾梨炒 薏苡仁

蒼木各半兩 草薢洗水者 杜仲去蘆皮刺蓋 自然桐燒紅醋淬

牛膝各壹兩 虎脛骨洗酒浸 川五靈脂各四錢 秦艽

白附子炮 全蝎去毒微炒 右細末乳香 沒藥麝 別研漸入以浸藥酒調 飛麵煮糊

淋酒下不拘時服仍間用 同法碎壹升煎湯 同燻盥浴最

妙未服藥前須以鹽酒 二十一箇去翅足用 黑豆壹建 壹建壹慢

火同炒焦只用七箇并豆入 全蝎十四枚微炒 五靈脂二錢

半為末糕糊圓麻子大每貳拾壹圓老酒下先去其風根

鐵彈圓治諸風癱瘓 川烏炮去皮臍 川五靈脂四兩

乳香 沒藥各壹兩 麝壹錢 右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末之

拌和再碾滴水為圓彈子大每壹圓薄荷酒磨下

拒風丹治一切風 川芎四兩 防風壹兩半 天麻 甘草各壹兩

細辛 車撥各半兩 右末煉蜜和杵每兩作三十圓每服壹圓細嚼荆芥酒下傷

風鼻塞項強頭疼薑湯下

麝香圓治白虎癰 癰風走注疼痛遍身癢痒如虫啣書靜夜劇

川烏者大八箇 全蝎貳拾壹 地龍半兩 黑豆並生用

麝香半字

中風

右細末糯糊圓象豆大每服七圓甚者十圓夜卧令膈空温酒下微出冷汗便瘥

**增味五痺湯**

治風寒濕合而為痺肌体麻痺不仁

羌活

防己

片子薑黃 白朮

海桐皮

當歸

白芍藥略壹 甘草柴妙

右剉每服三錢薑十厚片煎服病在上食後病在下食前

**瓜蒂散**

吐法

右瓜蒂末壹錢熟水調下若風蕪證須以瓜蒂散吐痰

**稀涎散**

治風涎潮塞上膈氣閉不通

猪牙皂角

四條肥實不蛀者去黑皮

光明晉礬壹兩

右細末輕者半錢重者三字熟水調下但少吐之弱者不可

吐用

**養正丹**

三十圓

研細南木香

煎湯調下仍與南星

豁痰歸經雞心賓榔亦能疎風順氣

**鶴膝風**老酒煎候温常服

**急風方**

朱砂壹字

輕粉壹點

巴豆去油如

全蝎壹枚

蟬殼兩枚

右末之研和大人盡劑用薄荷泡湯調下小兒分半用乳汁

調下或吐痰或泄毒物皆效

**烏龍飛**

治諸風癱瘓口眼喎斜語言蹇澁

真川烏

生法好五靈脂各貳兩

右末入腦麝半錢同研滴水圓小彈大陰乾每壹圓先薑汁

研開次好酒調下空心食前日兩服似鐵彈圓

**廬山**

治風痙昏迷吐沫抽掣脊脊強直產後中痙通用

當歸

荆芥穗

右等分末之每貳錢水壹盞酒少許煎七分灌下如牙緊用

銅匙斡以雞羽蘸藥入口或用童尿調下或以弓藥代

當歸

亦妙

又方

黑豆炒焦好酒淋之取清汁

右每酒壹盞獨活剉三錢煎七分溫服又連續進劑以瘥為度

**太陽風痙證候**始則發熱腹痛喘息涎浮次則牙緊頭搖十指

微動漸加項背強直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視滑世

不禁身腰反張如此則十不救一新產血虛汗出傷風亦作瘥

證九產後發熱若舌蹇唇急手指微動便急作風瘥療之**刺**

**湯獨活酒**

方見在溫門

人為邪氣所干則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒若暑若濕腑臟表裏冷熱虛實各有受病之處用藥之法必究其原而後可以起病否則前賢所謂獵不知兔廣絡原野莫一人獲之術亦疎耳是可以人試伎乎哉

**附諸賢論**

病機要曰治風須分在臟在腑在經之異云風本為執執勝

則風動宜以靜勝其燥是養血也治須少汗亦宜少下多汗則

虛其衛多下則損其榮宜治在經雖有汗下之戒而有中臟中

腑之分中腑者多著四肢有表證而脈浮惡風拘急不仁中臟

者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目瞽大便結閉中腑者宜汗

之中臟者宜下之表裏已和宜治之在經當以大藥養之

發明云中血脈則口眼喎斜中腑則肢節痠中臟則性命危三

治各不同中血脈外有六經之形證則從**續命**加減中腑內

有便溺之阻隔宜**湯**等通利之外無六經之形證內無便

溺之阻隔宜養血通氣**秦**等**湯**完**活愈風湯**主之○劉宗厚

曰按此分在表在裏在經之三證立汗下調養之三法可謂開

後世之有聲但所用諸方學者宜詳審之

河間曰風病多因執甚俗云風者言末而忘其本也所以中風

有癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中於風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無知也多因喜怒悲憂恐五志過極而卒中者皆為熱甚故也若微則但僵仆氣血流通筋脉不牽緩者發過如故或熱氣大盛鬱滯不通陰氣暴絕陽氣後竭而死○痰涎者由熱甚則水化製火而生○偏枯者由經絡一側得通否者痺而癱瘓也○口筋緊急者由風熱太甚以勝水濕又津液滯于胸膈以為痰涎則筋太燥然燥金主于收斂勁切故也○或筋反緩者乃燥之甚血液衰少也諸筋牽易愈諸筋痿難復以見燥之微甚也

丹溪云案內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論性刘守真作將息失宜水不能制火極是由今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所襲其氣必虛風之傷人在肺臟為多○許學士謂氣中者亦有此七情所傷脉微而數或浮而緊緩而遲必也脉遲浮可治大數而極者死若果外中者則東垣所謂中血脉中府中藏之理其於四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮甚詳子和用三法如的係邪氣卒中痰盛實熱者可用否則不可

河間曰中風之人不宜用龍麝珠簞之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入而莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知事宜用藥下其痰涎故風者乃百病之長雖審經意故莫不有疑者也吁醫之不明運氣造化地理病機之微而欲行通變之法者難矣哉

附方

防風通聖散

宣明方論曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩暈嘔吐謂風熱之甚也夫風拂鬱風火生於熱以熱為本而風為

標凡言風者即風熱病也氣壅沸筋脉拘倦肢體焦痠頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利腎隔痞嘔嘔筋筋惕驚悸或腸胃燥熱結便溺淋閉或夜卧寢汗咬牙墜語筋惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於週身而但為小便多出者或濕熱內餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外及以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄者或表之陽和正氣備氣與邪熱相合併入於裏陽極似陰而戰煩渴者表氣寒故戰也或虛氣人不已者經言與衛氣併入於裏則寒戰也併出則熱也或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或暗風癱者或洗頭風或破傷風或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘不能辨者或熱甚佛結而反出不快者或熱極黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑

偏身黑翳紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗呼為疔風者或成風癘世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過執毒蕪解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身寒疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱証腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口禁筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者惡物過多而不兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因熱結大小便澀不通或腹急痛腹滿喘悶者並皆治之

- |                          |                       |                      |    |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 防風                       | 川芎                    | 當歸                   | 芍藥 |
| 大黃                       | 薄荷葉                   | 麻黃                   | 連翹 |
| 芒硝 <small>朴硝製過者是</small> | 石膏                    | 黃芩                   |    |
| 桔梗 <small>各半兩</small>    | 滑石 <small>三兩</small>  | 甘草 <small>二兩</small> | 荊芥 |
| 白朮                       | 梔子 <small>各二錢</small> |                      |    |

右為末每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分温服涎軟  
**加**五錢薑製此藥不可無生薑同煎劉廷瑞方有  
無其餘皆同

**加**頂防風疾常服取効

防風

川芎

當歸

芍藥

薄荷

麻黃

連翹

黃芩

桔梗各一兩

甘草二兩

荆芥

白朮各二錢

烏藥

羌活

天麻

僵蚕 寺分

辨虛氣弱者磨

痰涎壅盛者加南星半夏枳實

**搜風順氣**

聖惠方

治腸胃積熱以致腸間痞悶大便結燥小

便亦澁腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓行步艱辛

語言蹇澁三十六般風及七十二般氣無不治之此藥宣通

氣血清熱潤燥通利大小便則諸病自愈

車前子 半兩

白檳榔

大麻子

微炒去殼

牛膝

酒浸

乾山藥

各二兩

枳殼

去穢

防風 去芦

獨活

各一兩

郁李仁

湯泡去

大黃

五錢半

生半熟

右為細末練蜜丸如梧桐子大每服二十九茶酒米飲任下  
早晨臨卧各一服又覺大腸微動以羊肚肺羹補之此藥膏  
梁之家肥甘大過以致大便結燥尤宜服之老人大腸無血  
大便結燥最宜

**蘇合香圓**

療傳尸骨蒸癘帶肺痿症忤鬼氣卒心痛霍亂吐

痢時氣鬼魅瘴疔赤白暴痢瘀血月閉痰癖丁腫驚癇及小

兒吐乳大人狐狸等病○小兒用大緋絹袋盛當心帶之一

切邪鬼不敢近○凡人痰氣及中風痰涎壅上喉中有声不

能下者用**青白丸**同丸**生薑**自然汁化下立効○產婦

中風小兒驚風牙關緊硬不開及不省者擦牙即開然後用

風藥治之○小兒吐瀉驚疳先用火焙此藥然後用**白**

自然汁化開白湯調灌○脚氣衝心用**車前子**去殼搥碎和

九敷則脚心疼痛立止○心腹絞痛中滿嘔吐白湯化服○  
大人小兒傷風咳嗽白湯白湯調下○中風狂亂如見鬼  
神白湯調服方見咳嗽門

**白圓子** 和劑方 治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫及小兒  
驚風並皆治之方見痰類

**大秦丸湯** 按粹方 治中風外無六經之形証內無便溺之阻隔  
知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不能言宜養  
血而筋自榮

秦艽 石膏各三兩 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風去芦

黃芩 白芍藥 吳白芷 白朮

生地黃 熟地黃 白茯苓略 細辛五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨  
加生姜七片如心下痞加枳實一錢煎服

**姜活愈風湯** 按粹方 治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏潰及治  
風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心  
亂則百病生靜則為病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活 甘草炙 防風去芦 黃芪去芦

人參去芦 蔓荊子 川芎 細辛去芦

枳殼煨 穰麩 地骨皮 麻黃剉 知母去皮

獨活 白芷 杜仲炒 繼絲 秦艽去芦

柴胡去苗 半夏湯洗 厚朴姜製 防己

熟地黃 前胡各二兩 芍藥去皮 黃芩去腐

白茯苓 石膏 生地黃 蒼朮各四兩

桂乙兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服如遇天陰加生  
姜三片煎空心一服臨卧再煎查服○常服之藥不可失四  
時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人參各二兩望夏穀

中風

良方集腋卷之三

三





五珠子 廣木香半麝香 龍腦研許

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千下每兩分作十九每服一九以硬物擊碎温酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧壹呷藥之衣蓋覆當自出汗即差脚湯及避風寒茶下半丸蓋出汗入膏時如稠再入水少許煎動入藥唯少為妙其麻黃膏不可多其麻黃膏煉去見後

**秘傳祛風散**

姜活 獨活 山梔 半夏  
蒼木 蒼耳子 甘草 茯苓  
陳皮 當歸 生地黃 防風  
荆芥 漢防已 白芍藥 牙皂  
威靈仙 各等分

右咬咀每服水二盞薑三片煎至一盞不拘時服加減於後

**御風丹**

聖惠方

治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎 白芍藥 桔梗 細辛  
白僵蚕 川羌活 天南星姜製各半兩 麻黃去根  
防風去 白芷各半兩 乾生薑 甘草炒各七  
硃砂二各半

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓熱酒化下食前日三服神昏有涎者加硃砂二錢半

**續命散**

大全良方

治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲飲水此藥能扶榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風 獨活 當歸 人參  
細辛 葛根 芍藥 川芎  
甘草 熟地黃 遠志去心 荆芥格

官桂 牝牛

半夏 五升

汗多不止加牡蠣粉

右咬咀每服一兩

**生薑**

三片水二盞煎至一盞去滓通口服

**獨活湯**

大全良方

治虛風昏憤不自知覺手足痠癢坐卧不寧

或發寒熱若血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活

羌活

人參 去

防風

當歸

細辛

茯神 去

半夏

桂心

白微

遠志

菖蒲 去毛

川芎

甘草 各五

右咬咀每服一兩水二盞生薑伍片煎至八分去滓食後溫服

**川芎石膏湯**

宣明方

治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻

塞口瘡煩渴淋悶眼生翳膜此藥清神爽志宣通氣血治中

風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎

芍藥

當歸

山梔子

黃芩

大黃

菊花

荆芥 穗

人參

白朮 各半

滑石 肆兩

寒水石

桔梗 各貳

甘草 各兩

砂仁 貳錢

石膏

防風

連翹

薄荷 葉 各壹

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水調亦得

**忌** 發熱物

**保命丹**

千金方

治諸風痰癱不能語言心忪健忘恍惚去來頭

目暈眩胃中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憤又治心氣

不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒不時或

發狂顛神情昏亂及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風

并羊顛猪顛發叫

硃砂 壹兩

珍珠 貳錢

南星 壹兩

麻黃 去根

白附子 炮

雄黃

龍腦 各半

琥珀 錢

僵蚕 炒

犀角 錢

麥門冬 去心

枳殼

地骨皮

神曲

茯神

遠志 去心

人參

柴胡 各壹

金箔 壹百

牛黃 壹錢

天麻 半兩

腦子 少許

麝香 少許

膽礬 半兩

牙硝 肆錢

毫車

天竺黃

防風

甘草

桔梗

白木

升麻 各壹

蟬蛻 半兩

黃芩 貳兩

荆芥 貳兩

右為細末煉

為丸如彈子大每服一圓薄荷湯化下不拘

時候忌

豬羊血更加大

炮去皮臍

製半夏 自正川芎 各壹兩 猪牙皂 角壹兩 和前

藥丸服尤妙

神效活絡丹

治風濕諸痺肩背腰膝筋骨疼痛口眼喎斜半身

不遂行步艱辛筋脉拘攣能清心明目寬膈宣通氣血年逾

四十預服十數丸至不生風病

白花蛇 酒浸焙乾

烏梢 蛇酒浸焙乾

麻黃 去節

細辛 去土

全蝎 去毒

兩頭尖 酒

赤芍藥

貫芎

防風

葛根

沒藥 另研

血竭 另研

硃砂 另研

烏犀 屑

地龍 去土

甘草 皮炙

丁香 去枝

白僵蚕 炒

乳香 另研

麝香 另研

片腦 另研

官桂 粗皮

草豆蔻

川羌活

虎胥骨 酥炙

玄參

牛黃 另研

天麻

威靈仙 酒浸

人參

藿香 去土

天竺黃

敗龜板 炙

安息香 壹兩

何首烏 去土

白芷

烏藥

香附 壹兩

青皮 乙兩

黑附子 皮炮

黃連

茯苓 壹兩

白豆蔻

骨碎補 各乙

黃連

茯苓 壹兩

黃芩 貳兩

白朮 乙兩

熟地黃 貳兩

沉香 貳兩

大黃 貳兩

當歸 半兩

木香 貳兩

沉香 貳兩

金箔 為衣

右為細末煉丸為丸如彈子大每服一九細嚼溫酒茶清漱

**續命散**

治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎

細辛

藜蘆

白芷

防風

薄荷各壹

猪牙皂角剉去皮

右為細末用芦筒納藥每用少許吹入鼻中

**麻黃膏**

宣明方

治中風不省人事卒然倒地

右須臾日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鐵量大小盛五七斗者可先煮三沸掠去滓逐旋添水盡至三五斗以來漉去麻黃淘在盆中澄定良久用細羅布瀝去滓取清者鐵內再熬至一斗再澄再瀝取汁再熬至升半已來為度只是勤攪勿令着底恐焦了熬時太陰人澄時須蓋覆不得飛入塵土且葉放一二年不防三膏稠用水解熬再勻丸中風卒倒用此膏加湯藥內

服或用此膏丸藥

**續命湯**

按辨方治中風外有六經之形証先以加減

証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴姜製

大黃

枳實

羌活等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自榮衛自和矣

**續命湯**

出乾坤生意

夫聖人治未病之病知未來之疾此其良也其中風者必有先兆之證覺大姆指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣者此先兆也三年內必有大風之至經云急則治其標緩則治其本宜調其榮衛先服八風散愈風湯天麻丸各一料

為効宜常服加減**風通聖散**預防其病則風疾不作而獲其安矣

**初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也**  
又治中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去從有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一句之通利如此乃常服之法也久則清濁自分榮衛自和矣

- 羌活 甘草 防風 當歸
- 蔓荊子 川芎 細辛 黃耆
- 枳椇 人參 麻黃 香白芷
- 甘菊花 薄荷 枸杞 柴胡
- 知母 地骨皮 獨活 杜仲
- 秦艽 黃芩 芍藥 石膏
- 蒼朮 生地黄 肉桂 一兩

右剉每服一兩水二鍾生姜三片煎空心服臨卧煎薄服空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下四白丹謂之輕劑立其法是動以安神靜以清肺○假令一氣之微汗用**愈風湯**三兩加**麻黃**一兩勻作四服加**生薑**空心服以粥投之得微汗則住○如一句之通利用**愈風湯**三兩加**大黃**一兩亦勻作四服如前服臨卧服得利為度此藥常服之不可失四時之輔○如望春大寒之後本方中加**桂枝****芍藥**各二兩通前四兩謂迎而奪少陽之氣也○如望夏穀雨之後本方中加**石膏****黃芩****知母**各二兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也○季夏之月本方中加**防己****白朮****茯苓**各二兩通前四兩謂勝脾土之濕也○望秋大暑之後本方中加**厚朴****二兩****薑香**三兩**桂**一兩通前四兩謂迎而奪大陰之氣也○望冬霜降之後本方中加**附子****官桂**各一兩**當歸**二兩通前四兩謂勝少陰之氣也○如得春氣候減冬所加四時類此此

雖立四時加減更宜臨病之際審察虛實寒熱土地之宜邪氣靈少此藥具七情六欲四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之永不結滯此藥與**天麻丸**相為表裏治未病之聖藥也若已病者更宜常服無問男女老幼驚癇搐搦急慢驚風四時傷寒等病服之神効

**八風散** 和劑方 治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚瘙癢癩疹成瘡及治寒熱不調鼻塞聲重

藿香半斤 白芷 前胡去芦各 黃耆去芦 甘草監 人參去芦各 羌活去芦各 防風去芦各

右為末每服貳錢水一鍾入薄荷少許煎湯調下食後服之

**天麻丸** 治風因熱而生熱勝則動宜以靜勝其躁是養血也

天麻 牛膝二味用酒同浸三日焙乾 玄參 草薢各六兩別研 杜仲炒斷絲 附子炮一 羌活十四兩 川歸十兩 生藥 一方用獨活五兩腎間風

右為末蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸空心温酒白湯下予按用藥治病之法寒因熱用熱因寒用正治也今中風癱瘓之証本風火陽邪而用**烏附**等熱藥治之何哉蓋中風癱瘓乃濕痰死血結滯於臟腑經絡之間非**烏附**等熱藥而能開散流通之乎此非正治乃從治也書云從少從多各觀其事則從治之藥只可為引經而已丹溪云肥白人多濕少用**烏附**行經是也此方既用**烏附**又用**獨活****羌活**助之其理安在哉本欲削去姑存以待肥白多濕之人減而用之中病則已不可過肥白多濕之人不可用也

**灸法** 風池百會曲池合谷肩髃風市絕骨環跳三里等穴皆可灸之

# 附胃風

胃風方論

丹溪云此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦腹大惡風頭多汗膈塞不通胃風湯正始此然亦看挾証加減

脈右關弦而緩帶浮  
胃風湯 按粹方 治虛風証能食麻木牙關急搐目內蠕瞶胃風

面腫

白芷 壹錢 葛根 貳分

蒼朮

當歸身 各壹錢

升麻 貳錢

甘草 錢半 柴胡

藁本

羌活

黃柏

草豆蔻 各叁分

麻黃 伍分

蔓荊子 壹分

右咬咀水貳盞薑叁片棗壹枚煎至壹盞去滓溫服

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或

瘀血 方見瀉痢門

附傷風

傷風方論

內經曰風為百病之長又曰風勝則動又曰賊虛邪者陽受之又曰傷於風者上先受之

丹溪云傷風屬肺者尋宜辛溫或辛涼之劑散之如桂枝湯參

蘇合香風散 羌活散 究證施治

桂枝湯 治太陽經傷風頭疼身痛或翕翕發熱或洒洒惡風自

汗 無汗者不可服

桂枝

芍藥 各三兩

甘草 炙壹兩

右咬咀每服三錢水一盞姜叁重貳枚煎前柴分去滓溫服不

拘時服惟春初依此方自春末夏至已前加黃芩半兩夏至

後加知母半兩石膏貳兩或升麻半兩若病人素虛寒不用

加減

神木散

和劑方

治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼木米泔浸 藁本去土 香白芷 細辛去葉  
羌活去芦 川芎 甘草各二

右為細末每服參錢水壹盞姜參片葱白三寸煎七分温服不拘時如傷風鼻塞用葱茶調下二錢

**定風餅子**

簡易方

治風客陽經邪傷膝理背脊強直言語蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川芎 南星 川芎 乾姜 甘草 半夏 天麻 白茯苓各等分

加白附子

右為末姜汁丸如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服壹餅細嚼熟生姜湯下不拘時服

**金沸草散**

和劑方

治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花去梗 荆芥穗半兩 麻黃去節 前胡去芦

甘草炙 赤芍藥 半夏湯洗七次 枳殼去穢

右咬咀每服伍錢水壹盞姜參片棗壹枚煎捌分温服

**參蘇飲**

和劑方

治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大解肌熱寬中快膈或欲成勞瘵潮熱往來並能治之

木香 紫蘇葉 乾葛洗 半夏湯泡七次  
前胡去苗 人參去芦 茯苓去皮各 枳殼去穢

桔梗去芦 甘草炙 陳皮去白各

右咬咀每服肆錢水壹盞半姜參片棗壹枚煎陸分去滓熟服不拘時簡易方以氣盛不用木香

**冲和散**

簡易方

治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠欠伸出淚

蒼木米泔浸 荆芥穗式兩 甘草壹兩壹錢半  
右咬咀每服伍錢水壹盞煎捌分去滓熱服不拘時



**消風百解散**

和劑方 治四時傷寒頭疼發熱惡寒及風壅咳嗽  
鼻塞声重

荆芥

白芷

陳皮 去白

麻黃 去節

蒼朮 略肆

甘草 炙 貳兩

右以咀每服伍錢水壹盞姜叁片葱白叁莖煎柒分不拘時  
如咳嗽再加烏梅煎

**川芎茶調散**

重

和劑方

治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞声

薄荷 去梗不見

川芎 肆兩 羌活 貳兩

甘草 貳兩

細辛 壹兩

防風 兩半 白芷 貳兩

荆芥 去梗 肆兩

**消風散**

和劑方

治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻噴声重耳  
作蟬鳴及皮膚頑麻瘙痒癢婦人血風頭痛腫痒並皆治  
之

右為末每服貳錢食後茶清調下常服清頭目一方無細辛

荆芥穗

甘草 炒 貳兩

陳皮 去白 半兩

人參 去芦 壹兩

茯苓 去皮用 壹兩

白殭蚕 炒 壹兩

防風 去芦 壹兩

芎藭 壹兩

藿香葉 去梗 壹兩

蟬蛻 去殼 壹兩

朴 去皮姜 兩半

羌活 壹兩

右為細末每服貳錢感風頭暈吳流清涕者用**荆芥湯**茶清  
調下遍身瘡癬温酒下

**天麻散**

御藥院方

清頭目化痰涎及感冒風寒声重頭目昏

眩項背拘急皮膚瘙痒並皆治之

天麻 壹兩

防風 貳兩

細辛 半兩

薄荷葉 半兩

川芎

甘草 炙

吳白芷

朱砂 各壹兩

右以七味為細末煉蜜丸如彈子大**朱砂**為衣每服壹丸細  
嚼食後生姜湯下茶清亦可

**人參散**

和劑方

治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞

声重如心經蘊熱口舌乾燥者加**黃芩**

柴胡 去苗 肆草 炙 桔梗 人參 去芦

傷風

傷風附遺卷三

羌活 去苗

芎藭

茯苓 去皮

枳殼 去穢

前胡 洗

獨活 去苗各

右咬咀每服參錢水壹盞薑三片薄荷少許同煎七分去滓温服

羌活散

和劑方

治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞声重肢節煩疼天陰風雨預覺不安

前胡 去芦

羌活 去芦

麻黄 去根

白茯苓 去皮

川芎

黄芩

甘草 炙

蔓荆子 去皮

枳殼 去穢

細辛 去苗

石膏 別研

菊花 去梗

防風 去芦各

右咬咀每服壹兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至一盞温服

# 附破傷風

破傷風論

病機云破傷風者同傷寒證治通於表裏分別陰陽有在表者在裏有在半表半裏者在裏宜下在表宜汗在表裏之間宜和解不可過其治也

河間曰破傷風者從外至內甚於內者則病也因此卒暴傷損風襲之間傳諸經絡至使寒熱更作身體反強口禁不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候故諸瘡不差呼世皆言者灸為上是為熱瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搖或角弓反張口禁自邪皆因瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有破傷不灸而病死者瘡者白如瘡口閉塞氣難通泄故陽熱亦為鬱結而熱甚則生風也故表脉浮而無力太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和若明此三法而治不中病者

末之有也

**羌活防風湯**

按辨方 治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

各壹兩 地榆

細辛 各貳兩

右咬咀每服伍柒錢水壹盞半同煎至柒分去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加**大黃**貳兩大便秘則加**大黃**壹兩緩緩令過

**白朮防風湯**

按辨方 若服前藥之過有自汗者宜服此藥

白朮

黃芪 各壹兩

防風 貳兩

右咬咀每服伍柒錢水壹盞半煎至壹盞去粗溫服不拘時候臟腑和而有自汗可用此藥○破傷風臟腑秘小便赤自汗不止者因用熱藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用**芍黃湯**參貳服後用**大芍黃湯**下之

**芍黃湯**

按辨方

川芎

壹兩

黃芩 陸錢

甘草 貳錢

右咬咀每服伍柒錢水壹盞半同煎至柒分去滓溫服不拘時候參服即止再用下藥

**大芍黃湯**

按辨方

川芎

羌活

黃芩

大黃 各壹兩

右咬咀依前煎服宜利為度

**羌活湯**

按辨方 治半在表半在裏

羌活

去芦

菊花

去梗

麻黃

去根節

川芎

白茯苓

去皮

防風

去芦

石膏

研

前胡

去芦

黃芩

蔓荊子

細辛

去葉

甘草

炙

枳殼

各壹兩

薄荷

香白芷

各半兩

右咬咀每服壹兩水貳盞生姜伍片煎至壹盞去滓通口服食後滓再煎服

破傷風

東醫雜考卷三

十五

白朮湯

按粹方

治破傷風大汗不止筋掣搐搦

白朮

黃芩各伍錢

甘草錢半

葛根

芍藥

升麻

右咬咀每服壹兩水貳盞煎至壹盞去滓溫服不拘時

江鯽丸

按粹方

治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裏可用

江鯽丸下之

江鯽剉炒

野鴿糞炒

白姜蚕錢各伍

蜈蚣壹對

天麻壹兩

雄黃壹兩

右為末作參分貳分用燒飯九桐子大硃砂為衣壹分巴豆霜貳錢半亦燒飯九桐子大每服硃衣丸叁拾九加巴豆霜九壹丸第貳服加貳九加至利為度再服硃砂丸病愈止

蜈蚣全蝎散治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣壹條去毒炒全蝎壹對炒去毒並頭足

右為細末如發時用膏字或貳字擦牙縫內或吹鼻中

防風湯

按粹方

治破傷風同傷寒未証未傳八裏宜急服此藥

防風

羌活

獨活

川芎各等分

右咬咀每服伍錢水壹鍾半煎至七分去滓溫服二三服後

宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散

按粹方

蜈蚣壹對

江鯽叁錢

右為細末用防風湯調下如前藥鮮表不已齊轉入裏當服

左盤龍圓微利看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

按粹方

左盤龍

白僵蚕

鯽各五錢

雄黃壹錢

右為細末燒餅為丸如桐子大每服拾伍丸溫酒下如裏證

不已當於左龍丸壹處半內入巴豆霜半錢燒餅為丸如桐

子大每服壹丸同左龍丸壹處合服每服藥中壹丸如此漸

加服至利為度若利後更服後藥若搐搦不已亦宜服後藥

防風湯

防風湯

十六

羌活湯也

羌活湯 按粹方

羌活

獨活

防風

地榆各壹兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去粗溫服如有熱加黃芩○有涎加半夏○若病日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血為度

養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各壹兩 細辛伍錢

右咬咀依前煎服

地榆防風散 治破傷中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬牙莧各等分

右為細末每服參錢溫米調下

秘傳止血定痛生肌散 專治跌打損傷牙咬刀傷出血諸般腫

毒出膿後肌肉不生痛不止者並皆治之

真龍骨

煨參錢

白芷貳錢伍分

黃丹飛過伍錢

軟石膏煨去火壹兩

血結貳錢

乳香參錢

沒藥參錢

朝腦少許

右為細末磁確搽患處血止痛定肌生肌用應効如神如若腫毒頑瘡收口先用此藥搽瘡口再用白膏藥貼之肌生收口方見腫毒門

秘傳破傷風方

初覺有風急取執糞堆內蟻蟻一二箇用手捏住待虫口中吐出水就抹在破處身穿稍厚衣裳待少時瘡口覺麻兩脇微汗風出立効如風緊急速取此虫三五箇剪去尾肚內黃水自出塗瘡口再滴此少入熱酒飲之汗出立効

秘傳獨聖散 治破傷風五七日未愈已至角弓反張牙關緊急服之立有神効

破傷風

十二

蟬退 去頭足土淨每錢

右為末用好酒壹碗煎滾服之立甦為妙

**如聖散** 聖惠方 治破傷風止血定痛

蒼朮 六兩 川烏頭炮去皮 防風

細辛 兩半 兩頭尖炮去皮 天麻

白芷 各兩 蝎稍微炒 雄黃各半

右為細末每服一錢酒調下不物時服

**蜈蚣散** 治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣 一條去毒炒 全蝎 一對去毒炒

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中

**一方** 治破傷風欲死者 川烏 南星 半夏並生 天麻去苦分

# 寒

## 中寒論

寒者嚴凝殺厲之氣也人以腎為根本惟腎則受寒惟寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口禁失音此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也霍亂轉筋洞泄下痢乾嘔吐逆積飲停痰此寒邪入腸胃也以至為咳嗽為虛勞為痲瘖為脚氣為帶漏為遺精為痰癰為諸痛寒亦主之人性腎氣不充疎於謹護非特霜凝水沍之謂寒或者炎天暑月當風取涼臥地受冷使寒邪之氣自皮膚而達經絡自經絡而入臟腑如前數證皆得以恣睢四出矣溫腎禦寒如**乾薑****附子****川烏****天雄**輩佐之以**參****朮****靈砂**此固禦寒中物然寒傷榮氣徒知溫腎而不知溫血恐未必有十全之功是則**桂枝****當歸**又溫血之上藥也不然古人何以致意於寒泣血云

中寒證治

不換金正氣散 解散寒邪

蒼木 炒

橘紅

半夏麴

厚朴製

藿香葉 各壹

甘草 炒分

右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服

養胃湯 治外感寒邪內傷生冷

蒼木 炒

厚朴 製

半夏麴 各壹

人參

茯苓

草果

藿香 各半兩 橘紅 半錢半

甘草 炒 錢半

右剉每服三錢加(酒)半錢薑七片烏梅半箇煎服

薑桂散 溫中散寒生

乾薑

良薑 各半兩 辣桂

木香

半夏麴

甘草 炒 各貳錢半

右剉散每服三錢薑五片棗二箇煎服

附諸方

生料五積散

和劑方

治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔

吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸夜及婦人經泄腹痛並皆治之

蒼木

米泔浸去粗皮

桔梗

去芦 拾兩

陳皮

去白 貳兩

麻黃 節

去根

枳殼

去穢 各肆兩

厚朴

乾姜

各四兩

白芷

川芎

甘草 炙

茯苓

去皮

肉桂

芍藥

當歸 各叁兩

半夏 湯泡 七次

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑叁片葱白叁根煎七分熟

服胃寒用煨姜挾氣加吳茱萸婦人調經則用艾醋

按此藥氣味辛溫發表溫中開鬱行氣有殊功去寒濕之聖

藥也夫寒濕屬陰熱燥屬陽人之為病不過二者而已矣善

用藥者以苦寒而瀉其陽以辛溫而散其陰病之不愈者未

中寒

良薑

十七

之有也予嘗以防風通勝散瀉熱燥之藥也生料五積散為散寒濕之藥也不識明哲以為何如  
理中湯和劑方治臟腑中寒口禁失音四肢強直煎治胃脘停痰冷氣刺痛

人參

乾姜炮

甘草炙

白朮各一分

右咬咀每服肆錢水壹盞煎服

四逆湯

和劑方

治傷寒自利脉微欲絕手足厥冷四逆名者四肢逆冷也

甘草炙

乾姜半

附子去皮

右咬咀每服伍錢水壹盞煎七分溫服不拘時

白朮散

活人方

治陰毒傷寒

乾煩燥四肢逆冷

川烏炮去皮

桔梗去芦

白朮

附子炮去皮

細辛各壹兩

乾姜炮半

右為末每服貳錢水壹盞煎六分熱服不拘時

補中益湯

方見內傷

附理中湯

治中寒中濕嘔逆虛弱

人參

白朮

乾薑炒

熟附子各壹兩

甘草炙

右咬咀每三錢薑五片食前煎服少血加當歸

沉附湯

治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑炮

沉香

白朮各壹分

甘草壹錢半

右剉每三錢薑五片煎食前服

薑附湯

治中寒厥冷強直失音口禁吐沫或陰盛發燥

熟附子

乾薑炮

右咬咀每服三錢水壹盞煎半空心溫和服亦治洞泄嘔吐

附子散

傷寒陰證唇青面黑身背強痛四肢厥冷及諸虛沉寒

熟附子三分

當歸

白朮各二分

乾薑炮

半夏麩

各壹分



右坐每服三錢薑五片棗二枚食前煎服

**五丹圓** 治沉寒痼冷方見血證類

**應愛人參散** 治傷寒身熱頭疼亦主痰嗽

人參 白朮 白芷 乾葛

北梗 青皮 各三分 甘草 壹兩 乾薑 壹錢半

右為末每服二錢薑棗煎服

**敗毒散** 傷寒熱證通用

人參 赤茯苓 川芎 北梗

羌活 獨活 前胡 柴胡

枳殼製 甘草 等分

右坐散每服三錢薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

**暑** 附暑風注夏

中暑論

人有常言傷暑做出百般病其果厚誣哉蓋暑之入人伏於三焦腸胃之間至有兼旬累月而不可測識者如嘔吐如中滿如泄瀉如下痢如焦渴如發瘧如腹痛如下血以至諸熱等證苟因暑得之其根未除雖百藥通嘗難施其巧夫人心胞絡與胃口相應胃氣稍虛或因飢胃暑故暑氣自口鼻而入疑之於牙頰達之於心胞絡如響應聲遇暑以還急漱口而勿嚥可也若覺暑毒逼塞咽喉尤當灌滌而吐之傷暑脉虛面垢自汗身熱背寒煩悶大渴倦怠少氣毛聳惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛經云熱則諸毛孔開故灑然惡寒體認不精妄以傷暑為傷寒誤人不小然而暑家何以脉虛暑能消氣氣消則血散脉安得而不虛其或六脉沉伏冷汗自出悶絕而昏不知人此則中暑證候又加重耳治法大要雖貴於驅暑尤貴於和中二者並行則其間雜證不戰而自屈若汗若下若用藥差

冷古人戒之雖然夏月伏陰在內暑家氣虛脉虛或飲水過多或冷藥無度傷動其中嘔吐不食自利不渴此則外熱裏寒無惑手傷暑伏熱之說非也又有冷藥過度胃寒停水潮熱而嘔或身熱微煩此則陽浮外而不內非也不可也抑猶有戒焉暑家脉虛面顴冷汗灑然毛聳手足微寒苟不明辨其裏熱之證誤以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚者蓄血悶亂而斃矣吁可畏哉

中暑證治

**五物香薷湯** 驅暑和中通用

香薷各二兩 白扁豆姜製 厚朴製 白茯苓各壹兩半

甘草壹兩

右剉每服三錢水煎溫服

**香薷縮脾飲** 驅暑和中除煩止渴

縮砂仁貳兩 草菓仁 烏梅肉 香薷

甘草各兩半 白豆蔻姜製 白乾葛各壹兩

右剉每服三錢薑五厚片水煎微溫服

**香薷散** 解暑毒止霍亂

香薷二兩 厚朴製 茯苓 陳皮

甘草各半兩 良薑三錢

右剉細每服二錢半鹽一捻水煎服

**五苓散** 治傷暑煩渴引飲過多小便赤澀心下水氣方見水飲

**六一散** 治傷暑外熱內渴方見血 於內更加生薑為妙

**竹葉石膏湯** 治伏暑內外熱熾煩燥大渴

石膏半斤 半夏盪洗七次切焙 麥門冬去心

人參 甘草各一兩

右麤末每服二錢薑五片青竹葉七片粳米百粒水煎服

**六和湯** 治暑證身熱嘔不甚渴

人參 半夏麴 杏仁去皮微炒 甘草炒

縮砂仁各一兩

茯苓

藿香

宣木瓜

扁豆各二兩

厚朴製三兩

香薷四兩

右劉每服三錢薑五片煎服內傷生冷通用

**陳湯**

現類治傷暑復感冷及內傷生冷

半夏製

橘紅各五兩

茯苓三兩

甘草炙一兩

右吹咀每服三錢薑七片小烏梅壹枚煎服感冷更添生薑

**小半夏茯苓湯**

方見本飲類

**消暑圓**

治傷暑伏熱生痰以致頭痛中痞

半夏

半斤洗淨醋二升

茯苓

甘草生各四兩

右末之用醋并薑汁調半夏煮糊圓桐子大每服七十圓熟

水下暑藥皆可下

**來復丹**

均平陰陽治中暑昏迷霍亂吐瀉

透明硫黃

硝石各一兩

五靈脂去砂石日乾

元精石一兩

研細水飛

陳橘皮去白

青橘皮去白

右靈脂二橘皮為細末次入元精末及硫黃硝石末和畢以

好醋打糊圓豌豆大每服五十圓空心米飲下或五苓散下

或水研灌亦得

**大黃龍圓**

治中暑昏潰眩暈分利陰陽

透明硫黃

硝石各壹兩

白礬枯

雄黃

滑石各半兩

飛羅白麵四兩

右為細末入麵拌和滴水圓桐子大每服十五圓至二三十

圓新汲水下昏塞者水研灌下如無硝石以益硝代來復黃

龍大抵性溫

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸熱湯煖其脘腹即漸蘇醒

次以來復丹為末井水調下無中則以大蒜細研新水調與

之仍以來復丹少許置鼻中或謂中暑最忌得冷來復黃龍井蒜

以水調下者何蓋其藥性溫因寒而發用也

**香薷飲**

和劑方

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之

一方加**黃連**四兩用姜汁同炒令老黃色名**黃連香薷飲**

厚朴去皮炙半斤白扁豆微炒半斤香薷去土壹斤

右咬咀每服三錢水壹鍾入酒少許煎七分沉冷不拘時服熱則作瀉香薷須陳者佳

**縮脾飲**

和劑方

消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁四兩 乾葛二兩 白扁豆二兩 烏梅肉

草果炒去皮四兩 甘草炙各四兩 一方無乾葛有乾姜

右咬咀每服四錢水一大椀煎七分以水沉冷服

**加味五苓散**

齊生方

治伏暑熱二氣及冒濕泄瀉注下或煩或

小便不利

赤茯苓去皮澤瀉 猪苓去皮 白朮各壹兩

宮桂不見火 車前子各半兩

**生津止渴**

人參 麥門冬 五味子

右剉水煎服

**人參白虎湯**

徐同知方

治伏暑發渴嘔吐身熱脉虛自汗

人參一錢半 知母二錢 石膏半兩 甘草炙壹錢

右咬咀入**粳米**一合水二鍾煎至一鍾不拘時執服如伏暑

作寒執未解宜和**五苓散**同煎服伏熱後或冷水沐浴或喫

冷物清氣在脾不覺散令日晡作寒慘壯熱渾身洒淅宜加

**煎服出汗便解**

**大順散**

和劑方

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀下分霍

亂嘔吐臟腑不調

甘草三斤 乾姜 杏仁去皮尖

肉桂去皮各兩

右先將**甘草**用**白砂蜜**炒及八分黃熟次入**乾姜**同炒却入

甲署

百病回春遺卷三

十四

**杏仁** 候杏仁 不作聲為度用篩篩淨後入  
末每服三錢水一盞煎至七分溫服如煩燥并花水調下不  
拘時候以沸湯點服亦可

**十味香薷飲**

百一選方

消暑氣和脾胃

- 香薷 一兩
- 人參 去芦
- 陳皮 去白
- 白朮
- 黃芪 去芦
- 白扁豆 炒去
- 甘草 炙
- 厚朴 去皮姜汁
- 乾木瓜
- 白茯苓 去皮各

右為末每服二錢熱湯冷水任調下

**消暑益氣湯**

東垣方

治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神

減少懶於動作胃滿氣促肢下疼痛或氣高而喘身熱而煩  
心下虛悶小便黃而數大便澇而頻或痢或渴不思飲食自  
汗體虛

- 黃芪
- 蒼朮 米泔
- 升麻 各一
- 人參
- 白朮
- 神麩
- 陳皮
- 澤瀉 各五

- 甘草 炙
- 酒栢
- 麥門冬
- 當歸 各二

- 葛根 二分
- 五味子 九粒
- 青皮 二分

**益元散**

即天水散又名六一散

治中暑身熱小便不利此藥性

涼除胃脘積熱又淡能滲濕故利小便而散濕熱也

- 滑石 六兩 非桂府則不為佳
- 甘草 微炒 壹兩

右為末每服三錢蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白

**豆豉湯**

調下

**桂苓甘露散**

治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利

- 白朮
- 茯苓 去皮
- 甘草 炙
- 葛根
- 澤瀉
- 石膏
- 寒水石 各壹兩
- 官桂 半兩
- 人參 去芦
- 藿香 各半
- 滑石 壹兩
- 木香 貳錢

右為細末每服貳錢白湯下新及水姜湯亦好

**暑病治例**

出明醫雜著

夏家寸寸遺失

十五

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏日人感之自口齒而入傷心包絡之經其脉虛或浮大而散或弦細乳遲蓋熱傷氣則氣消而脉虛弱其為症汗煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭昏自汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平木搖撼不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉利此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然治法不同也

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類暑熱發渴脉虛用人參白虎湯或用竹葉石膏湯亦好見前

東垣清暑益氣湯治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神少胸滿氣促肢節痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗体虛此湯最好見前

若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大厦涼臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾薑藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷水水生冷瓜果之類前藥最加乾姜縮砂神曲之類此非治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是內傷水水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲見前或理中湯見中寒類加神曲麥芽縮砂蒼朮此專治內濕中消食也

中暑

中暑

若吐瀉脈沉微甚者不可用涼藥可用**大順散**見前加**熟附**

**子**等分或**附子**理中加炒**芍藥**

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治濕利小便之藥醫者要識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次

治其外清暑補氣而以理脾為主於前陰陽二條內相兼

取用東垣**清暑益氣湯**已兼此意其用**黃芪****赤廬****人參****白**

**朮****甘草****麥門冬****當歸****五味****黃柏****高麗**是清暑補氣也**蒼朮**

**陳皮****神曲****澤瀉****青皮**是治內補脾也

**附暑風**

**治暑風**卒倒法○凡人中暑先着於心一時昏迷切不可與冷

水飲并臥濕地其法先以熱湯灌或童便灌及用布蘸熱湯

熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其甦省然後進藥若

旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處擲路中熱灰土作窩於臍

中令人**尿**其內即甦却灌以人**尿**或攪地漿飲之半碗或**車**

**輪****土**五錢冷水調澄清服皆可 一方用**大蒜**三兩瓣細嚼

溫湯送下禁冷水即愈

丹溪云挾火挾痰用**陳湯**加**黃芩**實者可用吐法

戴氏曰暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因

痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎爍所以卒

倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞碍心之

竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐內經曰火

鬱則發之吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

**附注夏**

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱者是宜

補中益氣湯去**柴胡****升麻**加炒**柏****白芍藥**挾痰者加**南星****半夏**

**陳皮**煎服又或用**生脈湯**

補中益氣湯 方見內傷門

濕

中濕論

天氣下降地氣上騰二氣薰蒸此即濕也豈必水流濕而後為濕哉且風之撼動人知其為風寒之嚴疑人知其為寒暑之炎熱人知其為暑惟濕之入人行住坐臥實薰染於冥冥之中人居戴履受濕最多况夫濕能傷脾胃土一虧百病根源發軔於此矣帶而為喘嗽漬而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕熱則發黃濕遍體則着濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏不知人至於為身熱為鼻塞為直視為鄭聲為虛汗為脚氣為腹中脹脐下堅為小便難大便自利皆其證也濕家不可汗汗之則發瘥熱而瘥者斃又不可下下之則額汗曾滿微喘而小便淋閉難以有膠治濕之法通利小便為上益脾順氣為中夏伏苓蒼朮白朮官桂乾薑皆要藥耳其若小便快熱不

則伏苓防己輩自有奇功大抵濕之為病易至沉深漸潤之餘淪肌浹髓於斯時也須以木附薑桂作大劑與之藥力根柢病當漸解不可以旦暮而責效焉要之治濕莫若生附蒼朮為快中濕證治

並主之

蒼朮 炒

白朮

甘草 炙

乾薑 炮

伏苓 各貳兩

橘紅

辣桂

厚朴 製

右剉每服三錢薑棗煎服

伏苓

乾薑 炮

甘草 炙

白朮

辣桂

蒼朮 炒

甘草 炙

右剉每三錢水煎服

治腎虛受濕小便自利腰冷而痛重

中濕



乾薑炮 伏苓各貳兩 甘草多 白木各壹兩

右剉每二錢半水煎服加桂亦得

黃耆微炙 辣桂各叁兩 甘草貳兩 白芍藥六兩

右釐散每服三錢薑四片棗一枚煎食前服

不換金正氣散治濕益脾順氣加 伏苓生薑 寒方親

神木圓治濕消飲 防類 可用 正氣散送下

生附除濕湯治寒濕交攻身體冷痛

附子註兩 蒼木製壹兩半 白木 厚朴製半兩

宣木瓜 甘草各叁錢半

右剉每服四錢水二盞薑十厚片煎一盞食前微温服

桂枝附子湯治風濕相搏汗出氣短身體煩疼微腫惡風不效去衣

辣桂貳兩 白木 附子熱格壹兩 甘草壹兩

右剉散每服二錢半水盞半薑七片棗二枚煎一盞食前微

温服小便不利悸氣加 痺加 防 腹痛加 防

甘草附子湯治中濕小便不利大便自利

附子熱乾壹兩 白木 甘草各一兩

辣桂貳兩

右剉每服三錢薑七片煎食前微温服汗出加 防 悸氣加

伏苓

木附湯治傷濕大小便皆自利

白木貳兩 甘草貳兩 附子熱七錢半

右剉細每服三錢薑七片水盞半煎一盞食前微温服

五苓散治濕證小便不利經云治濕之法不利小便非其治也

方見水

茵陳湯治濕氣痰熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳蒿壹兩 大黃半兩 小紅梔子枚

中温

右劉每服三錢水煎服**五苓散**亦治發黃二藥夾煎尤穩

**附諸賢論**

賈真孫曰濕為土氣火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則萬物乾燥濕病本不自生因熱而佛鬱不能宣行水道故停滯而生濕也况脾土脆弱之人易為感冒豈必水不流而後為濕哉人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎暄感人於冥冥之中也病式云諸症強直積飲等證皆屬於濕或附腫體寒而有水氣裏必小便赤少不通或渴是蓄熱入裏極深非病寒也大抵治法宜理脾清熱利小便為上故治濕不利小便非其治也宜**桂苓甘露****木香葶藶****木通**治之守真師曰**葶藶****木香散**下**神弓**此藥下水濕消腫脹利小便理脾胃無出乎此也腹脹脚腫甚者**舟車丸**下之濕熱內深發黃**茵陳湯**下之或佐以**防已****黃**一身盡腫痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜**五苓散**加**官**

**桂苓木**微汗之不可大汗若自汗出多熱燥津液內水不利切勿利之重損津液也宜**茵陳****白朮****白芍湯**主之其濕證有二濕熱證多濕寒證少當以脉證明辨之如脉滑數小便赤澀引飲為濕熱證若小便自利清白大便瀉利身疼自汗為寒濕證治之宜**五苓散**加**生附****蒼朮****木瓜**主之

**附諸方**

**防已黃芪湯**

金匱方治風濕脉浮身重汗出惡風或痛少力

防已 一兩

甘草 兩半

白朮 半錢

黃芪 一兩

右咬咀每服一兩入姜棗煎喘者加**麻黃**胃氣不和加**芍藥**氣上衝加**桂枝**下有寒加**細辛**

按濕勝身重陽微中風則汗出惡風故用**黃芪****甘草**實表

**白朮**

勝溫也足三陰例藥 見寒類

**五苓散**

和濟方治外感風寒胃寒濕身體重痛 各半湯也**蒼朮****甘草**

中濕

按海截云

四下

**陳皮** **厚朴** 即 **平胃散** 也 **枳殼** **陳皮** **茯苓** **半夏** 即 **桔梗** **半**  
**夏** **厚** 也 又 **川芎** **當歸** 治血 燕 **乾姜** **厚朴** 散氣 此數藥相合  
為解表溫中泄濕之劑 去痰消痞 調經之方 雖為內寒外感  
表裏之分 之所制 實非仲景表裏 **麻黃** **桂枝** **參** 附 之的方也  
至於積冷嘔泄時疫 項背拘急 如 **葱** **白** **豆豉** 厥逆加 **吳茱萸**  
寒熱欬逆 加棗 婦人之產加 **附** 始知用之 非一途也 惟知活  
法者 其擇之

**和劑方** 治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀大  
便溏泄皆坐卧濕地或陰雨所襲之也

**蒼朮** **白朮** **甘草** 各壹 **乾姜**  
**茯苓** 各貳兩 **陳皮** **丁香** 各貳錢

右咬咀每服四錢入棗煎  
按此足陽明太陰藥也 溫中勝濕之劑  
**茵陳五苓散** 治濕熱勝發熱黃疸

**五苓散** 伍分

右二物和勻水煎服

**霍亂吐下頭痛口乾** 宣明方 治濕熱內甚煩渴瀉利小便澀大便急痛  
方見暑門

**東垣方** 治表裏有濕熱痿厥癱瘓不能行走或足踝膝  
上背腫痛口乾瀉痢 方見痿門

**三花神佑丸** 宣明方 治一切水濕腫病大腹實脹喘滿  
輕粉一錢 大黃一兩 牽牛二兩 芫花 醋炒

甘遂 大戟 各半兩  
右為末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下無時

日三服  
**平胃散** 和劑方 治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰

**蒼朮** 伍斤 厚朴 姜制炒 陳皮 各三斤 甘草 炒三拾  
右為末每伍錢姜三片棗一枚煎服入鹽一拾沸湯點服亦

中溫 宣明方 治道三

得一方加**草菓名**平胃**菓散**

**升陽除濕湯** 東垣方

**升陽除濕防風湯** 東垣方俱見泄瀉門

**養神散** 治諸般濕氣筋骨疼痛方見風門

**秘授仙方萬應膏** 貼一切濕氣襲於肌肉入於筋骨疼痛不常

貼之神効方見癰疽門

**神弓藥水丸**

治濕熱內鬱胸膈痞滿斂口舌生瘡咽候不利

牙疳齒蝕口臭或遍身生濕瘡乾疥睡語咬牙驚惕怔忡大

小便滯澀風熱酒毒蘊熱等証

大黃 各二 黃芩 各二 牽牛 頭末 滑石 各四

右為末水丸如桐子大每服四伍十九溫水下虛實隨証臨

時加減

**舟車圓**

大黃 貳兩 甘遂

大戟

芫花

青皮

陳皮 各壹

牽牛 頭末

木香 伍錢

右為細末水丸如梧桐子大每服六七十九 **日湯** 下隨時

加減

**經法祛濕煮酒方**

治風濕相搏遍身手足疼痛者服之神効

川芎

威靈仙

荊芥

麻黃

防風

天麻

青木香

金毛狗脊

羌活

獨活

枳殼 各伍錢

川烏

草烏 各四錢 蒼朮

陳皮

川當歸 各伍錢

右咬咀用好頭 **蜜糊** 勿令泄氣用文武火煮熟每服五盞度

壘口再用 **蜜糊** 勿令泄氣用文武火煮熟每服五盞度

**附瘟疫**

瘟疫方治

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗

而加

卷之三

四十二

能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感於勞勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病雜著云冬温為病此乃天時不正陽氣及泄藥忌温熱時行寒疫却在温暖之時時本温暖而寒反為病此亦天時不正陰氣及逆藥忌寒涼又云此病多發於春夏一槩相同者此天地之厲氣當參運氣而施治也

東垣云陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之視其種勢在何部隨經治之當緩勿令重劑過其病所陽明為邪首大腫少陽為邪出於耳前後先以酒炒**本連****豨莶草**煎少少不住服再用

**大黃****鼠粘子**煎入**芒硝**等分時時呷之母令飲食在後及邪氣已只服前藥未已再煎次第服之取大便邪氣已即止陽明局加**石膏**少陽渴加**瓜蒌根**陽明行經**升麻****芍藥****葛根****甘草**太陽

行經**羌活****防風****荆芥**並與上藥相合用之  
**神湯**治時令不正瘟疫妄行  
**升麻葛根湯**治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱

**柴胡升麻湯**治時行瘟疫吐熱惡風頭痛身寒鼻塞咽乾咳嗽涕唾稠枯方見傷寒門

**步柴胡湯**治瘟疫內虛發熱胃腸痞悶渴加**瓜蒌仁**方見血門

**百葉石膏湯**傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐方見暑門

**大青丸**治時行瘟疫發熱並勞役發熱上膈一切結熱神効  
薄荷  
甘草  
黃芩

右為細末用**青蒿**自然汗為丸如菽豆大用**雄黃**為衣治雜病發熱者**硃砂****青黛**為衣每服五六十丸**白滾湯**送下

**黃連解毒湯**治時疫三日已汗解或因飲酒復劇若煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不睡方見眼目門

**解毒散**蘊要方  
獨活  
前胡  
人參  
茯苓

川芎 枳殼 枳梗 甘草  
荆芥 牛旁子 薄荷 防風  
羌活 薄荷 各一錢

右咬咀水煎服如內熱加**黃芩**一錢口渴加**天花粉**一錢

**四君子湯** **四物湯** 俱見補損門 **補中益氣湯** 方見內傷門

**嶺南諸病** 出明醫雜著  
春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱脇膈飽悶不思飲食此毒氣從鼻口入內也清當清上焦解內毒行氣降痰不吐發汗

黃連 升麻 蒼朮 厚朴 枳實 木通  
黃芩 木香 蒼朮 厚朴 枳實 木通  
半夏 桔梗 柴胡  
生甘草 七分

**生姜** 五片水一鍾半煎七分食前熱服滓煎四分繼服

寒溫不節汗身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發挑頭疼此傷寒類也但嶺南氣溫易出汗故多類瘧重則寒熱不退輕則為瘧南方氣升故嶺南人得此病者卒皆曾滿迎風壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而裏自和者不同治當解表清熱降氣行痰此方用於寒涼時月及雖在溫暖時而感冒風寒者

羌活 蒼朮 柴胡 黃芩  
橘紅 半夏 枳實 甘草  
川芎 絡

五片水一鍾半煎七分食前溫服渣煎四分隨服取汗

瘧瘧時瘧寒熱往來

柴胡 知母 半夏 蒼朮 陳皮 川芎  
黃芩 酒炒 乾葛 陳皮 川芎

甘草分七

**生薑**三大片 **烏梅肉**二箇水一鍾半煎七分食前清震服滓

前四分午前服 瘡久者加人參一分 當歸一錢 汗多者去 **蒼朮** 換 **白朮** 加酒

炒 **白芍藥** 各一分半

後變成痢疾瘡後之痢從虛治用補脾胃藥

黃連炒

木香

宿砂

黃芩炒

橘皮

當歸 酒洗各一分

白朮 壹分

白芍藥 炒式

甘草分五

**生薑**三片水二鍾煎八分食前熱服

溫暑之月民病天行瘟疫熱病治宜清熱解毒兼治內外

枯苗芩炒

知母炒

乾葛 各一分

石膏

白芍藥炒

人參 各一分

黃連 炒

生地黃 酒洗各五分

升麻 一分

生甘草 七分 羌活 三分

**生薑**三片水一鍾半煎七分食前熱服滓煎四分繼服若

腫痞悶痰涎壅塞者加 **枳實** **半夏** 各壹錢 **生薑汁** 四五匙若

胃不實加 **白朮** 壹錢

時氣發熱變為黃病所謂瘟瘡也宜治內瀉濕熱

茵陳

黃連 炒

山梔仁

白朮

白茯苓 皮去

厚朴 炒

木通 皮去

人參 各壹錢

白芍藥 炒

乾葛 各壹錢

**生薑**三大片水二鍾煎七分食前溫服查煎四分繼服

**附運氣證治** 出乾坤生意

運氣證治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機考氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨補瀉之法施寒熱溫涼之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠哉言也今遵先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

瘟疫

卷之三

四二

甲巳得合為土運 乙庚得合為金運 丁壬得合為木運  
丙辛得合為水運 戊癸得合為火運

六氣為司天之歲

子午少陰君火 丑未太陰濕土 寅申少陽相火

卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水 巳亥厥陰風木

南政北政

甲巳運為南政蓋居中央君導南面而行餘四運以臣事之面北面受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年君火司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者手少陰心經也心者君主之官神明出焉君火乃

主宰陽氣之本餘象生土乃發生萬物之源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事于上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒即起至二月驚蟄終止

天時 寒風切冽霜雪水冰 伏藏

民病 閉却禁固 夜中外 瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補瀉瀉心

自二月春分即起至四月立夏終止

天時 風與特寒雨生 羽蟲

民病 於上而熱令人 目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛

自四月小滿即起至六月小暑終止

天時 大火行熱氣生 羽蟲不鳴燕 百舌在宇之類

民病 厥熱 偏寒 更作 咳喘 目赤

四之氣太陰濕土用事子母相順瀉肺補腎

氣運



自六月大暑節起至八月白露終止

天時 大雨時行寒熱互作

民病 黃疸衄血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 溫氣乃至初冬尤暖萬物尚榮

民病 寒熱伏邪於春為瘧

六之氣太陽寒水用事火衰心病瀉賦益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病 生腫咳喘甚則血溢下連小腹而作寒中

丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候

大陰濕土者足大陰脾經也脾屬中央戊己土每季寄旺

一十八日合為七十二日以應一歲六六三百六十日之

成數也

太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄終止

天時 大風發榮雨生毛虫

民病 血溢經絡拘強關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補酸

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 大火至疫癘君令宣行濕蒸相搏暴雨時降

民病 瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺尅水補腎瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 雷雨電震地氣騰濕氣降

民病 身重附腫胸腹滿感冒濕氣

要氣

卷之三

四十七

四之氣大陰濕土用事其旺鹹衰補腎益膀胱

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 水沸騰地氣升濕化不流

民病 膝痺 脾血 暴溢 寒瘧 心腹 脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉肺

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 大涼 露降

民病 皮膚 寒瘧 痢甚行

六之氣太陽寒水用事以上尅下瀉脾補腎

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 大寒 凝冽

民病 閉節 禁固 腰腿 拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候

少陽相火者三焦浮流之火火邪炎上上尅肺金金受尅

腎水失母則上盛下虛虛陽上攻變生諸疾致傷元氣

厥陰風木在泉

初之氣厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 暴風 傷人 疝氣 流行

民病 寒熱 交作 夜逆 頭痛 血氣 不調 心腹 不快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 暴風 疾雨 溫濕 相蒸

民病 上熱 下逆 胸膈 不利 頭痛 寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補肺益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 炎暑 亢旱 草萎 河輸

民病 煩勞 目赤 喉閉 失血 熱渴 風邪人多暴死

四之氣太陰濕土用事火能生土瀉肝補脾

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風雨時降炎暑未去

民病 瘧痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉胃補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 寒熱風雨草木黃落

民病 寒邪風熱君子周密

六之氣太陽寒水用事心火受邪瀉鹹補苦

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 寒溫無時地氣正寒霜露乃降

民病 感冒寒邪關節不利心腹痛

卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候

陽明燥金者節與太陽之氣象庚辛金也

少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事金木相尅補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起二月驚蟄終止

天時 陰始凝風始肅水乃冰寒雨多花開遲

民病 寒熱痺痺夫血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 巨君居位大熱早行

民病 疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事土盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 燥熱交合風雨暴至

民病 寒熱頭暈心煩作渴

四之氣太陰濕土用事以下生上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 早秋 寒雨有傷 百稼

民病 卒暴 寒熱 風邪傷人 心疼 浮腫 瘡瘍 失血

五之氣 陽明燥金 用事 金盛木衰 瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 不行 春令 草木生青 風雨生虫

民病 寒熱 作痢 氣血不和

六之氣 太陽寒水 用事 客來助主 益吉 瀉臍

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 氣候反溫 蟄虫出現 反行春令

民病 疫癘 溫毒 寒熱 伏邪

辰戌年太陽寒水司天 歲氣寒化之候

太陽寒水者足陽明經也與足少陰腎經合為表裏傷北

方壬癸水

大陰濕土在泉

初之氣厥陰風木 用事 脾胃受邪 瀉臍助耳

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 氣早 暖早 榮溫 風至

民病 溫疫 寒熱 頭眩 嘔吐 瘡瘍

二之氣少陰君火 用事 心火受邪 瀉臍補耳

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 春寒 多雨 寒濕 無時

民病 氣鬱 中滿 浮腫 寒熱

三之氣少陽相火 用事 以上冠下 瀉臍助舌

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 暴熱 乍涼 疾風 暴雨

民病 寒熱 心煩 瘡癩 瘡瘍

四之氣大陰濕土 用事 木旺土衰 瀉耳補酸

五

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風濕交爭雨生 邪氣暴風疾雨

民病 大熱短氣赤白痢瀉

五之氣陽月燥金用事金生水旺制 誠益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 濕熱而行客行主令

民病 氣虛客虛血熱妄行 脈氣雍盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉助 舌

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 凝寒雨雪地氣正 凝令行

民病 病乃寒慘 孕婦多火脾受 濕肺旺 肺衰

巳亥年厥陰風木司天歲氣風化之候

厥陰風木者足厥陰經也 肝屬東方甲乙木春旺七十二日也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸 補甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒始 肅客行主令 殺氣方至

民病 寒居右脇氣滯脾胃虛腫

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心 補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 寒不去 霜雪來殺無施 水草焦 寒雨至

民病 熱中氣血不升降

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦 益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 風熱大作雨生 羽虫

民病 疾出耳鳴掉眩

四之氣太陽濕土用事木土相刑瀉酸 益甘

五十一

自六月**天暑**節起至八月**白露**終止

天時 **熱**返用山澤**澤**風雨澤溫

民病 心受邪**黃疸**面為**浮腫**

五之氣**陽明燥**金用事以**金**刑木瀉肺益**肝**

自八月**秋分**節起至十月**立冬**終止

天時 **燥**更朦沉陰乃布**風雨**乃行

民病 及肺受**風**脾受**燥**發為**瘧**

六之氣**太陽寒**水用事主助客勝瀉**心**補**脾**

自十月**小雪**節起至十二月**小寒**終止

天時 **寒**司令陽乃**火**化**雷**出現流水不**水****地氣**

大發**草**乃生

民病 **瘧疾****心腎**相制

○謹按運氣之說內經言之詳矣夫人在氣交之中與天地相為流通苟不先立其年以明其氣臨病施治之際烏乎以用

補瀉之藥哉此運氣證治不可不知也又嘗按而驗之多有不應何則陰陽之消長寒暑之更易或失其常在智者通其活變豈可膠柱鼓瑟按圖索驥也耶

新刊仁齋直指附遺方論卷之二終

新刊仁齋直捷附遺方論卷之二

手足緩直而翹林越瑟對圖索難出唯

不勝何頃氣則之保其寒暑之更甚如夫其常至皆宜慎有  
漸以之藥好也 數辰益益不可不戒也又嘗對山鱗之多既

新刊仁齋直捷附遺方論卷四

# 風緩

痿証

風緩方論

風緩者風邪深入而手足為之緩弛也夫人四肢百脉逢寒則  
牽急遇熱則柔緩病在陽經氣行遲而關以縱病在陰經氣行  
疾而關以收此物理之常然也然脾主肌肉四肢胃為水穀海  
所以流布水穀之氣周養一身脾胃既虛肢體失其所養於是  
風邪襲虛由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不為之緩  
廢乎若曰驅風之劑與助胃之劑不同亦顧吾活法用之何如  
耳抑余聞人之一身筋骨為壯肝主筋腎主骨肝腎氣虛風邪  
襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於此尤當  
如意

風緩證治

風緩

**排風湯** 續命湯

此散風毒邪氣

方見風類加

**製干葛**

**雞心大續命**

增薑煎先以

蘇合香圓用沸湯泡生薑汁調開吞真白圓子貳拾圓日貳

服治手足風緩或白圓子安腎圓夾用食前服方見散門水飲門

不換金正氣散方見寒類加川芎自煎煎食前吞安腎圓治脾

胃肝腎俱虛風入四體筋骨緩弱不仁仍早晨常服炒黑豆淋酒

大聖新金丹治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯頑痺麻痺癩

癩倒地閉目作聲項強反張口禁直視

大川烏炮大附子炮去新羅白附子炮去各貳兩

川五靈脂白傷蚕妙去白羨梨妙去各壹兩

白礬妙朱砂沒藥麝香別研各半兩

右細末合和用松煙墨半兩新汲水磨汁搜圓每兩作陸圓

金箔貳伯片為衣令自乾每服壹圓以生薑半兩取自然汁

磨開溫酒半盞調服蓋取微汗為效

**大鐵彈圓**治中風難緩口眼喎斜筋骨攣疼肢體麻木

自然銅燒紅醋淬半兩虎脛骨酒浸當歸酒浸

白附子炮去川烏炮去五靈脂妙麻黃去節各壹兩

沒藥乳香全蝎焙安息香烏蛇肉酒浸焙乾

白芷直僵蚕妙去朱砂麝香各壹分

木鱉貳拾壹箇右為末以酒煮安息香入飛白麪為糊圓彈子大每壹圓溫

酒磨下

**唱附散**治肝腎氣虛風入筋骨手足緩弱

小附子去皮生草烏頭炮去皮當歸蜜炙蒼朮妙

牛膝酒浸川芎黃耆蜜炙天麻各半兩

防已白芷全蝎各壹分

右末每壹錢黑豆淋酒調下兼用核桃肉研酒下食前服

**四斤圓**治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢酸疼痺痺



宣木瓜

去穢切焙

天麻

剉

牛膝

剉焙

茯苓

切焙

附子

各壹斤

虎骨

各壹斤

剉

各壹斤

右為末用浸藥酒調麪糊圓桐子大每服冬肆拾圓食前溫

酒或日淋酒下

又方

加

參分

乳香

沒藥

五靈脂

各半兩

麝香

壹錢

名大

四

虎骨

剉

治諸風

緩弱

及歷節

風骨節酸疼

虎脰骨

剉

治諸風

緩弱

及歷節

風骨節酸疼

右搗碎如米每骨壹升以酒叁升浸伍日空心服壹盞冷則

暖之

織骨丹

織骨丹

方並見風類

治諸風

緩弛

其他用藥

風類

甚詳

也矣

附

痿

證

論

痿證方論

內經曰肺熱葉焦五臟因而受之發為痿蹶心氣熱生脉痿故  
脛縱不任地肝氣熱為筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痺  
而不任腎氣熱生骨痿故足不任身然治痿獨取陽明陽明者  
五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也云故陽  
明則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也或曰手陽明大腸經肺  
之腑也足陽明胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也願  
明以告我丹溪先生曰內經云諸痿生於肺熱只此一句便見  
治法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北方此固是就生尅  
言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方  
火心也北方水腎也五行之中惟火有一腎雖有二水居其一  
陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體  
燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也  
火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得

火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所  
 勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能  
 為用而諸痿之病作矣瀉南方則肺經清而東方不實何脾傷  
 之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則  
 宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱隆吉亦曰  
 風火既熾當滋腎水東垣先生取**黃柏**為君**黃芩**等補藥之輔  
 佐以治諸痿而無一定之方有蕪痰積者有濕多者有熱多者  
 有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖針藥  
 中肯綮矣若將理失宜聖鑒不治也天產作陽厚味發熱先哲  
 格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也  
 丹溪云痿證斷不可作風治而用風藥有濕熱濕熱痰氣虛血虛  
 瘀血濕熱東垣**健步丸**加燥濕降陰火藥**蒼朮****黃柏****牛膝**  
 之類濕熱**二陳湯**加**蒼朮****白朮****黃芩****黃柏****竹瀝****姜汁**氣虛**四**  
**君子湯**加**黃芩****黃柏****蒼朮**之類血虛**四物湯**加**黃柏****蒼朮**煎

**送補陰丸** 方見虛損門 亦有食積死血妨碍不得下降者大

**率屬熱用** **木四物湯** **黃柏**之類

**清燥湯**

東垣方 治溫熱成痿以燥金受溫熱之邪是絕寒水生

化之源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動  
 黃芪 壹錢半 蒼朮 壹錢 白朮 橘皮

澤瀉 各 五味子 九个人參 白茯苓

升麻 各叁分 麥門冬 當歸身 生地黃

麩末 術炭 酒黃柏 各貳 柴胡

黃連 甘草 各壹分

右咬咀每半兩水煎空心熱服

**健步丸** 治膝中無力伸而不得屈屈而不得伸腰背腿脚沉重

行步艱難

羌活 柴胡 各半兩 防風 叁錢 川烏頭 壹錢

炒滑石 炙甘草 各半 防己 壹兩 苦參 壹錢 酒制

肉桂 半錢

瓜蒌根 酒製 兩 澤瀉 三錢

右為末酒糊圓如桐子大每服柒拾圓煎愈風湯空心送下

愈風湯

方見風門

陳湯

方見瘧門

四君子湯

四物湯

方並見虛勞門

謹按風痿之別痛則為風不痛則為痿經曰痛則為實不痛則為虛曰風曰痿虛實二者而已矣東垣曰氣盛病盛氣衰病衰何則人之氣血充實而風寒客於經絡之間則邪正交攻而疼痛作矣人之氣血弱虛而痰火起于手足之內則正不能勝邪而痿痺作矣舟溪先生曰痿症切不可作風治而用風藥蓋以風為實而痿為虛也曰散邪曰補虛豈可紊亂矣



# 歷節風

附

痺証

歷節風方論

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁癯其體脫漸至摧殘其痛如掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空掩護不謹以致風寒濕之邪徧歷關節與血氣搏而有所疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黃汗出者為風多通身走癢徹骨疼痛晝靜夜劇發如出蟻者謂之白虎歷節治法當以溫藥解其風寒濕之毒或用和平則獨活寄生湯輩可也其白虎歷節遊走癢痛中實為之况夫脾主肌肉虛則為癢遇癢而進飲食尚庶幾焉而出亦厭飲其間不至於頓上齒也書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳以此證候一名厲風須當大作湯圓未可拘以平常淺近之劑

歷節風證治

虎骨散

治白虎歷節走注痒痛不得屈伸

虎脛骨

酒炙

白芍

酒炙

天麻

自然銅

用醋

防風

白附子

炮

官桂

虎骨散

五

當歸

羌活

牛膝

白芷

川芎

僵蚕炒去絲 全蝎焙

地龍去土

乳香

沒藥

雄黃各半兩 麝香壹分

右末每服二錢食前以煖豆淋酒調下

**雄鹿丸**

治歷節風骨節疼痛急痺頑

安息香

五靈脂

天麻各壹

地龍淨

白僵蚕微炒各 全蝎微炒

雄黃各半兩 麝香壹分

烏蛇肉多取 天雄炮去

當歸

川烏炮去

川芎

南星炮

官桂

虎脛骨酒炙黃

川獨活貳兩

右末煉蜜作圓桐子大每服拾伍圓食前温酒下

**海桐皮散**

治歷節走注骨節疼痛

獨活

草薢鹽水

川芎

當歸各三分

桃仁去皮焙 天麻

辣桂

牛膝

麻黃法製

枳殼製

海桐支

白芍藥

川烏炮去

松節

防風

杜仲薑製

甘草各

麝香壹分

虎脛骨西炙黃

右鹿末每服貳錢薑伍片棗貳枚食前服

**獨活寄生湯**

治歷節風亦治脚氣方見暖風門

**虎骨酒**

治白虎歷節遊走腰痛狀如虫嚙方見風類

**虎骨酒**

治歷節諸風百節疼痛方見風緩門

**硫黃酒**

治惡風頭面肢體癢疹疔癰

透明蜂芒硫黃

右每服參錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清者滓又

开細入酒飲之連日如是硫黃能殺惡虫自大便下

**必用歷節風方**

治手指彎曲骨節間痛甚

草麻子去皮

黃連去鬚劉如豆

右用新水貳升於磁甌內浸貳藥蜜封柴目取出逐日侵晨

而東以浸藥之石(軍麻)壹粒柴日後添兩粒微利不妨以療大風亦效

**反魂丹**命再造散治大風厲風

川大黃綿散破者獨生皂角刺一兩半

右未每服貳錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄虫如虫口黑色乃是多年虫口赤色是為方近三數日又進壹服直候無虫則絕根也瘰癧若喫醋則風疹食人

**神授圓**治風寒濕合而為痺通身或半身麻木不仁最能殺虫方見盧勞門用增味五厘湯下空心服方見風類

**白虎風走注癢痛方**

雞子皆患此况參過願送薑堆頭蓋白虎是薑神愛喫雞子患者下飯用黃脚雞為妙亦可抱雞來壓之其癢自止

**麝香圓**治白虎風歷節風遊走疼痛通身癢癢狀如出齧書靜夜劇方見風類

**四妙散**治歷節痛風走注

威靈仙酒浸 羊角灰二錢 白芥子一錢 蒼耳一錢

右為末每服一錢生姜一大片搗汁入湯調服

**洗藥方**治一切風氣濕氣足脛羸腫疼痛並皆有效

荆芥 菴白草 防風 蒼耳草

苦參 地榆 青藤 威灵仙

麻黃 蒼朮 生葱 煨鹽略

右件用水一桶煎熱於桶內薰蒸痛處出微汗待湯稍溫再洗痛處一二次竟痛減如或貧者只用柘柳榆槐桑椿六件椹枝煎湯洗之亦有神効

**大補元丸**

人參去芦 黃芪去芦 白朮酒浸 當歸酒洗  
生地黃酒洗 陳皮去白 白芍酒洗 黃柏酒洗

知母 酒二兩  
 牛膝 酒二兩  
 巴戟 三兩  
 右件共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九用白滾湯送下或淡酒姜湯清米飲送下亦可

祛風丸

防風 二兩  
 川芎 二兩  
 桑寄生 二兩  
 何首烏 二兩  
 獨活 二兩  
 青藤 二兩  
 木香 二兩  
 右件共為細末酒打米糊為丸如梧桐子大每日五更時用

清茶送下七八十九少許時再服前大補元丸

愈風化痰丸

何首烏 酒浸  
 南星 姜製  
 牙皂 瓦炒  
 地黃 去土八  
 川烏 去皮  
 漢防已  
 獨活 各一兩  
 右件共為細末酒打米糊為丸如梧桐子大每服一伯九空  
 心食前酒送下日服二次  
 諸風應効酒治一切諸般風氣濕痺遍身骨節疼痛紫白癩風  
 神効  
 當歸  
 川芎  
 何首烏 各二兩  
 蒼朮 四錢

山茱萸 淨肉 二兩  
 遠智 去心 二兩  
 石菖蒲 去毛 二兩

山藥 二兩  
 杜仲 姜汁炒 一兩

破故帛 二兩  
 兔系子 炒 二兩

防已 二兩  
 生地黃 酒洗 三兩

薤白 仁 一兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

黃芩 酒炒 各一兩  
 牛膝 酒洗 一兩

桂枝 一兩  
 光烏 酒浸 去皮 二兩

沉香 一兩  
 木瓜 一兩

白芍藥 酒炒 二兩  
 白朮 炒 二兩

陳皮 去白 二兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

半夏 便者 一兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

破故帛 炒 一兩  
 沉香 一兩

木香 一兩  
 黃芩 酒炒 各一兩

天麻 二錢  
 當歸 酒洗 各一兩

白朮 炒 一兩  
 羌活 一兩

杜仲 姜汁炒 一兩  
 巴戟 去心 三兩

桑寄生 一兩  
 陳皮 去白 一兩

半夏 便者 一兩  
 沉香 一兩

破故帛 炒 一兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

牙皂 瓦炒 一兩  
 黃芩 酒炒 二兩

地黃 去土八 一兩  
 防風 去芦 一兩

川烏 去皮 一兩  
 羌活 一兩

漢防已 一兩  
 當歸 酒洗 各一兩

獨活 各一兩  
 巴戟 去心 三兩

杜仲 姜汁炒 一兩  
 陳皮 去白 一兩

桑寄生 一兩  
 沉香 一兩

破故帛 炒 一兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

牙皂 瓦炒 一兩  
 黃芩 酒炒 二兩

地黃 去土八 一兩  
 防風 去芦 一兩

川烏 去皮 一兩  
 羌活 一兩

漢防已 一兩  
 當歸 酒洗 各一兩

獨活 各一兩  
 巴戟 去心 三兩

杜仲 姜汁炒 一兩  
 陳皮 去白 一兩

桑寄生 一兩  
 沉香 一兩

破故帛 炒 一兩  
 白芍藥 酒炒 二兩

牙皂 瓦炒 一兩  
 黃芩 酒炒 二兩

地黃 去土八 一兩  
 防風 去芦 一兩

川烏 去皮 一兩  
 羌活 一兩

漢防已 一兩  
 當歸 酒洗 各一兩

獨活 各一兩  
 巴戟 去心 三兩

其方附過者四

白芷

苦參

防風

胡麻

石南藤

石連藤

姜蚕

各二錢

細辛一錢

川山甲

黃柏

知母

白芍藥

生地黄

牛膝

白朮

藜蘆

木瓜

大風子

威靈仙

羌活 各二錢

川烏 一錢

八角風

五加皮

紫荊皮 各二錢

木香 一錢半

薏苡仁 三錢

右件共為粗末用好酒一壇將藥用絹袋之懸於壇口下用文武火煮一二時辰取出放於濕泥去火毒任二三日再服

每服加後末藥入內飲之亮力而用末藥方於後

入酒末藥方每服前藥一鍾加此末藥八分入酒服之

烏藥

白芷

木香

荊芥

甘草

何首烏

川烏

青藤

藜蘆

天麻

金銀花

蒼朮

金蠟

細辛

防風

草烏

川芎

人參

當歸

石斛

麻黃

兩頭尖

右件共為細末入煎藥酒服之効

治一切腫風白虎歷節疼痛

當歸 六分

川芎 八分

蒼朮 六分

白朮 九分

白芍藥 九分

枳椇 九分

生地黃 二分

半夏 一分

甘草 九分

烏藥 一分

麻黃 三分

茯苓 二分

防已

陳皮

木通

薏苡仁 各一分

五加皮 一分

木香 六分

桑寄生 二分

黃芩 八分

羌活 二分

獨活 二分

牛膝

木瓜 八分

海風藤 三分

蘇葉 四分

右件共為粗末煮法照前

治諸風氣歷節插腿風年高者亦可服神効

當歸	人參	茯苓	烏藥
砂仁	杏仁	川烏	草烏
何首烏	五加皮	枸杞子	川椒 <small>已上各二各半</small>
木香	牛膝	枳殼	乾姜
虎骨	香附子	白芷	厚朴
麥門冬 <small>去心</small>	陳皮 <small>去白</small>	白木	川芎
麻黃	獨活	羌活	半夏
肉桂	白芍藥	生地黃	熟地黃
防風	天門冬	五味子	小茴香
細辛 <small>已上各一各</small>	蒼木	破故布	葶草 <small>各五</small>
核桃肉	紅荳	酥油 <small>各五分</small>	蜜 <small>八兩</small>
沉香 <small>五分</small>	葡萄 <small>二系</small>	荊芥	地骨皮
山茱萸	巴戟	知母 <small>各一分</small>	

右為細末分作二袋用確盛酒袋懸於確內封確口安局內

者熟過五七日方用每服隨量飲病在上食後服病在下食前

**金刀如聖散** 治三十六種風七十二般氣口眼歪斜半身不遂

遍身遊風白虎歷節疼痛立効

川烏 <small>炮</small>	草烏 <small>炮各四</small>	硃砂 <small>另研</small>	雄黃 <small>另研</small>
荊芥	麻黃 <small>去根</small>	天麻	當歸
何首烏	細辛	石斛 <small>去芦</small>	人參
全蝎 <small>去足</small>	川芎	甘草	防風 <small>已上各</small>
蒼木 <small>海浸炒一兩</small>			

右研為細末每服五分臨臥温茶送下如病長者初服三分徐七加至七分看人肥瘦大小加減

**又治証同前**

蒼木 <small>海浸炒一兩半</small>	防風 <small>去芦</small>	細辛	荊芥穗
何首烏	蟬退	全蝎	硃砂 <small>另研</small>
白姜蚕 <small>水洗微炒</small>	麻黃 <small>去根</small>	藁本	當歸 <small>酒洗</small>



天麻各一分 川芎去根各三分

川烏煨 草烏煨各一分 乳香

烏藥 青藤各三分 白芷五分 甘草微炒一分

兩頭尖一分 雄黃一分 蜂房五分 白芍藥一分

右為極細末臨臥時用溫茶送下諒人虛實有力者服八分

起至一錢止老弱者只服五六分止

**羌活湯** 治白虎歷節風毒注骨髓疼痛不定 方見痺門

**烏頭湯** 治歷節痛不可伸屈

川烏一枚用蜜四合 甘草灸 麻黃去節

芍藥 黃芪各等分

右水煎一合丹煎至八分去查空心服最治脚氣不可屈

# 附痺証

## 痺証方論

袖珍方曰凡痺疾病目有五種筋痺脉痺骨痺皮痺肌痺是也  
多由体虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵不能隨時驅散  
流注經絡久而為痺病者也風多則引注寒多掣痛濕多則重  
着治之當辨其所感風寒濕三氣注於何部分其表裏須從偏  
勝者王之藥餌如有此証治之宜早為貴乎

**五痺湯** 和劑方 治風寒濕之氣各留肌腠手足緩弱麻頑不仁

羌活 白朮 防己各一兩 片子姜黃去灰上

甘草微炙

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去粗病在上食

後服病在下食前服

**防風湯** 宣明方 風寒濕三氣合為痺風氣勝者行痺上下左右

無留隨所至作防風湯主之 治行痺行走無定

防風 甘草 當歸 赤茯苓去皮

痺証方

惠濟附送卷四

二

杏仁去皮 桂各一兩 黃芩 泰朮

葛根各三錢 麻黃去節 右為末每服伍錢酒水各二盞棗三枚姜伍片煎至一盞温服

**伏苓湯** 宣明方 寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜通氣 温經而愈伏苓湯 加減主之 治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫

赤茯苓去皮 桑白皮各二兩 防風 官桂 川芎 芍藥 麻黃去節

右為末每服伍錢水一盞棗一枚煎至八分温服以粥投之汗泄為度効矣

**伏苓川芎湯** 宣明方 濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著而不 去多汗而濡者伏苓川芎湯 主之 治著痺留注不去四肢 麻木拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂

川芎 麻黃 芍藥 當歸

甘草每分 右為末每服四錢半水貳盞棗三枚同煎至一盞去滓空心 温服如欲出汗以粥投之

**續命湯** 濟生方 治手足冷痺腰腿沉重及身熱煩疼背項拘急

當歸洗 赤芍藥 黃芪去蘆 防風去蘆 片子姜黃 羌活各一兩 甘草各半

右咬咀每服四錢水一盞半姜伍片棗一枚煎八分去粗温服

**防風湯** 濟生方 治血痺皮膚不仁

川當歸洗 赤伏苓去皮 川獨活各一兩 甘草多半 防風 一兩 赤芍藥 黃芩各一兩 杏仁去皮

泰朮去蘆 桂心不見火 右咬咀每服四錢水一盞姜伍片煎七分去粗温服不拘時

**續斷丸**

本事方

治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒

川續斷

草薢 各一兩

川芎 七錢半

乳香 半兩

天麻

防風

附子 各一兩

沒藥 半兩

**黃耆酒**

濟生方

治風濕痺痛筋脉攣急或身軀頑痺

當歸 去芦

雲母粉

茵芋葉

白木

虎骨

草薢

木香 不見火

仙靈皮

川續斷

甘草 炙

白芍藥

黃耆 去芦

防風 去芦

官桂 不見火

天麻

石斛 各一兩

右吹咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞溫暖服之常令酒氣相續為佳

**茯苓湯**

濟生方

治停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏 湯洗七

赤茯苓 去皮

陳皮 各一兩

枳實 去穢

桔梗 去芦

甘草 炙

右吹咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分溫服

**損續斷丸**

本事方

治寒溫之氣痺帶關節麻木疼痛

人參

防風

鹿角膠

白木 各一兩

麥門冬

乾地黄

黃芪

續斷

薏苡仁

山芋

牡丹皮

桂心

山茱萸

白茯苓

石斛 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒空心下

**羌活湯**

濟生方

治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活 去芦

附子 炮皮

秦元 去芦

桂心

木香 不見火

川芎

當歸 去芦

牛膝 酒洗

甘草 炙

桃仁 去皮尖

骨碎補

防風 去芦

**虎骨散**

濟生方

治白虎風肢節疼痛發則不可忍

右吹咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服



施藥固在權衡然古人以此名為緩風謂其感於風毒所致則  
 總治之法大要疏導大便使毒氣得泄而後愈但分劑不可過  
 焉其補湯淋洗皆醫家之大戒也雖然脚氣治法以疏利毒氣  
 為先蓋慮乎氣突而死矣然表裏之有異經於熱之有異證或  
 因也病而後發或致他病之續主又不可以不通其變所謂寒  
 則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛氣之扶養其中疑  
 陰蘊毒為之溫利是又胃中之活法矣其或療治不早使毒氣  
 入復衝心攻築作痛喘滿上氣嘔吐異常此則漸入頓深或者  
 自貽奄忽

脚氣證治

二十四味輕脚圓浴脚氣通用

- 當歸 酒浸 川芎 草薢 薑乾 羌活
- 杜仲 姜製炒 石南葉 薏苡仁 大雞心 攪榔
- 華陰細辛 枳殼 各一兩 蒼朮 炒 五加皮

防風

獨活

續斷 洗 牛膝 酒浸 炙

木瓜 酒浸 炙

威靈仙

海桐皮

木香

木瓜

麻黃 去節

川五靈脂

沒藥 各三分 研

滴乳香 華兩

右細末酒浸雪糕為圓桐子大每服伍拾圓細對煎湯

食前煎湯下或

木瓜散 脚氣通用

大腹

炒蘇

羌活

木香

伏苓

陳皮

甘草 各半兩

宣木瓜 乾 兩

右細末每冬錢壹兩煎服

脚氣通用

半夏 製

真蘇子 微炒 冬

當歸

厚朴 製

甘草 炙

北前胡 各二兩

肉桂

陳皮 各三兩

右判散每冬錢壹伍片棗兩枚煎服如無蘇子以蘇葉貳兩

代之

**檳榔散** 治風毒脚氣腫痛

掃葉 杉木節各一握

右童子尿壹盞醇酒半盞煎陸分濾清乘熱調**檳榔末**貳錢食前服**非風湯**通用方見風類

**生木瓜** 脚氣通用

宣州生木瓜就蒂切壹盞取出穢以王蠶絲塞筒合蓋

右入**五寶散**末和圓桐子大日乾每服柒拾圓食前醇酒下

**上嘔湯** 治脚氣嘔逆吐瀉轉筋

宣木瓜壹味細剉每服肆錢新水煎服神效

**檳榔壹物湯** 治脚氣攻注手足不能牽

雞心大檳榔

右末每服叁錢用**柴葉**連梗摘皮壹全箇不去白薑伍

片煎湯乘熱調下治脚氣衝心痛悶用童尿煎服治脚心串

痛温酒調下

**海桐皮酒** 治風毒脚氣膝脛疼痛

海桐皮 五加皮 川獨活 枳殼製

防風 杜仲薑製炒牛膝 酒浸熟 薏苡仁炒各壹兩半

生地黃貳兩半

右末用綿裹以醇酒壹斗春浸七日秋浸拾肆日每日空心

温服壹盞午前壹盞

**治脚氣攻心痛悶脹滿不食**

青皮 陳皮 天台烏藥 雞心檳榔

宣木瓜 乾杉木節半夏製 枳殼製

縮砂仁 赤伏苓各半丁香 茴香微炒

大腹皮 紫蘇子微炒 羅蔔子微炒 北梗

甘草各一分

右剉每叁錢薑伍片煎

**三和散** 加木香煨 枳殼方見水飲門 **和劑流氣散** 方見脹滿門

**分氣紫蘇飲**

方見喘門

**烏藥順氣散**

方見中風門

脚氣通用

**疏導毒氣**

枳殼製兩

甘草一兩半

右末每服貳錢濃煎

木瓜湯調下如要

利更加麻仁

**脾約丸**

治脚氣大便秘澀

麻仁別研

杏仁各五兩半

枳實製

厚朴製

芍藥各半斤 大黃壹斤蒸切熬

右末煉蜜圓桐子大每貳拾圓食後熟水下或**敗毒散**加火

**黃連湯**

治脚氣風熱煩悶發渴大便不通

木香

大黃各半兩 黑豆一兩

升麻三分

右剉每服叁錢烏梅貳箇新水煎服

**追風毒散** 治脚氣熱多證踈泄風毒

活一兩

雞心檳榔 防風

桑白皮各半兩

郁李仁

大黃各壹分

右剉散每服叁錢黑豆百粒煎服熱甚大便秘更加**大黃**

**敗毒散**

方見寒類 治脚氣熱證或自汗惡風則加**桑白皮** 無汗惡寒

則加**去節麻黃** 又治風濕脚氣發熱焮腫加**蒼朮** **檳榔** **大黃** 微

利為效

**竹茹湯**

治脚氣胃熱煩燥嘔吐 方見積熱門加**烏梅** 煎

**百蘇**

方見血類加**生甘草** 治執證脚氣

**木香飲**

治脚氣入腹攻心嘔悶

南木香

甘草炙

青木香

吳茱萸 各半兩

宣木瓜

真橘皮

紫蘇莖葉

雞心檳榔 各一兩

右剉散每服叁錢置伍片烏梅一枚煎服

**降氣湯**

方見前 吞**五寶丹** 方見痼冷門 治脚氣衝心築痛嘔吐

**延沫和**

治脚氣寒證 方見脹滿門

**椒瓜圓**

治脚氣寒證

大生木瓜就蒂切蓋以**獨活湯**神實其中用竹筒插其蓋收熟  
右研貳味為圓桐子大每肆拾圓温酒下扶虛用**核桃肉煎**  
湯下

**越婢湯**治脚氣風多證

麻黃去節一兩半 爛石膏式兩 白木一兩 熟附子

甘草各半兩 右剉散每服參錢薑伍片棗壹枚煎服

**小續命**多用薑片治脚氣寒多證加**獨活**治脚氣風多證方見

**乾薑甘草湯**方見神效門加**製臭柴更****官桂**治寒證脚氣

**香薷散**加**木瓜****煎卷****消暑圓**治暑證脚氣方並見暑門

**獨活寄生湯**加**東皮**治風證脚氣無熱者皆可服最除風毒消

惡血方見腰疼門

**石南圓**治風毒脚腫生瘡或筋攣痛重

石南葉 薏苡仁 杏仁浸去皮 牽牛炒熟

大腹子 腫皮 川芎 川續斷 赤芍藥

赤小豆 陳皮 當歸 麻黃去節 各二兩

五加皮 牛膝各叁兩 宣木瓜 獨活

草薢 杜仲薑製炒 各四兩

右細末以酒浸蒸餅研圓桐子大每服參拾圓煎**木瓜**湯

加**利除濕湯**加**續斷**方見濕門 **五苓散**方見水 治脚氣渴多證

**換腿圓**治風濕脚氣緩弱痺痛上攻肩背

石南葉 南星炮 石斛酒浸曬 牛膝酒浸曬

羌活 薏苡仁炒 防風 草薢

黃耆蜜炙 天麻 當歸酒浸曬 續斷各一兩半

檳榔二兩半 宣木瓜四兩 加蒼木炒 川芎各一兩半

右末酒麩稀糊圓桐子大每伍拾圓食前橘皮煎湯下

羌活 麻黃去節 熟附子 生乾薑

川芎 牛膝 白芍藥 白茯苓

脚氣



黃耆蜜炙 人參 杜仲薑製炒 甘草炙  
辣桂 當歸 白朮 木香等分

**活血應痛圓**

右鹿末每服三錢薑伍片棗二枚同煎活血應痛圓

蒼木六兩 香附炒研淨 威靈仙二兩 草烏頭二十四兩  
陳皮伍兩半 狗脊去毛 沒藥一兩別研

右末酒麩稀糊圓桐子大每服貳拾圓用獨活湯下治腎文  
風冷脚氣酸疼及久痢登廁風冷入於腸胃以致兩脚削小  
成鼓槌風而痢又不止用此兩藥俱效

**不老地仙丹**

治腎臟風毒輕脚壯筋

當歸 牛膝 茯苓各酒浸 虎骨酒炙黃  
真川椒去目 川草薢益水 蒺藜炒 川芎各一兩  
白附子炮 黃耆蜜炙 圓白南星炮 何首烏  
羌活 獨活 杜仲薑製炒 沒藥別研

防風

赤小豆

地龍去土

茴香炒

木鱉子去油 血竭

乳香別研

右細末河麩稀糊圓桐子大每服肆拾圓木瓜煎湯下

**烏蛇圓**

治風寒脚氣隱痛痒痺

烏蛇肆兩酒浸 虎骨醋洗淨 石斛令作末 黃松栢節酒浸研  
巴戟去心 茯苓酒浸焙 官桂 防風

獨活

續斷

五加皮

薏苡仁

當歸

木香

川芎各半兩

乳香別研 生乾薑各二

**慈濟圓**

治脚氣痿走兩足轉上腰腿疼痛不能轉側

宣木瓜二兩 川烏炮去 黃耆 蒺藜炒去刺

當歸

防風

草薢

牛膝

天台烏藥各一兩

赤小豆

茴香炒

地龍去土

老白膠研篩

川五靈脂各三分

右細末酒麩稀糊圓桐子大圓數肆拾食前紫蘇湯送下

**四氣圓** 治脚氣緩弱隱疼及腎虛感受風寒濕痺 方見風緩門

**大流氣散** 加**當歸**下 方見張蒲門

**虎骨散** 方見歷節門 脚氣筋急掣痛用**木瓜****楸皮**煎湯調下

**金液丹** 方見脾疼門 治凝陰蘊毒温而利之**養正丹**通用以**枳**

**殼木瓜** **檳榔**煎湯下

**二陳湯**加**檳榔****細辛**製**枳殼**治脚氣痰多證 方見瘧門 無熱者

**三陳湯**下**養正丹****艾丸圓** 方見腎氣門

脚痛緩弱患在風濕風證以**烏藥順氣散**加**麻草****白芷**主之濕證以**不換金正氣散**加**茯苓****生乾薑**主之一七收功容易事也若夫腎虛為病脚弱而痛又當何如曰腎主骨故爾惟**安腎圓**最良以**不換金正氣散**送下仍夾和**白圓子**佐之余每見脚氣緩弱人多服**四斤圓**亦**安腎圓**輩也然則腎氣充則骨氣強骨氣強則無緩弱之患治法要當究其原

**附方**

**麻黃左經湯** 三因方治風寒暑温流注足太陽經腰足亦痺關

節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈

麻黃 去節 乾葛 細辛 白木 蘇 淋

茯苓 防已 桂心 不見 羌活

甘草 各等分

右為末每服四錢水一盞**姜**三片**枣**一枚煎空心服自汗去

**麻黃**加**肉桂****芍藥**重者加**白木****陳皮**無汗減**桂**加**杏仁****澤瀉**

並各等分

**半夏左經湯** 三因方治之小腸經為風寒暑温流注發熱腰脇

疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏 湯洗 乾葛 細辛 白木

麥門冬 去 柴胡 茯苓 桂心 不見火

防風 乾姜 炮 黃芩 小草



及遍身疼痛下疳于足脛痛不可忍

羌活

甘草

黃芩

茵陳

人參

升麻

苦參

葛根

蒼朮

防風

當歸身

知母

茯苓

澤瀉

猪苓

白朮

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心服

**烏雞平氣湯**

三因方

治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱

苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神

甘草

白芷

當歸

白朮

川芎

五味子

紫蘇子

乾木瓜

人參

烏藥

右咬咀每服四錢水一盞薑五片二枚煎七分温服

**東垣羌活導滯湯**

治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便溺阻

隔先以此藥導之後用**當歸拈痛湯**

羌活

獨活

防己

當歸

大黃

枳實

右咬咀每服五錢或七錢水煎服

**金匱八味丸**

治足少陰經脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘急腎經

虛寒所致也此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵方見補

**叻味敗毒散**

治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上焮赤腫痛寒

熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

煎胡

柴胡

枳殼

桔梗

甘草

人參

茯苓

川芎

大黃

蒼朮

右咬咀每半兩入姜煎

**五續散**

和劑方治寒濕流注兩脚酸疼有蕪痰氣者用之尤宜

內加木瓜

方見中寒門

**健步丸**

方見痿

...

...

生芋 半兩

歸尾

芍藥

陳皮

蒼朮

牛膝 各一兩

吳茱萸

條芩 各半兩

桂枝 二錢

大腹子 三箇

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮木通湯下

防已散 用溪方

白朮

木通

防已

檳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮 鹽炒

生芋

黃柏 各酒炒

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有熱加黃芩黃連大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝麥汁如常腫者專主乎濕熱先生別有方

脚氣治列

心法附錄曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕○勝濕

以仙朮白朮防已川芎為主或六物附子湯或當歸桂枝湯

○脚氣鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸

○脚氣解表用麻黃左經湯等藥隨經選用有蕪痰氣寒濕者五積散加木瓜○若双解以天黃左經湯東垣羌活湯

湯○若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃

柏南星或健步丸○若疎風養血用獨活寄生湯最效○春

夏氣溢腫而痛者用香蘇散加五加皮木瓜檳榔川練子○

執帶紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮○秋冬已後用五積散加

木瓜牛膝檳榔吳茱萸

附足跟痛

舟溪曰○有痰有血熱○血熱四物加黃柏知母牛膝之類○

有痰唾者五積散加木瓜

四物湯 方見補損門

五積散 方見中寒門

舟車丸

除濕丹

俱見濕類

開結散飲丸

方見痰延明

治脚轉筋疼痛卒急用**松節**貳兩判細**乳香**壹錢以銀石器內  
 慢火罍炒焦存性研細每服壹錢至貳錢**木瓜酒**調下  
 治脚氣筋骨疼痛用**金銀花**為末每服貳錢熱酒調下或判碎  
 同**木瓜****白芍**藥**食桂****當歸****甘草**酒水各半鍾煎去滓空心熱服

新刊仁齋直指附遺方論卷之四終

新刊仁齋直指附遺方論卷之五

# 諸氣

梅核氣積聚癥瘕痞塊

諸氣方論

人以氣為主一息不運則機絨窮一毫不續則穹壞判陰陽之  
 所以升降者氣也血脉之所以流行者亦氣也榮衛之所以運  
 轉者氣也五臟六腑之所以相養相生者亦此氣也盛則盈衰  
 則虛順則平逆則病氣也者獨非人身之根本乎人有七情病  
 生七氣七氣者寒熱怒喜憂愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆  
 通也然則均調是氣將何先焉曰氣結則生痰痰盛則氣愈結  
 故調氣必先豁痰如**七氣湯**以**半夏**主治而**官桂**佐之蓋良法  
 也况夫冷則生氣調氣雖用豁痰亦不可無温中之劑其間用  
 桂又所以温其中也不然七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如  
 梅核窒礙於咽喉之間咯不出燕不下或中滿艱食或上氣喘

急曰氣隔曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚疝瘕癥心  
腹塊痛發即欲絕殆無往而不至矣。冷氣者生冷傷脾風冷  
入胃或血海虛冷冷則生氣用

**湯** **大沉香圓**。痰結者 **三因** **大沉香圓**。中滿者痞滿不食水氣腫脹而目俱浮

**流氣飲** **指迷七氣湯** **順氣不香散** **三香散** **百皮散** **加** **三夏** **伏苓**

○上氣者氣逆而上呼吸喘促 **蘇合香湯** **蘇子降氣湯** 或贊

**蘇合香圓** 以 **秘傳降氣湯** 送下。○氣隔者陰陽不和中皖室塞

五隔吐噫食不能下 **五積寬中散** **和氣七氣湯** **加水香** **縮砂** 間

以 **紅圓子** 佐之。○氣滯者滯於胃腸則脹滿滯於手足則浮腫

滯於腰間則墜痛脹滿用 **異香散** **調氣散** **五香降氣湯** 仍與神

**保圓** 或 **少蓬煎圓** 利之浮腫用 **三和散** 夾 **生料五苓散** 或 **五皮**

**散** **加桂** **吞青不香圓** **局方** **流氣飲** **加赤茯苓** **枳殼** **腰痛** **俞山人**

**降氣湯** **局方** **七氣湯** **加橘核** 或 **辣桂** **煎湯點** **調氣散** **吞青娥丸**

○氣秘者停宿不消腸胃留滯大便不通 **蘇合香圓** **夾和** **厚**

**圓** 或 **楊氏** **蘇香圓** **局方** **麻仁圓** 並用 **枳殼散** 送下。○氣疾之人

多因氣不歸元遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是

無痰此為氣中不得誤用風藥及通關利膝等輩先以薑汁泡

湯調 **蘇合香圓** 次用 **下氣湯** **大流氣飲** **加石菖蒲** 繼之氣順而

蘇即以 **台中湯** **加水香** 以和其中使氣歸常道若更不能調則

氣逆而厥又有變證。○五積者五臟之所積其病難醫六聚者

六腑之所聚其病易治挾水為癖挾血為癥氣血水飲皆能結

塊輕者 **神保圓** 以 **麝香湯** 送下或 **少與** **蓬煎圓** **檀氣** **阿膠** **圓**

**凌前圓** 重者 **如意圓** **頂** **圓** 酌量用。又一 **證** **鹿瀝** 作 **聲** **腹中**

纏帶他無所苦此為水飲 **消飲圓** **倍木圓** 方並見 **水飲類** **一** **薑**

○夾和用之。○人有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常一

婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身百病

臆氣填嘔惡全不入食入食則吐痰延 **一** **塊** **如核** **室** **寒** **胃** **疾**

而痛或一塊如刃築觸心下而疼或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發闕挽四肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋瀝日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只是有孕謬所謂孕婦做得白般病者此也用藥但以**三陳湯**加**縮砂****桔梗****薑****烏梅**同煎**半夏**理氣消痰**縮砂**安胎順氣**枳**以開胃喉之隔服之自然安平若妄以剛劑溫胃胎氣必煩病無由愈白濁一節謹勿燥泄**二陳湯**加**白茯苓**以下**白圓子**方並見痰涎類可也若夫七情所發逆氣填胃不惟核膜上塞咽喉甚者攻擊蒲悶欲絕產後尤多有之故曰產前安胎產後調氣男女或有胃喉間梅核作恙者事勿怒飲食勿冷

諸氣證治

**和劑七氣湯**治七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛不能飲食  
半夏五兩 參 辣桂銛 鹿破甘草各兩  
右劉散每服參錢水大麥置伍片棗壹枚煎至柒分食前服

**和劑治中湯**方見脾胃門

**和劑治氣湯**治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸證  
沉香一兩 縮砂仁三兩 甘草二兩半 香附炒淨

右末每一錢鹽壹點沸湯點下  
**大沉香圓**治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎塞婦人血氣刺痛並宜服之方見心氣類

**三因七氣湯**證治如前有熱者可用此

半夏五兩 茯苓四兩 厚朴製 紫蘇葉二兩  
右劉散每服四錢水壹半薑七片末二枚煎六分不時服

**易簡二陳湯**方見痰涎門  
**枳殼散**方見脚氣門 治證同前加**南木香**煎服

**和劑流氣飲**調榮衛利三焦行痰滯消腫脹  
橘紅 青皮 紫蘇葉 厚朴製

香附炒淨 甘草各四兩 木通二兩 大腹皮



丁皮

檳榔

辣桂

木香

草果仁

蓬木根

藿香葉各一兩半

麥門冬

人參

白木

木瓜

赤茯苓

石高蒲

白芷

半夏製

枳殼製

右劉散每服三錢薑四片末二枚煎服餘見水腫門

**指迷七氣湯**治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮

陳皮

桔梗

蓬義木

辣桂

藿香

益智仁略

香附一兩半

甘草三分

加半夏製

右劉散每服三錢水壹錢薑肆片末壹枚煎七分不時服

**順氣木香散**治冷證腫脹泄瀉

厚薑

乾薑炮

茴香炒

縮砂仁

辣桂

橘紅

厚朴薑汁

甘草燻

蒼朮炒

丁皮

桔梗各等分

右末每貳錢半薑末煎食前服

**三和散**和暢三焦治痞脹浮腫

大腹皮炒

紫蘇莖葉

沉香

宣木瓜切焙

羌活各壹兩

白朮

川芎

木香

甘草炒

陳橘皮去白

檳榔各等分

右麓末每貳錢煎服加赤茯苓可以和氣利水

**五皮散**治皮膚水氣

大腹皮炒

桑白皮炒

伏苓皮

生薑皮

陳橘皮等分

右麓末每叁錢煎服

**分氣紫蘇湯**治腹脅疼痛氣促喘急

五味子去梗

桔梗剉

伏苓

大腹皮

陳橘皮洗淨

草果仁

桑白皮炙剉

甘草各壹斤

右捌味吹咀為麓末秤貳拾斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍

斤搗碎同一處拌勻每服四錢水壹大盞薑錢叁片入鹽少許同煎至柒分去滓空心食前服常服和胃進食

**蘇子降氣湯** 治心腹脹滿喘促短急

蘇子淨炒 半夏洗七次各 甘草炙 前胡去苦

陳皮去白 厚朴姜汁製 桂皮一兩去 川當歸去芦

右為吹咀每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑三片煎至柒分去滓溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食

**蘇合香圓** 療疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴疔赤白

暴利痧血月閉痰癲丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等疾方見歌類

**五加皮湯** 治同前

五加皮半兩酒浸半 枳殼洗浸去 柴胡去芦

骨碎補去毛 地骨皮半兩 白朮半兩 甘草炙

桑白皮炒 陳皮一兩 訶子半兩 甘草炙

半夏洗七次各 草果去皮膜

右為散和勻以碗盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷

之每服一錢紫蘇三葉薑錢三片水壹盞同煎七分食後通

口服痰嗽加半夏麩煎心膈虛加人參茯苓煎上膈熱加北

黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑

婦人血虛加當歸煎

**五膈寬中散** 治七氣留滯飲食不下穀脹氣脹通用

白豆蔻仁 丁香 木香 縮砂仁

甘草 青皮 陳皮 川厚朴

香附各四兩 右麓末每三錢薑三片鹽壹點煎服

**五膈散** 治丈夫脾積氣帶胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣

諸般血癥氣塊方見該門

**五膈散** 治腹脇膨脹痞悶噎塞噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛

諸般

蓬莪茂煨 益智仁 甘草鹽 京三棱煨

青皮去白 陳皮去白 石蓮肉壹兩 厚朴去籠皮薑

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚鹽壹捻煎七分

通口服不計時或鹽湯點或鹽酒調皆可服

**調氣散** 治氣滯不勻宿食不消

白豆蔻用仁 丁香 檀香剉 木香各貳拾兩

藿香葉 甘草鹽各 縮砂仁貳斤半

右為細末每服壹錢入鹽壹字沸湯點服不計時或用薑棗

略煎服

**神保圓**

木香 胡椒各壹分 巴豆十枚去心研乾 柴故

右仲湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服三粒心膈痛痞

蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣

盛者白礬蛤粉各三分黃丹壹分同研為散煎桑根白皮糯

米飲調參錢下小喘止用桑皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴  
香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿  
食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此  
藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥  
乃流入背脊久之又注右脇寧痛甚苦乃合服之一投而瘥  
後嘗再發又一投瘥

**蓬煎圓** 利大腑去積氣

舶上茴香炒 附子炮去 枳殼湯壹兩去 川練子去核

檳榔 山藥各貳兩 礪砂半兩 京三棱

蓬莪木武味各肆兩醋炙 猪胰壹斤入 礪砂并三

右為末入膏內同醋麩糊為圓如梧桐子大每服拾圓至拾

伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘時候更量虛實加減常

服順氣寬中消積滯化痰飲

**生料五苓散** 去水退腫

通

澤瀉制貳拾猪苓去皮赤伏苓去皮白木去皮各壹

桂去皮

右為細末每服貳錢熱湯調下不拘時又治痰熱在裏身發黃直濃煎茵陳蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛熱加黃芩人參末少許

**俞山人降氣湯**治氣不升降痰實喘滿

紫蘇子微炒前胡去芦厚朴薑汁浸壹半夏麩炙

甘草炙橘皮去白五加皮薑汁炙當歸洗去芦

桂心不見火黃耆各壹兩人參去芦附子炮去皮大

桔梗炒羌活乾薑各半兩

右麓末每服貳錢水壹盞半紫蘇參葉生薑參片棗子壹枚同煎半分去滓食後服

**青神圓**治氣滯不散兼治腰痛

破故紙酒炒胡桃貳拾人蒜四兩杜仲拾六兩去皮

右為細末蒜膏為圓每服參拾圓空心温酒下婦人淡醋湯

**一常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顏色**

**順三焦潤五臟治大便秘塞不通年高人尤宜服之**

白檳榔半生羌活去芦木香各壹兩肉桂去皮

兔絲子酒浸壹宿山茱萸各壹車前子別懸研

枳殼去穰防風去芦頭山蕓兩半麻仁別懸研

大黃半生郁李仁各四兩

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓温水吞下臨卧服

**鐘氣阿魏圓**治五種噎疾九般心痛痰癖氣塊冷氣攻刺

茴香炒陳橘皮洗青橘皮洗川芎

丁香皮炒蓬莪木炮甘草冬壹兩縮砂仁

肉桂 去麋皮 白芷 各半兩 生薑 四兩切片子用鹽  
胡椒 各半兩 阿魏 宿以麩同為糊

右為末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓壹斤用朱砂半錢為衣丈夫氣痛炒薑益湯下壹粒至貳粒婦人血氣醋湯下常服壹粒爛嚼茶酒任下

**三稜圓** 治中脘氣痞心腹堅脹胃中痞塞喘滿短氣大便不調或泄或秘

京三稜 生細剉半斤搗羅為末以 青橘皮 去白  
杏仁 湯浸去皮 蘿蔔子 各炒 乾漆 各貳兩 神麩 炒  
麥蘖 炒 各壹兩 礪砂 研飛

右為末以三稜膏搜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓黑米飲下食後服

**二薑圓** 養脾胃溫胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胃下氣一切冷物所傷

良薑 去芦 乾薑 炮

右件等分為細末麩糊為圓如梧桐子大每服拾伍至貳拾圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

**香橘湯** 治七情所傷中脘不決腹脇脹痛

香附 炒 半夏 製 橘紅 各貳兩 甘草 炒一分  
右剉散每參錢薑伍片棗貳枚煎服

**橘殼湯** 治諸氣痞結滿悶

枳殼 各貳兩 甘草 半兩  
右剉散每肆錢水盞半薑伍片煎至中盞溫服

**薑桂散** 治心中卒痛腹脇氣帶

辣桂 川白薑 不炒各壹兩 蓬莪朮 半兩  
右末每壹錢溫酒調下

**沉香開膈散** 治五隔五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹拒

沉香 荆三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁

萹澄茄 縮砂仁 草果仁 益智仁

川白薑 丁香 人參 丁皮 各半兩

木香 白伏苓 香附 炒 藿香葉

半夏麴 青皮 陳皮 各一兩 甘草 一兩一分

右麴末每叁錢水盞半薑伍片棗貳枚煎至中盞食前服

**良薑湯** 治冷氣腹痛

良薑 辣桂 各壹兩 半夏 製分 木香

當歸 厚朴 製 甘草 一分

右麴散每叁錢薑肆片水大盞煎六分食前服

**白豆蔻** 治七氣所傷滯於胃膈室於咽喉脹痛於心下噎氣

不酸不能飲食

白豆蔻仁 縮砂 萹澄茄 丁香

木香 甘草 各壹分 青皮 陳皮

桂 各貳分 厚朴 香附 各三分

白末每叁錢水壹盞薑叁片鹽壹捻煎柒分不時服

**如意圓** 治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾

沉香 木香 大丁香 萹澄茄

史君子 辣桂 川白薑 炒 桃仁 炒

五靈脂 炒 礞砂 醋浸 雄黃 沒藥

大戟 牽牛 炒取末 巴豆 去油 荆三稜

蓬莪木 肉豆蔻 各半兩

右末研細水煮麴糊圓麻子大每服貳圓加至叁圓止溫酒

送下

**頂心圓** 治積氣塊痛久年脾積癥瘕之疾

木香 丁香 淡豉 礞砂 醋浸半日

朱砂 研細 巴豆 去油

右末陳米飯為圓桐子大輕者壹圓重者貳圓臨睡先嚼煨

薑如指許燕下次以冷熟水吞藥不得嚼破上項兩圓子請

酌量用

**楊氏治管圖** 治停宿積聚能尋諸處痛九膀胱氣脇下痛最難治此藥主之

麝香 一條 木香 胡椒 各一兩 全蝎 去毒微炒

巴豆 各四枚

右為末湯泡蒸餅糊圓麻子大朱砂衣每參圓常服熟水下  
心腹痛研煨薑泡湯下血痛妙薑醋泡湯下腎氣脇疼茴香  
酒下大便秘蜜湯下

**橘皮一物湯** 治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用凡酒食  
所傷中脘妨滿嘔吐吞酸悉療之

陳橘皮洗淨新汲水煎服屢效

**氣塊石淋散** 治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左脇

車蛾殼 蛤蚧殼並燒灰存性 乾薑 生

官桂 甘草 各一分

行爲末每服貳錢臨發時沸湯點服車蛾蛤蚧殼治塊

**分心氣飲真方** 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大小便

紫蘇莖葉 兩半 夏製 枳殼 製各一 青皮 去白

陳橘紅 大腹皮 桑白皮 炒 木通 去節

赤茯苓 南木香 檳榔 蓬義木 煨

麥門冬 去心 桔梗 辣桂 香附

藿香 各一兩 甘草 各一分

右剉散每服參錢水大盞薑參片棗貳枚燈心拾葉煎柒分  
不時服里人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞溫白  
圓 見浮腫門 初則小便數次後則大便通其病頓愈

# 附梅核氣

梅核氣方論

梅核氣者窒礙於咽喉之間咯之不出嚥之不下如梅核之狀

者是也始因恚怒太過積熱蘊隆乃成厲痰鬱結致有斯疾耳  
治宜導痰開鬱清熱順氣如**半夏陳皮香附川芎山枝仁黃本**  
**枳殼蘇子**之類是也如老痰凝結不開以**鹹軟之堅海石**是也  
**加味二陳湯**

半夏 陳皮 茯苓 甘草  
黃本 枳殼 真蘇子 桔梗  
白豆蔻仁 山柰子仁 各等分  
右吹咀每服伍錢加**薑**壹片水壹盞煎陸分食後徐徐服

### 附積聚癥瘕痞塊

積聚癥瘕痞塊方論

內經云積者蓋厥氣生足悅悅生脛寒脛寒則血脈凝滯凝滯  
則寒氣上入於腸胃則膈脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散  
日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷

陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則  
後血腸胃之絡傷則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合  
凝聚不得散而成積矣或外中於寒內傷於憂怒則氣上逆氣  
上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏不散津液凝滯滲著而  
不去而成積矣故曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭  
足久不愈令人發欬逆痰連歲不已心之積名曰伏梁起臍  
上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾之積名曰痞氣在胃  
脘右側覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌  
膚肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒  
熱喘咳發肺壅腎之積名奔豚在小腹上至心下若豚狀或下  
或上無時久不愈令人喘逆骨痠少氣  
難經曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之  
所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所  
成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終



始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也矣

原病式曰癥者腹中堅硬按之應手然水体柔順而今反堅硬如地者亢則害承乃制也瘕者腹中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及廢也經曰血不流而滯故血內凝而為瘕也小腸移熱於大腸乃為虛瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血移而為伏瘕血澁不利月事沉滯而不行故云為虛瘕為虛與伏同傳寫誤爾

陳無擇云癥瘕屬肝部積聚屬肺部夫癥者堅也瘕者假也假物而成形然七癥八瘕之名經論亦不詳出雖有蛟蛇鱉肉髮蟲米等七證初非定名偶因食物相感而致患爾若婦人癥瘕則由內外不內外因動傷五臟氣血而成古人謂為痼疾以蛟蛇等為生瘕然亦不必泥此並屬血病蛇髮等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚假血而成自有活性亦猶末微中僧病噎

者腹中有一物其狀如魚即生瘕也紫古云養正積自除譬如蒲座皆君子縱有一小人自無容地而出令其真氣實胃氣強積自消矣紫古之言豈欺我哉內經曰大積大聚衰其大半而止滿實中有積氣大毒之劑尚不可過况虛中有積者乎此乃治積之一端也邪正虛實宜詳審焉丹溪云凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則根除矣又云氣不能作塊成聚塊乃有形之物也瘕與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為死血大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰為主用**海石****三棱****蓬朮****香附****桃仁****紅花****五靈脂**之類為丸**石****雞****白****大****湯**送下

凡婦人腹中有塊多屬死血丹溪方治一婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜

眩運身熱時作時止  
黃連 薑 兩半 以益 智 半 兩 同 炒 去 菜 更

萊菔子半斤 炒  
莪木醋煮 麥麩  
山查各一兩

梔子 三稜  
桃仁去皮 香附童便浸焙乾

右為末蒸餅凡如梧桐子大每服伍拾丸黃湯下

**撞氣回魂圓**治五種噎疾九般心痛痲痺氣塊冷氣攻刺如意

**圓**治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾頂珠圓治積氣塊痛久年脾積

癖瘕之疾鐵圓利大腑去積氣調氣散治氣滯不勻宿食不

消聖圓治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積

氣諸般二癥氣塊氣塊石痛散治飲食傷冷心下結塊狀如伏

梁又攻三脇楊氏治停宿積聚能尋諸處痛九膀胱氣

脇下痛最難治此藥主之已上八方並見前諸氣門

**肥氣圓**專治肝之積在脇脇下如覆杯有頭足久不愈令

人發效逆瘕瘕連歲不已

厚朴五錢 黃連七錢 蘇胡二兩 川烏頭去皮

巴豆霜伍分 乾薑伍分 皂角去皮

白茯苓壹錢半 甘草錢 廣木壹錢 人參

昆布各壹錢

右件除茯苓巴豆霜另末外為極細末和勻煉蜜為丸

如桐子大初服壹丸一日加壹丸二日加貳丸漸漸加至大

便微澹再從貳加服周而復始積減大半勿服

**伏心圓**治心之積起膈上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃連壹兩半 厚朴半 人參各伍錢 黃芩伍錢

桂枝壹錢 乾姜 菖蒲 巴豆霜

右件除巴豆霜外為細末另研豆霜旋旋入末煉蜜為丸如

桐子大服如上淡黃連湯下

**痞氣圓**治脾之積在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

黃疸飲食不為肌膚

厚朴 建錢半 黃連 兩錢 吳茱萸 錢 黃芩 貳錢

澤瀉 人參 各壹錢 川烏頭 炮 川椒 炒各伍分

茵陳 酒炒 乾姜 炮各壹錢 砂仁 壹錢半 白朮

巴豆霜 桂 各肆分

右件除**巴豆霜**另研**茯苓**另末旋入外同為細末煉**蜜**為丸如

桐子大每服用**淡甘草湯**下服如上法

**息貫丸**治肺之積在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱

喘效發肺壅

厚朴 制 兩錢 黃連 炒 壹兩 乾姜 炮 白茯苓

川椒 炒 紫苑 粉 壹錢 桂 川烏頭 炮

桔梗 白豆蔻 陳皮 京三稜 各壹錢

天門冬 人參 各壹錢 青皮 伍分 巴豆霜 肆分

右件除**茯苓****巴豆霜**旋入外為末煉蜜為丸如桐子大以淡

**寒湯**下服如上法已上四方秋冬加**厚朴**減**黃連**肆分之壹

**腎脈丸**治腎之積發於小腹上至心下若脈狀或下或上無時

久不已令人喘逆骨痠少氣及治男子內結七疝女人瘕聚

滯下

厚朴 制 柒錢 黃連 伍錢 白茯苓 澤瀉

菖蒲 各貳錢 川烏頭 伍分 丁香 伍分 苦棟 酒煮 貳錢

玄胡索 壹錢 全蠍 附子 獨活 各壹錢

桂 貳分 巴豆霜 肆分

右除**巴豆霜****茯苓**另為末旋入外為細末煉**蜜**為丸如桐子

大淡**鹽湯**下服如上法

**散聚湯**三因方 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心

腹絞痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利 陳皮

半夏 枳殼 各叁分

杏仁 炒 去皮尖 桂 各式兩 茯苓

附子 炮 川芎 枳殼 炒 厚朴 制

吳茱萸湯洗各壹兩

大黃大便利去之

右吹咀每服肆錢水煎

**濟生大七氣湯**

治積聚狀如癥瘕隨氣上行發作者時心腹疔

痛上氣窒塞小腹脹滿

益智

陳皮

京三稜

蓬朮

香附子各壹兩

桔梗

肉桂

藿香葉

甘草

青皮各壹分

右吹咀每服伍錢水煎

**阿魏丸**

治肉積

連翹半兩

糖菓子壹兩

黃連陸錢半

阿魏壹兩醋炒

右為末用阿魏糊為丸如桐子大每貳叁拾丸白湯送下

**秘傳寶壽丹**

追虫取精神効

黑丑各兩

木香末半

錫灰醋炒末

檳榔取半

陳皮取末

青皮取末

三稜醋炒

香丸取半末

陳皮取末

青皮取末

三稜醋炒

棗木

醋炒各一兩

右件各為細末再用便服二兩便服各一兩三味用

水二碗煎至一碗用便服一合布包在藥內煮將熟起手先

用丑末二兩法起次用檳榔末一兩再用雷丸末一兩盡再

用木香錫灰三稜我末陳皮青皮等末盡後再一用雷丸二

用檳榔三用丑末蓋在外陰乾每服三錢四更時候用冷

吞下復睡至天明不可洗手洗面吃湯物代取下或虫或積

惡毒滯氣並原藥下盡方可用冷水洗面其藥末下寧耐片

時見其藥下再用藥食補之

**木香檳榔圓**

瑞竹方

治一切氣滯心腹涌悶脇肋膨脹大小便

結滯不快方見

**丹溪治淋癖方**

石膏

黃芩

升麻各等分

右為末

沙糖

水調下

塊和膏專貼積塊

大黃

朴硝各

右為末用(天志)搗膏和勻貼之

**保和圖**治一切食積方見傷食門

○謹按丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為血塊誠然言也何以明之曰左關肝膽之位肝膽藏血液右關脾胃之位脾胃藏飲食所以左邊有積則為血塊有邊有食則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積則為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁其痰是已如(木香) (檳榔) (天氣) (枳實) (去血積) (麥牙) (神麩) (去酒積) (香附子) (枳實) (去食積) (牽牛) (吐瀉) (水積) (山查) (阿魏) (去肉積) (海粉) (礞石) (去痰積) (雄黃) (白礬) (去積) (乾姜) (巴豆) (去寒積) (黃連) (大黃) (去熱積) 各飲其類也

之藥分其藥勢則難取效雖要認得分明是何積聚兼見何證然後增減斟酌量使之不爾反有所損要在臨時通變也

新刊仁齋直指附遺方論卷之五 終

漢代十齋書經四經文館錄文正

終

猶如發會賦博量賦之不爾及承故書要全湖御嚴變也  
之繁衣其燥燥傾鑽短校說要嘉書令即其何許難無長何

三五



