仁齋直指

四

特別
ヤ9
183
4

漏濁

漏濁方論

精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無節思慮過度精心不足而腎氣虛不能管攝往往小便類數漏濁之所出生也因小便而出者曰漏精心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降上下乖暌是以有清濁不分之證藥法品量條列于下要必體認之精而後斂用之審歟外此又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足力乏腰背酸疼益用參朮等劑以斂脾精斂脾謂何精生於穀也

漏濁證治

治小便中泄精不止

白龍骨煅研細 新羊子骨浸壹宿次日搗細 冬霜後採者壹斤猪

右末酒調糯米爲糊圓桐子大每服叁拾圓空心鹽湯下

蓮子湯 治心熱赤濁

石蓮肉 連心用陳陌

右末每服貳錢食後燈心壹小撮煎湯調下

清心蓮子飲 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

石蓮肉 白伏苓各壹兩 益智仁 遠志水浸取肉薑製炒 麥門冬去心 人參各半兩 石昌浦 車前子 甘草炙壹兩 白朮 澤瀉

右剉散每服叁錢添燈心壹握煎服 方見前門

茯菟散 方見水飲門 可治和解

心腎交 前湯調下男女通用

雞清圓 便濁通用

圓白半夏生

右爲末用雞子清圓桐子大稍乾以小薑湯下 末夾和慢火同炒圓子裂爲度留下焙令末養藥磁器密收每叁拾圓食前

白伏苓 前湯下或用鹽湯

金鎖固精 調平心氣赤白濁通用方見心痛門

秘元圓 治心虛便濁 方見驚悸門

妙應圓 赤白濁通用

真龍骨 辰砂

石昌浦各貳半 白伏苓

縮砂仁各叁半 川續子煮去皮 益智仁 石蓮肉

右末以山藥研細糊圓桐子大每伍拾圓日間前食下

酸棗仁湯 下臨臥服

遠志圓 治心氣不足遺精白濁

遠志水浸取肉 山藥炒熟 地黃洗曬 天門冬去心

龍齒研細各壹兩 麥門冬去心 北五味子 車前子各半兩

白伏苓　伏神去皮　地骨皮各壹兩　玉桂壹錢壹豆子

右末煉蜜圓桐子大每伍拾圓食前煎半湯下

伏苓湯　亦白濁通用方見消渴門

伏苓湯下

腎氣圓　治腎虛心熱小便急而數澁如水竇欲滲之狀又且油濁方見消渴門　隨用湯藥送在之　方見直門

牡蠣圓　治精氣不禁白濁夢遺

牡蠣壹兩　白茯苓壹兩　白茯神壹兩　白芍藥壹兩　白朮壹兩　遠志去心壹兩　龍骨壹兩　山藥壹兩　菟絲子壹兩　五味子壹兩　桑螵蛸各壹兩

右為末煉蜜圓桐子大每食前煎人參湯下

金櫻子圓　治諸虛滑精白濁

金櫻子壹斤　厚朴薑炒壹兩　龍骨壹兩

右以雄鼠壹壹盛淘淨煮熟去皮骨取肉焙乾為末入金櫻子膏拾玖枚去刺并穰蒂洗淨煮濃汁和丸梧桐子大每食前煎人參湯下

淨槌碎破器內入水一斗煮濃汁濾清調伏苓末為糊圓桐子大每三十圓食前用益智伍枚連殼槌碎北五味子十粒縮砂仁三箇煎湯下

北五味子圓　用北五味子煎湯下治諸虛白濁方見直門

桑螵蛸散　治心腎不和小便白濁或如米泔或為夢泄

桑螵蛸蒸過　遠志水浸取肉甕焙　石昌蒲　人參　白伏神　當歸　龍骨別研　鱉甲各半兩炙黃　甘草炙貳錢

右為末每服貳錢人參伏苓煎湯調下夜卧服

生料四君子湯　方見直門　生料五苓散　方見水飲門　貳藥夾和

每服貳錢用燈心壹撮同煎服治小便白濁

龍齒補心湯　治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡卧不寧小便油濁

龍齒煅別研　人參　當歸酒浸一宿焙　熟地黃洗焙

北梗 焙 酸棗仁 炒 白伏苓 白伏神 去木
遠志 水浸取肉 薑汁淹焙 枳殼 去瓤 麩炒 麥門冬 去心
半夏麴 白朮 甘草 各半兩 肉桂 貳錢半
綿黃耆 七錢半 蜜炙

右麄末每服三錢水盞半薑五片粳米壹小撮同煎不時服
臨卧服

煉蜜方 治漏精白濁

雪白鹽 入鹹脆 內築十分實以荷葉蓋頂黃泥塗封
白伏苓 日取出放陰地上壹夜窯器收
山藥 炒 各壹兩

右爲末入鹽壹兩研和用沸湯浸束取肉研爽煉蜜丼研爲
圓桐子大每服參拾圓空心棗湯下蓋欲其以濟鹹脾腎而
得也

山藥圓

乾山藥 二兩 北五味子 菟絲子 酒浸搗焙 各四兩

牛膝 酒浸焙 澤瀉 熟地黃 洗 山茱萸
伏神 去木 巴戟去心 赤石脂 各壹兩 杜仲 炒 薑汁炙 壹兩

右末煉蜜圓桐子大常服參拾圓鹽湯下

安腎圓 方見水飲門 白圓子 方見身痛門 山藥圓 方見前三藥

夾和每服柒拾圓食前煎雙和湯送下 方見虛煩勞門 治虛勞羸
瘦浮腫白濁

還少丹 治心腎俱虛漏精白濁方見虛勞類

鹿茸益精圓 治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸 去皮 酥炙 黃 當歸
巴戟 去心 兎絲子 酒浸 杜仲 截碎 薑汁炙 斷絲
川楝子 蒸去皮 取肉焙 益智仁
韮子 微炒 故紙 炒

龍骨 別研 各貳分 滴乳香 壹分

右細末酒調糯米糊圓桐子大每柒拾圓食前白湯送下

家韭丸 治陽氣衰敗白濁遺精
家韭子 炒 陸兩 菟絲子 酒浸焙 牛膝 熟地黃 洗曬 當歸 各貳兩 巴戟去心 鹿茸 酥炙 各壹兩 杜仲 薑汁炒 桂心 石斛 乾薑 各壹兩
右末酒調糯米爲糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下亦治脾冷遺尿

震靈丹 治腎經虛憊漏濁不止方見寫門用二陳湯加白伏苓送下 乃日華煎飲

白圓子 治陰陽不調清濁相干小便渾濁方見身痠門用伏苓煎湯下

分清飲 治思慮過度清濁相干小便白濁
益智仁 壹兩酷 川萆薢 石菖蒲 去毛 各壹兩
天台烏藥 白伏苓 酪各壹兩 甘草 四錢
右爲末每貳錢鹽少許同煎食前服

蒼术丸 治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋瀝腰痛力疲
蒼术 杵去麓皮壹斤米泔浸壹日夜焙乾 舶上茴香 炒 川練子 蒸去皮取肉焙乾各叁兩 川烏 炮去皮臍 故紙 炒 各半兩
右末酒麪糊圓桐子大 朱砂 爲衣每服伍拾圓空心 縮砂 煎湯下 粳米 湯下 蒼术 收斂脾精

附諸方

妙應圓 治赤白濁
真龍骨 辰砂 石菖蒲 各貳錢半 川練子 取肉 半兩
白茯苓 益智仁 石蓮肉 縮砂仁 各壹錢半
桑螵蛸 炙上 兎絲子 酒浸一宿焙乾 牡蠣 破碎鞋包火煅 各半兩
右以山藥 碎炒爲糊丸如梧桐子大每服伍十九間日煎 參酸棗仁 湯下臨臥 粳米 飲湯下

遠志圓 齊生方 治因事有驚心神不定夜夢驚醒小便白濁
遠志 去心 煮 石菖蒲 各貳 茯神 去木 白茯苓 去皮

人參　龍齒各壹兩

右爲末煉蜜丸梧子大以辰砂爲衣每服柒拾丸熟湯下

一方治心經伏暑小便赤濁

人參　白朮　赤茯苓去皮香薷　澤瀉　木猪苓去皮　連肉　麥門冬去心各等分

右㕮咀每服肆錢水一盞煎一盞煎服

一方治小便白濁出髓條

酸棗仁炒　白朮　白茯苓　破故紙　人參　益智洗淨　大茴香　左顧牡蠣童便煅各等分

右爲末加青鹽酒丸如梧子大每服三十丸溫酒米飲任下

秘傳金鎖固精丹治男子嗜慾過多精氣不固澁以去脫之劑

蓮花蕊十兩煖無毒鎮心忌犯黃蒜　石蓮子十兩味甘平温無毒益精氣安心澁精止痛取淨粉用　雞頭實十兩味甘平無毒益精氣強志取其實淨粉

右以金鎖子三斤取霜後半黃者木臼中轉杵却刺勿損擘爲兩片去水淘淨爛搗入大鍋以水煎不絕火約水耗半取出濾過重煎如稀餳布肆乾者炒之用水浸軟去子煎令如法入前藥末和丸桐子大每服叁拾九空心鹽湯下

針灸法陰交一穴在臍下一寸氣海一穴在臍下一寸半關元在臍下三寸

夢泄

夢泄方論

邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有三年少氣盛餘瞻玲持強制情慾不自覺知此泄如瓶之滿而溢者也人或有之是爲無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病猶輕合用和平之劑藏納精窮真元久虧心不攝念賢不攝精此泄如瓶之覆而漏者也人少有之其病最重須當大作補湯或謂夢泄

无甚劳此世俗者聞其說也獨不觀證候之有重輕乎外
此又有一種神氣消靡怪異橫生風邪乘其虛鬼氣乘其正往
往與妖魅交通是又厄運之不可曉者也法藥相助誠哉是言

茯苓圓 治心虛憂泄

白伏苓
右為末每服肆錢粳米湯調下間用温熟水調下空心食前
臨卧日三服

健脾丸 治脾胃虛弱飲食不進或食已嘔吐或腹脹泄瀉方見瘟門

白朮散 治藏腑久虛憂泄

人參 白伏苓各三分 白朮 甘草炙 藿香葉各半兩
右為細末每服二錢水一盞煎至六分去渣温服不拘時
煎湯下

辰砂妙香散 方見瘟門 治心虛憂泄

人參 當歸 茯苓 茯神 遠志去心 桔梗 甘草炙各半兩 辰砂別研 麝香別研 新羅人參 酒浸一宿各半兩
右為細末每服二錢温酒調下空心食前

龍骨散 治心神不安腎虛自泄精

龍骨煅 牡蠣煅各一兩半 知母 黃柏各六分
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸空心鹽酒
或鹽湯送下

固精丸 治心神不安腎虛自泄精

知母炒 黃柏酒炒各一兩 牡蠣煅 龍骨煅

栢子仁去殼 甘草炙各一分
右末每服三錢半姜五片棗三枚粳米百粒食前煎服

還少丹 方見虛勞門 **鹿茸丸** 治虛損憂遺用 **十補湯** 送下方見瘟門

震靈丹 封固下焦治憂泄不止方見瀉門 空心鹽湯下

煎湯下

附諸方

秘傳龍骨鎖精丹

白龍骨煅二兩半 牡蠣煅二兩 知母五分 黃柏六分
猪苓五分去皮 遠志甘草湯煮去心乙兩半 人參乙兩
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸空心鹽酒

芡實

右為末煮 山藥 蓮蕊 茯苓 遠志去心 山茱萸肉各三分
糊丸梧子大 硃砂 為衣服五十九
芡實丸 治生方治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面
少顏色驚悸健忘小便赤澁遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗
芡實蒸去 蓮花鬚二兩 茯神去木 山茱史肉
龍骨生用 五味子 肉蓯蓉酒洗 枸杞子 熟地黃酒蒸
右為末 酒 煮 山藥 為丸如梧子大每服七十九空心 鹽湯 下
玉鎖丹 御藥院方治精氣虛滑遺泄不禁
龍骨 蓮花鬚 雞頭實 烏梅肉各等分
右為末用 熟 去皮為膏和丸小豆大每服三十九空心
米飲下

秘傳金鎖思仙丹 桑螵蛸散 並見漏門

十卷終

新刊仁齋直指附遺方論卷十一

○眩運

眩運方論

眩言其黑運言其轉冒言其昏眩運之與冒眩其義一也其狀
目閉眼暗身轉耳聾如立舟舡之上起則欲倒蓋虛極乘寒得
之亦不可一塗而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則
重滯此四氣乘虛而眩運也喜怒哀樂悲恐憂思辭而生痰隨
氣上厥此七情攻虛而眩運也活慾過度腎家不能納氣歸元
使諸氣逆奔而上此眩運之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家
不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩運之生於血虛也又明
矣以致新產之後血海虛損或瘀滯不行皆能眩運是可不推
尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可
妄施汗下然而眩運欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂

目眩與夫少陰病下利止而頭眩時自冒者此虛極而脫也
識者將有采薪之憂并脉滋大多作眩運諸風掉眩皆屬於肝

眩運證治

伏苓桂枝白朮甘草湯 治衆上衝胷戰搖眩運

伏苓壹兩　桂枝三分　白朮　甘草各半兩

右剉散每服肆錢新水煎服風證加川芎 納半濕證加川芎

苓朮寒證加乾薑良薑 方見瀉門 治寒濕眩運仍吞 寒濕門 方見暑門 甚者 春正冊 方見痛玲門

苓朮除眩湯 治感濕感寒頭重眩運

附子生　白朮　川芎各半兩

官桂　甘草　炙各貳錢半

右剉每服三錢薑棗厚片同煎食前服

乾薑甘草湯 方見脾疼門 陰證用此 方見寒類 並主虛寒眩運

理痛圓 治暑證眩暈

肉桂

右細末煉密圓每兩作捌圓每服一圓用 香蘇散 調下 消

暑圓 通用方並見暑門

十四友圓 方見驚悸門 安胎圓 方見水飲門 二藥夾和用 和劑

七氣湯 送下方見氣門 治七情相干眩運欲倒仍間用 乳香泡湯下

芎羌湯 方見頭風門 治痰飲厥逆眩運

千金五套圓 方見脾疼門 治痰飲結聚胷脘眩運欲嘔

香橘飲 治氣虛眩運

木香　白朮　半夏麴　橘皮

白伏苓　縮砂各半兩　甘草炙各一分

右剉散每服三錢薑五厚片同煎若 藏合香圓 方見嗽門 本方加 當歸 川芎 各三分 官桂 半兩治血虛眩運

蘇沈流霽圓 治一切血運每服壹圓研開用 滴乳香 泡湯調下
亭霽湯 方見血類加 細辛 石膏 治婦人血運眩暈不省人事
次用 和劑七氣湯 佐之
五苓散 方見水飲門加 赤伏苓 治停飲眩暈心下悸氣
養正丹 方見痼冷門 來復丹 方見暑門升降陰陽用之 養正丹
次和 震靈丹 以 乳香 泡湯下升降鎮墜功用兩全
震靈丹 方見痼冷門 鎮墜眩運用之
蘇合香圓 用 棗湯 調開吞 震靈丹 治心氣不斂怔忪頭運
二陳湯 方見癎門加 生乾薑 治因氣贊痰眩運及酒食所傷眩
運及酒食所傷眩運痰運吞 來復丹 尤勝
定逆圓 治風證眩運及血證眩運
新白芷 擇大塊湯盪洗三次日乾
右為末煉蜜圓彈子大每服一圓荊芥煎湯嚼下
白朮丸 治風痰上厥眩運頭疼

白附子 炮 南星 炮 半夏 盪柒次 旋覆花
甘菊 天麻 川芎 橘紅
僵蚕 炒去絲嘴 乾薑 制 各壹錢
右末用生 薑 半斤取汁打麪糊小圓每五十圓食後 荊芥湯 下
參前胡湯 治風痰頭運目眩
前胡 橘紅 枳殼 製 半夏曲 木香
甘草 各半兩 紫蘇葉 赤伏苓 南星 炮
右麄末每三錢薑棗厚片慢火熟煎服
白朮白圓子 方見身疼門用三十圓 蘇合香圓 三粒 全蝎 一箇
炙為末三件研和以 橘皮 煎湯入 生薑汁 少許調下治諸
風眩運搐掣語短嘔吐

○驚悸

驚悸方論

人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辯乎驚者恐怖之謂悸者怔忪之謂心虛而膽怯則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心爲之忤使人有惕惕之狀是則爲驚心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則爲悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之證

驚悸證治

養心湯 治心虛血少驚惕不寧

黃耆炙　伏神　半夏麴　白伏苓　當歸　川芎各半兩　遠志取肉汁淹炙　柏子仁　酸棗仁浸去皮隔紙炒香　北五味子

人參各壹分甘草炙肆錢

右龕末每服參錢壹匙水壹盞煎貳枚煎食前服加檀香末伏苓

治停水怔忡

寧志圓 治心虛血虛多驚

人參　白伏苓　琥珀　當歸　伏神　柏子仁　遠志酒浸半日新布裹搥取肉焙各半兩　酸棗仁温酒浸半日去殼隔紙炒香　石菖蒲各壹分　乳香

右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下

參紅圓 治心氣不足怔忪自汗

人參半兩　當歸壹兩乾　乳香壹錢半研

右末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

十四友圓 治心血俱虛怔忡驚惕

柏子仁研　遠志肉壹兩汁淹焙酸棗仁湯浸去皮隔紙炒香

紫石英 煅 熟乾地黃 川當歸 白伏苓
白伏神 人參
辣桂 龍齒 研各壹兩 朱砂 研半兩
右細末煉蜜圓桐子大每參拾圓 參 煎湯下

朱雀圓 治心病怔忪不止
白伏神貳兩 煉
右細末煉蜜圓小豆大每參肆拾圓食後棗湯下

蜜陀僧散 治大驚入心敗血頑痰填塞心竅喑不能言
蜜陀僧 即是爐底 研極細
右每服桃壹大錢已無熱者用熱酒調下有熱者沸湯泡 露 一宿
香 調下亦治瘡風頗有奇效 出夷堅志

溫膽湯 治心膽虛怯觸事多驚亦治水氣怔忡
半夏 製 枳殼 製 白伏苓 各壹兩
甘草 炙半兩
橘紅壹兩半

右剉每服參錢半薑棗片棗貳枚刮青竹皮壹塊如錢大煎服或加 製遠志 尤妙

加味四七湯 治心氣鬱滯鬱痰散驚
半夏 製 貳兩半 白伏苓 厚朴 製 兩半 各壹 伏神
紫蘇葉 洛壹兩 遠志 薑汁 蘸 炙 各壹兩 甘草 炙各半兩
右剉每服肆錢薑棗片 石膏 研 半寸棗貳枚煎服

伏苓甘草湯 治心下停水怔忡
伏苓 桂枝 各貳兩 甘草 炙壹兩 生薑叁兩
右剉每服肆錢水煎服

薑术湯 治虛證停飲怔忪
白薑 生 白术
辣桂 甘草 炙各壹分
右剉每服參錢薑棗煎服

小半夏伏苓湯 並主水氣心下怔忪方見水飲門 伏苓 半夏麴 各半兩

炙甘草湯 治心下動悸其脉結代動而時止曰伏

甘草炙壹兩　人參半兩　生乾地黃四兩　桂枝參分
麻仁　麥門冬去心壹合　生薑參分　大棗八枚

右麤末每椀參大錢水壹盞半酒半盞煎至捌分入**透明礬**壹片俟膠消溫和服日進參劑不拘時

孚志膏 治因驚失心

人參　酸棗仁湯浸去皮名壹兩　辰砂半兩　滴乳香壹錢坐水研　遠志去心貳兩　琥珀　茯神金

右末煉蜜和杵圓如彈子每壹圓薄荷湯化下

附諸方

珠朱安神丸 治血虛心煩懊憹驚悸怔忡胸中氣亂方見內傷

加味遠志圓 治痰迷心竅驚悸怔忡

遠志去心貳兩　人參壹兩　菖蒲貳兩　白茯苓參兩

右爲細末煉**蜜**丸如梧子大**硃砂**爲衣每服二十九**米**湯下

健忘

丹溪云精神短少者多亦有痰者戴云健忘者爲事有始無終言談不知首尾此以爲病之名非此生成之愚禎不知人事者

歸脾湯 濟生方 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮　茯神去木　黃芪蜜炙　龍眼肉
酸棗仁去殼人參去芦各兩　木香半兩　甘草炙半錢

右�once咀每服肆錢水一鍾**薑**伍片**棗**一枚煎七分溫服

人參遠志圓 聖惠方 治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬去心　白茯苓　菖蒲各七錢半　人參去芦
遠志去心　酸棗仁
丹砂　官桂去皮各二錢半　黃芪蜜炙各半兩　桔梗

右爲末**蜜**丸如豆大每服貳拾丸至參拾丸**米**湯下

孚志膏 和劑方 治心神恍惚一時健忘方見前

新刊仁齋直指附遺方論卷之十二

○疫癘

疾癘方論

風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由内作此疾癘感受之胚胎也豈特夏傷於暑秋必爲癘哉古人蓋以其受病最多者言之耳癘候何如始而呵欠繼而足冷面色青黄身体拘急寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去未幾内外皆熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也或内伏寒疾寒從皆起冷如掌大癘之寒熱其豈非陰陽二氣更相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能温其熱也氷水不能寒衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以作衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而内搏故發於暮夜若乃邪氣内搏

於五臟橫連於募原其道遠其行遲不能與衛氣交併故有隔日發有三四日一發微氣之行疾行遲病作之有晏甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣瘧有數種（風瘧）自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而為瘧風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如（川芎）（白芷）（青皮）（紫蘇）之類或（細辛）（桔梗）佐之（溫瘧）一証亦先熱後寒此為傷寒壞病與（風瘧）大畧則同熱多寒少（小柴胡湯）熱少寒多（小柴胡湯）內加（官桂）（寒瘧）自感寒而得無汗惡寒拿痛面慘轉而為瘧寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪（生料五積散）（增桂養胃湯）或（良姜）（乾姜）（官桂）（草果）之類甚則（姜附湯）（附子理中湯）（暑瘧）者暑勝熱受得之一名（癉瘧）陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠去盡月（小柴胡湯）（香薷散）嘔者（縮脾飲）加（生姜）溫服下（消暑丸）熱甚者少與（竹葉湯）（常山）（柴胡）於暑證取便（濕瘧）者胃虛脈濡雨濕汗出澡浴得之身体痛重肢節煩疼嘔逆脹滿盍用（五苓散）（除濕湯）加（薏米）（倍茯）葷寒受者多不熱氣虛而泄悽慘振ㇾ施之為當（食瘧）一名（胃瘧）（柴胡桂姜湯）減半（黃芩）加以（葛根）最良（牝瘧）者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒咳生冷鹹藏燕塩肥膩中脘生痰皆為食瘧其狀舌飢而不能食ヒ則中滿嘔逆腹痛青皮陳皮（實脾）（半夏）縮砂（白豆蔻）作劑或四獸湯下（紅丸子）自有奇功（瘴瘧）挾嵐瘴溪源蒸毒之氣致然也自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人受瘴瘧其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂忘亦有啞不能言者皆由敗血聚於心毒涎聚於脾披仙指為脾胃實熱所致又有甚於傷暑之瘧耳治之須用凉膈疎通大腸（小柴胡）加（大黃）（芒硝）如前數証經久不瘥真氣已耗邪氣（觀音應）皆為要藥○如猶存則有所謂（老瘧）（瘧母）者焉表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來謂之（勞瘧）法當調養氣血（川芎）（當歸）（官桂）（芍藥）輩所

不可無○彌年閱歲經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為
癖謂之瘧母此証未可直攻急作[烏頭七棗湯]以扶其裏俟
其內氣已充繼此[經效瘧丹]或[消癖丸]下之取愈大抵瘧之初
得三數日間如火燎原不可向通波濤洶湧未易回瀾當俟其
稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已瘧方來與正發及將
解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩時之先或遇發
日凌晨空心與之諸瘧之脉大約尺寸俱弦或浮數或緊實或
緩濡或虛遲或左手盛或尺寸盛而関中濡不可定
名以為弦也總前治法弦數者熱之浮
弦浮緊浮數其邪在表者可汗
下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴
欲水漿藥入輒吐[人參]煎湯交抑猶有說焉嘗讀三薦攝生見
其論議若瘴瘧若暑毒每用疎轉之劑取下根源里有先傷暑
後發瘧涉年餘者度其腹中有癖水磨[青皮]下[鱉甲煎丸]黒

血如泥泄下極臭由是獲愈嘗知諸瘧皆有根在治法之外又
當隨輕重而利導之實者與[白虎大黄]虛者用[參苓白朮]輩不然
[常山]於瘧每每作效何耶蓋瘧家多蓄黄水[常山]為能破其癖
而下其水也

疾瘧證治

[麻黄白朮湯]治感風發瘧

麻黄去節　官桂　青皮　陳皮
川芎　白芷　半夏麴　紫蘇
伏苓　白朮　北梗　甘草炙等分
加細辛　檳榔
右剉散每服三錢薑肆片棗貳枚空心煎服

[五積散]感寒發瘧初作以此解散

蒼朮炒　北梗壹兩　麻黄去節　枳殼製
陳皮各六錢　乾薑　厚朴製各四錢　川芎

當歸　白芍藥
半夏製　官桂
右剉散每服參錢水盞半煮白參十薑參片煎半空心服

養胃湯加減　治感寒發瘧
厚朴製　蒼朮炒
伏苓　草果
甘草炙壹分
右剉散每服參錢水盞半薑伍片烏梅半箇煎半溫服

解毒雄黃圓　方見積熱門

養正丹　主寒瘧方見痼冷門　薑附湯　附子理中湯　主寒瘧方見寒類

草果飲　諸瘧通用加減　治寒瘧
草果　白芷
川芎　良薑
紫蘇葉　甘草炒等分
右剉散每參錢煎服

柴胡湯　治暑瘧純熱方見血類或寒執等則加減

香薷飲　治傷暑發瘧
香需四兩　厚朴製
右剉散每參錢水盞半煎服

五物香薷湯　香需緬脾飲　並主暑證方見暑類

常山飲　治傷暑發瘧
嫩黃川常山　葛豆製各貳兩
甘草炙各壹兩二錢　良薑六錢
右咬咀每參錢水壹椀薑伍片棗參枚煎半稍冷服

七寶飲　治暑瘧諸瘧
川常山　雞心檳榔
甘草炙各半兩　青皮刮去白
右細剉每參錢桃柳枝各柒寸烏梅參箇水大椀煎半稍冷
空心服　草果仁貳錢半

五苓散 治傷濕發瘧及小便不利方見水飲類

加減除濕湯 木防湯 並主濕瘧或加官桂伏令方見濕類

柴胡桂薑湯 治牝瘧但寒或寒多微熱

柴胡 二兩　辣桂 三分　甘草 炙　牡礪 煅各半兩　括蔞根 壹兩　乾薑 炮　黃芩 三錢　內加半夏麴半兩

右剉散每服叁錢薑棗煎服

二陳湯 治食瘧諸瘧

陳皮　半夏 製　茯苓 各伍兩　甘草 炙壹兩

右㕮咀每服叁錢薑伍片烏梅半箇煎服寒多者加草果熱多者加知母貝母之類隨意增用

四獸湯 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 製　人參　伏苓　白朮

橘紅　草果　生薑　烏梅

大棗 各等分　甘草 炙減半

右㕮咀以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四錢水壹椀煎半溫服

紅圓子 治食瘧食積氣滯腹脹

京三稜 水浸軟截碎　蓬莪朮 煨　青皮

陳皮 各伍兩　胡椒　乾薑 炮各三兩

右為末米醋煮米粉糊圓桐子大朱紅為衣每伍拾圓一陳

皆可下

雷氏截瘧湯 治久瘧但寒及胛寒發瘧或寒重熱輕

大川烏頭 一个炮去皮臍切作七次用鹽水浸一晝夜取出焙乾

右細剉分貳服每服壹七厚片棗三箇姜四三寸水大椀煎半先熨棗稍冷服

又方用小附子壹枚修製一同薑附若能溫胛挾風則用川烏寒甚則用附子

治瘧木香圓

牽牛一斤淘去浮者焙搗取末四兩別類雞心檳榔 陳橘紅各二兩
青木香 人參
官桂去麤皮 京三稜
乾薑炮 甘草炙
芍藥各半兩 肉豆蔻煨去面
右爲末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和
煉蜜圓桐子大每服貳拾圓橘皮煎湯下以通利爲度

地龍飲 治瘴瘧諸瘧大熱煩燥
生地龍三條研細細
右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加腦
子少許

觀音圓 取下暑毒瘴毒
圓白半夏生 烏梅肉
右爲末薑麪糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙
每服伍圓臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

宮歸鱉甲散 治勞瘧寒熱
當歸 川芎
陳皮 伏苓
右剉散每三錢薑伍片棗貳箇小烏梅壹箇水煎服熱多加
柴胡寒多加 草果

五勞圓 治勞瘧瘴瘧久病
嫩黃芪山三兩半
辣桂去麤皮淡豉三兩
右曰乾爲末煉蜜圓梧子大每三四十圓空心温酒下不飲
者熟水入些酒下

經效扈丹 治瘧毋結癖寒熱無已
真阿魏 雄黃各七錢半
右沸湯泡阿魏研散 雞末 爲末和之稀麪糊圓桐子大每壹

芍藥 青皮
半夏製各一分 鱉甲醋炙黃半兩
陳皮 伏苓
川芎 川烏去油每件各十枝炮
牡丹香 川巴豆不去油每件各十枝炮
右爲末以厚紙蓋貼有油又再易紙

桃仁去皮尖炒二兩
烏梅肉去核半兩
辣桂去麤皮淡豉三兩半
右曰乾爲末煉蜜圓梧子大每三四十圓空心温酒下不飲

朱砂一錢半

圓【人參】煎湯候冷空心服瘴瘧【飛】煎湯冷服臨發磨壹圓
傳鼻頭口畔

【消瘧圓】治瘧毋停水結癖腹脇堅痛
芫花 炒 朱砂 研細等分
右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎柬湯下去癖須用【大戟】破水之劑下後即與【養胃湯】

【驅瘧湯】治諸瘧久瘧
草果仁 青皮 陳皮 人參
伏苓 厚朴 製 蒼术 炒
雞心檳榔 白术 甘草 各玖 半兩 良薑 一分
右剉散每三錢薑伍片棗貳枚烏梅壹箇空心煎服

【生脈飲】治脾寒發瘧及痰多熱渴
草果 肉豆蔻 各兩個 壹生 川厚朴 方寸許 二片
生薑 弐鬼半生半濕紙裹 甘草 弐寸半生半炙
右判散分貳服每服煮棗水貳柬壹烏梅煎半空心服

【截瘧圓】截瘧消痰
華丹 煅 穿山甲 炮焦 各一分 上硃半兩
右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓【生薑烏梅】前湯下

【七物湯】治諸瘧
常山 酒浸蒸 檳榔
陳皮 川厚朴 製 草果 甘草 炒等分
右剉細每服三錢薑伍片烏梅貳箇水壹椀煎半露壹宿來早溫服之如熱多加【黃連】

【截瘧丹】瘵志修合
土朱 弐兩半 淨末 真綠豆粉 弐兩 一兩生入藥一兩煮糊
右用【綠豆粉】糊築和參件圓如麻子每服止貳圓新汲水研桃敷空心服是日飲食微和而已

膠艾圓 治一切瘧寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚中滿
雞心檳榔 壹兩日乾 川常山 酒浸蒸焙四兩

右爲末水麪糊圓桐子大每服參拾圓於未發前半日冷酒下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下二十圓仍不得喫熱飲食又次日飲食無拘

柴胡湯 貳貼加**當歸**貳錢分作兩服每服壹錢柒片棗貳枚**烏梅**貳枚水壹椀煎陸分候微冷吞前件**膠艾圓**柒圓次日吞參圓

六物湯 治久瘧不已寒少熱多
嫩常山 柴胡 雞心檳榔
青皮各拍 草果仁

右對分參服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹盞煎許新水貳盞煎半隔宿露空以紗蓋之次早拂明服若寒熱等加製厚朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熱

續方

白虎加桂枝湯 活人方 治瘧疾但熱不寒及有汗者
知母 甘草炙 桂枝 粳米各三合

右㕮咀每服伍錢水壹半煎至壹盞去滓溫服

大柴胡湯 治瘧熱多寒少日痛多汗脉大以此湯微利爲度餘邪未盡以**白虎湯**或**三物湯**以盡其邪方見傷食門

清脾飲 濟生方 治瘴瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澁

青皮去白 厚朴姜製 白朮
草果仁 柴胡去苗 茯苓去皮 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水壹半煎柒分溫服不拘時

正氣散 余同知方 退寒瘧止胃寒進食

藿香 半夏 陳皮
厚朴 甘草各一兩 炒仁 草果略四

右剉為散生薑(五片)煎服如瘧未全俟發入早服

六和湯

人參　草果
白芷　檳榔
右咬咀(生薑)(五片)一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

柴胡(各壹錢)　知母　貝母　烏梅
(柴胡用酒拌炒山梔子)

瘧疾治例　出明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有間日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗　白朮

蒼朮米泔浸各壹錢　已上三味麤疾必用之

陳皮七分　甘草炙伍分　乾葛一錢二

若一日一發及午前發者邪在陽分加(桔梗)(半夏)(各一錢)熟甚頭痛加(川芎)(軟石膏)(各一錢)

冬間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加(川芎)(當歸)酒炒(知母)(貝母)(各四分)酒炒(黃芩)(各四分)酒洗(紅花)酒炒(黃芩)(各四分)

若一日一發及午前發者邪在陽分加(桔梗)(半夏)(各一錢)熟甚頭痛加(川芎)(軟石膏)(各一錢)

提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加(人參)(黃芪)(白芍藥)(當歸)(白芍藥)(熟地黃)(各壹錢)以補血

若陽虛多汗用(黃芪)(人參)(白朮)以斂之無汗(柴胡)(蒼朮)(白朮)

若陰虛多汗用(當歸)(白芍藥)(熟地黃)(黃芪)(黃蘗)以斂之無汗(柴胡)(蒼朮)(大川芎)(紅花)(酒炒麻)以發之故曰有汗者要無汗

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加(人參)
(一錢半酒炒)(苡米)(大麥芽)各一錢
若傷食痞悶或有食積者加(神麯)(麥芽)(枳實)炒各一錢炒(黃連)炒各六分
若痰盛加(姜製)(半夏)(南星)(枳實)各一錢(黃芩)(黃連)各六分
若欲截之加(枳殼)(黃芩)(青皮)(常山)各一錢(烏梅)三箇淨肉肥者
若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用
(四君子)合(四物湯)加(柴胡)(黃芩)(黃芪)(陳皮)以滋補氣血

新刊仁齋直指附遺方論卷之十二終

霍亂吐瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦爲否陽陰而不降陰無陽而不升此否之所以否而不通也人其此陰陽糾霍變亂結搏於中卒然吐瀉或瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶煩疼其視天地不交之否異乎否乎霍亂嘔吐下利發熱憎寒頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋類頻特反掌間蓋足陽明爲胃以養宗筋暴吐暴下津液驟亡宗筋失其所養故攣急甚則舌卷縮囊充甚風燭矣然亦何以致此哉曰胃傷暑毒露卧卑濕當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而發焉於是邪正相干中脘節閉氣不得通吐利暴作所謂脾受賊邪木來勝土

者此也治法霍香正氣散加霍香生薑為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可踈投香薷飲次則以香蘇飲沉冷之劑自合先治中脘如藿香正氣散加人參白朮茯苓半夏湯服散暑解煩眯者指為脾胃虛冷遽用之禹以壯胃澁腸不思風冷未散輒以參朮苓薑調補寒邪氣得之愈盛愈作縱得淹延或下痢或久瀉或腹脹虛浮或中滿不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍亂死者少乾霍亂死者多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則止猶可幸免若上不得利所傷之物擁閉正氣關格陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍交亂如人被髮交爭必有以挨之可也古方用藿香正氣散正取疎利之意但多則太溫莫若薷藿湯下藿香正氣散為愈霍亂氣息劣不欲言者不治

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而復嘔吐者中脘挾風寒也治嘔

蚛莫先於調肺既調肺而復喘蚛者風寒在表或在裏也瀉痢之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留客風寒邪氣之所致乎故必隨其感受解散於其先則其病其痢庶乎其對證矣解散風寒不換金正氣散為上其間增益則藿香正氣散等皆可也惟用最良若欲其清解則藿香正氣散等皆可也惟暑亦然毋毋隱伏作病或為熱嘔或為焦煩或為腹痛或泄痢不止若中類多有之炎燥蘊隆念慮又當及此此說雖詳于卷首敬用申之

吐瀉證治

藿香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加白芍小便不利者加茯苓方見一卷此藥能溫散風寒濕氣若暑證加香薷

香薷飲治霍亂熱多發渴方見水氣門

良薑治霍亂神效

良薑　霍香　陳皮各一兩　甘草炙三分

右剉細每三錢水前服

又方

藿香葉　良薑

右同煎治霍乱水瀉效

治要除濕湯

半夏麴　川厚朴製　蒼术炒　各壹兩　藿香葉

陳皮　伏苓　各壹兩　甘草炙七錢

右剉散每服四錢薑七片棗壹枚煎服霍乱瀉而不吐者加木瓜

注吐而不瀉者去蒼术加縮砂仁各壹兩吐瀉俱作兼腰痛者加注

開鬱湯　治霍乱吐瀉

胡椒七粒　生緑豆弐拾壹粒

右末前薑木瓜湯温和調下

治中湯　治飲食居處不節以致霍乱方見嘔吐門　本方薑枚

皮散薑　能散風冷

香蘇散　治傷暑霍乱方見暑門

木瓜湯　治吐瀉不已轉筋擾悶　甘草炙二分　吳茱萸半兩泔浸炒

酸木瓜壹兩　尚香壹分微炒

右剉散每四錢薑一片棗一枚水煎服

四順附子湯　治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣小不語急服

生附子　白薑炮　甘草炙各一分　人參

右剉每服四錢水貳盞壹盞空腹服腹痛加注小便不利加

伏令仍用炒鹽熨或用薑鹽敷　治乾霍乱欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹

薑鹽湯　鹽一兩　生薑半兩切

右同炒令色変以童尿內浸煎壹盞分為貳温服

瀉黃湯法　治乾霍乱心腹絞痛欲吐不吐欲下不下

先以鹽湯壹盞頓服候吐出令透不吐再服續以剉理中湯倍加薑注伏令倍加縮砂或藿香散加薑注伏令倍加縮砂或藿

白朮 用 釋設 二分 木瓜 半分煎湯調下治乾
蘇合香圓 方見諸氣門
霍亂不吐不瀉氣痞于中心腹絞痛此證最惡
黃連方 治霍亂吐瀉心腹作痛
炒鹽貳錢紙包紗護頻熨其胃前并腹肚上截以熨斗火熨氣
透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事
霍亂吐瀉臨時無藥以 生薑 研細塗心下及兩脚心即止
附方
不換金正氣散 治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼 方見傷寒門
六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉痢 方見暑門
理中湯 治中寒霍亂吐瀉方見寒門
七氣湯 三因方 治七氣鬱結五臟之間互相刑尅陰陽不和揮
霍變亂吐利交作
半夏湯洗五兩 厚朴姜製 桂心 人參 各二兩 白芍藥

茯苓 去皮 各四兩 紫蘇葉 橘皮 各貳兩 人參 去芦 各壹兩
右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞煎柒分去滓溫服

加減理中湯

人參 白朮 乾姜 甘草 炙 各等分
若爲寒氣溫氣所干者加 附子 一兩名 附子理中湯 ○若霍
亂吐瀉加 茯苓 各壹兩名 茯苓理中湯 ○若乾霍亂心腹作
痛先以 溫湯 少許頻服候吐出令透即進此藥○若嘔吐者
於 理中湯 內加 丁香 一兩名 丁香理中湯 ○若瀉者加 茯苓 各一兩名 茯苓理中湯 ○若瀉泄不已者於 補
中湯 內加 附子 一兩○不喜飲米穀不化者再加 縮砂仁 一
兩共成八味○若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內
去 白朮 加 藿香 名 四順湯 ○若傷寒結胸先以 白散 取 利 寸
分煎服不愈者及諸吐和後胃痞欲絕心膈高起急痛手不

可近者加【四君】【枳朮】各一兩名【四君異功湯】○若渴者再於【異功】內加【葛根】一兩○若霍亂後轉筋者【理中湯】內加火煆【石膏】一兩○若腎上築者腎氣動也去【朮】加【肉桂】一兩半腎惡燥故去【朮】恐作奔豚故加【肉桂】○若悸多加【茯苓】一兩○若渴欲飲水者添加【葛根】一兩半○若腹滿者去【白朮】加【附子】一兩○若飲酒過多及啖炙煿熱食發為鼻衄加【四物】一兩若傷胃吐血以此藥能理中脫分利陰陽安定血脉

○泄瀉

泄瀉方論

胃為水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸大腸腸胃虛弱或挾風挾寒或傷暑傷濕傷冷傷熱不調泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋脈拘急身躰怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮

股躰重着冷則腸鳴胠冷而手足清熱則煩燥胠熱而手足清熱不調者由穀積於內不能去其積徒以冷藥水之挾氣無所發泄故冷與挾搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以熱藥脫之冷積不得宣行故挾熱與冷干而成泄或澁或溏裏急後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃不能消心腹脹脹所下酸臭可驗焉治法當究其感受之源然後為之固實不窒其源昔恐決潰四出莫知其終者矣雖然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂泄人皆以泄為脾惡而不知腎病有泄焉腎泄何如曰腹痛無定處似痢非痢骨節面黧脚下痠冷者是也前件諸方條例于后至若泄利之後腹痛身疼是則為表裏俱病先當温裏急與【四逆湯】然後解表急以【桂枝湯】與之活人書言之詳矣抑猶有繼餘之論焉肝者脾之賊木能勝土古人慮之固也經曰肝腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門户要束之具束則不泄也不然泄瀉而面色

青慘者古書謂肝經受寒所致特設當歸厚朴湯以主之果何意哉下利惡諸具載活人總括

泄瀉證治

理中湯 治腸胃虛弱洞瀉澼有声泄瀉類併

人參 白朮 乾薑炒 甘草炒 各一兩

加伏苓 川厚朴製各三分

右剉細每服三錢空心煎服

調中散 治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉 縮砂 蓬朮炮 乾薑炮

肉桂 茴香炒 乾薑炮

益智仁 橘紅各三分 麥芽炒

甜梗各一兩 甘草炙三分 蒼朮炒 神麴炒

右末每服三錢薑棗并少鹽煎服

南薑散 治脾虛腸鳴泄瀉不食

大肉豆蔻一枚 煨小餅子內入 煨熟為度去麵

右末每壹錢米飲調下

治暑湯瀉湯 治風邪泄瀉加 辣桂 寒邪泄瀉加 乾薑 良薑 通用

加 木香 方見吐瀉門

香薷散 方見暑門 治傷暑泄瀉更增 伏苓

平胃散 治傷濕泄瀉

橘紅 厚朴 製各三 蒼朮 炒 五兩半 甘草 炙一兩

右剉細每服三錢薑棗煎服

又法以 平胃散 對夾 香薷散 用陳米煎暑瀉濕瀉諸證皆驗

黃連阿膠圓 治暑瀉熱瀉 未米飲下 方見咳門

又洞泄方 黃連阿膠圓 用 五苓散 送下 方見水飲門

藿皮湯 治協熱泄瀉亦治血痢

藿皮 三兩 黃芩二兩 黃連一兩

右剉每服四錢水大盞煎七分入 阿膠末 半錢再煎少頃澄服

薑桂湯 治冷證泄瀉方見寒類 **米醋湯** 見濕類 通用

大半夏圓 治虛冷腸鳴滑泄

良薑 乾薑炮 各六 肉桂 茸桉各四兩

右末麪糊圓桐子大每五十圓米飲下

戊己圓 治冷熱不調泄瀉

吳茱萸炒 黃連去鬚 白芍藥等分

右末米糊圓桐子大每三十圓空心米飲下

眞人養藏湯 治冷熱不調泄瀉裏急後重

罌粟殼去筋蜜炙 一兩八錢

訶子肉六子人參 木香 白芍藥各八錢

甘草炙 肉荳蔻各四枚 白朮 當歸各三錢

右麁末每服二錢薑棗煎參前服先用 **縮砂煎湯下** 通用

方見脹滿門 俟其積消然後服此

雞苏散 治飧食生冷又爲冷積

良薑 辣桂 香附淨炒 益智仁

天台烏藥各一兩 甘草炙半兩

右末每二錢入少鹽沸湯點吞 **感應圓**

三稜散 消食傷積用此

京三稜炮 莪朮炮 益智仁

甘草炙 青皮去白各二兩 白伏苓四兩

右末每二錢少鹽煎吞 **感應圓** 治傷食泄瀉俟酸臭出盡即

服 **固腸散** 止之

固腸散 治冷瀉腸滑及下痢頻併

罌粟殼去筋蜜炙一兩 陳米炒一兩 乾薑炮

甘草炙各二錢 肉豆蔻生二枚 木香一錢

右末每二錢薑棗煎食前服

實腸散 治泄瀉不止

川厚朴製一兩半 肉豆蔻 訶子炮

縮砂　橘紅　蒼朮炒　伏苓各一兩
木香半兩　甘草炒四分
右麁末每三錢薑棗煎服手足冷加炒乾薑
安腎圓方見水飲門治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面黧
腰脚時冷用和劑七氣湯送下方見氣門
震靈丹治腎泄證候同前
禹餘粮火煅醋淬不計遍以手撚得碎爲度　丁頭代赭石如上修製
赤石脂　紫石英以上各四兩入甘鍋內以瓦盖口鹽泥固濟候乾用硬炭一十斤煅通紅火盡爲度入地坑埋出火毒二宿研末　的乳香別研　沒藥
五靈脂各二兩並去砂石研　朱砂一兩研
右並爲細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服三圓用炒故紙入棗一煎湯調鐘乳粉少許空心送下小兒腎泄白膿褐汁面黯齒脫猥人怯寒震靈丹末入些少鐘乳粉以棗子煎炒故取熱汁調下

木香散治脾腎俱虛泄瀉
肉豆蔲麪裹煨　故紙炒　白朮　白伏苓各半兩
木香　甘草炙各一分
右剉細每三錢食前薑棗煎溫服
二神圓治脾腎俱虛泄瀉不食
破故紙四兩炒　肉豆蔲二兩生
右末用肥棗蒸爛取肉研膏和杵圓梧子大每服四十圓淸米湯下若飯食後常一泄服此頻愈
當歸厚朴湯治肝經受寒面色青慘厥而泄利
當歸炒　厚朴製各二兩　官桂三兩　良薑五兩
右剉散每三錢食前服
附諸方
白朮芍藥湯机要方治太陰脾經受濕水泄注下体重微滿困弱無力不欲飮食甚泄無數水穀不化

白朮　芍藥各一兩

右㕮咀每服一兩水煎

【保陽除濕湯】按將方治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻　柴胡　防風　神麯

澤瀉　猪苓各半兩　蒼朮一兩　陳皮

甘草炙　大麥芽各三

右㕮咀水煎食後热服

【升陽除濕防風湯】東垣方如不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必致重病及鬱結而不通也又此道本其陽則陰氣自降矣

蒼朮米泔浸去皮乾淨四兩　防風二兩

白茯苓　白朮

右㕮咀除蒼朮另作片子水一碗半煎至二盞內諸藥同煎

【當歸湯】按將方治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥热短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身躰皆悶口乾不喜飲冷

當歸　黃芪　甘草

柴胡　人參

當歸稍　升麻各半

右㕮咀水盞半煎八分食前通口服

【胃苓湯】治感暑次食泄瀉煩渴即平胃散五苓散相合

蒼朮　陳皮　厚朴姜製　甘草　白朮

茯苓　猪苓　澤瀉　桂

右㕮咀水煎入鹽少許服如作末藥湯服亦可

【敗毒湯】分理陰陽治瀉解热

柴胡　半夏　甘草減半

半夏湯泡各二分　黃芩

白朮　益智各三

陳皮半　蒼朮半一錢

人參　豬苓　白朮　茯苓　澤瀉各等分

水二鍾煎一鍾空心服

參苓白朮散 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉方見痰癖門

五味異功散 並見暑門

丹溪方 治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄黃芩炒半兩　白朮炒二兩　白芍藥酒拌炒半夏泡各半兩　神麯炒　山查炒各一兩半　薑香一兩

右為末薑湯煮包飯繞熟研丸如梧子大食前白湯下

錢氏白朮散 治氣血俱虛神弱之人或吐瀉

人參　白茯苓　白朮　木香　甘草　藿香各一兩　乾薑半兩

右為粗末每服伍錢水一鍾煎七分食前溫服

參苓白朮散 治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉方見虛勞門

溫脾止瀉散 治大人小兒久瀉滑脫不止

乾姜微炒　白芷

右為細末用生白蜜丸如彈子大挨入內一二日即止　附子生各一錢

出明醫雜著

泄瀉治法

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澁之

主方

白朮二錢　白茯苓　白芍藥炒各一錢半　〇亂上三味泄瀉必用之藥

陳皮一錢　炙甘草　法製半夏各五分

若傷食泄黃或食積加　神麯　大麥芽　山查子　各一錢炒　黃連七分

消之腹中窄狹飽悶再加　厚朴　枳殼　木香　各五分

若小便赤澁短少加　豬苓　茯苓　澤瀉　各一錢以分利之夏月再加　黃連　炒　四分

若口渴引飲加乾薑一半 烏梅肉二个

若春秋之間濕熱大行兼注水泄加炒黃連 蒼朮 澤瀉各一錢 升麻 滑石各四分 赤加茵蔯一錢 山梔 木通各五分 發熱煙渴加乾葛一錢 黃芩小便黃若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連 茵蔯 乾薑各一錢 木香五分 神麯 麥芽各八分

若寒月濇泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神麯 麥芽炙 乾薑各一錢 益智 木香各七分

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不効宜加人參 黃芪各一錢以補中氣 升麻 葛根各四分以升提之加 羌活 防風 蒼朮各三分助風以平之更加炙乾薑五分以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃芪 人參各一錢 神麯 麥芽各一錢五分

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻一枚 木香 炙乾薑各一錢

灸法 脾腧二穴在十一推下兩傍各開寸半主泄瀉中脘一穴在脐上四寸主腹痛泄瀉 關元一穴在脐下三寸各開寸半灸三壯 天樞二穴在脐傍各開三寸治腹滿脾泄瀉痢 大腸俞二穴在十六推下各開寸半灸三壯治腸鳴腹脹腹痛暴瀉

新刊仁齋直指附遺方論卷之十四

瀉痢

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻塞惡風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之面垢背寒自汗發渴受濕得之身重痛重着浮黃或停冷則喜清腸鳴或瘟熱則發熱煩燥冷熱不調者乍瀉乍痢飲食傷飽者注下酸臭諸有積以肚熱纏痛推之諸有氣以狀如蟹渤驗之宛其受病之源次之對病之劑大要以散風邪行滯氣開胃脘為先不可遽用固濇劑〔甘〕〔草〕葦以補住寒邪不可遽投調華蓋〔藿〕〔香〕纏擾撮痛則為裏急後重所以日夕淹延而未已也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若風邪挾熱則所下黃而

瀉痢方論

赤焉其白者冷痺腸間津液凝滞則白也若寒邪併之則所下白而黒焉冷熱相交故赤白相半重者狀若膿漦而血雜之輕者白涕中間微有赤縷是也内挾風邪故清血流注或濕毒乘虚入腸胃之間則下如豆汁或有瘀血是也論者以手足寒為冷手足温為熱於理甚當亦當合赤白而並観之烏乎其的矣雖然風寒暑濕感之於外者也其有大腎傷飽宿酒漿醯醋以成積滞於腸間縱情加奔走勞役以耗精血此非病生於内者乎必明別内外而推度之則受病淺深用藥輕重知有定嚮矣毋紊曰無積不成痢○下痢壯熱須用敗毒散加陳米問與五苓散有風邪挾暑者赤者與敗毒散冷者白者不換金正氣散加木香

之方見水飲門

瀉痢證治

敗毒散 治風邪寒邪壯熱下痢方見寒類 陳米飲調 五苓散 佐

木挽金正氣散 治風邪寒邪冷證下痢方見寒類

治要瀉濕湯 方見吐瀉門 加官桂 木香 治風寒冷證下痢仍以五苓散 利其小便

薑附湯 治傷濕下痢仍以五苓散 伏令 治濕冷下痢

理中湯 方見瀉門 加厚朴 木香 伏令 治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

艾薑丸 乾艾葉 四兩炒焦存性 川白薑一兩炮

右為末醋煮麪糊丸桐子大每柒拾丸食前清米飲下

人參五苓散 冷證瀉痢通用

木香 厚朴 製 蒼术 米泔浸一宿 乾薑 炮 肉豆蔻 生各一兩半 夏麪 陳皮 阿膠 炒 縮砂 甘草 炒各二兩半

右剉每三錢薑棗煎食前服

香蘇敗毒散 五物敗毒湯 六和湯 方見暑門 治傷暑下痢 五苓散

升麻湯
升麻　白芍藥　甘草炙各十兩　白乾葛十五兩
右麤末每三錢薑三片同煎呑感應丸治傷暑下痢纏痛
黃連阿膠丸方見數門　芎藭湯方見瘡門　治熱證發抵下痢亦治產前
香連丸治冷熱不調瀉痢
黃連一兩用茱萸半兩炒　木香一分
右取香連為末醋糊丸桐子大每三十丸米飲下前戊己丸通用
真人養臟湯治冷熱不調下痢方見瀉門依前法用之
白薇散治食積下痢腹痛方見瀉門依前法用之
感應丸方見諸氣門　鮮魚雜菓丸方見積熱門　治諸積下痢用玉本散送下
和劑泡氣飲　太真香散　白薇散　白薇青黛散方見諸氣門治諸氣痢

牛乳湯治氣痢泄如鼈潮
牛乳半斤　蓮藕末二升
右同煎減半空腹服
茱連丸治赤白下痢
黃連去鬚半十一截同吳茱萸炒熟分為二如
右各碾末醋麪糊丸桐子大赤痢專服黃連白痢專服茱萸
赤白併服或多或少以意增減每服七十丸陳米飲下以愈為度
胃風湯治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血
人參　白伏苓　川芎　當歸
辣桂　白朮　白芍藥等分
右剉每服三錢棗一百餘粒同煎食前挑服腹痛加木香
肉豆蔻散治冷證久痢不止方見瀉門

附理中湯　方見寒類　茱附湯　方見溫類　治虛損久痢四肢厥冷以意擇用

蒜苔劑方

石蓮肉 日乾

右為末每服二錢陳米飲調下便覺思食仍以日照東方壁土妙真 附子 為末姜棗略煎佐之

斷下痢　止赤白痢

伏苓　白朮各一分　甘草半分　草果連皮一枝
大黑栗殼十四枚去筋蒸剪齊醋浸炒燥加木香半分

右為麤末分作兩服每服姜五片 大棗三个大 烏梅 三个食前煎服 通用

前前服 通用

毛華白附　治臟腑久虛止瀉止痢

陽起石 入乾鍋取通紅酒淬見日 白石脂 煅紅 鍾乳粉一兩

左顧牡砺 鹽泥固濟煅紅取白者各半兩

右研極細如粉和艸糊米糊圓空心米飲下渴者 人參湯下亦治陽風下血又震靈丹 方見寒類 通用

赤石脂 禹餘糧湯　治瀉痢諸藥不效以此固其下焦

赤石脂 判小蚬 禹餘糧 煅醋淬以碎為度

右等分炙和每服四錢空心煎溫服

瀉痢須要衣服周密恐傷風冷久瘕熱血痢裏急而痛甚雖已瘳通瀉條然甚痛不減者非熱亦非積也榮血虧少陽剛勝陰故耐用藥當以 川芎 為佐榮血一調其痛立止

附諸方

芎藭湯　拔粹方　治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

芎藭　防風　芍藥　黃芩各一兩

右�once咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

經驗指迷湯　治傷寒下痢亦治久血熱痢

薤皮三兩　苗茶二兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛加[小]

[芍藥甘草湯]（千和方）治一切溫熱悪心痢頻併窘痛無問膿血

芍藥　黃蘗各一兩　當歸　黃連各半兩

右為末水九豆大溫水下三四十九寺服忌[生冷]

[黃連阿膠湯]（机要方）治老人奉養大過飲食傷脾時或瀉痢

白朮芍藥湯　治氣血俱虛之人或瀉或痢並見泄瀉門

[當歸芍藥散]（粹七方）治痢疾痛甚者

蒼朮二兩　芍藥一兩　黃芩　官桂各五錢

右㕮咀每一兩水二鍾煎至一鍾溫服

[芍藥黃芩湯]（拔粹方）治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉浮実

芍藥及下痢膿血調粘

苗茶　芍藥酪一　甘草兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

[調胃承氣湯]（保命集）治下痢純血

[四物湯]　當歸酒洗　川芎　芍藥　熟地

右㕮咀水煎服

[地榆芍藥湯]（拔粹方）治泄痢膿血乃至脫肛

地榆二兩　蒼朮八兩　芍藥各三兩　卷柏

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

[阿膠梅連丸]（宣明方）治下痢無問久新赤白青黑疫痛諸証

金井阿膠淨草炙妙秀　烏梅肉去核　黃連去頂　乾姜炮

黃柏到妙研細　赤芍藥

赤芍藥

當歸 酒洗 各等分

右為細末入[阿膠]研勻水丸梧子大溫米飲下十九食前連夜五六服小兒丸如菜豆大忌油膩腥肥諸物

[石灰皮散] 經驗方治暴瀉不止及痢赤白

用[鍛石灰皮]燒存性不以多少空心[米飲]調下二錢

[保和丸] 專治脾虛因積作後重者不可下用此消導方見積聚門

[秘傳香連丸] 治男婦小兒諸般痢疾作痛並久痢虛脫濃血不止者服之神効如初痢二日之間不可服恐攔住積滯熱毒他証愈劇反為咎矣

川黃連 酒閙炒 五兩 木香 乳香 沒藥 各五錢 白豆蔻 各一兩半

右為細末[面糊]丸如彈子大每服一丸赤者[甘草湯]磨下白者[生姜湯]下

[黃連湯] 治痢疾

黃連 滑石 生地黃 白芍藥 蒼朮 台朮 當歸 青皮 各等分 條黃芩 各半分

右㕮咀每服忝錢水二盞煎八分去滓食遠溫服

[大黃甘草湯] 治下痢舌黃口燥胸滿作渴身熱腹脹譫語此必有燥屎宜下後服[木香黃連]苦堅之[三乙承氣湯]暑毒溫熱傷後下痢膿血宜服二方見傷寒門

[導水法] 見前泄瀉門詳論

脫肛

脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所畜惟虛則寒寒則內氣餒而不能收而況大腸之厚薄膏脂之脊肥亦視夫內氣之

虚实何如耳大凡脫肛須以温湯澆令和軟然後摩掌而入治法以温斂行之其有産婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虚亦有此證○此腸頭作癢即是腹中有虫（生用）者前湯熏洗仍以（熟用）者前服其脫肛腸風痔漏不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用絶有一毫染汚其間立見痛腫如此急以温湯滌之患在肛腸叠溷後須用一洗

脫肛證治

（蝟皮散）治肛門脫出不收

蝟皮一个（火内燒令脆）　磁石半兩（法醋煎數沸）
辣桂三分　　磁石七次（為末）
　　鼷頭一枚（慢火炙令焦黄）

右細末每服二錢食前米飲調下仍以破草鞋底炙上面熨按令入

（鼷頭散）治脫肛

鼷頭（慢火炙焦黄存性）

右為末塗傳腸頭用軟紙襯鞋底按入仍以方寸匕食前米飲調下

（磁石散）治脫肛

磁石半兩（焦入煎沸醋中凡七次）

右為末每服一錢空心米飲調下

（香附散）治脫肛

大香附　荊芥穗（各半）　縮砂二分半

右末每服三錢食前新水煎数沸即服小兒通用

（豬肚丸）治大腸虚冷脫肛不收及腸風諸痔

白礬（枯）　訶子（裂取肉）　枳殼（去穰麸炒）
緑礬（枯）　生半夏　生附子（去皮臍各一兩）

白附子　生南星　蝟皮（一个刺碎燒存性）

黄瓜蒌（一个燒存性）

雞冠花（乾妙二兩半）

右細末醋煮麪糊丸桐子大每服二十丸空心温酒下或

【散】送下

【細砂湯】治大腸虛而浹熱脫肛紅腫

縮砂　黃連

右末每一錢米飲調下

【黃連阿膠湯】方見痢門　治腸虛為暑熱所攻脫肛紅腫肛門熱痛仍以【淨末】【導】泡湯温洗次用【薄荷風】【膩粉】【散】津液調傳【鉄粉散】治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

鉄粉研細

右入【白礬】末炎和傳之即按入

【蒲黃】治脫肛热痛

生蒲黃以猪膏和傳即按入

【桑螵蛸】治脫肛

桑楪上緑桑螵子燒存性

右末以【猪膏】和塗雨後緑桑者佳

【豫土膏】治脫肛

豫土子燒存性猪肪和傳

【木賊散】治脫肛不热

木賊燒存性為末摻以帛按入

【獨虎散】治脫肛不收【五倍子】【膩粉】各一錢半兩末井水三椀入磁瓶内慢火煎半續入【和】【膩粉】各一錢乘热熏洗仍以帛按入

【石灰方】治大腸積冷久年脫肛

石灰炒热以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以【無憂散】末傳

【敗毒散】小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪加【藥】

煎方見寒類

【熏洗方】

黃皮桑楪取葉三升煎帶温

右以布盛罨小兒肛門輕手按入次用門臼中細墜綿焦撲之

【小兒家法】【百合穴】直取前後髮際折中横取兩耳尖折中在順

之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸灸則肛腸自收

雞屎醴 虫蝕肛門咽乾唇瘡齒齲方見活人總括

附諸方

三聖散 治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨煅五分　木賊燒存性二分

右為末摻托之

一方治脫肛用**五倍子**為末每用三錢入**白礬**一塊水二碗煎洗

一方用**黃柏蘿蔔**子連殼一對**橡斗**十六个搗碎水煎三五沸入**朴硝**熱洗其肛自收

一方用**蛇床**為末乾貼患處

斜炙法 命門一穴在十四推下灸二七壯治大腸虛冷脫肛不入　長強一穴在尾閭骨尖上灸二七壯治痢風痔一潮脫肛不收

新刊仁齋直指附遺方論卷之十四終

新刊仁齋直指方論附遺卷之十五

積熱　附　風熱　火證

積熱方論

酒麪煎煿雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉朝斯夕斯甘所由來尚矣夫人偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷煖得中而已矯枉過正識者憂焉然則欲去積熱將何如曰**三黃**第一藥耳雖然凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心**鬼心散**所不可闕熱能傷血**四順清飲**又不可無此自本自根之論也若夫酒後之麪飯後之酒最易積熱又當防於未然

積熱證治

小柴胡湯 諸熱證通用方見傷寒證括　**敗毒散** 解熱次之方見寒

三黃湯 治積熱蘊隆三焦皆熱大小便閉

黃連去鬚　黃芩　大黃濕紙煨等分

右剉細每服三錢㘝三片慢火煎食後服

三黃圓 證治同前即前項藥品等為末煉蜜圓桐子大每參㕮拾圓熟水下

洗心散 治壯熱煩燥風熱壅塞大小便秘澁

大黃濕紙煨甘草炒　當歸　芍藥
麻黃不去節　荊芥穗各三兩　白朮七錢半

右末每服貳錢半生㘝薑一片煎少許同煎食後服

四順清凉飲 治血熱蘊結壅滯

大黃米上蒸日乾　赤芍藥　當歸　甘草微炙等分

右為麤末每二錢半慢火煎服小柴胡湯亦治血熱可擇用

八正散 治心熱煩燥目赤咽疼小便淋閉

大黃濕紙煨瞿麥　木通　滑石
萹竹　車前子　山梔仁　甘草炙等分

右剉每服三錢入燈心煎食後服大凡心熱要得小便流利而出

甘露飲 治諸瘡發熱

生乾地黃　熟地黃　天門冬　麥門冬並去心
黃芩　枇杷葉刷去毛淨　山茵陳　枳殼製
石斛　甘草炙等分

右末每服二錢半食前煎服加乾葛柴胡尤佳

木通散 治諸熱利小便

生乾地黃　木通　荊芥　地骨皮
桑白皮炒　甘草炙　比梗等分

右剉每二錢㘝三片煎服

甘露湯 治諸熱煩渴大小便澁

黑豆貳合　甘草貳錢

右生㘝柒片井水煎汁服

黃連湯 治一切熱血熱眼熱酒熱並主之

黃連去鬚對碎

右以井水浸良久磁椀盛之置鐵銚內隔湯燒取清汁服再服

牛黃涼膈圓 治上焦壅熱口乾咽痛煩燥延潮

馬牙硝 寒水石煅 硬石膏酪貳廿草微炙壹兩

牛膽南星三分紫石英半兩研飛牛黃研飛脳子麝香各壹分

右末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服一圓温漿水入參湯調下

解毒雄黃圓 取積下熱

雄黃研飛 川鬱金各壹分 巴豆十四箇去油

右末醋煮麪糊圓麻子大每服伍圓加至七圓熱茶清下裹實用此喉閉以熱茶清調灌

竹茹湯 治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

半夏三分用姜汁半盞煎至十沸焙乾 竹茹參兩 甘草參分生

右㕮咀每三錢青竹茹一彈子許薑棗煎溫服或加薑汁

諸熱濟衆黃連圓 黃連阿膠圓皆可用

附諸方

涼膈散 治臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並此皆治之

連翹 甘草炙 大黃 朴硝各貳兩

薄荷 黃芩

右㕮咀每服水一鍾半煎至七片薑少許煎食後温服

解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安卧大便微秘

大黃酒煨 黃連酒炒 黃芩酒炒 甘草炙

桔梗錢二 柴胡 升麻 連翹

當歸身錢一

右㕮咀每服水二鍾煎食後温服

大金花圓 治內外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋閉咳嗽衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽者

黃連　黃柏　黃芩　梔子仁
大黃各等分
右為末滴水丸如小豆大每服三十九新汲水送下

加味金花圓　治內外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉
黃連　黃柏　黃芩　山梔炒已上各二兩
梔梗　半夏泡　陳皮　人參去芦各一兩
右為細末滴水丸如小豆大每服五十九淡薑湯送下

清涼膏　治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋者
黃芩　車前子　麥門冬去心　地骨皮
甘草炙各半兩　薏苡擘炒各七錢半　石蓮子去心　白茯苓
人參各一錢半
右㕮咀每服水一鍾煎服如發熱加

經驗地仙散　治骨蒸肌熱一切虛煩
地骨皮　防風去芦各壹兩　鷄蘇　人參
甘草各貳錢伍分
右㕮咀每服一兩薑三片竹葉五片水二鍾煎至一鍾去滓通口服不拘時候

甘露湯　治骨蒸勞熱自汗
甘草　人參去芦　知母　黃芩各貳
茯苓　熟地黃　葛根各叁錢　石膏伍錢
竹葉二十片
右剉㕮咀作一服入薤一合煎服

人參養榮湯　治諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱
人參養榮湯　治久病虛損口乾食少欬而下利心驚悸熱身瘦五心煩熱四肢怠惰欬嗽咽乾

黃芪散　治男婦虛熱自汗並見虛勞門

自汗食少
人參　肉桂
半夏泡　紫菀
黃芪　甘草
鼈甲各伍錢　秦艽
柴胡各叁錢

右�once咀每服壹兩姜水煎服

柴合建中湯 治臟腑虛損身体消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡去芦壹兩　細辛
桂心　橘皮去白
茯苓去皮　麥門冬去心
甘草炙各壹兩　半夏湯泡七次

右�once咀每服四錢水一鍾姜伍片棗一枚煎服不拘時

防風當歸飲子 治煩渴發熱虛煩燥病

六物湯 滋陰退熱並見火門

龍膽瀉肝丸 治心中鬱熱消煩渴凉上膈解酒毒治肺熱咳嗽吐血鼻衄崩中下血血淋尿煩諸淋胃熱口臭方見火門

當歸補血湯 東垣方 治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無通評虛實論云脉虛血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎湯惟脉不長實為辨熱若誤服必死此病得之於飢困勞役

白虎湯
黃芪一兩　當歸酒製二錢

右�once咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服之空心服

柴胡飲子 解一切肌骨蒸熱積熱作往來及傷寒發熱汗不解或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病皆治

柴胡　人參
大黃　當歸酒浸
黃芩　甘草炙

右�once咀每服七錢水二鍾姜三片煎八分食後服

清心蓮子飲　治心煩懊憹反復心亂怔忡上熱胷中氣亂心下痞悶食入反出

黃芩　生甘草　二錢半　麥門冬　五錢　人參　茯苓　地骨皮　各一錢　車前子　五錢　砂仁　四錢　黃連　五錢

右為細末湯浸蒸餅丸如綠豆大每服一十九食後時時津唾嚥下內經云心肺位近而高偶制其小服此緩治之理也

補中益氣湯　東垣方　治陽虛發熱又患虛勞

調中湯　東垣方　治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊憹狀並見內傷門

凉膈散　各氏方　治肝經鬱熱

當歸　酒洗　龍膽草　川芎　山梔　炒　大黃　羌活　防風　去蘆

右為末蜜為丸雞頭子大每服壹二丸

凉膈散　治脾熱口臭咽乾

藿香葉　七錢　山梔　二兩　石膏　五錢　甘草　三兩

防風去蘆

右為末蜜酒拌微炒香無令焦每服一錢

人參湯　治手足心發熱

升麻　葛根　柴胡　白芍藥　各一兩　防風　甘草　各五錢

右剉散服伍錢連須葱白三寸煎稍熱服不拘時

大青湯　治上焦挾結勞役發熱並瘟疫時行發熱　方見火門

風門

防風通聖散　治風熱諸証　方見中風類

消風散　各易方　治風客陽經邪傷腠理背脊強直言語蹇澁鉢挾惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐泄沫頭目暈眩常服消風去邪　方見傷風門

和劑方　治諸風上攻頭疼目眩鼻塞声重皮膚瘙痒眉角牽引婦人血風一切頭風並皆治之

白殭蚕去絲嫩炒 荊芥各二兩 防風去苗叉各四兩 金喝拙一兩 甘草炙各一兩

右為末每服半錢食後臨臥調下

龍腦川芎丸 御藥院方 消風化滯除熱消痰通利七竅爽氣清神

桔梗一兩五分 片腦六分 砂仁去皮 白豆蔻五分 薄荷去土五分 川芎 防風去苗 甘草炙各一兩

右為末煉蜜為丸每兩作二十丸每服二丸細嚼茶清送下

○附火証

火証方論

劉宗厚曰火之為病甚害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能禦之遊行乎三

焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不安動能不違於道常以禀位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之極也病則死矣經所謂水不勝二火之火出於天造君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激之其火踰起蓋大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君主自焚則死矣肝溪又路火出五臟王病曰諸風掉眩屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人為又考內經病机一十九條內本屬火者五諸熱瞀瘈皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契曰經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁渡脹大皮之有聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂昏聾腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄瞀癰

血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣所爲也若脊痛胃脘痛操縵狂越罵詈驚駭附腫疾瘧痺耳鳴及龍嘔洞溢食不下目昧不明暴注瞤瘈暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所爲也是皆火之變見爲諸病也爲脉虛則浮大實則洪數藥之所主各因其爲君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之爲可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃柏之爲可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火龍膽瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之爲若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之爲若君心火亢極鬱熱內夾爲陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴

之爲若腎水受傷真陰失守無根之火爲陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之爲若右腎命門火衰爲陽脫之病以温熟之劑濟之如附子乾薑之爲若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之爲不明諸此之類而求火之爲病施治何所依據故於諸經集著其說備處方之用庶免實火虛火之禍也滑氏曰虛勞証中多云相火爲患者何氣使然是爲火也請明議焉對曰華陀云三焦者相火也相火之相者譬之如丞相之相也善政之道輔佐過身惟特綱紀所接元陽以爲一身統領使百脉安和上焦曰膻中之爲宣行氣血中焦曰中脘之爲腐熟水谷下焦曰膀胱之所漉便精溺無形而有用焉故曰三焦蓋三焦者爲諸陽升降之方呼吸發源之所三元有道九竅流通神志相關命脉相繼過身有倚氣血無偏治化宣和是無虞矣又曰於火爲患者何以驗云對曰於斯者是因脉虛之人房勞過損腎水乾枯無因既

濟相火顛生或因七情所感或因怒火傷肝肝木相乘為熱為風風邪鼓舞火性上炎為百病之長也華陀云三焦積熱於火空者吐血無痰咳嗽喉痺痰涎明虛實欲知治嗽先補其源身熱者滋陰清氣惡寒者和陽散陰治寒遠寒治熱遠熱甘緩温和調虛之則丹溪云陰虛火動証雖治用四物湯加炒黃連降火補陰龜板乃陰中之至陰也又云氣從腳下起者陰火也氣從脚下起入腹如火者乃虛之極也蓋火起於九泉之下多死一法用神芎導水湯調安胃氣以四物湯加降火藥服之妙

治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛脉右關緩弱或弦或浮數

羌活	甘草炙	蒼术各一兩	
升麻	柴胡一兩半	黃芪蜜炙	
黃連酒炒半兩	石膏半兩	人參	黃芩各七錢

右㕮咀每服一兩或半兩水煎服

升陽散火湯 治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻	葛根	白芍各半兩	
人參	甘草炙	獨活	羌活
甘草炙三錢		防風各半錢	柴胡八錢

右㕮咀每服一兩水煎積熱服

清胃散 治一切肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數

八正散 治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑秘結小便赤澁

三黃丸 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

三黃湯 治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁大便秘結並宜治之

大金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳衄血瘦弱頭痛并胃熱肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又曰梔子解鬱丸

加味金花丸 治內外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉火証方並見積熱門

東垣清膈湯 治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚方服目門

大生地丸 治上焦熱結勞役發熱並痰火瘟疫發熱方見疫門

宣膈丸 治大人小兒藏腑積熱口舌生瘡痰實不利煊燥多渴腸胃秘澁便溺不利俱見積熱門

神芎丸 治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽膈能令遍身結滯宣通氣利而愈神強体健耐傷省病

大黃 黃芩 各錢四兩
黃連 薄荷 各半兩
右爲末水爲丸如小豆大溫水下十九至十五九二十九

清心湯 即宣膈散料內加黃連伍錢用蜜與竹葉同煎

連翹 山梔子 大黃 薄荷葉
黃芩 各伍錢 甘草一兩半 朴硝二錢伍分 加黃連半兩
石爲細末每服伍錢水一盞少許竹葉十片同前七分服

黃芩湯 治心肺鬱熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬去心
木通 生地黃 甘草 各等分
右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞食前溫服

玄明粉 御藥院方此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澁並宜服之以竹葉前遍澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用磁碓子按實於炭火內從慢至緊看然成汁前滯直候不響再加頂火一煆便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去大毒然後研爲細末每二斤入甘草生熟二兩爲末一處攪勻臨睡對量用之或一錢二錢以冰

前湯或（綠白湯）下

防風通聖散 方見風門 清燥湯 方見慶門 龍腦雞蘇圓 方見鼻門

地骨皮散 治虛潮熱骨蒸壯熱

六味地黃丸 治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血

補陰丸 降陰火治發渴骨蒸補腎水眞陰不足 俱見虛勞門

大補丸 丹溪方 去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補氣藥下血虛以補血藥下並不單用

川芎 川黃柏炒褐色 右以水丸服

六物湯 滋陰血降腎火

白芍藥酒炒 生地黃酒洗 當歸酒洗 川芎 黃柏蜜炒 知母酒炒各等分

右㕮咀用水一鍾半煎至八分食前溫服

當歸散附膿圓 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋脈拘攣伸志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤動胸膈咽嗌不利腸胃燥澁躁擾狂越罵詈驚駭火熱共証

當歸 草龍膽 黃柏 山梔仁 黃連 青黛各半 木香 青皮各壹錢 右爲末煉蜜爲丸如小豆大 金匱湯 下三二十丸此藥瀉肝心脾肺腎胃火之神藥也

千金方 治諸疾後火熱乘肺咳唾有血胸脇脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬 桑白皮 生地黃各一半夏 紫菀 枯萎 淡竹葉 麻黃各七 五味子 茸草各伍錢 右㕮咀每服伍錢或一兩入 姜煎

防風當歸飲子 宣明方 治痎渴發熱盛煩火証

柴胡 人參 滑石 三兩 大黃 甘草 酪一 黃芩 當歸 芍藥 防風 各伍錢

右㕮咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓通口服不拘時如有痰嗽加半夏泄者去大黃

石金圓 丹溪方 治肝火

黃連六兩 吳茱萸一兩

右爲末水丸或麵糊丸白湯下五十九

瀉陰降火湯 養血降火之聖藥也

川歸身 酒洗 地黃 涼血用生補血用熟 天門冬 去心 白芍藥 薄荷炒 白术 各一錢 麥門冬 去心 甘草 炙各伍錢 知母 黃柏 俱炙 陳皮 洗 各六分 久病去之

右㕮咀姜水煎服 氣血虛加人參 血加當歸 熱加

痎冷

痎冷方論

苟得其養無物不長苟失其養無物不消人之處世飲食爲上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而爲之沉痼也男子精流女子帶下肾寒腦冷氣乏血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法雖貴乎養氣中佐以薑棗雖貴乎爲俞抑古人所謂精不足者補之以味腥心火獨炎識者未保其往繼此尤當加意焉若夫執劑剛燥亟欲陽氣頻回吾恐腎水易

十補湯 治諸虛百損

人參 白术 白伏苓 甘草 炙 辣桂 當歸 川芎

熟地黃　白芍藥各半兩

右剉散每服參錢半薑棗煎空心食前服加熟附子溫之

【附子理中湯】（沉附湯）並主痼冷須加當歸方見寒類

【薯蕷丸】治虛勞虛熱精血耗少

熟地黃　山藥各三兩　杜仲炒斷絲　鹿茸酒炙各壹兩半

北五味子　肉蓯蓉　牛膝並酒浸沉香半兩麝香半錢各一兩

右末煉蜜圓桐子大每參伍拾圓食前鹽湯下

【八味圓】治下元冷憊腰脚疼重虛勞消渴

熟地黃　山茱萸各二兩　辣桂

熟附子酌一　澤瀉　牡丹皮　白茯苓各壹兩半

右爲末煉蜜圓桐子大每服參拾圓食前鹽湯下

【黑錫丹】治脾腎俱虛冷氣刺痛止汗除濕破癖

黑錫洗鉛取淨　透明硫黃各砂各二兩　金鈴子蒸熟去皮

沉香　木香　熟附子　葫盡巴酒

肉桂各半兩船上煎香炒破故紙酒浸炒

陽起石研細水飛　肉豆蔻麵裹煨各一兩

右用新鐵銚如常法結黑鍚硫黃砂子地上出火毒候冷研極細餘藥並末同研自朝至暮以黑光爲度酒麪糊圓桐子大陰乾每三五十圓空心鹽湯下婦人又醋湯下本方加減

【當歸丹】升降水火助陽接真治咳逆翻胃痰結頭運腰痛腰疼霍亂吐瀉

好硫黃研　黑錫　水銀　硃砂研細各一兩

右淨鐵鑊以厚紙布扎柄七錢半濾去滓壹兩淨再放鑊內用鐵匙炒攪將熟無性其硫黃皆燒去但得鉛熟遂傾放地下紙上令硬即碾開以砂篩出鉛粉其餘成珠者再炒碾爲末次將鑊銚頓慢火爐上又鎔鉛粉以熟硫黃壹兩漸

入頻攪炒絶見黃煙上急拖過冷爐上少頃又過火上再攪
炒得(必)與(硫黃)皆成黑色(極)調和了却放冷爐上候(盡)微
冷又頓在十分微微火上少頃入(水銀)以鐵起頻攪切勿令
青煙上煙上便走了(水銀)又次入(朱砂末)頻攪炒令十分調
和即傾放地下紙上候硬別碾爲末糯米糊圓彔豆大每參
拾圓鹽湯空心下

(靈砂)諸虛痼冷厥冷神效

好硫黃壹兩

水銀參兩

右修煉家有見成者贖研細糯米糊圓小麻子大每服伍七
圓加至拾伍圓空心(人參)(棗)湯下或鹽湯下○疝氣偏墜木
腎腫疼炒(茴香)入(酒)煎候温下○虛勞喘嗽(生薑)(烏梅)(紫蘇)
(葱)煎湯下○盜汗小便多煅(牡蠣)入(鹽)煎湯下○痰癊不已
(桃枝皮)湯下○服藥腰痛腰疼(乳香)(木香)湯下○嘔逆翻胃(丁香)
(白伏苓)湯下○中風咬厥白青(木)

(香)湯研灌○走注風遍身痛實(忽白酒)下○脚痛(木瓜)湯下
○氣滯(生姜)(陳皮)湯下○婦人血痛氣痛(延胡索)(五靈脂)酒
醋各半煎湯下○小兒慢驚(沉香)(丁香)煎湯
吞下

(獨附散)治腎氣上攻項背不能轉側亦治冷痺不仁

熟附子 (末)

右每服(附子末)二大錢七(川椒)二十一粒用白麪塞煎水盞
半(姜)七片煎半去椒入鹽少許通口空心服

大凡腎氣須以(川椒)引而歸經則安矣又一證腎虛血寒氣逆
而脹胃腹走痛中脫痘漿兩眼多瞼此寒泣血也(二陳湯加官)
(桂)(當歸)下(安腎圓)立愈若大便溏更加(肉蔻)(二陳湯)方見寒類

(安腎圓)

附前方

(沉香半夏丸圓)和細方治內挾積冷脇腹攻急痛引腰背面色

蔓黃臟腑自利小便滑數少陽一切氣痛並皆治之
桃仁去皮尖 木香
川烏炮去皮臍半兩 沉香
茴香 補骨脂炒
右㕮咀到服三錢水一盞入鹽少許煎八分空心熱服

復陽丹 濟生方 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細亂連傷寒陰証悉皆治之
川烏去皮臍四兩 天椎炮去皮二兩
陽起石火煅研 朱砂臨研一兩
右爲末酒煮神麴糊丸如梧桐子大每服伍十丸空心鹽湯下

附子面脂散 聲聽方 治氣虛積冷心腹絞痛
肉豆蔻 乾姜炮
木香 附子大者一枚炮去皮臍各一兩 茴香
白朮炒 人參 甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞少許煎七分空心服

雄朱丸 百一選方 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱委頓勞瘵
雄黃 朱砂各二兩
以上用沙合一箇先以雄黃二兩內外簞盛黃入藥於內以和麪作餅盖定合口以赤石脂固濟合縫又用黃泥裹令了一重再用黃泥紙筋又裹一重先以草火燒令乾次以炭火五斤漸又添至一斤候火力漸消取出掘地坑一尺埋一宿去火毒取研入後藥
丁香 茴蔻
白朮略一 赤石脂 胡椒 附子
右爲末入前藥研勻以清酒二升二分熬去二分入煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心鹽湯任下

秘泄 附 轉胞 便多

小便不通方論

腎主水膀胱為之府水渚於膀胱而泄於小腸實相通也然小腸獨應於心者何哉蓋陰不可以無陽水不可以無火水火既濟上下相交此醫術所以流行而水實開闔所以不失其司耳惟夫心腎不濟陰陽不調故內外関格而水道澁傳送失度而水道滑熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絶無其熱微者小便難而僅有腎與膀胱俱虛客熱乘之故不能制水水挾熱而行澁焉是以數起而弱有餘澼腎與膀胱俱冷內氣不充故胞中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多若夫下焦蓄血其與虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛冀不能温制水液則便溺欲出而不禁亦是皆心不與腎交通故或冷或熱而滑澁隨之矣继自令心氣旺盛小便難遏以清利行之如（小麥）（人參）之類是也心氣虛怯小便滑利溢和益之如（乳香）（益智）（巴戟）（人參）之類是也演觸其間腎實虛

腎可以舉隅而反或者膠柱調瑟詳於腎而略於心其可乎雖然小腸之與膀胱心腎所主固也然素問有云水之本在腎其末在肺則知天一之水自上而下相為貫通亦猶心腎之不可不升降也昧者夜間忽縮小便使水氣上逆乘肺痰涎喘欬激乱爭鳴莫來不可與於此乎見肺主氣也小便澁滑又當調適其氣焉哥徒門（高陽）（侯）可以逐肺經之水

水便不通證治

（高陽）腸治心腎有熱小便不通

牛蒡前音揖取自然汁半盞入（麝）壹匙調服

（連翹）腸治心腎有熱小便不通

赤茯苓　木通　車前子　燈心　滑石等分

荆芥　生蒲黄　赤芍藥　桑白皮炒　甘草微炙

右末每服貳錢慈頭壹片（紫蘇）伍葉煎湯調下

八正散 治心經邪熱小便赤澁不通方見積熱門

五苓散 方見水飲門 加赤伏苓 治小便不通每服貳錢用燈心

山茵蔯 各壹握煎湯調下

參者湯 治心肺虛而客熱乘之小便澁而數數而瀝

赤伏苓七分半 生乾地黃 苗者

地骨皮兩半 人參 北五味子 桑螵蛸微炙

甘草炙各二分半 兎絲子酒浸研

右細剉每服參錢新水煎臨熟入燈心貳拾壹莖溫服

平補圓 治腎虛小便數而瀝如欲滲之狀或虛勞內損遺泉或下焦虛寒小便欲出而不禁通用方見消渴門

茸香圓 治下焦虛冷泉多或虛勞遺泉或欲出而不禁

鹿茸酥炙 肉蓯蓉酒浸焙 當歸各半兩 雞內金七分半微炙

龍骨 赤石脂 禹餘粮蝦蟆汁醋淬為度各研細

牡礪灰 巴戟 乳香各二分半

川白薑 益智仁

右細末糯米糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下

柳氏氣淋湯 治下焦蓄血漱水迷忘小腹急痛內外有熱加生蒲黃方見血類

大小便不通

綿附法 治小便大便不通證治通用

巴豆去皮二十一粒研二味同研爛捏餅烘熱掩臍中以帛札定良久氣透自通不然再換一劑

轉胞證治

轉胞方 治胞轉小便不能通先用

良薑 葱頭

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蕉帛洗以手拊摩臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

紫蘇莖葉各一握

蜀葵子二分半 赤芍藥

右剉每服三錢煎取清汁再煖乘熱調蘇合香圓二丸并研

白芍藥各半兩

細末[盞]半錢食前温服○又法炒塩半斤囊盛熨小腹
便多證治

[多潤方][腎實丸]治腎虚多溺或小便不禁而濁
葫盧巴炒 故紙炒 川練肉用[杜仲]炒去牡蠣
大熟地黄洗焙 益智仁 鹿茸酒炙 山茱萸
代赭石煅熱醋蘸淬次研細 赤石脂各三分 龍骨
海螵蛸 熟艾米醋浸一宿炙焦 丁香
沉香 滴乳香各二分 禹餘粮煅醋淬研為度細研
右細末水煮糯米糊圓桐子大每服伍拾圓食前[温]煎
湯送下

[附方]

[導氣除燥湯]東垣方 治小便閉塞不通乃血澁致氣不通而竅澁也
知母酒炒三分 黄芩酒炒四分 滑石炒黄色 澤瀉

茯苓麦皮各
右件和匀每服半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱服空心
如急閉不計時候

[當歸湯]東垣方 治腎疸目黄甚至渾身黄小便赤澁
升麻半兩 羌活 防風 藁本
獨活 柴胡已上各五分 已上治腎疸目黄渾身黄
白木半兩 蒼木一兩 猪苓四分 澤瀉三分
茯苓二分 已上治小便赤澁
葛根五分 甘草 人參各三分 黄蘗一分
麹六分
右件剉如麻豆大分作二服每服水三盞煎至一盞去滓稍
熱服食前

[黄金散][黄連圓]治心火炎上腎水不升致便水火不得相濟膀胱
小腸積熱或塞閉不通或遺溺不禁或白濁如泔或膏淋如

膿或如[泡]水或如小[石]相似者諸熱証也

[辟]金　黃連酪一　黃芩　大黃[酒浸]各一兩　滑石　現珀研　白茯苓酪四　黑牽牛[炒]一兩　右為末水丸如梧子大每服伍十丸滿湯下空心服如用消導飲食臨心火可加[泥]

一方治孕婦[轉胞]并男子小便不通研各伍錢[木通]各三錢右作一服水煎溫服外用[茯苓][炒][為末][白滑石]和搗成膏或用[生薑汁]調貼臍中立通

一方治遺尿失禁用[益智][去皮鹽炒]二兩[烏藥]酪四兩右為末以[山藥]酪陸兩打糊為丸如梧子大每服七十丸空心[煎米飲]送下

大便秘澁方論

凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所以司出而不納也今停畜編結獨不得其疎導何哉抑有由矣熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也

人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道澁此大腸之挾冷然也腹[膿]脹[悶]脘膈欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風涸燥秘澁此證閉塞以風氣蕃灼得之若夫氣不下降而較道誰意通之澁必有其證矣剂量治法執熟者[三黃湯]冷者[金沸散]宿食

[精澤丸]風秘者[麻子仁丸]氣不下降則[活便如救湯]固在精澤而蕃熱其間縱橫交應亦自智中活法充之矣然而大腸與肺為表裏大腸若熱則清利冷則溫利積聚者按其積風壅者疎其風若肺為四者之樞細乎不然和何以曰肺與大腸為傳送

[大黃飲子]治身熱煩燥大便不通

川大黃[濕紙裹煨去皮切]　枳殼[浸去瓤麩炒各半兩]　梔子仁　川升麻　黃芩　甘草[炙各弍兩半]　生地黃一兩　人參

右剉散每服叁錢 生薑 伍片 棗 貳枚 煎湯 三沸 去滓 熱服

三黃湯 治執證大便結方見積熱門

三黃丸 治執證風證大便不通方見積熱門

當歸丸 治大便挾冷結滯用 麻仁 煎湯下 方見脾疼門

半硫丸 治冷秘風秘老人秘結

鼠白半夏 湯泡去次焙乾等分

右末生薑汁煮白麪糊築圓梧子大每服貳拾圓壹湯下或用 蔥白 壹條 生薑 叁片煎熟入 阿膠 貳片溶開食空送下

膠薑湯 治老人虛人大便秘澁

連根葱白三片

右新水煎去葱入 陳阿膠 炒貳錢 薑 貳 起溶開食前温服

潤腸圓 大便秘澁通用

杏仁去皮尖 杵碎浸去 麻仁 陳皮 各半兩

右末煉蜜圓梧子大每服伍拾圓老者 薑 煎湯下壯者 酒

米泡湯下

脾積圓 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘

蓬莪朮叁兩 京三稜 青皮去白 南木香 各半兩

右為細末用 巴豆 半兩只去殼研如泥漸入藥末研和得所麪糊圓麻子大每服伍圓加至拾圓 薑 皮 煎湯下

木香檳榔圓 治食積氣滯通利大便兼治脚氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

檳榔 青皮去白 南木香 各半兩

右件並末用 生薑 自然汁調 神麯末 為糊圓麻子大每服拾圓 薑湯下如氣攻腹痛 煨 大蒜 煎湯下

二香圓 治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅噦

南木香　丁香　肉豆蔻生　青皮浸去白瓤　橘紅

草果仁　蓬朮煨熟縮砂仁各七分半　白豆蔻仁　五靈脂香潤者別研各半兩

右細末用生薑半兩研如泥漸入藥末研和白麪稀糊同麻子大候乾每服叁圓加至伍柒圓止生薑湯下壅噦加

生薑煎湯 治大便積日不通

大好棗一枚擘開入

右以棗相合麻線札縛慢火煮熟爵細以**緊脈**送下

脾約麻仁圓 治風秘及脾約證小便數大便秘方見腳氣門用

如聖散 送下

治風毒斷散 治風氣蕃盛大便秘結方見腳氣門

疎風散 治風毒秘結

拟穀製半兩　防風　羌活　獨活

檳榔　白芷　威靈仙　羌蕤炒赤去刺

麻仁　杏仁　甘草炙各一分

右麁末每貳錢半**薑五片**棗壹枚**慢火**煎服

活津散 治氣不下降大便不通方見氣門加**紫蘇葉**煎

宣氣湯 治氣不下降大腑澁滯

香附炒净二兩　天台烏藥去心枳殼製各一兩半　縮砂仁七分半

蘇子炒半兩　青木香炙各半兩　甘草炙七分半

右末每服貳錢**陳皮**煎湯調下或吞**青木香圓**少許

降氣湯 治氣不下降才使不通方見脚氣門加**枳殼**吞**石**煎此

藥流行肺氣

蘇感圓 治氣秘不大便用**紫蘇**煎**陳皮**煎湯下或**枳殼散**送下**蘇合圓**

方見敕門　方見脹滿門**蘇合**肆分**感應**陸分研

和別圓大凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆吐惟**蘇感圓**用**薑**

汁泡湯下最妙

濃煎方 痼頭痛 煨熟去皮以綿裹納後部即通

又簡便法 方見小便門臨用入 軟滑 少許尤速

兔糞不通用 用梳燒置於桶內熏並後部自通

調血 治婦人產前產後大便不通

當歸　防風
枳殼 製各兩分　甘草炙二錢

右細剉每服三錢食前 薑棗 煎服

附錄方

潤腸圓 東垣方 治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食乃風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通

麻子仁　桃仁 去皮尖各一兩　枳殼 麩炒去瓤半兩　當歸尾

右件除麻仁桃仁別研如泥外搗羅爲末煉蜜圓如桐子大每服叁伍拾圓空心白湯送下○如病人不大便爲而大便不通而滋其邪盛者急加酒製大黃以利之○如血燥加桃仁大黃○如風結燥大便不行者加皂角仁大黃麥門冬仁以利之○如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加大黃以除之氣燥○如寒因之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半硫圓或加煎附子薤姜湯冰冷與之其病雖陰寒之證常當服陽藥補之若大便不通者亦當拾服中與一服藥微通其大便不令閉結乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加如陰燥欵坐井中者其二腎脉必按之虛或沉細而遲此易爲辨耳知有客邪之病亦從權加藥以去之

當歸潤燥湯

升麻一錢　當歸
茸草　大黃
紅花　少許

右件除桃仁麻仁外剉如麻豆大作一服水二大盞入桃仁麻仁煎至一盞去滓另研如泥外剉如麻豆大作一服水二大盞去滓空心宿食消盡熟服之

導滯潤燥湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸　升麻
熟地黃各五分　紅花
桃仁泥各一錢　生地黃
炙甘草各一分

右件作一服水二盞煎至一盞去滓調細末半錢稍熱服

四物湯 治臟結秘澁

當歸　熟地黃　川芎　白芍藥

大黃煨　桃仁鉄杵各一錢

右㕮咀作一服水二盞煎八分去滓服此為丸亦得

潤燥麻仁丸 治嘔膈大便燥結方見膈一門

木通散 治下焦燥熱小便澁而數方見虛煩門

大補丸 治陰虛燥熱方見火門

新刊仁齋直指附遺方論卷之十五終

五疸

五疸論

濕鬱熱鬱薰蒸於脾面目肢體爲之發黃此即疸也疸之名有五發熱不渴身腫而汗汗如黃檗汁者曰黃汗此胃中蓄熱汁出浴水得之已食如飢但欲安卧小便如黃檗汁者曰黃疸此酒變多病蘊熱於胃得之其或飲酒常多進食常少醞熱入水大醉當風以致心中興疾足脛腫滿是之謂酒疸大勞濕慾大熟交接衹膚未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急是之謂女勞疸五者雖不同其爲黃則一自本自根未有非熱非濕而能致病者也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則如薑黃而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉土色尚黃濕

熱內蒸或重或輕不容揜於外矣白其濕熱瘀而傷血此又爲
血證發黃何以明之疸證之黃小便不利血證之黃則小便自
利耳況夫脾受濕熱鬱而不行亦多有腹脹之候治法綱領大
要疏導濕熱熱於大小便之中人徒見茵陳湯五苓散黃連圓二黃
圓輩隨試輒效則目之以治黃常不思單陽無陰病勢已極疸而
不渴猶可用工疸而復渴其或腹澎全齐者鮮甚則寸口無脈
鼻出冷氣與夫形如煙熏搖頭直視爲心絶環口黧黑油汗發
黃爲脾絶此皆倉扁所坚而驚者也孰謂黑疸之能有瘳乎
脾與腎俱病爲里證色疸一名女勞身黃額黑疸脉緩大
順弦急而堅逆已食如飢胃熱消穀

五疸證治

薑蜜湯諸疸通用或小便出血或小便如血用之皆效薑半盞
薑錢拾片新汲水壹椀煎服逐日常進兩服小便漸白而瘉瘥
桂枝黃耆湯治黃汗自出發熱身腫小便不利

白朮藥一兩半　辣桂
黃耆炙二兩　黃芩半兩

右剉散每服四錢水壹盞半薑五片棗三枚煎服覆取微汗来
汗再服

必效散黃疸通用

萎蕤子炒紙　龍膽草　山梔仁
山茵陳

右爲末每服三錢新水煎服

清涼飲疸證發熱諸熱通用

柴胡三兩　赤伏苓二兩　桑白皮製
川芎一兩　甘草炙半兩

右剉每參錢薑棗煎服

當歸湯治濕熱於而發黃小便秘澁頭汗而渴方見濕門

茵蔯散疸證通用方見飲水門　吞酒兼黃連圓方在後治濕熱

發疸或煎茵蔯湯調下亦得

山梔連翹散 治黃疸大小便秘澁

梔子一兩　茵蔯一兩　拭實製柴枝

赤伏苓　　甘草炙各一分

右剉每服三錢薑三片煎服

甘露飲 見積熱門加山梔連翹柴胡同煎吞黃連阿膠圓 方見救門

治瘧熱發疸小便秘澁

柴胡茵蔯湯 治熱疸

柴胡一兩　甘草一分剉細白茅根一握

右件以水三椀煎柒分時時服壹日盡

生髮方 治疸

生髮燒灰存性為末新汲水調方寸匕日參服

紅圓子 治穀疸腹滿脇運拂鬱怔忪酒疸通用。 黃連阿膠加

砂煎半 並見瘧類

瘟疫如香散 治飲酒行事酒熱瘀於心經致成黃疸

伏苓　伏神去木　黃耆炙各一兩　人參　木香　厚砂別研各半兩　麝香一分

右細末每服二分加辰砂心許用茵蔯煎湯調下日三服

治酒疸

苦酒大鬱淨四兩器碎以酒洒醞一宿日乾為末粟米糊為圓桐子大每服三四十圓以茵蔯湯加乾薑茵蔯入姜棗煎送下

當歸白术湯 治酒疸發黃心下飲結妨滿

伏苓一兩半　當歸　黃芩　茵蔯各半兩

白术　枳殼炙制　甘草炙　杏仁去皮炒

前胡　乾葛各一兩　半夏制三分

右剉散每服三分水盞半姜棗片食前煎服亢酒疸執疸大

便秘者可見積熱一

六物湯 治酒疸肚脹

蕪荑　荊芥穗　不蛀川練子連皮核用

生姜母　軟烏梅　茸草

右件等分於石臼中擣細用磁器盛以自己湏腹小便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星壹宿拂明飲其清汁續用 **梔豉湯** 治酒疸熱疸 **山梔湯** 治酒疸熱疸 **茵陳湯** 治酒疸熱疸 **瓜蒂散** 治酒疸熱疸 **抵當湯** 治酒疸熱疸 **大黃硝石湯** 治酒疸熱疸

煎湯乘熱調 **五苓散** 服自覺黃水從小便出而肚不脹妙

梔豉湯 治酒疸熱疸 **瓜蒂散** 搏取汁恁服

山梔湯 治色疸

梔子十四箇擘　豉一合綿裹

先以水洗酒浸三宿研搦棄滓

一山藥一斤切　石連肉二斤　白伏苓一斤

右為末山藥糊圓梧子大每五十圓用 **茵蔯湯** 多加伏苓煎湯下方見血類

茵陳湯 加劑治色疸

茵蔯壹兩　白伏苓壹兩　白朮壹兩　甘草炙半兩

加黃耆炙　白扁豆制衣各壹兩

右剉細每服三錢薑五片棗二枚煎服

雖熱方

生車前草最治黃疸解諸熱淋研細井水調下

方

車前子炒末之米飲調立止　洞泄

時珍曰論

此事難知云色如重火黃乃濕病也一身盡痛色如黃乃黃病也一身不痛乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者濕病也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者

茵陳湯 溫黃脾也小便不利而黃者 **茵陳蒿湯** 若大便自利而黃者 **小柴胡** 加 **梔子湯** 暑例云內感傷寒勞役形

体欬食失鄭中州変寒之病生黄非傷壞之而得只用茵陳(茵陳)也

中州(中州)方

茵陳大黄湯 治傷寒大熱發黄面目悉黄小便赤

茵蔯高 梔子 柴胡 栢皮

黄芩 升麻 大黄(炒各一兩) 龍胆草(半兩)

右爲粗末每服伍錢水煎服

茵蔯五苓散(局方) 濟生方 治傷寒或伏暑發黄小便不利煩渴(方見温門)

茵蔯五苓散 濟生方 治酒傷寒或伏暑發爲疸煩渴引飲小便不利

茵蔯 赤茯苓(去皮) 猪苓(去皮) 白朮

澤瀉(各等分)

右㕮咀每服四錢水一盞(姜)伍片煎六分温服不拘時

瘡根湯 濟生方 治酒疸

梔實(去白) 梔子仁 豆豉(各壹兩) 甘草(炙半兩)

葛根(貳兩)

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分温服不拘時

伏苓湯(温脾) 治黄疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱黄小便不利

白伏苓(伍分) 茵蔯(壹分) 猪苓 澤瀉

黄連 黄芩 梔子 漢防已

蒼朮 白朮 陳皮 青皮

梔實(麩炒各貳分)

右㕮咀每服水二鍾煎至一鍾去滓食前温服

小温中湯 治疸又能去食積

蒼朮 川芎 香附 神麴

針砂(醋炒紅) 香加(芎)夏加(芎參)或(黄連)冬加(具茱萸)或(乾薑)

大温中方 治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾虛者以參朮為君 陳皮 甘草 作湯使

陳皮 蒼朮 厚朴 三稜
蓬朮 青皮 各伍兩 香附壹斤 甘草
針砂 醋炒紅 各弍兩

右為末醋糊丸空心 姜湯 下午後飯食可 晉 下忌 犬肉 菜

撞藥瓜蒂散 扶脾方 治黃疸遍身如金色累效

瓜蒂 貳錢 丹丁香壹錢 黍米 捌拾粒 赤小豆 伍分

右先将 瓜蒂 為末次入三味再碾至夜令病人先含水一口次将藥半字搐入鼻內待下或吐去水便睡至半夜或次入取下黃水直候利水止即服 黃連散 或 茵陳 五苓散 病輕者五日病重者半月見効

黃連散 扶脾方 治黃疸大小便秘澁臟腑壅熱

黃連 弍兩 川大黃 好酒半炒弍兩 黃芩 去黑心 炙甘草 各壹兩

右為極細末每服二錢食後温水調下日三服

十方 治黃腫及積滯浮腫

皂礬 半斤醋煮乾 膠棗仁 弍斤去皮核平胃散 四兩

右用 薑 搗爛入 礬 丸如梧桐子大以 平胃散 為衣每服三伍十丸臨臥温 酒 送下

新方 治黃病助脾去濕

用 白礬 不拘多少以冰攤盃鐵銚內浸過一指深炒乾再炒三五次候銚內通紅方可取出又用 陳糠米 半升隔夜以水浸次日淅起於臼內搗為粉就作成塊如鴨彈大入釜中煮如粉劑又以生熟相停再杵調粘為度却入 白礬 炒過一兩半 雄黃 二兩半於粉內仍搗數百下為丸如梧桐子大每服伍十丸用 生薑 半兩 煎 末 浸 酒 吞下初服若泄瀉其病源去也

腎相湧 東垣 方 治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澁方見黃疸門

一方 治遍身黃不浮腫手足怠倦

針砂 用水擂東 青礬 炒令赤 蓖术 煨各二兩 右為末麵糊丸如梧桐子每服三十丸 米湯溫酒 任下

一方 治黃胖

用明亮綠礬一斤鍋內鎔化次下多年黃 陳米 四升熬火煮炒約一時許烟盡為度攤於地上出火毒為末另用 蒼朮 米泔水浸一晝夜刮淨剉晒乾為末一斤和前藥以 陳米醋 為丸如梧桐子大每服七八十丸空心臨臥溫 酒 送下 陳米湯 亦可忌 糯米 面 生冷

綠礬丸 治黃胖

針砂 二兩炒 醋汁 綠礬 四兩煮 生姜 五倍子 各半斤 神曲 右為末 大棗 半斤取肉為丸此方神効但愈後宜忌食 蒼朮

無忌內 諸毒物若犯之即死余嘗見一人服此藥後二年下因食所犯忽無故而兢死

一方

用 綠瓜 全者燒灰為末病因 面 傷 面湯 下因 酒 傷 酒 調下

針灸法 至陽一穴在第七推下灸二七壯治渾身發黃脾俞二穴在十一推下灸二七壯治渾身發黃汗心中煩女勞疸發熱百勞一穴在第一推骨尖上 中脘一穴 三里二穴 穴法見前

諸淋

諸淋方論

諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣爭遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱胞裹急膏血沙石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間則令人

悶絕矣大九小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澁小腸有熱則小便痛七者為血淋不痛者為尿血敗精結者為沙精結散者為膏金石結者為石揣本按原各從其類也執劑之法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱其於調平心火又三者之剛領焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用補氣得補而愈脹血得補而愈盛水實不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澁者其狀先寒戰而後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰解而得便溺也況又有胞系轉戾之不通者乎是不可以無辯胞轉證候臍下急痛小便不通允強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入房使水氣上逆氣迫於胞故尿戾而不得舒張也胞落即殂

消石散 治諸淋

諸淋證治

消石者為細末每服弍錢○血淋（山梔仁）煎湯調下○熱淋小便赤而淋瀝臍下急痛新水調下或（黃芩）煎湯不○氣淋小腹脹滿尿後常有餘瀝（木通）煎湯下○石淋莖內痛割尿不能出尿中有沙石令人悶絕此證浮（滑石）用抄紙隔炒紙焦為度研細（冬葵子）三拾粒打開煎湯調下

神散 治諸淋急痛

黃色海金沙七錢半滑石半兩

右為細末每服弍錢半多用（灯心）（木通）麥門冬草新水煎入蜜調下

五淋散 治諸淋

赤伏苓　山梔仁
生甘草　各三分　當歸　黃芩各二分

右為細末每服弍錢半水一盞煎至八分空腹服或以（五苓）散和之用竹園尿門冬草葱頭燈心煎湯調下

車前子散 治諸淋小便痛不可忍
車前子 不炒半兩 淡竹葉 荆芥穗
赤伏苓 燈心錢半
右件分作兩劑多用新汲水煎恣意服荆芥通竅
血餘散 治諸血下見血痢 白芷花灰心 各一握新汲水煎湯調
下若血淋婦人最更好加 海金砂 佐之切不得用 百草霜 蓮蓬
止澁之劑
黃芩湯 治血淋熱痛
黃芩細剉新水煎通口服
八正散 治熱淋 方見積熱門
琥珀散 治尿血
琥珀為細末每服弐錢燈心一握腦荷少許煎湯調下
增味導赤散 血淋尿血通用
生乾地黃洗晒 木通 黃芩 生甘草

車前子 不炒 山梔仁 川芎 赤芍藥 甘草
右件為末每服三錢入竹葉十葉薑三片煎服
車前草方 治小腸有熱血淋急痛
生車前草洗淨臼內搗細每服准一盞許井水調濾清汁食
前服若沙石淋則以煅 滑石 為末和之新水調下
瞿麥湯 血淋尿血通用
爛滑石 赤芍藥 瞿麥穗 車前子 不炒
赤伏苓 石韋去毛 桑白皮炒 阿膠炒酥
黃芩 生乾地黃洗焙 甘草炙
白茅根 已上並生用 分晒乾
右為細末每服二錢入生髮燒灰一錢沸湯調下如無茅根
止用茅花
海金散 治血淋沙淋小便澁痛
黃檗芩石 於草陰地為末每服二錢生 甘草 煎湯調下亦治

小腸氣壅腫囊腫用木通燈心赤伏苓麥門冬煎湯調下
五苓散 治尿血方具水飲門內加辰砂少許用燈心壹握新水煎湯調下
伏苓調血湯 治酒麪過度房勞後小便下血
半赤伏苓一兩　赤芍藥　川芎　半夏麴各半兩
前胡　柴胡　青皮　枳殼
北梗　桑白皮炙　白茅根　燈心
甘草炙各二錢半
右剉細每服三錢薑五片蜜二匙新水煎服
薑蜜湯 治小便出血方具血門加白茅根煎
甘草湯 治血淋諸淋小便痛不可忍方具癃閉門
導赤圓 治心腎氣壅膀胱有熱小便淋痛及諸熱壅滯
生乾地黃洗焙　木通去節各二兩　山梔仁三兩　赤伏苓一兩半
赤芍藥　大黃濕紙裹煨各一兩
右為末煉蜜圓桐子大每服弍拾圓食後煎竹葉湯送下亦得
秋石圓 治濁氣于清精散而成膏淋黃赤白黯如肥膏油蜜炙
白伏苓一兩　桑螵蛸蜜炙　鹿角膠搗碎炒黃焦末之　秋石各半兩
右末研和糕糊圓桐子大每服伍拾圓人參煎湯下
滑石散 治沙石淋痛劇
爛滑石　爛石膏各半兩　石韋去毛　瞿麥穗
木通去節　蜀葵子各三錢
右細末每服弍錢半用葱頭弍片燈心一握新水一大盞煎
弍盞煎湯調下
鵬砂散 治沙石淋急痛
鵬砂細研　琥珀　赤伏苓　蜀葵子
陳橘皮不去白　等分
右末每服弍錢半用葱頭弍片去心麥門冬弍拾一粒薑弍

是新水煎取清汁調下或菜豆水浸和皮研清汁調下

木香湯 治冷氣凝滯小便淋澁作痛身躰冷清

木香　木通　檳榔　船上茴香各
當歸　赤芍藥　青皮去白　澤瀉
辣桂　橘紅　甘草炙
右剉散每服叁錢薑五片煎服

沙石淋方

黑豆一伯弍十粒　粉草一寸生
右以新水煎秉熱入滑石末一錢調和空腹服

附諸方

琥珀散 宣明方 治五淋沙石淋

滑石　琥珀各一兩　木通　當歸
木香　爵金　蒲竹各半兩
右為末每服伍錢以灯心煎湯空心調服如無灯心以

竹葉煎湯送下

葵湯甘遂湯 治淋莖中痛不可忍相引脇下痛

人參伍分　茯苓四分　甘草各等分
生甘草一錢　川楝子炒一錢　琥珀三分
玄胡索柒分　澤瀉
當歸稍　加青皮　黃柏各三分
右作一服水一鍾半煎至七分空心温服

瞿麥散 治婦人小便卒淋澁

木通　瞿麥穗　榆柏皮
石葦　甘草各等分
瞿麥子　黃芩
右㕮咀每服八錢水一鍾半姜三片煎至八分去滓食前服
治膀胱有熱水道不通淋瀝不宣脐腹急痛或尿如豆

五淋散 治

便如**石淋** 膏淋血並宜服

山茵陳二兩去梗　淡竹葉四兩　木通去節　滑石
甘草炙各六兩　山梔仁炒十四兩　赤茯苓去皮　赤芍藥各半

右吸咀每服三錢水一鍾煎服一方加當歸除木通滑石

地膚飲 濟生方 治諸病後躰虛觸熱熱結下焦遂成淋病小便赤澁數起少出

地膚子　知母　黃芩
猪苓　通草　瞿麥
海藻　升麻　枳實炒
葵子

右吸咀每半兩水煎入姜

加減法 治氣虛而濕者 加黃芪 或寒者 和濟方 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並皆治之方見濁門

煎湯服諸藥中可加牛膝老人虛為要藥

八味地黃丸 並見虛勞門

針灸法 陰谷二穴在膕內輔骨後大筋下小筋上按之有動脈是穴灸二七壯治小便淋閉作扁陰囊腫痒三陰交二穴在踝上三寸按之有動脈是穴治小便淋閉不通七壯灸

新刊仁齋直指附遺卷之十六終

○消渴

消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而為人水亦可以包
潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行
腎水上潤於肺故識者以肺為津液之臟自上而下三焦臟腑
皆周乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真
水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒炙無節酷嗜炙煿糟
藏鹹酸酢醢甘肥膩膏之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火
上熏腑藏生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣
渴之為病有三曰消渴曰消腎分上中下三焦而應焉
熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤唇紅
此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾

虛受之伏陽蒸當汗消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而淸病屬中焦謂之脾中熱伏於下腎虛受之眼膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴水飲不多隨即潟下小便多而濁病屬下焦謂之脾腎白脾腎而折之又有五石過度之人眞氣既盡石氣獨留而腎為之石陽道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中則其斃可立待也雖然眞水不充日從事於盃勺之水其間小便或油膩或赤黃或淸白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿溢火自炎留於肌肉則發為癰疽此又病之派而證之變者也總前數者其何以為執劑乎吁此虛陽炎上之熱也叔和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請援此以為治法○又曰消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟然尒熟知脾土不能

制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎治法總要當服

白术散 可以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以資肉碎細入鹽醋油酒葱椒豆豉調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有所司又用**猪胰黃連**溫劑入**雄猪肚**中密扎於斗米上蒸爛添些蒸飯臼中杵粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以淸心止渴

消渴證治

茯兎湯 三齊湯通用亦治白濁

兎絲子（酒浸二宿水淘一宿搗餅焙乾）

北五味子（酒浸一宿水淘沙盆研細）

右末**山藥**六兩末為糊搜和搗三百杵圓桐子大每五十圓食前米湯下神妙

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參　遠志（去心）　麥門冬（去心）　當歸　川芎

熟地黃　白伏苓　黃耆（蜜炙）　北五味子

甘草微炙 各半兩 天花粉一兩

右㕮咀細每三錢棗煎食前服

生地黃湯 滈證通用

生地黃 東垣如常法大二把 冬蜜一盞

白伏苓一兩 人參半兩

右將生地黃洗切研細以新水一椀調開同蜜煎至半次入參末拌和磁器盛收貯挑服

黃耆湯 治諸滈疾

黃耆 伏神 瓜蔞根 麥門冬去心 各一兩

北五味子 甘草各半兩 生乾地黃一兩半

右㕮細每四錢新水煎服

豬肚圓 治諸滈疾

川黃連五兩 淨白乾葛 知母 伏神 瓜蔞根

麥門冬去心大熟地黃洗焙各二兩

粟米各三兩 人參一兩

右末拌和磁器盛收貯挑服

又方 一味黃連末入豬肚內縫密置甑內蒸極爛秉熱石杵臼中同搗爲散入淨再杵細若硬加少蜜丸桐子大蒸汁下五十丸或粥飲下

如前法

川黃連丸 治諸渴

川黃連淨白 白天花粉

右末以生乳汁和搗圓桐子大每三十丸粳米飲下

玉泉圓 治煩渴口乾

麥門冬去心 人參 伏苓 黃耆半生熟多

瓜蔞根 乾葛各一兩半

爲梅肉焙 甘草各一兩半

右末煉蜜丸彈子大每一丸溫湯嚼下

上湯丸散

枇杷葉 新布拭去毛炙 白乾葛 生姜切片焙各一兩
大烏梅七个 大棗去核 甘草生各半兩
右㕮咀每四錢新水煎服

【劑】生天花圓 治渴通用
黃連淨三兩童尿浸三宿 白扁豆一兩製去皮炒
辰砂 白伏苓 牡蠣粉 知母
苦參 天花粉 鐵粉各半兩 蘆會一分
金銀箔各二十片
右末取【瓜】根生汁和生蜜圓桐子大每三十丸麥門冬湯下

【兼】治渴疾【急】熟時盡意食之爲妙
又方【生】細呷○又方【生】【蘿】搗取汁時飲少許

【蠟】丸圓 補虛治濁止渴
黃蠟 雪白伏苓各四兩
右【伏苓】爲末鎔蠟和【圓】彈子大每壹丸不飢飽細嚼下

【蜜】煉 治渴神效煮蜜搔終湯任意飲之頻效如非時以終竈
綿煎湯服

【辰】砂妙香散 治渴證小便澁數而濇兼有油濁方見直指用灯
草伏苓煎湯下

【天】花粉圓 治消渴飲水多身躰瘦
天花粉 黃連去須各一兩 伏苓 當歸各半兩
右末煉蜜圓桐子大每三十丸葛根煎湯下

【瓜】連丸 治消渴骨蒸
黃連淨劑用【瓜】汁浸一宿研乾丸七次

右末【瓜】汁丸桐子大每三四十丸半飢飽熟水下或五十
丸米飲下

【玉】壺丸 治消渴引飲無度
人參 瓜蔞根等分
右末煉蜜丸桐子大每三十丸麥門冬煎湯下

天花散 治消渴
天花粉 生乾地黃洗各一兩 乾葛
麥門冬去心 北五味子各半兩 甘草一分
右麤末每服二錢粳米伯粒同煎服

錢氏白术散 治消中消穀善飢
人參 白术 白伏苓 甘草炙
霍香葉一兩 白乾葛二兩 木香半兩
加北五味子
右麤末每三錢新水煎服

大神丸 治消中煩熱消穀小便數
人參 伏神 生乾地黃 黃連半
麥門冬去心 枳殼製 牡蠣粉各一 石蓮肉
黃耆炙 知母各半兩 瓜蔞根三分
右末煉蜜同搗三百杵丸桐子大每伍十丸清粥飲下

兔絲子丸 治消腎以北五味子煎湯下方見前
治消腎久渴日多小便滑數
枸杞 兔絲子酒浸研碎 白伏苓 苗耆炙
牡蠣粉 牛膝 熟地黃洗 麥門冬去心各一兩
雞肉金微炙桑螵蛸 瓜蔞根各半兩 山茱萸
牡丹皮各半兩
右末煉蜜和搗三百杵丸桐子大每五十丸食前粥飲下

八味圓 治消腎補虛止渴方見胸冷門本方去附子以北五味
地黃代之內 澤瀉 截堀再蒸 茯苓
山藥圓 治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而澼如欲滲之狀
兔絲子酒浸研碎 山茱萸酒浸焙 益智仁各半兩
川練肉 牛膝 菟蘆巴炒 厚杜仲姜製炒
巴戟去心 菟絲酒浸焙各二兩半 乳香二錢
右末糊米糊丸桐子大每五十丸東湯或鹽湯食前服

双補丸 治腎虛水泛燥渴勞倦

鹿角膠二兩 沉香半兩 澤瀉蒸半兩 覆盆子
白伏苓 人參 宣木瓜 薏苡仁炒
黃耆炙 熟地黃洗再蒸 萸肉酒浸焙 鬼絲子酒浸蒸焙
北五味子 石斛炒 當歸酒浸焙各一兩 麝一分

右末煉蜜九桐子大 朱砂為衣每五十九空心煎湯下

腦麝方 治消渴有虫出袁坚志

虧少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨自浸下虫三四條狀如蛔虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有虫耗其津液

附遺方

參蘇飲子 治膈消胸膈煩滿心煩津液乾燥短氣消渴

人參 麥門冬 知母
五味子 伏神 甘草炒
生地黃 括蔞根

每服水二鍾 煎至一鍾 去滓 十四次煎去滓溫服

生津甘露飲子 東垣方 治高消大渴飲水無度舌上赤澁上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃白白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色胸下急痛善唾善怒健忘骸腰背寒兩九冷甚

炙甘草各二錢半 生甘草
石膏二錢半 人參 白豆蔻 香白芷
山梔子 華澄茄 黃蘗酒洗焙各半錢 白茯苓
連翹各一錢 杏仁去皮尖 木香各三分 桔梗三錢
麥門冬各半錢 黃連 當歸身半錢
升麻 知母酒製焙各二錢 蘭香半錢
全蝎二個 薑黃一錢 柴胡三分

右件為細末如法渤浸蒸和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎餘如大人後每服二錢抄於掌中以舌舐之隨津

下或送以白湯少許亦可此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下清矣戊申正月七日葉律千戶服此大効

枇杷葉散 治消渴胃蒲心煩津液大小

枇杷葉 去毛炙黃 生地黃 知母 去毛 甘草 各七分

右作一服水二鍾煎一鍾去滓食遠温服不拘時

人參白虎湯 即白虎加人參湯

人參半兩 石膏一兩 知母七錢 甘草四分

東垣加黃芩杏仁

右�once咀每服一兩水二盞煎一盞去滓通口服

硃砂黃連丸 秘方治心虛盜熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂二兩別所 黃連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服伍十丸溫水送下

人參白术湯 宣明方治胃脘痺熱煩渴飢不欲食痺成為消中善食而瘦燥挽轉甚而成消渴多飲而數小便黑濇一切陽實陰虛風挽燥鬱頭目昏眩中風痛枯酒過積毒一切勝胃燥澁倦悶壅塞齊疼痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參 白术 當歸 芍藥

大黃 山梔子 荆芥穗 薄荷

梔捸 知母 澤瀉 各半 茯苓 去皮

連翹 瓜蔞根 乾葛 各一兩 甘草三兩

藿香葉 青木香 官桂 各一分 即二禾半是也

石膏四兩 寒水石二兩 滑石半斤

右為細末每服抄伍錢水一茶盞入盐少許温服漸加至十餘錢得藏腑流利取至半盞絞汁入盐少許温服漸加至十餘錢得藏腑流利取 生姜三片煎

效如常服以意加減無服消痞丸散以散腸胃結治溫熱內甚白利者去了大黃白朮

調胃承氣湯 治消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤 方見傷寒門

三黃丸 方見火門

加減八味丸 治腎水枯竭心火多炎煩燥渴小便頻數白濁陰痿飲食不多肌膚日削本方減附子加五味子

六味地黃丸 方並見眩暈門

對金飲子 脾俞二穴在十一椎下各開寸半 中脘一穴在臍上四寸 治飲不止渴

三里二穴 兩膝下三寸大脛骨外廉足陽明經 治食不充飢

太谿二穴 在足內踝骨上動脈陷中 治房勞腎消

脹滿

脹滿方論

陰陽愈伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳化脹滿所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷或熱又不可以無別失飢傷飽若悶停酸且則陰消陽長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀脹脾土受濕不能制水水漬於腸胃而溢於肌膚漉漉有聲怔忪喘息是爲水脹七情鬱結氣道壅隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是爲氣脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是爲血脹陽挾爲邪則身躰有挑脹滿而明乾陰寒爲邪則吐不下食脹滿而自利隨證劑量是固然尤抑猶有虛實之辨焉實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當爲之疏利虛者時脹時減虛氣留滯按之則滿法當以溫藥和之此又出於隨證劑量之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫腑心突起或下利頻頻百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

十腫散 治七氣爲病飲食不消穀脹氣脹通用

人參　伏苓　厚朴製　橘紅
逢术　枳殼製　半夏麴　甘草炙
生白姜　辣桂　檳榔　木香等分
右為末每二錢姜二片棗二枚煎服

大異香飲 治穀脹氣脹
京三稜　蓬术　青皮　陳皮
半夏麴　霍香　北梗　益智仁
枳殼製　香附炒各半　甘草炙三分
右剉散每二錢姜五片棗二枚煎服

五精散 治七氣留滯飲食不下氣蒲膨脹方見諸氣門
華澄茄　白豆蔻仁　青皮
蘿苞子　木香各三分　肉豆蔻　尚香炒
辣桂　丁香各一分半　陳皮三分

右末飛羅煮稀糊圓桐子大每叁拾圓陳皮湯下

調氣散 治氣滯脹蒲宿食不消方見蒲氣門

大半夏湯 方見痰涎門 小半夏伏苓湯 方見水飲門 二藥加橘

紅出裹積聚門 檳榔 共皇 炙並主水氣脹蒲

和氣流氣飲 調榮衛利三焦行痞滯消腫方見諸氣門加減見水腫門

調脾湯 治氣脹方見蒲氣門

沉香降氣湯 治陰陽交滯心腹脹蒲留飲停酸積冷諸證方見諸氣門

人參烏歸湯 治血脹

當歸　半夏製　川芎　一兩　蓬术
木香　縮砂仁　烏藥　甘草炙各半兩
人參　辣桂　五靈脂炒各一分
右剉散每服叁錢薑伍片棗貳枚紫蘇四葉前食前服

溫胃湯 治冷則氣聚脹蒲不下食
熟附子　當歸　厚朴製　人參

橘紅　半夏麴　生白薑　甘草炙各一兩
川椒去合口者炒出汗二分
右剉散每服參錢棗貳枚食前煎服

順氣木香散　治冷證腫脹泄瀉方見諸氣門

枳朮湯　治熱證脹滿
厚朴製　枳殼麩炒製　北梗各半兩　甘草炙大黃蒸各一分
右剉每三錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服

感應圓
丁香　木香各一兩　乾薑一兩　深村白豆霜二兩淨
大杏仁一伯四拾去皮尖　肉豆蔻二拾個　肥巴豆柒拾粒去油
黃蠟四兩用老酒煮
右將丁香木香薑薑為細末并三味研極得所煉油蠟和成劑油單裹漸圓蒸豆大每五七圓加至拾伍圓熟水下火煮
合香圓　方見諸氣門
通利脹滿雖然感應只可治漸不可

治瀉蓋前家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉誤人已上數劑前氣類多用之方却在此

附諸賢論

東垣曰六元政紀論云太陰所至為中滿云云太陰所至為畜滿云云諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病謂經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中未傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿膜脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃中寒則脹滿者是也（臧經三卷脏病第八）腹滿大便不利上寒水為脹與通評虛實論腹暴滿按之不下取三陽三陽者足太陽之莫也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛

熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門潔
淨府溫衣繆處其處是先瀉其血絡後調其真經氣血平陽布
神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機
總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實
腹滿仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成
脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨
之心法附錄曰心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也
屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺
通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而
有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之
泰是為無病今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾
土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰
自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而為熱熱留
為濕濕熱相生遂成脹滿經曰故脹是也以其外雖堅滿中空

無物有似於鼓其病膨脝固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義
理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之患滋腎水以制
火使肺得清化却厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛
實急於作効病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知覓得一
日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟實脹丸又名
泰金丸制肝補脾殊為切當又曰朝覓暮急血虛暮覓朝急氣
虛終日急氣血皆虛嚴氏曰脹脉浮者易治虛者為難治
平肝飲 齊生方專治喜怒不節肝氣不平乘脾胃心腹脹
滿頭暈嘔逆脉來浮弦
防風去芦 桂心不見火 枳殼 赤芍藥
桔梗去芦 甘草炙 木香炒不見火 人參
檳榔 當歸去芦酒浸 川芎 陳皮半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜伍片煎服不拘時
木香順氣湯 治濁氣在上則生膜脹

木香壹錢貳分　厚朴制壹錢六分　青皮　陳皮
益智　白茯苓去皮各壹錢　澤瀉　乾姜
半夏洗　吳茱萸湯泡去苦水各壹錢捌分　當歸
升麻　柴胡各肆分　蒼术米泔浸貳錢　草豆蔻煨壹錢貳分

右㕮咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食前温服忌生冷硬物恚怒

廣茂濕堅湯 治中滿腹脹内有積聚堅硬如石令人坐臥不能二便澁滯上喘氣促面色痿黄通身虛腫

厚朴製　黄芩　草豆蔻煨裹　鹽智仁炒
當歸酒洗各貳錢半　黄連叁分　半夏湯泡叁分半　蓬术煨
紅花　吳茱萸湯泡去苦水　升麻　甘草炙
柴胡　澤瀉　神麯炒　陳皮
青皮各壹錢半

右㕮咀分二貼每貼水二鍾姜三片煎八分食遠服

木香導氣元 治中滿腹脹

陳皮　蘿蔔子炒各伍錢　木香
草豆蔻面裹煨　青皮各叁錢　蝎稍炒去毒二錢半

右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服伍十丸食遠米飲下

青木香丸 治中滿氣脹喘滿浮腫及水氣脹

蛇含石三兩煨　真針砂伍兩　馬餘粮三兩同炒

右㕮咀三味爲主其次量人虛實入下項藥

木香　牛膝　蓬术炮　白豆蔻
桂心　川芎　白茯苓　茴香炒
三稜炮　羌活　枳殼　乾姜
青皮　陳皮　附子炮　當歸酪半

右爲細末拌勻以湯浸蒸去水搗勻丸如桐子大每服伍十丸空心温酒送下

中滿分消元 治中滿鼓氣水氣等証

黃芩炒伍錢　姜黃
甘草炙　衍冬各壹錢　黃連劉炒五釐　白茯苓
砂仁　枳實　半夏洗各伍
厚朴壹兩制　知母炒四錢　澤瀉　陳皮各三錢
右爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服一百丸食遠白湯下

中滿分消湯 治中滿窄悶大小便不通四肢厥冷食入反出心痞奔豚

益智　半夏湯洗　茯苓　木香
升麻各弍錢　川烏炮　澤瀉　人參
青皮　當歸酒浸　生姜　麻黃
柴胡　乾姜炮　草澄茄　黃連各弍錢
黃芪　吳茱萸洗　草豆蔻煨　厚朴制各五釐
黃柏弍錢
右㕮咀每貼一兩水二鍾薑三片棗一枚煎八分食後溫服

人參定喘湯 治蠱脹有喘

人參壹兩　杏仁去皮尖炒壹兩　陳皮伍錢　木香參錢
甘草伍錢
右爲末每服三錢食遠濃煎蘇木湯調服三服喘即止

秘傳龍蠶保命丹

肉蔻參兩　皂礬壹斤　紅棗壹斤煮去核大麥芽炒壹斤半
香附斤淨　茨菰皂礬二味入罐內火煅尽煙
右爲末麵糊爲丸如梧桐子大每服二十九好酒下食後服
日進三服量人大小用

四炒枳殼丸

枳殼　去穰咀分四分
一分同蒼木壹兩炒　一分同蘿蔔子壹合炒
一分同乾漆壹兩炒　一分同小茴香壹兩炒
右各炒枳殼黃色爲度揀出爲細末却將蒼木寺四味用水

二㮾煎至半㮾去滓攪調和服三十丸食遠米飲送下

一方治血蛊腹如盆脹

三稜煨　莪术　蝎虫炒　硇砂　水蛭石灰炒赤　大黄各等分

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十丸空心温酒送下亦可

敷法治腹緊硬如石或陰瘡腫大先用甘草煎湯一鍾服之後用此藥敷

大戟　芫花　甘遂　海藻各等分

右為末醋糊和藥塗腫脹處

針灸法脾俞二穴在第十一推下兩傍相去各一寸半隨年壯　肝腧二穴在九推下兩傍各一寸半隨年壯

分水一穴在臍上一寸治腹脹　腎俞二穴在十三推下兩傍各寸半治心腹痛腰痛　三焦腧二穴在十三推下兩傍相去各一寸半隨年壯　脾俞二穴在十一推下兩傍相去各一寸半隨年壯　胃脘一穴在臍上四寸治腹痛久不愈

○虚腫

虚腫方論

賈洛陽以病腫不治必為鬼疾雖有俞跗亦莫能為則知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之土穀則脾主之惟腎虚不能行水惟脾虚不能制水肾與脾合氣胃為水穀之海又因虚而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸淫脾土於是三焦俱滿經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目胞上下微起肢體重着咳喘怔忪股間清冷小便澁黄皮薄而光手按成窪拳手即滿是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又當權其重輕不

可過用
猛烈之劑一發不收吾恐峻央者易固閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之為腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉為風腫者皮麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚肉肢瘦削腹脇脹膨甚或煩燥漱水迷忘驚狂悶逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安胃飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢而後歸於腹者不治至若盡脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫唇黑傷肝缺盆平傷心脐突傷脾足平傷腎背平傷肺皆為不治之証當明辯之○男從脚下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治

虛腫證治

青龍湯 治表有水

效 方見水飲門

煖臍圓 治十種水病積聚脹滿癥癖堆痛久瘧諸風

吳茱萸 湯洗紫次焙　柴胡　北梗
石昌蒲　乾薑　黃連 去鬚
伏苓　人參　肉桂
皂角 去皮子炒　紫菀茸　川椒 去目閉口炒出汗　厚朴 製
石細末和巴豆膏圓桐子大每服叁圓食後薑湯下加至伍圓 去皮膜出油各半兩　川烏頭 炮去皮臍一兩半

柒圓止治水種 煖臍圓用 五苓散 加炒 葶苈 入些薑汁略煎送下 方見水飲門

集香湯

沉香　丁香 各弍錢　木香
霍香　川芎　青木香
枳殼 製　甘草 炙各叁錢　赤伏苓　檳榔
乳香一錢半　麝香一字別研

右麤末每貳錢半妾三片紫蘇三葉空心煎服凡虛腫先用諸香以透其閉絡然後審證療之

蘿蔔子飲 治水病浮腫

蘿蔔子　赤伏苓半兩略牽牛末炒　萊菔炒香　苡草各條四兩半夏製　辣桂　青皮　川芎　檳榔　白色商陸各叁錢　陳皮　青木香

右劑每服叁錢薑肆片不飢不飽煎服

三和散 方見諸氣門加縮砂赤伏苓煎叁**青木香圓** 治水蠱脹腹腫腎腫面浮乃水腫要藥但酌量用或**平胃散**送下或**枳殼散**不無執著者**沉香降氣湯**下

建脾散 治水腫

牽牛炒取末萊菔炒香各一兩半　木豬苓水浸軟去皮切焙　澤瀉　木香各一兩川椒目一兩半

右末先以葱白三莖搗水壹盞煎半盞入老酒半盞調藥末三錢空心服

芎水圓 治水腫氣腫

胡蘆巴炒故紙炒縮砂仁華澄茄　正川椒去目紙上炒出汗　烏梅肉焙乾各弍錢半　木香

右末稀麪糊圓豆大每伍圓食後薑湯下

萬安丸 治腎浦腹腫大瀉不止時或乾嘔

人參　川厚朴製　草果仁　良薑　前子炒　川白薑生　霍香　丁皮　蒼木炒　真福紅　甘草炙各一分　木香　肉豆蔻炮　縮砂仁　伏苓各一分

右劑散每服叁錢水煎食前服仍以**木香縮砂煎湯濃調**

加參苓白朮散 佐之

桑皮飲 治肺間積水頭面浮腫

桑白皮炒 青皮 陳皮 檳榔製
枳殼 青木香 當歸
川芎 石韋炙去毛 羌活各一分 牽牛炒末
半夏製 葶藶炒香 甘草炙各一分半

右剉每叁錢薑肆片前服

防風湯 治風腫皮粗麻木不仁或時疼痛

麻黃去節 牽牛炒取末甘草炙各一分半 杏仁去皮
防風 半夏製 芍藥 辣桂
白芷 防己 當歸 川芎
羌活 獨活 檳榔各一分

右剉每叁錢薑肆片紫蘇三葉煎服

消風湯 治氣作蠱脹腹滿而四肢頭面不腫

紫蘇葉葉 縮砂 肉豆蔻生 枳殼製

青皮 陳皮 三稜炙 蓬术
檳榔 辣桂 白豆蔻仁 華澄茄
木香各一分半夏製 羅葛子生 甘草炙各一分半

右剉每叁錢薑棗煎服

枳殼湯 治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分

枳殼製 白术 紫蘇葉葉 辣桂
陳皮 檳榔 北梗 木香
五靈脂炒洛半夏製 伏苓 甘草炙各一分半

右剉每服叁錢薑肆片前服

調榮飲 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

華陰細辛 羌术 辣桂 赤芍藥
延胡索 當歸 川芎
檳榔 大腹皮 白芷
赤伏苓 陳皮 桑白皮炒 瞿麥穗
葶藶炒香 大黃溫細銼各一分

甘草炙一分半

右剉每服叁錢薑棗煎食前服

續斷飲　治血分如前

延胡索微炒當歸　川芎　牛膝
川續斷　赤芍藥　辣桂
五靈脂炒　羌活各一分　赤伏苓
半夏製　甘草炙一分半　犁牛炒取末

右剉散每服叁錢薑肆片食前煎服

土狗方　治遍身腫外腎腫生者壹箇手足全者研細入續斷飲壹劑末半分老酒調下

蟲腫方　以大香附杵淨以童尿浸壹日夜取出別換童尿文浸壹日夜再取出又換童尿浸壹日夜次以生布錢袋牽擦去皮於巳中搗細用米醋煮飛白麪糊圓桐子大每服柒拾圓煎和劑流氣飲送下　方見脹滿門

又方

生綠五一箇　椒拾粒　橘皮弐錢　良薑一錢細剉

右橘皮二錢良薑一錢細剉煎湯候冷調綠豆末得所然後略煖連三日空心服

青皮　木香　黃連　橘紅各一分

胡椒一錢半

右為末入巴豆肉不用去油壹粒湯下大便利腫自消未利再服停積痢滯通用

又方　治四肢大流氣腫一切

右為末一握生薑七片大棗二枚新水一大椀同煎取清汁調藥末一貼加枳殼一錢用紫蘇連莖三條煎二盞分二次溫服

又方　治外腎腫大並物水泡通明方

右為末煎汁一盞調藥末伍圓效溫白圓方見浮腫門

前方　青木香圓　百粒效

治十種水氣病根源証方法

先從面種者曰（梨水）其根在肺（桑白皮）為主

先從四肢種者曰（大戟）其根在脾（大戟）為主

先從背種者曰（黃水）其根在膽（雄黃）為主

先從胃腫者曰（風水）根在皮膚（茯苓）為主

先從脇腫者曰（歐水）其根在肚（芫花）為主

先從腰腫者曰（石水）其根在胃（甘遂）為主

先從腹腫者曰（冷水）其根在肺（商陸）為主

先從陰腫者曰（黑水）其根在腎（澤瀉）為主

先從手腫者曰（八水）其根在腹（巴戟）為主

先從脚腫者曰（清水）其根在心（黃蘗）為主

右十味為末所主藥加（各等分）各等分每服一錢空心井水調服以利為度忌鹽百日外忌魚蝦麵食一切毒物房事病痊後更服調補藥

調補藥方

肉桂　乾姜炮　肉豆蔻　青皮

白朮　川芎　茯苓　枯梗各等分

右為細末每服三錢食遠白湯調服

補肝飲

大戟微炒　澤瀉　車塵炒　連翹

桑白皮　木香炒　甘遂炒　赤小豆炒

芫花醋炒　巴戟去心　已上各等分主

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸（桑白皮）湯送下

治脾温有餘氣不宣通面目四肢浮腫

桑白皮　白朮　木香　茯苓

澤瀉　陳皮各等分

右㕮咀每服七錢水二盞煎八分去滓食遠温服

（手足飲）治上氣喘嗽面目浮腫

紫菀　紫蘇子炒各一錢半　杏仁去皮尖五味子　陳皮　烏梅肉
桑白皮炙　麻黃去節　阿膠炒　甘草炙各一錢
右㕮咀分二貼每貼水二盞薑三片煎八分食遠溫服

葶藶丸　治肺氣咳喘面目浮腫喘促不安小便赤澁
防己　木通　杏仁去皮尖炒黃　貝母煨各一兩
右為末棗肉搗膏為丸如梧桐子大每服五十丸食遠棗湯下

皮　煎湯下

治男子婦人十腫水氣取水法
大鯽魚一个去腸肚　大戟　同甘遂各半錢
右先以大戟同甘遂一半入魚肚裏水濕紙裹煨令焦取出
焙乾同㕮咀為末每服三二錢用土狗一箇爛研入藥內

蠱毒門　治腫滿小便少　猪苓　針砂各半分
地龍
右為末蠱毒調敷臍中寸高以帛束之

蠱毒門　治水氣遍身浮腫宜先此藥數日次服消水丸
茯苓皮　陳皮　生姜皮　大腹皮
桑白皮　加蘿蔔子　蘇子　葶藶子
漢秋子
右五子同炒㕮咀每服五錢水一鍾生姜三片同煎至七分
去滓不拘時服

一方　治酒腫及脾虛作腫　皂角伍斤
蘿蔔拾枚
右二味用水同煮乾去皂角將蘿蔔搗爛入永餅和丸如鷄
頭實大蘿蔔煎湯如意送下

一方 治水腫氣蠱

木香　檳榔　陳皮　青皮
大戟　芫花　肉豆蔻　路錢半　牽牛末一錢半

右為末水丸或(甫)汁丸如菉豆大每服伍十丸空心白湯下

三五加減法 治一切水溫腫病大腹實脹喘滿(毋庸)方見溫

針灸法 分水一穴在臍上一寸灸七壯療腹腫不能食若是水病灸大良
神闕一穴當臍中灸三壯主水腫
石門一穴在臍下二寸灸七壯主水脹
三里二穴在膝下三寸箭外廉兩筋間灸七壯主水腹脹皮腫
水溝名人中在鼻柱下灸三壯主水腫人中滿

水腫惟得針(水溝)若針餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人針分水殺人多矣若其他穴亦有針得瘥者特幸焉丹不可為法也

新刊仁齋直指附遺方論卷之十七終