



仁齋直指

五

特別
64
183
5

南
181
人

南
文
庫

門 武
第 183
卷 5

書庫

新刊仁齋直指附遺方論卷之七

身體

身疾方論

凡人百骸四躰肌肉皮膚關節筋絡總而謂之身風濕滯血
刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍徒
千萬大不侔焉蓋骨為髓之藏髓者飲食五味之實秀也髓虛
則骨虛勢所必至矣痛在於身風之證以走注知之濕之證以
重着驗之血有筋脉鑽刺之證痰有眩暈咳唾之證驅風除濕
行血豁痰對證一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷
之不可救藥者也其能生乎然則身痛之與骨痛毫釐千里之
差於此不可以無辯雖然酒家之癖多為項腫臂痛蓋熱在上
焦不能清利故醞釀日久生痰涎聚飲氣流入於頂臂之間不
腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理一分殊之別伏於包絡

同書

仁齋

指

附遺

圖書

藏

隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃府為嘔為吐此則胃家之病學者不可不知

身疼證治

人身風濕身疼通用方見風類更增川芎半兩亦散風邪

左短圓風濕湯治風濕身痛並見風類

加刺除濕湯生附除濕湯方見濕類五苓散見水飲類並主傷

濕身痛

黃蒼建中湯方見濕類加川芎當歸治血刺身痛

大半夏湯方見痰涎類加陳皮治痰證身痛

消痰伏令圓治臂痛不能卒手或左右轉移或兩臂如人抽拽

圓白半夏湯洗三次切碎伏苓一兩

風化朴消分枳殼半兩

右末薑汁煮稀麪糊圓桐子大每三十圓食後薑湯下

天仙飲治痰注臂痛

片子薑黃六錢天仙藤卷活

白朮各錢白芷梢各錢半夏製半兩

右到每服參錢薑五片煎服間下千金五苓圓方見脾疼類

白圓子諸風痰涎通用

圓白半夏湯洗過南星三兩

白附子生式兩川烏頭生去皮臍

右細末入生絹袋井水擺以手揉出滓再研入袋擺入磁盆

中曬露星至曉弃舊水換新水攪曬次早又換新水攪曬春

伍日夏參日秋柴日冬拾日去水曝乾研開糯米粉煎粥清

圓菜豆大每參拾圓薑湯下治酒家痰壅項腫白圓子式錢

研末白豆寇縮砂煎湯調下七痰立愈自後陳湯加刺不

服方見瘰癧類

膏根酒治風濕濕滯手足不卒筋節攣皮先與通關用

全蝎

朱管新瓦上
微炒末之

麝一字

右老酒叁盞空心調作壹服如竟已透則止未透次日再作壹劑然病未及除自後專以

神效

消飲圓

倍木圓治酒癖停飲臂痛見水飲門

沉香

治勞倦身痛

沉香

人參

牛膝

伏苓

秦艽

木香

黃耆微炙

巴戟去心

當歸

半夏製

柴胡

荆芥各半兩

孰附子

辣桂去麋皮

鱉甲浸去裙襖炙黃

羌活

孰地黄洗酒蒸焙

柴錢半

全蝎去錢半

大肉豆寇四箇

右末每貳錢葱白貳寸薑叁片束貳枚食前煎服温酒調下尤妙

補腦

加製添桂

治勞倦身痛方見痼冷門

補腦

治風淫血刺身軀疼痛四肢拘挛

延胡索炒

辣桂去蘆

當歸半分

右末每二錢酒調下

延胡索

活血除風理氣

補腦丹

補益真元治臂痛腰痛

杜仲去蘆炒

破故紙十兩用

紙十兩用之麻五兩同

鹿茸二兩

沒藥一兩別研

右細末用

胡桐子

三十箇湯浸去皮杵為膏入麩少許酒煮

糊圓桐子大每百粒空心鹽湯下

補腦

拔斮方

肩背痛不可迴顧者此太陽氣鬱而不行

以

風藥散

之脊痛項強腰似折項似拔者此足太陽經不通

也

羌活

獨活銘一

藁本

防風

甘草銹半

川芎

荆芥絡三

右吹咀水煎服

麒麟竭散

治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可忍者

血竭

乳香

沒藥

白芍藥

當歸

水蛭炒冷

射香各錢

虎脛骨酥炙黃

右為末每三錢瀉酒調下食前

當歸散

治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸膈不利及遍身疼痛下症於足脛痛腫不可忍方見脚氣門

丹方治上中下疼痛

南星姜製

蒼朮泔洗

黃栢酒炒各

川芎一

白芷兩

神麴炒一

桃仁兩

威靈仙酒炒

羌活三錢走

防已兩

桂枝三錢

紅花酒洗

草龍膽半兩

右為末麴糊九梧子大每服一百丸空心白濁下

方治血氣虛有痰白濁陰火痛風

人參兩

白朮

熟羊

川黃酒炒黑各

山藥

海石

南星各壹

瑣陽兩

敗龜板酒炙

乾姜燒灰半兩

取其不走

右為末麴糊九一云酒糊丸

方治酒濕痰痛風

黃栢酒炒

威靈仙酒炒各

蒼朮

羌活

甘草叁錢

陳皮

芍藥各壹

右為末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下

治一切諸般風氣濕痺通身骨節疼痛方見風門



腰

腰痛方論

腰者腎之外候一身所恃以轉移闔闔者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝風受濕傷冷苦熱血滯氣滯水積

清傷與夫失志作勞種七腰疼疊見而層出矣衝風者汗出乘風七邪風毒之胚胎也受濕者踐雨卧温重著腫滯之萌蘖也腰間如水為傷冷發渴便閉為蓄熱血瀝則轉側如錐之所刺氣滯則鬱七悶七而不伸積水沉重則小腸不得宣通墜墮損傷則瘀血為之疑結沮判失志者腎之蠹疲精勞力者腎之戕率是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經曰腰者腎之府轉搖不能腎將備矣審如是則痛在少陰必究其受病之原而處之為得雖然宗筋聚於陰器肝者腎之同系也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廩也鬱怒傷肝則諸筋絏弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之寇故併及之

腰痛證治

青娥圓

治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用安胎飲吞神効

破故紙律兩

杜仲去籠剉肆兩

右為末用胡桐肉參拾箇研膏入少熟蜜圓桐子大每服五

十圓調氣散

食前下

方見服諸門

安腎圓

治腎虛腰痛橘皮煎湯食前下

方見水飲門

獨活寄生湯

治風邪冷濕傷腎腰脚背痛及新產腹痛腰脚痺

疼最除風活血脚氣通用

獨活貳兩半

桑寄生如無以

秦元去蘆

杜仲薑製炒

細辛

牛膝酒浸焙

川芎

防風

白芍藥

辣桂

熟地黄淨

甘草炙

人參

當歸

熟地黄淨

甘草炙

右細剉每服錢空心煎服下利者去

小續命湯

治風攻腰痛

方見諸風門

加桃仁去皮尖炒

生附湯

治受濕腰痛

附子生

蒼朮炒

杜仲薑製炒

生乾薑

白朮

茯苓

牛膝酒浸焙

厚朴製甘草炙

右剉每錢薑肆片棗貳枚食前

薑附湯 治傷冷腰痛 方見寒類 加 辣桂製 杜仲 食前煎服

甘豆湯 治內萎風熱入骨腰痛大小便不通 方見積熱門 加 續

斷天冠間服 敗毒散 方見寒類

蘇沈元麝圓 治血滯腰痛 方見血類 用 續斷 牛膝 桃仁 炒煎湯

磨下

人參順氣散 烏藥順氣散 治氣滯腰痛 方見諸風類 加 五加皮

入少 煎湯調下

腎着湯 治腰間積水痛重 方見濕門 續用 安腎圓 并少許 青木

香圓 繼之 方見水飲門

乳香透痛散 治打墜腰痛

虎脛骨 煎 敗龜 酒炙 兩 騏驎竭 赤芍藥

當歸 沒藥 自然銅 煨醋淬細研

防風 白附子 炮 辣桂 去麩 白芷

蒼耳子 微炒 骨碎補 炒去毛各參兩 牛膝

天麻 攢榔 五加皮 羌活 各一兩

右末每服一錢溫酒調下加 全蝎 妙脚氣通用

茴香酒 治打墜凝於腰疼通用

破故紙 炒香 茴香 炒 辣桂 等分

右為末每服二錢熱酒調食前進 破紙 主腰痛主行血

治失志傷腎氣到腰痛 方見氣類 多加 白茯苓 少

加 補湯 下 青娥丸 治勞

力腰痛 方見痼冷門

調用散 治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏 製 辣桂 宣木瓜 當歸

川芎 牛膝 好細辛 各二 石昌蒲

酸棗仁 盪去皮微炒 甘草 各一分

石剉細每三錢薑伍片棗二枚煎服

沉香降氣湯和調氣散每服二錢半薑棗煎治憂思傷脾發為腰痛方見諸氣門

腰重痛方

橘核

茴香

胡盧巴

菴藷子

破故紙各炒附子炮等分

右末酒煮糯米糊圓桐子大每服三四十圓食前鹽湯下

神麴酒治腰痛不能轉側陳文神麴一大塊燒通紅淬老酒去

神麴通口吞青磁圓兩服頓愈

腰重痛方

八角茴香炒末食前溫酒調下

附諸方

獨活湯治因勞役得腰痛沉重如水似折

羌活

防風

獨活

肉桂

大黃煨

澤瀉三錢

桃仁五十

當歸

連翹半兩

甘草貳錢

防已

酒連壹兩

右咬咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

補髓膏百一選方升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛方見身體門

○若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水又坐水濕處或為雨露所着

濕流入腎經以致腰痛宜獨活湯不效宜腎氣湯○若風傷

腎而腰疼者或左右痛無常處牽引兩足宜五續髓每服加

半錢或加全蝎三箇不續髓獨活寄生湯可選而用

經絡活絡湯治墜墮控閃氣血凝滯攻刺腰痛神效

桃仁去皮

紅花

牛膝酒洗

玄胡索

破故紙炒

杜仲炒

川歸尾酒洗

羌活

官桂

蒼木各煨炒

茴香

乳香少許

右咬咀用水一鍾酒半鍾煎至八分食前溫服

補陰丸治腎虛腰痛方見虛勞門

牛膝酒 三因方 治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮 五加皮 薏苡仁 川芎

牛膝 兩 甘草 壹兩 生地黄 兩 海桐皮 貳兩

羌活 壹兩

右咬咀用絹包裹藥入無灰酒內炙浸七日夏三五宿每服

一盃曰用三四服長令酒氣不絕一法加炒杜仲壹兩

杜仲酒 三因方 治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲 兩 薑 兩 法製杜仲

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

針灸法 腎俞二穴在十四椎下一法點記度皆尺處灸隨年壯

腎氣

腎氣方論

腎主納氣人之氣海擊善為腎虛而為風寒所乘為暑濕所殺

喜怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏是以群邪聚於其中曰
疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹
作痛或攻刺於腰脇或游走於背脊或冷氣搶心心下痛滿或
手足厥冷痛遶臍傍或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹
中累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒淅寒
熱者有不得大小便者有裏急而下泄者有自汗出者有不欲
食者其於陰間則知有大小伸縮而上下不常囊有腫脹急痛
而發軟無定挾冷觸怒則塊物逼上囊根或攻腹脇時和心平
則塊物自循管系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則
散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣
水與氣搏行其小便其間以主治腎氣之劑參之固定則也然
總治之法大要以流行疎利為先母曰腎虛得病不敢疎泄蓋
腎為邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛劑
兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖然腎氣

身休

發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有冷熱不調尤
當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清而多遇寒即發是也熱
者內挾暑氣或積酒毒或服煖藥於前外腎與小腹俱熱肛門
間糞後亦熱小便數而澁遇熱則甚是也冷熱不調者小腹外
腎乍冷乍熱大便小便或秘或利用藥溫涼當隨證而權度之
但所謂流行踈道常常運轉於其中矣其若大小便流利之後
或更有牽刺引疼或微氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣
不還元當加潤養人參當歸川芎芍藥熟地白朮黃芩葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶又不
可無惟是逆氣長嘔中脘停酸燥悶擾擾甚而至於嘔吐最為
惡候何則天生水腎實主之宗筋聚於陰器惟藉陽明以養
之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁必為涎飲在前踰時遂成
暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如養天百未良薑之類誠
不敢發用耳及其嘔吐大作葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶葶藶用之而不顧若猶未也則
吳茱萸單按剛燥等劑又加多焉錐亦用之而救急矣

熟至此脾上未強腎水已為之涸腎水既涸脾土又為之焦往
往陰陽不升降榮衛不流行大小二便閉澁閉而腎汁胃汁
皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識證預與病家言
腎氣證治

杜仲丸治風寒痲痛及諸血帶作痛

牡丹皮四兩 桃仁浸法去皮 官桂各五兩 川烏頭一隻炮熱

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓溫酒下血痛醋湯下

方見痲冷門治奔豚氣痛嘔吐身冷下

治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼治濕證

附子乙錢 沉香 辣桂 葶藶茄

甘草各半錢 香附一錢

右剉為一服薑七片空心煎服

桂枝湯治無陽臍冷疝氣兼治濕證

吳茱萸十兩半酒醋 川白姜生 辣桂各半兩

良姜

萹澄茄

茴香炒

縮砂仁

益智仁

木香

伏苓

甘草各三錢

右判每服三錢水煎調蘇合香丸食前服

美蓬丸 治腎冷寒疝

良姜

碎研

巴豆肉

炒十一粒截斷同桂心半兩

右並末醋麩糊圓桐子大每三十九溫酒食前服

茴香酒

治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上茴香

三錢

胡椒

乙錢

縮砂仁

辣桂各二錢

右麗末

以生雀燎毛去腸拭淨不洗用三箇入藥於其腹中

麻繩繫定溫紙數重裹煨香熟空心嚼食溫酒送下

川椒

治疝氣外腎腫痛

正川椒

法日并治口者

微炒出汗

官桂

各半兩

川芎

當歸

青皮

陳皮

製

枳殼

南木香

檳榔

赤伏苓

青木香

南木香

萹澄茄

白豆蔻仁

甘草

各壹分

右麗末

每叁錢薑棗煎食前服

梔子散

治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大小便不通

梔子仁

製

枳殼

各半兩

北梗

北前胡

青木香

赤伏苓

車前子

甘草

各壹分

右判每叁錢

新水煎服壯熱加枳殼大便秘加大黃

甘豆湯

治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆

三合

甘草

二錢對

薑

七片

右作壹劑

新水煎取清汁服

海浮石散

治腎氣熱證小便秘澀黃色

海浮石

右細末

每貳錢

前麥門冬

赤伏苓

湯調下

金蓮散

治膀胱氣痛

巴豆

三十粒去殼截斷

川練子

二十四箇湯浸

去皮薄切片

右件用麩貳合同炒令黃赤去麩與巴豆只將川練為末每貳錢溫酒調空心服

五寶散 方見水飲門 用**生車厘子****竹園尿****赤茯苓****麥門冬**去心

柴胡桂枝湯 治腎氣冷熱不調證

柴胡錢 兩三 人參 桂枝 白芍藥

生薑各半兩 半夏四錢 黃苓 甘草各錢

右剉散每服四錢棗壹枚水大盞煎柒分溫服

解毒雄黃丸 方見積熱門 **溫白丸** 見浮腫門 以**枳殼散**送下方

見脚氣門 治腎氣大便不通酌量輕重用

二物湯 治奔豚疝氣攻刺走痛 牽牛炒 乙兩

右麩末每服貳錢薑棗煎溫服

青木香丸 治膀胱疝氣每五十九丸以**酒**入**白煎****五散**送

下方並見水飲門 又方**青木香圓** 二伯粒**班**十箇去頭足

為末同於文武火上慢慢炒令丸子微香以磁碟蓋銚上頓在

冷處少頃去**班**末取圓子每服五十九丸**茴香酒**下

金鈴散 治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川練子三十箇 湯浸去簿皮每箇作七片 **巴豆**三十

右以**舶上茴香**與**川練**等秤并**木香**壹分為末每二錢水酒

各半盞連根**葱白**貳寸煎取汁食則調下

煨棗丸 治小腸氣痛不可忍**班**壹箇去頭足翅入大棗中線

繫溫紙包置慢火中煨令香熟去**班**空腹食棗以**酒****煎**

煎湯送下

鴨麝散 治膀胱小腸氣痛**鴨**緊實而全者不拘多少焙乾為

末每迎病發時用**鴨**壹錢入**麝**半字分作貳服溫酒調下入

行拾里又進後服神效

天笑散 治小腸氣痛及諸血痛

川五靈脂 蒲黃微炒 加延胡索各等分
右末每服貳錢酒半盞水半盞煎七分食前服血痛臨熟入
米醋少許

鹽煎散 治小腸氣吊腹中成陣刺痛兼治風證

益智仁 白芷 白乾姜炮 茴香炒
甘草炙 天台烏藥法香附各乙兩 青皮壹兩半
檳榔 麻黃去節 川芎 枳殼製

右末每服貳錢鹽少許水煎食前服

全蝎延胡散 治小腸氣痛最良

延胡索 用鹽炒壹兩 全蝎 日乾生用壹分

右細末每服壹錢食前溫酒調下亦治心痛不飢飽醋湯調下

胡盧巴散 治小腸氣攻刺

胡盧巴 妙乙兩

右末每服貳錢茴香炒紫用熱酒沃蓋定取酒調下

白散 治腎氣刺痛七氣通用

當歸 川芎 枳殼製 官桂
青皮 川白姜生 茴香炒 川練肉
陳皮 紫蘇 三稜煨 蓬木醋浸一宿焙
白芍藥 茯苓 木香各乙兩 人參
沉香 甘草各半兩

右末每服叁錢葱白二寸鹽少許煎服大便秘加**大黃**

白散 治奔豚諸疝作痛

當歸 延胡索 舶上茴香妙 胡盧巴各乙兩
桃仁浸去皮 桑螵蛸酒蒸 川五靈脂研 白芍藥
川練肉各半兩 葶澄加 木香二錢半 全蝎十個焙

右末米醋打麩糊圓桐子大每服伍十圓少鹽入酒送下有

熱小便秘**車前子**煎湯下

生料調氣散 治寒疝作痛 方見諸氣門 每服貳錢入**生姜****紫蘇**

少鹽煎服若是藥末用茴香鹽酒調下

秘傳朱更內消圓 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰瀕偏大或生瘡出黃水

吳茱萸 半酒半醋浸

山茱萸 蒸去核 馬蘭花 醋浸焙

川練子 蒸法 官桂

黑牽牛 炒取 舶上茴香 用鹽炒

延胡索 畧炒 橘紅

青皮 去白 海藻 浸洗去鹹焙

桃仁 浸去皮 白蒺藜 炒并去刺 木香 各半兩

右細末酒麩稀糊圓桐子大每四十圓食前溫酒鹽湯恁下

葫蘆巴丸 治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹有物如如上下走痛

葫蘆巴 炒

川練子 蒸去皮核焙

川烏 炮去皮略

大巴戟 去心各一兩半

茴香 炒參兩

吳茱萸 半酒半醋浸壹宿 牽牛 炒取末貳兩

右為末酒麩稀糊圓桐子大每貳拾圓空心溫酒送下

續命圓 治小腸膀胱氣痛

延胡索 畧炒 川練子 蒸去核

舶上茴香 炒各半兩

牽牛 炒取末 當歸

良姜 去白 青皮 去白

木香 天台烏藥 各乙分

全蝎 七箇焙

右末生薑自然汁浸糕為糊圓桐子大每服參拾圓燒綿灰存性調酒送下

續命圓 治腎氣作痛

黑牽牛 炒熟

白牽牛 炒熟

右為末每服挑參錢七續命膏副薄切開縫入山椒五拾粒

壹壹伯粒以續命不編摻入腎中線繫濕紙數重裹香

熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

伏苓桂枝湯 治臍下悸動欲作奔豚

伏苓 二兩

甘草 半兩

桂枝 乙兩

右到細每服肆錢藥壹箇用甘泉水壹盞半煎壹盞溫服
敵金圓 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛遠腰寒熱
往來

京三稜

蓬莪朮

木猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川練肉

山茵陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

薑黃

茴香 各壹兩

南木香 半兩

丁香 壹分

澤瀉

巴上並生用

海藻

酒浸壹宿焙乾

海浮石

米醋浸火煨紅滓醋又

川山甲

熱大灰煨 焦各壹兩

青皮

拾筒去頭足翅同炒黃色去班不用

香附

拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用

右件截碎夾和微炒並為末酒麩稀糊桐子大每服叁拾

圓溫酒送下此藥能泄斟酌用之

川練散 治膀胱小腸氣木腎諸疝通疝方具大腎門

金剛文瓜丸

治腎氣攻刺及脚氣酸疼通用皆得效

葫蘆巴

慢火炒

牛膝

酒浸焙

舶上茴香

酒浸炒

肉苁蓉

酒浸焙

川續斷

揀淨生用

厚杜仲

去麋皮姜製

天麻

各二兩

當歸

酒浸焙

沒藥

別研各乙兩

右為末以

艾

去枝梗貳兩

木瓜

貳枚切蓋去穰入艾塞滿

蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為丸桐子大每服七拾

圓溫酒鹽湯任下

腎氣方

大七氣湯

加炒

厚

煎服

附者方

又方 生姜母多開小孔納以

川椒

溫紙煨透老酒嚼下

川練子散

治小腸氣痛

木香

不見

茴香

鹽炒黃

川練子

用巴豆十粒同川練子炒黃色去巴豆各乙兩

右為末每服二錢

溫酒

空心食前調服

玄胡索散

治小腸氣痛

附者方

卷之十

七

用**玄胡索**鹽炒防風各等分為細末空心**鹽酒**調下
腎氣方丹溪方治諸疝定痛

茴香 破故紙 吳茱萸鹽炒各五錢 胡芦巴七錢

木香三錢

右為末**羅**搗汁丸**鹽湯**下

守功治癩疝要藥不痛者

蒼木 南星 白芷散木 山查略心

川芎 枳核又云枳 半夏各半 秋冬加吳茱萸

右為末**神**糊丸服又云有熱加**山**一兩堅硬加**神**半

兩又或加**青皮**荔枝核

又方治癩疝

南星 山查 蒼木各二 白芷

半夏製 枳核 神麴各乙 海藻半兩

昆布半兩 玄明粉 吳茱萸各二

右為末**酒**糊丸

積疝方

山查妙乙 茴香妙 柴胡妙二 牡丹皮鉞

右為末**酒**糊丸如梧子大服伍六十九**鹽**湯下

又方治疝作痛

蒼木 香附俱益 黃柏酒炒已 玄胡索

益智 桃仁已上 茴香妙 附子鹽剉 甘草已上

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

治偏墮用**沒藥****川**練肉**角**全蝎為末每服二錢空心熱酒調



木腎

木腎方論

心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和
溫溫其和安有所謂木強者哉惟夫嗜慾內戕腎家虛備故陰

陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痰頑痺結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流轉益如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚氣與敗血交攻亦有木強脹痛之證治法大要則同於中更為之消痰

木腎證治

川練散

治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜諸證

川練子不姓者時給及肉以同香二錢半
同妙併留故紙切七箇以香二錢半同妙併留故紙
半箇切七箇以香二錢半同妙併留故紙
四箇去翅同妙去班備不用切七箇以香二錢半同妙併留故紙
作兩斷同妙去班備不用切七箇以香二錢半同妙併留故紙
妙去蘿蔔子同妙去班備不用切七箇以香二錢半同妙併留故紙
不用外更別入同妙去班備不用切七箇以香二錢半同妙併留故紙
尚香各半
青木香各半
辣桂

右並為末酒調稀麩糊圓桐子大每服參十圓食前鹽酒下積日計功打墜瘀血證本方加延胡索半兩畧炒入藥以

研為末調酒下

瘦瘵方

治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎方見腎氣門

四種丸

治腎冷疝氣脹痛

吳茱萸陳淨一兩半用米醋浸壹宿各焙乾
大香附淨洗淨 荳蔻淨洗淨
青木香各半兩

右為末米糊圓桐子大每服七十圓食前鹽湯下或乳香葱白煎湯下

附方

治木腎不痛

枸杞子 南星 半夏 黃栢酒炒
蒼木鹽炒 山查 白芷 神麴炒
滑石 昆布 吳茱萸

右為末酒糊丸桐子大空心湯下七十九
治小腸氣及木腎偏墜方

黑華子 一斤用**酒** 胞裝滿以線縛定口子好**酒米醋** 各一
 碗於砂鍋內煮乾為度取去**黑華子** 用**青紅娘子** 十九箇於
 鐵鍋內炒燥去**青紅娘子** 將**黑華子** 研取頭末四兩另入**酒**
澤瀉 細末各二兩**酒** 糊丸如梧桐子大每服三十九空心**酒**
酒 送下不可多服如多服令人頭眩如頭眩可服**黑華子**
奪命丹 和濟方遠言近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬
 陰間濕痒抓成瘡癬
 吳茱萸 童便 浸四兩 醋 浸四兩 湯 浸四兩 澤瀉 去灰 七
 右為末**酒** 煮麵糊丸如梧子大每服五十九温**酒** 湯任下
一方 治木腎
楮白葉 又云雄者晒乾為末**酒** 糊丸桐子大空心**酒** 湯下五
 十九

腎臟風癢

腎癢方論

實則為痛虛則為癢癢之出於骨虛也明矣腎為足少陰之經
 囊間濕癢謂之腎臟風世所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥
 陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不充內為嗜慾所
 耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入囊間其有不濕癢者乎
 脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當疏散風邪流行濕毒夫
 然後以**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎
 連用**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎
 為酒麵灸燻所傷腎虛而挾熱如**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎**酒** 煎
 無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄
 肝腎愈虛或者未知攸濟

腎痿證治

宣風散 疎肝腎風

大雞心 檳榔 貳箇

牽牛 生取末壹兩 炒取末壹兩

右末每服貳錢蜜湯調下

不換金 去肝腎濕氣 方見傷寒類

青木香 疎導腎經風水 方見水飲門 病人腎虛挾邪浮腫多

用安腎圓 少用 夾和鹽湯下屢效 方見水飲

活血驅風散 治肝腎風毒腎囊濕痿脚下瘡癬

當歸 川芎 白芷 華陰細辛

白蒺藜 炒去 桃仁 煨去皮 白芍藥 半夏製

塊潤 五靈脂 甘草 生 蒼木 炒

杜仲 薑汁炙 辣桂 天麻 薏苡

橘紅 檳榔 厚朴 製

右細剉每服參錢水盞半薑錢五片棗貳枚煎七分濾清

執火 末少許食前服 以佐心氣使心腎相交或有

執證去 加 煎

痰和散 治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡癢

蒺藜 炒 柎刺 草烏頭 水浸三日 白芷

白附生 蒼木 炒 荆芥 各錢半

右熬末米糊圓桐子大每三十圓上則茶清下則鹽酒服

治肝腎風痿 方見楊風門

治外腎濕痿 方見虛勞類

大腹皮 壹升

右夾 煎湯溫洗拭以津唾塗次用 油髮 燒存性入

些 白 末傳逐日煎湯密室洗換藥或用 龍骨散 仍服

用米飲調下

垂頭三五孔小漏瘡出血微膿妙方

油髮燒存性灰傳乾則津唾調仍以米湯調髮灰食前服

乳香治外腎濕癢活爛如癩

龍骨 石膏生 五倍子各壹 白及

乳香 黃華丹各半 麝少許

右細末先以苦參大腹皮煎湯溫洗後傳

陰囊濕癢方

爐甘石綠者 真蚌粉 黃連 五倍子各半分

右細末摻先以苦參煎湯溫洗

又爐甘石方 見諸瘡門

如精瘡陰蝕瘡方

油髮灰 青黛乾等分

右為末入此三或摻或津唾調傳

又青紙方 見如精瘡中

大學治腎臟風癩瘡方

雞心檳榔壹大箇 破開以黃華丹壹錢

明硫黃壹錢 生革丹壹錢 全蝎叁枝 焙

右同末入一少許於磁器收每用少許調抹

兩掌先以鼻臭男以兩掌拊外腎女以兩掌拊兩乳各睡至

醒次日又如此用藥廢效

用法 用大紅山去白水醮濕半日夾一研膏擦手如上

法亦驗

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡 澤瀉各壹 車前子 大通各五

生地黄 當歸尾 草龍膽各叁

右件咬咀如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去滓相

熱空心宿食消盡服之更以麩壓之

治兩外腎冷兩脾樞陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣

生甘草 酒黃蘗絡貳柴胡 當歸尾絡貳

紅花少許 草龍膽 麻黃根 羌活

漢防已絡壹 五味子絡叁 升麻 澤瀉絡壹

茯苓壹

右件判如麻豆大都作一服水三大盞前至一盞去滓温服

食前忌酒房事

補肝湯 東垣方 前陰如冰冷并陰汗内胸痠飲無力

黃芪柒分 人參 苜蓿根 白茯苓各叁分

升麻肆分 柴胡 羌活 當歸身

連翹 炒黃蘗 澤瀉 蒼朮

麴末 知母 防風 陳皮絡貳

炙甘草半 猪苓肆分

右件判如麻豆大都作一服水二盞前至一盞去滓稍執服

空心食前忌酒温酒温

又方 治眼目赤腫瘡

蜜陀僧 乾姜 滑石

右為末擦上

又方 先相吳茱萸煎湯洗

吳茱萸半兩 寒水石二 黃柏紅 樟腦 蛇床子半

輕十 硫黃一 白礬 煨礬 白芷絡三

右為末麻油調搽

頭風

頭風方論

足大陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻風邪乘虛皆得而入之矣况復擲沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必

頭風

食前忌酒房事

四

須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻肩稜之間或有一處不若吾之鮐焉皆其漸也有頭疼有頭運有頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或頭并或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極臭或只呵欠而作冒眩之狀凡此皆頭風證也治法大要有執證者用防風煎湯下無執證者用薄荷清下又有素患頭風之人或因傷風寒暑濕依證調理已獲輕安未幾頭風發作則不必拘泥前藥當以頭風和平之劑療之其或病驅老弱先患頭風復感寒邪自汗不止此等用藥無不可也若夫太陽項強一證無汗惡風則為表實合用桂枝湯汗出惡風則為表虛合用桂枝湯是又感受風邪在頭風界限之內者也入水捕魚入林捕兔要必知其所在斯可矣婦人月候適行無故所覺多成頭風牽痛浦頭如水泡之狀

頭風證治

消風散治頭目昏痛鼻塞冒運

人參

羌活

川芎

白茯苓

白僵蚕炒

藿香葉

荆芥穗

防風

甘草炒

蟬殼各一兩

厚朴製

陳皮各半兩

右末每服二錢防風煎湯調下

追風散

治偏正頭風疼痛面上游風狀若虫行

川烏炮去

軟石膏

白僵蚕炒去

防風

荆芥

甘草各一兩

南星炮

白附子炮

羌活

天麻

全蝎

地龍去土

白芷各半兩

草烏炮去

沒藥

乳香

雄黃並研

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服

川芎茶調散

治諸風上攻偏正頭疼

川芎

荆芥穗各一兩

香附去毛

薄荷各四兩

白芷 羌風三分 羌活 細辛 甘草各一兩

右末每服一錢食後茶清調下

究原抽 治頭風掣痛

川烏切片重 雄黃 蟬退去頭足各半兩 川芎 細辛各一兩

右末每服半錢食後臨卧茶清調下

芎芷散 治頭風風壅

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏蝦等分

右末每服一錢食後沸湯調下

香芷散 治頭面諸風

新白芷 對以夏荷汁浸日乾

右末沸湯調食後服或以此子搐入鼻左用右右用左屢效

又方

新白芷 洗曬

右為末煉蜜圓彈子大每一圓食後湯下妙

湯 方見另白門 加刺木 治頭風兼治痰壅酒壅

聖餅子 治偏正頭疼痛連腦項吐逆惡心耳聾目暗

川烏炮去 南星 川白薑各一兩 川芎

甘草各二兩 天麻 防風 半夏重洗去滑生

右末蒸餅糊圓雞頭大捻作餅日乾每服五餅同刺木

細醬薑湯下

湯 治諸頭疼及痰厥飲厥腎厥氣厥等證但發熱者不可服

附子生 烏頭生 南星 乾薑

川芎 細辛各一兩 甘草三分

右劉散每服三錢薑五片茶少許煎煎空服

活人書葛根湯 治太陽病頸項強無汗惡風為表實

葛根一兩 麻黃去節 官桂 芍藥 甘草炙各

右劉散每服肆錢薑五片大棗一枚煎服

頭風

桂枝湯

治太陽病頭項強汗出惡風為表虛

桂枝 芍藥 甘草 各半斤 葛根 一兩三分

頭風方

右劉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服

川芎 天麻 各半兩 細辛 華陰者 爛石膏

荆芥穗 白芷梢 甘草 微炙 各二水 全蝎 炙 五个

右末白湯或茶清調食後臨卧服 **消風散** 加 **神效** **白圓手** 加

附方

川芎散 按粹方 治偏頭痛頭風神効

甘菊 石膏 川芎 各三

右為末每服一錢 **茶** 調下一方有 **白僵蚕** 六錢生用

菊花 川芎 荆芥穗 羌活

甘草 白芷 各兩 細辛 壹兩 防風 去芦 壹

蟬蛻 僵蚕 薄荷 各五

右為末每服二錢食後用 **茶** 調下

又方

片苓 酒炒 蒼朮 試錢 羌活 蒼耳

川芎 生甘草 酒黃連 各半 半夏 麩 炒 三分

右為末服法同前

附東垣頭風論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如是太陽膀胱之脉起於目內眥上額交額上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足小陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴

頭痛

東垣頭風論

二

九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在葛
中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癩疾者
下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如痛半
寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽七明此偏頭痛也有真
頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯
大寒內至骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛
皆以風藥治之者總其大略而言之也高顛之上惟風可到故
味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異
故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽
經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒
脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰涎
重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮厚朴半夏南星為主少陰頭痛
三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子
細辛為主厥陰頭痛項痛或嘔吐涎沫厥冷其脈浮緩白芍

湯主之諸血虛頭痛當歸為主諸氣虛頭痛人參黃芪為
主為上者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也
氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯中少加川芎實則細辛其
効如神半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱
頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛藥也如溫氣在頭者以苦吐
之不可執方而治

和劑方治八風五痺肢躄不仁大治風寒入腦
陽虛頭痛畏聞人声目旋運轉耳內蟬鳴應有溫痺脚氣緩
弱並皆治之

山茱萸去 乾姜炮 茯苓去皮各 細辛一兩
防風去芦 附子三箇半 炮
右為細末每服溫酒食前調服

仲景治太陽傷風頭痛有汗 並見傷寒門

定風散 秘方 治偏正頭痛 方見傷風門
川芎散 聖惠方 治頭風偏正頭痛

羌活

細辛

川芎

香附子

槐花

甘草炙

石膏

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風各

右為末每服二錢 **茶清** 調食後服忌動風物

清血膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅及腦痛
降血虛頭痛不治餘皆治之

川芎

柴胡

黃連

防風

羌活

炙甘草

細挺子

黃芩

右為末每服二錢熱盞內入 **茶** 少許湯調如膏揉在口內少

用 **白湯** 送下臨臥如苦頭痛每服加 **細辛** 二分痰厥頭痛服

緩減 **羌活** **防風** **川芎** **甘草** 加 **半夏** 一兩五錢如偏正頭痛服

之不愈減 **羌活** **防風** **川芎** 一半加 **柴胡** 一倍如發熱惡熱而

渴此陽明頭痛只與 **白湯** 加 **白芷** 白虎湯方見傷風門

一方 治傷風減風一切頭痛

甘菊 一兩

細辛 半兩

甘草 七分

白芷

香附子

羌活

薄荷 各半

荆芥 二十

茵陳 半兩

芥水 半兩

川芎 各

右為末每服二錢 **茶清** 調下婦人產後 **當歸石膏末** 調下

聖惠方 治頭眩

川芎

石膏

白芷 各等分

右為末每服四錢熱 **茶清** 調下

聖惠方

治風熱頭疼

川芎

細辛

甘草

白芷

豆粉 各半

薄荷

石膏 各半

朴硝 二

右為細末煉 **蜜** 和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼

茶清 下

頭痛

風之

乙

微清膏

蔓荆子

細辛各一

薄荷葉

川芎各二

生甘草

炙甘草各五
葶藶木各錢

右為末酒調一錢下

半夏白朮天麻湯

治脾胃証已經服疎風丸下二三次元証不
瘳增以吐逆痰壅稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂四
肢厥冷不得安臥此氣虛頭痛也

黃芩酒洗

乾姜二分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮各五

炒神麩

白朮各一

麥芽

半夏湯洗

陳皮各半

右每服五錢水煎熱服

順氣湯

治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪各半

人參各半

白朮

陳皮

當歸

芍藥各一

升麻

柴胡各三

細辛

蔓荆子

川芎各二

右作一服水煎食後服亦治氣血俱虛頭痛

安神湯治頭旋眼黑頭痛

羌活一兩

防風二系半

柴胡

升麻各半兩

黃蘗酒製一兩

知母酒製一兩

生地黄半兩

黃芪二兩

炙甘草

生甘草各二

右件每服秤半兩水二盞煎至一盞半加蔓荆子半錢川芎

三分再煎至一盞去滓臨卧熱服

腎歸湯治血虛頭痛

川芎

當歸各等

右每服五錢水煎服

調中益氣湯治氣血俱虛頭痛

頭痛

內加川芎三分

蔓荆子三分

細辛二分

方見脾胃門

真定府竹葉卷七

十

眉眶痛
丹溪云眉眶痛者屬風熱與痰作風痰治類痛風

方

黃芩酒浸炒 白芷

右為末茶清調二錢

選奇湯治眉骨痛不可忍大有効

羌活

甘草各一錢酒黃芩不用

右每服三錢水一鍾前七分食後温服

方治頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開

雨前茶

川芎

白芷

防風

藁本

細辛

當歸

右用水煎服

新刊仁齋直指附遺方論卷之十九終

新川仁齋直指附遺方論卷之二十

眼目

眼目方論

眼者五臟六腑之精華如日月麗天著明而不可掩者也其首尾赤腎屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主之是雖五臟各有證應然論其所主則瞳子之關係重焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩烏輪赤暈刺痛浮翳此肝熱也膽生清淚枯黃透睛此肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二而三者也何則心主血肝

眼目

二

臟血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心涼肝又不可因執水生木之說特眼者輕膜裏水照徹四方迴源反本非天一之水又果孰為之主宰乎折而論之則拘急牽颺腫青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚溫漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼渾而淚胞腫而軟上壅脈酸澁微赤是之謂風熱其或風與熱并則癢而浮赤風與氣搏則癢澁昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類氣血不至故有眵視胞垂雀眼育障之形淡紫而隱紅者為風熱鮮紅而妬赤者為實熱兩皆呈露生弩肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙傘者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶溫色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼執經久復為風冷所乘則赤爛眼中不赤但為痰飲所注則作疾肝氣不順而挾熱所以羞明熱氣滯聚而傷飽所以胞合吁此外證之大槩然爾五臟不可闕二脾與肺獨無預何耶曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞

下胞或目昏間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之秀養者中則精華發見於其外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以甘寒藥潤養之輕用溫藥不可也况夫肺能發燥肝亦好潤古方率用桑白皮黃芩為佐果非潤益之意乎至於退翳一節尤關利害凡翳起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳真珠翳狀如碎米者易散梅花翳狀如梅花葉者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血為之水而翳不能去其有赤眼與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而水凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於點洗善怒失節嗜慾無度窮役眼力泣涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火飲啖熱多此皆患生於腑臟者也專事點洗可乎哉有能靜坐澄神愛護目力放

眼目

卷之二

懷息慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋
淵斷可必矣謔曰眼不點不害耳不幹不聾請以為戒風眼以
則軟熱眼腫則硬

眼目證治

人參羌活散 治風眼熱眼澀癢昏朦

羌活

獨活

柴胡

人參

川芎

枳殼 煨炒

茯苓 各半兩

前胡

北梗

天麻

地骨皮

甘草 各二外半

右末每服一錢半

前湯調下

菊花散

方在後 夾和亦得

散

方見傷寒類

加 **散** 性效同

消風散

方見頭風門

治眼風癢昏澀 **前湯下**

治眼壅熱赤腫方

山茵陳

車前子

右煎湯下本門 **川芎茶調散** 通用食後臨卧服

磨光散

治諸風攻眼消磨翳膜

沙苑蒺藜

形如羊腎 慢火炒 去刺

防風

羌活

甘草

甘草 鹽水炙

石决明

搗碎 研水飛過

草决明

蟬蛻 去足

蛇皮

油煎 研和 川芎 各半兩

右末每壹錢半用 **前湯** 去心煎湯下食後臨卧服

白蔞散

治風毒攻眼昏淚颯

蒼木

日換 童尿浸二宿

防風

白蔞 炒搗去刺 各二兩

荆芥穗

一兩半

甘草 鹽水炙 七錢半

右末每服壹錢入鹽少許沸湯點下或用 **消風散** 夾和尤佳

羌活散

治風氣攻眼昏澀淚花

羌活

川芎

天麻

旋覆花

甘菊

藁本

防風

蟬殼 洗曬

細辛

杏仁 浸去皮

甘草 半兩炙

右為末每貳錢新水略煎服

菊石散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

蟬殼去足 木賊去節童尿浸一宿曬 白蒺藜炒搗去刺

羌活各二兩 甘菊四兩 荆芥穗 甘草各二兩

右末每貳錢食後茶清下

白蒺藜散 治腎經風毒攻眼昏淚澀癢

白蒺藜炒搗去刺 防風 甘草 生直薑蚕妙去絲

白南星壹兩半用黑豆二合青鹽 甘菊去萼 一兩半

右末每貳錢沸湯少鹽點下

風毒散 風毒氣眼眩澀障膜通用

蒺藜妙去刺 防風 羌活 川芎

天麻 伏苓 蟬殼足 蒼朮童尿浸壹宿

華陰細辛 荆芥 荒蔚子 甘草各壹分

甘菊去萼二兩

右末每貳錢鹽一點食後沸湯調下

海明散 治風眼昏淚翳膜

川芎壹兩 蒼朮童尿浸一宿去皮焙 木賊去節童尿浸

蟬殼洗曬 蛇皮皂角水洗新瓦焙 羌活 防風

荒蔚子 楮實 地骨皮 荆芥穗

旋覆花 白蒺藜炒去刺 爛石膏 細辛

杏仁浸去皮 甘草鹽水炙 全蝎五枚

右細末每服一錢半食後臨卧服或煎湯下

石决明散 治風眼氣眼昏淚癢翳膜或頭風牽引眼小胞爛

石决明用東流水入鹽煮 當歸 甘草各二兩

防風 羌活各三兩 蟬殼洗 細辛各一兩

蛇皮皂角水洗新瓦焙 荆芥 蒼朮童尿浸二宿去

伏苓四兩 蒺藜炒去刺 芍藥 蒼朮皮切曬各十兩

右細末每貳錢食後米泔茶清下

蓮花散 治風眼熱眼昏流腫疼漸生翳膜

蟬殼 洗曬

甘菊

川芎

防風

羌活

山梔仁

白蒺藜 炒去刺

草决明 炒

荆芥穗

蔓荆子

穀精草 洗曬

蜜蒙花

木賊 去節童尿浸

蒼木 米泔浸

甘草 炙等分

右末每貳錢食後米泔茶清恁下

治眼赤腫 治風熱赤眼赤腫

荆芥穗

梔子仁

牛蒡子 炒

蔓荆子

甘菊

細辛

甘草 炙

防風

白蒺藜 炒去刺

玄參

川芎

大黃

黃芩

木賊 去節童尿浸

草决明 略一

蒼木 米泔浸一

右末每服貳錢食後臨卧煎湯調下或蜜湯下

千金漏蘆湯 治熱眼赤腫膠霧

白及

漏蘆

黃芩

麻黃 去節

川升麻

芍藥

白薇

枳殼 麩炒

大黃

甘草 炙等分

右麩末每參錢新水煎熱服以通利為度

治執眼腫痛

車前子

龍膽草

穀精草

仙靈脾

威靈仙

藥本 各半兩

荆芥穗

秦皮

甘草 炙各貳錢半

右細剉每服貳錢食後煎服

黃連湯 治諸執眼赤腫羞明胃暑飲酒患眼通用

黃連 去鬚搗碎色紅者

右以磁瓶盛重湯炆食後服滓再炆

寫肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁

荆芥

大黃

甘草 等分

右剉每服二錢水煎食後服

眼目

真寶丹

五

肝散 肝盛風熱攻眼赤腫眵淚浮霧蔽明

當歸 川芎 防風 羌活

山梔仁 薄荷葉 大黃焙 甘草炙

右末每服貳錢食後煎泡湯調下

治眼痛方

當歸鬚 木賊 草撥

右末茶水調舌浸出涎

消毒散 治肝熱風毒攻眼赤痛

大黃生 山梔仁拾兩 杏仁去皮

右末煉蜜圓桐子大每服參肆拾圓臨卧濕湯下

龍膽散 治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼

龍膽草 梔子仁各貳錢 防風 川芎

玄參 荊芥 山茵陳 甘菊去萼

楮實 甘草各壹錢

右末每服壹錢半食後茶清調下

和劑亦氣散 加川芎治氣眼浮軟上壅朦朧加炭治風眼

眵昏淚澀癢 方見眼滿類調消風散尤佳 方見頭風門

楮實散 治肝熱生翳亦治氣翳細點者

楮實子研細

右以蜜湯調下食後服亦治小兒翳眼

遠志圓 清心益肝明目退翳

人參 伏神去木 蘆薈研 琥珀

蔓荊子各半 川芎 生地黃 熟地黃洗焙

羌蔚子 蝉殼洗曬 車前子 細辛

白蒺藜炒去刺 遠志水浸去心曬乾 全蝎伍枚

右細末煉蜜圓桐子大每伍拾圓空心粥飲下臨卧石膏

湯下

麥黃湯 治熱眼赤痛

限目

原方

六

車前子 麥門冬 去心 生地黄 洗曬 等分

右判每服參錢新水入蜜同煎食後服加川芎尤好

生地黄圓 明目活血消去瘀肉

人參 防風 各半兩 當歸 川芎

生地黄 乾白茯苓 各壹兩 全蝎 伍尾

右曬為末煉蜜圓桐子大每伍拾圓食後薄茶下加羚羊 半兩尤佳

朱傳

蟬殼 洗曬 疾藜 炒去 防風

木賊 去節童尿浸壹宿曬 川芎 羌活

秦皮 楮實 荊芥 藁本

甘草 各貳錢半

右末每服壹錢薄茶調下

道人開障散 治諸障翳

蛇退 洗焙 黃連 去鬚 半兩

綠豆 一兩 甘草 生 二錢

右判細每服貳錢食後臨卧新水煎服

杏仁方 治肝腎風虛瞳人帶青潤澤臟腑洗垢開光驅風明目

真杏仁 水浸五枚去皮尖

右五更初就床端坐勿言勿唾息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥

逐一細嚼至五粒俟津液滿口分為三嚥直入肝腎惟在久

而成功

花膏 治患眼腫痛流淚昏淚羞明

羯羊膽 一枚飯上蒸熟

右以杏仁研和入末少許頻研成膏食後臨卧匙抄少

許含嚥亦可點目

夏枯草散 治眼痛痒翳膜

夏枯草 大香附 淨童尿浸一宿木賊 去節童尿浸

眼目

蚕退紙炒存性細辛

連翹

川芎

當歸鬚 赤芍藥

蟬殼洗曬各半兩

甘草微炙

腦荷各二錢半

右末每貳錢茶清米泔恁下無以夜明砂代用

神效治一切眼疾昏翳通用

木賊去前童尿浸一宿曬甘草生

川芎

穀精草 蒺藜炒并去蟬殼洗曬

荆芥

羌活 防風 旋覆花 密蒙花寺分

右末每貳錢茶清煎湯調下

益木散治內外障

蒼木細入兩日換米泔浸此日刮去破細木賊去節二兩童

右搗為末每一錢温米泔調下或滲入飲食中恁服

仙米散治眼中翳膜

蒼木曬尿換二宿光淨木賊去節童尿浸一宿曬

蟬殼去十白蛇皮洗淨白蒺藜炒去穀精草

防風 羌活 川芎 杏仁去皮甘草生

右末每壹錢食後蜜湯調下

觀音圓治內外障失明或欲結青光內障或赤脉疼痛悉療之

血竭 熊膽各研人參 蛇退皂角水洗

木賊去節蒼木童尿浸威靈仙 鷹爪黃連去鬚

地骨皮洗曬蔓荊子 羌蔚子 車前子

川芎 當歸 羌活 蟬退洗曬

石决明煨存半生 蚕退紙貳拾幅炒焦

右細末用酒壹具去筋膜慢火煮半生熟帶血性和藥

同搗以酒用肝汁煮糊圓桐子大每柒捌拾圓温米泔

下或石煎湯下食後常服

羊肝圓解熱消血明目

黃連淨為末杏仁去皮白羊子肝壹具去筋膜

張目

右件口內搗細衆手圓桐子大每生拾粒食後臨卧温米泔下日三服

大仙鍊 治內外障翳目睛疼痛

石决明煅明礬石膏生川芎 木賊去節童尿浸壹

杏仁浸去皮半兩甘草炙貳錢

右細末每貳錢治眼生翳障神效少許煎服食後臨卧

前麗開翳散 治眼生翳障神效

白蒺藜炒搗去刺蒼朮洗童尿換浸貳宿曬蟬殼洗曬

蛇退去頭尾及脊上壹線皮不甚用菜花蛇皮

好川芎 杏仁水浸去皮防風 羌活

白芷各半兩華陰細辛 獨活各肆錢白附子生

明爛石膏 荊芥穗 真蚌粉各叁錢

右細末每服壹錢半沸湯點茶清調以舌浸於藥中良久毒涎自出又別換藥食後臨卧服仍用

真珠退翳散

白澤石膏 烏賊骨 真蚌粉等分小珠少許

右細末每壹錢第二米泔調食後臨卧常服

退翳散 治眼中翳膜瘡且翳眼通用

真蛤粉研一兩 細殼精草日乾細末

右夾和每服貳錢生猪肝叁指大竹刀切開藏藥捲束麻繩扎米泔壹碗煮肝熟食後臨卧細嚼以汁下

五退散 治內障眼

蟬退 蛇退 蚕紙

烏雞卵殼 男子髮等分

右火燒存性研細末每壹錢和羊肝湯喫不時常服

還睛圓 治眼目昏翳

蟬殼洗曬 蒼朮童尿換浸 熟地黄洗焙 川芎

白蒺藜炒并去刺 羌蔚子 羌活

眼目 真蚌粉研一兩

火一作夾恐非

防風

木賊

去節童尿浸一宿曬

甘菊

荆芥

蔓荊子

杏仁浸去皮

兔絲子酒浸

石决明

煨各蛇皮酒浸洗淨焙

右細末煉蜜圓彈子大每壹圓食後細嚼薄茶下

明眼生熟地黃圓

治腎氣衰弱肝受虛熱眼生黑花

生地黃

熟地黃斤各壹斤半淨右斛炒

枳殼各六兩

羌活

防風

牛膝各四兩

甘菊去萼壹斤

杏仁

去皮焙拾兩

右末煉蜜圓桐子大每伍拾粒空心食前搥湯下或痰熱煎湯下

駐景圓

治肝腎俱虛眼目昏翳

兔絲子

酒浸研伍兩

熟地黃洗曬車前子各三兩

右末煉蜜圓桐子大每伍拾粒食前搥湯下或白伏苓石昌蒲煎湯下本方加

枸杞子壹兩半尤佳

山藥圓

見漏瀉門

駐景圓

明眼地黃圓

養顏圓

見本門

右肆藥夾和每服百粒食前搥湯下或太流氣飲下治腎虛

瞳人開大淡白昏朦凡人五更初腎氣開繞一言語咳唾腎

氣即合當腎開時靜默進前藥百粒功效勝常

補腎圓

治肝腎氣虛日暗黑花

茯苓

酒浸洗

枸杞子三兩

甘菊去萼四兩

川巴戟去心酒浸

右細末煉蜜圓桐子大每伍拾粒食前搥湯下余太宰方

加二兩淨或用**對交服**

升神圓

升降水火明眼目血心腎

磁石

燒紅碎法醋以碎為

朱砂一兩研細

神麩

炒二兩

加沉香半兩

右細末別用生神麩水調濃煮糊圓桐子大每服參拾粒空

心搥湯下磁石法水入腎朱砂法火入心濟以沉香是則升

降水火

限目

限目

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸形翳膜

當歸 赤芍藥 黃連 去鬚等分

右末每用二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩
三次

水淋法 治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水眼睛自入
仍以

黃連 治熱眼赤腫疼痛

鷹爪黃連 淨二錢 乾文葉 少許 真杏仁 一箇去皮

右同搗碎新汲水浸一日夜瀝清汁仰卧以帛蘸滴入眼中
鼻內見苦味即藥透也或新水浸黃連磁器盛重湯炒濃汁
以熟艾燒存性入藥用

猴風散 治風毒攻眼赤腫癢疼

黃連 去鬚 蔓荊子 各半 五倍子 三錢

右剉細分三次新水煎瀝清汁以手沃洗效

淨器中生研少許

雪白鹽 淨器中生研少許

右以大燈草蘸盞輕手指定浮翳就點凡參次不疼痛勿驚
恐屢效

薑末膏 治眼風癢冷淚爛眳有虫

生薑母 壹塊 以銀筋挿入即拔出點眼頭尾效

南鵬 治弩肉瘵突

南鵬砂 色黃 腦子 少許研細

右以燈草蘸點其上 女參 麥門冬 煎湯調 赤心散 服

爛眩風 治爛眩風 燒紅碎童尿凡參次出火毒壹

日夜研細末夾 童尿 未用童尿浸取清汁點眼胞仍取 覆盆子
軟葉入男兒乳汁研為圓置眼背頭引虫自出

耳石散 治風眼流淚不止

綠爐甘石 烏賊骨 等分

眼目 卷之十

右細末入腦少許點目并口淚自收貳毫燥腦和之

前庭點藥

朱砂貳錢

南鵬砂壹錢

麩仁貳拾壹粒用紙

真珠

爛石膏各半

熊膽壹字

麝少許

右細末用冬研和於碗內蒸得粘入角罐收用時煎黍汁調銅筋點於眼背頭淚出為效

傳眼方 治患眼赤腫閉合

土朱貳分

爛石膏壹分

右末新水入蜜調傳眼頭尾及太陽處仍以山煎湯調治

眼流氣 服一泄而愈方見前

雀盲散 治遇夜目不能視雀參錢為末雀

一葉竹刀披開納蚌於中麻線扎第二米泔煮七分熟別

蘸粉細嚼以汁送下無以代用治內外

障纏入猪肝煮帶主和汁細嚼效

治偷針方 脾間積熱兼宿食不消則偷針刺剉細夾水

煎調 大黃末少許利之

雞血方 治小兒豆瘡入眼生翳擊其尾而垂之從項下割

破些少取生血點翳白尤佳若翳已凝即用南以燈心

蘸點仍用威洗曬等為末每壹錢第二米泔調服

通關散

細辛

川芎

腦荷

蔓荊子等分

右為末每半錢搐入鼻又頭風門加皆可通關

小兒疳眼不開諸疳方論在後

附諸方

石膏羌活散 宣明方治久患雙目不視光明遠年近日內外氣

障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活治

蜜蒙花治

木賊退

香白芷清

乾菜子起

荊芥穗生

細辛倒

乾菜子

荊芥穗

細辛

荊芥穗

細辛

眼目

川芎治頭 蒼木開鬱 甘菊花明目 石膏

黃芩二味先 藁本治偏正 甘草和諸藥

右為末每服一錢至二錢食後臨臥用茶一盞調下或茶

清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十

餘人矣後人加當歸 枸杞子 梔子仁 連翹 柴胡 薄荷 防風

天麻 精製 各等分為

白濁 必方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 黃連 厚朴各一兩

牛黃 黃芩 川芎 羌活

蟬退 白芷 菊花 大黃

防風 草決明 地膚子 滑石各伍錢

生地黄 熟地黄絡七 牽牛半

右為末煉蜜如梧桐子大

清神益氣湯 東垣方 治因脾胃虛損黃証之人誤服瀉肝散致

目疾

茯苓 升麻 陳皮 生甘草

芍藥 白木各式 五味子 麥門冬

澤瀉 蒼木 防風各三 黃柏

青皮各一 人參 生姜伍分

右剉水煎服

治赤腫苦痛

桂枝 連翹 紅花 細辛

歸身 甘草各伍 蒼木 草龍膽各七

羌活 黃芩 麻黃 柴胡

防風 藁本 黃連 黃柏

生地黄 知母銘一 芍藥各

右剉水煎服

經驗神仙退雲丸 治一切翳暈內外障昏無睛屢効

眼目

川歸

川芎

木賊各一兩犀角

枳實

黃連

蟬退

薄荷各半

瓜萎根各

甘草

蛇退

蜜蒙花

荆芥

地骨皮各三

白蒺藜

乾地黄各二

右為丸飲下婦人

當歸湯下有氣水香湯下

羊肝丸治一切目病不問障翳

黃連兩

白乳羊肝

甘草

防風

薄荷

荆芥

羌活

川芎

川歸各半

右為末羊肝水水下

助陽和血補氣湯

補生寶鑑治眼發後上熱白睛紅多眼淚無

疼痛而癢澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故

眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風七分

黃芪各錢

甘草各

蔓荆子各一

當歸身

白芷

升麻

柴胡各伍

右吹咽作一服水一鍾半煎一鍾臨臥通口服忌風寒及食

冷物

蔓荆湯

聖惠方治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃耆

人參各壹

蔓荆子各錢

甘草各錢

白芍藥貳錢

黃柏各錢酒浸

右吹咀每服五錢水二盞食後臨臥溫服

車前散

晉氏家傳肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞

明多淚

蜜蒙花去枝

甘菊花去枝

白蒺藜炒去

羌活

粉草

草决明

車前子炒

黃芩

龍膽草洗各

右為末每服二錢食後飯湯調下

四物龍膽湯

按粹方治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 地黃各伍錢
羌活叁錢 草龍膽貳錢 防風叁錢 防已貳錢

右吹咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

東垣熟地黃丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑
熟地黃壹兩 生地黃壹兩 柴胡八錢 天門冬
甘草叁錢 枳殼 地骨皮 黃連

右為末煉蜜丸如菽豆大每服百丸茶清下

决明散 治眼青盲内障方
桔梗 羚羊角 大黃 紫决明
當歸 川芎 瞿麥兩 生地黃
木賊 羌活 防風 赤芍藥

石决明火煨 青相子 車前子 蝉退
白芷 細辛 蔓荊子 蒺藜炒

香附子 玄參 瞿麥各半兩
右吹咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾通口服立効加

黃連 猪苓 杏仁 犀角
蛇退 菊花 旋覆花 木通
山梔子 丹砂 空青殼水 甘草

養肝丸 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力
當歸酒浸 車前子酒蒸 防風 白芍藥
蕤仁湯泡 熟地黃酒蒸 川芎 楮實子各半

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸食後白湯下又

婦人血虛目疾日宜服
益陰散 東垣方 此壯水之主以鎮陽光

熟地黃二兩 牡丹皮五錢 生地黃四兩 澤瀉二錢
當歸尾醋洗 山茱萸各半 茯苓二錢 柴胡

五味子 乾山藥各伍錢

右件為細末煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服五七十九
空心送下

地之丸 治目不能遠視能近視或亦妨近視

生地黄焙干 天門冬去心 枳殼炒去 甘菊花去枝

右為細末煉蜜為丸如桐子大硃砂送下百丸酒亦可

定志丸 治眼不能近視反能遠視者方見驚鴛傳門

秘傳東陽光明散 屢用神效

水銀五 鉛錫方五 枯礬各一 炒鹽

炒硝各五 治翳膜加朋砂硃砂各一錢

右五味共研為末入於陽城確內用鐵燈盞蓋之再用

扎定外用舊草鞋燒灰和鹽泥故濟用文武火升之勿令泄

氣欲燈盞上常七用水漬之依法三炷官香時退火候冷輕

手開確取下靈氣雪白重伍錢者為佳用磁確收貯入後爐

耳石 煅煉所用

耳石 一兩用搥熟黃泥包封耳石在內再將前靈氣

伍分摻於泥上再用青鹽合黃泥搥熟又裹於外故蜜晒乾

用醫條纏綠團圍縛定用炭火煅紅用童便漬之依法七次

取出去土將耳石研為極細末點之立效或加水片少許

天功 治赤眼爛眩風神效

防風 連翹 荆芥 黃芩

黃栢 生地黃 海漂硝 羌活

黃連 當歸各一

右咬咀用水伍碗煎熟去滓再熬成膏入白粉一兩同錄三

錢前靈氣伍分氣脚三分共為細末入膏和成條子每用二

三錢水磨化重湯煅溫淋洗三次立愈神效

秘傳神仙撥雲散 點開翳膜如神

珍珠 鵬砂 石燕子炒過 水片三厘

硃砂升過 牙硝炒過 石蟹 牛黃各半

眼目

右為極細末點開再用後方末藥點之神効

又方

乳香製過 沒藥製各五分 輕粉五厘 石燕子一個浸九次

青鹽溫紙包一分 珍珠溫紙包 琥珀放豆付內五次用 血結各三分

雄黃 雄膽用箬焙干 硃砂各二分 枯礬

胆礬各五厘 海漂硝三厘 白丁香洗過

煇井石火煇七次 童便童便黃

右研極細末加水少許點之神効

服藥方

蜜蒙花 生地黄 井菊花 梔子仁

黃柏 黃芩 木賊 知母

木通 川芎 藁本 甘草

石决明 黃連 陳皮 草决明

龍膽草 枳殼 當歸 白附子

柴胡 桔梗各半

右吹咀用水二鍾煎食後服

又未詳方 服之神効

防風 木香 川芎 黃連

黃芩 白豆蔻 菊花 川椒

瓜蒌仁 秦皮 蜜蒙花 羚羊角

犀角 枸杞子 蟬退 枳殼各半

右為末每服一錢茶清調下

秘傳受仙方復明膏

黃連細切碎 赤芍藥洗淨 當歸洗淨 杏仁三七粒

黃柏皮一兩去

右剉碎安銅鉢內用水滿浸文武火熬至茶鍾七半一次二

次三次熬至一茶鍾熬至九次次用磁器盛藥水於內攪動

取大半碗藥水煨紅煇井石九次吃將乾為度煇井石雖用

服目

重之得長天十

十一

茶褐色者社份輕用乳鉢細研為聲用密絹羅七之再研
二十分細用製了淨三錢重除用三分製了定石末
一兩半重

硃砂重一子 片腦重二錢

前五味用信白帛好綿濾過洗銅銚淨於內慢火熬不可吹
灰塵在內功忌諸般厭穢之事用竹篋子不住手撓之休令
銚底焦了再括下乳鉢中乳得十分均上殼如常法立効

補陰圓 治腎虛眼目昏暗 方見虛勞門

風通聖散 治風執眼痛頭目昏眩 方見中風門

明目氣散 治一切眼疾疼痛神効

- 大黃炮 牛蒡子炒 川芎 菊花去枝
- 細辛去苗 白蒺藜炒去刺 防風去芦 玄參去芦
- 山梔殼 黃芩 甘草炙 蔓荊子
- 荆芥去梗 木賊去節各一兩 草央明伍兩 蒼木米泔浸二兩

右為細末臨睡服二錢

秘傳神應眼藥

製炒甘草十兩 黃連 黃柏 薄荷各三

右五味咬咀用水數碗煎熟濾去滓用鉢頭盛之將石
研細入銀內火煨深紅傾入藥水內就研飛過淨末听用

- 水銀一兩 黑鉛錢一上二 何鵬砂錢
- 硃砂五分 食鹽一兩用白 枯白礬一兩
- 皂礬二 火硝五分

右八味同一處入湯內用鹽故濟於密升打一炷官
候冷取出用將前製石研細再入伍兩在陽城

嚴封固打一炷官香冷定出火毒研極細紙羅過如點翳膜
如一半如一半加白伍錢一錢伍分火硝一錢伍分

照前製過名曰**捲簾散**如點昏朦加**冰片**名曰**光明散**

至寶琥珀錠子

煇石七便煇石七便附丹各四飛過兩鵬砂四琥珀

硃砂 明礬

熊膽 輕粉 海漂硝 淨皮硝

雄黃 乳香 沒藥各四 冰片五分

射香四分

右為極細末又**黃連****黃柏****黃芩****白茯苓****梔子仁****谷積****蘇合**
各一兩伍錢**訶子**三箇共味咬咀滾水浸一晝夜**銅器**熬成
老膏又**蜜**一斤六兩熬成老膏滴水成珠去火為度同煎成
膏和均下前末藥令勻**銀簪**三箇取汁通和前藥成錠子用

倒睫拳毛

因邪風攻入脾經致使兩皮風痒不住双手背揉目久赤

拳毛入眼內將**木別子**去殼搥爛用**絲綿**包撚成條左患

右鼻右患塞左其毛自分上下次服**五退散**

五退散

蟬退一 猪退四 蚕蛻三 穿山甲五

防風去 荆芥半 石决明 川烏炮

草决明炒 甘草三 蛇蛻醋 竹同盛

右為末每服二錢送下

針法 攢竹二穴在兩眉頭內尖 兩中是穴宜以細三稜針

絲竹空二穴在兩眉后 失髮除胎中

灸法 三里二穴眼目昏 睛前治

風翳在左灸右手中指本節頭骨上灸五壯炷如小麥大

右患灸左

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十終

耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精也

氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪乘虛使精脫

腎備則耳轉而在耳又有氣厥而聾者有扶風而聾者有勞損而

聾者蓋十二經脈上絡於耳其脈既諸經適有交并則臟氣逆

而為厥也氣搏入於耳是為**厥聾**必有時乎眩暈之證耳者宗

脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳之脈使經氣痞而不宣

是為**風聾**必有時乎頭痛之證勞役傷於血氣滯慾耗其精元

瘦悴力疲昏聵是為**勞聾**有能將適得所血氣和平則其

聾暫輕其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有

耳觸風邪與氣相擊其聲嘈聵眼或見光謂之**虛鳴**執氣乘虛

新刊仁齋直指附遺方論卷之廿一

耳

耳論

本鼻亦患塞去其手自衣山寸穴題

風風去風 陰茶牛 正火地 山鳥 益強 采山甲

一平 四平 三平 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

正合 正合 正合

隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之**膿耳**人耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之津液結韌成核塞耳亦令暴聾謂之**聾耳**前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則瀯而濡風為之疎散熱為之清利虛為之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之於此得耳中三昧

耳病證治

治厥在耳方和利流氣飲加**石菖蒲**每服三錢以生姜葱白同煎食後服**沉香降氣湯**方見脹滿門或**降氣湯**方見脚氣門**不痺**

金止氣散方見寒門**指迷七氣湯**方見氣門通用輕者吞來復

冊方見暑門**重者吞養正冊**方見痼冷門九治耳聾皆當調氣

桂星散治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

細辛

淨石菖蒲

木通

白蒺藜炒

木香

麻黃去節

甘草炙各二分

大南星煨裂

白芷稍各四分

右件剉碎每服三錢水盞半菖蒲二片紫蘇五葉姜伍片食後前服晚少食臨卧加此**金鳴服神風湯**亦可用方見風類

雞心檳榔通利腎臟風氣

雞心檳榔三個橘皮

桃仁浸去皮焙

白芷

枳殼制各半牽牛二兩重半炒半生

右為末每服二錢蜜湯調下食前服

地黃丸治勞損耳聾

大熟地黃酒浸三日當歸

川芎

辣桂

兔絲子酒浸三日

大川椒出汗

故紙炒

白蒺藜炒胡芦巴炒

杜仲姜制炒

白芷

石菖蒲各一分磁石火燒醋淬七分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九以葱白温酒空心吞下晚飯前又服

益腎散治腎虛耳聾

磁石制度 巴戟 大川椒開口者 沉香
石菖蒲 各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少許并藥
溫紙十重裹煨令香熟空心嚼以酒送下

耳鳴方 治風入耳虛鳴

白芷 石菖蒲炒 蒼木 陳皮

細辛 厚朴制 半夏制 辣桂

木通 紫蘇莖葉 甘草各一分 又川芎二分

右對散每三錢姜伍片葱白二片水煎食後臨卧服

耳鳴方

草烏頭燒帶生 石菖蒲

右等分為末用綿裹塞耳一日三度

耳聾方

川椒 石菖蒲 舊松脂各一分 巴豆肉五分

右為細末鎔蠟圓如棗核大塞入耳

蔓荆子散 治內熱耳出濃汁

川升麻 木通 赤芍藥 桑白皮炒

麥門冬去心 生地黃 前胡 耳藥

赤茯苓 蔓荆子 耳草各一分

右件對散每服三錢姜棗煎食後臨卧服

耳執出汗方

消石 爛石膏 天花粉 防風已上各

腦少許

右件為末摻耳立止

膿耳方

直龍骨 白礬煨 赤小豆 黃華丹煨

烏賊骨各一分 鱧脂半分

右為細末摻耳

耳

又方

爛石膏於新瓦上煨出火毒

明礬煨

黃革丹煨

真蚌粉

真龍骨各半

麝少許

右為細末用綿纏竹筒拭耳換綿醮藥入耳

耳方

生豬脂

生地龍

金丁墨半

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿包入耳令潤即挑出

耳龍方

明硫黃

雄黃各研細

遠志去心

皂角肉半

右為細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳

又方

草麻子肉

巴豆去膜油

杏仁去皮

滴乳香

松脂各別研青鹽半

右件細研鎔蠟圓如棗核大入耳

又方

以生鼠取膽汁入耳又以生鼠取腦髓綿包入耳生野魚

腦通用

雜方

菖蒲一寸

巴豆一個去心

麝少許

右為末合研作七圓綿包入耳日一圓

又方

草麻子兩個一個去油用

遠心去心

乳香

磁石燒如前皂角煨取肉

生地龍中者一條

全蝎二個

右為細末入蠟搗圓柱入耳

耳方

白鹽炒熱重帛包熨

又方

杏仁炒焦研細帛包塞

耳

耳方

耳

出耳方

桃葉按細塞其耳自出。或以藍青研汁滴入耳又以川椒為末法醋浸一宿滴耳

入耳方

猪脂一指許炙令香置耳孔邊其蟻自出

入耳方

用生姜取汁灌放耳中少時自出或以桑皮搗汁灌入耳即自出

耳龍方

用大蒜一瓣從一頭開孔以巴豆肉一粒慢火煨極熟入蒜孔中以新綿包塞耳逐日換

入方

用益燿石半錢搥碎生研細入聾耳孔別用針砂末入不聾耳孔自然通透然後傾出

天石耳聾通神散

全蝎一枚 土狗一枚 中地龍三條 雄黃

明礬各半錢 麝壹字

右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐一時三日一次

聾方

明白礬煨 黃號卅煨 龍骨 麝脂許少

麝少許

右件研為細末用綿杖纏乾換綿杖蘸藥入耳入麝香許少各少許摻入耳

方

蝎梢七箇去毒 麝脂半錢 乳香 麝香各少許

右研為細末以幹子挑入耳

耳方

論腎者宗脉所聚耳為之竅血氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之搏故為耳鳴先用三棱散許少

散邪疎風 方並見水飲門 散邪疎風

下氣續命飲 和養 當歸 華陰細辛 兩半 辣桂

川芎 石菖蒲 白芷 各錢

右剉細每服三錢入茶煎服如虛冷甚者酌量加

犀角 鎊

治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角 鎊 葛蒲 木通 玄參

赤芍藥 赤小豆 炒各兩 甘菊花 去梗 兩 甘草 兩半

右咬咀每服四錢水一盞半煎服

清神散 治風氣壅上頭目不清耳常重聽

僵蚕 絲 乾菊花 略 荆芥 穗 羌活

木通 川芎 防風 錢五 木香 壹錢

石菖蒲 甘草 各錢

右為末每服參錢食後臨臥茶清調下

半夏 製 陳皮 去白 白茯苓 皮 甘草 炙

瞿麥 菴蓄 木通 黃柏 去粗皮 炒 湯

右用水二茶鍾煎至一茶鍾空心臨臥各一服

涼膈散 治風熱上攻耳聾 方見積熱門

通聖散 治風熱上攻耳聾 方見風門

滾痰丸 治熱痰濕痰耳聾 方見痰門

神芎 治濕熱濕痰耳聾 方見積聚門

棋柳丸 治濕熱溫痰耳聾 方見脇痛門

會 治肝火上升耳聾 方見脇痛門

方 治耳聾久不聞

磁石 壹塊 知 川山甲 壹字 燒存性為末

耳 耳 耳

右用新編裹塞於患耳內口中含此生薑覺耳內如風聲即愈

方治耳作膿者

用其遂一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐徐嚼

方治凍耳 用撮攪核燒灰清油調敷雀腦亦可

鼻

鼻論

肺為氣之主通竅於鼻鼻者清氣出入之道路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉其或七情內鬱六氣外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行自鼻孔出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交澇不

能自收謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宜香臭不聞於是壅作鼻鼈冷氣停聚血脉陰凝歲月淹延轉加壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊鼻道不通則為鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則為鼻齋疊是數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也外此更有濕蟻一證鼻爛汁臭下部生齋詳於後篇詳論見之

鼻病證治

治上熱衄血

生地黄生各半兩 阿膠炒 川芎 北梗

蒲黃

右剉碎每服三錢水煎熟入生薑汁二匙溫服

麥門冬散治鼻衄

生地黄 生麥門冬三錢 生薑一錢 白藥

蒲黃 各二升 白蜜 一合

右搗細以井水二大碗煎七分分兩服

川芎三黃散 治實熱衄血

大黃 濕紙

川芎

黃連 淨

黃芩 等分

右為末每服二錢井水調服食後

敗毒散

方見寒類

治肺熱胃中鬱熱衄血兼治血淋

吐血口臭

雞蘇 即腦荷 真蒲黃 一兩焙

麥門冬 去心 阿膠 一兩炒

甘草 比錢半 人參

黃耆 各半兩

木通

柴胡 各一兩 生地黃末 三兩

右為研取細用冬蜜一斤熬一二沸即入

次將餘藥和圓如桐子大每服三十圓食後服

蘇合香湯

治虛壅鼻血 方見脚氣門

血方

川鬱金末井水調下亦治吐血。又芫花煎湯通口服。又

方血餘散

方見血類 曾服燒煉藥致鼻血者

仍燒 **山梔** 存性為末入鼻。又方 **烏賊骨** 等末入鼻。

又方 **槐花** 半生半炒末入鼻。又方 **成片人中白** 燒去穢為

末入 **麝** 少許入鼻或加 **油髮灰**。又方 **蘿蔔汁** 或 **藕汁** 滴入

鼻。又方 **大蒜** 煨香取叁瓣研傅脚底鼻中有蒜氣即去之

川椒散 治流涕

大紅開口川椒 微炒蓋出汗 苛子 煨取肉

川白薑 生者

辣桂

川芎

細辛

淨白朮 等分

右件為末每服貳錢溫酒調下

南星散 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦氣不宜逐

流膿涕

上等大白南星 切成片用沸湯盪兩次焙乾每服貳錢用棗

柴箇甘草少許同煎食後服叁肆服後其硬物自出腦氣流

鼻

轉隨弟自收仍以...作餅用紗籠炙熱貼額前
對斗火慰透或...末入鼻

苦參散 治鼻塞為艱

芍藥

實柳

麻黃 去節

肉桂

防己

木通

細辛

白芷

石高蒲絡

木香

川椒

甘草 焙各半

右剉每叁錢生薑紫蘇煎服

通頂散 治鼻艱

瓜蒂

荊蘆各一分

皂角肉 半分

麝 少許

右為末吹些入鼻

鼻淵雄黃丸

雄黃 半錢

瓜蒂 式箇

綠礬 一糸

麝 少許

右為細末搗些入鼻亦治息肉

又方

瓜蒂

明礬

華陰細辛 各壹 雄黃 半錢

右為末以雄犬膽汁和圓綿包塞鼻

千金息肉方

瓜蒂

華陰細辛 等分

右末綿包少許塞鼻

又息肉方

牡遂

明礬 煨

朱砂

雄黃

雌黃

荊蘆

瓜蒂 等分

右為末清蜜調傅前鼻艱貳藥通用

人參順氣散

方見風類

霍香正氣散

方見嘔吐類皆治鼻痛

又方

杏仁 水浸去細辛

白芷 各壹糸

全蝎 兩箇 焙

右為末麻油調傅

甘香散

方見積換門

黃連阿膠丸

方見嗽門 共治鼻瘡

方

用杏仁研乳汁傳之。或以烏牛耳垢傳。或黃栢。苦參。擯。柳等為末。以猪胆研傳。或青黛。槐花。杏仁研傳。

酒香鼻井鼻上贅肉面粉刺雀斑方

黃華丹錢

硃砂半錢

巴豆肉拾箇紙

餅藥壹盞半

右件同入罐子中以慢火熬叁肆沸取下續入研細。石炭。叁錢和畢。鵝毛蘸掃紅處日壹次。粉刺雀斑。小竹枝挑藥點。繞見微腫便洗去。鼻上贅肉。傳之。半月取出膿血自成。落矣。

又酒香鼻白面風瘡方

白龍圓末逐日洗面如燥且法更審少時方以湯洗去食後常服。龍虎丹壹帖。並見雜方。半月坐潔。

酒香鼻方

白龍圓常擦妙

鼻血方

髮灰入鼻磨好墨入點法醋井水調下

附諸方

齒根散治鼻衄不止

茜根

阿膠烔粉

黃芩

側柏葉

生竿酪一

甘草半兩

右以水煎服加姜三片

黃芩為藥湯治鼻衄不止

黃芩

為藥

甘草

右以水煎服或犀角地黄湯如無犀角以升麻代之

一方治鼻血不止

用通鼻燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可

御寒湯治寒邪傷於皮毛令人鼻塞咳嗽上喘

黃蘗二分 黃芪壹兩 人參五分 炙甘草

疑冬花各叁 羌活 黃連各壹分 白芷

防風各三分 陳皮伍分 佛耳草叁分 升麻半錢

蒼朮七分

右咬咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍服

高瀉散 御藥院方治鼻內窒塞不通不得帶息

高瀉 皂角 各壹分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子 桔梗 桑白皮 紫苑

荆芥穗各兩 甘草兩

右咬咀每服入錢水一鍾半姜伍片煎八分食後溫服

羌活散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞方見傷風門

蒼耳散 三因方治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁兩 蒼耳子 炒半 香白芷 一兩 薄荷葉 伍分

右為末每服二錢茶清食後調下

辛夷散 濟生方治肺虛為四氣所干鼻壅塞涕出不已或氣息

不通或不聞香臭

川芎 木通 去節 防風 去芦 甘草

辛荑 細辛 洗去 藁本 升麻

香白芷 各壹分

右為末每服三錢茶清調下

防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必衄血

防風 半兩 黃芩 人參 甘草 炙

川芎 麥門冬 去心 各壹分

右為末每服二錢沸湯調食後服

丹後方 治鼻中瘻肉胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶簪 式錢 細辛 一錢 白芷 半錢

鼻

右為末內鼻中

治鼻淵方

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麴

酒芥

辛荑

荊芥 各等分

右為末水調食後服

白黃散

簡易方

治鼻淵瘰肉鼻痔等證

雄黃

白礬

細辛

瓜子 各等分

右為末搗入鼻中

辛荑膏

御藥院方

治鼻生瘰肉窒塞不通有特效

辛荑葉 兩

細辛

木香

木通

白芷

杏仁

湯泡去皮尖 研各五錢用

右用羊髓

宿脂

二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色

放冷入龍腦麝香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

又方

治鼻中瘰肉

蝴蝶礬

二錢 細辛 一錢

白芷

五分

右為末內鼻中



唇舌論

心之所司者舌脾之所司者唇口是雖各有司存然心之氣未嘗不通於脾脾之氣未嘗不通於心也夫舌者心之官嘗五味之秀以榮養一身資脾胃之藏以分布水穀故心之本脉系於舌根脾之絡脉系於舌傍或風寒暑濕之所中傷則舌縮捲而不能言或憂怒思恐之所鬱閉則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡脾閉則白胎如雪舌之為病合心脾而主治之故曰心之氣未嘗不通於脾者此也口者一身吐納之都門百物榮養之要道節宣少舛病必生焉故熱則苦寒則鹹宿食則酸煩燥

則澁虛則淡疽則其臟氣偏勝則其味必偏應於口鹹酸甘苦
非舌味之而誰歟若夫上池津液出於舌端心實主之也津液
沉布非胃而何故曰脾之氣未嘗不通於心者此也或問口臭
一證可得聞乎曰臟腑異氣燥腐不同是氣蘊積胃膈之間挾
熱而衝發於口人將掩鼻而過之信夫醫不難於處方惟難於
識證受病源流情不及究律以古方嘗試一中不幾費人乎此
辯之不可不早

唇舌證治

升麻散 治心脾有熱口舌破裂生瘡

川升麻

玄參

川芎

生地黄洗晒

麥門冬去心各半兩

玄參

大黃

黃連

淨黃芩

甘草焙各三錢

右件剉碎每服三錢姜棗煎食後服

龍石散

治口舌生瘡喉間腫痛

寒水石煨 朱砂六錢

腦半錢

右為細末日三五次搽

口疳散

治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參洗焙

北棗各三兩

茯苓二兩半

人參半兩

馬牙硝枯

青黛各一兩

甘草七錢半焙 麝一字

金銀箔用四十片為衣

右為細末煉蜜圓如皂子大以腦荷泡湯候冷調下如口臭
以生地黄汁調下

生地黄膏

治口舌瘡腫

生地黄

藍青葉各等分

右入蜜杵細每服半兩井水煎食後服

宋厚圓

治口舌瘡

浮萍草晒

黃柏並末

杏仁

青黛等分

輕粉少許

唇舌

唇舌

十三

右煉蜜研圓皂子大以綿裹含有涎吐之

洗心散 治心熱 **四順清涼飲** 治脾熱 **生薑散** 治血熱 **生薑涼膈**

治 治唇焦口瘡咽痛 並見積熱門

舌出血

槐花晒為末傳舌上或 **真蒲黃** 生傳

黃連阿膠丸 治心熱口瘡 方見嗽門可擇用

鵬砂圓 治口臭口乾口舌瘡

寒水石 燒紅 鵬砂 貳兩

腦

麝香 各貳錢

馬牙硝 銼碎 甘草 浸汁熬膏貳兩

右為細末甘草膏搜圓麻子大含嚥

雞蘇圓 治胃中鬱熱口臭煩渴 方見鼻門

舌腫大方

真蒲黃 炒傳

又方

鴨砂末 薑錢 離擦

古腫方

蛇皮 燒存性 全蝎

右為末少許搽傳

舌瘡腫方

大山豆根剉細含嚥或末搽傳

口瘡方

正黃連 厚黃柏

雞心攢擲

右等分為細末傳之即可

又方

黃柏 肆錢

青黛 二錢

銅綠 壹錢

右件為末傳之

又方

黃連

升麻

唇舌

真蒲黃

一七

右貳件為末以薄綿包含喉嚨處會末傳

又口勿處瘡

白爛檳榔 燒存性 和少輕粉研傳

唇舌焦燥口破生瘡者蓋心脾受熱所致也以水浸黃連重湯
炒而飲之或用黃連以粳米飲吞下此為要藥至於大
渴而不可禦合小與黃連煎湯執劑之法無以踰此然此特隨證
應變而巳就根本論之則水火相濟方見消渴門

治瘡方

端效方治唇緊瘡疼

訶子肉

五倍子

右為末乾貼唇上立効

治瘡方

端效方治赤白口瘡

黃柏

青黛

蜜陀僧

右為末乾貼瘡

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索 一兩 黃柏

黃連 各半

蜜陀 一兩

青黛 二兩

右為末傳貼口內有津即吐

升麻散

濟生方

治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛 一兩

甘草 生用 五兩

右以咀每服四錢水一鍾半 伍片煎八分溫服

增損如聖散

治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗 二兩

甘草 炙 一兩 兩半

防風 半兩

枳殼 製 二兩 兩半

黃芩 一兩

右為末每服三錢水煎食後服

一方 治舌腫

用百草霜為末以好醋調敷立効

一方治口唇生瘡赤爛

青黛

枯礬

檳榔末各等

水片少許

右共為細末搽患處

寫黃欬子

濟生方

治風熱蘊於脾經唇燥折裂生瘡

白芷

升麻

枳殼去白

黃芩

防風去芦

半夏湯洗

石斛各兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜伍片煎七分溫服

咽喉

咽喉論

咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以燕物喉以候氣理一而分殊也自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而為咽疼自其熱氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而為喉痹尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上蝕於喉或癢或

疼如鑿之候也穀賊者穀芒強澁藏於米而誤食之滯於咽間不能傳化故風熱併聚與血氣搏遂令腫刺如喉益之生穀賊也胃脘實熱煙炙上焦發為白頭赤根固有咽瘡之證臟腑停寒上則氣縮如物室礙於其間亦有喉閉之證至若懸癰生於上腭雖不閉於咽喉所以暴腫者抑亦熱氣使然也咽喉懸癰關要所係病不急療皆能殺人然則療之將何如曰熱則通之寒則溫之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣

咽喉證治

膽毒散

治酒麪熱盛咽喉腫結閉塞

全蝎二個

鴨比前膽礬

半斤

右為末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用

生青可研

細并水調下候吐出毒涎即愈未吐再服

山豆根丸

治積熱咽喉閉塞腫痛

山豆根

一兩

北大黃

川升麻

朴消生各半兩

右為末煉蜜丸如皂子大每壹粒以薄綿包少痛便含燕液

青解毒丸

治熱毒上攻咽喉腫痛

寒水石 石膏 各四兩 研 青黛 二兩

右為細末拌和青黛水浸蒸餅研糊丸龍眼大每一丸食後

以井花水化下

吹喉散 治咽喉熱腫口舌生瘡

盆硝 四兩 青黛 七分半 真蒲黃 半兩

右以生荷汁半斤和參件入磁鉢慢火熬乾研細每半錢箇

吹入口內

寒水石 煨紅鵬砂

牙硝 朱砂 各研一

腦 半斤

右為細末每壹字摻入口燕津

玉屑無憂散 治咽喉熱閉腫痛舌瘡物癢

貫衆

縮砂仁

荆芥穗

白伏苓

玄參

黃連 屑

山豆根

滑石 研

甘草 生各

寒水石 壹兩

鵬砂 壹錢 研細

右為細末每一錢乾摻舌上新以新水嚥下

牛黃涼膈丸 治咽喉唇舌熱腫生瘡 方見積熱門

如聖湯 治咽喉腫痛

北梗 去苦

甘草 焙

加荆芥穗

右件等分為鹿末每服二錢用井水煎臨卧服

白僵蚕 治喉風

白僵蚕 炒

明白礬 生

右件為末以白海因和圓如皂子大每一圓薄綿包入喉少

頃涎水出而愈

遠志散 治喉閉

遠志 祛心取

右為細末以管子擗開口吹藥入喉策令頭低涎出而愈

白藥 朴消

右為末以小管吹入喉

救賊方

木鱉子仁 川大黃 牙硝 射干

山豆根 川升麻 白藥

右件等分為末煉蜜圓如皂子大以薄綿包含燕液

又方

鵬砂 牙硝

右件等分細研每服半錢以薄綿裹含燕

口瘡赤爛方

清蜜浸黃白一宿取汁含燕

和劑七氣湯 加此種 **和劑七氣湯** 治冷證氣縮喉閉

治冷證無陽咽疼喉閉

辣桂 甘草 半夏 煎

右件等分對碎每服三錢水一大盞煎半候冷少呷

咽喉方

膽礬細研以管子挑少許吹入喉中即破續以白梅煎湯調炒僵蚕末以去其風如無膽礬只透明綠礬代之亦得

又方

明白礬末一大錢七用川山豆肉一粒入礬中以火熬乾取

礬為末極細每一字以小管挑吹入喉涎出自愈

又喉風喉痹方

蛇皮 畧洗過日乾剪作細屑 白梅肉

右件研和為圓合化屢效

解毒雄黃丸 治纏喉風急喉閉 方見積熱門 每服七圓研細以

熱水研白梅肉調下或熱茶清下熱則通之用此

回疾

玉鑰匙 治風熱喉痹

焰消 三分

鵬砂 一分

直僵蚕 炒半分 腦 少許

右為末每半錢以竹管吹入喉

又熱閉方

川升麻 半兩

右剉井水濃煎服少頃吐出毒氣

又方

山豆根

射干

升麻

右井水平煎服

喉風喉閉方

蚕退紙燒存性為末煉蜜圓皂子大含嚥

又方

綠礬研細米醋調嚥一邊痛側卧含嚥

又方

皂角肉半錠剉細以米醋壹大匙煎至七分濾清

通關散

白礬 炒

直僵蚕 炒

南星 生

荊芥 各一分

全蝎 焙式箇

右為末以小管挑壹字吹入鼻中吐痰喉通

又方 治喉閉欲絕

雄黃 式分

明礬 生

荊芥 各壹分

蝎梢 半枚

猪牙皂 柒分

右為細末每服壹字吹入鼻吐痰效

懸壺腫痛方

玄參 半兩

升麻

射干

大黃 各一分

甘草 壹分

右為末每叁錢以井水煎時時含嚥

又方

明礬燒灰存性和魚腦研細筋頭點傳患處

喉癰方 脂麻炒為末以湯點服

喉癰方 白明礬服 牙硝各一 燕脂半

右研細爛烏梅肉圓旋含燕

又方 治痰熱閉喉以羅蔔汁和皂角漿吐之

又喉閉方 牙硝 燕脂 鹽梅屑

右件同研以雞羽送入

又喉痛方 以山豆根常常含燕汁

附諸方

耳枯湯 活人方治少陰候痛

桔梗 甘草各等分

右咬咀每服伍錢水一鍾半

又方 治喉痺并時行痰痛

桔梗 甘草 升麻 連翹

防風 牛勞子炒研 薄荷酒炒

右咬咀作一服水二盞煎八分食後細細飲服

化三黃丸 秘方治咽喉痛大效

山豆根研 鵝砂式 龍腦少許 麝香少許

右為末用青魚膽為丸如棗豆大每服三五丸金花洋燕下

方 治咽喉腫痛

山豆根 射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

三黃丸 大成治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心膈燥煩小便

赤澀入便秘結並宜治之方見火門

又方 大成治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利咽喉

頰燥多渴腸胃秘澀小便不利一切風熱並宜治之方見續

吹喉散治咽喉腫痛急慢喉閉懸壮乳鵝鴨物不下
訶子宿一兩醋浸一 黃芩酒浸一 膽礬一
明礬半 牛旁子 甘草生 薄荷各五

一方有百藥煎 右為末先用好藥擦舌上每用藥一錢吹入喉中吐

出涎痰使用熱茶喫下再吹第二次便用熱酒三次再吹用

執茶或執酒乘熱食之加甜酒末少許如口舌生瘡川藥吹

之口中利去痰涎為妙
針灸法一穴在大指甲後第一節長三小 少商二穴在大指內側去爪甲 合谷二穴在虎口針五分

齒

齒論

齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅誠哉是言也或曰手陽明之支脈入齒手陽明者大腸經也於齒夫何預不思大腸傳送氣道行焉壅則齒浮虛則齒露挾風則上攻頭面疳蠱則變成齲脫不相為而實相關也夫齒之為痛者五一日風寒二日風熱三日胃滯四日血虛五日風氣襲虛客於齒間乘於血氣故令斷腫熱氣加之膿汁遺臭此風熱之為齒痛一也血氣不足骨髓乃虛風冷湊入停於齒根不腫不蛀日漸動搖此風冷之為齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證壅盛咳唾交衝此毒痰之為齒痛三也頭面有風挾熱攻斷熱搏於血故令血出瘀滯不消掣痛鑽刺此惡血之為齒痛四也凡人飲食其肥不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根有孔虫在其間蝕一齒盡又度其餘至如疳蠱皆其種類必虫殺而後痛止此非五曰虫蝕之證乎前是數者痛有自來治各隨證條列于後雖然百物養生莫先口

齒不漱不洗損蠹之媒是不惟患生宿腐而暑毒酒毒常伏於口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至干晨興灌漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終身行之真可為終身受用

荊芥湯治風熱齒痛

荊芥

腦荷

升麻

細辛

右件等分為末每服貳錢以沸湯點漱口含燕併用擦牙

消風散方見頭風門治齒熱痛斷腫有汁先傳**消風散**又以**刺**

有傳其上○又法**刺**煎湯漱燕解毒

溫風散治風冷齒痛

當歸

川芎

細辛

白芷

草撥

藁本

蜂房

炒等分

右判每貳錢并水煎服仍含漱

安聖圓方見水飲門**八寶圓**方固冷門治冷證齒痛

香散治冷證齒痛

香附

紅川椒

故紙

炒名貳分

草撥

右為末和炒**鹽**貳錢擦傳

關笑散治風冷齒痛

白芷

細辛

良薑

草撥

川椒

香附

蜂房

炒

右件等分為末擦牙搗鼻

皂莢散治風齒動搖

長肥皂角

二升

白鹽

半兩

右二件同燒赤研細常擦

陳湯方見鹿類加**細辛****沒殺**用薑棗之烏梅煎治毒痰齒痛仍

以**片子薑黃****草撥**等分并水煎候溫以舌浸其中涎自流出

耳癢散治毒血齒痛方見積熱門加**升麻**煎

刺槐散治牙宣出血或痛

齒

耳癢散

二五二

槐花

荆芥穗

右等為末擦牙仍煎點服

靈脂散 治齒出血

鬱金

白芷

細辛

右件等分為末擦牙仍以**竹葉****竹皮**濃煎入鹽少許含嚥或

炒鹽傳

靈脂散 治惡血齒痛

川五靈脂以米醋煎汁含嚥

鷓鴣散 治虫蝕齒痛

猪牙皂角三條

川椒一分半

生明礬

鷓鴣各一條

右為末蒸飯搜圓如麻子大納於孔中有痰吐之

椒鹽散 治齒虫痛

川椒

白鹽

煨干房炒

右件割碎等分每服二錢以井水葱白煎熱含冷吐

虫蝕牙痛方

川巴豆肉三枚

明乳香一條

右同研溶蠟圓麻子大每服一圓塞孔

又虫漏方

紅川椒末一條

大巴豆肉一粒

右件研細蒸飯圓如麻子大以薄綿包塞孔

又方

明礬二條 滴乳香一條

右為細末飯圓塞孔

又方

蜘蛛殼一箇揉軟以薄綿包塞痰吐之○又方**米醋**煮**川椒**

入**雄黃末**入**麝**研傳痛處

毒

又方

直僵蚕

蜂房各炒二件

樟腦半之

右為末皂角肉

按濃漿煮少頃和作小團塞痛孔

齒痛通用方

葶撥

生地黄

當歸鬚

荆芥穗

白芷

桑白皮炒

蜂房炒

赤芍藥

薑黃

細辛

膏本

赤甘草生等

右為鹿末每服三錢井水煎頻漱齒

歸劑散齒痛通用

當歸

荆芥穗

川升麻

川鬱金

細辛

白芷

葶撥等分

右為末每服半錢指痛處良久鹽湯灌漱

齊寧川椒散齒痛通用

紅川椒四等

樟腦

赤小豆

明礬一枚為末少許塞傳燕不妨齒痛惟藉川椒

又方

蜂房三等

全蝎貳箇為末傳亦治風疼

又通用方

丝瓜乾燒存性為末擦搨

又方

蜂房炒

明礬版

黃革丹等分

右為末飯為小團塞齒

麝香散治疳蠱斷爛口臭

白礬煨

青黛

胡黃連

蘆菴各壹分

蝦蟇炙焦半

右為末每服半錢傳患處

又牙疳方

以知蜂殼為末入麝香傳之或用大知蜂壹枚

以濕紙裹又用荷葉外包煨令焦存性為末入少麝香研傳○又

香附末可為齒藥

牙疳方

齒

廿五

朱砂
雄黃
磁石
石膽
礬石 即銀星石

右件等分入磁合盪泥塗燒兩日夜覆地出火毒兩日細末
雞羽蘸傳瘡惡肉朽骨損牙俱出而愈此周官五毒攻瘍正
方諸惡肉朽骨瘡毒通用

牙疔漏方

蚕紙 燒存性 直僵蚕 炒等分 為末擦傳良久盪湯漱口

又方 鶴虱為細絲良久盪湯洗口

又牙疔出血方

明白礬 煨貳分 乳香 半分 少麝

右件同研細輕手擦良久盪湯灌漱

酒齒漏方 以井水洗口煨換且含且漱或**白礬**泡湯微冷含

燕或羅少 嚼傳齒痛通用

疔毒方

羌活散 治客寒犯腦風寒溫腦痛項筋急牙齒動搖肉斷袒脫
疼痛苦楚

麻黃 去節 限 羌活 一分
細辛 少許 升麻 伍分
蒼朮 五分 白芷
草豈寇 式錢
防風 三分
藁本 三分
柴胡 兩
當歸 身 六分
骨灰 即羊胛骨灰

右為細末先用溫水嗽口淨擦之其痛立止

草豆寇散 治寒多熱少牙疼痛

草豈寇 一錢 式分
細辛 葉 防風 各式
當歸 六分
黃連 一錢
升麻 二錢 半
熟地黃 各伍

右為細末擦之同前

立效散 治牙齒疼不可任痛及頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲

防風 一錢 升麻 七分 炙甘草 二分 細辛 葉 二分

牙齒

卷之十一

十五

草龍膽酒製四分

右咬咀如麻豆大都作一服水一盞煎至五分去滓以匙抄在口中燂痛處待少時立止如多惡熱飲更加草龍膽一錢此法不定隨寒熱多少臨時加減若更惡風作痛加草龍膽五分黃連五分却勿加草龍膽累用得効

秘方治風牙疼痛用苦楝食鹽川椒等分為末用肥皂一箇去子將藥末安於肥皂內用線縛定用炭火燒存性為末擦於患處立効久擦齒白牙堅

方治陰虛牙出鮮血

四物湯亦牛膝香附生甘草側柏

秘方治牙落重出

公鼠骨一付取骨法用鼠一箇剝去皮用酒炒

香附一兩 白芷 川芎 桑葉

地骨皮 川椒 蒲公草 青鹽

川槿皮絡三 旱蓮草

右為細末擦百日復出固齒無不効驗

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十一終

孫氏仁齋直指附遺方論卷之二十一

古為醫未濟百日身出固齒無不效

川對文編三 旱草

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十一

癰疽

癰疽論

癰疽五發發腦發鬢發眉發頤發背是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發見焉又豈特五者而已哉俗以癰疽附於癰疽之列以是為五豈知癰與疽不過癰疽之一物古書所載僅有所謂癰疽則癰亦同出而異名也若癰若疽前未之聞合是以為五發其可乎癰者壅也疽者沮也血氣壅沮寒熱不散陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽而所發無定處也蓋衣服厚煖則表易招寒滋味過多則裏易生熱感受日久熱勝於寒寒化為熱六腑蘊熱騰出於膚肉之間其發暴盛腫而光軟皮薄以澤侵展廣大者為癰其患浮淺不傷筋骨此可治也五臟蘊熱攻焮乎肌骨之內其發停蓄狀如痞

癰皮厚以堅淡白焦枯者為疽其患沉深傷筋蝕骨此不可治也凡發熱憎寒頭痛惡心筋節拘牽氣急悶悶或病渴經年是皆欲發癰疽之證發於喉舌頭面腦項肩背胛腹四肢大節女子妬乳數者為險其他為緩腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不變者發於骨髓近骨者多冷近虛者多熱近骨久不愈則化血成虫近虛久不愈則傳氣成漏成虫則多癢少痛或先癢後痛成漏則多痛少癢或不痛不癢若形狀腫大按而後痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而即復者有膿按之強而不復者無膿瘡淺者欲在厚處瘡深者欲在薄處腫起堅硬膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛有實熱者易療虛寒而邪熱多者難療癰疽已決去其膿而煩疼尚未全退其脉洪龐者又難為力要之癰疽脉來帶澁但得和緩為平若洪龐則銳毒不收鮮有濟也然則治療之法將何如曰血得溫則流行氣得溫則和暢服餌貼傳藥用和平初覺則散腫內

消已潰則排膿斂毒膿盡則去腐內塞惡肉盡則生肌傳痂此定則也瘡家臟腑生熱熱蒸其血血敗則腐肉肉腐則成膿當膿血燉聚之時所賴朝夕洗滌以外舒其毒氣總覺有膿即煖醋蘸熨而破之終見敗肉即煖藥盪射而去之稍或稽延不反掌而侵蝕筋骨是必腐敗盡除庶幾真氣得復好肉得生耳而况癰疽險惡古人以虎口鳩毒喻之一芽初萌灸熨宣散急作主張殆有甚於拯溺救焚之不可緩也柰何人多玩忽在難成形潰裂四出往往不救伊誰咎歟大抵癰疽自內發外最不可服冷藥亦不可傳冷藥但以溫和調治使毒氣自內發出可也若服冷藥則必至傷動臟腑若傳冷藥則逼令毒氣內行內氣有虧毒從外入衝心煩燥嘔吃嗽喘以至泄瀉此為內壞殺人無疑或不隨順療理妄以急澁七劑行之斂口太速毒氣舒泄未盡必於其傍復發大疽活血排膿斂毒去腐生新收口人所共知也孰知諸痛癢瘡皆屬於心心主血脉心通諸竅如

大神效 益智 等輩又當佐助於其間抑使病人不得
憂驚噴怒勞精疲神有觸於心尤關利害五臟六腑所包者一
膜耳人有患疽鑿瘡兩月新肉已平夜寐中幹者攻擊疾呼驚
觸入心新肉開裂鑿者謂其肉膜已破而後肉開神仙莫救果
非心乎於此又能精加飲食使胃氣有所充和劑救裏使內氣
得所養有諸中形諸外理勢必然切戒離疽成形以後不得通
利大便上鑿宣毒蓋用 等類以 佐之若 則不敢輕用也如其有熱即以 如豆湯法亦能疏導若夫瘡口瘀熱而焮疼却暫用 水不乾者其中必有淫虫朽骨當以藥消蝕而盡除之婦人患 此適值月候不行尤當急為調血所謂大寒大熱大渴大吐大 痛狂言無事喜笑鼻青唇慘赤暈不收膿青血黯膿血腥臭血

流不止小便如淋結硬過月方發硬如石榴不破多日不腫不
疼昏睡不知痛癢患熱恣意取涼沉重痿弱氣乏肩項運掉不
便心病臉如脂垢貼藥鮮血常流膿如赤白下痢眼小窺視而
白睛青黑膿血大泄而焮腫且堅聲嘶色脫而肢體腫浮氣短
喘籠赤恍惚嗜腫煩燥時嗽而腹痛渴甚飲食不下而服藥即
嘔與熱吃逆嗽喘大便泄瀉皆惡証也抑猶有內外之別焉疽
初發來一粒如麻豆許身體即熱患處亦熱腫大而高多生疼
痛破後肉色紅紫此為外發縱使極大用藥有條百無一失自
發疽以來不問小大身體無熱但覺倦怠瘡亦不熱數日之間
漸漸開闊不腫不高不焮不痛低陷而壞爛肉色紫黑此為內
發廬扁無如之何蓋其未發以前臟腑已先潰爛矣此又善惡
之衡鑑云雖然癰疽治法已條列於前矣究其病源有風有氣
有食有藥毒有勞損而所受不同焉風則多癢氣則多痛食則
發寒熱藥毒則堅硬勞損則瘦弱此外證之為可驗也風氣食

癰疽

癰疽

三

三種易療藥毒勞損二者難醫大槩風毒當驅風氣毒當調氣
食毒當消積勞損當補虛藥毒則**黑豆**利之**生薑**解之
則可以為佐登山到須酌水問源故推明本始
以為瘍鑿一髮之助

癰疽證治

灸法癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼其中
心頗小艾柱灸之五壯而止若形狀稍大以黃稭紙蘸酒全貼
認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯
而止**又法**屈指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺
輕快即此灸之更於別處尋灸若或大腫即搗蒜為餅焙乾蘸
法醋炙熱更換頻晷或以熨汁火於蒜餅上熨之更換熱餅頻
熨如覺患處走散即以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間傳藥凡癰
疽展大如龜之形且看頭向上下先灸其前兩脚以灸其尾或
紅筋走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若盡灸之

不惟火氣聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以

白芷各半 漢椒 桑白皮各壹 連根葱白十片

右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可以辨認

頭尾

煉淨癰疽發背已發未結已結未潰急以**黃明膠**新水
溶令稀稠得所攤在抄紙上貼之良久以軟布二條於醋中
煮熱互換漉出罨在膠紙上蒸熨常要熱氣相接若患處癢乃
藥氣透須忍癢頻蒸熨直至消散或破而膿出將盡即以**黃明**
煎湯洗去膠紙用**眼腫散****爛毒散****疔水膏**等類慘傳或使用**痰**
毒散隨意急服**膏****散**或**肉消散****乳粉**等散破後以**洗**
毒盪洗發散毒氣

拔毒散癰疽腫結通用能散能潰

南星上等 大白者 草烏頭
白芷各半 木鱉子仁壹箇 研

癰疽

右細末分兩次法醋入蜜調傳紗貼之

獨毒散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

大南星 壹兩 具母 叁分 白芷 雄黃 二錢研 赤小豆

直僵蚕 各半兩

右細末初用醋調傳後用蜜水調傳

癰疽宣毒方 諸癰疽已破未破通用

瓜蒌 一箇去皮州細 紫車螯殼 壹箇黃泥和並塗上傳

皂角刺 甘草 各二錢 乳香 輕粉 各半錢

右細末先用老酒貳碗煎瓜蒌瀉清取壹大碗五更煖瓜蒌

酒調上項藥末空心服大便自下惡物如魚涎狀

宣毒

瓜蒌 壹箇 老翁鬚 一箇半

右剉酒水等分同煎少頃入開口正川椒肆給久盡臨熟又

入乳香及藥末少許恁意服

癰疽宣毒方

黑牽牛 去皮

右取仁入猪腎中線札濕紙包熱火灰內煨香熟候冷溫酒

爵下 溫酒

宣毒方

斑蝥 一枚 好大棗 一枚 青竹葉 重包濕紙 裹入猪腎中線札

右空心喫猪腎溫酒下

宣散癰疽腫毒

老翁鬚草 亦名金銀花忍冬草鷺絲藤水楊藤其藤左

右花與葉生搗煖酒調服無花只用葉酒和葉烘煖可傳瘡

癰疽托毒排膿 治五毒附骨在臟腑裏托出毒氣止

痛內消

蜂房 一兩 蛇退 穿山甲 油髮 並燒帶生存

右為末每服二錢入乳香末半錢煖酒調下

皂刺散 托毒排膿

川芎 半兩 甘草 生 一兩 乳香 一分 皂莢 刺性 四兩

右末每二錢溫酒調下

歸托裏散 托裏排膿生肌

川芎 當歸 白芍藥 炒 木香 茯苓 各半兩 人參 辣桂

丁香 甘草 各一分

右末每二錢食前米湯調下

癰疽毒入臟腑嘔吐惡食方

甘草 半兩 丁香 三錢半

右剉每服二錢水煎入麝少許溫服

癰疽腫毒傳藥 靈散 收腫斂毒排膿

滑蘭 模皮 末 紫貝草 搗

右二味同搗酒調為膏傳或密水調亦好 把毒 貝散

血或單用 紫貝草 亦效

妙勝散 收腫斂毒排膿

落地茄花 去心 黃蜀葵花 去心 并毒

右為末井水稀調雞羽掃放患處乾則再傳或收毒平散或

破潰出膿神效如瘡口開用末搽亦斂毒不急並

消腫散 癰疽通用

滑蘭皮 大南星 赤小豆

白芷 薑黃 各一分 白及 半分

右細末酒調傳或密水醋同調傳

退毒散 癰腫通用

木鱉子 去油 大南星 半夏 生 赤小豆 白芷 草烏 剉 披 尖

右細末硬則法醋調傳熱熈則蜜水調傳

川烏散 癰腫初發急用

川烏 散 癰腫初發急用

川烏

右細末法醋調傳未結則散已結則潰

螟蛉窠土 等分

夜明砂 一兩

辣桂 半兩

乳香 一分

右細末入乾砂糖半兩研和用井水調膏傳

乳豆膏

治癰疽腫節疼痛入門先用此止痛

綠豆 去皮取肉

乳香 竹葉 罌粟 手 罌

右末酒調傳傘紙貼乾則再傳續後却換消腫排膿藥

星馬散

治癰疽已結未作穴潰

大南星

草烏頭

辣桂 等分

右末用酒或醋調傳軟白紙貼未穴再用

欬毒散

傳四圍收毒

南星

赤小豆

白及 等分

右末井水調傳四圍軟帛貼上

退腫散

癰疽腫毒通用

大南星

白半夏

各半兩

赤小豆

五倍子

白芷

貝母 各二錢半

右細末蜜醋調傳

以毒外消膏

黃明牛皮膠

以長流水半斤煎柳枝急墮五六沸

右候冷收入磁合以雞羽攤於瘡上留口如未破傳腫自消

乳香膏

治癰疽腫毒惡瘡排膿止痛收縮筋脚

乳香

沒藥

各一分 輕粉 一錢

麝 半錢

黃蠟 二錢

草麻子仁 一兩

右搗研極細成膏以撫紙折薄攤藥留眼貼之日二換或純

用

入

研細傳貼

保安

治癰疽發背腫毒

透明硫黃 為細末

蕎麥麩 各二兩

右用井花水調和作餅焙乾收下要得**硫黃**性和用時再末之入**乳石**少許并水調厚傅瘡上如乾以雞羽蘸新水潤之如此至瘡愈方歇痛則不痛不痛則痛神驗

蜀葵膏治癰疽腫毒惡瘡

黃蜀葵花

右用鹽摻取入磁器密封經年不壞患處傅之自平自潰

葵子炒碎入宣毒藥中尤驗

皂角膏癰疽腫結通用

不蛀皂角滿尺者搗碎去弦核

右以法醋煮爛研膏傅之自消

四虎散治發疽腫硬厚如牛皮按之方痛

大南星 草烏頭 半夏生 狼毒等分

右細末醋蜜調傅留頭出毒氣

沉水膏癰疽發背排膿欬毒

大南星 三分 白芷 赤小豆

半夏生 貝母各半兩 木鼈浮仁 去油

乳香 沒藥各二錢半 雄黃 一錢

右細末并水入蜜調傅紗貼

伊峯散治癰疽腫毒等患

大南星 半夏各半兩 直僵蚕

五倍子 赤小豆 片薑黃 直僵蚕

貝母 白及各四錢 乳香二錢半

右細末未破者酸醋調傅已潰者清蜜調傅半乾温只摻若

紅腫多汁研汁調傅仍煎 白皮湯淋

麝香膏癰疽已結而頭不破用此

直雀屎研 斑蝥去翅 麝香隨意

右細末法醋調少許點在有頭處立破急用煎黃連湯洗去

房泉膏治癰疽軟而瘡頭不破或已破而瘡頭腫結無膿

斑蝥 去頭足翅焙

右為末揉和蒜膏似小豆許點在膏藥中准瘡口處貼之少頃膿出即去藥或用

頭軟處亦破須四圍塗藥護之

赤足蜈蚣 一條去頭足 全蝎 三枚實全尾者並生用

木香 一錢

右細末每用一字摻於膏藥錢上准瘡口貼如瘡口開闊不硬勿用若是風邪所搏即煎 **根葱白** 五莖次入 **白芷** 末半兩少頃瀝清淋洗明日又洗仍服 **不換金** 散

護肌 收暈斂毒

大南星 二兩 明白礬 並生用七錢半 白欬

白及 雄黃

右細末每半兩 **地黃** 取汁調傳瘡暈外舊肉上自外圍而

促欬之又驗瘡用新水調筆蘸傳瘡藥力勝則腫消皮破易瘡若腫處皮急暈開難瘳

神功妙貼散 塗傳離疽暈內使膿血化為水出收暈斂毒

大南星 剉白 葶麻子仁 各四錢 半夏 生

白芷 消片 薑黃 五倍子 各二錢 花藥石散 二貼

白及 各三錢 沒藥 乳香 各二錢

右細末夾和井水入 **調傳瘡色黯晦** 汁調傳從暈邊抹收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大全用紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片如瘡勢先貼藥上然後貼瘡久年瘳仰上竹葉亦得竹葉出水藉藥以行之凡傳藥須是細末則不痛

力 離疽惡方萌總覺便服

穿山甲 挿入製芒熟灰中煨焦黃

右為末入 **隨** 隨意每服式錢半温酒調下或 **煎** 煎酒調下

尤妙日兩服

大金丹消散內消離疽惡毒總覺便服

穿山甲片以谷芒煨炒

當歸半兩

甘草二錢半

右末每服參錢溫酒調下

小車散內消離疽取下惡毒首初便服

紫背大車蠟生取殼壹合鹽泥塞滿相合麻線纏鹽泥塗乾炭火煨通紅去泥冷地出火毒一伏時

右細末每服參錢入生薑末壹錢鹽壹字用瓜裏一枚

除心參拾莖分兩次煎酒乘熱調下五更溫服天明又服日

中大便下黑苔惡物或不用甘草入蜜貳匙

皂刺散治離疽等患宣毒排膿首初便服

紫黑色皂角刺

連皮瓜蒌時比五靈脂減半

右剉細每服肆錢酒或大盞煎陸分入乳香少許溫服皂刺

亦能宣毒

萬金一醉膏治離疽發背宣道惡毒始初便服神妙

瓜蒌一箇去甘草半兩沒藥水中研

右用紅酒冬大椀煎取其半分兩服溫服之在上食後服患

在下食前服重者再劑以瘡為度又方加當歸白芷并些鹽

更要宣毒加鹽壹分

初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吃嘔嗽喘

以至泄瀉急用此類服北裏返出毒氣自內發起于外此藥又

能消已發未發皆可服神妙

真菘豆粉心二兩

明乳香半兩以竹葉包煨

右末每服二錢熟新水調下或白芷煎湯調食後少時細

呷常要藥味在胃隔間則毒氣不能攻心或瘡已沉晦用當

歸壹錢鹽二錢煎湯調下仍以加味不散正氣散為佐

小兒豆瘡陷入鹽能救之瘰癧攻心嘔悶通治

瘰癧治離疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛護內膜驅解諸毒自然

內消神妙

通明白礬生用

右細末黃連一兩二錢溶汁就爐上入礬拌和衆手圓桐子

大每服十五圓熱水下或冷酒下常七服之漏瘡用油髮

和雞內金末外塞

明膠酒治癰疽等患使毒氣不攻於內不轉惡證
通明牛皮膠 每用一兩截片

右醇酒壹大碗入膠重湯姚令溶散通口服

排膿內消散治癰疽發背活血排膿消毒紅內消即紅

何首烏 一兩 當歸 川芎 生地黃

川續斷各洗 伏苓 芍藥 白芷

半夏麩 霍香葉各半 紫草茸 甘草各三錢半

右麩末每服參錢新水貳分酒壹分薑煎服有熱者加

只用煎

充原排膿內補散活血排膿扶養內氣或大潰開爛用此救裏

內塞 方且腸癰門以加味不換金正氣散佐之有熱證者勿用

以排膿內消散加燈心服

五香散治癰疽須用香氣透達經絡

木香 丁香 霍香葉各一 沉香

乳香 連翹 木通 續斷

桑寄生 甘草微炒

右細剉每服三錢井水一椀煎七分入麩少許患在上食後

服患在下食前服五發證皆令人頭痛惡心寒熱氣急拘攣

此藥療之如有熱加味桑白皮

加味不換金正氣散治癰疽寒熱往來或內挾風邪或內氣虛

緩通用最能發出風毒可與排膿內補散並行

蒼朮煨炒 橘紅 半夏麩 霍香葉

厚朴製 甘草各一兩 白伏苓 川芎各半兩

木香 二錢半

右為末每服三錢薑伍片棗二枚煎服若瘡陷不發多加**辣**

桂當歸 風氣食三證通用調暢胃氣須兼服之

木香 霍香葉 白豆蔻仁 半夏麩

厚朴製 橘皮 伏苓 蒼木炒

甘草炙 各半兩 益智仁 縮砂仁各一 丁香二錢半

右麓末每二錢半薑棗煎服

黃耆托裏散 托裏內虛止痛

黃耆 白伏苓略一 甘草生 二錢半 乳香別研 一錢半

右末每服二錢酒小盞慢火煎如膏再添酒調服內虛加**當歸**

當歸酒 治難疽陰證頭平向內沉黯不疼渾身患處不熱

辣桂法瀝皮 當歸四錢 木香 白芷各二錢

右細剉每服三錢半醇酒一碗慢火煎七分入**乳香**末半錢

不飢飽溫服以**排膿內補散** 加味不發金匱氣散為佐以

補猪蹄 腎肉為養**香麥** 能發起可煮食之如更不發起用

局方薑附湯 加**當歸** **木香** **炙甘草** 煎服又更不發起用

穿山甲頭截片 蘇醋炒焦 生人牙煨留性各一分

右為末分作兩服用**辣桂** **當歸** **去節麻黃** 煎酒食前調下患

處用**生薑汁** 和**麩** 厚塗或用**川烏** **硫黃** **人牙** 煨並細末酒調

傳之

神效香附湯 治癰腫結硬聚毒作痛

香附將去皮用生薑汁浸一宿曬乾

右末每一錢半米飲調下或**麥蘗** **甘草** 煎湯調下進數服腫

硬自消有膿即出於氣證尤便急用只**小烏沉湯**

消毒散 肉消癰疽惡毒 當歸 白芷 甘草生

赤小豆 紫葺茸略半 貝母一兩

右末每二錢半水酒煎日二服

聖麥散 排膿止痛通利小便從小便出毒氣

嬰麥穗 赤小豆 當歸 川芎

白芷 黃耆 赤茯苓 各半 辣桂

甘草 各二錢半

右末每二錢半酒調下

萬病解毒圓 治癰疽發背魚臍毒瘡瘰癧毒草毒挑生毒蛇獸毒

蠱毒母瘵虫諸惡病

文蛤 即五倍子 山茨菰 即金燈花根 全蝎 五枚 大山豆根

紅牙大戟 洗焙 續隨子 取仁去油留性 麝香 一錢 朱砂雄黃 各二錢

右件先以前伍味入木臼搗羅為細末次研後肆味夾和糯

米糊圓分作三十五圓端午七夕重陽腸日淨室修合每服

一圓生薑蜜水磨下井水浸研傳患處解毒收瘡救病神妙

未砂 雄黃 功能醫五毒攻瘡中物也

紅內消散 癰疽內蘊熱外發熱用此

紅何首烏 解遠志 水浸取肉薑黃汁焙 赤茯苓

川芎 北梗 苦參 赤小豆 各半兩

赤芍藥 蔓荆子 威靈仙 各三 生甘草 半兩

右末每服二錢 麥門冬 十四粒煎湯調下

清心散 治癰疽有熱證 赤芍藥 生地黃

遠志 制 赤茯苓 麥門冬 去心 知母 甘草 各等分

右剉每三錢薑棗煎服小便秘加燈心木通

癰疽大便秘 瓜蒌 連皮

紫草

右剉新水煎服或用黑豆一盞入生薑紫蘇煎湯亦得

誑疽煩湯方

參苓白朮散

右以瓜蒌根京豆烏梅煎湯調下

加味八味丸降心火生腎水治諸渴疾癰疽未發前已瘥後渴證通用

好熟地黄洗焙

山藥剉微炒山茱萸蒸取肉焙

辣桂去蘆皮澤瀉剉作塊酒浸蒸五火對焙牡丹皮焙

白茯苓各八錢真北五味子慢火焙透別研

右為末煉蜜候冷和圓桐子大每服三十圓空心薑湯下

癰疽復痛方

辣桂一分 木香 芍藥

廿五靈脂各半分

右剉散每服三錢薑棗煎服

癰疽泄瀉方

粉乳托裏散

右用木香白茯苓煎湯調下加味不全正氣散佐之嘔惡

用

癰疽虛證集驗方

明乳香研細

右每服一錢執水調下戰發於肝乳香着肝而溫之寒戰隨止

山藥剉治癰疽因腎虛勞損所發每服七十圓五更初腎

氣開時端坐勿言勿動勿咳勿垂侍側有人進藥薑湯下日間

以排膿內補加當歸白茯苓佐之最療勞損證

內托黃耆丸癰疽因針砭錐割傷其經絡白膿赤汁逗留不止

用此

黃耆二兩 當歸七錢半肉桂 木香

沉香 乳香各二錢半

右末菘豆粉一两生薑汁煮糊圓桐子大每服七十圓溫熟

水下

特異膏靈散治癰疽發背腫毒等患神妙

軟石膏燒通紅大白南星 赤小豆

草烏

連皮尖 各半兩 乳香 別研 二錢

右細末蜜水調膏從外抹收入留最高處如錢勿傳如已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿不致潰爛屢效

洗瘡方

莽草

苦參

貝母

射干

木通

蜂房

大腹皮

桑白皮

漢椒

連根葱白 多用

白芷

右煎湯密室中淋洗

又方

白芷 一兩

新桑白皮 三兩 貝母 半兩

漢椒 三錢

紫蘇 三莖

右剉碎分兩次入連根葱煎以葱蘸湯洗潰爛者

洗或水膠煎湯洗亦好

北艾湯

癰疽瘡口冷滯膿血少肉色白久不合逐日用

北艾 壹把

右煎湯密室中洗仍以白膠燒煙熏之續貼膏藥仍多服

六神散

又方瘡口已成大窟以

桑白皮 壹分

當歸 半分

右為末乾摻外用

治瘡口有熱攻焮作痛亦爛淫汁

桑白皮 新者 兩 苦參 三

槐花

天花粉 各半兩

右杵細末乾摻仍煎

又方

白芷

桑白皮

右煎湯洗以桑白皮末摻效

又瘡口大窟專以

大桑葉 日乾

右末之類摻効經霜黃桑葉尤好摻傳煎湯皆可用

消蝕惡肉 淫虫朽骨先用洗瘡方然後傳此

明白礬入銀窩內九蓋 綠礬煨熟 雄黃

乳香 好胭脂 遠志水浸取肉 各二錢

右細末蜜水研膏傳惡肉上麻油調亦得

又消蝕之 膈月收瘡宿糞燒存性

積宿糞隔月取燒存性 雄黃 研 雞心檳榔各式錢

右細末濕者摻乾者麻油輕粉調抹蝕惡肉圓如好

內粉層夾天粉粉 乾摻消毒生肌

軟滑石 花藥石 雞內金各半 白及三錢半

白斂二錢半 雄丹煨 滴乳香各一錢

右滑石花藥石共燒通紅椀覆泥地一伏時為細末次入餘藥末研和乾摻神效

保嬰散方 白及各一兩 雞內金二兩 厚黃藥半兩

右細末井水調補須膿盡乃可用貴者亦能斂

雙鹿生肌方 降真香一兩 桑白皮新者 半夏各半兩

乳香 當歸 五倍子各二錢

右細末乾摻

又方 大南星 半夏生 五倍子 雞內金各半兩

南木香 當歸 厚黃藥 降真香節

白斂 白及各二錢半

右細末先盪洗後搽藥傷撲通用

生肌散

老狗頭生腦骨碎新瓦二兩 桑白皮新者二兩 當歸 二錢半

右細末麻油調傅瘡深則搽傘紙護之

六乙膏 治癰疽發背惡毒

好號丹二兩 男生髮洗焙 木鱉仁碎參 肥白巴豆肉十八

右用麻油四兩慢火先前巴豆木鱉髮團更換柳枝撻准髮

耗五分頓冷爐縮憑再煖入淨號丹換柳枝頻撻候色變滴

入水成珠隨意入乳香末再煎沸傾入磁器候凝覆泥叁日

貼用凡修合膏藥密室中勿令徇犬婦人見之

神應膏 治癰疽發背惡毒

龍泉好光粉 二兩 真麻油 三兩

右慢火同熬更換柳枝頻撻滴入水成珠方入白膠末少許

徐上傾入磁器以水浸兩日抄紙攤貼

神異膏 治癰疽發背惡毒瘡癤

黑參 白芷實 露蜂房 杏仁不去皮

木鱉仁 男生髮洗焙 各二錢 蛇退鹽水洗焙

肥白巴豆 壹 十五粒

右剉細林油伍兩同藥入磁鉢浸一宿慢火煎更換柳枝撻

候藥色焦黑頓冷爐生縮憑再入鉢煖入乳香末二錢拌和傾入磁器候凝

急撻候黑滴入水成珠入乳香末二錢拌和傾入磁器候凝

覆泥地三日貼用

遇仙膏 治癰疽發背毒瘡等

川五靈脂 白芷 貝母各半兩 當歸 二錢半

右剉細柳枝截二拾肆寸木鱉六兩同上藥入磁鉢壹宿慢

火煎柳枝撻藥色稍焦入肥白巴豆二拾壹粒木鱉碎伍

箇撻煎冷黑頓冷爐生縮憑再煖入乳香半兩溶盡再頓冷爐

入淨乳香二兩半更換柳枝急撻候色黑滴入水如珠入乳香

香末各二錢拌和傾入磁器候凝覆泥地三日貼服皆好柳枝止痛

神仙

治癰疽發背毒瘡發作便服使毒氣不內攻可保

真麻油器內煎十餘沸傾出候冷

右和醇酒二椀分伍次湯溫日夜服盡解陰證沉毒

醫理

避風邪 少睡卧 勿驚愛 勿嗔怒 徐行動 省言語

戒閨房 絕思慮 防觸穢 聽好事 瘡頻洗 藥常助

盥漱聞香 二便順序 擇飲食內充無飢飽失度

傳藥運掉屈伸瘡口常加愛護 妄用惡草愈滋其毒不忌

飲食反害其瘡皆非正法

癰疽發背龜形

灸法

凡發背如龜形辨認龜頭不論左右上下

但以腫高處為頭或有疑似即以黃稭紙蘸醋掩之先乾處為

頭把筆點定男女皆取左手中指用草比量全指為度一樣剪

草拾貳片陸片安頓在外合作龜背形陸片安頓於龜背之內

中心直頓貳片四方分頓肆片內外各相連合如是則頭尾四

足定矣以筆點其尾足抹蒜膏灸之先灸其尾赤壯火未滅便

灸後壹脚赤壯火未滅又灸後壹脚赤壯迤邐如是灸至前兩

脚而止須留龜頭莫灸以出毒氣法艾得實如筋中間大剪作

艾柱此法合陰陽氣候可用灸之省力療理

論熱背發大瘡惟發熱則謂之背若不發熱皆癰也其有陰證

於五臟內發者却又沉晦無熱大凡癰疽惟藉有熱則發熱則

氣血行冷則氣血滯熱則能生肌冷則瘡不合遇有熱者切不可

退熱但用溫藥以微涼少濟之是為和劑

論暈癰疽發背俗以腫痕所至為暈非真暈也暈生於瘡口之

傍如紅筋之狀纔見暈則非美證矣壹暈貳暈以至叁暈尚可

措手若肆暈伍暈是臟腑蘊受統毒斷斷難醫

保嬰

癰疽漏瘡通用神妙

粉草 以山泉溪澗長流水澆小梳徐曬
水慢火炙水盡為度秤壹兩

右劉龍末用醇酒參梳煎貳梳空心隨意溫服最活血消毒

灌疔方

赤小豆 綠豆 黑豆 川薑黃

右為細末末發起薑汁和井水調傳已發起薑水調傳

諸癰疽大便秘方

甘草 洗

右剉碎井水濃煎入酒調服能疎導惡物

蝕漏瘡

生油髮 脫留性

白及壹錢細末摻傳

去水膏

治癰疽破穴後誤入皂角水及諸毒水以致疼痛

甘草 生為末 砂糖

糯米粉 各叁分

右為膏攤在絹上貼毒水自出驢馬汗及尿糞一切青水皆治之

木香除疥瘡口方

木香

雞心檀栴 號丹砂 一錢 輕粉 半錢

右細末摻

秦元細末摻之

疔瘡

白芷

苦參

川椒

右煎先執嫩加煎芥

疔瘡

深山黃牛糞 一四口后

蜂房

白芷

大腹皮 洗 甘草 洗

右以黃牛糞晒為細末撒糝常服酒調排膿內消散飲醇酒

食肥肉自然生肌深山黃牛糞百草平由牛只與禾稈

諸癰瘡方 或在上或在下頑結留滯不潰不散用膠漆門

散宜毒從小便出非用一醉膏之類宜毒從大便出也先以
調下佐之在上者如
此瘡最險毒氣灌注頭面腫大可畏牙齒亦脫治法○
解開頭髮尋頂螺中灸式拾乙壯如不透連灸至肆拾玖壯而
止其瘡開口大孔用
散本方加煨過
煎服
百骨性寒始亦疑之然火煨通紅盆覆地上以出火毒最能收
軍使瘡口把就不至爛肌

真人活命飲治癰疽惡瘡惡瘻瘡血塊氣塊面目手足浮腫隨病加
減並宜治之
天花粉錢
赤芍藥
沒藥
金銀花 三錢
在背俞
在四肢
右作一貼用金華好
瓦瓶以紙密封口勿令泄氣能飲酒服藥後再飲數鍾浩大
不可憶度

大惡癰疽終可醫
消毒只如湯發雪
陰功豈止萬人活
神效何須刻日期

皂角刺 各伍分
當歸尾 酒洗
陳皮 各半
木鱉子 去殼
黃芪 錢
防風 去分
川山甲 三錢
乳香 錢
具母 錢
白芷
甘草節
其草節
乳香
具母
白芷
甘草節

真人活法世間稀
大惡癰疽終可醫
消毒只如湯發雪
陰功豈止萬人活
神效何須刻日期

雜宜

留下仙方誠信授

存仁修製上天知

此方治一切癰疽疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不

痛先用此劑大勢以退然後隨餘症調治其功甚捷誠仙方也

防風通聖散治癰疽通用方見中風門

狗寶丸

濟生方

專治癰疽發背附骨疔諸般惡腫得發時先吞

口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功效不可具

述

金條蜈蚣條全者

輕粉

雄黃

滴乳香

沒藥

烏金石即石炭

狗寶狗腹中得之

狗膽一箇乾者用之去

鯉魚膽一箇乾者用

粉霜

網砂半兩

孩兒乳一合頭鉛白霜一錢

右先將**狗寶**放在確內文武火化開次將各藥末和成

劑用時大人丸五大小兒丸如**茶**大每服三丸病重者

加至伍丸用**白丁香**七箇研爛新汲水調送下腰以下食前

服腰已上食後服如人行五里熱**白粉**投之即以衣被蓋

定汗出為度已後只喫**白粥**當服**十宣散**留頭其四邊以**烏**

龍膏貼

龍膏湯精以治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發癰疽

初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢麻疼痛四肢

沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱大便秘瀉小便赤黃並

宜服之惟妊娠忌服

漏蘆

白欬

黃芩去黑

麻黃去節

枳實去穢

升麻

芍藥

甘草炙

大黃錢

朴硝一錢水煎服

漏蘆

連翹

黃芩

白欬

枳殼去穢

升麻

粉草炙

麻黃各一錢

千金漏蘆湯精要治證同煎

大黃溫紙煨

朴硝別研

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服

淵然通專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥右研化者血蝎一錢 乳香 沒藥

銅綠 硃砂為衣各 輕粉半斤 膽礬

寒水石銹一 椎黃三錢 射香半錢 腦子半錢無

蝸牛連殼用 蜈蚣一條酒浸炙 黃去頭足

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如蠶大若丸不就以好酒煮麵糊為丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之久再用熱

蠶杯以助藥力發熱大汗出為度如汗不出重者再服二

丸汗出即效初竟者二丸即消三五日病重者再進二丸如

疔瘡走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗

爛裹藥仍以熱酒吞下瘡在上食後服瘡在下食酒後

忌冷水黃心脂子酒毒雜藥一切發風瘡毒等物及

婦人洗換狐臭犯之難治

精義方治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴

者

淡竹葉二分 生地黄兩 黃耆 黃芩去腐

當歸 川芎 甘草 芍藥

人參 麥門冬去心 半夏洗 石膏各肆

右用水一盞半煎藥五片煎藥五片煎至一盞溫服

內補散專治癰疽發背潰膿出多內虛少力不進飲食有虛證

惡重者亦治之

癰疽

精義方

十一

人参 白茯苓 川歸 黃耆
桂心 甘草 遠志各半 芍藥
麥門冬 白芍藥 陳皮 熟地黃
五味子各一

右吹咀水一鍾姜三片藥一枚煎至中鍾溫服

敗毒流氣飲

人参 桔梗 枳殼 甘草

防風 柴胡 全胡 川芎

羌活 白芷 芍藥 紫蘇各等分

右吹咀水一鍾半姜棗煎服

護心托裏飲

人参 黃芪 當歸 川芎

甘草 白芍藥 乳香 木香

烏藥 官桂 防風 枳殼

桔梗 厚朴各等分

右吹咀水煎服

治癰疽疔毒

乳香 沒藥各半 大黃 黃柏

黃連 南星 半夏 防風

皂角刺 水蠟子 瓜蒌 甘草節

草烏 阿膠

右為末醋調成膏砂石氣內火熬黑色鵝翎作之

治諸般癰疽疔毒

乳香 沒藥 大黃 連翹

黃芪 黃柏 黃連 南星

半夏 防風 羌活 瓜蒌

阿膠 皂角刺各等分

右為研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

藥錄并攔

貝母

南星

連翹

五倍子

經霜

芙蓉

右為細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

必傳

霜後芙蓉葉

二兩 海金砂 伍錢

草烏

金線重樓

天南星 伍錢

右為末用好米調藥成膏圍敷患處若是發背加不

正錢為末和前藥立効

治背疽併諸惡瘡如三日以內未針灸及利大便者則可消矣

葱活

藁本

生黃芩

人參

炙甘草

木猪苓 防風身洗

防風稍

川歸身

連翹

酒黃芩 川歸身

生甘草

陳皮

蘇木

五味子

酒黃柏

酒防已 枯梗

山梔

酒生草

酒黃連 酒大黃 參 麥門冬 二錢

右細切分作二服每服用水三大盞浸半日前一盞稍熟服後一服如前併滓煎服忌冷水此方如竟有病即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿者則不消矣

治瘡腫托裏未成者速散已成者速潰

人參

當歸

黃耆

厚朴

川芎

桔梗

防風

桂心

白芷

甘草

右細切作一服用水一盞煎至一盞去滓食遠服

治一切腫毒未潰貼之則消已潰貼則去

腐生肌並治楊梅離漏惡瘡風氣骨節疼痛痞氣積塊坐閃

腰痛一切諸証貼之神効

卷之二 通志卷之二

羌活壹兩 巴豆二兩 木鼈子二兩 川烏 皂角刺

川山甲 白芷 蟬退 杜當

赤芍藥 金線重樓 五倍子 獨脚連

雷藤 連翹 血余 白芨 降香

白欬 紫荊皮 藁本 黃連

石手用 廣藤 川芎 僵蚕壹

草麻子仁 防風二兩 蜈蚣七條 草烏二兩

當歸 蠶 蛇退 葉下紅 三白草

八角風 苦參 孩思母 何首烏

大風藤 小風藤 海風藤 尋風藤

七葉黃荆 松節 金銀花 車前草

槐角 丹參 斑毛 青木香

玄參 牛膝 地榆 威靈仙

生地黃 薄荷 蒼木 五靈脂

天花粉 南星性者一 細辛 蝦蟇一隻

桔梗 山梔 荆芥 黑丑 花蛇

大風子 烏藥 小茴 烏梢蛇 節骨草

兩頭尖 黃栢 烏稍蛇 槐嫩枝

挑嫩枝 柳嫩枝 榆嫩枝 椿嫩枝各五兩

右件七十九味 吹咀片末用真 干舂和藥浸七 再下鍋

熬代藥淨成炭 無形方可 瀝去藥滓再熬滴水成珠 再

將 徐徐入內收為膏丹 入後項藥

乳香 血蝟 阿魏 龍骨

膽礬 雄黃 輕粉 沒藥

孩兒茶 各五 章腦 四兩 赤石脂 七兩 沉香

木香 各五 麝香 一分 冰片 一分

右十五味 研為極細末 入膏內 攪勻 用磁鉢收貯 出火毒

攤貼神効

卷之三

十五

秘傳定痛生肌散

龍骨煨

白芷各叁

黃丹水飛

軟石膏煨去火

沒藥

乳香各叁

血結二斤

黃連四斤

輕粉

硃砂各五

右為極細末糝於瘡口上止痛生肌神效再用白膏藥貼之

秘傳白膏藥

官白粉半

赤石脂煨一章腦

輕粉五分

右為細末用生油香油去膜搗爛和前藥調勻先將生肌散糝

上後貼之

洗毒散 通玄論治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡並宜此洗之

用蛇床子地骨皮丁麻黃荆芥防風桔梗各三錢

右用水三椀葱白三根煎至一椀無風去洗

乳癰

乳癰方論

男子以腎為重婦人以乳為重上下不同而性命之根一也坐
草以後風邪襲虛榮衛為之疑滯與夫嬰幼未能吮乳或乳為
兒輩所吹飲而不泄或斷乳之時檢出不盡皆令乳汁停蓄其
間與血氣搏始而腫痛繼而結硬至於手不能近則乳癰之患
成矣乳癰一名垢乳婦人四十以下血氣周流患此可療年事
既高血氣耗澁患此難療惡寒發熱煩燥大渴是其證也甚則
嘔吐無已咽膈窒礙何耶蓋胃屬足陽明之經實通乎乳血熱
入胃嘔吐何疑或者不能溫散妄以寒涼踈轉之劑行之即使
癰毒自外入裏嘔吐尤甚其咽膈妨礙者毒氣上衝所致也
宣和結湯 最為咽間要藥 **宣和散** 最能返出毒氣 **香散**
加**瓜蔓根** 止嘔止渴兩得其便焉更仗**第金****醉膏** 佐之能事
畢矣雖然渴而過飲水入腸胃必至下利醫理失節久而不瘥
必成漏瘡又不可不防其變

乳癰發治

充原五物湯 癰疽發背乳癰通用

瓜蒌研一枚 皂莢刺帶生燒 沒藥各半兩 乳香甘草各半兩

右龜末醇酒三升煎取二升時時飲之痛不可忍立止

萬全一醉膏 內加川芎一分當歸半分

乳癰方

皂莢刺半兩 帶生 真蚌粉一分 研細每一錢酒調下

生薑甘草湯 治癰疽諸發毒氣上衝咽喉胃膈窒塞不利

北梗去芦頭 甘草生 生薑各半兩

右剉細每服三錢井水煎服

乳初腫方

甘草生二分

麝末分兩次新水煎服即令人吮乳

傳乳方

大南星 半夏生 皂莢刺帶生

白芷 草烏 直僵蚕微一分

右細末多用葱白研取汁入蜜調傳若破瘡口用膏藥貼

乳癰初發

具母為末

右每服二錢温酒調下即以兩手覆按於棹上垂乳良久自通

灸方

右膏燒紅掩覆地出毒細末參錢温酒調下

附諸方

補遺湯 治乳癰初發即散已潰即効痛不可忍者

陳皮湯浸去白兩乾

右為細末麝香研少許每服二錢酒調服初發覺赤腫疼痛

一服效因小兒吹妳變成此疾者並治

復元通氣散

治發乳癰疽及一切腫毒

乳癰

治發乳癰疽及一切腫毒

木香

茴香

青皮

川山甲炙酥

陳皮

白芷

甘草各等

貝母去殼

加漏蘆

右咬咀每服伍錢水一盞半煎八分去滓入酒食遠服未酒服二錢亦可

方治婦人乳赤腫成癰者

詩曰

欲治乳癰良捷法

紫蘇一味勝他方

濃煎湯飲頻頻服

蘇葉圍來盒乳房

方治乳癰神效

用桑黃不拘多少用好酒磨熱服即安

方治婦人吹妳

用棗七枚去核入鼠矢七粒火煨存性研末入麝香少許溫酒調服

又方治婦人吹妳

詩曰

婦人吹妳治如何

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盞調八字

双手揉散笑呵呵

一方加乳香少許

一方治婦人乳頭裂

用秋後冷露茄兒裂開者曬乾燒存性為末水調敷患處甚

驗



癰

癰疽諸發此法通用

發癰方論

癰者上高下深岩穴之狀顆顆垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各露一舌毒根深藏穿孔透裏男則多發於腹女則多發於乳或項或肩或臂外證令人昏迷治法急用草等藥外

傳以多出其毒水如癰疽方中乳香膏神功妙貼散是也內則於小便利之蓋諸痛癢瘡皆屬於心心與小腸為表裏所當宜毒於小便但諸發蘊毒又非交閉冬俗公享之所能宜必如是齋方中五厘散以地膽為主以白牽牛洗石末通佐之而後可以宜其毒矣自此又於心腎用工人之一身水不能濟火則渴而後發瘡心腎相交水火既濟於久何病之有心主血也清心行血固所當然亦使腎得其養則水有所司真元疑合彼瘡自平更服童尿又可以灌滌餘毒切戒忌風邪入之將理一節米脯諸蹄可以益腎可以養中當加之意

癩

發癩方論

面發於手足或掌心或腰腿或臂下伸縮處長形平腫無頭無而低貼肌肉皴裏開瘡如癩而大走注牽連較之諸發癩渴為

甚其患淺則可療其患深則害人或重毒已平數月之後復於他處大發但作肉色微帶淡紅終不能救治法以癰疽類例推之大要培養內氣以防滑泄兼用膏藥吮瘡神異膏搗仙膏可貼可服

癩

發癩方論

癩疽之發有數種先作點而後露肉小者如粟如豆劇者如梅如李赤黑青白色變不常或臂或臂或口齒或肚臍發無定處大槩多見於手指之間根深入肌走臂遊腫毒血流注貫串筋脈爛肉見骨出血極多令人串痛狂言痛入於心即死突出於外腎者亦死此瘡最慮引風治法宜毒行血尤當於心腎加意焉蓋心為萬病之門敗血鬱滯煩燥暖悶皆毒氣攻心之候也心家為毒所攻若於小便利之又恐外腎虛怯易至傷風勢得

宣毒於大便如**瓜麩酒**之入**次藥****五靈脂****皂莢刺**帶生灰是也
是雖大便引導毒氣然清心行血去風邪之劑如之何而廢之
心清血行風邪解散庶乎有瘳矣經云在指則截在肉則割蓋
慮毒氣隨風走肌隨脉入腹倏忽害人至速而不可留也此疾
根源初因感受惡風入於脉理或傷寒瘧瘧之後毒變所生凡
癰疽諸發開壹寸則壹寸引風非必風入於其中蓋虛處自引
風也惟風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流**大南星****生半夏****白芷**
稍最能去風可以頗傳其諸療理推廣癰疽法度行之

發癰證治

癰疽瘰癧瘰癧瘰癧方

生髮燒留性皂莢刺燒帶生白及壹分

右細末乾搽或井水調博**皂莢刺**能行諸藥

瘰癧方

生髮燒留性皂莢刺燒留性生赤蜈蚣厚黃栢各壹分

右細末雄豬膽汁調博

又方

雞內金 生髮各燒留性大南星 半夏生細末搽

又方

皂莢刺燒帶白及少許細末搽諸瘡通用

又方

燕巢和百雀兒糞研膏傳 生髮燒留性末之米湯調服兼傳漏瘡亦効

又方

諸瘡諸瘡瘰癧圓冷酒入麝香送下

洗湯瘰癧瘰癧方

荆芥穗 白芷 漢椒去目葱白連根

右用井水煎入鹽候温自手臂上湯下日叁次瘰疽毒氣走
臂腫所至處緊繫之

又洗方

山竈屋垂塵 竈煙 釜下土各半升

右研和分兩次井水煮沸溫洗日如是

炮方

生井蛙取皮日乾燒帶生

右細末搽或蜜水調傳又通用方在前

是齋

方見瘰癧門

瘰癧灸法瘰癧自手發者毒走至心不救自足發者毒走三腎不救各有小紅筋湯洗再尋其筋之住處灸小艾柱參壯即瘥此即蛇瘡

瘰癧方論瘰癧一名蛇瘡南地多有毒蛇吐毒於壘煙瘡兩之鄉人有伏水土風氣而感觸之者數月以還未有不發為蛇瘡也惟**赤**、**白**、**伏**蛇最為上藥**雄黃**、**白**、**白**次之諸蛇藥亦可以制其毒矣 雄黃有毒爛肌但夾和蛇藥用

瘰癧

丁瘡方論

丁瘡令身毒氣突出兩寸痛癢異常一二日間害人甚速是九在癰疽之上也內經以白丁發於右臍赤丁發於舌根黃丁發於口唇黑丁發於耳前青丁發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處在手足頭面骨節間者最急其餘尚緩幾焉丁曰五丁類分數種如白如豆如葩如箔金如菜葉如石榴子或發疹搔破而青黃汁出或衣物觸着而疼痛忽生或白而腫突或赤而浮虛其狀不一大抵瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光傳為溫爛深孔透肌如大針穿之狀外證心驚頭痛物急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間赤黑點點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡眠其斃可立待也此疾雖自風毒而來其諸觸犯不可不信如石丁之忌瓦礫磚石麻子丁之忌麻衣麻仁火丁之忌火光灸燻水丁之忌飲水渡河惡眼鹹食爛帛刀

鍊色色見忌又不特雌雄二丁戒謹房事而止一有觸犯難以
有瘰其或背脊拘強瘡痛徹骨此觸犯之候也治法以調平心
氣為上蓋丁瘡者毒結於心如**伏苓****伏神****遠志****益智****蓮肉****白**
寧神之類佐以**山豆****黃芩**皆舒豁心經之劑也心氣一清毒自
消散外所傳者用銷蝕惡肉輩如**瘡毒****綠髮****鐵霜****斑蝥**等類以
餅藥調和頭筆傳之爛其肉而後剪隨傳隨爛次第剪平却以
生髮**蛇皮****土蜂窠****皂莢刺**各燒留性**白皮**減半並為細末以平
瘡口或銷蝕惡肉輩傳之作疼則以**排膿肉****補散**多用酒調以
醉之矣又有一種瘡頭黑深形如魚脰破之黃水滲出四畔浮
漿是曰魚脰丁瘡其毒尤甚通前治法即癰疽方中**方****兩****毒**
圓以清心行血湯使服之以井花水磨傳之是為神仙妙藥

丁瘡證治

諸瘡

生髮 拔一圓如鷄子火 雄黃 一豆許

雄黃 一豆許

○莢刺 二十一針

赤小豆 式十一粒

右並窠末撒放髮上捲就緋絹作一團外用髮繩十字縛定
熨斗內烈火燒帶性為末入**地骨皮**末倍之分作兩服空心
酒調下

又方

生髮

蛇皮 洗晒

土蜂窠

皂莢刺 各半兩

右以緋絹一尺分作四片分裹上件藥髮繩扎之炭火燒帶
性並為細末每一錢空心酒調下

又方

蛇皮

土蜂窠

等分 每一錢酒調下

又方

蛇皮洗晒炙焦為末雞子清調傳

又方

磁石 於白中搗為細末

再研醋調傳

又方

蒼耳 亦名鼠耳 取一色研細

各一色研細

廿

右酒調下仍以**蒼膏**燒灰醋調傅或不拘一色雜採用之

丁膏方

金頭蜈蚣 壹條

烏賊骨 各壹

膽礬

銅綠

右細末以紙摺蘸麻油粘藥引入瘡中如瘡頭硬即灸破或

刺破然後入藥

回丁出治丁瘡走胤下止

金脚信

蟾酥

血竭

硃砂

沒藥 各伍

輕粉

片腦

射香

右為酒**生草烏頭**汁為錠如麥子長大用時將瘡頭刺破

納入一錠第二日瘡腫為効以膏藥貼之

聖惠方

治一切惡疔瘡

人言

班猫

巴豆

沒藥

硃砂

硼砂

乳香

黃丹 各壹

南星 水洗

半夏 水洗各

血竭 貳錢

射香 分半

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入班猫四箇然後捻成定于如小麥大每一瘡針破下一錠子用飯粘白紙封口用前四分內一丸噙在舌上覺麻凉水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開一方加**雄黃**二錢

千金托裏散治疔腫發背一切惡腫

官桂

人參

甘草

川芎

白芷

芍藥 各壹

木香

沒藥 各三

乳香 貳錢

當歸 半兩

連翹 貳兩

黃耆 貳兩

防風

桔梗

厚朴

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三二沸和滓服無時

治疔瘡

土蜂房 藥全

真身

蛇蛻 壹條

三

右作一匙細尾器中以黃泥封固火煨存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡已化為黃水仍服

聖散

五聖散

大黃

生薑

金銀花

甘草各壹兩

瓜麥壹箇

皂角針貳兩

右咬咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

瘰癧

瘰癧方論

瘰癧生於項腋之間凡人少小以來動輒蓄怒或憂思鬱抑鬱不伸多致結核于項日積月累風毒熱氣聚焉於是腫濕開瘡起伏無已甚則瘰癧連至于腋下自腋下而蔓衍心骨始無及矣發熱增寒煩渴盜汗或寒熱往來或痛或不痛其外證也治法無他大抵以**消瘰癧**為主蓋瘰癧之毒莫不有根

消瘰癧製度如法能使其根從小便中出或如粉片或如塊血或如爛肉皆其驗耳但毒根之行小便亦必澁痛當以**不通**導之然是毒必從小便出者何哉諸痛癢瘡蓋屬於心其或一二流行於大便尤快便也人有此患不惟懲忿窒慾謹護燥濕風寒其於飲食百味一切戒之然則投方七之劑當何如而責效焉曰飯蔬食而已

瘰癧證治

是瀉立應散

治瘰癧神效已破未破皆可服

連翹

赤芍藥

川芎

當歸

甘草炙

滑石各半兩

黃芩二錢

白牽牛生取末

土蜂房

蜜水洗飯上蒸

川烏尖七箇

地膽去頭皮足秫米炒采

右為細末每服抄一大錢匕濃煎木通湯調下臨母服毒根從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊血爛肉是也如未效後再服繼以**消瘰癧**解其風熱且地膽性帶毒濟以烏尖或

衝上麻悶不能強制嚼葱白一寸茶清下以解之如小便澁
燈心煎湯調服瘡處用好膏藥貼若癩癰疽用此宣
導惡毒本方去不用

薄荷丹

解癩癰風熱之毒自小便宣毒後常須服

杜薄荷

皂角去殼 連翹

何首烏米泔浸

蔓荊子

京三稜煨 荆芥各一兩

右為末好豉貳兩半以米醋煎沸酒豉淹令軟研如糊和圓
桐子大每三十圓食後熟水下日一服病雖愈常服之

必捷回

治癩癰多年不瘥

斑蝥去頭翅足

林米炒

薄荷葉三分

右細末烏雞子清和圓桐子大空心茶清下二圓午時後服
三圓臨卧服四圓次日空心服伍圓脐下痛小便取下惡物
為效如小便秘與葱茶少許

神祕散

治癩癰

斑蝥去頭翅足

林米炒

荆芥穗日乾

直僵蚕炒

黑字子微炒取仁

右細末每服一錢五更好酒調下日中當取下惡物如不下
次日五更再進一服或更不下第三日五更先與林米粥一
盞次服此藥其毒決下如小便痛澁以茶不解之或

心煎湯利之

雄雞散

治癩癰

斑蝥一雄一雌

雄雞足翅全者

貫衆二錢

鶴虱

甘草各五分

木鱉散

治癩癰經年發歇無已

木鱉仁式筒用厚紙擇去油研碎

右細末作兩服飽飯後好茶濃點一錢調下
右取雞子清調和磁盞盛之甑內蒸熟每日食後與一
之半月自欲消靡

粉乳花東散治癩癧攻心嘔吐發中毒方 見癰疽門

山巨根治咽喉疾上膈熱毒患癩癧者常常含汁熱下仍以

紫蘇葉細剉煎湯臨卧服

解熱方 厚壁四畔紅腫多汁為熱證

小黑豆 合紫蘇 一盞 薑七片 細剉煎湯食後服

洗傳方

白芷煎湯泡荆芥

右候溫軟昂醮洗拭乾好膏藥貼膿汁惡肉出盡更用

半夏生 南星 各二錢 血竭 一錢 輕粉 少許

右細末以津唾調傳

究原方欽瘡口

血竭 一字 棗 燒灰 麝 少許

右夾研津唾調傳

詔方

以腫潰膿湯治馬刀瘡結硬如石或在耳前後上下及肩脇背

手足少陽經及癩癧遍於頭或頰車堅而不潰在足陽明經

一瘡已破乃流膿水並皆治之

草龍膽 酒洗 炒 桔梗 各五 升麻 六錢 甘草 炙

柴胡 各五 連翹 三錢 葛根 白芍藥

黃連 各五 黃芩 稍炒 半生 昆布 知母 酒洗

括萎根 酒洗 黃蘗 各五 京三稜 酒洗 廣茂 酒洗 各

當歸 稍半錢

右吹咀每貼柴錢水二盞煎八分去粗食遠熱服於臥處伸

足於高處頭微低每噉一口作數次熱下至服畢如常安臥

取藥在胃中停畜也另攪一料作細末煉蜜丸每服百丸此

藥湯留一口送下更加 五錢炒

治九漏癰癧發於項腋之間拜痛增寒發熱

青皮兩 生犀鎊 黑牽牛兩 半半生
白花蛇焙乾去皮骨

右為不每服二錢膩粉伍分研勻五更糯米飲調下以利下
惡毒為度十餘日再進一服可絕病根

恒心書 治男婦惡瘡瘰癧

蟬酥式錢 粉霜 沒藥 輕粉各六
射香 冰片 血竭各四 乳香

右為細末用男人乳丸如茄子大每服一九含一九在舌上
待自化原可先食和面飲後含之其瘡自消神効

治瘰癧 以手仰置肩上微舉肘尖上是穴隨患處左即
灸左右即灸右文炷如筋頭大再灸如前三次永無恙如患
四五年用藥不退辰時着灸申時即落所感稍深三灸即安
法仍以藥勿片貼瘰癧上灸七壯身多灸取効

癭瘤

癭瘤方論

氣血凝滯結為癭瘤癭則憂患所生多着於肩項皮寬不急提
提而垂是也瘤則隨氣留住初作梅李之狀皮嫩而光漸如盃
外是也其肉色不變者謂之肉癭其筋脉呈露者謂之筋癭其
赤脉交絡者謂之血癭隨憂愁而消長者謂之氣癭堅硬而不
可移者謂之石癭癭之名有五者此也一曰骨癭二曰脂癭三
曰肉癭四曰膿癭五曰血癭六曰石癭癭之種有六者此也癭
癭二者雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必
至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂癭氣癭隨順用藥尚
勝幾焉

癭瘤證治

海原圖 癭瘤通用

海藻洗晒 海蛤假 砂羅格七錢 當歸

川芎 官桂 白芷 細辛

藿香 白欵 明礬煨 昆布洗晒

右細末煉蜜圓彈子大每一圓含咽下

瘰癧方 瘰癧通用常服自然縮水消瘰方見羅疔門

針沙方 專治氣瘰

針沙浸於水缸平日飲食皆用此水十日一換

浴小瘰方 先用甘草煎膏筆蘸瘰癧傍四圍乾而復搽凡三次

後以

大戟 芫花 甘遂

右等為細末米醋調別筆搽傳其中不得近着甘草處次日

縮水又以甘草膏搽小瘰三次中間仍用大戟芫花甘遂如

前自然焦縮

又治留方 鞋皮洗煎東常食之瘰若破如豆瘰極臭

瘰癧方

吸毒散 治五瘰

海藻洗 龍膽草 海蛤 通草

昆布 明礬枯 松羅各參 麥麩四分

分半夏 具母各真

右為末酒調服日三食忌甘草鯽魚猪肉五辛生菜毒物

昆布方 治一切瘰癧

昆布洗 海藻洗 小麦類類

右為末煉蜜丸如杏核人每一丸食後嚼熱

瘰癧方 治一切瘰癧神効

乾猪庵 煨柴 燻管 用灯 盡火 海漂硝 木香

青木香 孩兒茶 錫伍 雄黃 神麩

麦芽 辰砂銘 壹

右為細末用酒送下食後令睡時服之即睡丹不可言語戒

惱怒為室此方係累用無不効驗
海帶丸治瘦氣久不消者

海帶 具母 青皮 陳皮

右各等分為末煉丸如彈子大每服一丸食後嚼化

一方治頸下結核不消經効

大蜘蛛 不計多少

右以好酒浸過研爛同酒調開澄去滓臨臥服

外臺風藥治頭下卒結瘦漸大欲成癭者

昆布 海藻各等

右為末蜜丸含如杏核大稍稍燕津

針灸法天突一穴在喉候下宛宛非治諸般癭疾

肩禺二穴在膊骨頭有端兩骨間陷死中舉臂取之男左

十八壯右十七壯女左十七壯右十八壯又灸

兩耳後髮際七壯

癭漏瘡

漏瘡方論

漏者諸瘻之潰漏也很瘻鼠瘻蟻蛄瘻蜂瘻虻蟻蟪蟪瘻浮
蛆瘻瘰癧瘻轉筋瘻古所謂九瘻是爾析而言之三十六種其
名目又不同焉大抵外傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染調
毒動含靈之毒未有不變為瘻瘡穿孔一深膿汁不盡得冷而
風邪併之於是滄滄而成漏矣漏喜發於項腋亦喜發於陰解
肛門之間瘻治夫時即生寒熱不特瘻能為漏凡癰疽諸瘡隨
所在處苟有宿膿敗肉朽骨停蓄其間皆一切漏瘡之前案也
治去溫散風冷為急收水次之生肌又次之霍香厚朴半夏
冷矣然有近年漏者有久年漏者近則或帶淡紅或帶微腫或
留水核久則上而高曰肉而黑爛活只惡臭生焉近者不過前

藥數品而已。又者復其元陽亦當以補畫加減而用之。如其不當用而輕用，又恐熱氣乘虛移結核旁，緣相通而孔竅為尤。其若夫收水一節，則有司存水為腎也。腎虛不能傳導而後水溢於腎，水溢則滲漉於漏，滲行腎之水無如畫必以牽牛取末入於猪腎，慢火煨熟而溫酒下之，則借腎入腎一縱一擒，兩得其便。惡水既泄，不復淋瀝，繼以畫空心溫酒調下，仍以畫兼而齊之，庶幾腎得所養，真元凝合，天然後畫肉方生，又當以畫為養，不惟滋味益腎而陽明之主肌肉亦藉穀氣以克之。此則自本自根之論也。雖然，漏已息矣，瘡已平矣，愈轉動念可乎？否乎？曰：始焉之漏者，溝澮之細流也；終焉之犯者，江河之浚決也。知而故作，虛漏其如之何。

漏瘡證治

溫解 溫散漏瘡風冷

藿香葉

厚朴製

半夏麩

橘皮

蒼木炒

細辛

川芎

白芷各壹分

辣桂

川白薑生

甘草各半分

右劉散薑棗煎服

消腎酒 通行漏瘡中惡水自大腸出

黑牽牛碾細去皮取末壹分入猪腎中以線扎青竹葉包

右慢火煨熟空心溫酒嚼下

補腎 止漏活血益腎氣續筋脉

椿藤子洗 當歸

川芎

黃耆微炙

川續斷洗 胡蘆巴炒

紫金皮

生乾地黄洗晒

牡蠣粉研細 木香

辣桂各壹錢

甘草貳錢

右為末每貳錢空心溫酒調下或加畫佐之

治漏瘡內外腫方見乳囁門

惠濟附錄卷之二

四十一

雲母膏 治漏瘡效

穿山甲殼 鹽片去肉用 真蚌粉同炒 煖香 熱起 去肉

右入乳香末壹錢 麝香半錢 夾和雲母膏 拾伍貼為圓 桐子

大每服參拾圓 溫酒下 仍以雲母膏 調鹽酒服神效 圓

方見虛勞門兼服之

八指石圓 治漏瘡膿血不止 方見痔門

冷漏乳香圓

白淨滴乳香壹分 牡研粉半分

右細末雪糕糊圓 麻子大每服參拾圓 道地川白薑生用煎

湯空心下

雄黃 治積年冷漏黃水不止

雄黃 硫黃各壹分 頭髮 黃蠟各半兩

右用麻油或兩煎熬頭髮添盡去滓次入雄黃硫黃碎片黃

蠟慢火亡桑枝頭攪為膏攤生絹貼用藥先以赤甘草頭煎

湯洗或露蜂房 煎湯常洗常貼

黑靈散 漏瘡通用

露蜂房剉淨 牡礪粉 號丹 硫黃各壹分

一右同炒令煙盡為細末入髮灰壹分 麝香少許 拌和傳患處

能引藥透達亦殺中

血竭散 治痔漏痛不可忍

血竭 牡礪灰 髮灰各等分

右細末入麝香少許 自以津唾調傳如更痛研杏仁膏調藥

傳之

生肌黃膏 漏瘡通用

露蜂房交黃 五倍子 木香各參錢

滴乳香貳錢 輕粉壹字

右細末用生肌黃壹握搗細和為膏攤生絹上貼瘡

蜂房散 治久年漏瘡或暫瘡復或移於別處

多乳露蜂房 炙黃參分 穿山甲 炙焦 龍骨 各壹分

右末入麝香用臘月猪脂調傳濕則搽

蛇蝎散 治漏瘡血水不止

蛇皮 洗焙焦 五倍子 龍骨 各壹分 川續斷 洗曬

右細末入麝香少許津唾調傳

人牙散 治漏瘡惡瘡生肌裏欲乾則用

人牙 油髮 各壹分 雄雞內金 各等分

右為末入麝香少許濕則搽乾則麻油調傳

平肌散 治漏瘡久不合露乾則用

老狗頭骨 露蜂房 生髮 各壹分 新桑白皮 半分

右細末入麝香少許津唾調傳乾則搽

鐵屑膏 治漏瘡露乾則用

鐵屑 半兩 狗頭連齒骨 炙黃壹兩

鹿角 燒灰壹兩 真輕粉 壹錢

右細末用猪脂調傳

薰漏

艾葉 五倍子 白膠 苦練根 寺分

右剉碎如燒香法置長桶內坐熏瘡處

洗瘡方 漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

露蜂房 白芷煎湯洗 或大腹皮 苦參煎湯洗

右洗畢候水出拭乾先用東向石權皮晒為末乾搽以殺活

虫少頭傳藥

諸漏瘡方

百日兒屎密器封伍日取塗瘡

惡核漏瘡 並戒怒氣不然核則大漏則水多

漏瘡方

真龍骨 蜂房 各壹分 黃丹 壹分 五倍子

降真香節 枯骸骨 各壹分

右為細末傳之

久慶方

九孔蜂房炙黃為末臘月宿研俟收汁以

真龍骨 淨真香附 細末入此 **乳香** 硬瘡

附諸方

蓋漏瘡須先服補藥以主血

人參

黃耆

白朮

川芎

各等分

右咬咀為主大劑服之外以附之末唾調作餅如錢厚以艾

炷灸之漏六艾炷亦大但灸令微熱不可令痛于貼易之如

困倦則止來日又灸直至肉平為効仍用好膏藥貼之

聖藥 治年深冷漏日久惡瘡有反肉用之

銅錄

寒水石煨

滑石絡三

明礬

膩粉

砒霜

雲母石

研如粉各分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺經之如脩合此候天色清明則可

截瘡散 治年深疔瘻

川黃連

白芨

白欬

黃丹

蜜陀僧

各壹兩

右為細末入輕粉 射各半錢研乾敷於瘡或膏藥貼

傳生肌長肉膏

龍骨

煨參

白芷

錢

黃丹

伍錢

軟石膏

煨去火

血竭

錢

辰砂

伍錢

樟腦

少許

香油

少許

黃占

壹兩

右為細末將黃占 溶化後入藥末攪勻要軟不可硬捻成條

子塞瘡口內自長肌肉痛甚者加乳香 沒藥 血出加血竭 各

貳錢

漏瘡

治年深疔瘻

四三

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十二終



請骨

白土

黃丹

煆石膏

古燕酥末

各半

煆石膏藥想

蜜和

白芨

白芨

黃丹

川黃

白芨

白芨

黃丹

古燕酥末

古燕酥末

古燕酥末

