



仁齋直指

六

特別
183
6



門 武 9
編 183
卷 6

醫全文庫

醫全文庫

醫全文庫

醫全文庫

腸癰

新刊仁齋直指附遺方論卷之七

腸癰論

癰發於外人可得見者猶為危急之疾而况隱伏腸間痛無定處人不可得而見者乎蓋癰疽五發在外則為發背發腦發眉發鬚發頤在內則為腸癰心癰腎癰肺癰臍癰等患治之得法尚庶幾焉一着少差枰碁去矣何則腸癰為病身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀而按之濡體無悶熱腹無積聚者此積陰冷之所致也當以暴藥調之發熱無汗酒浙惡寒小腹腫強而按之痛小便澀數其候如淋者此內結熱之所致也當以涼劑利之其脉遲緊膿未成者可下其脉洪數膿已成者不可下甚者腹肚脹大轉側聞有水聲或達臍生瘡膿汁穿出或臍中常常出膿或大便屢下膿血凡此皆為惡證其間寒熱氣急煩渴驚悸

醫全文庫

醫全文庫

嘔惡唾膿咳嗽痰涎自汗自利如尋常發離之狀亦類有此婦人尤多得之但恐世俗不識其證耳抑余聞焉內經有曰息貴病有人得之二三年遍身微腫其後大腸與臍俱出膿血遂至不救此亦腸癰類也又可不審思而明辯之乎

腸癰證治

牡丹散 治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

人參

牡丹皮

白茯苓

天麻

黃耆

木香

當歸

川芎

辣桂

桃仁浸去皮炒

白芷

薏苡仁

甘草炙各一分

右末每服三錢井水煎食前服

木通散 治腸癰熱證腹痛而強發熱惡寒小便似淋膿未成者用此

木通

薏苡仁

葶藶

甘草炙

川升麻

北梗

桃仁浸去皮炒

牡川皮各壹兩

生乾地黄

甜瓜子

敗醬

赤芍藥各壹兩

大黃半兩

朴消壹分

右剉為散每服叁錢井水壹盞平薑伍片煎服

薑黃散 治腸癰疽便毒神效

生黃瓜壹枚

薑黃壹枚

粉草末肆錢

沒藥末叁錢

乳香末壹錢

右件用好紅酒貳大椀慢火煎至壹椀分作兩服兩日服盡大便順導惡物妙若乾瓜萎則用兩枚

養源散 治腸癰冷熱證通用方見血類如**北梗甘草**煎服

養源散 治腸癰冷證及癰疽等患

人參

當歸

川芎

厚朴薑製

防風

北梗焙

白芷

辣桂

黃耆炙

甘草炙

白茯苓等分

腸癰

真...

二

右為末每服參錢溫酒調下如不飲酒南木香煎湯下諸癰

執鑿黃瓜蔓煎湯下
靈壽膏治內外一切癰腫結毒冷執鑿通用藥料四十件修製去度詳見和劑方每服壹錢固如梧桐子大冷蓋以酒送下熱

證甘草煎湯送下。又肺癰骨膈間隱痛而咯膿血腥氣上衝

濃煎此梗煎湯送下服畢皆就枕
蠟燭膏治諸癰腫毒痔瘻惡瘡方見痔門

燒棗散治腸癰
乾棗運核燒存性 川百藥煎研細等用

右為末每服壹錢米飲調下

附諸方
秘傳黃艾仁湯治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便

澁婦人產後虛熱多有此病絞非是癰證疑似閉便可服
薏苡仁五 牡丹皮 桃仁去皮尖 瓜仁四錢

右以州分二貼每貼水二盞煎八分去滓溫服

方治肚癰便癰
牽牛末兩 大黃半兩 牛旁子半錢 補骨脂分錢

右為細末令水調空心服每二錢加妙

牡丹湯治腸癰小便腫否按之即痛如淋或小便自調時時發

熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血洪數

者膿已成不可下
大黃蒸 桃仁去皮尖 牡丹一字 瓜蒌實三錢

芒硝分三 右以州作一服前去滓入白再煎沸頓服未效再服敗毒

神功托裏散和劑方治癰疽發背腸癰妳癰無名毒腫毒作疼

痛增寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並治之
忍冬草槩 黃耆各兩 當歸二錢 甘草炙

陽

右為細末每服二錢酒一盞煎至一盞病上食後病下食前少頃再進 滓外傳未成內消已成即潰也

一方治腹內癰腫

大黃四兩取末

牛旁子一兩取末

右和作二服水調空心服以利為度

丹溪云

大腸有痰積死血流注用**桃仁承氣湯****加連翹****秦元**近肛門

破入風者准治防風之類

桃仁承氣湯方見血門

腸風

腸風論

腸胃不虛邪氣無從而入人惟坐卧風濕醉飽房勞生冷停寒

酒麪積熱以致榮血失道滲入大腸此腸風臟毒之所由作也
挾熱下血清而色鮮腹中有痛挾冷下血濁而色黯腹內畧疼
清則為腸風濁則為臟毒有先便而後血者其來也遠有先血
而後便者其來也近世俗輩前黃後之說非也治法大要先當
解散腸胃風邪熱者與**敗毒散**冷者與**不換金正氣散**風邪既
去然後隨其冷熱而對治之或曰血遇熱則行止血多有涼藥
如**地榆散****鱗皮湯****黃連阿膠丸****酒蒸黃連丸**輩施之熱證固當
然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用**木香理中湯****附子理
中湯****養血湯****集湯**輩如之何而廢之要之**芎歸湯**一劑又調
血之上品熱者加**茯苓****槐花**冷者加**茯苓****木香**此則自根自本
之論也雖然精氣血氣生於穀氣靖惟大腸下血大抵以胃藥
收功**宜料四君子湯****笑公白朮散**以**枳殼散****小烏沉湯**和之胃
氣一田血自循於經絡矣抑猶有說焉腸風之與虫痔特介乎
毫芒之間腸風之血自腸中來虫痔之血肛門邊傍別一小竅射

如血線是也迨夫肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自此又不能約而收之矣善調理者尤當以**薰黃** **艾葉** **白芍** **黃連** 輩為之化虫。血屬於心雖曰**川芎** **當歸** 主血當以**伏苓** **伏神** 佐之前輩止血亦不用甘草但增棗入藥用腸風證治

敗毒散 **不換金正氣散** 方並見寒類

地榆散 治腸風執證下血

地榆 黃連 茜根 黃芩

伏神各半兩 梔子仁壹分

右龕末每服參錢薤白五寸同煎服又**藥炭湯** 方見瀉類通

酒蒸黃連圓 方見痢門 **黃連煎** 方見痢門 **伏苓** **伏神** 煎湯

下治諸下血腹痛痛即是血多服為佳**附子理中湯** 方見寒類

理中湯 方見瀉類 內加**木香** 治虛冷腸風。 **芍藥湯** 方見血類

熱證加**伏苓** **槐花** 冷證加**伏苓** **木香**

小烏沉湯

香附并去皮毛 貳兩

天台烏藥去心 甘草炒壹分

右為末每壹錢鹽點服**枳殼散** 正方不用加藥**參苓白朮散**

方並見虛勞門 **四君子湯** 痢門 四件夾和薑棗煎服治諸下血

烏劑圓 治腸風下血諸風抽掣

川烏頭壹兩炮去皮 荆芥穗貳兩

右為末醋麪糊圓如桐子大每服貳拾圓**枳殼散** 方見身疼門 治腸

風及便血如**六神丸** **氣散** 加**川芎** **當歸** 同煎吞**白圓子** 方見身疼門 治腸

四君子湯 加**白扁豆** **黃耆** 治腸風五痔下血痿黃乏力

豬臟圓 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急

名曰野雞先用**海螵蛸** 炙黃去皮取白者為末以**木賊草** 煎湯

調下服之三日後用**淨黃連** 貳兩剉碎嫩猪臟貳尺夫肥以黃

連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊圓如桐子大每服

連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊圓如桐子大每服

連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊圓如桐子大每服

參伍拾圓米飲下

散毒散 治腸風臟毒久不止

撒攪核於燈燭上燒存性研為末每服貳錢用陳米飲食前調下

蘇連圓 一名**金屑高麗丸** 治腸風臟毒 方見血類 ○**法製香膏**

方并圓散子 治腸風臟毒 方見血門類

黑玉丹 治腸風痔瘻等疾

棕筒

頭髮 淨以皂角水洗

刺蝟皮

槐角 各叁兩

牛角腮 肆兩

並燒存性 生油麻

雷圓

各壹兩

苦練根 壹兩

乳香 半兩

麝香 貳錢

猪蹄甲

四拾九箇燒

楛藤子 兩壹分

右為末酒麪糊圓桐子大每服伍拾圓食前米飲下

腸風黑散 治腸風下血腹痛

敗棕

頭髮

木饅頭

木賊 各壹兩

槐角 炒

枳殼 製各壹分 甘草 炒焦

烏梅肉 半分

右為末每服貳錢陳米飲粟熟調下

木賊散 治腸風下血

木賊 壹兩

木饅頭 炒

枳殼 製

槐角 炒

茯苓

荆芥 各半兩

右為末每貳錢濃煎棗湯調下

槐角散 治腸風瀉血脫肛

槐角 壹兩

防風

地榆

當歸

枳殼 製

木賊

伏神 各半兩

右末酒麪糊圓桐子大每服參拾圓米飲下

白濁丸

方見瀉類 加

白濁丸 治腸風冷熱不調下血

黑聖散

治腸風臟毒痔瘻及諸下血

當歸

川芎

伏苓

地榆

槐花 焙

敗棕

艾葉 燒存性

百草霜

右件等分為末每服貳錢食前陳米飲調下

鯽魚方 治腸風血痔及下痢膿血

大活鯽魚壹箇不去鱗肚下穿壹孔去其腸穢入透明白壹塊如金橘大以敗棕皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗內燒帶生存性為末每服壹錢空心溫米飲調下

震靈丹

方見馮類

玉華丹

方見劑類

治臟腑虛損大腸不收

少保腸風下血二藥夾用煎不換金正氣散加川芎空心嚥下

黃龍圓 治傷酒藏毒及暑瀉熱瀉

黃連淨捌兩用酒壹大升煮乾研細水麩糊為圓如桐子大每服肆伍拾圓陳米飲湯下

消風散 治腸風米飲調下吞烏龍圓酒蒸黃連圓隨意方見頭

腸風久血方

三柴黃 淨半兩盪柴次炒過黃連去須柴錢

右為末陳米糊圓桐子大每服伍拾圓陳米飲下食前服

又方

茅花 敗荷葉 敗棕各半兩 香附淨

和壹半炒焦

右為末食前米飲調下貳錢

腸風方

香附壹兩製 枳殼叁分 當歸 川芎各半兩

槐花炒 甘草炙冬壹分

右為鹿末每服叁錢新水壹盞半薑棗煎食前服

附方

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉 生地黃 當歸酒浸 川芎各壹

枳殼炒 荊芥穗 槐花炒 甘草各壹

右以咀每服四錢水一鍾姜三片烏梅少許同煎空心溫服

腸風黑散

和劑方 治腸風下血或在糞前後並皆治之

荊芥 貳兩

亂髮

槐花

槐角 酪燼

甘草 炙

蠟皮 兩半

枳殼 煨 韻 兩

右將所燒藥同入瓷瓶內，鹽泥固濟，燒存三分，性出火毒，同甘草枳殼搗羅為末，每服三錢，水一鍾，煎七分，空心服。

結陰丹

後辨方治腸風下血，臟毒下血，諸大便血疾。

枳殼 煨 威靈仙

黃芪

陳皮 去白

椿根 白皮

何首烏

荊芥 穗 酪 半

右為末，酒糊丸，如梧子大，每服五七十九，陳米飲入醋少許，前過要放溫水送下。

黃連黃芩散

張子和方治腸風下血

黃連

鷄冠花

貫衆

大黃

烏梅肉

枳殼

荊芥 酪 壹

甘草 炙 半錢

右為末，每服二錢，溫米飲下，食前。

一方治臟毒下血

用**黃連**四兩，**酒**浸，春秋五日，夏三日，冬七日，晒乾為末，以**烏梅肉**六兩同搗為膏，丸如梧子大，每服二三十丸，空心白湯。

一方治腸風下血

滑石

當歸

生芋

黃芩

蒼朮 冬等分

右以水煎服，或以**蒼朮**生芋不化，鐵器為末，丸服。

一方治腸風臟毒

用**藥**燒灰存性為末，**米飲**調下二錢，小兒服半錢。

諸痔

諸痔論

臟腑本虛，外傷風濕，內蘊熱毒，醉飽交接，多慾自戕，以故氣血下墜，結聚肛門，宿滯不散，而衝突為痔也。肛邊發露肉珠，狀如鼠乳，時時滴潰膿血，曰**痔**。肛邊生瘡，腫痛突出，一抄數日，膿

潰即散曰(通腸)腸口顆顆發扁且痛且癢出血淋瀝曰(脈痔)腸
內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰(腸痔)若血痔則每遇大便
清血隨下而不止若(消痔)則每遇飲酒發動瘡腫而血流若氣
則則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難強力則肛出而
不收矣此諸痔之外證然也治法總要大抵以解熱調血順氣
先之蓋熱則血傷血傷則經帶經帶則氣不運行氣與血俱滯
乘虛而墜入大腸此其所以為痔也諸痔出血肛門間別有小
竅下如血線不與便物共道痔久不愈必至穿穴瘡口不合痛
無已時此則變而為瘻矣前乎治法之外抑猶有說焉腸風臟
毒之與痔瘻同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕爛可畏此
果何物致然哉或虫是也其間執劑又當為之化虫不然古書何
以謂之虫痔○氣血下墜衝突為痔既不能坐又不容行立則
愈則其墜矣惟高枕偃仰心平氣定其腫自收

諸痔證治

清湯云問云諸痛癢瘡皆屬於心心主血熱諸痔受病之源
也此藥主之

黃連淨一兩 伏神去木

微赤伏苓各半兩

右為末煉蜜圓如桐子大每服壹百圓食前米飲下患痔只
是契白米稀粥疏其腸胃

黃連淨一兩 治諸痔解熱調血方見教門用 枳殼散送下 方見

益勞門或(黑)煎湯下解裏熱先用此○追風毒似散治諸痔

蘊熱腫扁大便不通加(枳殼)煎方見脚氣門

清散治諸痔熱證大便秘結

當歸

赤芍藥

甘草炙

大黃酥上蒸

右為鹿末每服貳錢新水煎服

五痔散治諸痔不問冷熱內外

鱉甲醋浸炙 蝟皮剉碎

猪甲剉碎炒焦 蜂房炒各

蛇皮一條燒並各存性

右為末入（）少許每服壹錢半食前米飲調下

聖圓子 諸痔通用
楸藤子重一兩者三
大皂莢刺存性用

猪牙皂角二兩 蝟皮一箇炙
沒藥別研 槐角各三分

右為末酒麩稀糊圓桐子大每服三十圓（）送下

維峯烏命散 治痔漏
穿山甲 刺蝟皮
槐子 皂莢刺

黃牛角心烙碎 猪牙皂角
枳殼

阿膠各等分 牛角
右為末每服壹錢半用（）研爛併調酒食前服大腸有

熱煎木 泡湯調下漏血不止（）煎湯調下

槐角圓 治諸痔及腸風下血脫肛
槐角去梗一兩 防風 地榆 當歸

枳殼麩炒 黃芩各半兩

右為末酒麩稀糊圓梧桐子大每服參拾圓米飲下
積殼圓 治諸痔出血裏急疼痛
槐花微炒 艾葉炒黃 枳殼製 地榆

當歸 川芎 黃耆 白芍藥

白礬煨 貫衆各半兩 蝟皮壹兩炙焦 頭髮燒三錢
猪後蹄垂甲 炙焦 盈尺皂角一箇去核

右為細末煉蜜圓桐子大每服伍拾圓食前米飲下
諸痔通用

透明阿膠炒酥 黃連淨 貫衆各半兩
盈尺皂角去核醋炙焦 蝟皮炙焦 蜂房炒焦

蛇皮畧燒 皂角刺畧燒 穿山甲揷入熱火 川芎
猪後蹄垂甲 燒已上各存性 當歸

槐花並用二

右為末米醋煮麩糊圓桐子大每服七拾圓調氣用**枳殼散**
下消血熱荆芥煎湯下食前服

蠟藥圓治諸痔諸難惡瘡便毒

明白礬煨為末蠟燭圓桐子大每服七圓溫熱水下

猪甲散治諸痔

猪後蹄垂甲不拘多少燒存性

右為末陳米飲調貳錢空心服

青蛙圓治諸痔

青色蛙長脚者取一箇燒存性

右為末雪糕圓桐子大每服拾伍圓空心先喫飯二匙次以
胡桃肉切細煎湯調**送下**若產婦發痔裏急作痰用
黑豆一伯粒陳米一合夾煎湯下亦先喫飯二匙

穿山甲治痔肛邊生鼠乳或成瘡痛

穿山甲橫取後段尾根尺一兩多焦存性 鱉甲半兩西 麝半錢細研

右為末每服壹錢半用蠟茶半匙夾和沸湯調下**煎湯**
調亦得留滓傳痔○**又方**單用**穿山甲**

地榆散治痔生瘡腫痛

地榆 黃耆 枳殼 檳榔

川芎 黃芩 赤芍藥 槐花

羌活各半 白欬 蜂房炒焦 甘草炙各

右劉每服三錢新水煎服

皂刺圓治痔痛而復發

皂刺二兩燒煙 防風 槐花各三

蛇床 白礬煨 白蒺藜炒去 枳殼製

羌活各半兩 蜂房炒焦 五倍子各壹分

右為末醋調菘豆粉為糊圓如小豆大每服伍十圓以**苦酒**

煎湯下仍用童子熱尿入**白礬末**澆洗肛門

皂刺圓治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

蒲尺皂角

三錢去灰

刺蝟皮

炙一兩

白礬

煨一兩

猪後垂蹄甲

十枚燒

桃仁

浸法

川芎

北梗

甘草 薑 礬 各 善 法

白芷 路 壹

右為末煉蜜圓桐子大每五十圓

煎湯下仍以

煎湯重洗

治痔下血不止

川芎

當歸

黃耆

神麩

地榆

槐花

阿膠

荆芥 總

木賊

頭髮

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓食前米飲下

治酒痔

白乾葛

枳殼

半夏

伏苓

生乾地黄

杏仁 略 半

黃芩

甘草 略 一

右剉碎每服三錢黑豆百粒薑伍片白梅一箇前服

治氣痔

橘皮

枳殼

川芎

槐花

檳榔

木香

桃仁

紫蘇 葉

香附

甘草 各 錢 半

右剉每叁錢薑棗前服

代赭石

代赭石

礬 磁石 煨 七 沸

白礬

牡蠣 灰

龍骨

蝟皮

皂莢 刺 燒

猪後垂蹄甲

蜂房

赤石脂

川椒

木賊

蜂房

右件等分細末神麩糊圓小豆大每服伍拾圓食前艾并生薑煎湯下漏血更以熟艾揉和血竭塞日三換

治氣滯發痔

荆芥 總

枳殼

槐花

香附

紫蘇莖葉

右為末每服貳錢米湯調下

甘草 炙等分

三白湯

方具載血類

加

濕花

微炒治產婦諸痔

三白湯

治腸口熱腫

三錢

馬砂

半錢末之乾搽○又

滑石

等分末之井水調傅○又

水消

五倍子

等末傅之

七厘方

明血竭末之傅○通用方

宿從蹄垂甲 燒灰傅○又水浸熊

膽汁以筆傅○又鴨背青膽礬煨為末用清蜜調筆傅可以

消脫○又雞子一箇煮熟去黃取白切焙明礬煨白欵各一

錢同末傅有孔用紙捻蘸入

熏洗方

槐花

刺木

艾草

水煎入白礬

熏洗○又

木鱉

七枚取仁研

玉琴

末二錢少水煎

熏兩三次○又

宿從蹄

前湯先熏

後洗

潘籬花似小芙蓉○又

蟬皮

三指許

艾草

一團如燒香法置長

桶中坐熏三次凡痔發於肛內者須用熏洗若腸口腫熱

未 新汲水調常淋之

浴前痔方

凡痔皆因酒麪炙博蓄熱傷血惡血結聚於下焦不

得疏通於是下墜而為痔患痔之人下部留蓄血熱多致大小

便不通小腹結急總得一通又復閉塞且有漱水之證此下焦

留蓄血熱明矣其下焦蓄血亦以尺脉洪盛見之合用

主治須得大小便通快患處即以

再沃次用

尾間炙焦

去翅足

炒各壹

分為細末入

少許研和酒調以筆蘸傅少頃痛來以

沃去準一時許前藥又增些

若痛又以

時藥中又增些

並如前法一日三次用前藥其

又以漸加多於

第二日矣痛則沃之以葱湯三日以還更不用藥只是

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀

諸痔

諸痔

十三

無膽藥以通利代之

通利大小便取下黑物

川芎

白芷

生乾地黄

赤芍藥

五靈脂

枳殼製

阿膠炒

蓬莪木

伏苓

伏神

木通

生甘草路壹

實大黃

生用 桃仁 盪去皮焙 各壹分半

右到散每叁錢井水壹椀薑叁片蜜叁匙煎服以利為度瘀血作痛通用

治痔五聖丹

雄黃

葉子雌黃

朴消

綠礬

明白礬 各半兩

右件各別磕碎以銀窩壹入 雌黃叁入 綠礬肆入

紅煙上方好候冷取出紙糊瓶口上用盆蓋出火毒壹日夜

入乳香沒藥末各壹錢同研極細每抄壹匙煎湯調傳

外用雞羽掃藥末蓋之日貳次夜壹次自然乾硬而脫逐日

須用葱白煎湯入 溫洗軟帛拭乾然後傳藥

須先用 取白皮煎湯溫洗然後傳藥

五倍子日乾如燒香法置長桶內坐燻患處自然收縮

紫金皮新水煎食前服

焙乾為末入 以津唾調傳青紗上貼或

焙黃到碎每用壹兩井水叁大椀

煎乘熱熏先拭乾 燒紅椀覆地出毒細末傳

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛 枳殼炒 半夏 茯苓
生苳 杏仁各半 黃芩 甘草各貳錢半

右劉每服三錢錢一百粒錢三片白一箇水煎服
橘皮方 治因憂思怒適臨于前痔瘡發作腫痛大便難強努則肛出并皆治之

橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒各兩
檳榔 木香 桃仁炒去 紫蘇莖葉
香附 甘草錢半

右劉每服參錢姜棗煎服
地黃 治五痔滋陰必用之
地黃酒蒸熟 槐花炒 黃栢炒 杜仲炒
白芷各壹 山藥 山菜取肉 獨活各八錢

澤瀉 牡丹皮錢 茯苓六錢 黃芪壹兩
白附子貳錢

右為末煉丸如梧子大每服五十九空心米湯服下
五灰散 三因方 治五種痔瘡不問內外並宜服之

驚甲治壯 蝟皮治壯 蜂房治腫 蛇蠟治氣
猪左足懸蹄甲各等分
右燒存性隨証倍用一分為末并花水調二錢空心臨臥時服之

一方 治熱痔疼痛不可忍者
用鮮枸杞根數莖杵爛煎湯熏洗其痛立止

四物湯 方見虛勞門
解毒湯 方見積熱門
灸法 用大蒜一片頭垢捻成餅子先安頭垢餅於痔上外安灸

便毒

便毒論

腎為作強之官所藏者志也男女大慾不能以直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢泄而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念精與血交滯其不為腫結也幾希便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩者之中是也嘗怪世俗無知縱竟有便毒證狀必以為熱氣所攻每上薄衣露足遂使寒邪乘之熱氣轉不得散日復一日敗精宿血愈聚而愈結焉不思一身宗筋上絡於舌本下聚於陰器筋得寒則急上則縮甚至偃倮而不獲伸於斯時也百藥並陳亦難責效况復從事於寒涼者乎治法散寒利熱泄其腎邪活其血脈是為捷徑外此老人氣滯亦或有之

便毒證治

雙解湯治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

辣桂

川大黃生

白芍藥

澤瀉

牽牛炒取

桃仁去皮炒乾

甘草半分

右為鹿末每服三錢薑五片食前煎服日兩服先小便快熱從小便出後大便利皆是稠毒

連翹治便毒腫結

木通

獨活

川升麻

射干

木香

桑寄生

赤茯苓

甘草各七錢半

大黃生用

木香

乳香

沉香各半兩

右坐細每服三錢慢火煎服

復元通氣散便毒初發用此方

穿山甲酒浸炙

白牽牛末炒

天花粉酒浸

白芷

舶上茴香炒

甘草各一兩

延胡索皮去

南木香

當歸

右為細末每服二錢溫酒調食前服不飲酒南木香煎湯下

便毒

便毒

便毒

退毒飲 治便毒腫結

穿山甲醋炙焦

木猪苓醋微炙

右為末每服二錢食前老酒調下次以法醋煮肥皂研膏傳之妙

五苓散 疎利小便以泄敗精方見飲水門用葱二莖煎湯調下

追風毒酒散 治便毒熱證大便秘結方見脚氣門又清涼飲通

用方見痔門○**神效氣散** 治便毒大便不通加生天黃食前

服方見脹滿門○**空原** 治便毒已消常服之方見腸

腫核痔漏諸癰方見痔門○**四聖散** 治便毒癰疽腸癰神效方

見腸癰門

傳 治便毒腫痛

雄黃

乳香各二錢

黃柏一錢

右為細末分作兩服以新水調傳自平

皂角 治癰疽便毒等

皂角一條長尺以上者槌碎法醋煮爛研成膏傳之屢效

膠 治便毒初發

水膠用水溶開塗傳若便毒已大而軟則用魚鱗膠於熱湯中煮軟乘熱研爛傳之或要換藥以熱湯洗去

蕉葉 治便毒

蕉弓葉乾者焙焦為末法醋生薑自然汁等分調傳

紫背草

研醋調傳

蟬退 治便毒初起疼痛服之神效

蟬退去土並

楓由蟲各死各蜈蚣三條燒

雄黃三分

右件共為細末分三服用好酒煎一二沸食前服忌食諸熱

毒物

秘傳獨聖散 治一切便毒連上作痛更不腫起名曰陰毒服之立應

取活蜈蚣一二条用炭火燒存性為末用好酒調服食前下

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼痛

辣桂

大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛炒搗研

杏仁去皮各伍分

乾姜一錢

右吹咀分二貼每服用水二盞煎七分食前服

治便毒初發以生薑一大塊米醋一合以麩磨取

附注 敷之即散是泥地上人經行日久其突起者

秘傳鳳凰衣散

治疥瘡腫痛神效

鳳凰衣即包鴉子壳內衣是也

輕粉

水片各分

右為極細末傳患處效

鹿茸香粉散 治血疳陰蝕臙瘡耳疳一切惡瘡

輕粉

射香各分

乳香

沒藥

明凡各一

右為細末乾貼

方 治下疳瘡

蜜陀僧

黃連

黃柏

輕粉各分

右為細末以鹽艾湯沃洗乾摻

津調散

治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

疑花等分

右為末以蛇骨皮蛇床子煎湯洗絹帛挹乾津調藥敷

哥曰

陰瘡痒痛黃汁注

輕粉石膏温乾傳

不然細研生白礬

冷水洗之根亦去

又

瘡本五倍末同調

參傳陰瘡便可消

更有一般官局藥

水銀和粉玉龍膏

又

婦人交接妬精瘡

地龍乾研作洗湯

細研黃連款冬末

唾津調傳是良方

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十三終

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十四

癩疹風

癩疹風論

風氣挾熱起於腠理皮膚不腫不疥發為瘡癩謂之癩疹此風
熱之浮淺者也其亦有寒暑濕之氣行焉風熱在表天時炎暄
而燥氣乘之則為赤疹風熱在表天時寒涼而冷氣折之則為
白疹赤者遇涼清而後消白者遇溫暖而後滅然則用藥加減
可無權度於此哉其有浴後湊風與夫汗出解脫而得之者隱
隱微黃似赤似白疑滯於肌肉之間而四躰為之重者此風熱
之挾濕外證又可推矣如其不知寒暑濕之所由生驟以瘡風
熱等輩索之按圖殆恐痰嗽嘔渴雜證交攻由癩疹而變為瘡疹

癩疹證治

天麻散

治風熱癩疹

天麻

川芎

川升麻

半夏續各三

防風

細辛

羌活

荆芥穗

蟬殼去青足

甘草焙各二

右細到每服二錢姜錢三片井水煎服挾寒者加**官桂**挾暑

加味羌活散 癩疹通用

羌活

前胡各半兩 人參

北梗

川芎

伏苓

天麻

枳殼製

甘草各二

蟬殼去頭足 腦荷一各半

右末每挑二大錢七姜錢三片煎服

消風散

治癩疹瘙癢 方見頭風門

天麻散

治風熱癩疹 方見頭風門

加味羌活散

治風熱癩疹瘙癢 方見眼目門

惺惺散

桔梗

細辛

人參

伏苓

白朮

瓜蒌根

甘草各五分

右末入薄荷煎要和氣添姜錢可夾和人參羌活散治癩疹

亦治瘡疹

羌活散 治癩疹

白僵蚕

直者去青尾及絲冷黃

右末好茶清入此姜汁調下

惺惺散

明礬

朴消為末井水調雞羽掃傳

又方

赤小豆

荆芥穗晒為末雞子清調薄傳

又方

朱黛散 僕傳 方見丹毒門

花方 蚕沙新水煎客室温洗

胡麻散 治風氣挾熱癰疹癢痒

胡麻子附 苦參

威靈仙 防風

菊花 蔓荊子

右末每服式錢食後煎何湯點服或好茶清亦得

丹 並不得喫醋

毒丹 斑在面傷寒一二日或吐下後變或陽毒腰背痛

煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脉浮大咽痛

人參 黃芩 射香 犀角

甘草各二分 升麻半兩

右咬咀水煎取飲半匙刻許再進溫覆手足得汗出解

升麻湯 斑在身治汗下吐後毒不散表虛裏實發於外甚則煩燥譫妄

玄參 升麻 甘草各等

右咬咀水煎服

陽毒湯 治傷寒壯熱百節疼痛而發斑

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥

石膏 知母 杏仁 柴胡

甘草各等

右為粗末每五錢入器五片豉百粒煎服

消毒犀角飲 治斑及癰疹

牛旁子六分 荊芥 防風各三 甘草一分

右咬咀水煎服

解毒防風湯 治斑及癰疹痒痛

防風一兩 地骨皮 黃芪 芍藥

荊芥 枳殼 牛旁子各半

右為粗末每四五錢水煎服

調中湯治內傷外感而發陰斑

蒼木半斤

陳皮

砂仁

藿香

芍藥炒

甘草炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼各一

川芎各五

麻黃

桂枝各五分

右咬咀三片水煎服

丹毒

丹毒方論

丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤浮肌肉而為之走注也然丹有五丹不特色赤或青或黃或白或黑是血熱風毒有盛有衰元冷挾熱故其色交易又不同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古人以丹命名蓋謂心應火色尚赤端冷發元夫既心家血熱所致風以動之於是遊

而通體也蔓衍而不散則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於胃腹然後流散於四肢者易愈

丹毒證治

藍葉散治諸丹發熱赤腫

白芷

柴胡

知母

杏仁去皮

川芎

赤芍藥

生地黄

川升麻

乾葛

生甘草各一分

爛石膏

梔子仁各半分

藍葉日乾一分

右剉細每一錢半新水煎服熱甚加黃芩煎服

方已散治諸丹

漢防已三各

川升麻

黃芩

犀角

黃耆

川芎各一分

朴消一分

右剉每一錢半新水入少蜜并內葉煎

朱黛散解丹熱諸毒

青黛

土朱各一分 軟滑石

荆芥穗各半分

右為末每一錢半蜜水調下兼與僕身

人參兔活散

方見眼目門

霍亂散

方見癰疹門

夾和用竹葉煎

湯調下治諸丹

諸丹熱證加黃冷 冷證加黃 白芷

疎風解毒散亦治丹毒方見諸惡瘡門

傳方

此藥淨研一椀 中等活地龍七條研細傳

又方苦酒末水調傳

又方苦酒傳

又方苦酒取汁傳

又方苦酒燒灰雞子清調傳

洗方蛋沙一升井水煎溫和客室洗

青白丹龍中黃土一分 岐半分為末麻油調傳

黃連

荆芥

黃連

土朱

赤小豆

爛石膏等分

右為末撲之服藥同前

附方

藍青散治一切丹毒赤腫

藍青

知母

甘草

杏仁去皮尖

黃芩

升麻

柴胡

寒水石

石膏

山梔

赤芍藥各四

翔羊角叁錢

右剉每服叁錢水煎服

消毒散治赤丹火丹紫葢丹

牛旁子妙研

荆芥穗五錢

甘草炙壹兩

防風

升麻各半

犀角叁錢

麥門冬

桔梗各五錢

一方加補骨二錢

丹毒

丹毒

五

右吹咀每服一二錢水煎服

治火丹毒遍身赤腫痛

寒水石

石膏各參兩

黃柏

甘草各壹兩

右為末調敷

治火帶

詞曰

瘡毒細如天火帶

能令斑駁皮肉壞
傳若頻時消亦快

爛研一味百合根

治丹瘤

大黃

朴硝

土蜂窠

右為末水調塗之

防風

酸車草

赤豆

竈心土等分

右煎湯洗立効

防風通聖散

蚯蚓泥

右共為末畧炒調傳極妙

從肚皮上起者是重熱發於外還服防風通聖散

見中風門



癩風

癩風方論

癩風即經所載厲風也癩之名非一證狀多端不出五種風生五種虫是爾黃風生黃虫青風生青虫赤風生赤虫白風生白虫黑風生黑虫四虫猶可措手惟黑虫未必有瘰疬此惡疾也瘰疬毒乍熱乍寒身體魁扁手足指脫眼爛鼻塌齒豁唇翻顏色枯黃眉鬚墮落頑痺痛癢不能屈伸病證之惡莫甚乎此然此雖出於風必有所致大率多因嗜慾無度勞動氣血熱發汗出不避冷濕外風遂致滯氣與榮衛相干衛氣挾邪則肌肉

癩風

癩風方論

六

不仁榮氣泣濁則脉絡瘀熱故通身瘍潰變壞人形千金所謂
自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心故應如是亦有傳染
觸犯而得者此則不謹之所招也其虫在於病軀去來無數甚
入骨髓食人肝則肩脫脫落食人肺則鼻柱頹崩食人脾則語
音變散食人腎則耳鳴如雷若食其心則諸痛癢瘡心實可之
心不受觸觸則死矣人有斯疾切須忌鹽及一切口味幽隱林
泉屏弃世務蚤蚤救療庶為全人治法以疎風殺虫逐惡毒輩
為之宜通謹勿用補此風從頭起而下者順從足起而上者逆
順則易逆則難又當識此餘於直指後集歷節方論見之 大寒
大熱不得行滯多致風顛或久病也麻痺其狀解

癩風方論

通天拜送散 治大風諸癩

- 川鬱金 半兩
- 白牽牛 半生半炒
- 綿紋皺大黃 壹兩
- 黑色大皂莢刺 壹兩半

右細末每服參錢半月首五更面東好酒調下重者此虫
頭小虫輕者世如魚腸爛肉極臭服藥至無虫則瘡肆箇月
絕口味但喫白粥白飯慙忿室慾永斷牛馬鴉鴿等物下藥
俟至勿令病人知恐虫匿也

本國... 治大風

- 北大黃 半錢
- 大皂莢刺 壹兩
- 川鬱金 半兩

右細末每貳錢用真 **大風油** 入 **好酒** 溫調臨睡服隔兩日再
服直候世下無虫方瘥此疾業緣果報常須至誠念佛懺悔
以全其身

皂莢湯 治大風

- 皂莢刺 壹兩半
- 北大黃 壹錢
- 輕粉 半錢

右末酒調空心服取下惡物服藥數日齒出毒血甚臭

皂角圓 治大風諸癩

肥長皂角 貳拾條先炙透後

頰風

去皮其核自脫

右以**皂角**多用酒慢火煎得稠粘瀝出清稠者候冷入雪
糕杵為圓桐子大每五十圓不飢飽酒送下

養酒熬癩風虫

明硫黃 乳鉢研細

右入酒調空心飲清汁明日添**硫黃**再研入酒如前或添**天**
風油更好

黑虎治大風諸癩惡虫內蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩

蝦蟇 二個去頭足

生人中白

桃仁 浸去皮麝香 壹錢

硫黃

雄黃 各壹兩

穿山甲 熱煎老皂莢刺 燒存半兩

輕粉 二錢半

右末煉蜜圓桐子大每三拾圓月首五更米飲連日服取虫
盡則愈殺瘵虫通用

烏蛇治風癩殺五虫

胡麻子 四兩

烏蛇肉 酒浸

乾蝦房 各

苦參

檳榔

獨活

桃仁 浸去皮

白蒺藜 炒

皂莢刺 炒焦

貫衆 各半

蕪荑

雷丸

雄黃

硫黃 各半

朱砂 二錢半

蝦蟇 二個去頭

右細末以長皂角拾條水三升投取濃汁去滓煎成膏和藥
末圓如桐子每叁拾圓空心温酒下

雄朱治大風

雄黃

朱砂

滑石

阿魏

雌黃

雷丸 炒

藜蘆 炒

硫黃

生犀角屑 各三

完青虫

斑蝥虫 各去翅足黑皂莢刺 錢半

右細末每服三錢天明温酒調下明日再服

雷風癩取虫

水銀

硫黃

雄黃 各壹錢半用乳鉢入

雷丸

阿魏

貫衆末 錢半麝香 半錢

右研極細每壹錢天明温酒調下明日又服

嬰囊 治大風殺五虫

乾蝦蟇壹斤 肥皂角壹條 右為末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩貳升鋪甌內置麩上蒸熟去麩入藥半錢同搗圓如桐子每貳拾壹粒空心温酒下

蔓荆子 治大風

蔓荆子 蒼耳脚操 枸杞子 牛蒡子炒

黑牽牛炒 胡麻 白芷 何首烏

威靈仙 荆芥穗 獨活 茯苓炒并去刺

華陰細辛去苗葉土 直僵蚕炒去 道人頭去刺取十

皂莢刺炒焦 苦參 大草烏去皮炙生

石細末大風相和圓荆子大每貳拾四圓食前茶清下

以用萬應方并返魄追命丹造散皆治大風胡麻散解風毒熱氣應疹瘡方見

聖藥 治大風單服鍊以

癩風服藥半月後兩腰眼各灸比壯

附錄

醫風丸 治大風

川當歸 羌活 獨活 川芎

天麻 細辛 防風 荆芥

威靈仙 麻黃 何首烏 石京子

牛蒡子 車前子 皺面草即地 蒼耳子各壹

右皆不見火晒乾為細末酒煮酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸食前温酒下服後煎藥熏洗

加威大造苦參丸 治大風瘡及諸風赤白癩風

苦參壹斤 防風 荆芥 蒼耳子

胡麻子半生 皂角刺略十 蔓荆子 牛蒡子

黃荆子 枸杞子 何首烏 禹餘糧

癩風

蛇床子各各 香白芷壹兩 薄荷 生地黄各壹兩
右為細末用白搗爛熬膏入前藥勻為丸丸如梧桐子大
每服五十九任下

方治大風眉毛脫落肌膚拆裂
用方加天麻早晚各一服至百貼必愈
忌房事童腥生冷油膩之物

方治大風風
苦參壹兩 牙皂壹兩 龜板壹兩 姜蚕壹兩
全蝎壹錢 輕粉分 全付鴛毛
共為末每服一錢好酒調下每日早晚各一服

方治大風風洗藥
苦參 荊芥 防風 白芷
獨活 羌活 藁本各壹兩 落陽花四兩用燒酒一
右咬咀勻作三次煎水洗汗出為度

當歸拈痛湯治大風風兩足血風瘡痛痒等証方見脚氣門

癩風

癩風方 雞子壹枚用酸醋浸壹宿
右以針刺小穿瀝清汁入砒末并綠豆末少許夾和先以石
札擦破次用青布蘸擦妙

治癩風方 硫黃 明白礬並生
右為末薑汁調茄蒂蘸擦兩三次

癩風方 雄黃 硫黃 黃骨丹
密陀僧 大南星

右等分為末先用薑汁擦患處次用薑醃藥末擦擦後漸黑次日再擦黑散則無事矣

附諸方

蒼耳丸 治諸風及諸風瘡癩疹白紫癩風

五月五日割取蒼耳草洗淨晒乾為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九日三服若身軀有風癩或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺黃汁出盡乃止

靈草冊 治一切風疾及癩疹紫白癩風痛痒頑麻

採紫草草攤於竹篩內下着水晒乾為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用黑豆淋酒化下及治脚氣打撲傷損渾身麻痺

諸風應効酒 治一切諸般風濕痺遍身骨節疼痛紫白癩風神

効方見歷節門

治汗斑紫白色者

用白附子硫黃各等分為細末以茄帶醃醋粘末擦之

一方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥皂方去白癩黑點白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白殭蚕 白芨 猪牙皂角

白蒺藜 白欬 草烏 山查 枙松

白丁香 大黃 藜本 鱉白 杏仁

豆粉各壹兩 猪脂去膜 輕粉 蜜陀僧 樟腦各半兩

孩兒茶去裏外皮筋并子 肥皂去裏外皮筋并子

右先將淨肥皂肉搗爛用雞清和曬去氣息將各藥為末同肥皂猪脂雞清和為丸

一方

用生小治兒分為節擦之三五次効

諸瘡

諸瘡方論

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲愈者此皆心腎不濟飲食不節腸胃停留以致風毒與血氣搏凝滯於肌肉之間而發露也其名目療治有異焉凡人脉虛感受風熱濕毒之氣發為瘡瘍痒痛焮腫身熱多汗是為(惡瘡)或生於手足間相對如新菜萐痒痛拆裂搔則黃汁淋漓有孔如窩久而生虫是為(爛瘡)或初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀是為(肉花瘡)或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕若從四肢發生然後入口者重是為(鼠瘡)或生於兩耳鼻面間及下部諸竅侵蝕

筋絡月中則瘡盛月未則瘡衰以其隨月而生是為(月瘡)或耳下瘡亦名月蝕或毒氣攻於手足指弩肉裹上指甲疼痛出血瘡中有虫是為(肉瘡)或指頭先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是為(爪瘡)或人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫透眼微赤痒處搔之隨起痞癰重者遍身如豆如杏膿焮作痛是為(漆瘡)或盛夏腠理易開風熱毒氣搏於皮膚輕者狀如撒粟重者熱汗浸漬匝匝成瘡曰(濕瘡)或心神鬱燥遍身發瘡多出膿血赤爛如火曰(火瘡)或身觸風寒冷氣以致血澁不行其瘡頑滯不知痛痒經久難瘥曰(風瘡)或身發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或痒或刺曰(疥瘡)或頭生白團班剝如鱗上有白皮久則成痂遂至滿頭瘡中有孔有膿細虫入裏不痛微痒少長不瘥曰(癬瘡)或風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痒步履艱難惟生於膝骨者為重曰(膝瘡)以其骨上肉少皮薄難愈至有多年無已瘡口開闊皮爛骨現臭穢可畏

諸瘡

瘡方論

七

者先當取虫然後傳藥或淫夫龜上生瘡初發如粟拂之則痛由是出清膿作白孔侵蝕臭爛日漸大痛曰(淫精瘡)以婦人先有宿精在內或月水未斷與之交接滌穢不前傳氣而作婦人亦有生於玉門者曰(淫毒瘡)或滿頰滿項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳內外濕爛如浸淫瘡之狀曰(走皮瘡)田野呼為(惡半瘡)已上數種名目不同治各有方條列于後

諸瘡證治

桑螵蛸散 治諸惡瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

厚黃栢各半兩

號丹

乳香各壹分

粳米粉貳錢 雄黃

輕粉

各壹錢

麝香半錢

右細末以不食井水和沙糖調傳

又方

蜘蛛曬為末(麻油)調傳

白蠟油膏

治癩瘡久不瘥

杏仁

水浸去

乳香各三小 硫黃

輕粉

各半

蠟半兩

麻油乙合

右研極細先熬油沸入蠟溶盡次入諸藥煎攪成膏冷地出火毒磁器收用

又方

燕窠取孢子麩土為末摻先以(白芷) (大腹皮) 煎湯洗拭瘡

胭脂散 治反花瘡

胭脂

貝母

胡粉各乙分

鵬砂

沒藥各半分

右末研細先以溫漿水洗拭後傳藥

青練散 治浸淫瘡

苦練根

日乾燒存性

石為末猪脂調傳濕則摻先用(苦參) (大腹皮) 煎湯洗

胡粉散 治月蝕瘡

胡粉炒微黃 白礬煨 號丹煨 黃連淨

輕粉各各 麝脂乙 麝少

右末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油周

綠礬散 治甲疽瘡

綠礬半兩 蘆會乙 牛膝乙

右研如粉以絹袋盛藥納所患指於袋中線扎定瘡為度

烏梅醋法 治代指手指甲頭腫

烏梅 橫去殼肉只取仁

右研細米醋調得所入指漬之自愈

中法

十樣蚯蚓和猪脂搗如泥傳

生方

生蟹取黃隨瘡大小編傳之

用麻油調塗 又方 雞子黃打開塗

方 磨鐵槽中取泥塗磨刀石下泥亦得

滑石粉 治癩瘡

綠豆粉式 軟滑石兩

右末拌和以綿撲子蘸撲仍以石粉佐之

紫草膏 治熱瘡

紫草茸 黃連 黃柏

漏蘆各半兩 赤小豆 綠豆粉各乙 合

右搗細入麻油為膏日三傳常服黃連阿膠圓清心

又方 治熱瘡淫濕

南星 半夏 黃柏 黃連各乙 分

五倍子煨 號丹各半 分

右細末摻瘡加煨白礬更瘡加雄黃

又方 熱瘡止痛收汁先用大腹皮苦參白芷煎湯泡刺不洗用

地俞

苦參

黃連等分

右為細末入些

真蚌粉

乾搗更痛加去皮

綠豆

檳榔散 治冷瘡

雞心檳榔

木香

硫黃

薑黃各半兩

吳茱萸式不磨乙字

右搗末麻油調傳有膿則乾搗

赤豆散 治無名瘡

赤小豆

吳茱萸

赤色白膠

厚黃栢

黃連

貝母

硫黃

糯米各乙分

號丹散

右末麻油輕粉調抹

身羊膏 治頭白禿瘡及惡瘡腫瘡

質猪糞臘月收燒灰

檳榔式不

雄黃乙字

右末告以麻油調和

鴨子膏

約頭大小作厚餅溫覆頭上引

虫不可執覆不得動頭時十分癢忍不得令人急手搗起次

用**苦練根**煎湯淋洗拭淨濕則搽乾則**麻油****輕粉**調抹

治頭爛瘡**蘇合**為末搽

竹葉膏 治兩脚骨癢瘡先用

小網蝦三十尾去頭殼尾

右同糯米飯一合研細臨卧以帛扎患處上下次以青紗罩

瘡却將蝦飯傳青紗上別用青紗罩蝦飯之上擊定至五更

初解紗連蝦飯揭起掛空閑處皆是小赤虫即以**漢椒****葱白**

煎湯候溫淋洗次用舊茶籠內白竹葉隨瘡大小剪貼軟帛

繫之一日兩換直待汁水出盡方以好膏藥貼逐日煎**苦練**

根湯淋洗仍換膏藥直待生肉將滿則不用膏藥其瘡口只

如筋尾許乃可以**血竭**或**降真香**節夾**白欬**取平瘡口切忌

動風發氣等物

天麻散 先用**制天麻**入**白鹽**少許煎湯洗拭次用

雄黃

雌黃

硫黃

白礬各二錢

鷹爪黃連法厚黃栢各三錢

輕粉半錢

靛丹二錢

右並細末外用酒盞煎

巴豆肉二錢瀉清筆蘸抹藥

末摻其上妙甚

又方 先用

木香 檳榔 貝母 等為末摻

五倍子

白芷

又方

雀巢糞燒帶

雞心檳榔三錢 真龍骨二錢 輕粉壹字

右末麻油調傳先盪湯洗拭後用藥兩日一換

又方

中鯽魚二尾

滿尺皂角壹條 穿山甲二錢 入皂角內

右細末先以井花水洗盪膿汁用白竹葉一葉針插多孔

於瘡一候水出盡然以麻油輕粉調藥傳

又方 先用酸漿水溫暖淋洗次用

生覆盆子葉瓦上曬乾

右碾極細乾摻紗扎次日以新水濕去痂又用溫漿水洗拭

藥傳 治妬精瘡

青黛乾

欵冬花等分

麝少許

右末先以地骨皮煎湯溫洗軟帛拭乾次以津唾調

又方 久年冊皮青紙以津唾粘濕貼上明日又重貼勿動自愈

舊青紙蓋取青黛涼而煞虫紙無性耳

治陰濕瘡方

綠色燼其石壹分

真蚌粉半分

右細末撲傳

豆豉散 治陰蝕瘡

綠豆粉

蝦蟇灰各壹分 臘脂半分

右細末乾摻

神降散 治走皮癩桑寄生 壹小把桑根 取皮壹握白芷

連煎湯 溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾傳藥

蒲尺皂角去核

燒存性

麻竹大籜燒存性

厚黃栢

鷹爪黃連

瓜樟葉乾

白芷

右逐件為末等分麻油調抹自然生七神效謹勿喫醋

又癩瘡發散不止

凌霄煎湯 溫洗凌霄傍松柏榎生數次洗效

煎湯

方見雜症門

諸瘡皆可服內消其毒凡洗瘡須用藥草

疎風解毒散 治諸惡瘡頑癩開熱及婦人血風遍身紅斑圓點

斑中漸發疹那開爛成瘡癢痛

白芷

細辛

蒺藜炒去刺 麻黃去節

雞心楨榔

當歸鬚

生乾地黃

川芎

赤芍藥

川獨活

牽牛微炒

蒼朮炒

桑白皮炒

枳殼製

甘草微炒

右剉散每服三錢入黑豆七十粒紫蘇五葉薑五片同煎服如大便秘加些生大毒次用目膏傳瘡

貝母 三錢半 半夏 生

南星

五倍子

白芷

厚黃栢

苦參略 二錢

號丹煨 一錢半

雄黃 一錢

右細末初用蜜水調傳兩三次後只乾摻先以蜂房白芷苦煎湯熏洗拭乾即用藥或間有留滯不瘡以

好膏藥貼

亦色白膠錢一明白椹錢三 黃色黃丹半錢

右細末麻油調傳先以酸漿水煖過洗瘡拭乾用

又方目為末入些雄黃搽

治久不瘥

黃連等分

右細末以雞子清一箇打碎鋪新瓦上焙為末夾上頂藥油調傳先用白芷煎洗

諸瘡調傳方

蒲尺皂角去灰核

黃連淨半兩赤色白膠

五倍子各三錢蛇床壹錢

黃丹假二錢輕粉半錢

右細末先用柳枝煎湯洗拭後搽或用黃連半兩蛇床一分輕乾為末麻油調傳

來頭瘡方

黃連為末用調傳所是於碗中將艾一撮燒煙調傳上熏之德再加艾熏用

右頭丸瘡方

五靈脂

白礬

白芷

青黛

好草烏各壹分

右為末麻油調傳

頭瘡方

頭枕後生正者為腦側者為痺

輕浮白浮石燒存性為中

右麻油調雞羽刷上勿用手按即漲或用黃牛糞於耳上音乾加之尤好亦治頭瘡

瘡方

大乾芭蕉葉慰中內燒存性

右為末麻油打和傳與留頭以軟紗貼換易三次或散

或破無痕

穿山甲

蚌粉同炒

仁末 麻油 調傳

生艾 白芷 大腹皮 連根葱

右煎湯洗拭以 鹽菜入些 生艾 搗細蜜水為膏傳亦治 惡瘡

又無方

硫黃 黃連 淨分 黃丹 赤白膠
蛇末 樟腦 髮灰各半分

又方 右末濕則搽乾則 麻油 調傳

白礬 煨 五倍子 厚黃栢 黃連 淨

黃丹 煨 海螵蛸 貝母 等分

石為末入 麝 少許 搽痛則加 地榆 癢則加 苦參
方見諸惡瘡類 加 黃連 蜂房 關石 帶 尤好或四

白禿頭方 難瘡 半入法醋須以雞羽掃傳

當歸 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或腫痒

膿水浸淫或發赤疹痞癩 川芎 芍藥 地黃

當歸 防風 白疾藥 去 荆芥 穗 各一分 錢

何首烏 黃芪 甘草 各八分

右吹咀分二貼每貼水二盞 三片煎八分溫服 治諸惡瘡痛痒不定心煩口乾及婦人血風紅斑圓點

開爛成瘡流黃汁

川芎 當歸 芍藥 地黃

防風 荆芥 連翹 牛旁子 研

山梔 黃芩 瞿麥 木通

諸瘡

意各付卷十四

十九

瓜蒌根 麥門冬法 甘草絡等

右咬咀每貼七錢水二盞法二十莖同煎八分服

方治一切疥瘡

雄黃伍錢 樟腦伍分 大楓子餅 斑蝥各十足翅炒

狗脊 蛇床子 寒水石 硫黃各伍錢

右為極細末疥瘡用酒調搽癬瘡用酒調搽

方治疥瘡神效

大楓子肉 樟腦各一 水銀 皂礬各一

油核桃肉 旧燭油

先將大楓子搗爛次加樟腦水銀各伍錢核桃碾和為末再將

方熬化入藥和勻搗破瘡搽之效

方治凍爛脚成瘡

黑附子生法

右為末酒調貼

方治凍耳成瘡痒痛

黃精 白欬各伍錢

右為末先湯洗次用香油調搽

方治手足皸裂

方二兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮

軟拭乾將藥於慢火上更炙擦傳

方治手足皸裂春夏不愈者

生姜汁 紅糟 鹽 猪膏臘月

右研爛炒熟擦入皸內一時雖痛少頃使皮軟皸合再擦則

安

方治脚跟皸

用醋一大握酒一碗於瓦器內熬候油沸雨化爛出

火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟

拭乾傳其上即安一方加米

者

附楊梅瘡方

防風通聖散

治楊梅瘡初起疼痛增寒壯熱方見中風門

本方每服加(中)四兩如汗多去(麻黃)大便溏去(硝黃)服之

又方

冷飯團一名上 五加皮 白鮮皮 防風

白芍藥 木瓜各一兩 皂角 白丑各三

生地黄酒 地骨皮 牛膝 黃連

槐花 川芎 尋風藤 葳靈仙

白茯苓 杜仲斷 白芷 當歸酒浸洗

甘草各半 荆芥穗一兩

右吹咀作二十服每服用水一鍾(酒)一鍾煎至一鍾在上食後服在下食前服忌(中)

又方

當歸 連翹 羌活 荆芥穗

薄荷葉 枳殼 黃柏 茯苓

車前子 防風 木通 芍藥

川芎頭上 山柰 桔梗 天花粉

姜蚕 白芷 甘草 金銀花

獨活各壹 柴胡 前胡各半

右吹咀作二十服每服用水二鍾煎至八分溫服上多食後服下多食前服服此仍用熏藥並治

治楊梅瘡神効

人參 白朮 當歸 生地黄各壹錢

防風壹錢 木通 苦參 川芎

連翹 薏苡仁各壹 木瓜 皂角刺

天花粉各別 甘草 羌活 青風藤各伍

白鮮皮壹錢 山牛參兩 金銀花壹錢

右吹咀每服水三碗煎至二碗一次用渣并二次忌(燒酒)(茶)

生肉

薰楊梅瘡方

雄黃

沉香各分

乳香

沒藥

硃砂各分

血竭各分

黑鉛

水銀各壹

右為末均作紙撚七條用香酒點灯放床上令病人兩腿抱
住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不損口頭一
日用三條後每日用一條薰之有效

方 治楊梅腫痛腫塊

杜枸杞子

防風

牛膝

牙皂

枳椇

當歸

連翹

苦參

蔓粟壳

姜蚕

赤芍藥

杜仲

荆芥

白癬皮

川芎

皂角刺

木瓜

防已

薏苡仁

天麻

木通

金銀花

茯苓各等分

黃柏

牛旁子

右咬咀每服一兩加酒四兩水五碗煎三碗病在上

食後服病在下食前服忌食鴿魚牛肉煎炒虛者人參服之
神効外用秘傳止血定痛生肌散搽之去腐生新收口方見

疥癬

疥癬方論

疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之沉
深者為癬疥則多因風毒挾熱得之癬則多因風毒挾濕得之
疥發於手足或至於遍身癬則肌肉癢疹或圓或斜或如首每
疥散內藏汁而外有筐二者莫不均有虫也亦莫不易為之染
癬也癩赤癢痛作瘡有膿曰天疥隱起帶根搔不知痛曰馬疥
瘡癩含漿摘破出水曰水疥癢而搔之皮起乾痂曰乾疥薄皮
小瘡常常淫汁曰濕疥此疥之名目然也乾疥則搔出白屑索
然彫枯濕疥則淫如虫行搔之多汁風疥則瓜擦彈頑不知痛
養疥則狀如牛領皮厚而堅其若時作微癢白點相連是之

疥癬

疥癬方論

十二

謂疥癬輪廓全無縱橫不定是之謂疥癬此疥之種類然也疥癬治法驅風殺虫固也然殺虫於其外亦須以硫黃輕粉調抹者無熱用藥加減又當權衡

疥癬證治

透明生硫黃 半兩

明白礬 各錢半 白葉 壹葉去中心

右末 麻油調抹

又方 疥癬方

硫黃 明礬 各半兩 黃連 淨 各錢半

雌黃 胡粉 蛇床 各錢半

右細末 猪膏稀調抹

生明硫黃 辨黃丹

煨 各壹錢 輕粉 半錢

右末 乾擦 熱疥赤腫加調抹

生明硫黃 辨爛石膏 貳錢 黃丹 壹錢 右末 麻油調抹

生明硫黃 辨胡粉 黃丹 各貳錢 右末 乾擦

痛尺不蛀皂角 參條炙去核為末米醋 貳大蓋煎如飴膠 輕粉 調抹 治瘡疥

斑蝥 生用 明硫黃 藜蘆 各參錢 輕粉 壹錢半

右網末 調擦

鯽魚 壹頭 生髮 壹雞 明硫黃

雄黃 各半兩 生猪脂 肆兩

右件先煮猪脂溶沸即入鯽魚煎令煙尽入髮銷盡瀝清即入

又方

草烏頭不去皮尖截小塊壹半用猪脂煮令淨黃壹半用鹽炒令焦黃

右末酒麪糊圓桐子大每拾伍圓茶酒恁下亦治諸風頑痺

又方

先用川椒連根葱豨薟草煎湯溫洗次用

吳茱萸

生半夏

草烏

白芷

赤小豆等分

右細末米醋夾生蠶稀調傳

又方

紫背草入生明礬研細傳兩三次斷根

又方

生硫黃

消石

明礬各半兩

雄黃

雌黃各壹錢

輕粉壹錢

右細末好麻油調傳溫則搽

又方猪脂真膩粉搽

小兒癩猪脊骨髓條研和膩粉傳

乾癬方

很毒

草烏頭各壹錢斑蝥七枚去翅足

右生為末津唾調抹

溫癬方

明礬搗

黃連各半兩胡粉

黃丹

水銀各壹錢

右末用猪脂油二兩夾研令水銀星盡散磁合收用

又方

斑蝥去頭足糯米炒去米

右為末以淮素盪軟取肉研圓津唾調抹

牛皮癬方

旧皮鞋底燒存性麻油調抹

又方

石榴根取皮明礬末擦切莫用醋則虫沉也

調下
五更喫炙牛肉一片細嚼下少刻以真輕粉醇酒

遍身牛皮癬方

川烏

草烏 去皮尖

何首烏

白芷

蘇木 等分

右截小片臘月宿脂者焦候令入鹽少許磁器收時常挑壹匙酒調空心服

又方

雌黃末入輕粉宿膏調抹

附諸方

連粉散 風癬濕瘡並皆治之

黃連

膩粉

黃栢

黃丹

枯白礬各一輕粉

龍骨

苧甘石 各五分

右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽

碧玉散

治癬 銅綠

硼砂

白礬 各等分

右為細末香油調搽

又方

風通聖散去青黃加浮萍皂角刺服又用

耳浮萍煎湯洗

又方

浮萍

蒼耳

蒼木 各壹兩

苦參 壹兩

黃芩 兩

香附 錢

右用酒糊為丸

治癬神効

巴豆 十枚

黑棗 五箇

共搗為爛搽之立効

治諸癬神効

川槿皮

剪草

木鱉子 各等分

右為細末用醋調塗之即愈

赤癬

各等分

廿五

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十四終

黃芩兩 香附兩 蒼朮兩 苦參兩
各半 蒼朮兩 苦參兩

天 黃 天 黃 天 黃 天 黃

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十五

諸虫

拆傷

諸虫方論

經云人身中有八萬尸虫若無即人身不成立尸虫與人俱
生狀如馬尾或如薄筋出則在脾入則五臟之俞居之然人亦
不必盡有有亦不必盡多也古方論臟腑九虫多寡有無固未
可必亦當備識其名目凡虫者何一曰伏虫二曰白虫三曰肉
虫四曰肺虫五曰胃虫六曰脾虫七曰赤虫八曰肺虫九曰肺
虫 虫俗謂之食虫固不待辯而知矣其他皆由臟腑不實脾
胃俱虛雜食生冷其肥油膩穢藏等物節宣不時腐敗停滯所
以發動虫之為候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來乍作乍止
色白形扁摸人精氣力乏腰疼燒虫細如菜虫能為痔瘻
瘡癩疥癬癰疽等患寸白蟻蚘是三者皆九虫數中之一物也

外此又有兒童疳積昏睡煩燥鼻爛汁臭齒齲生瘡下利黑血
支集疳論附之其傷寒濕霍證候虫食下部為狐下唇有瘡虫
食其臟為惑上唇有瘡活人總括言之詳矣

諸蟲證治

無名散 取諸虫

雞心檳榔錢三 蕪荑二錢 木香壹錢

右末為壹服當晚先煎**石榴根湯**湯至五更喫炙肉壹片嚼
細引虫上至喉以**石榴根湯**煖溫調藥服虫自軟而下

木香檳榔圓 殺下諸虫

雞心檳榔壹錢 木香 鷓鴣壹錢 貫衆

錫灰 乾漆燒煙盡 史君子肉各半兩

輕粉貳錢 雷圓 巴豆肉各貳錢半

右細末飛白麩糊圓麻子大每服貳拾粒五更粥飲下或**蒲石榴根煎湯**下

錫灰圓 取寸白諸虫

錫灰研細末 雞心檳榔 貫衆各半兩

木香貳錢半 輕粉 黃丹各貳錢

右細末酒醋煮麩糊圓荔枝乾大每壹圓米泔浸軟日衙先
喫飯了至黃昏不飢飽時喫肉脯壹片引虫俟少刻溫酒嚼
下天明虫出**專喫韭菜**治寸白虫

蝦蟇圓 殺虫

大蝦蟇乾壹箇炙令焦 木香 雞心檳榔

貫衆 桃仁水浸去皮 苦練根 酸石榴根皮各三錢

蕪荑 鷓鴣各貳錢 巴豆肉貳錢

右末粳米粉糊研圓麻子大每服拾圓五更石昌蒲煎湯下

雄砂圓 殺諸虫

鷓鴣 蕪荑 乾漆燒煙盡 直僵蚕各壹錢

貫衆 酸石榴根皮各半兩 朱砂

諸蟲

真齊十貴天十五

二

雄黃

雷圓

甘遂

各壹錢半

右細末粳米粉糊圓麻子大每拾圓五更粥飲下

化虫散

雷圓

式箇

雞心檳榔

式箇

鶴虱

壹錢

大史君子

柒箇

右細末入（藥粉）少許分作兩服當晚用精猪肉壹兩切成片以（皂角）漿浸壹宿至五更微火炙熟又用些（麻油）拭肉候溫取壹服藥末參於肉上略烘過空腹食之至巳刻虫自下酒飲食

實衆酒

取寸白諸虫五更嚼炙肉壹片莫吞俟虫尋肉其頭向上却吐出肉嚼（史君子）叁箇并（輕粉）壹字吞下少頃以當晚所煎（實衆酒）吞（解毒雄黃圓）柒粒瀉下皆虫也

殺諸虫

醇酒

壹盞

蜜

壹合

蠟

三錢

蜀漆

一兩

右銅銚內慢火同熬可圓即圓彈子大每服壹圓溫酒化開

佛前服之虫自下

雄黃下諸虫

檳榔

五錢

大黃

兩

黑牽牛

兩

皂角

斤

定細

苦煉根皮

壹

右件將（皂角）

（苦煉根皮）二味用水一大碗熬成膏子一處搜

和前藥二味研細末為衣先用（泥）

（衣）後用（雷丸）

（末）

（衣）每

服三九四更時分用（沙糖）

水送下

方取寸白虫

紫煑榔

十箇

何陽石榴皮

十

右水煎露一宿以下虫為度

方治吐虫有積

黑錫灰

煑榔

右為末（米飲）調下

諸虫

真文厚更矣十五

三

木香三棱散

瑞竹治腹中有虫面色痿黄一切積滯

黑牽牛半生半

大腹子式錢 煨御

雷丸

錫灰醋炒

三棱煨

蓬朮煨

木香式錢

大黃二斤

右為末每服伍錢用沙糖水調服先將燒肉一片口中細嚼

吐出然後服藥一方加阿魏一錢無黃仁三錢

一方消化虫毒在腹作痛

煨御

酸榴根皮焙 各

紅丹煨

雷丸

貫衆如雞頭者

君子肉絡式 甘草炙

枳殼製

大黃絡五

右為末清油打溲雞子餅抄藥一錢於上空心捲而食之見

小糯米糊九栗米六每服二三十丸以淡酒或雞子餅

下空心亦佳

烏梅丸治胃冷蛇虫攻心痛嘔吐四肢冷

專快柳散治男婦心脾痛虫痛

方並見別門

虫盤毒母

毒毒方論

害人利己識者不為昧者競趨之而况傷人性命以圖家道之
温煨此為富不仁之甚者也夫蠱毒有數種皆妖魅變惑之氣
其怪使然人有造作而得之者多取虫蛇之類以盆盎盛之任
其自相啖食其間一物獨存則以之為蠱即能變惑隨酒食以
毒害於人他人受殃則蓄事之家日益富盛又有一種飛蠱條
爾去來狀如鬼氣得之卒重吁母怪乎變現惑人之不可曉也
九中蠱毒不論年月遠近但煮一雞卵去殼以小銀釵插入其
中併含入口一飯之頃取視釵卵俱黑即為中毒又法以水一
碗唾津液入水其唾沉則為蠱浮則非蠱又法口含大豆中蠱
者豆脹爛而皮脫非蠱則豆不脫爛其候面目青黃力乏身痛

唇口乾焦煩燥而悶胃脇妨滿肚脹皮堅腹中鞞鞞切痛如虫
醫又如虫行唾吐鮮血小便淋瀝大便膿血雜下病人所食之
物皆变化而為虫侵蝕臟腑蝕及則死矣死則病氣流注復染
著於傍人夫是之謂蠱症

九中蠱人用藥已瘥自後飲食未不得喫冷若飲食帶冷鬼
氣乘之毒虫復生竟不能救

蠱毒證治

治蠱毒挑生毒神呪出大藏經典九在外飲食先默誦七遍則
其毒不行呪曰姑蘇琢磨耶琢吾知蠱毒生四角父是穹窿穹
母是舍耶女眷屬百千万吾今悉知汝摩訶薩摩訶如飲食上
有蚊蛛必便莫喫又法每遇所到處念藥王萬遍七遍亦可辟
之灸蠱毒於足小指尖灸三壯即有物出酒得之隨酒出飯
得之隨飯出肉菜得之隨肉菜出

保靈丹 治蠱毒諸毒一切藥毒神妙出劉涓子神仙遺論雜家

普濟方一卷九三慶刊

朱砂海細研 大山豆根畔雄黃 黃丹

麝香 黃藥子生并末

川巴豆取肉不去油 斑蝥去毒用足

糯米炒半 赤蜈蚣式條一袋一生

右十味各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不令雞
犬婦人見用糯米稀糊圓如圓眼核大陰乾磁合收每服一
圓好茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條
聲將次毒物下或自口出或大便出嫩則是血老則成蠱或
蠅娘諸雜帶命之物藥圓凝血並下以水洗淨收之可救三
人如中毒口噤即挑開下藥或蛇蝎馬汗諸毒以好醋磨傳
患處立解服藥已效如知毒害之家不必研究若訝之其毒
再發不救瘥後更忌酒肉毒食一月惟軟飯可也或急用但

釋吉日精製修合

聖黃圓治蠱毒心腹堅積羸瘵骨立

朱砂研

雄黃研細各半錢 藜蘆去芦頭 莽草微炙

鬼臼去鬚各半兩 肥巴豆肉去油

麝香壹錢

青色大蝦蟇存帶生 斑蝥去翅足

右細末煉蜜和搗伍伯杵圓如小豆大每伍圓空心温酒下少刻更喫粥飲一盞利出虫蛇惡物若不吐利更服二丸必效

真病解毒圓治蠱毒挑生毒藥毒草毒畜獸毒方見雜症門

真堅志治蠱毒方

五倍子壹兩 硫黃末 甘草三十半生 丁香

木香各一錢 輕粉半錢 麝香少許 糯米二十一粒

右搗味剉細入磁瓶內用水滿拾分煎取柒分候藥面帶皺皮為熟生絹濾去滓空腹通口服却令病人平正仰睡高起頭覺腹中有物衝心者三即不得動若吐出以桶盛之如魚鰾爛肉之類乃是惡物吐罷喫茶一盞瀉亦不妨少進白粥

為補忘生冷油膩鮮脯鹹藏五日後服真病解毒圓二粒

日又服貳粒自然平復

生來圓治蠱毒

正料平胃散

右用好三和圓桐子大每七十粒空腹温酒下加至百粒

東坡准黃圓治蠱毒及虫蛇畜獸毒

雄黃 明白礬生研等分

右端午日研細溶黃蠟為圓桐子大每七圓念藥王菩薩藥上菩薩七遍熱水送下

破鼓皮燒存性為末 新水調或錢服之中

又方 蚕退紙不拘多少以麻油紙熱燒存性

右為末研細新水調一錢頻服諸中毒面青脉絕昏迷如醉

蠱毒

口禁吐血服之即蘇

七寶圓治蠱毒

破鼓皮

蠶退紙各燒存性刺蝟皮

五倍子

續續子

朱砂研

雄黃研

右等分為細末糯米稀糊圓桐子大每七圓空心熟水下

又方治蠱毒亦治挑生毒

川升麻細剉一兩作一服水煎常服

又方

明礬生末夾好茶水調解百毒

挑生

挑生方論

人苟愛身不可輕於濯水江南有射工毒虫其色黑形如肉筋口中橫骨如角弓生溪澗內或因雨潦逐水而入人家舍沙射

人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不能語又水毒虫一名溪温得之病狀與射工相若但有爛瘡為射工無瘡為溪温狩少異耳又沙蚤虫細如疥虫視不得見遇陰雨則行出草間着人身則鑽入皮裏刺如針芒是三者為病朝輕暮劇皆能殺人以方術灸法即葷治之治之不早變生飛蠱倏入患軀吸食五臟而死矣挑生之毒其類是乎挑生多於飲食過度凡魚肉果菜茶湯酒醋之中皆可挑毒以中人自嶺以南率多有此其候初覺胃脘作痛次則漸漸攪刺十日生於腹中生則能動矣治法胃痛則為生在上膈腹痛則為生在下膈在上膈者用鹽半錢投入一盞熱茶之內候藥溶化通口服之少頃以雞翎攪刺喉中取吐在下膈者用山二錢末之米湯調下即瀉出惡物吐瀉以後以人參壹分白朮壹分茯苓倍之碎為麩末新汲水和入磁瓶中慢火煨至半日每一盞通口服日兩三劑前蠱毒挑生况常須誦之抑有聞焉二廣山谷間有草曰胡

真章亦曰**斷腸草**或以藥人急水吞之急死緩水吞之緩死又有取毒蛇殺之以草覆蛇以水洒草數日菌生採取為末入酒毒人始亦無患後再飲酒毒發立死其俗淫婦多偶合北人情好雖稠不肯歸北陰以藥置食中與之還即叩之曰子某年來若從其說復以藥解之若過期不來則斃矣戒之哉戒之哉

挑生證治

萬病解毒圓治挑生毒蠱毒藥毒草毒金石毒百虫毒蛇毒獸惡毒鬼胎鬼氣癰疽諸病一切毒出入可以此藥隨身若覺意思不快四大不和即磨服之方見雜症門

好茶

好茶

中諸毒證治

生明礬各壹錢沸湯調服即吐毒

立勝散治虫蛇蜂蝎蛇蜘蛛沙虫等傷毒

大紅川椒去核十五粒 一豆豉十粒

右同入口嚼爛唾在手心次將**南星末**調和得所傳傷處毒水自出續又再傳神效

又方

貝母為末

右每服半兩令病人盡其酒量剝飲良久酒化為水從傷處出俟出盡又以**貝母末**塞瘡口妙不可言

蠅蚩方蠅蚩妖虫也隱於墻壁間尿射人之影令人遍體爛瘡

如湯火所傷治法以

雞羽燒存性

右麻油調傳雞食百虫故能治之或用**蘇葉**水調傳或南回

蘇葉自東取土末之新水調傳

天蛇毒方

秦皮濃煎服**蚌粉****滑石****貝母**末傳

蘇葉**蘇葉**

朱砂

雄黃等分為末法醋調入口鼻

治挑生毒蟲毒野毒方

川升麻多煎類服

解毒藥毒絞腹內毒方

藍青葉多研水調服

五絕欲死方

半夏末水圓風乾入鼻氣回即活

頭風方

又方麻油調輕粉塗髮

身取方

水銀和(關風)末帛搽之為索繫衣自落

獨勝散

解藥毒蠱毒虫蛇諸毒

大甘草節以真麻油浸年歲愈多愈妙

右取甘草嚼或水煎服神效

附跌撲損傷

跌撲損傷方論

袖珍方云折傷者謂其有所傷於身軀者也或為刀斧所刈或墜墮險地打撲身軀皆能使血出不止又恐瘀血停積於臟腑結而不散去之不早恐有入腹攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用(獨勝散)之類化利瘀血然後歎心調理生肌或因折傷而停鬱其氣又當順之子和六諸落馬塚并打撲傷損閃肭損折杖瘡腫發嫩痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜以(獨勝散)等藥或加湯劑瀉之後服(獨勝散)毒之藥

和劑方 治一切金刃所傷打撲傷損身軀血出者急

於傷處搽藥其血自化為黃水如有內損血入臟腑熱煎童子(小便)入(酒)少許調一錢服之立效若(腸)腸出不損者急送入用細絲(藥)火茸為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無(藥)亦得並不得封裹瘡口恐作膿血

如瘡乾以潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡惡血奔
心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃上色明淨者四兩花藥石為末

右二味相拌和勻先用紙筋和盆泥固濟瓦罐子一箇候乾
乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚至書八卦五行
字用炭一秤籠疊固匝自已午時從下着火令漸漸上徹直
至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以絹羅子羅至
細磁合內盛依前法服

金匱治馬墜及一切筋骨損方

大黃一兩切浸絳帛如手大亂髮如雞子炊單布一尺

敗蒲一把桃仁四十九个甘草如中指

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃
去滓分溫三服先剉敗蒲平領煎湯浴衣被奧斯浪通利
救行痛楚立瘥

發明方治從高墮下惡血留於脇下疼痛實不可

忍者

柴胡兩當歸六分其草 川山甲二各

大黃酒浸桃仁去皮尖紅花 瓜蒌根各二

右件桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二盞半酒半

盞煎至七分去滓食前大溫服以利為度得利后痛或不及

服乳香靈樞云墜墮惡血留於脇下則傷肝肝胆之

經行於脇下為厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸活

血脈又急者痛也以中草緩其急亦能生新血陽生陰長故

也為臣川山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒

製以蕩滌敗血為之使

治腰脊痛或打撲損傷從高墮下惡血留在太陽經中

令人腰脊或脛膈臂腰中痛不可忍

中桂 地龍各四羌活二各黃柏

耳草絡一
蘇木六分
麻黃五分
桃仁六分

右吹咀每服半兩水二匙煎至一盞去滓溫服

傷風 瘵馬落卓傷腕拆臂疼痛服此藥疼痛即止筋骨即當相連

澤蘭各 附子炮各 當歸炒 蜀椒炒
甘草各 桂心各 芍藥各

右為細末每服二錢溫酒調服日三息生葱 猪肉 水 生果

沒藥 乳香 當歸 川椒

自然銅醋 赤芍藥 敗龜炙 虎骨

白芷 骨碎補各 千金藤解李仁是也

又方加龙骨川芎

右為細末化臘半兩丸如彈子大每服一丸好酒半升化開

煎用東南柳枝攪散熱服

秘傳止血定痛生肌散專治跌打損傷牙咬刀傷出血諸般腫毒出膿後肌肉不生痛不止者並皆治之方見破傷風明

一方治刀傷斧斫 五倍子一味為末乾貼神効

桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾末貼之妙

湯火瘡

用臘月猪胆塗黃柏炙乾為末付之

一方治火燒

桐油 水各

右二件以桃柳枝不住手攪成膏再入少水溶外用猫兒肚底毛細剪摻上

一方治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黑為度研為末脂粉減半油調塗之

四黃散

治湯瀝火燒熱瘡連痛

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白芨各半

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡

瘡瘡方

用煨神效多年乾白者火煨為末如瘡破用乾摻之如不破

輕粉清油調傳之

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十五

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十六

婦人

子嗣

產婦傷寒方論

或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百一十三方此張氏截然之筆削也於其證則有其藥易嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而胃滿讖語者是則邪氣結於胃脇當刺刺期隨其實而取之傷風經日續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適來晝醒暮讖如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前

安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何
系寄生 **阿膠** **縮砂** 為要藥他如 **桂枝** **半夏** **桃仁** **大黃** 墮胎及燥
熱等輩則不可輕用也消瘀者何 **川芎** **蒲黃** **赤芍藥** **生地黃** 為
要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以 **阿膠** **桑**
寄生 **人參** **茯苓** **白朮** 等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以
芫 一分 **官桂** **芍藥** **厚** 半之 **姜** 同前為解表消瘀以 **葱白**
姜 大劑濃汁為產前發散以 **小柴胡湯** 去 **半夏** 和解熱入子宮
郭稽 中以 **枳殼** **防風** 一度 **甘草** 減半末之點服主大便秘澀又
以 **蜜** 導一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣
雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛 **枳殼** **香附**
陳皮 以調氣也 **當歸** **川芎** **黃芩** **人參** 以扶虛也退熱則 **柴胡** **黃**
本 解肌則 **紫蘇** **乾薑** 滋腸則 **麻仁** **枳殼** 助陽則 **乾姜** **良薑** 其間
採撫雖未備古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人
之意姑存之篇末以便學者之觀覽云

婦人論

男女均有此血氣人皆曰婦人以血為本何邪蓋其血勝於氣
耳血藏於肝流注子臟而主其血者在心上為乳汁下為月水
合精而為胞胎獨非血乎血之所以流暢於經絡者氣實使之
又不可舉一而遺一也女子十四而天癸至 男子二八天癸至
精氣益寫衝任二脉男女均宜 **白帶** 通太衝之脉盛故月候以
時而行 **衝** 者血之海也 **任** 者經絡之餘也經言其常其來
有期無過不及反此皆病其不行則尤甚百病生焉○自其血
氣和平陰陽調順則精血聚而胞胎成胞胎已成而心腎二脉
其動也應手而疾蓋心之所主者血腎之所主者精精血交并
而成之精勝則為男血勝則為女此亦自然之理也○自其血
氣不調陰陽愆伏過於陽則經脉前期而來過於陰則經脉後
期而至蓋血性得熱則宣流得寒則凝澀陰氣乘陽內寒血澀
故其來乍少陽氣乘陰血熱流散故其來乍多過與不及皆致

病也○然經脈不行其候有三一則血氣盛實經絡竭閉其脈
滑實見之當通經疎利一則形體憔悴經絡涸竭其脈虛弱見
之當滋養血氣一則風冷內傷七情內賊以致經絡痺滯其脈
浮濇見之解散風冷去瘀生熱經脈不行此諸病之所由生也
○是故血虛閉熱盜汗筋挛則為虛勞血少水涸燥氣乘肺則
為乾嗽宿寒留滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊特發寒熱則
為瘕癥或風寒滯經血化為水流溢四肢謂之血分或脾不制
水血與水并浮脹肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內慾過度風和
冷熱不氣入於胞門穢液與血相兼而下冷則多白熱則多赤
冷熱不調赤白相半謂之赤白帶或衝任勞損經海傷動脾虛
衛弱不能約制其血倏然暴下謂之崩中亦有非時血行淋瀝
不斷謂之漏下崩之中復有瘀血時崩時止謂之崩中漏下所
下五色各應五臟五臟俱虛五色俱下婦人血海挾受風邪血
換金正氣散加川芎官桂玉之以至眩暈煩悶嘔惡怔忡迷亂

多忘發狂妄語小便不禁此婦人以血受病最多而血之為病
遇夜愈增劇也血屬陰陰虛則夜爭○然則產育一科可得聞
乎曰產前之病其脈貴乎實產後之病其脈貴乎虛產前為之
順氣安胎產後為之扶虛消瘀此其要也抑產育之後血衰氣
弱宿瘀未盡飲食起居梳洗解脫一有不謹得病猶甚易焉凡
婦人血氣諸疾但用四物湯加以炒吳茱萸玉之陰臟加多陽
臟加少無不効者若產難若胎衣不下若胎損腹中則入醋夾
煎或生料五積散加芍歸縮砂煎之以水醋或局方異病散用
香煎湯調下皆其類耳外此則有芍歸湯佐以縮砂調理胎
婦腹痛或胎動下血更以炒阿膠并熟艾濟之至若胎婦喘咳
則縮砂川芎炒阿膠等分入生薑烏梅紫蘇最良胎婦艱食
則調氣散積殼散等分入縮砂為妙大小產後津液涸燥帶血
停留易至大便秘結積殼散加炒桃仁用蜜水同煎入醋數沸
可也縮胎之劑枳殼縮砂烏梅所不可無安胎之劑阿膠縮砂

婦人

桑寄生又不可闕婦人多因怒氣傷胎所以安胎尤莫先於順氣其於產後發熱**黑神散**加**川芎****刺木**入**生薑****葱白**尤佳產後消痰**黑神散**須多服餌至一服以後腹中略無疼痛方可與**四物建中湯**葷服之太早則補住敗血為害非輕若夫郭稽中所編產寶方論邇來書肆別有經驗節本辭簡理明此可為產科公據

附調經諸方

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有**色紫黑及淡者有成塊者有作疼者**夫經不通或因隨胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣如虛中有熱月事不來以**四物湯**加**黃本**治之常過期者血少也以**黃本**

參木煎痰藥治之過期紫黑有塊作痛血熱也以**四物湯**加**香附****黃連**過期色淡挾痰者以**一陳湯**加**芎歸**常不及期者血熱也以**四物湯**加**黃本****黃連****香附**肥人多兼痰藥治之血枯經閉者以**四物湯**加**紅花****桃仁**痰多枯住血海也位因而下多者目必漸昏肥人多有之以**南星****蒼朮****川芎****香附**作丸服之肥人軀脂滿經閉者以**黃連****痰湯**加**芎歸****黃連**不可服**地黃**泥痰故也如用必以**美水**炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而難化也宜服上藥瘦人子宮無血精氣不聚亦令無子以**四物湯**養血養陰等藥經水未行臨經將來作痛者血實也一曰瘀血鬱滯也以**四物湯**加**桃仁****香附****黃連****紅花**或加**玄胡索****蘇木****木香**有熱加**柴胡****黃本**經水行後而作疼者氣血俱虛也以**八物湯**加減煎服又云血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行

者氣之乱也紫者氣之熱黑則熱之甚也今人悉指為風冷而行温熱之劑禍不旋踵

四物湯 和劑方 治衝任虛損月水不調常服調益榮衛滋養血氣

當歸 去劣 川芎 白芍藥 熟乾地黄 各酒蒸焙

右吹咀每服四錢水一盞煎八分空心服崩中去血過多者加**熟艾**前服

大温經湯 和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期

不行或崩中去血過多或經損娠來血停留小腹急痛五心煩熱

阿膠 碎炒 芍藥 當歸 去劣 人參 去劣

肉桂 去皮 甘草 炒 芍藥 牡丹皮 各壹

半夏 二兩半 吳茱萸 洗七次 麥門冬 洗七次

右吹咀每服三錢水一盞煎八分空心熱服

調經散 治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月而來皆可服

川歸 酒洗 麥門冬 去心 吳茱萸 擇去閉目者沸湯

人參 去劣 半夏 湯泡 白芍藥 牡丹皮 去心

川芎 各一 肉桂 半斤 阿膠 炒 甘草 各七

右細切作一服水二盞加**生薑**三片煎至一盞空心稍熱服

行經散 和劑方 治血虛煩熱月水不調脘脇脹痛痰嗽潮熱

甘草 炙半 當歸 去劣 茯苓 去皮 芍藥

白朮 柴胡 去劣 一塊薄荷少許煎服不拘時

右吹咀每服三錢水一盞煨**鹽**一塊薄荷少許煎服不拘時

加減吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止

赤白帶下小腹急痛每至經行時頭眩飲食減少氣痛心

松肌膚不澤悉皆主之 吳茱萸 酢 麥門冬 乾姜 白茯苓

吳茱萸 酢 麥門冬 乾姜 白茯苓

牡丹皮
 當歸半兩
 半夏七片
 南木香
 苦梗各三
 甘草三片
 北細辛半片
 防風
 官桂各一

右吹咀每服四大錢水一盞半生薑伍片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服

桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來扶如瀉水四
 月不來舉躰沉重唯欲眠睡多思酸物

桃仁
 粉草
 半夏各一
 赤芍藥
 生地黃各三
 澤蘭葉
 川牛膝
 當歸
 桂心
 牡丹皮
 人參
 蒲黃

右為粗末每服伍大錢水盞半三片煎七分空心法淨服

牡丹散 和濟方 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢躰
 困漸成骨蒸並宜服之

桂心
 牡丹皮
 芍藥
 玄胡索炒
 沒藥別研
 陳皮去白
 紅花
 當歸去芦
 甘草
 烏藥各一
 真蓬莪朮
 鬼箭

右吹咀每服三錢水一盞煎七分不狗時候

內補膏 治血氣虛損月水不調或崩中漏下去血過多肌
 躰羸困及月水將行腰腿痛重並皆治之

直蒲黃炒
 熟地黃兩半
 當歸酒煮
 阿膠炒
 白芷
 續斷
 乾姜炮
 甘草炙
 川芎各回
 肉桂
 附子炮去
 白芍藥各一
 白朮
 吳茱萸湯洗三次

右為七煉蜜丸梧桐子大每服伍拾丸食前溫酒下

內灸散

和濟方

治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛九月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉

丁香皮

熟乾地黃

洗鹿肉桂去皮各一兩半

甘草

當歸

白朮

山藥

白芷

茴香

藁本

乾姜

川芎

黃芪

木香

白芍藥

陳皮

右為末每服參錢水一盞姜伍片文十葉同煎空心熱服溫

酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸

紅花煎嘔吐加藿香生薑煎

溫經湯

大全良方

治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪朮

人參

甘草

牛膝

右以咀每服伍錢水一盞半煎至八分溫服不拘時服

菱花散

蘇家方

治婦人月水不行發熱腹脹

當歸

凌霄花

劉寄奴

紅花

官桂

牡丹皮

川白芷

赤芍藥

延胡索

右以咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

四製醋附丸

瑞竹堂方

治婦人女子經候不調

香附子

一分好酒浸七日

一分小便浸七日

一分鹽水浸七日

一分米醋浸七日

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心食前鹽酒送

下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓

六合湯

濟生方

治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸

白芍藥

官桂

熟地黃

川芎

蓬木炮各

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

白薇

大全良方

治婦人月水不利四肢羸瘦漸蒼虛之

當歸

白薇

栝子仁

白芍藥

川芎

白木

桂心

附子

草解

木香

細辛

吳茱萸略半

人生

右斛

白茯苓

川牛膝

澤蘭葉各半

槲榔半兩

熟地黄二

牡丹皮

紫石英略一

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十九丸空心温酒下

伏苓補心湯

滌瘵方

治婦人去血過多虛勞發熱

用四物湯

一兩參蘇飲三兩和勻生薑

五片煎八分温服方

見虛勞門

增損四物湯

蘭室秘藏方治血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

蓬莪朮

京三稜

官桂

乾漆炒

右咬咀每服伍錢水二盞煎一盞去滓温服食前

磨積圓

楊氏家藏方

治婦人積氣內攻經候不調腹脇膨脹刺

痛

京三稜

莪朮各煨

茴香炒

附子炮

川練子肉

白芍藥

乾姜炮各一

巴戟去心炒

當歸

艾葉炒各

右為末酒糊圓如梧桐子大每服五十圓空心温酒下

麥門冬散

大全良方

治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬

胡胡

赤茯苓略一

羚羊角

赤芍藥

桑白皮

黃芪略三

生地黄

甘草略五

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口服

附錄

頭等附錄卷十六

八

黃耆散 大全良方 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食

人參 黃芩 當歸 各七 柴胡 一兩

黃芪 地骨皮 赤茯苓 麥門冬

生地黃 赤芍藥 赤芍藥 各一

右吹咀每服一兩水二盞姜五片煎至一盞去滓通口食前服

烏雞煎圓 秘方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

人參 二兩 茯苓 三兩 香附子 四兩 當歸 六兩

官桂 地骨皮 各二 生熟地黃 各四 黃芪 六兩

右用**烏骨白雞**一隻男用**雌**女用**雄**龍佳將藥末和炒圓

雞頭大喂雞服生膠吊死湯洗淨持毛搥碎骨入前藥

雞腹內用**酒醋**各一瓶煮一宿取骨焙枯研用丸打糊同如

膠 凡心腹疼痛一各膠有沉香治婦人久虛無子產

前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥能安胎催生延
娠臨月服五七圓產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十
圓男女自至又治積年血風脚手麻痺半身不遂赤白帶下
血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹中逆脹痛
氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞
小便不禁中風不語口禁產後痢疾消渴眼前見鬼迷運敗
血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血崩不止
飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人
眾疾不論年月日深並皆治之

白芍藥 藁本 石脂 赤白 川芎 不見火

牡丹皮 當歸 白茯苓 人參

白薇 白芷 桂心 延胡索

白朮 沒藥 甘草 沒藥 江西安撫司

本草綱目卷之六

其婦之經脈經脈既調則氣血和平氣血和平則百病不生而
樂乎有子矣丹溪云若是肥盛婦人稟受盛厚恣於酒食之人
經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行溫燥痰用
星夏 **養血** **合** **防** **風** **羌** **活** **滑** **石** 或 **導** **痰** **湯** 之類若是怯瘦性急
之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣
宜涼血降火或 **四** **物** 加 **香** **附** **黃** **芩** **柴** **胡** 養血養陰等藥可宜東
垣有 **六** **味** **地** **黃** **丸** 以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎
孕

又訣云三十時中兩日半二十八九君須筭落紅滿地是佳期
金水過時空霍亂霍亂之後枉費工樹頭樹底覓殘紅但解開
花能結子何愁丹桂不成叢此蓋婦人月經方絕金水終生此
時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時過此佳期則子
宮閉而不受胎矣然男女之分各有要妙存焉如月候方經一
日三日五日交會者成男二日四日六日交會者成女過此則

不孕矣又云陰血先至陽精後衝氣來乘血開暴精陰外陽
內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血後參橫氣來助精
開暴血陰內陽外則成離卦之象而為女若胎成三月之內男
女未分之時亦有轉女為男之術其法以 **鐵** **斧** 一柄置於孕婦
床前之下勿令人見知更佩 **雄** **黃** 一二兩於孕婦身左或佩 **雌**
石 亦可已上三法皆驗不可輕忽傳曰不孝有三無後為大古
詩云無官一身輕有子萬事足誠哉是言也無嗣者宜深思之
無怠

說 **說** **圓** 利劑方治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉一兩 肉桂五錢 當歸洗 熟地黃洗

川芎 石斛酒浸 白芍藥 牡丹皮

延胡索略 白朮半 乾姜炮

右為末醋糊 丸如梧桐子大每五十九空心溫酒 下

女附暖宮丸 治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢痠痛

子嗣

思齋村世公家

十一

倦怠無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子
息服藥更能戒惱怒生冷累用經驗

艾葉大葉者法香附子去毛六兩俱要合時陳者用鹽五
火焙乾三兩吳茱萸法大川芎法白芍藥法

黃芪取黃色白色川芎法續斷法

生地黄先用一兩官桂五兩

右為細末上好米醋打糊為丸如梧桐子大每服五七十九
淡酒湯食遠送下修合日宜天德合月德合日壬子日精選
藥材為妙耳

烏雞丸治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸等疾
不能成胎

用白毛烏骨分雞一隻重二斤半許閉死去毛腸淨用艾四

兩膏四兩剉碎納一半在雞腸用酒坦雲一隻納雞并餘
艾膏在內用重便和水灌令沒雞三寸許煮絕乾取出去骨

餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為細末

南香附子去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便浸
一分醋浸一分酒浸一分春秋二日夏一日冬四日取出
曬乾

熟地黄酒浸白芍藥醋浸

遼人參各三兩川牛膝法白朮法

川芎法牡丹皮法貝母法柴胡法

地骨皮法玄胡索法黃連法

秦艽法白茯苓法生地黄法

右并香附共為細末并醋末酒醋糊為丸如梧子大每服五
六十九漸加至七八十九溫酒下或米飲下亦得忌煎炒辛
辣之物及煎茶

白薇丸大全良方治婦人無子

白薇法牡蒙法藁本法姜黃法

子嗣

當歸	熟地黃 <small>各七分</small>	川芎	人參
栝子仁	石斛	桂心	附子炮
五味子	防風	甘草	川牛膝
吳茱萸	桑寄生 <small>各六分</small>	川椒 <small>五分</small>	禹餘糧 <small>別分</small>

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九日二服忌生
菜葱熱酒膏麥酒炙燻藥菜煎藥粘食臭物
 孕育備論

經云少陰脉動甚者有子厥旨何哉曰手少陰之經屬心足少陰之經屬腎心之所主者血腎之所主者精精血合氣而成之也然而胞門子戶又所以為精血之會其於尺部二脉尤有可驗者焉且婦人尺部之脉滑是為血實必主月事不行若其來斷絕或中絕而不至者此皆無孕惟滑而不絕略無間斷於其間此則宜胎孕之脉也○婦人懷胎臟氣擁閉不可多睡不可憂懼勞役不可啖食粘滯辛辣強硬之物又不可妄施針灸所

貴時行數步調暢自適使氣得其平若酒麵炙燻熱毒重蒸若感觸風邪傳染熱氣若誤服藥餌破血動胎若七情內傷快意縱恣則易致漏胎若腹痛方來用力太早若覺則驚動胎轉未得若胎持不正奔突後逐若近產多淫觸犯禁忌則易致產難既產之後或過用心力或素有痰阻或血虛氣逆或虛極東寒則血運眩悶之益生矣○然而安胎之法有二因母病以致動胎者但療母病其胎自安或胎氣不堅因觸動以致母病者則安胎而毋自產以膠艾湯各半縮砂佐之為良難產之劑前所謂四物湯加白朮入醋夾煎黑神散用乳香煎湯調下皆其要藥產後血運先以舊法燒煙微向其鼻次則五靈脂末半生半炒入蘇合香圓百沸湯調與之或黑神散入麝香少許調以蘇合湯或花柳石散用童子小便溫溫調劑可也損孕驗法婦人面色青手足冷指甲黑而且遍體不仁腰腹痛割其或面青唇青以至舌間暗黑口角沫出則不容以人力勝之大

要將產腹痛萬勿驚動且須凭物而行直至腰疼子逼育門方可用力蓋腎繫於腰而胎繫於腎故也○俗於產下多用**理中**然蜜甘而滯不若但用**理中湯**俗於小兒初誕多用**黃連**然差苦傷胃不若但用**理中**多煎綿蘸入口良久迭用惡物自出俗於胎孕已成多服**滑胎散**然**積殼**微寒須以**縮砂**為藥為佐產後飯食米飲勿用產後盥洗沸湯是常調血以**四物**為藥以**黑神**人所共知也其石夫順氣等劑胎前產後尤當兼施而並用之血運昏迷切勿用此藥宜宜重之以塞其口

論王叔和劉元賓別男女法

叔和以左手太陽浮大為男右手太陽沉細為女元賓以右手浮大為女左手沉實為男較是二說不無牴牾然即其脈經之旨而詳之又有若異而實同者經曰左手沉實為男右手浮大為女又曰左右手俱浮大者生二女俱沉實者生二男元賓所主者此也經曰左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女

曰尺脈俱浮產二男尺脈俱沉產二女叔和之所主者此也何者沉細之說與沉實之義不同左尺浮大之說與右手浮大者亦異欲知男女之法大抵沉實者可以為男沉細者斷然為女右手浮大者固知其女左尺浮大者大抵皆男沉細為女沉實為男即所謂諸陽為男諸陰為女者是也左尺浮大為男右手浮大為女即所謂左疾為男右疾為女者是也元賓言其詳蓋合左右手而別陰陽叔和言其略特不過脈經論尺脈之義矣尚何有異同之辨哉○聖惠云凡脈得太陽為男得太陰為女蓋太陽則浮大陰則沉也脈經云尺脈左偏大為男尺脈右偏大為女左右俱大產二子大者大而有力也左右手脈俱疾二子脈來縱橫逆而不順並主夾胎左尺脈帶強右尺帶弱者為男右尺脈帶強左尺帶弱者為女胎婦遺面南而行忽從後呼之左回首者為男右回首者為女或於廁所呼之亦同又胎婦其夫左乳有核者生男右乳有核者生女

附胎前諸方

安胎當歸湯

大全良方 瘵妊娘五月舉動驚愕胎動不安下墜

小腹引腰脇小便疼痛下血

當歸

阿膠

川芎

人參 各一

束子 二枚

艾

右細切酒水各三升煮至三升內膠令烊分二服腹中當

安小便當煖也

一方有甘草無參

旋覆花湯

大全良方 瘵妊娘六七月間胎不安常處亦名阻病

旋覆花 厚朴

白木

枳殼

黃芩

茯苓 略三

半夏 方無

芍藥

生薑 各一

右吹咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去滓溫服食前忌

阿膠散

大全良方 治妊娘胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白木

阿膠

各一

當歸 炒

陳皮 炒

甘草 炒

右吹咀每服八錢生薑三片水一鍾半煎至八分食

前溫服

當歸散

金貴方 始娘宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩 略一

白木 半兩

右五味為末酒飲調服方寸七日二次或用酒調為丸如

梧桐子大每服五十九茶湯任下空心食前服日三次

桑寄生散

治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸 去芦

桑寄生

川續斷 炒

川芎

白木

香附子 炒去

阿膠 炒

人參

茯神 去木各

甘草 後五

右吹咀每服四錢水一鍾五分煎七分去滓不拘時服

半夏茯苓湯

和消方 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

旋覆花

陳皮 去白

桔梗

白芍藥

人參 去芦

甘草 炙

川芎 略半

半夏 炮二兩

赤茯苓

熟羊 各半

右吹咀每服四錢水一鍾（易）四片煎七分空心熱服

橘紅湯

和劑方 治妊娠嘔吐頭眩暈

橘紅 去白

人參

麥門冬 去心

白木 略一

甘草 半

厚朴 姜製

白茯苓 各半

右吹咀每服伍錢水一鍾（易）伍片入（煎）一塊如彈子大同煎至八分溫服不拘時

竹葉湯

簡易方 治妊娠心驚膽怯終日煩悶謔曰子煩

白茯苓 四兩

麥門冬 去心

黃芩 略三

右吹咀每服四錢水一鍾（易）伍片煎服不拘時

羊角湯

類經方 治妊娠中風頭暈強直筋脈急言謔

潘痰延不利或時發搐不損人事名曰子癇

羚羊角 鑿

川獨活

酸棗仁 炒

五加皮 各半

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁 略四

木香

甘草 各二分

右吹咀每服四錢水一鍾（易）五片煎七分不拘時服

防風湯

大全良方 治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢強急

防風

寄生

葛根 略一

菊花

防已

細辛

秦艽

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角 略半

右吹咀每服四錢水一鍾半生（易）三片煎至八分去滓加竹

白木湯

簡易方 治妊娠面目虛浮肢躄腫如水氣名曰子

腫

胎前

胎前

良方

十一

白木 生姜皮 大腹皮 陳皮

右為末每服二錢調下不拘時

腎者湯 治妊娠腰脚腫

茯苓 白木各四 杏仁 甘草各三

右吹咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前服

安胎散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬去心 通草 滑石各三 當歸去酒浸 細辛各一

灯心 甘草各半 人參

右為細末煎安胎湯調下不拘時

濟生方 治胎氣不和湊上心腹脹滿夜痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去白

紫蘇葉 當歸去酒浸 人參 甘草各半

右吹咀每服四錢水一鍾生藥五片生薑七寸煎至七分空

心温服

獨聖散 治胎前心腹諸痛胎動不安此藥安胎止痛行氣故也

若非八九箇月不宜多服月不宜多服

用砂仁不拘多少

右為細末每服一七熱酒或艾湯或米飲皆可調服如覺

胎中熱即安矣大抵妊娠不可缺此

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩夏一兩春秋七錢半冬五錢 白木不見火 陳皮各貳兩

茯苓柴錢半不見火

右為末丸服

衛生散 又名東胎散

大腹皮參錢 人參 陳皮 紫蘇葉各五分

白木 芍藥 歸身尾 甘草錢二

右作一服入黃芩五葉黃楊樹七箇此即黃陽樹葉稍兒也

胎前

或加**枳殼**以水煎食後服於八九箇月服十數貼甚得力夏月加**黃芩**冬不必加春加**川芎**或有別証以意消息于后氣虛加**參**氣實倍**香附****陳皮**血虛倍**當歸**加**地黃**形實倍**紫蘇**性急加**黃連**有熱加**黃芩**濕痰加**滑石**半夏食積加**山楂**食後易肌倍**黃湯**腦有痰加**半夏**腹痛加**木香****砂仁**

又方治難產

砂仁

香附醋煮

枳殼

甘草

右為末湯調下以**香油****蜜****小便**和勻各半鍾調**益母草****末**

白芷灰

百草霜

滑石

右為末用**芎歸**煎湯調下或**姜汁**服

天麻丸易產

天麻即益母草六月間連根採陰乾

左為末不拘多少煉丸如龍眼大臨睡時溫酒或化

一丸能除產後百病

催生丹產婦生理不順產育艱難或橫或逆大有神效宜天

醫書日合

十二月免腦去膜碾如泥

通明乳香細研

母丁香研為末

麝香研細

右以**麝香**拌勻入**免腦**和九雞頭大陰乾**油紙**密封

固臨產服一丸溫水送下立產男左女右手中握藥出神驗

風寒熱病

表虛六合湯至惡方若姪娘傷寒中風表虛自汗頭痛項強身

執惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯四兩桂枝地骨皮各半

表實六合湯聖賢方若姪娘傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊惡寒太

陽經病宜合

四物湯四兩麻黃各半細辛各半

風濕六合湯 聖惠方若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而瀉頭痛太陽標病也宜服

四物湯 四兩 防風 蒼木製各

升麻六合湯 聖惠方若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如

錦文宜服 四物湯 四兩 升麻 連翹各

柴胡六合湯 聖惠方若妊娠傷寒胃腸滿痛而脉弦少嗚頭昏

項強宜服 四物湯 四兩 柴胡 黃芩各

大黃六合湯 聖惠方若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉况

數陽明太陽本病也急下之宜服 四物湯 四兩 大黃伍錢 桃仁十個去皮

朴六合湯 聖惠方若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本

盧也宜服亦治咳嗽喘滿 四物湯 四兩 厚朴 枳實炒各

參六合湯 聖惠方若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯 四兩 人參 五味子各五

六合湯 聖惠方若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯 四兩 黃芩各五

大者宜服 聖惠方若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉長而

四物湯 四兩 石膏 知母各五

茯苓六合湯 聖惠方若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜服

四物湯 四兩 茯苓 澤瀉各五

琥珀六合湯 聖惠方若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者

四物湯 四兩 琥珀 茯苓各五

拾前

十九

方服

四物湯 四兩 阿膠

一方加 同上一方加 艾葉 各五

附子六合湯

聖惠方 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛

脈況而遲少陰病也宜服

前胡湯

大全良方 治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏 二錢 前胡 六分 甜竹葉 三分 黃芩

大青 各五分 知母 梔子 各四分

黃芪湯

聖惠方 治妊娠傷風自汗

右咬咀每服八錢水一盞半 煎至八分去滓溫服

不物時外臺無 黃芪 當歸 川芎

水生地黃亦可

百合散

濟生方 治妊娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合 蒸 紫苑 茸 洗 具母 去心 白芍藥

前胡 去芦 赤茯苓 祛 桔梗 各一分 甘草 錢五分

右咬咀每服四錢水一盞 煎至八分去滓溫服不物

馬兜鈴散

大全良方 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人参 甘草

具母 銹 五 陳皮 大腹皮 紫蘇

食下氣湯

大全良方 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食

右咬咀每服八錢 生薑 三片 水一盞半 煎至八分去滓食後

溫服

四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

換柳

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

官桂銘五

紫蘇二兩

右吹咀每服八錢生五片一枚水一盞半煎至八分去

滓食前服

下死胎

大全良方

下死胎

麝香另研五分

官桂銘三

右共和勻用温酒一盞調服須臾如手推下

子死腹中胎不下胞破不生此方累有

效驗

鬼曰不拘多少黃色者去毛

右研為末以手指撚之如粉極細為度此藥不用羅每服三

錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

王壽齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙甘草之苦温從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問服何飲食有無傷積胃弱飽悶噯氣惡食泄瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食可調者方用補血証法產後無得令虛當大補氣血為先雖有雜證以未治之一切病多是血虛皆不可發表產後中風切不可作風治必大補氣血為主然後治痰當以左右手之脉分其血氣多少而治產後中風口眼喎斜切不可服下續命湯產後水腫必用大補氣血為主少佐蒼朮使水自利產後大發熱必用乾薑輕者用淡豨其

挑一應寒苦并發表之藥皆不可用產後發熱惡寒皆屬血虛左手脉不足補血藥多於補氣藥惡寒發熱腹痛者當去

惡血腹痛者不是產後發熱不通及膨者無子當消用
交藥 二兩炒研細末 **清湯** 調下作四服有子者用 **木通通草**
省 煎服九產後有病先固正氣前條云產後大熱必用 **乾**
姜 或曰用 **姜** 者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳
故以補陰藥大劑服之且 **能入肺和肺氣入肝分引血**
藥生血然不可獨用必與補陰藥同固此造化自然之妙非
天下之至神孰能與於此乎產後脈洪數產前脈細小澁弱
多死懷孕者脈主洪數已產而洪數不段者多主死

一方產後補虛

人參

白木 絡一

茯苓

歸身尾

陳皮

川芎 絡半

甘草 炙三

有熱加黃芩 一

生薑 三片水煎服

產後血塊方

滑石 三

沒藥

血竭 各二 子如無以
壯用皮代之

右為末 **醋糊** 丸如惡露不下以 **五靈脂** 為末 **神麩** 丸 **白木** **陳**

皮 湯下 **瓦龍子** 能消血塊

又方治產後泄瀉

黃芩

白朮

川芎

茯苓

乾姜

滑石

陳皮

炒芍藥

甘草 炙

右吹咀水煎服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂

香附

一方加蛤粉

右為末 **醋糊** 丸甚者入 **桃仁** 不去尖用

參木膏 治產後胞損成淋瀝証

人參 半

白朮 二

桃仁

陳皮

茯苓 絡一

黃芪 半

甘草 炙五

右吹咀水煎服 胞後入藥作一服

奪命丹 濟生方 治產後血人衣中脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子炮去皮 牡丹皮心法 乾漆炒令烟尽

右為末用**酸醋**一升**大黃末**一兩同熬成膏和藥丸如梧桐子大每服五十九**溫酒**送下

花藥石散 治產後胎衣不下極有神效 方見跌撲門

益母丸 治生產一十六証一名益母丸

野天麻一名益母草方梗四五月節間紫花葉子陰乾半斤木香五子赤芍藥六子當歸七子

右同為末煉**蜜**丸如彈子大每服一九隨飲子下

子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青**童便**和勻煎沸化下○產後惡血不盡臍腹刺痛**童便**和**酒**化下○

產時面垢額赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生不順心悶

欲死**童便**和**酒**自然汁和勻化下**溫酒**亦可○產後三四

日起臥不得眼暗生花口乾煩燥心亂見鬼狂言不省人事

童便和**酒**化下○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼溫

米飲下○產後浮腫氣喘小便澀咳嗽惡心口吐酸水脇痛

脇痛無力**酒**下○產後寒熱如癢臍腸作痛**米湯**下**桂枝湯**

亦可○產後中風牙關急七吐身不遂失音不語**童便**和**酒**

下○產後大便秘心煩口渴**童便**化下**薄荷**自然汁亦可

○產後痢疾月未滿食冷物與血相擊或有積**東湯**化下○

產後身體百節疼痛溫**米飲**下○產後崩中蓋是傷酸物狀

如雞肝脊背悶倦**糯米**去**元湯**下**桂枝湯**下亦可產後食熱

麵壅結成塊**四枝**無力睡後汗出不止月水不調久成骨蒸

勞**童便**和**酒**下○產後嘔逆虛脹**酒**下○產後鼻衄口乾舌

黑**童便**下○產後赤白帶下**秦元**同**糯米**煎湯下

黑神散 和**酒**方治婦人產後惡露不尽胎衣不下血氣攻心眩

暈等証

黑豆炒半斤

熟地黄

當歸酒浸去芦

肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

濟生方除

痛黃亦除

右為末每服二錢熱酒調下

清魂散

濟生方

治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或漆器

燒烟鼻中薰之頻置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉

人參去芦一兩

荆芥穗兩

甘草炙

川芎式兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

愈風散

聖惠方

療產後中風不省人事口噤牙緊手足痲痲如

角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心眼倒吐瀉欲

死

荆芥穗燂

當歸身尾

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神

口噤者幹開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麩糊丸如

梧子大每服五十九空心米湯下

人參湯

宋類鈔方

治產後諸虛不足發熱盜汗

人參法

歸身

右等分為末宿搜一隻去膜切片子以水三升糯米半

合二二葦煮取孰取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘

時服

大全良方

治婦人寒熱頭痛嘔吐不欲食脇下痛嘔逆

痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘡并經水適來適斷病

後勞後餘熱不解

柴胡四分

黃芩

人參

甘草各一分

右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時服

漢防已散

大全良方

治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮

商陸

甘草各七錢半

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓温服

無特一方空心服

參蘇飲

聖惠方

治婦人產後血入於肺面赤發腫欲死者

人參為末

蘇木二兩碎

右用水二碗煮取一碗去滓調人參末隨時加減服

玉露散

大全良方

治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛

大便澁滯悉能滯之涼膈壓熱下乳

人參

白茯苓

甘草各半

桔梗炒

川芎

白芷各一兩

當歸半錢

芍藥七錢

右吹咀每服四錢水一鍾半煎至七分去滓温服食後如頭

熱甚大便澁加木香二錢半

治因乳汁少

瞿麥穗

麥門冬心法

王不留行

緊龍骨

川山甲炮黃各

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服蒸以木梳

左右乳上梳三十餘下日三服

猪蹄

方

治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄七孔者

通草五兩

右將猪蹄洗净洗依食法事治次用水一斗同通草浸者次得四

五升取汁飲之

謂曰

婦人吹乳意如何

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盃調八字

須臾揉散笑呵七

理中

方見中寒門

蘇合香

方見咳嗽門

四物湯

方見調經類

論崩中帶下

下部出血不止謂之崩中穢液常流謂之帶下崩中失血多因衝任虛損榮道受傷得之冷帶雜下多因下焦不固內挾風冷得之是固然爾然崩中者投以**黃芩****白芍****赤石脂**者黑藥之屬血暫止而終不止帶下者投以**熟艾****艾葉****艾絨**之類帶暫歇而終不歇其故何哉經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣若虛則分肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其司耳况胃為血海水液會焉胃者中央之上又所以主肌肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌弱而膚空血之與水不能約制是以消亡漏卮休作無時而不暫停矣然則封之止之其可不加意於固衛厚脾之劑乎此**桂枝湯****白朮**以之固衛是活人書而**人參****白朮****茯苓****甘草****芍藥**以之厚脾二者俱不可闕也○雖然酒家嗜炙博亦有協熱而下血者此則**黃連****黃芩**所不可無肺經脉微亦主帶下此則**黃果****白朮**雖可燥水

亦須以**阿膠**佐之若夫帶之為患出於風冷停宿**官桂****乾薑**

辛白芷先與散其寒邪然後為之封固所貴擇之精而用之審

云○應婦人大小產及諸下血新瘡未得經久遽觸房事皆作崩中漏下二帶之疾又有月事久閉總得一通下部為風邪所搏致使敗瘀出而未及亦作崩中漏下黃水或粉紅滲漏無時其崩中下血不止者**震靈丹**三粒陳米并**香附**煎湯食前送下

又方**白朮****炮****薑****炒****中草****製****半夏****縮砂****香附****不香**等分姜

東煎服又方**白朮****劉碎**以**薑**和麵捏餅包裹炙令香熟

去**取****半夏**末之糯米稀糊圓麻子大每服伍十圓**芎歸湯****沉**

香降氣湯各半食空送下此皆止血之勝藥

附諸方**膠艾湯**和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及

妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠

芎藭

甘草二兩

當歸

艾葉炒 熟乾地黄 白芍藥各 四

右吹咀每服三錢水一盞酒半鍾煎八分熱服

富婦方 治婦人經脉漏下不止其色鮮紅飲食減

黃芪 橘皮 熟地黄各 半 蒼朮

白木 當歸 白芍藥各 一 炙甘草

柴胡 生地黃各 六

右吹咀煎服空心食前

柴胡調經湯 試効方 治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

可思飲食

羌活 蒼朮各 一 獨活 藁本

升麻各 半 柴胡各 七 乾葛 當歸

甘草各 三 紅花各 少許

右吹咀水煎去滓空心稍熱服取微汗立止

六神圖 治崩傷林瀝不已小腹滿痛常服益榮調經

吳茱萸湯 泡當歸各 半 熟地黄 白芍藥各 一

石菖蒲炒 川芎 人參 熟艾四 兩 熟米飲

右為末酒為丸如梧桐子大每服五十九酒飲任下

慶 十全良方 治衝任虛損以致經候過多又為風冷所乘

尺脉微細甚者司多開元百壯 禹餘糧各 一 艾葉

鹿茸去毛 赤石脂 附子焙 去皮各 半 兩 熟地黄酒 洗

柏葉 當歸酒 浸 續斷各 二 兩

右為末酒為丸如梧桐子大每服五十九酒下

涼血 治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守包絡

相火故血走而崩也

生苧 當歸各 五 黃連 黃栢

知母 藁本 川芎 升麻各 二 分

柴胡 羌活 防風各 三 黃芩

甘草炙

細辛

荆芥

蔓荆子各一

紅花少許

右吹咀水煎通口服食前

一方治婦人血崩不止

槐花一兩 棕毛灰五升

右為末水一鍾鹽少許煎七分去滓溫服

一方 大全良方

用棕白煨為末酒調二錢服

帶下方

暖宮妙丸治婦人赤白帶下

艾葉

龙骨

當歸

川芎

牡蠣

白芍藥

牡丹皮

茯苓

赤石脂

熟地黄各等分

右為末麵糊為丸梧桐子大服五十九空心湯下

白芷散

大全良方治婦人赤白帶下

白芷一兩 海螵蛸二个燒 胎髮一个燒

右為末空心酒調服二錢

富壽丸

濟生方治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦

瘦

當歸 酒洗

赤芍藥

牡蠣火煨取粉

熟苧 酒洗

阿膠

白芍藥

續斷 酒浸各一兩

地榆 半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九空心米飲下

丹溪方

治白帶因七情所傷而脈數者

黃連炒

扁柏 酒蒸

黃柏 半兩

香附 醋炒

白芍藥

白朮 各一兩

春根皮 炒二兩

白芷 燒存性三升

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十九空心米飲下

伏龍肝散

治婦人五色帶下 伏龍肝 炒 麥門冬 去心 赤石脂 各一 甘草

肉桂各五 川芎三兩 艾葉 熟地黄各二

乾姜燒七 當歸頭半斤

右吹咀水煎服或作末子米飲調下

丹溪方 治婦人有孕白帶

蒼朮三斤 白芷二斤 黃連炒二 黃芩炒二

白芍藥 山茱萸各二斤 椿根皮炒 黃柏炒各一

右為末糊丸 空心温酒下

丹溪方 治白帶兼風痛

半夏 茯苓 川芎 陳皮

甘草 蒼朮 黃柏酒炒 南星

牛膝各等分

右吹咀水姜煎服

一方 治婦人白帶

龜板炙 枳子各二兩 黃柏炒一兩 白芍藥半斤

香附半兩 乾姜錢半 山茱萸 苦參

椿根皮 且母各半

右為末酒糊丸 梧子大每服五十九丸空心米飲下

一方 治白帶或時腹痛

龜板酒炙 黃柏兩 乾姜錢一 枳子二錢

右為末酒糊丸 梧子大每服七十九丸服二次

桂枝湯 方見傷寒明

黃連湯 方見痢門

黃芩湯 方見痔類

加香降氣湯 方見諸氣門

血氣

血論

人具此陰陽即有此血氣氣陽也血陰也男以陽為主則陽勝

乎陰女以陰為主則陰勝乎陽氣血之為病男女則同耳人皆知百病生於氣又孰知血為百病之胎乎血猶水也水行乎地中百川理則無壅遏之患人之血脈一或凝滯於經絡腸胃之間百病由此而根矣乍寒乍熱發黃發斑讖妄驚狂煩悶嘔惡癡痰自汗開熱虛勞尿淋漏崩吐衄咳唾以至眩暈厥冷昏遺迷忘塊痛癢疹起止遺溺凡此數證非血而何經所謂先去其血然後調之良有以也夫血得寒則閉凝得熱則宣流榮氣虛竭風冷交侵固易為虛勞月閉之證其若出血等類大抵多因蓄熱致之榮道一開鮮血亦為之不禁矣則曰當歸血中上藥也出血諸證每以胃藥收功蓋心主血肝藏血胃者又所以生其血而能使真氣歸元故其血自止經又云乎血隨氣行氣逆則血逆於此尤當加意

血疾證治

血崩當歸湯加南木香下震靈丹

血崩帶下膠艾湯以海螵蛸炙黃刮碎和入同煎吞產寶固經

血氣虛損腰腹疼痛當歸建中湯加南木香若自汗則去木香

加人參白朮

嗽血咯血局方大阿膠圓加木香末少許略前食後服

肺熱嗽血金沸草散方見咳嗽類加桑白皮天門冬去心同煎

乘熱調大阿膠圓服

霍亂吐瀉七血不止正料合中湯方見諸氣類

大便下血芍藥湯加炒枳殼

口舌出血枳殼日乾為末傅之

血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒陰陽不相為守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是爾外證必有虛冷之狀法當溫中使血自歸於經絡可用理中湯加南木香或局方七氣湯方見諸氣類加川芎或甘草乾姜湯其效甚著又

血氣

方見諸氣類

有飲食傷胃或胃虛不能傳化其氣逆上亦令吐衄不香理中

湯 **五升圓** 治虛極而壅氣不歸元衄血喘嗽痰作來復丹 **黑錫丹**

震靈丹 **金液丹** 各一貼 **養正丹** 二貼右件別研細林米糊圓桐

子大每服三十圓空心生料理中湯加**木香**送下或沸湯調蘇

合香圓 下方見諸氣類 出血諸證每以胃藥收功用**木香理中湯**或**蘇合香散**二分

積殼散 一分 方見諸氣類 夾和米湯乘熱調下或真方**四君子**

湯 夾和**小烏沉湯** 米湯調下已上並用薑棗略煎亦得右藥不

惟養胃蓋以調氣輩與之並行若夫**桔梗枳殼湯** 方見諸氣類

夾和**二陳湯** 方見諸氣類 姜棗同煎入**蘇合香圓** 少許佐之又

調氣之上藥也 **蘇合沉麝丸** 治諸血諸氣痛不可忍

血竭 沒藥 沉香 辰砂 各一分

木香 麝香 各半分

右生為末磁器熬生**阿膠** 丸如皂子大每一丸薑盪湯嚼

下產後血痛氣痛並主之亦治脾痛 **桂香丸** 石月重木調心腹刺痛寒熱間作

當歸鬚 川芎 赤芍藥 牡丹皮

南木香 細辛 辣桂 並日乾 延胡索 各炒

乳香 沒藥 等分

右煮米醋將**阿膠** 為膏餘藥末之揉和為丸桐子大每服

服茶拾丸續命煎湯送下有熱多加**生湯**煎湯

調宗湯 治瘀血不消臍腹引腰背俱痛

川芎 當歸 芍藥 生乾地黄

三稜 莪朮 白芷 延胡索

蒲黃 香附子 澤蘭 細辛

川白姜 厚朴 製 桃仁 浸去皮焙 各二分

辣桂

半夏製

甘草炙

各三分

右劉散每服三錢薑棗煎食前服

縮砂湯

治胎動腹脇腰痛或忍痛失氣胎又不動或血水間下

縮砂

桑寄生各半

當歸

川芎

文葉炒

阿膠炒

南木香

甘草炙

各二分

右劉散每服三錢薑伍片棗兩枚煎服下血水者更以真料

理中湯加**縮砂**佐之

交濟散治血結作痛

生地黄

生取半斤

生姜

肆兩各洗淨同煎治留一火焙乾

右末每服二錢溫酒調下或男女血熱心煩或產後傷風則

以**煎木**煎湯調下

柴胡湯男女諸熱出血血熱蘊隆

柴胡二兩

黃芩

人參

甘草

炙各七分半

半夏製

各一字

右劉散每服三錢薑伍片棗二箇烏梅一箇煎服

桃仁承氣湯

治男女下焦蓄血小腹急痛内外有熱大便秘結

大黃半兩

桂枝

甘草

炙各二錢半

桃仁

浸去皮炒

芒硝別下

各一各半

右劉散分作三服每煎至臨熟入**芒硝**半錢再煎沸溫服以

通利為度

甘草湯

男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血

甘草

川白薑

等分

右劉散每服三錢食前煎服

加減四物湯

治血氣不足肢體乏力或瘀血腹痛或下血過多

當歸

川芎

白芍藥

乾姜

各半兩

南木香

甘草

各二錢半

右劉散每服三錢食前煎服若腹不痛則無瘀血更加**人參**

又能益血

半夏丸

治吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿虛腫亦消宿瘀

百病通用

圓白半夏刮淨洗扁以生薑汁調和飛白麩作軟餅包

右末米糊丸黍豆大日乾每三四剛温熟水下

黑散 諸竅出血並主之

隔年蓮蓬 敗棕簡 頭髮並燒存性等分

右為末每服三錢煎**南木香**湯調下或只用棕簡燒灰米湯

調下亦可

茅蘇湯 治吐血衄血

茅花 三錢 紫蘇莖葉 二錢

右散新汲水一碗煎七分乘熱調**生蒲黃**式錢旋服仍以大

蒜兩顆煨熟隨扁貼傳兩脚心少頃自覺胃中有蒜氣其血

立止若下部出血可以煨蒜傳兩掌心

豆蘇湯 治上焦有熱咯血痰血煩悶燥渴

黑豆 叁合 紫蘇葉 壹二 烏梅 兩箇

右水大碗同煎臨熟入薑汁叁大匙食後旋服

阿膠散 治肺破嗽血唾血

人參 伏苓 生乾地黃 天門冬水浸去心

此五味子 各一分 阿膠 炒斷 白及 各二分

右白及別為末餘藥劉散每服叁錢水大盞入蜜二大匙秋

米百粒薑伍片同煎臨熟入**白及**少許食後服

地黃煎 治肺損吐血嗽血

生地黃四兩取汁 鹿角膠一兩切碎炒黃

右為末拌和每服叁錢童子小便一盞煖熟入薑汁少許調

下無**鹿膠**則以**透明阿膠**炒酥代用

薏苡湯 治肺癰唾吐膿血

薏苡 二合 黑豆 百粒 烏梅 一箇

右水二盞煎一盞入**透明阿膠****生蒲黃**各一錢再煎沸食後服

艾薑湯 治大便秘下膿血

艾葉 一握

黑豆 百粒

右新水一大盞煎陸分入生姜汁三大匙稍熱服

又方

黃連 一錢

南木香 一錢 剉細慢火煎食前服

蒜連丸 治諸血妄行

黃連 一錢

獨頭蒜 一兩取肉研細

右入米醋些子搗和為圓桐子大日乾每叁四拾圓陳米飲下

人參湯 治吐血咯血

新羅人參慢火煎服

又方

人參

川芎

伏芎

半夏製 各叁分

甘草炒

右剉每服叁錢薑伍片煎服

羅蔔飲 治諸熱吐血衄血

生羅蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生羅蔔只

用羅蔔子一分微炒紫蘇葉半分坐散用煎亦效

血餘散 治吐血衄血

頭髮燒存性

右研細每服二錢米湯調下衄者更以少許吹入鼻

小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難其痛者謂之淋不痛者

謂之尿血

頭髮燒存性為末新汲水調下妙

又方

車前子但曬乾為末每貳錢以車前子葉煎湯調下

又方

海金沙為細末新汲水調下五淋散夾五苓散竹園尿

門冬草燈心葱頭煎湯調下

法製香附方 治諸下血

血論

廿四

大香附并去毛皮以童子小便浸一日夜

右為末每二錢米湯調下治冷帶用炒艾葉煎湯調下

又方

淨香附酒醋各半煮透焙

右為末黃秫米糊圓桐子大每四五十丸米湯下

又方 治血下帶下

香附并去皮二分鐘 艾葉三分米醋煮透曬焙

右為末林米糊圓桐子大每五六十丸艾醋湯或醋湯下

燒鹽酒 治血閉腹痛產後瘀血腹痛

新布數重包裹白鹽壹合灰火燒存性

右研細溫酒調下新布即青麻也能逐瘀血

桂枝酒 治打撲傷墜瘀血潤悶身體疼痛

辣桂

右為末每貳錢溫酒調下或用**桂枝**一分**大黃****當歸**各半分

每三錢**生薑****紫蘇**煎服取下黑物即安或未有藥倉卒且服

米醋一小盞亦散瘀血

朱砂丸 治打撲驚忤血入心竅不能語言

朱砂為細末

右以雞豬心生血和圓麻子大日乾每服七圓**石菖蒲**煎湯

下蒸湯亦可

略論

天門冬去心 青黛曬乾 生蒲黃

川姜黃 油髮灰絡

右末煉蜜丸桐子大每伍十九丸**松陽**中濕紙包煨香候

冷**酒白皮**煎湯臨卧嚼下柿能恋肺咯血屬肺嘔血屬脾

九竅出血方

荊芥酒煎通口服

又方 暴驚風九竅血其脈虛者

急驚風九竅血其脈虛者

靈砂百粒分三次
人參煎湯下
此蓋不可錯認血得熱則宣流妄用涼藥誤矣

又方
治傷寒嘔血繼而齒縫皆流血不止
開口川椒四十九粒

右用法醋大盞同煎臨熟入
三少許漱口含在口中少頃
吐出再啜漱而含

和劑良藥湯
治諸血作痛血運沉迷血澁難產一切出血過多

川芎

當歸 等分

右為籠散每服三錢水盞半取一盞稍熱服不拘時加

膠艾湯
治胎動腹痛漏血又名**宮藥湯**

經血淋瀝不斷
治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛

熟乾地黄 白芍藥 各四兩 當歸 去芦頭 艾葉 微炒 各三兩

阿膠 搗碎炒 令黃燥 芎藭 甘草 各二兩

右為籠末每服三錢水一盞酒六分煎至八分去滓熱服空

心食前日參服病甚者連夜併服

產寶固經丸

赤石脂 煨 艾葉 補骨脂 木賊 各半兩

附子 一枚

右末陳米飲和凡梧桐子大每服伍拾丸食前溫酒送下

澤蘭丸
治氣血不調肢體瘦弱

熟乾地黄 一兩半 澤蘭 去枝梗 人參 去芦頭

黃耆 去頭 牛膝 去芦 亦石脂 各一兩 白茯苓 去皮

木香 草薢 附子 皮 續斷 各三分

乾薑 炮 肉桂 去麋皮 芎藭 白木

當歸 宿對碎微炒 甘草 炙 各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服參十圓溫米飲下空心食

前產壹百日内每日常服壯氣益血

當歸建中湯
治婦人一切血氣虛損 方見虛汗門

和利大阿膠元

方見咳散門

和中湯治胃脇逆冷心腹疔痛

方見泄瀉門

和利來復丹

配類陰陽扶虛補損治心腹冷痛小兒慢驚風或

吐利不止變成虛風搖擗者非風也胃氣欲絕故也用伍粒
研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上
搶悶絕并惡露下上及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽
益精神散腎陰濕止腹脇冷疼應諸疾不辨陰陽證並宜服
之方見暑門

震靈丹

方見濕門

和利黑錫丹

升降陰陽暖脾補腎氣衝胃腹膨脹刺痛方見癰

和利金液丹

固其氣治衄血方見脾胃類

養正丹

治婦人血氣帶下腹痛助陽接真升降陰陽方見商冷

小烏沉湯

調中快氣治心腹刺痛

烏藥去心

香附子沙盆內折去皮

毛焙乾解二兩

甘草一分

有為細末每服壹錢鹽少許或不著鹽沸湯點不拘時

參天白木散

方見虛勞門

附諸血

諸血方論

內經曰大怒則形氣絕而血菀於上又曰怒則氣逆甚則吐血
又曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰濕淫汗出為衄衄
又曰脾移熱于肝則為驚衄胞移熱于膀胱則癰而溺血又曰
結陰者便血一升再結二升三結三升劉宗厚曰經云榮者水
穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脉也源七而來生
化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目
得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足
得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡
潤宣通者由此使然也注之於脉少則瀆冗則實常以飲食日

諸血

黃帝內經卷之十六

廿七

如此失血豈不皆由氣濁遇熱妄行之所致也大抵治血莫先清氣七清則血和氣濁則血乱斯言信矣大凡失血當先辨其血出何經當用此經清氣之藥然後涼血審其虛實調治之東垣云傷寒家衄血者仲景言不可發汗蓋為脉微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯脉已微者二藥俱不可用宜黃芩芍藥湯主之經曰諸見血身熱脉大者難治是火邪勝也身凉脉靜者易治是正氣復也故脉訣云鼻衄吐血沉細宜忽然脉大即傾危此之謂也

犀角湯治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣湧泄為衄血或清道閉塞流入胃嘔吐出清血如鼻衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之 方見声音門

小柴胡湯治初見血及血多宜服

熱共 一錢 生地 五分 當歸 川芎 各七分
柴胡 黃芪 牡丹皮 各五分 升麻

右以水煎服血不止可加**桃仁**五分**酒大黃**斟酌虛實用之內部去**芍藥**升麻

人參飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血
人參 去芦 三分 黃芪 一錢 五味子 五个 白芍藥

甘草 各錢 當歸身 三分 一麥門冬 二分
右件為粗散分作二服每服水一盞八分前至一盞去滓稍熱服

養血飲子 拔粹方 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血 方見內傷門

歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致友行或吐血下血 方見家傳門

是齋解毒散 簡易方治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食執道煎燻一切發風之物

白木 二兩

人參 去芦

白茯苓 各

黃芪 各

山藥

百合 去心各

甘草 各

柴胡

前胡 各

右咬咀每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎六分温服

黃連解毒湯 治積熱吐血咽膈不利並見大門

龍腦雞蘇丸 治喘咳或吐血衄血方見積熱門

養心湯 治心虛為邪氣所傷吐血方見虛勞門

四生圓 良方治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生柏葉

生地黄 各

右研爛丸如雞子大每服一九水三鍾煎至一此濾过温服

總散 濟生方治吐衄不止

生藕汁

生地黄汁

大薊汁

生蜜 半匙

右件藥汁調和令勻每服每服一小鍾不拘時服

雙何散 至惠方治卒暴吐血

藕節 七个

荷葉 七个

右同搗細水二鍾煎八分去滓温服或研末蜜調下

枇杷葉散 治暑毒攻心嘔吐鮮血方見中著門

但相散 治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其血如湧泉口鼻皆流不止服此即安又治男子婦人九竅

出血

人參 去芦

荆芥穗 各

側柏葉 各

右為末每服三錢入飛羅包三錢拌和汲水調粘相以服

治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血

高花 二兩

黃連 四兩

右為末以**大黃**末熬膏子丸如梧桐子大每服一百丸温湯

黃連解毒湯

四

下或前服亦可

丹溪云涼血行血為主大抵與吐血同

犀角湯 和劑方 固真氣治衄血 方見氣血門

生地黄散 河間方 治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枳椇 柴胡 黃連 地骨

白芍 甘草 天門冬 黃芩

黃芪 生芩 熟芩 各

右吹咀水前煎若下血加地榆

齒根散 治鼻衄不止 力並見鼻門

○鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出凡鼻衄並以

止衄散 特進折二津仍令以麻油滴於鼻或以

亦可又

對牛乳好外迎法以井花水溫過頂上

貼之左鼻衄以左手手中指右出扎右手手中止俱出兩手
俱扎或炒黑蒲黃吹鼻中或龍骨末亦可

止衄散

黃芪 赤茯苓 白芍藥 當歸

生芩 阿膠 各三

石為末每服二錢食後黃芪湯調下

麥門冬飲 治鼻衄川芎三黃散治實熱衄血 並見鼻門

清肺飲 治衄血吐血久不愈者

五味子 麥門冬 當歸身 人參

生地黄 各五 黃芪 二錢

右吹咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服用

氣衝出血立愈

一方治鼻不止

用茅花塞鼻中外用茅花濃煎湯服

咯唾血

咯唾血者由於腎也又有痰血內積肺氣壅遏不能下降用天

門冬麥門冬知母貝母桔梗黃芩熟地黃或加乾姜

丹溪云痰帶血絲出者用黃汁青黛童便入血藥中用如

四物湯加地黃牛膝膏之類主之

阿膠圓治肺破嗽血唾血方見前氣血門

一方治痰中見血

牡丹皮 白木各一錢 當歸 芍藥

桃仁研 貝母各一錢 山梔炒黑 黃芩各八分

桔梗七分 甘草三分 青皮五分

右以水煎服

又方治痰中血

牡丹皮 白木各一錢 貝母 芍藥

桑白皮 桃仁研 甘草三分 山梔炒黑

右以水煎服

又方治痰中血

橘紅二錢 五味竹五 甘草三分 人參五分

半夏 茯苓 白木 枳殼

桑白皮 黃芩各一

右以水一鍾姜三片煎服或加青黛二錢

雞蘇葉 黃芪 生地黃洗淨 阿膠

貝母去心 白茅根各一兩 麥門冬去 桔梗去 茸

甘草各五錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分温服

連阿膠丸 濟生方治勞嗽血唾血方見咳嗽門

咳嗽血

丹溪云火升痰盛身熱多是血虛用青黛調子貝母海

諸血

石山龍子為末蜜同姜汁丸噙化嗽盛者加後以**加**
減調理痰盛者更加痰者主之

局方治嗽血咯血**金沸草散**治肺熱嗽血並見咳嗽

疾本神效治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱

咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之方見虛勞門

咳血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽方見咳嗽門

接粹方治虛執昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

黃芪防風荆芥略一雞蘇葉錢薄荷

桔梗川芎甘草菊花

生地黃各半片腦五分

右為末煉丸如彈子大每服一九用去心煎湯送

牙宣

戴氏曰牙宣有二證有風壅牙宣有腎虛牙宣風壅牙宣

散擦之仍服腎虛牙宣以腎主骨牙者骨之餘虛而上炎故宜

帶涼劑而愈其著此屬腎經下虛上盛宜**鹽湯**下**安腎丸**間

仍用**姜鹽炒香附**黑色為末指擦其妙不可言也

消風散方見傷風門**安腎丸**方見水飲門**黑錫丹**方見癩冷門

巢氏曰肝藏血心之液為汗言肝心俱傷於邪故血從膚腠而

出也名曰肌衄

治肌衄

用男**脂髮**燒灰薑之立効

弱血

巢氏云心主於血與小腸合若心家有熱結於小腸故小便血

也血虛者**四物湯**加**牛膝膏**實者**當歸承氣湯**下之

瘧痢散治尿血**實味散**治血淋尿血**瞿麥湯****姜蜜湯****五苓**

諸血

散並治小便尿血 方前見諸淋門

小煎飲子 治下焦結熱血淋尿血

生草

小薊

滑石

通草

淡竹葉

蒲黃炒

藕節

當歸酒浸

梔子炒

甘草各半兩

右用水煎空心服

當歸承氣湯

當歸

厚朴

枳實

大黃

芒硝

右剉水煎

便血

大便下血者皆由五臟傷損所為臟氣既傷則風邪易入積熱在內而大便下血治宜四物湯加炒山梔升麻秦艽阿膠虛者加乾姜溫散之

法制香附方

治諸下血

方見氣血門

黃連香附方

治伏暑純下

鮮血

方見暑門

敗毒散

治風熱流入大腸經下血不止

方見中寒門

胃風湯

治風濕乘虛入於腸胃或下瘀血

方見劇明

當歸和血散

治腸癖下血濕毒下血

槐花

青皮各陸

當歸身

升麻各式

荆芥穗

熟地黃

白木各陸

川芎肆分

右為末每服二三錢清米飲調下

一方治中毒下血

用嚼皮燒存性研細每服二錢水調下日進三服

腸風下血方

別有腸風門類故不載矣

拾遺

服氣方

明白礬

黃丹入麝少許末之傳

拾遺

卷之六

四十四

白礬研飛過臨臥以紙襯棹上神手托壁柱以**礬**擦腋下
令熱痛即換衣着舊衣用**灰汁**洗

又方好**綠礬**半生半煨為細末入少**鹽粉**研細每半錢七浴後
以**生薑汁**調擦候十分熱痛即止

又方治液下遺臭不可向邇

大蜘蛛一箇以**黃泥**入少**赤石脂**并**鹽**杵為窠子納裏

蜘蛛燒令通紅候冷取**蜘蛛**研細入**輕粉**一字**米醋**調膏臨

臥浴淨傳之腋下來早瀉黑汁惡物為効埋之僻處

又方夜月少為末用**敗汁**調傳

跌破出血方為末用**敗汁**調傳亦治湯火傷爛

頭破傷風方大**黃**末水調塗四圍水出為効

失欠頰骨差方次酒令醉**痛**散入鼻嚏即止

脚筋疼痛頭暈方大**川椒**炒出汗

辣桂 川白姜 華陰細辛各一分

右為末 酒麩糊圓桐子大每柒拾圓食前溫下

附諸雜方

田螺散治體氣 患此疾者因內有油濕是

用**大田螺**一枚水中養之俟**靨**開以**巴豆**一粒去殼將**靨**挑

巴豆放在內取去拭乾仰頓盡內夏月一宿冬月五七宿白

然成水取搽腋下絕根

一方先用**麻脂**搽腋下其出狐臭之處黃色就將前說**巴豆**

螺去**靨**掩於狐臭之上**絹帛**勒緊其狐臭從大便出則絕根

矣

一方

用熟蒸餅一箇擘開作兩邊搽蜜陀僧細末一錢急夾在腋
下畧睡少時俟冷熱之除根

附國倉法

德壽軒遺卷五

田螺

倒倉法治癰勞蠱癩等証推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二拾斤或拾伍斤順取長流急水於大鍋內煮候水乾少再添湯不可用冷水以肉爛成粗為度瀝去滓用肉湯再熬如琥珀色隔宿不喫晚飯大便秘者隔宿進神芎丸不秘者不用五更於密室不通風處溫服一鍾伺隔間藥行又續服至七八鍾病人不欲服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯溫之病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須緊服又不可太疎恐其不達臨時消息大抵先見下方可使吐瀉極吐下伺其上下積俱出盡在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐利後或渴不得與湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二椀非惟可以止渴抑者可以滌羨餘垢睡一二日竟肌甚乃與粥淡食之待三日後始與小菜美自養半月竟精神煥發形體輕健沉疴悉安矣大際中間飲至七八鍾時藥力經滲經終骨節搜逐宿垢

正邪寧不抵牾悉有急悶似痛非痛自然惡况此皆好消息邪不能勝正將就擒耳尤須寧耐忍受又於欲吐未吐欲泄未泄交作皆有惱括意思皆須歡喜樂受一以靜處之此等有犬牛日景象不先說知使方寸瞭然鮮有不將皇者矣未行此法前一月不可近婦人已行此法半年不可近婦人五年不可喫性急好淫不守禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起三鍾慢飲最緊要能行經隧中去丹溪曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉七積穀之室也倒者傾去積垢而滌濯使之潔淨也經曰胃為受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散積聚既久致傷中和諸病生焉今用黃芩牛其義至矣夫牛坤土也黃土之色也以順為德而効去乎健以為功者之者胃之樂也熟而為液無刑之物也橫散入絡由腸胃而滲透肌膚毛竅瓜甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃田薄曲折處以為栖泊之窠白阻礙津液氣血重蒸燔灼成

病自非剖腸括骨之神妙孰能去之又豈合勺銖兩之丸散所能竅犯其藩墻戶牖乎夫牛全重厚和順之性潤枯澤槁豈有損也其方出於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾養壽之一助也

附取法

獨聖散治中風痰迷心竅癩狂煩亂人事昏沉痰涎壅盛及治五疔心風等證

瓜蒂 不拘多少

右為細末每服一錢以藥酒調下

四靈散治證同前

瓜蒂 一升 人參 蘆花 一升 赤小豆 甘草 絡一

右為細末每服一二錢或少至半錢量情與之食後調下

四靈散治證同前

綠礬 赤小豆 猪牙皂角 不蛀者去皮改炙

明礬 二錢 葱管 藜蘆 五錢

右為細末每服半錢或一二錢以藥酒調下如牙關緊閉幹開灌之

魚骨鯁方

魚骨鯁用白炭皮末 蘇葉 滑石 末和丸含口中津液嚥

下骨白隨下

治魚刺骨鯁在喉內

用香 樹 根 向下者用玉簪花根 同搗取自然汁 用匙或

竹筒盛汁 送入口內不可着牙着牙皆化累驗

附自縊法

凡自縊高懸者徐徐抱任解繩不得截斷上下安被卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按擄胸上數摩動之一人摩將臂脛屈身之若已強直但漸

屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開傷引
按不佳須臾以少桂湯及芎藭清灌令喉潤漸上能嚥乃止更
令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷
亦可救自暮至且陰氣盛為難救爾

附救凍死法

凡四肢直口噤只有微氣者用天全炒灰煖以囊盛熨心上冷
即換之目開氣出然後以芎藭清稍稍進之若不先温其心便
將火灸則冷氣與火爭必死

孫真人救落水法 醫方大成

急解去死人衣帶艾灸臍中即活

一方治風狗咬

用小兒胎髮炒新香附子野菊花研細酒調服盡醉

新刊仁齋直指附遺方論卷之二十六終

